

## CASO CLÍNICO 1

### Identificación

- Nombre: Laura
- Edad: 64 años (Fecha de nacimiento: 04/03/1949).
- Dirección y ciudad de residencia: Bucaramanga. Teléfono: XXX.
- Ciudad de origen: Málaga - Santander, residiendo en B/manga desde los 11 años de edad.
- Estado civil: Casada, con 4 hijos.
- Ocupación: Hogar y confecciones.
- Escolaridad: Quinto grado.
- Religión: Cruzada Cristiana.
- Recomendado por: XXX.
- Fecha de la consulta: 21/12/2012

### Síntomas subjetivos

#### **Padecimiento actual:**

- Dolor de cabeza que comienza a los 17 años de edad, presentándose diario desde hace 2 años, en la frente, lado izquierdo, que inicia con una punzada en esta zona, acompañándose de congestión nasal, y vómito si el dolor llega a ser intenso. Agrava en la mañana al levantarse de la cama, por la luz, el ruido, al comer chocolate, harinas en la noche, gaseosas oscuras o alcohol.

- Dolor de cabeza lado izquierdo, agrava en la mañana al levantarse, por la luz, el ruido, por licores (2-1).

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sensación de cabeza grande y congestionada, en la mañana al despertar, que mejora con el movimiento, desde hace 2 años.</li> <li>- Presión en el cuello, desde hace 3 meses.</li> <li>- Punzadas y prurito en el ojo derecho, iniciando hace 6 meses.</li> <li>- Dolor ardiente en el estómago, con distensión del abdomen, después de comer, especialmente tomate y fresa.</li> <li>- Frialdad de la pierna derecha constante, con disminución de la fuerza, desde los 56 años de edad (hace 8 años), 4 meses después de que le robaran 2 carros (de servicio público) y le secuestraran a su hijo por 7 días, causándole mucha tristeza durante un año, porque perdieron el trabajo de toda su vida al tener que vender la casa para cancelar la liberación de su hijo. Le diagnostican una neuropatía.</li> <li>- Ardor en el miembro inferior izquierdo, con adormecimiento. Agrava: después de despertar y por el calor.</li> <li>- Adormecimiento de las manos. Agrava en reposo, por la noche, al despertar. Mejora por el movimiento.</li> <li>- No soporta la ropa ajustada porque aumenta sus síntomas. Siempre usa ropa suelta.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sensación de cabeza agrandada, movimiento mejora (2).</li> <li>- Prurito en el ojo (1).</li> <li>- Dolor ardiente en estómago, después de comer (3).</li> <li>- Distensión abdominal, después de comer (2-3).</li> <li>- Frialdad de la pierna derecha (1).</li> <li>- Trastorno por reveses de la fortuna (1-2).</li> <li>- Dolor ardiente en miembro inferior izquierdo, agrava por calor (3).</li> <li>- Adormecimiento de miembro inferior izquierdo, agrava por calor (1-3).</li> <li>- Adormecimiento de las manos que mejora por el movimiento (1-2).</li> <li>- Presión de la ropa agrava (1).</li> </ul> |
|--|--|

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Orina ayudándose con una tabla para presionar la zona de la vejiga, desde hace 2 años, después de ser operada del prolapso de la vejiga y del útero.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Debilidad de la vejiga (1).</li> </ul> |
|--|---|

#### **Síntomas generales:**

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Clima: No le afecta ningún clima. Tiende a ser calurosa.</li> <li>- Apetito: Bien. No refiere deseos ni aversiones alimenticias.</li> <li>- Sueño: En general bien. A veces el dolor en el miembro inferior izquierdo la despierta.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sensación de calor (2).</li> <li>- Despierta con dolor (3).</li> </ul> |
|---|---|

#### **Antecedentes ginecoobstétricos:**

- |  |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menarca a los 16 años de edad.</li> <li>- Gestaciones: 4; partos: 3; cesáreas: 1; abortos: 0.</li> <li>- Salpingooclásia a los 42 años.</li> <li>- Menopausia a los 48 años de edad.</li> </ul> |
|--|

#### **Antecedentes personales:**

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- A los 4 años de edad su padrastro la golpeó con la hebilla de una correa en el ojo izquierdo, causándole sangrado en el ojo. A los 17 años de edad se da cuenta que no veía bien por ese ojo, y a los 27 años pierde totalmente su visión, por lo que le colocan una prótesis ocular (3).</li> <li>- Extirpación venosa en la pierna izquierda, a los 46 años de edad (1-3).</li> <li>- Operada por prolapso de vejiga y útero, a los 61 años de edad (1).</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pérdida de la visión en el ojo izquierdo por traumatismo (3).</li> </ul> |
|--|---|

### **Antecedentes heredo-familiares:**

- Padre: Falleció por asesinato cuando ella tenía 2 años de edad. No sabe nada de él.
- Madre: De 81 años de edad, con dolores e inflamaciones articulares (2). Carácter: Sumisa (1), tranquila (1), poco irritable (1).
- Abuelos: No refiere información.

### **Síntomas mentales y antecedentes psicosociales:**

- Su niñez fue “muy terrible” por los castigos de su padrastro. Le tuvo mucho resentimiento hasta los 52 años de edad (hace 12 años), superándolo al entrar a la nueva religión. El murió hace 10 años de una úlcera gástrica.
- Se casó a los 25 años de edad, con un hombre excelente.
- Su mayor tristeza en la vida ha sido el secuestro de su hijo y la pérdida de su capital.
- Se enoja por el dolor y, en general, por cosas simples. Poco llora.
- Después de la pérdida de su capital, se preocupa mucho por todo, por ejemplo, cuando sus hijos no la llaman.
- Miedos: a que su enfermedad la incapacite; a las serpientes, aumentando hace 8 meses al creer ver una en su jardín.
- Malicioso (3).
- Cólera por bagatelas (2).
- Lleno de preocupaciones (1).
- Miedo: de enfermedad inminente (2), a las serpientes (2).

### Síntomas objetivos

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tensión arterial: 110/80 mmHg; frecuencia cardíaca: 72 por minuto; peso: 72,7 Kg; talla: 163 cm.</li> <li>- Abdomen: Sin datos patológicos.</li> <li>- Extremidades inferiores: Venas dilatadas y tortuosas. La pierna derecha está fría al tacto.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Varices en miembros inferiores (1-3).</li> </ul> |
|--|---|

### Análisis

#### **Jerarquización:**

Síntomas característicos	Del hoy	Del ayer
<b>Mentales</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trastorno por reveses de la fortuna (1-2).</li> <li>- Cólera por bagatelas (2).</li> <li>- Lleno de preocupaciones (1).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Malicioso (3).</li> <li>- Miedo: de enferm. inminente (2), a serpientes (2).</li> </ul>
<b>Generales</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Presión de la ropa agrava (1).</li> <li>- Despierta con dolor (3).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sensación de calor (2).</li> </ul>
<b>Particulares</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dolor de cabeza lado izquierdo, agrava en la mañana al levantarse, por la luz, el ruido, por licores (2-1).</li> <li>- Sensación de cabeza agrandada, movimiento mej. (2).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pérdida de la visión en el ojo izquierdo por traumatismo (3).</li> </ul>

Síntomas característicos	Del hoy	Del ayer
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prurito en el ojo (1).</li> <li>- Dolor ardiente en estómago, después de comer (3).</li> <li>- Distensión abdominal, después de comer (2-3).</li> <li>- Frialdad de la pierna derecha (1).</li> <li>- Dolor ardiente en miembro inferior izquierdo, que agrava por calor (3).</li> <li>- Adormecimiento del miembro inferior izquierdo, que agrava por calor (1-3).</li> <li>- Adormecimiento de las manos que mejora por movimiento (1-2).</li> <li>- Varices en miembros inferiores (1-3).</li> <li>- Debilidad de la vejiga (1).</li> </ul>	

### Diagnósticos:

1. **Nosológico:** Migraña, neuropatía periférica, prolapso de vejiga y varices grado III en miembros inferiores. Tipo de enfermedad: Crónica miasmática.

2. **Individual:** Dos hechos marcan la individualidad de la paciente. Primero, el maltrato que sufrió en la infancia por parte del padrastro, que la hizo vivir en resentimiento hasta los 52 años de edad, superándolo gracias a profesar una nueva religión; y segundo, 4 años después, perder de un momento a otro el capital que había conseguido en toda su vida de trabajo, llenándola de pena hasta el momento actual, aunque refiere ya haberlo

superado. Este último suceso desencadena el hoy de la paciente y determina su síntoma rector: "Trastorno por reveses de la fortuna".

3. **Miasmático:** El miasma que actualmente está haciendo sufrir más a la paciente es la psora, y en menor intensidad los otros dos (1-2-3), coincidiendo en este caso con la cantidad de síntomas de cada miasma en el hoy de la paciente (psora: 10; sycosis: 6; syphilis: 6 síntomas). En la manifestación de los tres miasmas predominan más los síntomas sueltos que los intrincados. Se observan intrincaciones principalmente de psora-sycosis y psora-syphilis.

4. **Integral:** La herencia miasmática se puede valorar solamente por su madre, que es 1-2. La infancia es marcada por la sumisión y el resentimiento al padrastro (3-1), sin manifestación física. Sin embargo, la syphilis se desarrolla y ocasiona a los 27 años de edad la pérdida de la visión en el ojo izquierdo, y el daño venoso que termina en extirpación a los 46 años de edad (1-3). La syphilis entra en latencia debido a la nueva religión que hace superar el resentimiento. A los 56 años de edad se exacerba principalmente la psora con el suceso del revés de su capital, desencadenando la patología actual. Gracias a su buena fuerza vital, al amor de su esposo e hijos, a que aparentemente no hay obstáculos a la curación, y a que los miasmas están más sueltos que mezclados, es posible una buena respuesta curativa, aunque con limitaciones debido a su extirpación venosa (incurabilidad parcial).

5. **Medicamentoso:** Se eligen seis síntomas psóricos para repertorizar y se obtiene la siguiente tabla<sup>1</sup>:

Panel de síntomas 1		
1. MENTE - TRASTORNOS POR - fortuna; por reveses de	(8)	1
2. MENTE - PREOCUPACIONES; lleno de	(105)	1
3. GENERALES - VESTIMENTA - presión de la vestimenta	(53)	1
4. CABEZA - DOLOR - mañana; por la - levantarse - agr.	(74)	1
5. EXTREMIDADES - FRIALDAD - Piernas	(135)	1
6. VEJIGA - DEBILIDAD	(81)	1

<sup>1</sup> Todas las repertorizaciones del trabajo fueron realizadas con el repertorio computarizado Radar 10 (Archibel Homeopathic, 2012).

<i>lach.</i>	<i>hep.</i>	<i>nux-v.</i>	<i>lyc.</i>	<i>puls.</i>	<i>calc.</i>	<i>gastr.</i>	<i>sulph.</i>	<i>ars.</i>	<i>op.</i>	<i>thu-s.</i>	<i>sep.</i>	<i>saph.</i>	<i>dig.</i>	<i>nat-m.</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
10	9	9	8	7	9	9	9	7	7	7	7	7	6	6
1.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
2.	1	1	1	1	3	2	2	2	1	1	1	3	1	2
3.	3	2	3	3	1	3	2	2	-	1	-	2	-	2
4.	2	1	1	1	1	-	-	3	1	-	1	2	1	1
5.	3	2	2	1	1	3	2	2	2	2	3	2	-	3
6.	-	3	2	2	1	1	3	-	2	3	2	-	2	-

Se escoge como síntoma rector “Trastorno por reveses de la fortuna” y no “Trastorno por pérdida económica”, porque la paciente refirió tristeza al cambiar su situación de tener comodidades a no tener nada. La “pérdida económica” representa las consecuencias que desencadena perder cierta cantidad de dinero, sin la condición de quedar en la pobreza. La seriación miasmática del “Trastorno por reveses de la fortuna” es 2-1, pero se toma como 1-2 porque en ella predominó la pena.

De los medicamentos que arroja la repertorización se selecciona *Lachesis* por ser el medicamento que mejor cubre el caso del miasma predominante en el hoy de la paciente, incluyendo el síntoma rector. Si se observa, los demás síntomas correspondientes a los otros miasmas y a los síntomas del ayer, *Lachesis* también los presenta casi en su totalidad, lo que hace que con cualquier otro método clínico, seleccionando síntomas diferentes para su análisis y repertorización, posiblemente se obtenga el mismo medicamento, eso sí, sin la claridad del trasfondo miasmático y del pronóstico. En la selección de la potencia se toma en cuenta, además de otros parámetros, la no correspondencia miasmática entre la paciente y el medicamento *Lachesis*.

## Plan

Se prescribe *Lachesis* 0/6 LM<sup>2</sup>, dos veces al día (cuatro gotas en cada toma, sublinguales), y repetirlo cada 8, 4 o 2 horas en caso de mayor dolor. Se indican algunas recomendaciones en la dieta, de abstenerse de tomar analgésicos y se cita en un mes.

<sup>2</sup> El medicamento se da en alcoholatura, en un frasco gotero de 25 ml.

## Evolución 1

**Fecha:** 01/02/2013 (42 días después)

### Síntomas subjetivos

#### **Padecimiento actual:**

- Disminuye la frecuencia del dolor de cabeza desde el inicio del tratamiento, teniendo solamente dos recaídas, una en la primera semana del tratamiento, después de un enojo; y la otra, en la segunda semana, al inhalar detergente.
- Bien de la congestión nasal, que acompañaba al dolor de cabeza.
- Bien de la sensación de cabeza congestionada, pero recae en menor intensidad al terminar la medicina, hace 8 días.
- Refiere usar gotas hidratantes en el ojo derecho, que le ayuda al prurito.
- Bien del dolor ardiente en el estómago y de la distensión abdominal.
- La frialdad de la pierna derecha ya no es constante y en la noche es de temperatura normal.
- Sin cambio el dolor ardiente en el miembro inferior izquierdo (el que fue operado), que agrava por el calor y la ropa ajustada.
- Dolor de cabeza lado izquierdo, por cólera, olores fuertes (2).
- Sensación de cabeza agrandada (2), movimiento mejora (2).
- Prurito en el ojo (1).
- Frialidad de la pierna derecha (1).
- Dolor ardiente en miembro inferior izquierdo, con adormecimiento, agrava por calor (3).

- Disminuye importantemente desde el inicio del tratamiento el adormecimiento de las manos, permitiéndole trabajar mejor en sus quehaceres.
- Mejor de la incontinencia urinaria (síntoma no comentado en la consulta anterior), pero igual de la dificultad para orinar.
- Presión de la ropa agrava (1).
- Debilidad de la vejiga (1).

#### **Síntomas generales:**

- Sueño: Continúa a veces despertándose con el dolor en el miembro inferior izquierdo.
- Despierta con dolor (3).

#### **Síntomas mentales:**

- Se ha sentido mejor, y dice que ha vuelto el deseo de leer, ocupando su mente en cosas que le sirven, y disminuyendo un poco sus preocupaciones.
- Aunque todavía circunstancias simples la enojan, ya es menos frecuente.
- Lleno de preocupaciones (1).
- Cólera por bagatelas (2)

#### **Síntomas objetivos**

- Tensión arterial: 130/80 mmHg; frecuencia cardiaca: 72 por minuto; peso: 72,6 Kg.; talla: 163 cm.
- Abdomen: Sin datos patológicos.
- Extremidades inferiores: Venas dilatadas y tortuosas. La pierna derecha se palpa menos fría con respecto a la primera consulta.
- Varices en miembros inferiores (1-3).

## Análisis

Los síntomas bajo el tratamiento homeopático evolucionaron según la “cuarta observación”, es decir, mejoraron desde el inicio sin agravación; corroborándose el proceso curativo al presentarse tanto a nivel físico como mental. Como no se manifestaron síntomas diferentes al caso, no es necesario realizar una nueva jerarquización.

### **Diagnósticos:**

1. **Individual:** La paciente se encuentra más consigo misma, dedicando tiempo para su espíritu y disminuyendo la preocupación por los demás.
2. **Miasmático:** Continua 1-2-3. Si bien el medicamento se escogió solamente con síntomas del miasma psórico, se observa que actuó en su totalidad, mejorando síntomas de los otros dos miasmas.
3. **Medicamentoso:** Por la buena evolución de la paciente no se modifica el medicamento.

## Plan

Se continúa con Lachesis 0/6, 2 veces al día; y se cita en mes y medio.

## **Evolución 2**

**Fecha:** 21/03/2013 (48 días después).

### Síntomas subjetivos

### **Padecimiento actual:**

- Dolor de cabeza solo en una ocasión, por la preocupación que le generó el enterarse que su hijo quedaba sin trabajo, hace 20 días. No se acompañó del dolor punzante en la frente izquierda al inicio, ni de congestión nasal, ni de vómito.
- Bien de la sensación de cabeza congestionada, que no vuelve a recaer.
- Disminuye el prurito del ojo, y usa con menor frecuencia las gotas hidratantes.
- Permanece bien de la distensión abdominal y del dolor ardiente en el estómago; ya puede consumir los alimentos que antes le agravaban, como el tomate y la fresa.
- La frialdad de la pierna derecha no continúa mejorando, se mantiene igual que en el control anterior.
- Del dolor ardiente en el miembro inferior izquierdo refiere que mejoró un 50%, soportando más la ropa ajustada, y sin adormecimiento.
- Persiste igual la dificultad para orinar.
- Lleno de preocupaciones por otros (1).
- Prurito en el ojo (1).
- Frialidad de la pierna derecha (1).
- Dolor ardiente en miembro inferior izquierdo, agrava por calor (3).
- Presión de la ropa agrava (1).
- Debilidad de la vejiga (1).

### **Síntomas generales:**

- Sueño: No ha vuelto a despertar con el dolor en el miembro inferior izquierdo.

### **Síntomas mentales:**

- Se siente más tranquila, a pesar de la preocupación que le generó la falta de trabajo de su hijo.
- Menciona tener ánimo para realizar las cosas, por ejemplo, organizó e hizo cambios en la casa, cuando antes le era indiferente.
- Han disminuido sus estados de cólera.

### **Síntomas objetivos**

- Tensión arterial: 110/70 mmHg; frecuencia cardiaca: 70 por minuto; peso: 71,1 Kg.; talla: 163 cm.
- Extremidades: La pierna derecha se palpa fría, igual que en el control anterior; y varices.
- Varices en miembros inferiores (1-3).

### **Análisis**

La paciente continúa mejorando de manera integral, en lo mental, general y particular, aunque algunos síntomas físicos se han detenido en su proceso curativo debido al daño de los tejidos y de los obstáculos derivados de la cirugía (de las várices y prolapse de vejiga), correspondiendo la evolución de estos últimos síntomas, en cierto modo, a la decimotercera observación: “Mejoría corta, que se repite al tomar el medicamento”.

### **Diagnósticos**

1. **Miasmático:** Presenta disminución de síntomas en las tres enfermedades crónicas miasmáticas, haciéndose la sycosis muy poco activa en el hoy de la paciente, correspondiendo su estado actual a 1-3-2.
2. **Medicamentoso:** Lachesis, por la continuidad en su mejoría.

**Plan**

Se aumenta la potencia por la detención en la mejoría de algunos síntomas, suministrándose Lachesis 0/12, dos tomas al día (de 4 gotas cada una). Se dan indicaciones físicas para mejorar la circulación venosa y para continuar con la dieta sana. La paciente, hasta la fecha, no ha vuelto a control.

Historia clínica realizada por:

Dr. Iván Darío Navas Domínguez

2017