


**LA CLÍNICA  
HOMEOPÁTICA  
MIASMÁTICA  
EN  
CUADROS DE TEXTO**



**Dr. Iván Darío Navas Domínguez  
2019**



## CONTENIDO

Introducción .....	5
1. Historia clínica .....	7
1.1. Identificación .....	7
1.2. Síntomas subjetivos.....	7
1.3. Síntomas objetivos .....	15
1.4. Jerarquización .....	16
1.5. Diagnósticos .....	17
1.6. Plan.....	19
2. La selección de la potencia.....	20
3. Clasificación de las enfermedades .....	23
4. Clasificación de síntomas según lo miasmático, siguiendo al dr.	
Ortega.....	28
5. Clasificación de medicamentos según lo miasmático, siguiendo	
los conceptos del Dr. Ortega.....	52
6. La incurabilidad .....	54
7. Observaciones después de la prescripción .....	56
8. Ley de la curación .....	68



## INTRODUCCIÓN

Para tener a la mano durante la consulta homeopática una información rápida y concisa sobre clínica, que nos facilite la elaboración de la historia clínica, deducir el tipo de enfermedad a tratar, escoger los síntomas más importantes, realizar los diagnósticos, seleccionar la potencia y evaluar la respuesta del paciente al tratamiento, es que se ha realizado esta serie de “cuadros de texto”.

Los “cuadros de texto” son un resumen de los temas que se desarrollan en la página web “homeopatiapura.com”, en el menú “Para médicos”, por lo que invito a consultarla para su mejor comprensión e información de la bibliografía.

Los temas aquí tratados se basan principalmente en Hahnemann, Kent, y en los conceptos que desarrolló Proceso Sánchez Ortega sobre las enfermedades crónicas miasmáticas.



## 1. HISTORIA CLÍNICA

### 1.1. IDENTIFICACIÓN

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nombre:</li> <li>- Edad (y fecha de nacimiento):</li> <li>- Dirección y teléfono:</li> <li>- Ciudad de residencia:</li> <li>- Ciudad de origen:</li> <li>- Estado civil:</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ocupación:</li> <li>- Escolaridad:</li> <li>- Religión:</li> <li>- Acompañado por: (en niños, ancianos y enfermos mentales).</li> <li>- Recomendado por:</li> <li>- Fecha de la consulta:</li> </ul>
--	---

### 1.2. SÍNTOMAS SUBJETIVOS

<p><b>Síntomas subjetivos escritos tal como lo dice el paciente y sus allegados</b>, con las siguientes secciones (incluyendo algunas preguntas para orientar el interrogatorio):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Padecimiento actual y revisión por sistemas:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ¿Qué molestias o sufrimientos lo hacen venir a consulta?</li> <li>- ¿Hace cuánto tiempo inicio? ¿Cómo comenzó? Y ¿Qué causa le atribuye usted a su problema?</li> </ul> </li> </ol>	<p><b>Traducción o nitidez de los síntomas, y su seriación miasmática</b></p>
--	---

## 8 Síntomas subjetivos

<ul style="list-style-type: none"><li>- Si es un dolor o sensación, ¿Cómo es? ¿A qué se parece? Ardiente, calambroide, cortante, presivo, punzante, retorciente, como un clavo, etc.</li><li>- ¿Dónde se localiza exactamente la molestia?</li><li>- ¿A dónde se extiende?</li><li>- ¿Cuánto le dura y con qué frecuencia se presenta?</li><li>- ¿Cuál es el momento en las 24 horas del día en que se siente menos bien respecto al síntoma?</li><li>- ¿Qué le hace aumentar el sufrimiento? El movimiento, el reposo, de pie, acostado, durmiendo, la presión, el tacto, el calor o aplicaciones calientes, la luz, el ruido, comiendo, orinando, sudando, tosiendo, antes o durante o después de las menstruaciones, en soledad, en compañía, llorando, etc.</li><li>- ¿Cómo siente que se mejora o se alivia su problema? (Ver ejemplos de la pregunta anterior).</li><li>- ¿Al mismo tiempo, su molestia se acompaña de alguna otra?</li><li>- ¿De qué otras partes de su cuerpo sufre usted?</li><li>- ¿Qué medicamentos toma actualmente? Especificar su concentración, cantidad, frecuencia y el tiempo de consumo.</li><li>- ¿Qué efectos indeseados ha observado por la toma de los medicamentos?</li></ul> <p>2. <i>Síntomas generales:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ¿Cómo es su apetito?</li><li>- ¿Cómo es su dieta? ¿Qué acostumbra comer en cada comida y entre comidas?</li></ul>	Síntoma (1 o 2 o 3 o sus mezclas, por ejemplo: 1 - 3)
--	---

<ul style="list-style-type: none"> <li>- ¿Cómo se siente en general, antes, durante y después de las comidas?</li> <li>- ¿Cuáles son los alimentos que le hacen mal y por qué? Los alimentos dulces, salados, ácidos, grasos, irritantes; las frutas, las verduras, el huevo, la leche, etc.</li> <li>- ¿Qué alimentos le producen aversión o le repugnan?</li> <li>- ¿Cuáles son los alimentos por los que usted tiene un deseo marcado?</li> <li>- ¿Cuándo siente sed? ¿Cuánto bebe por vez y cada cuánto tiempo? ¿Qué desea tomar?</li> <li>- ¿Cuánto fuma usted por día? ¿Desde hace cuánto tiempo fuma? ¿Qué efecto le produce el tabaco?</li> <li>- ¿Cada cuánto toma alcohol, en qué cantidad y que acostumbra? ¿Desde hace cuánto tiempo?</li> <li>- ¿De las bebidas como el café, chocolate, té, aromáticas, gaseosas negras y energizantes, cuáles acostumbra a tomar? ¿En qué cantidad, frecuencia y desde hace cuánto?</li> <li>- ¿Cuáles medicamentos o factores externos lo enferman o le producen reacciones alérgicas?</li> <li>- ¿Qué clima le hace daño? El frío, el calor, lo seco, lo húmedo, las corrientes de aire, la lluvia, las tormentas, el sol, los cambios de temperatura.</li> <li>- ¿Cómo deja usted la ventana de su cuarto de noche?</li> <li>- ¿Cómo se abriga usted de noche en la cama? Y ¿Cómo se abriga en los días con tiempo más fresco?</li> </ul>	<p>Síntoma (1 o 2 o 3 o sus mezclas)</p>
---	--

<ul style="list-style-type: none"> <li>- ¿Qué partes del cuerpo tienden a ponerse frías o calientes? ¿En qué momento?</li> <li>- ¿Le molesta algo de su transpiración, por su cantidad, sitio, color, olor o circunstancias en que se presenta?</li> <li>- ¿Cómo tolera las ropas ajustadas, en el cuello, estómago, pecho?</li> <li>- ¿Cada cuánto acostumbra bañarse?</li> <li>- ¿Cómo es su vivienda? Los cuartos que tiene, su ventilación, luz y humedad.</li> <li>- ¿Con quiénes convive? Y ¿Convive con animales?</li> <li>- ¿Cómo es la distribución de sus actividades y diversiones? En el día, en la semana, en el año.</li> <li>- ¿Qué deporte practica, cuándo y con qué frecuencia?</li> <li>- ¿Cómo duerme usted? ¿En qué horario? ¿Si sufre de insomnio o somnolencia, cuál cree que sea la causa?</li> <li>- ¿En qué posición duerme y desde cuándo?</li> <li>- ¿Qué hace durante el sueño? Habla, grita, ríe, llora, se queja, se sobresalta, está inquieto, rechina los dientes, tiene los ojos entreabiertos, camina.</li> <li>- ¿Qué sueños se repiten? ¿Recuerda alguno que lo haya impresionado? ¿Para usted qué significa ese sueño?</li> </ul> <p>3. <i>Antecedentes y síntomas ginecoobstétricos (AGO):</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sobre la menstruación:</li> <li>- ¿A qué edad tuvo sus primeras reglas y a qué edad cesaron? ¿Se acompañó de alguna</li> </ul>	Síntoma (1 o 2 o 3 o sus mezclas)
---	-----------------------------------

<p>molestia?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ¿Cuál es su frecuencia, duración, abundancia, consistencia, color, olor?</li> <li>- ¿Cómo se siente antes, durante y después de las reglas, tanto física como emocionalmente?</li> <li>- ¿Cuántos embarazos, partos, cesáreas o abortos ha tenido, y se ha presentado alguna complicación en ellos? ¿El o los abortos fueron espontáneos o provocados? ¿Qué edades tienen sus hijos?</li> <li>- ¿Qué método usó o usa para el control natal y desde cuándo?</li> </ul> <p><b>4. Antecedentes personales (AP) (valorando en cada antecedente a que estado miasmático corresponde):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Especialmente en el paciente niño o joven: <ul style="list-style-type: none"> <li>- ¿Qué molestias o complicaciones tuvo la madre durante el embarazo y el parto?</li> <li>- ¿Cómo se sintió la madre emocionalmente durante el embarazo? ¿Se presentaron cambios en su personalidad? o ¿En sus gustos?</li> <li>- ¿Recibe o recibió lactancia materna o artificial? ¿Si no recibió lactancia materna, por qué?</li> <li>- ¿Presentó alguna dificultad en el desarrollo, por ejemplo, en la dentición, en el caminar o en el lenguaje?</li> <li>- ¿Qué vacunas ha recibido y cuál ha sido su efecto sobre su salud?</li> <li>- ¿Qué enfermedades ha tenido desde la infancia hasta ahora? Decir la edad en que se presentaron, sus complicaciones y si fue hospitalizado por ello.</li> </ul> </li> </ul>	<p>Síntoma vigente (1 o 2 o 3 o sus mezclas)</p>
--	--

## 12 Síntomas subjetivos

<p>Debe reiterarse sobre antecedentes de enfermedades de la piel y venéreas, por su importancia miasmática.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ¿Qué mordeduras, traumatismos u operaciones ha presentado? Decir la edad en que se tuvieron y sus complicaciones.</li></ul> <p>5. <i>Antecedentes heredo familiares (AHF)</i> (realizando la valoración miasmática de cada familiar por medio de sus síntomas):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- De sus padres, abuelos (paternos y maternos) y cónyuge:<ul style="list-style-type: none"><li>- Edades.</li><li>- Enfermedades que han tenido o tienen.</li><li>- Si han fallecido, anotar a qué edad, cuándo y su causa.</li><li>- El carácter o manera de ser de cada uno de ellos.</li></ul></li><li>- Antecedentes de otros familiares ( tíos y hermanos) de enfermedades como: mentales, de la piel, venéreas, cáncer, tuberculosis, asma, accidente cerebrovascular, hipertensión, diabetes, artritis, epilepsia, etcétera.</li></ul> <p>6. <i>Síntomas mentales y antecedente psicosociales o historia biopatográfica:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ¿Qué hechos emocionales intensos recuerda de su infancia y de su juventud?</li><li>- ¿Cuándo niño y adolescente, cómo fueron las relaciones con su padre, madre, hermanos, y como fueron entre ellos? ¿Actualmente como son?</li></ul>	Síntoma (1 o 2 o 3 o sus mezclas)
---	-----------------------------------

<ul style="list-style-type: none"> <li>- ¿Cuál ha sido su mayor tristeza en la vida? ¿Qué consecuencia ha tenido para usted? Amores contrariados, malas noticias, sustos, ira, indignación, humillación, etc.</li> <li>- ¿Cómo se define usted como persona? Sus cualidades y defectos.</li> <li>- ¿Qué concepto tienen de usted su cónyuge, familiares y compañeros de trabajo?</li> <li>- ¿En qué ocasiones o momentos está triste? ¿A qué hora en especial? ¿Por qué?</li> <li>- ¿En qué ocasiones llora? ¿Por qué? ¿Qué efecto le hace? ¿Cómo tolera las palabras de consuelo?</li> <li>- ¿Qué efecto le hace la soledad? ¿Y la compañía?</li> <li>- ¿Cuándo se ha sentido o se siente indiferente y hacia qué o quiénes?</li> <li>- ¿Cuándo siente o ha sentido remordimientos o sentimientos de culpa? ¿Por qué? ¿Cuándo se hace reproches? ¿Por qué?</li> <li>- ¿Cuándo o en qué circunstancias piensa o ha pensado en la muerte, o en el suicidio? ¿Por qué?</li> <li>- ¿Cómo ve el futuro, la vida?</li> <li>- ¿Qué piensa de su enfermedad y de sus posibilidades de curación?</li> <li>- ¿En qué momento se irrita o se nota más irritable? ¿Por qué? ¿Con quién en especial?</li> <li>- ¿Cómo manifiesta su ira? Hace gestos, se calla, alza la voz, grita, insulta, golpea, etc.</li> <li>- ¿El enojo le desencadena algún trastorno, ya sea mental o físico?</li> <li>- ¿Qué efecto le produce que lo contradigan, que</li> </ul>	<p>Síntoma (1 o 2 o 3 o sus mezclas)</p>
---	--

<ul style="list-style-type: none"> <li>- tengan una opinión contraria a la suya?</li> <li>- ¿Qué efecto le hacen las bromas? ¿Cómo las tolera? ¿Cuándo las hace usted?</li> <li>- ¿Qué efecto le hace que las cosas no estén en su debido lugar?</li> <li>- ¿En qué ocasiones siente o ha sentido celos?</li> <li>- ¿Cuándo desconfía? ¿De quién en especial? ¿Por qué?</li> <li>- ¿Cuándo ha sentido resentimiento u odio? ¿Contra quién? ¿Por qué?</li> <li>- ¿Cuándo tiene o ha tenido deseos de matar o ha deseado la muerte de alguien? ¿De quién? ¿Por qué?</li> <li>- ¿En qué ocasiones se ha sentido o se siente cruel, perverso, dañino, destructor?</li> <li>- ¿Ante qué situaciones se siente tímido?</li> <li>- ¿En qué situaciones o circunstancias se siente inseguro, inferior o disminuido?</li> <li>- ¿Cómo actúa cuando tiene que tomar una decisión?</li> <li>- ¿En qué ocasiones o circunstancias le gusta mandar?</li> <li>- ¿Cómo afronta los momentos de peligro?</li> <li>- ¿Cómo se siente respecto de hechos que van a ocurrir y en los que usted va a intervenir: entrevistas, exámenes, encuentros, reuniones importantes o no?</li> <li>- ¿En qué ocasiones y de qué tiene miedo? A las tormentas, oscuridad, de estar solo, a los fantasmas, en una multitud, de los animales, de que</li> </ul>	Síntoma (1 o 2 o 3 o sus mezclas)
--	-----------------------------------

<p>sucederá algo, a las enfermedades, a perder la razón, de morir, etc.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ¿Cómo soporta la espera? ¿En qué circunstancias es más impaciente?</li> <li>- Hay personas que hacen todo deprisa y otras con extrema lentitud, ¿Usted cómo es?</li> <li>- ¿Le gusta su trabajo? ¿Qué actividad desarrolla en él? ¿Cómo es la relación con sus compañeros?</li> <li>- ¿Qué efecto le hace el trabajo físico y el mental?</li> <li>- ¿Qué piensa del dinero y de cómo debe gastarse?</li> <li>- ¿Qué piensa de la mujer? (al hombre) ¿Del hombre? (a la mujer) ¿De casarse? ¿Por qué no se casó? (al soltero/a).</li> <li>- ¿Qué piensa de Dios o de la idea de Dios?</li> <li>- ¿En qué ocasiones se olvida y de qué?</li> <li>- ¿Cuándo se equivoca o se ha equivocado? ¿Qué errores comete? ¿Especialmente en qué?</li> <li>- ¿A qué edad tuvo su primera relación sexual?</li> <li>- ¿Hay algún problema en sus relaciones sexuales? ¿Cómo es su deseo sexual?</li> </ul>	<p>Síntoma (1 o 2 o 3 o sus mezclas)</p>
---	--

### 1.3. SÍNTOMAS OBJETIVOS

<p>1. <i>Observación del médico</i></p>	<p>Tanto en lo físico como en el comportamiento del enfermo durante la consulta.</p>
---	--

<b>2. Exploración física</b>	Signos vitales, medidas antropométricas y revisión de las partes del organismo que estén más enfermas.
<b>3. Exámenes de laboratorio y de gabinete realizados anteriormente</b>	Ayudan a conocer más las alteraciones fisiológicas y anatómicas, y a tomar medidas complementarias.

## 1.4. JERARQUIZACIÓN

<b>Síntomas característicos</b> <i>(Notables, extraordinarios, peculiares y singulares)</i>	<b>Del hoy</b>	<b>Del ayer</b>
<b>Mentales</b> <i>(Afecto, voluntad e intelecto)</i>		
<b>Generales</b>	Síntomas (1 o 2 o 3 o sus mezclas)	Síntomas (1 o 2 o 3 o sus mezclas)
<b>Particulares</b>		

## 1.5. DIAGNÓSTICOS

<i>Diagnóstico</i>	<i>Particularidades a definir</i>
<b>1. Nosológico o sindrómico</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- El diagnóstico de la enfermedad, según la alopatía.</li> <li>- El tipo de enfermedad que se va a tratar, según la clasificación de Hahnemann.</li> </ul>
<b>2. Individual</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- La personalidad o máscara, que se elabora por necesidad o imposición social.</li> <li>- La individualidad, lo más profundo de su ser, indagando: dónde, cómo, desde cuándo y quién está sufriendo.</li> <li>- El "hoy" del paciente y su "síntoma rector".</li> </ul>
<b>3. Miasmático</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lo miasmático del hoy, especificando primero el miasma predominante y luego los sucesivos, si existen.</li> <li>- La relación entre sí de los miasmas activos en el hoy del paciente. Puede darse que esté o estén activos o manifestándose: un solo miasma (estado simple); dos o tres miasmas, cada uno manteniendo su individualidad (estado compuesto), o dos o tres miasmas en un mismo órgano o síntoma, mezclándose (estado complejo).</li> </ul>

<i>Diagnóstico</i>	<i>Particularidades a definir</i>
<i>4. Integral</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- La herencia miasmática del paciente, por medio de los antecedentes heredo familiares.</li> <li>- La evolución de lo miasmático durante su vida, en lo físico, mental y social, por medio de los antecedentes personales y psicosociales.</li> <li>- La congruencia o incongruencia del “ayer” con el “ahora” del paciente respecto a la sucesión de síntomas.</li> <li>- Los obstáculos a la curación.</li> <li>- La intención curativa (lo que se debe curar) y la posibilidad curativa (lo que se puede curar).</li> <li>- Si el paciente es incurable, qué tipo de incurabilidad presenta.</li> </ul>

<i>Diagnóstico</i>	<i>Particularidades a definir</i>
<b>5. Medicamentoso</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- De los síntomas característicos del hoy, previamente jerarquizados, se toman en cuenta solamente los síntomas del miasma predominante.</li> <li>- De los síntomas del miasma predominante se elige el “Síndrome Mínimo de Valor Máximo”, incluyendo el o los síntomas “rectores”.</li> <li>- Se repertorizan los síntomas del síndrome mínimo de valor máximo.</li> <li>- Se escoge el medicamento entre los primeros obtenidos en la repertorización, corroborándose con la materia médica. El medicamento y el paciente deben, de preferencia, asemejarse también en lo miasmático.</li> </ul>

## 1.6. PLAN

- |   |
|---|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Medicamento homeopático, con su potencia y dosis.</li> <li>2. Dieta e indicaciones de higiene.</li> <li>3. Psicoterapia y la recomendación de lecturas que le ayuden.</li> <li>4. Continuación, disminución o suspensión del tratamiento alopático.</li> <li>5. Exámenes de laboratorio o gabinete.</li> <li>6. Complementación con otras áreas de la salud.</li> </ol> |
|---|

## 2. LA SELECCIÓN DE LA POTENCIA

Parámetros	Potencia		
	Baja (<12C; <0/6)	Media (30-200C; 0/6-0/12)	Alta 
1. <i>La clase de enfermedad</i>	Aguda, agudización miasmática, urgencias e indisposiciones	Aguda y agudización miasmática	Aguda y crónica
2. <i>El tipo de lesión o alteración</i>	Estructural	Fisiológica	Fisiológica y mental
3. <i>El estado de la fuerza vital</i>	Débil	Buena	Buena
4. <i>La intensidad de los síntomas</i>	Baja	Media	Alta

<b>Parámetros</b>	<b>Potencia</b>		
	<b>Baja</b> (<12C; <0/6)	<b>Media</b> (30-200C; 0/6-0/12)	<b>Alta</b> (>1000C; >0/30)
<b>5. La sensibilidad del paciente</b>	Hiper-sensible	Normo-sensible	Normo-sensible
<b>6. La edad del paciente</b>	Adulto mayor	Niños y jóvenes vigorosos	Niños y jóvenes vigorosos
<b>7. Los hábitos del paciente</b>	Vicios, drogas, malas dietas, exceso de trabajo	Buenos	Buenos
<b>8. La posibilidad curativa</b>	Incurable	Curable	Curable
<b>9. La clase de medicamento</b>	Superficial	Profundo	Profundo

<b>Parámetros</b>	<b>Potencia</b>		
	<b>Baja</b> (<12C; <0/6)	<b>Media</b> (30-200C; 0/6-0/12)	<b>Alta</b> (>1000C; >0/30)
<b>10. Correspondencia miasmática entre paciente y remedio</b>	No correspondencia	Si correspondencia	Si correspondencia
<b>11. La seguridad en la prescripción</b>	Dudosa	Segura	Segura

### 3. CLASIFICACIÓN DE LAS ENFERMEDADES

<i>Tipo de enfermedad</i>		<i>Definición</i>	<i>Tratamiento</i>
<i>Agudas - Individuales</i>	<b>1. Traumatismos</b>	Son trastornos patológicos por efectos <i>mecánicos</i> , como los causados por heridas, contusiones, esfuerzos, esguinces, luxaciones y fracturas. Incluye las intoxicaciones.	De tipo mecánico, que atenderá el médico personalmente o el especialista. Se puede dar un medicamento homeopático para ayudar a mitigar los sufrimientos o a reparar los tejidos.
	<b>2. Indisposiciones</b>	Son cuadros sintomáticos que derivan de alguna <i>causa excitante</i> (climática, alimenticia, impresiones físicas violentas, emocionales, etc.), produciendo síntomas <i>superficiales</i> que generalmente tienden a desaparecer por sí solos.	Indicar medidas higiénicas que faciliten la acción reparadora del propio organismo y, según el caso, ayudar con un medicamento homeopático, en baja potencia y a intervalos cortos.

<b>Tipo de enfermedad</b>	<b>Definición</b>	<b>Tratamiento</b>	
<b>Agudas - Individuales (continuación)</b>	<b>3. Agudizaciones miasmáticas</b>	Son explosiones <i>pasajeras</i> del estado latente de las enfermedades crónicas miasmáticas, que espontáneamente vuelven a tal estado, si la agudización no fue de carácter demasiado violento y suprimida prontamente. Tienen la apariencia de una enfermedad aguda, con los periodos de pródromo, desarrollo, estado y terminación.	Generalmente se dan medidas higiénicas. Puede ser necesario a veces un medicamento homeopático, pero hay que ser muy cautos. Cuando se deba al efecto de una buena indicación homeopática se procurará respetarla lo máximo posible y, según el caso, aumentar la frecuencia del medicamento.
<b>Agudas - Colectivas</b>	<b>4. Esporádicas</b>	Son las que, en un mismo momento, solo un <i>pequeño número</i> de individuos están <i>susceptibles</i> a sentir la acción de factores atmosféricos, telúricos o climáticos nocivos. Por ejemplo, cuadros catarrales luego de un cambio brusco de temperatura.	Pueden comportarse como indisposiciones o como agudizaciones miasmáticas, y su tratamiento corresponderá según el caso.

<b>Tipo de enfermedad</b>	<b>Definición</b>	<b>Tratamiento</b>
<i>Agudas - Colectivas (continuación)</i>	<b>5. Epidémicas</b>  Son enfermedades febres en las que <i>muchas personas</i> son atacadas simultáneamente, manifestándose con <i>síntomas muy semejantes</i> y provocados por la <i>misma causa</i> (epidémicamente); estas enfermedades se presentan con <i>síntomas diferentes</i> en cada nueva epidemia (por ejemplo, la gripe).	Debe investigarse los síntomas característicos de la epidemia reinante (lo que se denomina el “genio epidémico”) por medio del estudio de varios pacientes afectados por la epidemia, repertorizar, y tener una lista de medicamentos posibles para cada caso individual.  Si durante el tratamiento de las enfermedades crónicas miasmáticas aparecen <i>enfermedades intercurrentes</i> (epidémicas, miasmáticas agudas o esporádicas), se debe suspender el tratamiento antimiasmático y tratar el nuevo caso. Después de su curación, se continúa el tratamiento antimiasmático, ajustándolo al actual estado de enfermedad que permanece.

<b>Tipo de enfermedad</b>	<b>Definición</b>	<b>Tratamiento</b>	
<i>Agudas - Colectivas (continuación)</i>	<b>6. Miasmáticas agudas</b>	Son las producidas por <i>agentes infecciosos especiales</i> (miasmas agudos) que se caracterizan por reaparecer siempre bajo la misma forma (de ahí que se les conozca por algún nombre tradicional), pudiendo dejar inmunidad definitiva o no.	Se usara el o los medicamentos que contengan el genio epidémico (como se comentó)... y generalmente se requerirá repetición de la dosis, empleando potencias bajas o medias.
<i>Crónicas</i>	<b>7. Artificiales o medicamentosas</b>	Son las creadas artificialmente por los tratamientos alopáticos y las intoxicaciones medicamentosas, administrados en grandes y progresivas dosis.	Únicamente pueden ser remediatadas por la misma fuerza vital y bajo ciertas condiciones: si no ha sido demasiado debilitada; que nada perturbe su acción; que pueda disponer de varios años para este enorme trabajo, y ayudándola convenientemente, desarraigando algún miasma crónico que exista oculto en el fondo.

<b>Tipo de enfermedad</b>		<b>Definición</b>	<b>Tratamiento</b>
<b>Crónicas (continuación)</b>	<b>8. Aparentes o seudomiasmas</b>	Son las enfermedades que sufren aquellos que se exponen <i>continuamente</i> , por falta de <i>higiene</i> , a influencias patológicas evitables como: alimentos y bebidas dañosas, excesos o deficiencias de cosas necesarias para el sostén de la vida, viviendas insalubres, falta de ejercicio, trabajo mental o físico excesivo, preocupaciones constantes, disgustos, etcétera.	Estos estados de mala salud que la gente se ocasiona, desaparecen espontáneamente (con tal que no exista en el cuerpo ningún miasma crónico) mejorando el modo de vivir.
	<b>9. Naturales o miasmáticas</b>	Son las que se originan de un miasma crónico, y evolucionan al suprimirse su manifestación. Estas son: la psora, la sycosis y la syphilis.	Uso de medicamentos homeopáticos específicos para cada caso.

## 4. CLASIFICACIÓN DE SÍNTOMAS SEGÚN LO MIASMÁTICO, SIGUIENDO AL DR. ORTEGA

Seccio- nes	Síntomas		
	Psora	Sycosis	Syphilis
Mentales - Afecto	<p>Afectuoso, benevolencia, compasivo, humor llorón, sensación de abandono, tristeza, remordimiento, alegre, irritabilidad, ansiedad.</p> <p>Trastornos por: pena, nostalgia, infelidad, malas noticias, decepción, pérdida monetaria, remordimiento, castigo, rudeza de otros, vergüenza, mortificación, ansiedad, preocupaciones, anticipación, esfuerzo mental.</p>	<p>Altivo, presuntuoso, coqueta, sensible, descontento, humor cambiante, jovial, euforia, cólera, intolerancia a la contradicción, temor, asustadizo.</p> <p>Trastornos por: gozo excesivo, excitación, música, ruido, libertinaje, alcoholismo, ambición frustrada, egotismo, prisa, temor, susto, por reveses de la fortuna, peleas, contradicción, indignación, honor herido.</p>	<p>Falta de sentido moral, despreciativo, insensible, envidia, hipocresía, desagradecido, humor repulsivo, regocijo, aversión (a todo, a su esposo, a su esposa, a los niños), apasionado, sentimental, depravación, agrava por el consuelo, odio, malicioso o resentimiento, rabia, ateo, sensación de desvalido 1-3, angustia, terror.</p> <p>Trastornos por: rabia.</p>

Seccio-nes	Síntomas		
	<i>Psora</i>	<i>Sycosis</i>	<i>Syphilis</i>
<i>Mentales - Voluntad</i>	Timidez, pusilánime, dócil, cuidadoso, prudente, afabilidad, tranquilo, paciencia, resignación, dulzura, serio, reservado, confiado, ingenuo, lentitud, inactividad, falta de iniciativa, pereza, inclinación a sentarse, cansancio de vivir, aburrimiento, quejas o quejoso, pesimista, perseverancia, obstinado, desea la compañía, lascivo.	Falto de confianza en sí mismo, inconstancia, inquietud, hiperactivo, prisa, impaciencia, impetuoso, aburridor, optimista, hace muchos planes, bromas, payasadas, bailar, cantar, deseo de viajar, indiscreción, temerario, extravagancia, ambicioso, avaro, egoísta, cleptómano, chisme, locuacidad, laborioso, quejidos, caprichoso, dictatorial, sensual, impúdico, obsceno.	Brusco, desobediencia, contrario, anarquista, destructividad, crueldad, deseo de matar, suicidio, mutila su cuerpo, lamentase, aversión a la compañía, ocupado, caótico, corrupto, deshonesto, hipocresía, calumniar, maldice, blasfema, adulterio, morfínismo, libertinaje, homosexualidad, lujuria, ninfomanía, satiriasis, pedofilia, depravación.

Seccio-nes	Síntomas		
	<i>Psora</i>	<i>Sycosis</i>	<i>Syphilis</i>
<b>Mentales - Intelecto</b>	<p>Debilidad de memoria, concentración difícil, dificultad para estudiar, incapacidad de reflexionar, meditando, absorto, introspección, esfuerzo mental agrava, embotamiento, confusión mental.</p> <p>Pensamientos: repetitivos, persistentes, profundos, desagradables.</p>	<p>Memoria activa, concentración activa, poder mental aumentado, comprensión fácil, agilidad mental, facilidad para estudiar, distraído, fantasías, teorizador, ideas abundantes, clarividencia, ilusiones.</p> <p>Pensamientos: errantes, rápidos, sexuales, afluencia de.</p>	<p>Olvidadizo, no reconoce, postración de la mente, pérdida del poder mental, aversión al esfuerzo mental, inconsciencia, catalepsia, fanatismo, delirio, manía, insanía o locura, esquizofrenia, demencia, imbecilidad, idiocia.</p> <p>Pensamientos: aterradores, atormentadores.</p>

Seccio-nes	Síntomas		
	Psora	Sycosis	Syphilis
Sueño y Sueños	<p><i>Sueño:</i> somnolencia, bostezos.</p> <p><i>Insomnio por:</i> ansiedad, pena, irritabilidad, prurito.</p> <p><i>Sueños:</i> agradables, desagradables, enojosos, ansiosos, lleno de preocupaciones, tristes, llorando, de caída, de infortunio, agotadores, confusos, persistentes, continuación de los sueños después de despertarse, insignificantes, no los recuerda.</p>	<p><i>Sueño:</i> inquieto, ligero o superficial, sonambulismo 2-3-1, despierta frecuentemente.</p> <p><i>Insomnio por:</i> inquietud, temor, susto, excitación, fantasías, actividad de pensamientos, el más ligero ruido, por dolores.</p> <p><i>Sueños:</i> gozosos, cólera, inquietos, numerosos, vívidos, clarividente, visionarios, eróticos, excitantes, fantásticos, en un banquete, esfuerzo físico o mental, trabajo, con dinero, viajes, presentes en la memoria.</p>	<p><i>Sueño:</i> comatoso, profundo, despierta difícil, no reparador.</p> <p><i>Insomnio:</i> con delirio, a pesar del cansancio, total.</p> <p><i>Sueños:</i> absurdos, repugnantes, aterradores, pesadillas, peligro, accidentes, ladrones, luchas, peleas, fuego, serpientes, de caza, de muerte, cadáveres, asesinato, que es asesinado.</p>

Seccio-nes	Síntomas		
	Psora	Sycosis	Syphilis
Generales	Gente delgada, enanismo 1-3, detención en el desarrollo, debilidad, lasitud, cansancio 1-3, deseo de acostarse, pesadez, adormecimiento, falta de reacción, falta de calor vital, tendencia a resfriarse, escalofrío 1-2, palidez o blancura, anemia por carencia, estasis del sistema venoso, flacidez, relajación de músculos, esguince, luxación 1-3, sequedad de partes internas habitualmente húmedas.	Obesidad, sensación de calor, bochornos, congestión de la sangre, fiebre, transpiración, deseo de aire libre, estados alternantes y cambiantes, periodicidad, irritabilidad física, sensibilidad, intolerancia a la ropa, tensión, temblor, estremecimiento o tremor, estremecimientos nerviosos 2-1, pulsación, cosquilloso, hormigueo, todas las sensaciones anómalas.	Emaciación, caquexia, raquitismo, analgesia, cianosis, desmayo, colapso, arteriosclerosis, degeneración de los tejidos, atrofia, malformaciones, músculos y tendones acortados, constricción (sensación de banda), rigidez, estremecimientos o tics espasmódicos, calambres, convulsiones, corea, parálisis, hemorragia, apoplejía, ulceras, fistulas, abscesos, caries, necrosis de huesos, gangrena.

Seccio-nes	Síntomas		
	<i>Psora</i>	<i>Sycosis</i>	<i>Syphilis</i>
<b>Generales (Continuación)</b>	Venas varicosas por debilidad de las paredes venosas.  Hipotensión.  Pulso: blando, débil, esforzado, filiforme, casi imperceptible, intermitente, lento, pequeño, pesado.	Induraciones, hidropesía o edema, hinchazón, inflamación, tumores, contracción o estrechamiento o estenosis por inflamación, secreciones mucosas aumentadas. Venas varicosas por congestión. Hipertensión, diátesis urémica.  Pulso: aleteante, alámbrico, amplio o largo, audible, duro, contraído, excitado, febril, frecuente, fuerte, irritable, lleno, ondulante, sacudiente, saltón, tembloroso, tenso.	Secreciones mucosas: malolientes o fétidas, sanguinolentas, purulentas.  Venas varicosas: ulceración, sangrantes.  El cáncer es trimiasmático.  Pulso: anormal, discordante con la temperatura, doble, espasmódico, imperceptible, irregular, vacío.

Seccio-nes	Síntomas		
	<i>Psora</i>	<i>Sycosis</i>	<i>Syphilis</i>
<b>Generales - Dolores</b>	<p>Son los que tienen la tendencia a que el paciente se inmovilice.</p> <p>Aparecen y/o desaparecen gradualmente, cavante 1-3, constrictivo 1-3, dolores de crecimiento; dolorido o de magulladura, doloroso o continuo, entumecedor, lisiadura, moliente o triturante 1-3, paralítico, presivo o como de peso, como ráido o raspado 1-3, retorciente 1-3, sordo o embotante, como torcedura.</p>	<p>Aguijoneante o pinchante, como por una astilla, clavante 2-3, cortante 2-3, estremecimiento, errático, excavante 2-3, irradiante, lancinante 2-3, mordiente, neurálgico, ondulante, pellizcante, pulsante, punzante, roedor o royente 2-3, como si tuvieran los huesos rotos o de quebradura 2-3, sacudiente, taladrante o perforante 2-3, como un tiro o fulgurante, tironeante o tirante 2-1.</p>	<p>Agarrante o como de garra 3-1, ardiente o ardoroso, atormentante o torturante 3-1, calambroide 3-2-1, carne viva o como desolladura, escozor o escaldante o que escuece vivo 3-1, como hachazo, rasgante o desgarrante o arrancante, reventante o estallante 3-2, ulcerativo.</p>

Seccio-nes	Síntomas		
	Psora	Sycosis	Syphilis
Generales - Agravaciones y Mejorías	<p>Agrava: por la mañana (6 a 9 h), antes del mediodía (9 a 12 h), por frío, tiempo húmedo y lluvioso, al aire libre, baño, mojarse, invierno, otoño, al destaparse, cortando el pelo, movimiento, esfuerzo físico, parado, arrodillado, presión, agacharse, estirarse, viajando en carro, inspiración, ayunar, hambre 1-2, pérdida de fluidos, vomitar, amamantar, en general por todas las emisiones, estornudar, después del coito 1-3, pérdida de sueño, oscuridad.</p>	<p>Agrava: al mediodía (12 a 13 h), tarde (13 a 18 h) y al anochecer (18 a 22 h), cambio de tiempo, tiempo tormentoso, durante tormenta eléctrica, reposo, sentarse, acostado, contacto; al comer: una pequeña cantidad, demasiado, rápido; supresión de las secreciones naturales, durante y después de la fiebre, luz, luna creciente y llena.</p> <p>Mejora: por un breve sueño, al aire libre, viento, baño, otoño, primavera 2-1, actividad, movimiento.</p>	<p>Agrava: por la noche (22 a 6 h), durmiendo, al despertar, acalorarse, calor, exposición al sol, tiempo seco, tiempo claro, primavera, verano, música, hablar, bostezar, reír, respirando, inspiración, acostado, eliminación de flatos, vomitando, después de las funciones fisiológicas normales (como dormir, comer, menstruación, etc.), después de la transpiración, la transpiración no lo alivia.</p>

Seccio-nes	Síntomas		
	Psora	Sycosis	Syphilis
Generales - Agravaciones y Mejorías (continuación)	<p><i>Agrava (cont.):</i> antes de las funciones fisiológicas (como dormir, comer, la defecación, la menstruación, etc.), antes del escalofrío y la fiebre, durante la transpiración, luna menguante y nueva.</p> <p><i>Mejora:</i> durmiendo, al despertar, calor, verano, luz, música, magnetismo 1-2, reposo, acostado, sentarse, apoyarse, contacto, aflojándose la ropa, bostezar, inspirar, comiendo, después de comer, eructos, después de orinar, después de la menstruación.</p>	<p><i>Mejora (continuación):</i> esfuerzo físico, ascendiendo, descendiendo, parado, arrodillado, presión, doblar, cruzar los miembros, estirarse, fricción, viajando en vehículo, secreciones mucosas aumentadas, durante el coito, inspiración, estornudar, tabaco, durante o después de la transpiración, después de la defecación, diarrea, vomitar, durante la menstruación.</p>	<p><i>Agrava (continuación):</i> durante y después de la fiebre, comiendo, comer hasta la saciedad, eliminación de flatos, durante el coito.</p> <p><i>Mejora:</i> por el frío, tiempo frío húmedo, tiempo húmedo, tiempo nublado, al destaparse, invierno, oscuridad, ayunar, hemorragia, ruido.</p>

Seccio-nes	Síntomas		
	Psora	Sycosis	Syphilis
Cabeza	<p>Caída del cabello, fontanelas abiertas, sensación de adormecimiento, anemia cerebral, prurito, piojos, frialdad, pesadez.</p> <p>El vértigo será determinado miasmáticamente por su etiología, aunque en general es sycósico.</p>	<p>Casca, congestión, constricción o tensión, pulsación. Sensaciones anómalas como de: agitación, agrandada, bulto, casquete, pasa a través de la cabeza aire o viento, burbujeo, de crepitación, balanceo, tremor, vacío, etc.</p>	<p>Caída del cabello en placas, calvicie, hemorragia cerebral, reblandecimiento cerebral.</p>

Seccio-nes	Síntomas		
	Psora	Sycosis	Syphilis
Ojo y Visión	<p>Ojo: prurito, irritación, inclinación a restregarse, costras secas en los bordes de los párpados 1-2, sequedad, débil, pesadez, abertura difícil de los párpados, hundidos, caída de párpados 1 o 3, matidez o falta de brillo, mira fijamente 1 o 3, estrechez del canal lagrimal 1 o 2.</p> <p>Visión: borrosa, neblinosa, manchas, acomodación defectuosa, esfuerzo de la visión agrava.</p>	<p>Ojo: secreciones, lagrimeo, rubor, pannus, quemosis, mancha u opacidad de la córnea 2 o 3, vesículas, orzuelos, pterigion, tumores, condilomas, protrusión, tensión, glaucoma 2-3, brillante, vidrioso, fotofobia, pupilas dilatadas, abiertas al dormir, pulsación, guiño, tremor.</p> <p>Visión: aguda, de colores, objetos resplandecientes, chispas, estrellas, relámpagos, llamas, ígnea, ilusiones, los objetos parecen distantes, diplopía, poliopia, movediza, ondeante, zigzags.</p>	<p>Ojo: mirada salvaje, ulceración, catarata, pupilas contraídas o dilatadas o desiguales, abertura espasmódica, contracción de párpados, rigidez, rotados, torcidos, estrabismo congénito, parálisis. Movimiento de los globos oculares: convulsivo, rotativo, de un lado a otro como pendular (nictagmo).</p> <p>Visión: pérdida de visión o ceguera, manchas, colores de manchas negras flotando o moscas volantes, red ante los ojos, miopía.</p>

Seccio-nes	Síntomas		
	Psora	Sycosis	Syphilis
Oído y Audición	<p>Oído: frialdad, sequedad, erupciones, adormecimiento, comezón, prurito en, hurgando con dedo en el.</p> <p>Audición: disminuida.</p> <p>Los ruidos, tinnitus o acufenos, dependen de su etiología.</p> <p>Audición: aguda, distantes, ilusiones.</p>	<p>Oído: inflamación, secreciones, cera aumentada, humedad, sensibilidad, tensión, pulsación, tumores.</p> <p>En general las sensaciones, como de: aire, soplo, agua, estar tapado, cuerpo extraño, vermes, rasguño, abertura, distensión, plenitud, vacío.</p>	<p>Oído: absceso, supuración, secreciones sanguinolentas, ulceración, amenaza de caries, contracción.</p> <p>Audición: pérdida de la, su propia voz suena antinatural.</p>

Seccio-nes	Síntomas		
	<i>Psora</i>	<i>Sycosis</i>	<i>Syphilis</i>
<b>Nariz</b>	Sequedad adentro, prurito, hurgándose la nariz 1 o 3, venas varicosas 1 o 2 o 3, olfato disminuido.	Obstrucción, coriza, secreción, costras, estornudos, calor, transpiración, hormigueo, tumor, pólipos; sensación de: cuerpo extraño, plenitud. Olores imaginarios y reales, olfato agudo.	Movimiento de las alas como abanico 3-2, epistaxis, grietas, úlceras, ocena, tabique perforado, picotearse, pérdida del olfato.
<b>Cara</b>	Adormecimiento, prurito, comezón, hundida, clorótica. Expresión: ansiosa, atontada, confusa, ebria, embrutecida, estúpida, idiota, enfermiza, sufriente, somnolienta, trasnochada 1-3, demacrada 1-3, vacía.	Brillosa, grasosa, pecas, verrugas, calor, congestión, induraciones, sensible, sensación de telaraña, movimiento de masticación, mandíbula apretada, fruncida, tensión de piel, tremor. Expresión: aturdida, cambiada.	Piel áspera, labios agrietados o despelejados, arrugada, hipocrática, contorsión, contraída, rigidez, estremecimiento, trismo, convulsiones. Expresión: feroz, angustiada, aterrorizada, envejecida.

Seccio-nes	Síntomas		
	<i>Psora</i>	<i>Sycosis</i>	<i>Syphilis</i>
<b>Boca y dientes</b>	<p>Ablandamiento de encías, sequedad 1 o 3, decoloración 1 o 2 o 3. Lengua: fría 1 o 3, protrusión 1 o 2, blanda. Gusto: falta o insipidez de la comida, insípido 1-3, seco. Hablar difícil.</p> <p><i>Dientes:</i> frialdad, prurito.</p>	<p>Abierta, sensación de alargamiento, mucus, pegajosa, viscosa, salivación, vesículas, tumores. Lengua: dentada, lisa, induración, sensación como si fuera gruesa, temblor. Olor: dulzón, alcalino, caseoso, metálico 2 o 3. Gusto: agudo, pastoso, pulposo, pegajoso.</p> <p><i>Dientes:</i> rechina, apretar los dientes, Castañeteo, sensibles o delicados, dentera, trastornos por muelas del juicio, sensación de alargamiento, hormigueo, tensión, mucus, sarro.</p>	<p>Espuma por boca, hemorragia, aftas. Encías: esponjosas, separadas de los dientes, escorbúticas, fistula. Lengua: agrietada, mapeada, flácida. Olor: maloliente, pútrido, agrio. Gusto: pérdida del, su distorsión como: dulzón, salado, amargo, ardiente, picante, grasoso, terroso, mohoso, quemado, metálico, sanguinolento, maloliente, pútrido. Hablar: falto de, ininteligible, tartamudear.</p> <p><i>Dientes:</i> caries, flojedad de, desmenuzamiento.</p>

Seccio-nes	Síntomas		
	<i>Psora</i>	<i>Sycosis</i>	<i>Syphilis</i>
<i>Estómago</i>	Ansiedad, vacío 1 o 2, sensación colgante, frialdad, náuseas, indigestión, pesadez. Apetito: disminuido, fácil saciedad, sin apetencia. Deseo de alimentos de fácil digestión como dulces, farináceos o harinas.	Distensión, eructos, calor, gorgoteo; sensación de: bulto, piedra, plenitud. Apetito: incrementado, constante, roedor, cambiante, caprichoso. Sed: ardiente o vehemente, extrema. Deseo de: agrio o ácidos, estimulantes, condimentos.	Acidez, pirosis, hipo, asco, repugnancia por la comida, arcadas, vómitos, constricción. Apetito: insaciable, voraz, falta de. Deseo de alimentos que lo agravan. Las aversiones en general. Sed: inextinguible, con incapacidad para tragiar.
<i>Abdomen</i>	Ansiedad, vacío 1 o 2, sensación de debilidad, pesadez, hernia, venas distendidas 1 o 2, prurito.	Inquietud, distensión, flatulencia, borborigmo, gorgoteo, tensión, sensible a la ropa; sensación de: plenitud, relajación, algo vivo.	Constricción, contracción, estremecimientos.

Seccio-nes	Síntomas		
	Psora	Sycosis	Syphilis
Recto	Constipación en general, pesadez, prolapsio, prurito, vermes o parásitos, hemorroides 1 o 2 o 3.	Diarrea en general, urgencia, flatos, humedad, pulsación, hormigueo, estrechez, condilomas.	Inactividad, disentería, defecación involuntaria 3 o 2, dolor de tenesmo, parálisis, excoriación, fistula, fisura, hemorragia.
Heces	Secas, duras, de color claro (por defecto de bilis), blancas, largas, pequeña cantidad, indigeridas, escasas, tenaces.	Mucosas, acuosas, delgadas o líquidas, blandas, oscuras, biliosas, verdes (por exceso de bilis), copiosas, frecuente, ruidosas.	Sanguinolentas, nudosas (mal conformadas), acres o excoriantes, de olor pútrido.
Laringe y tráquea	Aspereza, irritación, carraspera 1 o 2, prurito, sequedad. Voz: débil, ronquera (disfonía) 1 o 2 o 3, áspera, atonal, baja.	Mucus, edema de glotis, cosquilleo, sensible. Voz: alta, hueca, profunda, nasal, interrumpida 2-3, cambiada, temblorosa.	Constricción, laringismo estriduloso, crup, silbido, ulceración, parálisis, cáncer. Voz: perdida de la (afonía).

Seccio-nes	Síntomas		
	<i>Psora</i>	<i>Sycosis</i>	<i>Syphilis</i>
<b>Pecho</b>	<p>Ansiedad, aprehensión, frialdad, prurito, sequedad, aneurisma, tuberculosis pulmonar 1-3.</p> <p>Leche: tenue, desapareciendo o retirándose.</p>	<p>Palpitación del corazón, aleteo, inflamación, induración, hepatización pulmonar, hidropesía.</p> <p>Leche: amarilla, aumentada, fluyente, en mujeres no embarazadas, en la pubertad, en niños 2-3, suprimida.</p>	<p>Absceso, calambre, murmullos o soplos, opresión, angina pectoris 3-2, retracción de los pezones.</p> <p>Leche: mala, espesa y sabe mal, ácida, amarga, sanguinolenta, niño rechaza la leche materna, ausente.</p>
<b>Respiración</b>	<p>Ansiosa, ruda o áspera o broncovesicular, imperceptible, lenta 1 o 3, contenida, detenida o apnea, impedida, difícil o corta 1 o 2 o 3.</p>	<p>Acelerada, profunda suspirosa 1-2, sacudiente, ruidosa, sonora, ronquidos, estertorosa, jadeante, gemido o quejumbrosa, intermitente, Cheyne-Stokes 2-3.</p>	<p>Paroxística, estridulosa, silbante, sibilante, asmática, asfixia, sollozante, abdominal, irregular.</p>

Seccio-nes	Síntomas		
	<i>Psora</i>	<i>Sycosis</i>	<i>Syphilis</i>
<i>Tos</i>	Seca, corta, cortante, ronca, dura o penosa, constante, persistente, durante la dentición, bostezando, ascendiendo, como por polvo, como por úvula alargada; por: cosquilleo, irritación, sequedad, comer, eructos, esfuerzo, frío.	Floja o húmeda, hueca, profunda, jadeante, ruidosa, carraspera 2 o 1, dolorosa 2 o 3, nerviosa, periódica, durante la fiebre, expectoración mejora.	Violenta, paroxística, atormentadora, torturante, desesperante, agotadora, espasmódica, asfixiante, sofocante, crupal, ladrante o perruna, tos convulsa o ferina, con afecciones del corazón.
<i>Expectoración</i>	Acuosa, transparente.	Copiosa, espesa, viscosa, mucosa, aterrionada, espumosa, blanca, amarilla, verdosa.	Difícil, acre, de olor fétido, sanguinolenta, purulenta.

Seccio-nes	Síntomas		
	<i>Psora</i>	<i>Sycosis</i>	<i>Syphilis</i>
<i>Piel</i>	<p>Adormecimiento, seca, áspera, malsana, flaccidez, inactividad 1 o 2.</p> <p>Erupciones: pruriginosas, indoloras, pápulas, sarna, sarpullido, invierno, lavar, suprimidas.</p> <p>Erupciones: secretantes, húmedas, vesiculosas, pénfigo, herpéticas 2-3, costrosas, escamosas, eczema, urticaria, ronchas, forúnculos, tubérculos, viruela.</p>	<p>Hormigueo, clavante, piel de gallina, pecas (o hiperpigmentación de cualquier tipo), picaduras de insectos, erisipelas 2-3, intertrigo 2-1, ictericia 2 o 3, caspa, queolloide, excreencias, verrugas.</p> <p>Erupciones: secretantes, húmedas, vesiculosas, pénfigo, herpéticas 2-3, costrosas, escamosas, eczema, urticaria, ronchas, forúnculos, tubérculos, viruela.</p>	<p>Ardiente, anestesia, arrugada, equimosis, grietas, cuarteada, excoriación, úlceras, gangrena, lupus.</p> <p>Erupciones: sangrantes, supurantes, pústulas, ectima, petequia, fagedénicas, escozor, impétigo 2-3, leprosas, sifilíticas.</p>

Seccio-nes	Síntomas		
	Psora	Sycosis	Syphilis
Vejiga	Debilidad, retención de orina 1 o 2, prurito.  Micción: débil, interrumpida, retardada, incompleta, insatisfactoria, goteo 1 o 2, infrecuente, inconsciente o insensible, involuntaria.	Cálculos, inflamación, catarro mucoso; sensación de: plenitud, tensión, vacío.  Micción: fuerte, frecuente, chorro fino o delgado 2 o 3, bifurcado 2 o 3, interrumpida 1 o 2 o 3, urgencia para orinar.	Espasmo, tenesmo, parálisis.  Micción: frecuente por la noche (nicturia), chorro fino o delgado, bifurcado, interrumpida (cuando se deben a espasmo).  Inactividad de la vejiga.
Orina	Acuosa, incolora, escasa.	Copiosa, espesa, espumosa, oscura o turbia, lechosa, película en su superficie, sedimento, azúcar, bilis, albuminosa, alcalina, peso específico aumentado.	Sanguinolenta, color amarillo oscuro (ya sea por sangre o por disfunción renal), acre, ardiente, peso específico disminuido.

Seccio-nes	Síntomas		
	<i>Psora</i>	<i>Sycosis</i>	<i>Syphilis</i>
<i>Genitales Masculino</i>	Criptorquidia, fimosis, flaccidez, manosea genitales 1 o 2.  Deseo sexual disminuido.  Coito con placer disminuido.  Disposición a la masturbación 1-2.  Erecciones: incompletas, difíciltosas.  Eyaculación: acuosa, fría, incompleta, débil, difícil, demasiado tardía.	Varicocele, sacudida en pene, tironeo hacia abajo, disposición a la masturbación.  Deseo sexual aumentado.  Coito con placer: aumentado, extremo, prolongado.  Erecciones: fuertes, frecuentes, continuadas o priapismo.  Eyaculación: copiosa, demasiado rápida o precoz.  Eyaculaciones seminales o poluciones.	Ulceras, atrofia.  Deseo sexual: falta de, excesivo, violento o incontrolable.  Coito: aversión al, doloroso, placer ausente, placer insoportable.  Erecciones: dolorosas, violentas, falta de o impotencia.  Eyaculación: dolorosa, sanguinolenta, falla durante el coito.

Seccio-nes	Síntomas		
	<i>Psora</i>	<i>Sycosis</i>	<i>Syphilis</i>
<i>Genitales Femeninos</i>	<p>Infantilismo genital, prolapso, desplazamiento del útero, placenta retenida, subinvolución.</p> <p>Menstruación: atrasada, escasa, corta duración, pálida.</p> <p>Loquias: escasas, tenues, movimiento agrava.</p> <p>Leucorrea: tenue o acuosa 2-1.</p>	<p>Flatos por vagina.</p> <p>Menstruación: frecuente o demasiado pronto, copiosa, prolongada, dolorosa o dismenorrea, intermitente 2-3.</p> <p>Loquias: copiosas, suprimidas.</p> <p>Leucorrea: copiosa, espesa, lechosa, blanca, amarilla.</p>	<p>Vaginismo, esterilidad, metrorragia, aborto, parto prematuro.</p> <p>Menstruación: irregular, oscura, maloliente.</p> <p>Loquias: acre, oscuras, malolientes, purulentas.</p> <p>Leucorrea: oscura, negra, sanguinolenta.</p> <p>Insensibilidad de la vagina.</p>

Seccio-nes	Síntomas		
	<i>Psora</i>	<i>Sycosis</i>	<i>Syphilis</i>
<b>Extremidades</b>	<p>Ablandamiento de huesos, curvadas y encorvadas, inestabilidad de las articulaciones, cojera 1 o 2 o 3, crujidos en las articulaciones, debilidad, pesadez, torpeza.</p> <p>Uñas: delgadas, corrugadas, manchadas, quebradizas o frágiles, exfoliación.</p>	<p>Apretamiento de los dedos de la mano, nudosidades artríticas 2-3, callos, exostosis, juanetes, flegmasia alba dolens, sabañones.</p> <p>Uñas: oniquia o paroniquia, uñero.</p>	<p>Tiesura o rigidez, músculos y tendones acortados, contracción de músculos y tendones, constricción, ataxia, paso vacilante, incoordinación, discapacidad, caries óseas, piel agrietada.</p> <p>Uñas: deformadas, padrastras 3-2.</p>

**Notas.** Respecto a la clasificación de los síntomas según lo miasmático, aclara Sánchez Ortega que “de ninguna manera quiere decir que un síntoma aislado sea forzosamente correspondiente a un miasma, así pues, siempre tendrá que referirse al conjunto, a la totalidad que es la que signa realmente al sujeto” (Sánchez, 1983, pág. 65). Debido a que clasificar un síntoma en un miasma está condicionado a la totalidad y a la causa que lo produce, la

clasificación de síntomas dada solamente debe tomarse como una guía general en la clínica.

Se obtuvo de los libros de Sánchez Ortega: "Introducción a la Medicina Homeopática, Teoría y Técnica" (Sánchez, 1992, págs. 423-477), "Apuntes sobre los Miasmas o Enfermedades Crónicas de Hahnemann" (Sánchez, 1983, págs. 73-95 y 147-175), y "Traducción y Definición de los Síntomas Mentales del Repertorio Sintético de Barthel" (Sánchez, 1998); de la traducción de Flores Toledo del libro: "Las Enfermedades Crónicas" de Hahnemann (Hahnemann, 1989, págs. 82-126); del trabajo de Riveros sobre: "Definición y Clasificación Miasmática de los Síntomas Generales del Repertorio Synthesis" (Riveros, 2000), y del análisis personal, siguiendo el concepto del hipo, hiper y dis, para la psora (1), sycosis (2) y syphilis (3) respectivamente. Los nombres de los síntomas se tomaron del repertorio "Synthesis", edición 6.1 (Schroyens, 1998).

Cuando un síntoma está seriado miasmáticamente por más de un número, hace referencia a que el síntoma es producto de la mezcla de los miasmas simbolizados por esos números, como se deduce del capítulo "Definición de Síntomas" del libro "Apuntes sobre los Miasmas o Enfermedades Crónicas de Hahnemann" (Sánchez, 1983, págs. 147-175).

**5. CLASIFICACIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN  
LO MIASMÁTICO, SIGUIENDO LOS  
CONCEPTOS DEL DR. ORTEGA**

<i><b>Medicamentos</b></i>		
<i><b>Psóricos</b></i>	<i><b>Sycósicos</b></i>	<i><b>Syphilíticos</b></i>
Alumina 1-2	Aconitum 2-3-1	Antimonium Crud. 3-1
Antimonium Tart. 1-3	Agaricus M. 2-1-3	Arsenicum Album 3-1-2
Bryonia 1-2-3	Apis M. 2-1-3	Arnica M. 3-1
Calcarea Carb. 1-(3-2)	Argentum Nit. 2-3-1	Aurum 3-1-2
Calcarea Sulp. 1-3	Chamomilla 2-(1-3)	Baryta Carbonica 3-1
Camphora 1-3	Coffea C. 2	Belladona 3-2-1
Causticum 1-2-(3)	Colocynthis 2-3-1	Carbo Veg. 3-1
China Off. 1-(2-3)	Dulcamara 2	Conium 3-1-2
Coccus 1-2-(3)	Hyoscyamus 2	Cuprum 3-2-1
Euphrasia 1-3	Ignatia 2-(1-3)	Drosera 3-1-2
Gelsemium 1-3	Ipecacuanha 2-1	Hepar Sulp. 3-2-1
Graphites 1-3-2	Ledum Pal. 2-1	Kali Bich. 3-1-2
Iodum 1-3-2	Magnesia Phos. 2-1	Kali Iod. 3-2-1
Kali Carb. 1-2-3	Medorrhinum 2	Kali Phos. 3-1-2
Lycopodium 1-2-3 (equilátero)	Natrum Carb. 2-1-3	Kreosotum 3-2-1
Magnesia Carb. 1-2-3	Nux Vomica 2-1-3	Lachesis 3-2-1
Natrum Muriaticum 1-2-3 (casi equilátero)	Platina 2-3-1	Mercurius 3-1-2
	Podophyllum 2	Nitricum Ac. 3-2-1
	Pulsatilla 2-1-3	Opium 3-1-2

<b><i>Medicamentos</i></b>		
<b><i>Psóricos</i></b>	<b><i>Sycósicos</i></b>	<b><i>Syphilíticos</i></b>
Phosphoricum Acidum 1-3-2 Plumbum 1-3-(2) Silicea 1-2-3 (equilátero) Zincum Met. 1-3-2	Rhus Tox 2-1 Spigelia 2 Thuja 2 Veratrum Alb. 2-3-1	Phosphorus 3-1-2 Psorinum 3 Sepia 3-1-2 (casi equilátero) Staphysagria 3-1-2 Stramonium 3-2-1 Sulphur 3-1-2 (casi equilátero)

**Nota.** El medicamento seriado con más de un número significa que tiene síntomas de dos o de los tres miasmas, siendo el primer número el miasma que predomina en cantidad de síntomas y el último el de menos, como se deduce del capítulo “Ejemplo de clasificación miasmática de los medicamentos conforme a sus síntomas” del libro “Apuntes sobre los Miasmas o Enfermedades Crónicas de Hahnemann” (Sánchez, 1983, págs. 179-195).

**Fuente:** Apuntes de clases en la escuela “Homeopatía de México A. C.”, 1993.

## 6. LA INCURABILIDAD

<b><i>Tipo de incurabilidad</i></b>	<b><i>Definición</i></b>	<b><i>Tratamiento</i></b>
<b>1. Parcial o relativa</b>	Concierne a una parte del sujeto, ya sea por lesión degenerativa de un órgano o por su amputación.	Se debe esperar, ayudado con placebo, y realizando una observación cuidadosa intervenir tan pronto sea adecuado.
<b>2. Total o completa</b>	Está afectado todo el organismo, un sistema o un aparato, con lesiones irreversibles, degenerativas.	Observar el momento oportuno de intervenir, y comenzar con un medicamento superficial en el sentido miasmático, buscando quitar una pequeña capa, sin provocar grandes reacciones.
<b>3. Absoluta o a corto plazo</b>	Deterioro del organismo sin ninguna posibilidad de detenerlo, con lesiones destructivas y con poca fuerza vital.	Solamente paliar, es decir, dar un medicamento de acción superficial y de baja potencia, ayudando a bien morir al paciente.

<b><i>Tipo de incurabilidad</i></b>	<b><i>Definición</i></b>	<b><i>Tratamiento</i></b>
<b>4. <i>Temporal</i></b>	Por circunstancias u obstáculos que imposibilitan la curación, como un medio ambiente adverso o los tratamientos alopáticos.	Dar inicialmente placebo, y luego tratar los pocos síntomas observables que no hayan sido suprimidos o que reaparezcan.
<b>5. <i>Persistente o a largo plazo</i></b>	Por penas o sufrimientos importantes que vive o que perduran en el paciente y que no puede o no quiere superar, alterando sus funciones orgánicas de manera total o parcial.	Buscar que el paciente rectifique su pensamiento y conducta con psicoterapia, y dar el medicamento indicado hacia el miasma actuante.
<b>6. <i>Definitiva</i></b>	Es cuando el paciente no quiere curarse. Se encuentra muerto en vida, con lesiones ostensibles o sin ellas.	Atenuando lo miasmático como vayan surgiendo en manifestaciones, es posible curarlo.

## 7. OBSERVACIONES DESPUÉS DE LA PRESCRIPCIÓN

Observa- ción	Causas			Procedi- miento
	Enfermo	Medica- mento	Miasmática	
<b>1. <i>Agravación prolongada y aniquila- miento final del enfermo</i></b>	Incurable, con poca vitalidad y daños profundos.	Semejante.	Mezcla miasmática de psora, sycosis y syphilis.	Paliar inicialmente, es decir, dar un medicamento de acción superficial y de baja potencia, para solo aliviar.
<b>2. <i>Agravación persistente y después lenta mejoría</i></b>	En curación, de una enfermedad muy profunda, con serios daños orgánicos.	Semejante, con dosis grande por poco diluida o en su potencia.	Enfermo con fondo psórico notable, y sobrepuerto uno de los otros dos miasmas.	Esperar que la naturaleza actúe, sin interferir ni permitir que el paciente lo haga.

<i>Observación</i>	<i>Causas</i>			<i>Procedimiento</i>
	<i>Enfermo</i>	<i>Medicamento</i>	<i>Miasmática</i>	
<b>3. Agravación rápida, corta y fuerte, seguida de rápida mejoría</b>	<b>En curación,</b> con buena fuerza vital y con lesiones o alteraciones funcionales considerables.	Semejante, con una potencia un tanto exacerbada.	Prevalece una condición sycósica o syphilítica, por la reacción violenta. El miasma vuelve a su estado de latencia.	Si se dio dosis única: esperar o dar placebo; en el método plus: disminuir la frecuencia de la dosis.
<b>4. Mejoría sin agravación</b>	<b>En curación,</b> con buena fuerza vital, y con patología superficial y funcional.	Semejante, con la potencia adecuada (simillimum).	El miasma no era muy profundo, o su actividad fue relativa y sigue latente.	No interferir médicalemente y dar indicaciones de higiene.

Observación	Causas			Procedimiento
	Enfermo	Medicamento	Miasmática	
<b>5. Mejoría corta y después agravación</b>	a. <b>Supresión</b> de síntomas.	Desemejante.		Dar el antídoto u homeódoto.
	b. <b>Obstáculos a la curación.</b>	Semejante.		Corregir lo que entorpece la curación.
	c. <b>Incurable.</b>	Semejante.	Incurabilidad por la unión activa o mezcla (intrincamiento) de dos o de los tres miasmas.	Debe esperar a que pase el efecto del medicamento. Si se prolonga, paliar. Luego, dar uno superficial.

<i>Observación</i>	<i>Causas</i>			<i>Procedimiento</i>
	<i>Enfermo</i>	<i>Medicamento</i>	<i>Miasmática</i>	
<b>6. Mejoría muy corta</b>	a. En los casos agudos, por inflamación importante; en los crónicos, por órganos destruidos o en destrucción, pero curables y con vitalidad.	Semejante, pero con <b>dosis insuficiente</b> en potencia o en su frecuencia.	La dosis es insuficiente porque el miasma predominante lo es tanto en extensión como en profundidad.	Repetir la dosis con una frecuencia de tiempo menor de lo que duró la mejoría, y si se prolonga la repetición, aumentar la potencia.
	b. <b>Obstáculos a la curación.</b>	Semejante.		Con el medicamento, ayudar al paciente a vencer el mal hábito.

<i>Observación</i>	<i>Causas</i>			<i>Procedimiento</i>
	<i>Enfermo</i>	<i>Medicamento</i>	<i>Miasmática</i>	
<i>7. Mejoría de los síntomas, pero no del enfermo</i>	a. Incurabilidad parcial por órganos con lesiones irreparables, o extraídos en cirugía.	Semejante.		Prescribir para lo que resta del organismo.
	b. Paliación de síntomas.	Superficial.	No se ha reconocido lo profundo del caso, lo miasmático.	Rectificar la toma del caso, en búsqueda del miasma predominante.
	c. Los miasmas en latencia persisten.	Semejante.	Los síntomas del hoy se producen sobre una fuerte condición miasmática en latencia.	Tratar el miasma de fondo que predomine.

<b>Observación</b>	<b>Causas</b>			<b>Procedimiento</b>
	<b>Enfermo</b>	<b>Medicamento</b>	<b>Miasmática</b>	
<b>8. Síntomas por hipersensibilidad del paciente</b>	<b>Hipersensible.</b>	Semejante, con potencia alta para el paciente.	Paciente sycósico, por lo intenso de sus reacciones.	Disminuir la potencia y tratar de evitar repetir la dosis. Hahnemann recomienda diluir y agitar una cucharadita del medicam. en 7 u 8 cucharadas de agua y dar una cucharadita por dosis.
<b>9. Acción benéfica de los medicamentos sobre los experimentadores</b>	Experimentador relativamente sano.	Medicamento a investigar.	Los <b>miasmas en latencia</b> al manifestarse por estímulo del medicamento, se atenúan.	Las experimentaciones deben ser dirigidas convenientemente.

<i>Observación</i>	<i>Causas</i>			<i>Procedimiento</i>
	<i>Enfermo</i>	<i>Medicamento</i>	<i>Miasmática</i>	
<i>10. Aparición de síntomas nuevos</i>		<b>a. Desemejante.</b>	Respuesta independiente a las condiciones miasmáticas del enfermo.	Si son muy intensos, dar un antídoto y luego el semejante; si no lo son, dar el semejante; y en caso de urgencia, dar un remedio que incluya los síntomas primitivos que persistan y los nuevos.
		<b>b. Por repetir el medicamento sin modificar la dinamización.</b>	Respuesta independiente a las condiciones miasmáticas del enfermo.	Sucusionar la medicina disuelta en agua, antes de cada toma.
	<b>c. Hipersensible.</b>	Semejante.	Ver la observación 8	

<b>Observación</b>	<b>Causas</b>			<b>Procedimiento</b>
	<b>Enfermo</b>	<b>Medicamento</b>	<b>Miasmática</b>	
<b>11. Reaparición de síntomas antiguos</b>	<b>En curación,</b> con buena fuerza vital.	Semejante, con la potencia adecuada (simillimum).	Gran avance de las enfermedades crónicas miasmáticas en el paciente a través de los años. El miasma actuante en el hoy se atenúa y da lugar al subyacente.	Observar su evolución sin modificar el tratamiento, excepto, si los síntomas son persistentes o intolerables; y concienciar al paciente para evitar que interfiera.
<b>12. Los síntomas toman una dirección equivocada</b>	<b>Supresión</b> de síntomas.	Desemejante, que abarca algunos síntomas locales y no la totalidad.	No se tomó en cuenta la totalidad de los síntomas característicos del miasma predominante.	Dar de inmediato el antídoto y luego prescribir para el miasma predominante.

<b>Observación</b>	<b>Causas</b>			<b>Procedimiento</b>
	<b>Enfermo</b>	<b>Medicamento</b>	<b>Miasmática</b>	
<b>13. Mejoría corta, que se repite al tomar el medicamento</b>	Incurabilidad parcial o relativa, por extirpación de órganos en cirugía.	Semejante.	La extirpación de un órgano impide la agudización miasmática que debía realizarse en ese órgano durante la curación.	Mantener la indicación del medicamento, generalmente de acción no muy profunda, y acentuar la higiene.
<b>14. Mejoría corta seguida de agravación de síntomas concomitantes, que se repite al tomar el medicamento indicado</b>	Incurable.	Semejante en cada prescripción.	Conjunciones o mezclas miasmáticas, generalmente psora-syphilis.	Atenuar primero el miasma más dominante y después el siguiente, con frecuencia repitiendo el procedimiento.

<b>Observación</b>	<b>Causas</b>			<b>Procedimiento</b>
	<b>Enfermo</b>	<b>Medicamento</b>	<b>Miasmática</b>	
<b>15. Mejoría corta seguida de nuevos síntomas o modalidades, que se repite al tomar un nuevo medicamento</b>	<b>Supresiones sucesivas.</b>	Desemejantes por superficiales y parciales.	No se reconoce el miasma predominante y se prescribe para el principal (en cantidad de síntomas) o de los que están en latencia.	Dar placebo mientras se estabiliza el cuadro y solo volver a prescribir con seguridad.
<b>16. Mejoría prolongada y después agravación</b>	<b>a. Incurable</b> por lo general, por supresiones muy anteriores, habitualmente en las primeras etapas de la vida.	Semejante, generalmente dado en alta potencia.	Se trajeron antes los síntomas más ostensibles y no los del miasma predominante, que se ha incrementado,...	Reconsiderar lo miasmático más importante según la herencia y la evolución de la patología, e ir atendiendo...

<i>Observación</i>	<i>Causas</i>			<i>Procedimiento</i>
	<i>Enfermo</i>	<i>Medicamento</i>	<i>Miasmática</i>	
			manifestándose en planos más profundos.	las expresiones de ese miasma.
<b>16. Mejoría prolongada y después agravación (continuación)</b>	<b>b. Curado o próximo a curarse.</b> La agravación que se presenta es moderada, a diferencia de la anterior (punto "a") que es profunda (Agravación homeopática final, comentada por Hahnemann)	Semejante, tomado específicamente en forma continua (método plus) y en escala cincuentamilesimal (LM).		Suspender el medicamento por 8 a 15 días para observar si desaparecen o persisten los síntomas. En el primer caso, probablemente está curado; en el segundo, debe darse nuevamente el medicamento a mayor dinamización

Observación	Causas			Procedimiento
	Enfermo	Medicamento	Miasmática	
17. <i>Agravación prolongada y después corta mejoría</i>	Incurable.	Semejante.	El estado miasmático es absolutamente dominante. La psora incapacita al organismo en su defensa.	Paliar, y tal vez nunca intentar la curación, a excepción de un joven que anhele vivir, rodeado de afecto y con buenos hábitos de vida, pero después de algún tiempo.

**Nota.** La causa *miasmática* pertenece al *enfermo*, pero se dividen para facilitar su estudio.

## 8. LEY DE LA CURACIÓN

<i>Dirección de los síntomas</i>	<i>Definición</i>
<b>1. De arriba hacia abajo</b>	La curación va de las partes superiores del cuerpo hacia las inferiores.
<b>2. De adentro hacia afuera</b>	La curación va de los órganos más importantes e internos a los menos vitales y externos.
<b>3. En orden inverso al de su aparición</b>	Primero se curan los últimos síntomas y después los pasados, que irán apareciendo y curándose en el sentido contrario a como se manifestaron.

