

Dr. K. P. S. Dhama
&
Dr^a. Suman Dhama

HOMEOPATÍA

Manual completo

Dirigido y revisado por el
Dr. Miguel Pérez Fuertes, médico homeópata.

Indice

Prefacio	11	Apostemas y diviesos (incluidos carbunclos, etc.)	51
Introducción a la Homeopatía	13	Artritis	55
Abdominal, Dolor	27	Ascitis	59
Aborto	28	Asfixia	60
Abscesos y forúnculos	30	Asma	62
Acidez	30	Aversiones	65
Acné	31	Azúcar en la orina	66
Adenoides	33	Bazo	67
Adicciones	34	Belleza, consejos de	68
Aflicción	34	Blefaritis	69
Afonía	34	Bocio	70
Aftas	35	Bostezos	71
Albuminuria	36	Bronquiectasia	71
Alcohol	37	Bronquitis aguda	72
Alcoholismo	38	Bronquitis alérgica	73
Alergias	39	Bronquitis alérgica	74
Alimentos y bebidas	41	Bronquitis crónica	74
Amebiasis	42	Bulimia	76
Amigdalitis	42	Cabello	77
Ampollas	44	Calambres	77
Anemia	44	Cálculos renales	78
Angina de pecho	46	Calvicie	80
Anorexia	47	Callos	81
Ansiedad	48	Canas prematuras	82
Apendicitis	49	Caminar	82
Apoplejía	50	Cáncer	83

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Caries dental	85	Disentería	113
Casca	85	Dismenorrea	114
Ceguera	86	Dispepsia	114
Cera	87	Dolor	115
Cerebro	87	Dolor de cabeza	115
Ciática	88	Dolor de espalda	117
Cicatrices	90	Dolores de la cama	119
Cistitis	90	Dolor de oídos	120
Codo de tenista	90	Eccema	121
Coito-masculino	91	Edema	123
Colapso	91	Embarazo	123
Cólera infantil	92	Emisión seminal	124
Cólera	93	Encefalitis	125
Cólico	94	Encías	125
Colitis	95	Encías, sangrado	126
Congelación	96	Enfermedades de los niños.	126
Conjuntivitis	96	Enfermedades debidas a una causa	126
Convulsiones	97	Enfermedades profesionales	127
Corazón, Afecciones del	98	Enflaquecimiento	128
Corea	99	Enuresis	128
Cuerpos extraños	100	Envenenamiento	129
Cuidados pre y post operatorios	100	Eosinofilia	130
Debilidad	101	Epilepsia	131
Demencia	101	Epistaxis	131
Dengue	103	Erecciones	132
Dentadura, dolor de la	103	Erisipela	134
Dentición	105	Eruptos	136
Dermatitis de contacto	105	Escarlatina	137
Deseo sexual, en el varón	106	Escorbuto	137
Deseo sexual, en la mujer	106	Escozor de barbero	138
Deseos	107	Espermatorrea	139
Desfallecimiento	108	Espina dorsal	139
Diabetes	109	Espondilosis	141
Diarrea	110	Espondilosis cervical	146
Dientes	112	Esterilidad femenina	146

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Estornudos	148	Herpes zóster	177
Estrabismo	148	Hidrocefalia	179
Estreñimiento	149	Hidrocele	180
Evacuación de heces	150	Hidrofobia	181
Exposición, Afecciones de	152	Hiperacidez	182
Faringitis	152	Hiperpirexia	182
Fiebre (simple)	153	Hipertensión	183
Fiebre del heno	154	Hipertensión esencial	184
Fiebres Tifoideas	155	Hipo	184
Filariasis	158	Hipocondriasis	185
Fimosis	159	Hipotensión	185
Fístula de ano	159	Hipotiroidismo	186
Fisura Anal	160	Histeria	187
Flatulencia	161	Horario	187
Gangrena	162	Huesos, Afecciones de los	189
Garganta, molestias de	163	Ictericia	189
Garrotillo	164	Impotencia masculina	191
Gastroenteritis	165	Indigestión	192
Glándulas mamarias	165	Inoculación	194
Glándulas, enfermedades de las	166	Inquietud	195
Gonorrea	167	Insolación	195
Gordura	168	Insolación, Consecuencias	196
Gota	169	Insomnio	197
Granos	169	Intoxicación por alimentos	198
Gripe	169	Iritis	198
Gusto	170	Irritabilidad	199
Halitosis	171	Jadeo	201
Hematuria	171	Lactancia	203
Hemorragia de encías	172	Lagrimeo	204
Hemorragia nasal	173	Laringitis	204
Hemorragia vaginal	173	Lengua	207
Hemorroides	173	Lepra	208
Hemorroides sangrantes	173	Lesiones	209
Hemorroides secas	174	Leucemia	211
Hernia	176	Leucodermia	211

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Leucorrea	211	Ojos, Afecciones de los	248
Llanto	213	Ojos, Ardor	251
Lombrices	214	Olor corporal	251
Lumbago	215	Orina	252
Lupus	215	Orquitis	255
Malaria	215	Orzuelos	256
Manía	219	Osteomielitis	257
Marasmo	219	Otorrea	257
Marcas de nacimiento	221	Ovarios, afecciones de los	259
Mareo en viajes	221	Palpitaciones	260
Mareos matutinos	222	Paludismo	261
Mastoiditis	222	Panadizos	261
Masturbación femenina	223	Páncreas	262
Masturbación masculina	224	Paperas	263
Meningitis	225	Parálisis	264
Menopausia	225	Parto	265
Menstruación	226	Pechos	266
Metritis	231	Pérdida de conocimiento	267
Metrorragia	232	Periodicidad	267
Miasmas	233	Peritonitis	269
Miedo	233	Pesadillas	269
Migraña	234	Picor	270
Miopía	236	Piedras en la vejiga	271
Mordeduras	236	Piedras en la vesícula	271
Nariz	237	Piel	273
Náuseas	238	Piedras en los riñones	273
Nefritis	239	Piojos	273
Nerviosismo	241	Piorrea	274
Neumonía	242	Pleuresía	275
Neuralgia facial	243	Pólipos de nariz	275
Neuritis	244	Pólipos De útero	276
Ninfomanía	245	Pólipos de oído	276
Obesidad	246	Presión sanguínea alta	277
Obstrucciones al flujo de fuerza vital ..	247	Presión sanguínea baja	277
Oídos	248	Prevención de procesos	277

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Proceso mastoideo	279	Sífilis	312
Prolapso de útero	280	Síntomas característicos opuestos	313
Prolapso de recto	280	Síntomas, Dirección de	314
Próstata	282	Síntomas peculiares	315
Prurito genital	282	Sordera	316
Psoriasis	286	Sinusitis	316
Pterygium	286	Sudor	317
Pulso	287	Sueño, Afecciones del	319
Queloides	288	Sueños	320
Quemaduras	289	Suicidio, Tendencia al	321
Quemaduras solares	289	Tabaquismo	322
Queratitis, sin ulceración	290	Talasemia	322
Quistes de párpados	291	Tartamudeo	323
Raquitismo	291	Testículos, Afecciones de los	323
Remedios del lado derecho	292	Tétanos	324
Remedios del lado izquierdo	292	Tiña	324
Represiones	293	Tirotoxicosis	325
Resaca	294	Torceduras	325
Resfriado, catarro y coriza	294	Tos	326
Retina, Enfermedades de la	297	Tosferina	329
Reumatismo	298	Tracoma	329
Rinitis alérgica	298	Trastornos mentales	330
Riñones	299	Tristeza	331
Ronquera	300	Trombosis coronaria	332
Ronquidos	302	Tuberculosis	333
Sabañones	302	Tumores	334
Salivación	303	Úlceras	335
Sarampión	304	Úlceras bucales	336
Sarna (Picor)	305	Úlceras pépticas	337
Sarpullido	306	Uñas	338
Sed excesiva	307	Urticaria	339
Sed, Ausencia de	308	Útero	341
Sensaciones	308	Vacunas, Afecciones producidas por ...	342
Septicemia	310	Vahídos	343
Sequedad de boca	311	Variaciones térmicas	343

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Vejiga y uretra	344	Viruela loca	351
Venas varicosas	345	Visión, Afecciones de la	352
Verrugas	345	Vómitos	354
Vértebra dislocada	346		
Vértigo	349	La peste	355
Viruela	350		

Prefacio

Nuestra personalidad y la estructura de nuestro cuerpo son tales que, tan pronto como aparece una impureza o un desequilibrio en ellos, empiezan a manifestarse espontáneamente sus signos externos, formando varios síntomas. Si podemos identificar esos síntomas a tiempo y administrar un medicamento homeopático que presente síntomas similares, puede curarse la enfermedad. Ese tratamiento no tiene nada que ver con la cirugía, los ejercicios corporales, el yoga ni cualquier otro sistema de curación sin drogas. Se dice que un sistema de tratamiento, como la Homeopatía, basado en los síntomas, que ataca a la enfermedad desde dentro, no se suele tomar en serio. Sólo puede haber una respuesta a esta situación: nosotros, los homeópatas, dedicamos gran parte de nuestro tiempo y nuestra atención al análisis correcto y preciso de síntomas y, basándonos en este análisis, seguimos administrando, sin miedo, nuestras "píldoras mágicas".

Un eminente alópata de Inglaterra, el Dr. Compton Burnett, estaba una vez enfermo con pleuresía. Cuando falló el tratamiento allopático, recurrió al homeopático y, después de curarse, se dedicó a la práctica de la Homeopatía. Decía que, si se hubiese mantenido en secreto el método homeopático, los gobiernos del mundo se hubiesen sorprendido por sus poderes curativos y estarían dispuestos a dar lo que fuese por aprender sus secretos. ¡Qué acertada es esta opinión! Los remedios homeopáticos, si se prescriben correctamente, actúan como por arte de magia.

La enfermedad o el accidente puede presentarse en cualquier momento. En tal caso, si podemos administrar rápidamente un tratamiento médico, se pueden evitar muchas complicaciones. Este libro está escrito para superar esas situaciones inesperadas. El presente trabajo sigue la versión resumida hindi, de éxito sin precedentes, y estamos seguros de que será inteligible para cualquier profano que tenga un conocimiento básico del inglés. Este libro será útil también como manual de consulta rápida para el profesional atareado.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Hemos tratado de presentar el tema de una forma que ayude a la selección de los remedios, de acuerdo con los síntomas, teniendo presente la necesidad de evitar detalles innecesarios. Hemos pretendido ser concisos e ir al grano. Si los lectores quieren analizar los temas más a fondo, estamos preparados para ello, siempre que nos envíen un sobre franqueado y con su dirección.

Hablando en términos generales, se han ordenado alfabéticamente las enfermedades, con lo que se facilita la localización de los remedios necesarios para cada dolencia. Cuando se necesitan referencias cruzadas, se han dado también. Para comprender mejor los temas y aplicarlos con más facilidad, es necesario leer primero la introducción.

Hemos contado con la valiosa ayuda y el consejo de muchos amigos. Merecen especial atención los siguientes nombres: Dr. Y.P. Chhibbar, Lt. Gen. R.P. Singh y Shri S.J.S. Chhatwal. Shri Amit Nagi ha preparado, con cuidado y atención, el borrador final computerizado.

**K.P.S. Dhama
Suman Dhama**

Introducción a la Homeopatía

LA HOMEOPATÍA FUE INTRODUCIDA POR el famoso doctor alemán, Samuel Hahnemann. Es una ciencia médica que trata las dolencias con remedios que, probados en personas sanas, han dado resultado. Surge la pregunta: ¿Por qué no en enfermos? La respuesta quedará clara después de leer esta introducción. Esto hace el sistema homeopático seguro a toda prueba.

El Dr. Hahnemann destaca la futilidad de experimentos o investigaciones generales que han tratado de aportar la curación, basándose en la **enfermedad general**, en vez de centrarse en **síntomas individuales**. Esto se debe a que los seres humanos reaccionan de una forma distinta a los animales y también diferente unos de otros. Este fenómeno se aplica tanto a los remedios como a las enfermedades. Por ejemplo, la **morfina** hace que vomiten los perros y los aletarga, mientras que excita a los gatos; el **acónito** mata a las ovejas y no afecta a los caballos ni a las cabras; el **antimonio** es letal para los seres humanos y la mayoría de los animales, excepto los cerdos y los elefantes. Esta misma lógica puede extenderse a los seres humanos. Por tanto, cada paciente deberá ser tratado individualmente, basándose en sus síntomas.

El fundamento de la Homeopatía está en un principio básico natural. En latín, este principio dice ***similia similibus curentur*** (que lo similar cure a lo similar), planteado por primera vez por Hipócrates. Esto quiere decir que, para curar una enfermedad, hay que buscar una droga que sea capaz de producir síntomas similares cuando se prueba en seres humanos sanos. En otras palabras, un remedio puede curar solamente lo mismo que puede producir. Una persona normal entiende esto como que “un veneno mata otro veneno”. Este principio está descrito en los textos hindúes como ***vishasya vishmaushadham***. Todo el mundo sabe que el hierro corta el hierro y que los síntomas de calor pueden curarse con un tratamiento de calor.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Según la ciencia, no podemos crear nada: sólo podemos cambiar la forma. Las cosas que existen hoy día existen porque ya había algo allí. Una droga evoca sólo lo que ya está latente en la persona que la prueba y, por tanto, no afecta por igual a dos pacientes. Se necesitan varios probadores, de diferentes tipos y diferentes resistencias, para sacar una imagen completa de la patogénesis de una droga.

De este principio se deduce que los síntomas que se crean en un cuerpo humano sano tomando un producto homeopático se curan con ese mismo producto, si aparecen durante una enfermedad. Por ejemplo, cuando una persona sana utiliza el cáñamo, sufre alucinaciones: un minuto le parece una hora, los objetos que están cerca los ve como a millas de distancia; si empieza a reír, continúa durante tiempo; si empieza a hablar, no para; no se da cuenta de que se le escapa la orina y empieza a dolerle la cabeza. Según el principio de la medicina homeopática, si aparecen estos síntomas en cualquier enfermedad, pueden curarse con el remedio homeopático *Cannabis Indica*, que se prepara con cáñamo.

De este modo, en Homeopatía cualquier enfermedad se trata dependiendo de sus síntomas, sin que importe el nombre que tenga. Para descubrir los síntomas de un remedio, se prueba en personas sanas. Esto se conoce como *prueba de droga*.

La mayoría de las substancias utilizadas en la mesa para sazonar los alimentos serán, dentro de una o dos generaciones, remedios muy útiles, ya que los padres se envenenan con substancias como el té, el café, la pimienta y el tabaco (no podemos decir que el tabaco se ponga a la mesa) y estos efectos venenosos producen en los hijos una predisposición a enfermedades similares a las producidas por estas substancias.

Kent

El Dr. Tylor Kent describe la acción-reacción de esta forma: todo agente que actúa sobre un cuerpo vivo (todo medicamento) altera más o menos la fuerza vital y produce, durante un período más o menos largo, algunos cambios en la salud del individuo. Esto se llama *acción primaria*.

Aunque esta acción primaria es resultado de la unión de la fuerza medicinal y la vital, se debe principalmente a la primera.

Nuestra fuerza vital presenta una oposición energética a esta acción primaria y esta reacción automática de conservación de la vida se conoce como **acción secundaria** o reacción.

Durante la acción primaria de agentes morbíicos artificiales (medicamentos) en cuerpos sanos, la fuerza vital, como veremos en los ejemplos siguientes, parece actuar de una forma pasiva o receptiva, como si se viese impulsada a recibir impresiones desde fuera, actuando en contra y protegiendo su salud. Entonces parece replegarse y desarrollar (a) una condición completamente opuesta, si es posible, el efecto contrario, proporcionado a su propia energía y a la intensidad de la acción primaria, o, (b) donde no hay una condición exactamente opuesta a la acción primaria, la fuerza vital parece “no diferenciarse” y, aprovechando su fuerza superior, extingue los cambios mórbidos, restableciendo así la salud normal. Esto es el efecto posterior o curativo.

Todo el mundo está familiarizado con ejemplos de (a). Si metemos una mano en agua caliente, al principio está mucho más caliente que la otra; pero si la secamos bien, al cabo de un rato está más fría (efecto posterior o acción secundaria). Una persona que se ha calentado con ejercicio violento (acción primaria), siente después frío y escalofríos (acción secundaria). Al que se ha calentado bebiendo mucho vino (acción primaria) al día siguiente la respiración del aire le parece muy fría (acción secundaria). La vivacidad excesiva que se tiene al tomar un café cargado (acción primaria) produce pereza y somnolencia durante mucho tiempo después (reacción, acción secundaria), si no se evita tomando durante algún tiempo café fresco (paliativo). Después del sueño profundo producido por el opio (acción primaria), se tiene insomnio a la noche siguiente (reacción, acción secundaria). Después del estreñimiento producido por el opio (acción primaria) viene la diarrea (acción secundaria) y, después de una purga con medicamentos que irritan los intestinos (acción primaria), se tiene estreñimiento varios días (acción secundaria).

De un modo parecido, vemos siempre que, después de la acción primaria de un remedio que, en grandes dosis, produce un cambio importante en la salud de una persona sana, se le opone acción secundaria producida por nuestra fuerza vital.

Como consecuencia de la acción de dosis homeopáticas muy pequeñas, se perciben muy pocos efectos secundarios, ya que, aunque esas dosis pequeñas, observadas con meticulosidad, demuestran que producen un efecto primario perceptible, el organismo

humano considera esta reacción como un requisito indispensable para restablecer las condiciones normales.

Hay que recordar siempre que la Homeopatía se basa esencialmente en un tratamiento individual. Por consiguiente, nunca utiliza ni busca específicos para la enfermedad. Por eso, no hay que pensar que cualquier remedio mencionado en este libro sirve para todos los casos.

Así, pues, podemos sacar las siguientes conclusiones:

- 1.- La Homeopatía se basa en principios básicos naturales.
- 2.- Los remedios pueden crear enfermedades.
- 3.- Para descubrir todos los síntomas de un remedio, se prueba en personas sanas.
- 4.- Para tratar una enfermedad homeopáticamente, tenemos que administrar un remedio que tenga los mismos síntomas que presenta la enfermedad.

Los síntomas mentales y físicos creados en una persona sana por la administración de un remedio están catalogados en la **Materia Médica** homeopática.

Cómo se preparan los remedios homeopáticas y de dónde se sacan

Los remedios homeopáticos se sacan de plantas (raíz, corteza, tallo, brotes, hojas, jugos, resinas, aceites, etc. de plantas sanas), substancias vivas (secreciones de organismos sanos, venenos, etc.), impurezas corporales, químicas, sintéticas, minerales, etc. Estos remedios están disponibles como tinturas madre, triturados y potencias.

Para preparar o administrar remedios, se utilizan los medios siguientes, que no tienen cualidades médicas por sí mismos. Pueden ser secos o líquidos:

- 1.- Azúcar de leche, para preparar el triturado o añadirle el remedio.
- 2.- Azúcar de caña farmacéutica, para preparar globulos o tabletas.
- 3.- Agua destilada, para preparar y administrar los remedios.

- 4.- Alcohol, para preparar tinturas madre o potencias.
- 5.- Glicerina, para conservar y administrar los remedios.
- 6.- Vaselina, para preparar ungüentos.
- 7.- Éter solvente, para probar remedios.
- 8.- Jarabe simple, para preparar jarabes, etc.

Tintura madre

Las tinturas madre se preparan generalmente a partir de plantas, minerales y productos animales solubles en alcohol. La graduación del alcohol puede llegar a 90°. La tintura madre se representa con una “Ø”.

Triturados

Las substancias que no son solubles en alcohol se muelen con azúcar de leche para preparar triturados.

Potencia

Las tinturas madre y los triturados contienen el remedio en forma cruda. Se echan en alcohol y se agitan repetidas veces de una forma especial o se muelen con azúcar de leche en un mortero con un almirez para potenciarlos. Para la potenciación, la tintura madre y el alcohol, el azúcar de leche o el agua destilada deben estar en una relación de 1 a 9 o 1 a 99. Los remedios preparados de 1:9 reciben el nombre de potenciación con una “X” junto con el número, como, por ejemplo, 3X. Es una **escala decimal**. Si el remedio está preparado como 1:99 (**escala centesimal**) no escribimos nada con el número, por ejemplo, Nux-v.30 (España se anota como 30CH).

Cómo seleccionar el remedio homeopático

Ya hemos dicho que la Homeopatía se apoya en un principio básico de la naturaleza. La alopatía u otros sistemas occidentales no prestan atención a los síntomas del paciente. Se receta el remedio, según el nombre de la enfermedad, cualesquiera que sean sus síntomas.

Todo el mundo sabe que distintos pacientes que sufren la misma enfermedad pueden mostrar síntomas diferentes. Varios pacientes que tengan un resfriado común pueden presentar los síntomas distintos siguientes:

- a) Frío repentino, flujo nasal, estornudos, agravamiento de los síntomas en una habitación caliente, miedo, inquietud, sed, fiebre.
- b) Estornudos continuos a causa del frío, agravamiento en una habitación caliente, demasiado flujo acuoso corrosivo, jaqueca, tos, ronquera, ojos hinchados y lagrimeo no corrosivo. Mejora en espacios abiertos y lugares fríos.
- c) Flujo nasal corrosivo, ardor en los ojos y la nariz, deseo de beber en cortos intervalos, inquietud y miedo, debilidad, insomnio debido a la jaqueca, todos los síntomas mejoran con el calor.
- d) Flujo frío, flujo constante y lagrimeo ardiente en los ojos, calor en la cara aunque el paciente esté frío o sienta frío, agravamiento de los síntomas por las tardes y en una habitación caliente.
- e) Escalofríos en la espina dorsal, tensión y pesadez en la cabeza y la cara, estornudos y catarro post-nasal, somnolencia, fiebre que desaparece sin sudar y vuelve de nuevo, sensación de frío con micción intensa que alige ra la cabeza.

Los cinco pacientes mencionados muestran síntomas diferentes, aunque sufren todos un resfriado común. No se les puede dar los mismos remedios. Sus remedios serán los siguientes: a) Acónitum; b) Allium cepa; c) Arsenico album; d) Eufrasia, y e) Gelsemium.

Si estos cinco pacientes fuesen a un médico alópata, se les hubiese dado el mismo medicamento a todos. Al alópata no le preocupa el aumento o disminución del flujo ni sus características: solo le importa el frío, que tiene un medicamento. Este medicamento no cura el frío, sino que lo enmascara. Al cabo de algún tiempo, este frío enmascarado puede dar origen a otras enfermedades más serias.

La razón de dar un remedio diferente a cada paciente está en que, en el momento de probar las drogas, medicinas diferentes produjeron síntomas diferentes, lo que demuestra que el remedio homeopático está seleccionado siguiendo la norma de que ***similia similibus curentur***.

Tratamiento del paciente y no de la enfermedad

La razón que hay detrás de toda enfermedad es un desequilibrio de la fuerza vital. El equilibrio de la fuerza vital mantiene el cuerpo en un estado sano y esto facilita el flujo de las percepciones sensoriales y la sensibilidad. Si, por cualquier razón, se obstruyese o desviase este flujo de comunicación libre, el cuerpo enfermaría. Esta interrupción de la línea de comunicación sensorial se denomina shock. Puede deberse a una herida, a la muerte de un pariente cercano o una persona amada, a ahogamiento, a frío repentino, etc. El shock, un impacto emocional que trastorna el sistema dinámico,¹ está en la raíz de todas las enfermedades.

Algunas personas pueden decir que la enfermedad tiene causas muy diversas. Es cierto que puede haber muchas razones que activan y fomentan la enfermedad; pero, si no pueden producir un shock en el sistema dinámico, no pueden producir una enfermedad.

Se ha visto en algunos experimentos que, después de administrarle anestesia, no le afectan a un paciente venenos que pueden ser mortales, como el cianuro potásico o el ácido prúsico, aunque todos sabemos que pueden producir la muerte instantánea si se administra a personas sanas, incluso en dosis mínimas. Esto demuestra que un veneno mortal no afecta a una persona anestesiada, porque en ese estado no funciona el sistema dinámico de comunicación. Por tanto, si no aparece el shock, no se perturba el equilibrio de la fuerza vital y, por consiguiente, esta persona no se ve afectada por el veneno. Lo mismo ocurre cuando una persona está en coma.

El cuerpo humano vive mientras está funcionando su fuerza vital. Esta fuerza vital se manifiesta en la mente, en el sistema dinámico, etc., que son etéreos y no físicos. En cuanto el cuerpo físico se queda vacío de fuerza vital, termina la existencia y este estado se denomina muerte.

Ahora, la pregunta es: *¿Cuál es la razón de la Homeopatía?* Las drogas crudas o no potenciadas reducen nuestro sistema de defensas naturales del cuerpo y dejan campo libre a las enfermedades. Un remedio cumple básicamente la labor de equilibrar las fuerzas vitales

1.- Es un sistema formado por un conjunto de elementos en interacción y que evoluciona en el tiempo.

del cuerpo, de tal modo que se mantenga la línea de comunicación. Mientras no se altera la fuerza vital, el cuerpo se mantiene sano. Si enfermedades como la gangrena matan los tejidos, se destruye la fuerza vital de esa zona y el medicamento no tiene efecto en esa parte; pero los remedios homeopáticas pueden restablecer el equilibrio de la fuerza vital y desechar los tejidos muertos, con lo que se recupera la salud.

Todo accidente, grande o pequeño, produce un shock. Es necesario observar las normas generales de tratamiento de un shock (mantener a la víctima en calor, utilizar una botella de agua caliente, cubrirla con mantas, etc.). El remedio homeopático **Arn. 200**, en pequeñas dosis y a intervalos cortos, ayuda a la víctima a recuperarse en poco tiempo. El Árnica es uno de los remedios básicos en caso de shock.

Si la víctima queda inconsciente a causa del shock, *el Arnica le ayuda a recuperar la conciencia*. El dolor producido por una lesión física o mental se cura con Árnica. Las inflamaciones producidas por la dentición o por dolor, torcedura, fractura, etc. responden bien al Árnica.

No reprimas una enfermedad

Una enfermedad es como la basura de tu casa. Hay que tirarla. Taparla o dejarla a un lado no te protege de sus efectos nocivos. Del mismo modo, una enfermedad es un elemento extraño al cuerpo y hay que expulsarlo. Es una tontería mantenerlo escondido y dejar que se quede en el cuerpo. La Homeopatía actúa según el principio de eliminar la basura y no dejarla a un lado.

Dosificación y frecuencia del remedio

La ingestión del remedio debe repetirse en proporción a la gravedad de la enfermedad: en caso de emergencia, cada 10 o 15 minutos; en otros casos, puede bastar con dos o tres veces al día. Hay que recordar que, cuando empieza el remedio a mostrar su efecto, debe reducirse la frecuencia. La repetición innecesaria puede producir en el paciente los síntomas del remedio.

En enfermedades de larga duración, como las fiebres tifoideas o la neumonía, debe continuarse la medicación 3 o 4 veces al día, durante algún tiempo. Los remedios actúan mejor si se tiene el estómago vacío. El remedio potenciado debe ponerse en la boca recién limpia y dejar que se disuelva. Estas medicinas se presentan en tabletas o en glóbulos de diferentes tamaños. Normalmente se utilizan glóbulos del N°. 20 o el 30. Las dosis pueden variar de 2 a 3 glóbulos, en el caso de niños, y de 5 a 6, si se trata de adultos. Las tabletas son generalmente de la medida de un grano. Si se trata de niños, se les puede dar 1 o 2 tabletas y, si son adultos, 5 o 6. Para los bebés bastan unas pocas gotas de una tableta disueltas en agua. **50 milésimal** (potencia de 50 por 1000) se marcan como 0/1, 0/2, 0/3 y así sucesivamente, o LM-1, LM-2, LM-3, etc. Generalmente están preparadas en agua destilada. Se debe sacar una cucharadita de té 3 o 4 veces al día. No hemos analizado este proceso detalladamente, porque no es muy común; pero es muy eficaz en casos crónicos.

La tintura madre (\emptyset) se administra en dosis de 1 o 2 hasta 10 o 15 gotas, en agua.

Los viales o frascos que contienen un remedio deben conservarse en un lugar frío, lejos de la luz solar. Han de mantenerse lejos de olores fuertes. Conviene comprarlos en centros de confianza, porque deben tener la potencia correcta, etc. Una potencia incorrecta no da resultado y puede hacer que se agrave la enfermedad. No se debe ingerir nada media hora antes o después de tomar el remedio. Está prohibido tomar cebolla, café y cosas saladas, etc. junto con los remedios. Su médico puede darle información sobre esto. Si siente una ganas fuertes de comer, hágalo. Si algo no está de acuerdo con usted, evítelo. Las dietas vegetarianas y blandas ayudan durante la enfermedad.

Símbolos y abreviaturas utilizados en el libro

- ★ Eficaz en la mayoría de los casos.
- La mayoría de las veces, eficaz en otros casos
- Intercurrente/catalítico.
- ✿ Basado en nuestra experiencia clínica.

SOS Como y cuando se requiera.

\emptyset Tintura madre

gt. Gotas

C/. Cada

h. Hora

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

m. Minutos

Sem. Semanal

Quinc. Quincenal

- () Las cifras que van entre paréntesis indican el número máximo de dosis.
Es necesario consultar *Materia Medica* para conseguir cualquier aclaración.
Cuando una potencia concreta deja de ser efectiva, se recomienda la inmediata superior.

Aviso: cuando se producen cambios patológicos en el sistema, no deben usarse potencias elevadas y el tratamiento debe hacerse exclusivamente bajo el control de un médico experto.

Los usuarios tienen que comprender que esta obra no puede tomarse nunca al pie de la letra con garantía. La literatura homeopática es precisamente un tratamiento de larga duración y no un sustituto del contacto cara a cara entre el paciente y el médico.

Abreviaturas utilizadas para designar los remedios

A.D.N. = Ácido desoxiribonucleico
Abies-c. = Abies canadiensis
Abies-n. = Abies nigra
Abrom-a. = Abroma augusta
Abrot. = Abrotanum
Absin. = Absinthium
Acal. = Acalypha indica
Acet-ac. = Ácido acético
Acid-mur. = Ácido muriático
Acid-phos. = Ácido Fosfórico
Acon. = Aconitum napelus
Actea-rac = Actaea racemosa
Aegle-f. = Aegle folia.
Aegle-m. = Aegle-marmelos
Aesc. = Aesculus hippocastanum
Aesc-g. = Aesculus glaba
Aeth. = Aethusa cynapium
Agar. = Agaricus muscarius
Agn. = Agnus castus
Agra. = Agraphis mutans
Ail-g. = Ailanthus granulosa
Alet. = Aletris farinosa
Alf. = Alfalfa
All-c. = Allium cepa
Aloe. = Aloe socotrina
Alst. = Alstonia
Alum. = Alumina
Am-br. = Ammonium bromatum
Am-c. = Ammonium carbonicum
Am-m. = Ammonium muriaticum
Am-p. = Ammonium phosphoricum
Ambra-gr. = Ambra grisea
Amoora rohutika = Amoora rohutika*
Anac. = Anacardium orientale

Anan. = Anantherum
Ange. = Angelica
Ant ar. = Antimonium arsenicum
Ant. tart. = Antimonium tartaricum
Ant-c. = Antimonium crud
Ant-i. = Antimonium iod
Ant-t. = Antimonium tartaricum
Anthraci. = Anthracinum
Antip. = Antipyrrinum
Ap-g. = Apium graveolens
Aphis. = Aphis chenopodi
Apis. = Apis mel.
Apoc. = Apocynum
Aral. = Aralia racemosa
Aran. = Aranea diadema
Arg. met. = Argentum-metalicum
Arg. Nit. = Argentum-nitricum
Arn. = Arnica (arnica Montana)
Ars. = Arsenicum album
Ars-br. = Arsenicum bromatum
Ars-i. = Arsenicum iodatum
Arum-t. = Arum triphillium
Asaf. = Asafoetida
Asim. = Carica papaya
Astac. = Astacus fluviatilis
Aster. = Asteriacanthion rubens
Atis. = Atista indica
Aur. = Aurum metallicum
Aur-ar. = Aurum arseniosum
Aur-i. = Aurum iodatum
Aur-m. = Aurum muriaticum
Aur-m-n. = Aurum muriaticum natrorum
Aur-s. = Aurum sulph.
Aven. = Avena sativa
Bac. = Bacillinum

Bad. = Badiaga
Bapt. = Baptisia
Bar-c. = Baryta carbonica
Bar-m. = Baryta muriatica
Bell. = Belladonna
Bell-p. = Bellis perennis
Benz. = Benzinum
Benz-ac. = Benzoic acid.
Benz-ac. = Acido benzoico
Berb. = Berberis vulgaris
Berb-a. = Berberis Aquifolium
Bio-comb. = Bio-combination
Bism. = Bismuto
Blatta-o = Blatta orientalis
Boerh-d. = Boerhaavia difusa
Borx. = Borax
Both. = Botrops lanceolatus
Bov. = Bovista lycoperdon
Brom. = Bromium
Bry. = Bryonia alba
Bufo. = Bufo rana
Cad-i. = Cadmium iodatum
Cad-p. = Cadmium phosphoricum
Cad-s. = Cadmium sulphuratum
Caesal-b. = Caesalpinia bonduc
Caj. = Cajuput
Cal-ar. = Calcarea arsenicosa
Cal-c. = Calcarea carbonica
Cal-f. = Calcarea fluorica
Cal-i. = Calcarea iodata
Cal-p. = Calcarea phosphorica
Cal-pic. = Calcarea pierica
Cal-sil. = Calcarea silicata
Calad. = Caladium
Caladium s. = Caladium seguineum
Calc-caust = Calcarea caustica

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Calc-cn. = Calcarea calcinata	Cist. = Cistus canadiensis	Eup-per. = Eupatorium perfoliatum
Calc-p. = Calcarea phosphorica	Clem. = Clemastis recta	Euph. = Euphorbium
Calc-ren. = Calcarea renalis	Cob. = Cobaltum	Euph-po. = Euphoria polycarpa. (Kent)
Calc-sulph. = Calcarea sulphurica	Coca = Coca.	Euphr. = Euphrasia officinalis
Calen. = Calendula officinalis	Coc-c. = Coccus cacti	Faec. = Bacillus faecalis
Calo. = Calotropis gigantea	Cocc. = Coccus ind.	Ferr-ar. = Ferrum arsenicosum
Camph. = Camphora officinalis	Coff. = Coffea	Ferr-i. = Ferrum iodatum
Cann-i. = Cannabis indica	Colch = Colchicum	Ferr-met. = Ferrum Metallicum
Cann-s. = Cannabis sativa	Coll. = Collinsonia	Ferr-p. = Ferrum Phosphoricum
Canth. = Cantharis	Coloc. = Colocynth.	Ferr-pic. = Ferrum picricum
Caps. = Capsicum	Com. = Comocladia dentata	Fic-r. = Ficus religiosa
Carb-ac.=Acido Carbólico	Con. = Conium	Fl-ac. = Ácido Fluórico
Carbn-s. = Carbonéun sulphuratum	Con. = Conium maculatum	Fl-ac. = Flouric acid
Carbo an. = Carbo animalis	Conv. = Convallaria majaris	Frag. = Fragaria vesca
Carbo-veg. = Carbo vegetabilis	Cor-r. = Corallium rubrum	Frax. = Fraxinus americana
Carc. = Carcinusinum	Crat. = Crataegus oxicanta	Fuc. = Fucus vesiculosus
Card-m. = Carduus marianus	Chr-ac. = Chrysophanicum acidum	Gamb. = Gambogia
Cas-s. = Cascara sagrada	Croc. = Crocus sativus	Gels. = Gelsemium
Cassia-s. = Cassia Sophera	Crot. = Crotalus	Gent-l. = Gentiana Lutea
Cat. =Cactus grandiflorus	Crot-casc. = Crotalus cascavella	Glon. = Glonoinum
Caul. = Caulophyllum	Crot-h. = Crotalus horridus	Glyc. = Glycerinum
Caust. = Causticum	Crot-t. = Croton tiglium	Gnaph. = Ganaphalium polycephalum
Cean. = Ceanothus americanus	Cuc-c. = Cucurbita citrullus	Goss. = Gossipium herbaceum
Cedr. = Cedron	Cupr-ar. = Cuprum arseniosum	Gran. = Granatum
Cephd-i. = Cephalandra indica	Cupr-met. = Cuprum metallicum	Graph. = Graphites
Cham. = Chamomilla	Cupr-s. = Cuprum sulphuricum	Grat. = Gratiola
Cheir. = Cheiranthus cheiri	Cycl. = Cyclamen	Grin. = Grindelia
Chel. = Chelidonium	Cyn-d. = Cynodon dactylon	Guaj. = Guaiacum
Chen-a.=Chenopodium anthelminticum	Dam. = Damiana	Gunp. = Gun powder
Chim. = Chimaphilla umbellata	Dig. = Digitalis	Gymne. syl. = Gymnema silvestre
China = China	Dios. = Dioscorea	Ham. = Hamamelis-virg.
Chinin-ar. = Chininum arseniosum	Diph. = Diphtherinum	Hekla. = Heckla lava
Chinin-s. = Chininum Sulphuricum	Dol. = Dolichos pruriens	Hell. = Helleborus
Chion. = Chionanthus virginica	Dros. = Drosera	Helo-s. = Heloderma suspectum
Chlf. = Chloroform	Dulc. = Dulcamara	Helon = Helonias
Chlol. = Chloralum hidratum	Echi = Equinacea angustifolia	Hep. = Hepar sulphuris calcareum
Chloram. = Chloromyctein	Eel serum = Serum anguillae	Hipoz. = Hippozoeninum
Chol. = Cholesterinum	Elat. = Elaterium	Hist. = Histamine
Cic. = Cicuta virosa	Emb-r. = Embelia ribes	Hura = Hura brasiliensis
Cimic. = Cimicifuga	Emetin. = Emetine	Hydr. = Hydrastis canadensis
Cina = Cina	Equis-a. = Equisetum arvense	Hydr-ac. = Hydrocianic acidum
Cinnb. = Cinnabaris	Erig. = Erigeron canadense	
	Eug-szyg. = Eugenia Jambolana	

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Hydrangea. = Hydrangea arborescens	Liat. = Liatris spicata	Nat-i. = Natrum iodatum
Hydrc. = Hydrocotyle asiática	Lil-t. = Lilium trigrinum	Nat-m. = Natrum muriaticum
Hygroph-s. = Hygrophila spinosa	Lith.= Lithium carbonicum	Nat-p. = Natrum Phosphoricum
Hyos. = Hyoscyamus niger	Lob. = Lobelia inflata	Nat-s. = Natrum sulphuricum
Hyper. = Hypericum perforatum	Lyc. = Lycopodium	Nit-ac. = Nitricum acidum
I-t. = Iris tenax	Lycps-v. = Lycopus virginicus	Nit-s-d. = Nitri-spiritus dulcis
Ign. = Ignatia amara	Lys. = Lyssinum	Nuph.= Nuphar luteum
Influ. = Influenzinum	Mag-art. = Magnetis polus arcticus	Nux-v. = Nux vomica
Iod. = Iodium	Mag-aust. = Magnetis polus australis	Nux-m. = Nux moscata
Ip. = Ipecacuanha	Mag-p. = Magnesia Phosphorica	Nyct. = Nyctanthes arbor tristis
Iris = Iris versicolor	Magn-act. = Magnanum aceticum	O.A. Nosode = Nosode de osteoartritis
Jab. = Jaborandi	Maland = Malandrinum	Oci. = Ocimum canum
Jal. = Jalapa	Malar = Malaria officinalis	Oci-sa. = Ocimum santum
Joan = Jonesiia asoka	Manc. = Mancinella	Oena. = Oenanthe crocata
Just. = Justicea	Mand. = Mandragora officinatum	Ol-an. = Oleum animalis
Kali-ar. = Kalium arsenicosum	Mang. = Manganum aceticum	Onos. = Onosmodium CM
Kali-bi. = Kalium bichromicum	Med. = Medorrhinum	Op. = Opium.
Kali-br. = Kalium bromatum	Menth. = Mentha piperita	Orig. = Origanum
Kali-c. = Kalium carbonicum	Merc. = Mercurius solubilis	Orni. = Ornithogalum
Kali-chl. = Kalium chloricum	Merc-c. = Mercurius corrosivus	Ovi-p. = Ova tosta
Kali-i. = Kalium iodatum	Merc-cy. = Mercurius cyanatus	Ox-ac. = Oxalicum acidum
Kali-m. = Kalium muriaticum	Merc-d. = Mercurius dulcis	Paeonia. = Paeon.
Kali-nit. = Kalium nitricum	Merc-p-i. = Mercurius proto-iodatus	Par. = Paris quadrifolia
Kali-p. = Kalium phosphoricum	Mez. = Mezereum	Pareir. = Pareira brava
Kali-s = Kalium sulphuricum	Mg-m. = Magnesia Muriatica	Parot. = Parotidinum
Kalm. = Kalmia latifolia	Mg-p. = Magnesia Phosphorica	Passi. = Pasiflora incarnata
Kreos. = Kreosotum	Mg-s. = Magnesia Sulphurica	Pectin. = Pectinum
Lac. vac-def. = Lactis vaccini flos	Mill. = Millefolium	Penic. = Penicillinum
Lac-c. = Lac caninum	Mit. = Mitchella repens	Pert. = Pertussin
Lac-d. = Lac defloratum	Morb. = Morbillinum	Petr. = Petroleum
Lac-f. = Lac felinum	Morg-p. = Morgan pure	Phos. = Phosphorus
Lach. = Lachesis.	Morph-pur. = Morphinum purum	Phys. = Physostigma
Lact-ac. = Lacticum acidum	Mosch = Moschus	Phyt. = Phytolacca
Lap-a. = Lapis albus	Mur-ac. = Muriatic acid	Pic-ac. = Acidum picricum
Lat-m. = Latroductus mactans	Murx. = Murex	Pic-ac. = Picricum acidum
Lath. = Lathyrus sativus	Mygal. = Mygale	Pilo = Pilocarpinum
Lath-sy. = Lathyrus sylvestris	Myris. = Myristica sebifera	Pilo-mur. = Pilocarpinum muriaticum.
Laur. = Laurocerasus	Naja-t. = Naja tripudians	Pin-s. = Pinus silvestris
Lec. = Lecithinum	Naphtin. = Naphthalinum	Piper-n. = Piper nigrum
Led. = Ledum palustre	Nat-ars. = Natrum arseniosum	Pitu-gl. = Pituitary glandula
Lem-m. = Lemna minor	Nat-c = Natrum carbonicum	Plan-m. = Plantago mayor

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Plat. = Platinum	Sel. = Selenium metalicum	Term-a. = Terminalia arjuna
Plb. = Plumbum metallicum	Senc-atc. = Senecio auranticus	Term-c. = Terminalia chebula
Plb-i. = Plumbum iodatum	Seneg. = Senega	Teucr. = Teucrium marum verum
Pneu. = Pneumococcinum	Sep. = Sepia	Ther. = Theridion curassavicum
Podo = Podophilum.	Septi = Septicaeminum	There-ch. = Therebinthina chios
Pothos-foe. = Pothos foetidus	Sil. = Silicea	Thiosin. = Thiosinaminum
Prun-v. = Prunus virginiana	Sol-lycpr. = Solanum lycopersicum	Thir. = Iodothyrinum
Psor. = Psorinum	Sol-t. = Solanum tuberosum	Thlas. bur-p. = Thlapsi bursa pasto-
Puls. = Pulsatilla	Solid. = Solidago	ris
Pulx. = Pulex irritans	Spig. = Spigelia	Thuy. = Thuya occidentalis
Pyr. = Pyrogenium	Spong. = Spongia tosta	Thyr. = Thyroidinum
Pyrus. = Pyrus Americana	Squill-b. = Squilla bifolia	Tri-p. = Trillium pendulum
Querc. = Quercus glandium aqua	Squill. = Squilla maritima	Trom. = Trombidium muscae do-
Rad-br. = Radium bromatum	Stann. = Stannum metallicum	mesticae
Ran-b. = Ranunculus bulbosus	Staph. = Staphisagria	Tub. = Tuberculatum bovinum
Raph. = Raphanus sativus	Stel. = Stellaaria	(Kent)
Rat. = Ratanhia	Still. = Stillingia sylvatica	Tub-k. = Tuberculatum Koch
Rauw. = Rauwolfia serpentina	Stram. = Stramonium	Typh. = Typhoidinum
Rheum. = Rheum officinalis	Strep = Streptomicinum	Uran-n = Uranium nitricum
Rhod. = Rhododendron	Stront-c. = Strontium carbonicum	Urt-u. = Urtica urens
Rhus tox. = Rhus toxicodendron	Stroph. = Strophanthus. (hispidus y sarmentosus)	Ust. = Ustilago
Rhus-a. = Rhus aromatica	Stry. = Strychninum	Uva. = Uva ursi
Rhus-v. = Rhus venenata	Strych-g. = Strychnos gaulteriana	Vac. = Vaccinimum
Rob. = Robinia seudoacacia	Sul-ac. = Sulphuricum acidum	Valer. = Valeriana officinalis
Rumex c. = Rumex crispus	Sulfonam. = Sulphonamide	Vario. = Variolinum
Ruta g. = Ruta graveolensis	Sulo-ac. = Acid sulphurosum	Verat. = Veratrum album
Sabad. = Sabadilla	Sulphur. = Shulphur.	Verat-v. = Veratrum viride
Sabal. = Sabal serrulata	Symph. = Shymphytum officinale	Vib. = Viburnum opulus
Sabin. = Sabina	Symph-race. = Symphytum racemosus	Vib-p = Viburnum-Prunifolium
Sach. = Sacharum officinale	Syph. = Syphilinum	Vinc. = Vinca min.
Sal-ac. = Salicylic acid.	Syzyg. = Syzygium jambolarum	Visc. = Viscum album
Sal-n. = Salix nigra	T.N.T. = Trinitroglycerina	Wies. = Wiesbaden
Samb. = Sambucus nigra	Tab. = Tabacum	Wye. = Wyethia
Sang = Sanguinaria canadensis	Tarent. = Tarantula hispanica.	Yojm. = Yohimbinum
Sanic. = Sanicula aqua	Tarent-c. = Tarantula cubensis	Zinc-met. = Zincum met.
Sanic-eu. = Sanicula europea	Tell. = Tellurium metallicum	Zinc-p. = Zincum phosphoricum
Santin. = Santoninum	Ter. = Terebentina oleum (Kent)	Zinc-s. = Zincum sulphuricum
Sars. = Sarsaparilla		Zing. = Zingiber

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
<u>ABDOMINAL, Dolor</u>		
(Ver también <i>Cólico</i>)		
❑ Dolores fuertes; mejoran presionando en la zona dolorida; región umbilical dolorida.	Coloc. 30	C/. 3 h.
❑ Los alimentos caen al estómago como una piedra; heces duras, estreñimiento; ganas de estar echado tranquilamente.	Bry. 30 o 200	3 gt. C/. 2 h. (3)
❑ Dolor punzante; cólico histérico.	Ign. 30 o 200	C/. 3 h. (3)
❑ Punzadas; empeora con el movimiento; cólico premenstrual.	Kali-c. 30 o 200	C/. 3 h. (3)
❑ Espasmo doloroso, cortante inmediatamente después de comer.	Kali-bi. 30	C/. 3 h.
❑ Dolor por encima de la pelvis.	Verat-v. 30	C/. 3 h.
❑ Dolor después de descargar flatos en exceso; empeora si se toman alimentos ricos en grasas.	Puls. 30	C/. 3 h.
❑ Irradia desde el abdomen a otras partes.	Plb. 30	C/. 3 h.
❑ En la parte superior del abdomen; heces duras, estreñimiento.	Graph. 30	C/. 3 h.
❑ En la parte delantera del abdomen; lengua limpia.	Ip. 30	C/. 3 h.
❑ En la parte baja del abdomen.	Vib. 30	C/. 3 h.
❑ En el hipogastrio.	Cimic. 30	C/. 3 h.
★ El dolor cambia repentinamente y aparece en partes distantes, como los dedos de las manos y de los pies. Mejora al echarse hacia atrás y al estirar el cuerpo.	Dios. 30	C/. 3 h.
★ Tras una operación abdominal; indignación.	Staph. 30 o 200	C/. 4 h.
★ Despues de comer demasiado; por hábitos sedentarios.	Nux-v. 30	C/. 3 h.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
----------	----------	--------------------------

- ★ Dolor violento espasmódico; mejora con aplicaciones o bebidas calientes. Mg-p. 6X o 30 C/. 2 h.

Remedio bioquímico Bio-comb. No.3 C/. 3 h.

ABORTO

Hacer que nazca un embrión o feto antes de su tiempo se llama aborto. Puede ser espontáneo, debido a un susto, una caída, una herida, etc. o inducido. Algunas mujeres son propensas al aborto en meses concretos del embarazo.

Amenaza de aborto:

- ★ Por susto o excitación. Acon. 200 C/. 10 m. (3)
- ★ Hemorragia fuerte, con flujo continuo de sangre de color rojo vivo; cólico; lengua limpia. Ip. Ø o 30 C/. ½ h.
- ★ Aborto en cualquier mes (especialmente en el octavo). *La paciente debe hacer reposo completo en cama.* Vib-p. Ø o 30 C/. 2 h.
- ★ Para impedir el aborto, cuando empieza la hemorragia. Tri-p. Ø, 5-10 gt. C/. ½ h.
- Producido por una caída o golpe, etc. Arn. 200 C/. 10 m. (3)
- Producido por excitación mental. Cham. 30 o 200 C/. 2 h.
- Debido a un esfuerzo excesivo o emociones irritantes. Helon. Ø, 5-10 gt. C/. 2 h.
- Con sangre negra que no coagula. Crot. 30 o 200 C/. ½ h. (3)
- Debido a debilidad del útero. Caul. 30 C/. 3 h.
- Aborto durante el primer mes. Croc. Ø o 30 C/. 3 h.
- Tendencia al aborto, especialmente en pacientes anémicas. Alet. Ø, 5-10 gt. C/. 2 h.
- Cuando persiste la hemorragia algún tiempo. Thlas. bur-p. Ø, 5-10 gt. C/. 2 h.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
<input type="checkbox"/> Efectos posteriores al aborto; dolor en la parte baja de la espalda, genitales, etc.	Sabin. 30	C/. 6 h. (6)
<input type="checkbox"/> Para recuperarse de la debilidad producida por una hemorragia excesiva.	China 30	C/. 3 h.
Para evitar el aborto (cuando se tiene tendencia):		
Pueden darse los remedios dependiendo de los síntomas, al menos un mes antes de la fecha en que se espera que se produzca el aborto, cuando tiene lugar en meses concretos.		
<input type="checkbox"/> Para evitar la tendencia al aborto cuando hay trastornos de tiroides.	Thyr. 200	Sem. (3)
<input type="checkbox"/> En pacientes anémicas.	Ferr-met. 3X	C/. 3 h.
<input type="checkbox"/> Aborto debido a endurecimiento del cuello de la matriz.	Aur-m-n. 3X	C/. 3 h.
<input type="checkbox"/> En mujeres obesas y flojas con menstruación abundante y adelantada.	Cal-c. 200 o 1M	Sem.(3)
<input type="checkbox"/> En mujeres histéricas con complejo de superioridad.	Plat. 1M	C/. 10 m.
<input type="checkbox"/> Aborto en los primeros meses; habitual en el 2º.	Kali-c. 1M	Sem. (3)
<input type="checkbox"/> Habitual en el 2º., 3º. o 4º. mes.	Apis. 200	Sem. (3)
<input type="checkbox"/> Durante el 3º. mes, con hemorragia negruzca.	Kreos. 30 o 200	Sem. (3)
<input type="checkbox"/> Durante el 3º. mes; hemorragia parcialmente coagulada; empeora al mínimo movimiento.	Sabin. 200 o 1M	Sem. (3)
<input type="checkbox"/> Aborto en los meses 5º. a 7º.	Sep. 30 o 200	Sem. (3)
<input type="checkbox"/> Aborto en los meses 2º. y 7º.	A.D.N. 1M	Sem. (3)
<input type="checkbox"/> Aborto después del 7º. mes.	Op. 200 o 1M	Sem. (3)
<input type="checkbox"/> En mujeres de útero débil y enfermizo, con historial de menstruaciones abundantes que duran varias semanas.	Sec-cor. 30 o 200	C/. 4 h.
<input checked="" type="checkbox"/> Remedio intercurrente; cuando hay antecedentes familiares de tuberculosis.	Tub-k. 200 o 1M	Quinc. (3)

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
● Remedio intercurrente; cuando hay historial de aborto.	Syph. 200 o 1M	Quinc. (3)
Remedios bioquímicos	Kali-p. 6X, Cal-p. 6X y Cac. f. 6X	C/. 4 h.

Cuando empieza el dolor o la hemorragia, la paciente debe echarse en una posición cómoda. En caso de emergencia se necesita hospitalización.

Para producir el aborto (cuando las menstruaciones se han retrasado sólo unos días):

Goss. Ø, Puls. Ø, y Sec-cor. Ø, en igual cantidad, con dosis de 40 gotas, 4 veces al día, durante 3-4 días (se tiene éxito en un 70% de los casos, aproximadamente).

ABSCESOS Y FORÚNCULOS

(Ver *Apostemas y diviesos*)

ACIDEZ

Hiperacidez (gastralgia)

Se llama hiperacidez a un grado anormal de acidez en el estómago que produce retortijones, dolores corrosivos o contractivos y ardor, etc. en el estómago, asociado con inquietud, eructos, jaqueca, estreñimiento, etc.

- | | | |
|--|-------------|----------|
| ★ Exceso de ácido hidroclorhídrico; ardor en el esófago, dolor en la boca del estómago, náuseas y sensación de frío. | Sul-ac. 30 | C/. 4 h. |
| ★ Por preocupación nerviosa por acontecimientos venideros; deseo de tomar dulces. | Arg-nit. 30 | C/. 4 h. |
| ★ Dolencias gástricas después de tomar alimentos grasos; poca o ninguna sed; mejora al aire libre. | Puls. 30 | C/. 4 h. |
| □ Hiperacidez; eructos agrios y amargos. | Iris. 30. | C/. 4 h. |

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
❑ Digestión lenta e imperfecta; flatulencia maloliente en la parte superior del abdomen; se mejora con la descarga de gases o eructos.	Carbo-veg. 30	C/. 4 h.
❑ Trastornos gástricos debidos a costumbres sedentarias o excesos de comida.	Nux-v. 30	C/. 4 h.
☆ Dispepsia; mejora después de comer.	Anac. 30	C/. 4 h.
❑ Acidez con eructos irritantes y jaqueca frontal; empeora por la noche.	Rob. 30	C/. 4 h.
❑ Eructos constantes; lengua sucia, con una capa blanquecina. Cardialgia. Ganas de tomar ácidos, escabeches, etc.	Ant-c. 30 o. 200	C/. 6 h.
❑ Digestión lenta; no cambia después de expulsar gases o eructar. Efectos de flatulencia en la parte media del abdomen.	China 6 o 30	C/. 4 h.
❑ Hinchazón del abdomen; se sacia fácilmente, el gas afecta a la parte inferior del abdomen; empeora por la tarde, de 4 a 8 pm.	Lyc. 30	C/. 4 h.
☆ Dolor y flatulencia en el estómago; el olor de los alimentos produce náuseas.	Colch. 30	C/. 4 h. (3)
● Remedio intercurrente.	Psor. 30	C/. 4 h. (3)
Remedio bioquímico Especialmente para niños		Nat-p. 3X o 6X
ACNÉ		C/. 3 h.
Granos		

El acné es una erupción inflamatoria, folicular, papulosa y pustular que afecta al sistema sebáceo de la cara, el pecho y la espalda.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
● Remedio capital. Los granos empeoran durante la menstruación; también empeoran después de ingerir grasas, azúcar, café y carne.	Psor. 200 o 1M	<i>Sem. (3)</i>
★ Granos en la edad de la pubertad, con picor.	Aster. 30	<i>C/. 6 h.</i>
★ Si falla <i>Aster.</i> ; erupciones pustulosas.	Kali-br. 30	<i>C/. 6 h.</i>
□ Casos crónicos; empeora cuando se toman huevos o en invierno.	Strep. 200 o 1M	<i>Sem. (3)</i>
□ Para limpiar la complejión.	Berb-a. Ø,	<i>7-8 gt. C/. 4 h.</i>
□ Granos; estreñimiento y heces parecidas a las de oveja; empeora con baños de mar.	Mg-m. 30	<i>C/. 6 h.</i>
□ Acné en la nariz; mejora en tiempo húmedo.	Caust. 30	<i>C/. 6 h.</i>
□ Para evitar la tendencia a los granos y purificar la sangre.	Echi. Ø,	<i>5-10 gt. C/. 4 h.</i>
□ Acné rosáceo. Los granos son dolorosos hasta cierta distancia alrededor; empeora durante la menstruación.	Eug-syzyg. Ø,	<i>5-10 gt. C/. 4 h.</i>
□ Granos duros como picotazos de pulga; sabañones.	Agar. 30 o 200.	<i>C/. 6 h.</i>
□ Humedad de la piel; granos; digestión lenta; flatulencia; mejora con la ventilación.	Carbo-veg. 30 o 200	<i>C/. 6 h.</i>
□ Granos de color rosado; palidez como la cera; personas frioleras.	Sil. 200 o 1M	<i>Sem. (3)</i>
● Acné en pacientes tuberculosos.	Tub-k. 200 o 1M.	<i>Sem. (3)</i>
□ Acné duro; base dura con pústulas en la punta; sudor por la noche.	Ars-i. 3X o 6	<i>C/. 4 h.</i>
● Cuando fallan los remedios anteriores (remedio intercurrente).	Sulphur 200 o 1M	<i>Sem. (3)</i>
Remedio bioquímico		<i>C/. 4 h.</i>
Especialmente en muchachas que tengan trastornos menstruales y debilidad en general.		

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
----------	----------	--------------------------

ADENOÏDES

Hipertrofia de los nódulos linfoides que hay en la pared posterior de la rinofaringe, debida a inflamación crónica.

- | | | |
|---|--------------------------|-------------------|
| ● Para empezar el tratamiento; también como remedio intercurrente. | Bac. 1M o 10 M | <i>Quinc. (3)</i> |
| ✗ En niños obesos y flojos, que se resfrían con cada cambio del tiempo; frío en las extremidades. | Cal-c. 200 o 1M | <i>Sem. (6)</i> |
| ✗ En niños que tienen ataques recurrentes de amigdalitis aguda. | Bar-c. 200 o 1M | <i>Sem. (6)</i> |
| ✗ Olor fétido; descarga nasal densa, continua, de color verdoso-amarillento; coriza con bloqueo de nariz. | Kali-bi. 30 o 200 | <i>C/. 4 h.</i> |
| ◻ Con hipertrofia linfoide; mucosidad amarillenta; catarro post-nasal. | Hydr. 30 | <i>C/. 4 h.</i> |
| ◻ Expectoración verdosa y purulenta; sensibilidad al frío. | Cal-i. 30 o 200 | <i>C/. 4 h.</i> |
| ◻ Sensibilidad al frío; sensación de calor y sequedad en la garganta; bebe con frecuencia; mejora después de comer. | Cist. 30 | <i>C/. 4 h.</i> |
| ● Catarro crónico; bloqueo de nariz, descargas malolientes; paciente friolero. | Psor. 200 o 1M | <i>Sem. (3)</i> |
| ◻ Paciente propenso al frío; obstrucción de las fosas nasales; amigdalitis crónica. Se respira con la boca abierta. | Agra. 6 o 30 | <i>C/. 4 h.</i> |

Remedios bioquímicos

Cuando los adenoides cubren el espacio post-nasal y la faringe.

Cal-f. 12X y

Cal-p. 6X

C/. 4 h.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
----------	----------	--------------------------

ADICCIONES

Para reducir el deseo

El hábito de tomar drogas o abusar del alcohol, etc. es perjudicial para el individuo.

<input type="checkbox"/> Al opio.	Berb. Ø.	5-10 gt. C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> A la morfina.	Aven. Ø,	10-20 gt. C/. 4 h.
● Afición hereditaria al alcohol.	Syph. 1M	Sem. (6)

Remedios bioquímicos

Para tonificar el sistema nervioso

Kali-p. 6X y
Nat-p. 3X

C/. 4 h.

AFLICCIÓN

<input type="checkbox"/> Impacto severo debido a la muerte repentina de seres amados; inquietud, ansiedad y miedo.	Acon. 200	C/. 10 m. (3)
<input type="checkbox"/> Tristeza continua; no se puede superar la pérdida de seres queridos.	Ign. 1M o 10M	C/. 6 h. (3)
<input type="checkbox"/> Cuando el sufrimiento está en la mente consciente; el paciente llora; no le gusta la simpatía.	Nat-m. 200 o 1M	C/. 6 h. (3)
<input type="checkbox"/> Para sufrimiento e indignación crónicos.	Staph. 200 o 1M	Sem. (3)

Remedio bioquímico

Kali-p. 6X

C/. 4 h.

AFONÍA

*Pérdida de la voz
(Ver también Ronquera)*

<input type="checkbox"/> Con ronquera; después de una enfermedad agotadora.	Carbo-veg. 30	C/. 4 h.
---	---------------	----------

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
<input type="checkbox"/> Por uso abusivo de la voz; agotamiento nervioso.	Kali-p. 6X o 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Con laringitis; por vocear constantemente.	Phos. 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Después de acalorarse; de origen gástrico.	Ant-c. 30	C/. 4 h.
Remedios bioquímicos		
Ferr-p. 6X y Kali-p. 6X		C/. 4 h.

AFTAS

(Ver también *Úlceras bucales*)

Pequeños puntos blancos, asociados con frecuencia con úlceras pequeñas de la membrana mucosa de la boca, que aparecen en llagas de la boca o con la infección de Vincent. Aunque suelen estar producidos por un virus o un hongo, pueden aparecer después del uso de antibióticos de amplio espectro, etc.

<input type="checkbox"/> Dolor; ampollas blanquecinas en la boca; sangran con facilidad.	Borx. 30	C/. 3 h.
<input type="checkbox"/> Ampollas dolorosas con mal olor; exceso de saliva; mucha sed con la boca húmeda.	Merc. 30	C/. 3 h.
<input type="checkbox"/> Grave; ampollas dolorosas. Saliva irritante y mal oliente.	Nit-ac. 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> La boca huele mal, a agrio; sarro en los dientes y las encías; hinchazón de las glándulas.	Acid-mur. 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Aftas con hinchazón de la lengua y mucha saliva; las encías sangran con facilidad; piorrea.	Sul-ac. 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Aftas con ampollas que producen ardor; postración e inquietud; sed insaciable, se bebe agua con frecuencia.	Ars. 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Aftas graves en carne viva y con ardor; encías hinchadas y esponjosas que sangran con facilidad; hinchazón de la lengua. El paciente se siente peor después de dormir.	Lach. 30	C/. 4 h.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
★ Aftas; estomatitis; lengua con capa amarillenta, grande y floja, con marcas dentales; estreñimiento.	Hydr. 30	C/. 4 h.
Remedio bioquímico Con acuosidad de la boca	Nat-m. 6X o 12X	C/. 4 h.

Nat-p. 6X y **Kali-m. 6X**, dos tabletas 3 veces al día da excelentes resultados, junto con otros remedios homeopáticos.

Para uso externo

- 1) **Borx.** mezclado con miel.
- 2) Una parte de **Hydr. Ø**, y 9 de **Glicerina**, mezcladas, dan buenos resultados.
- 3) En casos graves, puede utilizarse **Echi. Ø** para lavar la boca (5 a 7 gotas en medio vaso de agua templada).

ALBUMINURIA

Albuminuria es la presencia de proteínas en la orina, especialmente albúmina.

★ Orina albuminosa, con ardor y dolor como si tirasen de la uretra.	There-ch. Ø ,	5-10 gt. C/. 4h.
★ Orina turbia; maloliente, contiene mucosidad sangrienta o sucia; dificultad para orinar.	Chim. Ø ,	5-10 gt. C/. 4 h.
□ Orina frecuente; profusa, orina acuosa, lechosa; empeora por la noche.	Acid-phos. Ø .	5-10 gt. C/. 4 h.
□ Orina albuminosa; alcalina, clara y abundante; contiene fosfatos.	Helon. Ø ,	5-10 gt. C/. 4h.
● Historial de gonorrea reprimida, micción lenta y dolorosa.	Med. 200 o 1M	C/. 10 m. (3)
★ Necesidad frecuente de orinar; ardor en la uretra al empezar a orinar. Orina oscura, escasa y sanguinolenta.	Merc. 200 o 1M	Sem. (3)
□ Orina albuminosa con dolor fuerte en la uretra y gota; durante el embarazo.	Merc cor. 30	C/. 6 h.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
❑ Necesidad frecuente de orinar; orina escasa, oscura, color café. Vejiga abultada.	Hell. Ø 0 30	C/. 6 h.
❖ Orina turbia; marrón con sedimentos rojos, hematuria; sed de agua fría o helada.	Phos. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
❖ Orina escasa; de color fuerte cargada de diversos matices; ardor y molestias al orinar; pérdida de sed; empeora con el calor.	Apis. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
❑ Orina oscura; escasa o nula, sanguinolenta, marrón, negruzca; contiene albúmina; el paciente se encuentra peor al oler alimentos.	Colch. 30 o 200	C/. 4 h.
❑ Cuando la orina contiene sangre y albúmina; dolor como culebrinas con ataxia locomotriz; fatiga cerebral; nerviosismo y vértigo.	Zinc-p. 30	C/. 4 h.
❖ Orina albuminosa, turbia y escasa; ardor fuerte en la uretra al orinar.	Canth. 30	C/. 4 h.
Remedio bioquímico		Kali-p. 6X
C/. 4 h.		

ALCOHOL

Efectos nocivos

❖ Para los efectos nocivos del abuso de alcohol; temblores, delirio y dolencias gástricas, etc.; paciente irritable y nervioso.	Nux-v. 30 o 200	C/. 4 h.
❖ Cuando el paciente no puede digerir ni una cantidad mínima de alimento sin tomar alcohol.	Sul-ac. 30	C/. 4 h.
❑ Cuando el paciente se pone violento y hablador después del uso prolongado del alcohol.	Cann-i. 30 o 200.	C/. 4 h.
❑ Para pacientes que beben excesivamente y tienen muchos miedos en su mente. Delirium tremens.	Op. 200 o 1M	C/. 10 m. (3)

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
❑ El paciente se intoxica al tomar pequeñas cantidades de bebidas alcohólicas; especialmente en solterones.	Con. 200	C/. 6 h. (6)
❑ Con estreñimiento habitual y heces duras; el paciente se intoxica con pequeñas cantidades de bebidas alcohólicas.	Alum. 30 o 0/5 o superior.	C/. 4 h
☆ Para personas de mal carácter, de malos sentimientos y celos por naturaleza que dicen insensateces, incluso antes de beber.	Lach. 30 o 200	C/. 6 h.
❑ Delirium tremens constante; locuacidad.	Hyos. 30 o 200.	C/. 10 m.(3)
☆ Delirium tremens inflamatorio; afluencia de sangre hacia la cabeza.	Bell. 30	C/. ½ h.
☆ Delirium tremens maniático; alucinación, ilusiones y miedo a la oscuridad.	Stram. 200 o 1M	C/. 10 m. (3)
❑ Depresión mental y temblores; intento de autolesionarse.	Cimic. 30 o 200	C/. ½ h.
Remedio bioquímico		
Para tonificar el sistema nervioso		
	Kali-p. 6X	C/. 4 h.

ALCOHOLISMO

Para crear aversión

☆ Para crear aversión a las bebidas alcohólicas. El agua produce frío en el estómago; debe mezclarse con licores.	Sul-ac. 30,	C/. 4 h.
☆ Para borrachos crónicos de corazón débil.	Stroph. Ø.	10 gt. C/. 4 h.
❑ Para eliminar el deseo de tomar alcohol.	Querc. Ø	30-40 gt. C/. 4h.
❑ Para que el alcohol resulte desagradable.	Ange. Ø,	10 gt. C/. 4 h.
● Tendencia hereditaria (deseo excesivo) a las bebidas alcohólicas.	Syph. 1M o 10 M.	Sem. (12)
✿ Si falla Ange. Ø.	Camph. Ø,	5 gt. C/. 4 h.(SOS)

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
❖ Deseo de tomar bebidas alcohólicas en vez de agua.	Ars. 30	C/. 3 h. (SOS)
❑ Para personas débiles y nerviosas que son adictas al alcohol.	Aven. Ø,	10-15 gt. C/. 4 h.
Remedio bioquímico	Kali-p. 6X	C/. 4 h.

ALERGIAS

Hipersensibilidad a algunos alimentos, bebidas, medicinas, etc.

Para aliviar situaciones alérgicas, se puede administrar en algunos casos el mismo alérgeno en dosis mínimas (potenciadas), tan pequeñas que no produzcan síntomas. En Homeopatía, la “ley de semejantes” es la única respuesta.

❖ Alergia al polvo; al humo, a los perfumes fuertes.	Hist. 1M	Sem. (3)
❑ Alergia al pan; a los alimentos ácidos.	Nat-m. 30 o 200	C/. 4 h.
❑ Alergia a la cerveza; al licor de malta.	Kali-bi. 30	C/. 4 h.
❑ Alergia al polvo (asma).	Pothos-foe. 6 o 30	C/. 4 h.
❑ Alergia a la leche hervida caliente; al cerdo graso, (diarrea).	Sep. 30 o 200	C/. 4 h.
❑ Alergia a la leche.	Mg-c. 30 o 200.	C/. 6 h.
❑ Alergia al aceite de hígado de bacalao.	Hep. 30	C/. 6 h.
❑ Alergia a la aspirina; a los licores malos, a la mantequilla salada, a los huevos en mal estado, a los productos del pollo.	Carbo-veg. 30	C/. 4 h.
❑ Alergia a los antibióticos.	Sulphur 30 o 200	C/. 6 h. (3)
❑ Alergia al aceite de castor.	Bry.. 30	C/. 6 h.
❑ Alergia al café.	Nux-v. 30	C/. 4 h.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
<input type="checkbox"/> Alergia al calor.	Apis. 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Alergia a las bebidas frías; fruta, alimentos estropeados, yodina.	Ars. 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Alergia a la humedad.	Dulc. 30 o 200	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Alergia al olor de las flores (asma).	Ail-gt. 6 o 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Alergia a los dulces; comidas grasas, cebolla.	Thuy. 30 o 200	C/. 6 h. (3)
<input type="checkbox"/> Alergia al azúcar.	Arg. Nit. 30 o 200.	C/. 6 h. (3)
<input type="checkbox"/> Alergia al arroz.	Tell. 30 o 200	C/. 6 h.
<input type="checkbox"/> Alergia a la col.	Petr. 30 o 200	C/. 6 h.
<input type="checkbox"/> Alergia al queso.	Nit-s-d.Ø o 30.	C/. 6 h.
<input type="checkbox"/> Alergia a la leche fría.	Kali-i.200	C/. 6 h.
<input type="checkbox"/> Alergia a las verduras pasadas.	Carbo-an. 30 o 200.	C/. 6 h.
<input type="checkbox"/> Alergia a la fruta verde; a las ciruelas.	Rheum. 200	C/. 6 h.
<input type="checkbox"/> Alergia a la carne de ternera.	Kali-nit. 200	C/. 6 h.
<input type="checkbox"/> Alergia a los pasteles; a los helados, a la mezcla de comidas.	Puls. 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Alergia a la limonada.	Sel. 30 o 200	C/. 6 h.
<input type="checkbox"/> Alergia a los alimentos indigestos; lengua limpia, náuseas constantes.	Ip. 30 o 200	C/. 6 h.
<input type="checkbox"/> Alergia al melón.	Zing. 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Alergia al yoduro de potasio.	Aur. 30 o 200	C/. 6 h.
<input type="checkbox"/> Alergia al azúcar; a los alimentos amargos.	Nat-p. 6X o 30.	C/. 4 h.
<input checked="" type="checkbox"/> Remedio intercurrente.	Psor. 200 o 1M	<i>Quinc.</i> (3)
<input type="checkbox"/> Alergia al vinagre; la sal, los alimentos agrios, los ácidos.	Lach. 200	Sem. (3)

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
<input type="checkbox"/> Alergia a las fresas.	Ox-ac. 30 o 200	Sem. (3)
<input type="checkbox"/> Alergia a las ostras.	Lyc. 200	Sem. (3)

ALIMENTOS Y BEBIDAS

(Ver también *Alergias*)

<input type="checkbox"/> Apio (picor).	Ap-gt. 30 o 200	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Fresas (urticaria).	Frag. 30 o 200	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Azúcar.	Sach. 30 o 200	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Quinina.	Chinin-s. 30 o 200	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Perejil.	Petr. 30 o 200	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Huevos.	Sulphur 30 o 200	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Cerveza; escabeches, agrios y vinagre.	Ferr-met. 30 o 200	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Alimentos o bebidas en conserva o fríos; fruta pasada.	Ars. 30 o 200	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Alimentos pesados, grasientos o surtidos; huevos, productos no vegetales, etc.	Puls. 30 o 200	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Cebollas.	Thuy. 30 o 200	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Ostras	Lyc. 30 o 200	C/. 4 h.
<input checked="" type="checkbox"/> Trigo; leche.	Psor. 30 o 200	Sem. (3)
<input type="checkbox"/> Col; ensalada de verduras y pollo.	Bry. 30 o 200	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Asados.	Pectin. 30 o 200	C/. 4 h.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
<u>AMEBIASIS</u>		
(Ver también Disentería)		
☆ Lengua limpia; heces viscosas, verdosas o como una melaza espumosa; retortijones en el ombligo.	Ip. 30 o 0/5 (y superior) C/.	4 h.
☆ Con desesperación, abatimiento e irritabilidad; pérdida de peso.	Emetin. 30	C/ 4 h.
□ Heces verdosas, sanguinolentas y viscosas; empeora por la noche, con dolor y pujos en el abdomen; sensación de no conseguir evacuar.	Merc. 30	C/ 4 h.
□ Heces fétidas, con flatos; debilidad después de defecar; heces involuntarias, el paciente siente como si el ano se quedase abierto.	Phos. 30	C/ 4 h.
Remedio bioquímico	Kali-p. 6X	
<u>AMIGDALITIS</u>		
(Ver también Disentería)		
Llamamos así a la inflamación de las amígdalas.		
● Remedio intercurrente.	Bac. 1M	Quinc. (3)
☆ Fiebre alta, con enrojecimiento e inflamación de las amígdalas; después de una exposición; dolor pulsante que llega a los oídos.	Bell. 30	C/ 3 h.
☆ En pacientes frioleros; hipersensibles a todo tipo de frío; inflamación de las amígdalas; dolor pulsante, etapa de supuración.	Hep. 30 o 200.	C/ 4 h. (3)
☆ Dificultad para tragar en vacío; empeora con el humo.	Ign. 200 o 1M	C/ 10 m. (3)

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
❖ Las molestias de las amígdalas empiezan por el lado izquierdo; empeoran con el calor, el vinagre y las comidas agrias, y mejoran con el frío.	Lach. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
❑ Las molestias empiezan por lado derecho; muy dolorosas.	Lyc. 200 o 1M	C/. 10 m. (3)
❖ Con mal aliento; enrojecimiento y punzadas dolorosas; empeora por la noche.	Merc. 30 o 200.	C/. 4 h.
❖ Una exposición ligera hace que empeoren las amígdalas; amígdalas inflamadas.	Bar-c. 200 o 1M	C/. 10 m. (3)
❖ Amígdalas enrojecidas con puntos blancos; dolorosas.	Phyt. 30	C/. 4 h.
❑ Amigdalitis; alterna de lado.	Lac-c. 200	C/. 10 m. (3)
❑ Dificultad para tragar; tos seca.	Spong. 30	C/. 4 h.
❑ Sólo puede tragar líquidos; los sólidos producen náuseas.	Bap. 30	C/. 4 h.
❑ Empeora con el calor; mejora con el frío; pérdida de sed; punzadas dolorosas en las amígdalas.	Apis. 200	C/. 10 m. (3)
❑ Amigdalitis folicular; por infección de estreptococos; dolor al tragar, que pasa a los oídos.	Ail-gt. 30	C/. 4 h.
❑ Dificultad para tragar; el paciente parece un viejo prematuro.	Zinc-p. 30 o 200	C/. 4 h.
❑ Inflamación de las amígdalas; muy dolorosas, con tendencia a supurar; paciente friolero.	Sil. 200 o 1M	C/. 10 m. (3)
● Casos crónicos; amígdalas con úlceras; el paciente se cubre con ropa caliente, hasta en verano.	Psor. 200 o 1M	C/. 10 m. (3)
❑ Con endurecimiento crónico de las glándulas parótidas; tos; empeora de 3 a 4 de la madrugada.	Kali-c. 200	C/. 10 m. (3)
❑ Mejora con el calor y con bebidas calientes; empeora con el frío; inquietud y sensación de ardor.	Ars. 30	C/. 4 h.
Remedio bioquímico	Biocom. No. 10.	C/. 4 h.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
----------	----------	--------------------------

AMPOLLAS

(Ver también *Piel*)

□ Debidas a picaduras de insectos; pérdida de sed.	Apis. 30	C/. 4 h.
□ Por caminar demasiado; exposición al fuego, sol, etc.	Canth. 30	C/. 4 h.
□ En los dedos; anchas, llenas de suero oscuro.	Ail-gt. 30	C/. 4 h.
□ Con costra; en fiebre tifoidea.	Acid-phos. 30	C/. 4 h.
□ Ampollas en fiebre tifoidea (pus).	Bapt. 6 o 30	C/. 4 h.
□ Ampollas con picor fuerte y cerco rojizo.	Rhus tox. 30	C/. 4 h.
□ Ampollas con pus blanco dentro; sensibles al tacto.	Hep. 30	C/. 4 h.
□ Ampollas de fiebre, especialmente en los labios.	Nat-m. 6X o 30	C/. 4 h.
Remedio bioquímico		Sil. 6X o 12X
		C/. 4 h.

ANEMIA

❖ Anemia debida a pérdida de fluidos vitales; pérdida de sangre, menstruación excesiva, pérdida de semen, disentería, etc., con mucha debilidad; frío en las extremidades con hidropesía.	China 6 o 30	C/. 4 h.
❖ Anemia con desaliento, después de un pequeño esfuerzo. Aflujo repentino caliente en el rostro, con palidez de las partes e hinchazón de hidropesía.	Ferr-met. 3X o 6	C/. 4 h.
□ Anemia debida a excesos sexuales.	Acid-phos. 30	C/. 4 h.
□ Producida por sobredosis de hierro. Trastornos menstruales; falta o pérdida de sed; mejora al aire libre y frío.	Puls. 30	C/. 4 h.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
❑ Anemia con extrema postración e inquietud; debida a malaria o influencia tóxica. Irritabilidad e inquietud; demasiada sed, se toma agua con frecuencia.	Ars. 30	C/. 4 h.
☆ Anemia después de una tensión nerviosa prolongada.	Phos. 200	C/. 3 h. (3)
❑ Anemia de personas obesas y flojas aficionadas a comidas indigestas.	Cal-c. 1M	Sem. (3)
❑ Anemia de hombres de negocios, personas dedicadas al estudio, etc., debida a la vida sedentaria y a la ingestión de estimulantes, como el té, las bebidas alcohólicas, etc.	Nux-v. 30	C/. 4 h.
❑ Anemia con palpitación y desfallecimiento.	Stroph. Ø,	5-10 gt. C/. 4 h.
❑ Anemia progresiva y perniciosa; fatiga mental y excitación sexual.	Pic-ac. 30	C/. 4 h.
❑ Anemia con máxima debilidad y palpitaciones en todo el cuerpo; pulso flojo; depresión general; los pacientes se encuentran peor a las 3 de la mañana.	Kali-c. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
● Anemia con jadeo. El paciente se siente mejor echado y con calor; le apetece ropa de abrigo, incluso en verano.	Psor. 200	Sem. (3)
❑ Para anemia aplástica.	T.N.T. 200	Sem. (3)
❑ Anemia después de una larga malaria. Adelgazamiento a pesar de comer bien; sed excesiva; depresión; el consuelo agrava. Deseo de tomar mucha sal.	Nat-m. 6X o 30	C/. 4 h.
❑ Anemia perniciosa o clorótica en muchachas de compleción débil.	Cal-p. 6X	C/. 4 h.
Remedios bioquímicos		
	Ferr-p. 1X o 3X y	
	Cal-p. 6X	C/. 4 h.
	Bio-comb. No. 1	C/. 4 h.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
----------	----------	--------------------------

ANGINA DE PECHO

- Dolor agudo; ahogo y opresión en el pecho (zona del corazón). **Cat. Ø, 10-15 gt. C/ 15-20 m. (3)**
- ☆ Angina de pecho con dolor y entumecimiento que pasan al brazo izquierdo y a los dedos; casi específico en estados agudos. **Lat-m.3X a 30.** *C/ 10 m. (3)*
- Dolor en el pecho y el brazo izquierdo; el movimiento del corazón cesa repentinamente; sensación ahogo inminente, miedo a volverse loco, ideas de suicidio. **Cimic. 30** *C/ 10 m. (3)*
- Con latidos violentos del corazón; depresión y deseos de suicidio. **Aur. 200 o 1M.** *C/ 10 m. (3)*
- ☆ Sensación de que, si se mueve, el corazón va a dejar de trabajar; pulso lento; empeora con movimiento. **Dig. Ø o 30** *C/ 10 m. (3)*
- Angina con espasmos del corazón. **Vib. Ø,** *5-10 gt. C/ ½ h. (3)*
- Cuando el paciente no puede echarse del lado izquierdo por el dolor agudo. **Spig. 200** *C/ 10 m. (3)*
- Angina debida a debilidad del corazón. **Stroph. Ø, 8-10 gt.C/ 4 h. (SOS)**
- ☆ El paciente se queda inconsciente por el dolor intenso y el adormecimiento del brazo izquierdo. **Naja. 30 o 200** *C/ 15 m. (3)*
- Fallo cardiaco debido a enfermedad prolongada. **Am-c. 30** *C/ ½ h. (3)*
- ☆ Angina con agotamiento; inquietud y pulso débil. **Hydr-ac. 30** *C/ 10 m. (3)*
- Dolor repentino en el corazón y las arterias del lado izquierdo del pecho, que se extiende al brazo izquierdo. **Lach. 30** *C/ 10 m. (3)*
- Angina con inquietud; sensación de ardor; sed excesiva y miedo a morir. **Ars. 30 o 200** *C/ 10 m. (3)*

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
❑ Dolor en el corazón debido a la presión del viento. El paciente quiere ventilación; frío y cianosis del cuerpo.	Carbo-veg. 30 o 200	C/. 10 m. (3)
❑ Colapso con mucho frío, cianosis y debilidad del cuerpo. Corazón tabáquico; uno de los mejores estimulantes cardíacos.	Verat. 30 o 200.	C/. 10 m. (3)
❑ Palpitación con dolor del corazón; dolor con punzadas en el corazón, que se extiende al hombro izquierdo y la mano izquierda; empeora cuando se anda, después de comer; hipertensión; vértigo; oscuridad delante de los ojos.	Term-a. Ø o 6.	C/. ½ h. (SOS)
❑ Tónico cardíaco (para fortalecer el corazón).	Cat.. Ø y (Crataegus) Ø,	10-15 gt. C/. 4 h.
❑ Cuando el dolor se extiende desde la zona del corazón al hombro clavícula derechos o hacia la rodilla derecha.	Lac-c. 30 o 200	C/. 10 m. (3)
	Remedio bioquímico	Mg-p. 6X
		C/. ½ h.

ANOREXIA

Pérdida de apetito

★ Remedio capital; ganas de tomar vino y café.	Lec. 3X	C/. 4 h.
❑ Pérdida de apetito después de enfermedad grave.	Gent-l. Ø,	5-10 gt. C/. 4 h.
❑ Lengua con una capa espesa blanca; eructos; el viento pasa para abajo.	Ant-c. 30	C/. 4 h.
❑ Inapetencia, con ganas de comer.	Mez. 30	C/. 4 h.
❑ Pérdida completa de apetito por la mañana y fuerte necesidad de comer por la tarde y por la noche.	Abies-n. 30	C/. 4 h.
❑ Hambre sin apetencia; efectos nocivos del té; digestión lenta.	China off. 30	C/. 4 h.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
❑ Pérdida de apetito por agotamiento después de un trabajo prolongado; paciente obeso y friolero.	Cal-c. 30	C/. 4 h.
❑ Pérdida de apetito debido a indigestión; sabor amargo; lengua con densa capa en la parte posterior.	Nux-v. 30	C/. 4 h.
❑ Se satisface con facilidad; desaparece el apetito después de tomar unos bocados de alimento.	Lyc. 30	C/. 4 h.
❑ Pérdida total de apetito para los alimentos normales. Apenencia de alimentos de difícil digestión, ácidos y variados.	Ign. 30	C/. 4 h.
❑ Con pérdida de sed y ganas de estar al fresco al aire libre.	Puls. 30	C/. 4 h.
❑ Fluctúa mucho, con aversión a los alimentos; náuseas y vómitos con alimentos no digeridos.	Ferr-p. 6X o 6	C/. 4 h.
☆ Tónico general.	Alf. Ø,	5-10 gt. C/. 4 h.
● Remedio intercurrente.	Sulphur 30	C/. 3 h. (3)

ANSIEDAD

(Ver también *Miedo*)

☆ Repentina, con inquietud y miedo a morir.	Acon. 30 o 200	C/. ½ h. (3)
☆ Prolongada, con ataques periódicos y de pánico.	Ars. 200	C/. 4 h. (3)
● Con episodios de agotamiento; sudor abundante; empeora por la mañana.	Sulphur 30 o 200	C/. 3 h. (3)
☆ El paciente camina rápido; debida a preocupaciones.	Arg. Nit. 200	C/. 3 h. (3)
❑ Empeora si se está en cama con los ojos cerrados.	Carbo-veg. 30 o 200C.	4 h. (6)
❑ Agrava al hacer movimientos hacia arriba o hacia abajo, como en un ascensor; se siente peor hasta las 11 de la mañana.	Borx. 200 o 1M	C/. 3 h. (3)

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
<input type="checkbox"/> Ansiedad por los negocios, aunque esté gravemente enfermo.	Bry.. 200	C/. 3 h. (3)
<input type="checkbox"/> Completamente aprensivo por la tarde.	Caust. 200	C/. 3 h. (3)
<input type="checkbox"/> Ansiedad y miedo por la tarde, con inquietud y palpitación.	Cal-c. 200 o 1M.	C/. 3 h. (3)
<input type="checkbox"/> Ansiedad mayor cuando está echado. La música melancólica mejora las dolencias.	Mang. 200	C/. 3 h. (3)
<input type="checkbox"/> Ansiedad debida a violencia, miedo, noticias excitantes; empeora cuando comparece para un reconocimiento o entrevista, etc.	Gels. 30 o 200	C/. 3 h. (6)
<input type="checkbox"/> Ansiedad debida a un disgusto o impacto de la mente subconsciente.	Ign. 200 o 1M	C/. 3 h. (3)
<input type="checkbox"/> Ansiedad; mejora después de comer.	Anac. or. 30	C/. 4 h.
Remedio bioquímico		Kali-p. 6X
		C/. 4 h.

APENDICITIS

La inflamación del apéndice vermiciforme se llama apendicitis.

<input type="checkbox"/> Para empezar el tratamiento.	Bapt. CM	1 dosis
<input type="checkbox"/> Dolor fuerte en la región iliocecal; se agrava con el movimiento más ligero.	I-t. 1M	C/. 2 h. (3)
<input type="checkbox"/> Dolor fuerte repentino. El paciente no puede soportar la presión más ligera en la zona.	Bell. 30 o 200	C/. 15 m. (6)
<input type="checkbox"/> Dolor en punzadas; se agrava con el mínimo movimiento, incluso el de la respiración; mejora si se está echado quieto sobre el lado derecho dolorido.	Bry. Ø,	5-10 gt. C/. 2 h.
<input type="checkbox"/> Dolor aumenta en reposo y mejora en movimiento.	Rhus tox. 30 o 200	C/. 2 h. (6)

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
☐ Cuando empieza la putrefacción; frío, diarrea, ansiedad y pérdida repentina de fortaleza; punzadas con inflamación.	Ars. 200 o 1M	C/. 10 m. (3)
☐ Cuando se alivia el dolor echándose hacia atrás. Intestinos llenos de gas; dolor con retortijones.	Dios. 30 o 200	C/. ½ h. (3)
☐ Todo el abdomen está sensible; punzadas desde el punto inflamado hacia atrás y hacia abajo, en dirección al músculo; no se puede soportar ni el contacto de la ropa en las zonas afectadas.	Lach. 200	C/. 10 m. (3)
☐ Dolor agudo e insopportable; el mínimo contacto o exposición al frío lo agrava. El paciente siente frío.	Hep. 200 o 1M	C/. 15 m. (3)
☐ El dolor empeora cuando se está echado del lado derecho. Sudor abundante, que no alivia.	Merc. 200	C/. 15 m. (3)
Remedios bioquímicos		
		Ferr-p. 6X, Kali-m. 6X y Mg-p. 6X , en agua caliente.
		C/. ½ h.

APOPLEJÍA

Abolición del funcionamiento cerebral, producido por varias causas.

☐ Ataque repentino debido a corrientes de aire frío.	Acon. 200	C/. 3 h. (3)
☐ Inconsciencia completa; suspiros involuntarios, el paciente adopta un aspecto de idiota.	Hell. o 1M	C/. 3 h. (3)
☐ Inconsciencia; afluencia de sangre a la cabeza.	Bell. 200 o 1M	C/. 3 h. (3)
☐ Inconsciencia completa; apoplejía cerebral, mandíbulas caídas.	Op. 1M o 10M	C/. 3 h. (3)
☐ Estupor con gritos y estremecimientos repentinos y agudos; inconsciencia.	Apis. 200 o 1M	C/. 3 h. (3)

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
<input type="checkbox"/> Boca semiabierta con caída de la baba.	Bar-c. 200 o 1M	C/. 3 h. (3)
<input type="checkbox"/> Apoplejía debida a una herida mecánica.	Arn. 200 o 1M	C/. 3 h. (3)
<input type="checkbox"/> Apoplejía debida a ira contenida.	Coloc. 200 o 1M	C/. 3 h. (3)
<input type="checkbox"/> Apoplejía debida a trastornos emocionales; disgustos, emociones, etc.	Ign. 1M o 10M	C/. 3 h. (3)
<input type="checkbox"/> Con palpitación; piel fría y húmeda; convulsiones de los músculos de la cara.	Laur. 30	C/. 3 h.
● Remedio intercurrente.	Sulphur 200	C/. 3 h. (3)
Remedio bioquímico		
	Kali-p. 6X y Mag-p. 6X	C/. 4 h. (4)

Para tratar con eficacia el caso, procure encontrar la causa exacta y el tratamiento oportuno.

APOSTEMAS Y DIVIESOS (incluidos *carbunclos, etc.*)

(Ver también *Abscesos*)

Una inflamación normal puede convertirse en un divieso e incluso en un apostema. Las tres etapas están consideradas aquí.

Primera etapa

De la inflamación a la supuración

- ❖ En apostemas agudos; diviesos sanguinolentos, cuando se produce pus con rapidez (apostemas de mamas, hepáticos o glandulares). **Bell. 30** C/. 2 h.
- ❖ Favorece la formación rápida de pus, es útil para apostemas glandulares con dolor pulsante; empeora con el calor de la cama. **Merc. 30** C/. 3 h.
(Se puede dar alternando **Merc. 30 y Bell. 30**)

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
❖ Al principio de la supuración; formación de pus sanguinolento, corrosivo y pútrido, con dolor punzante, frío y agudo; el pus huele como el queso viejo. Aunque el paciente tenga frío, se siente mejor en clima húmedo.	Hep. 30	C/. 4 h.
❑ Al principio, cuando la zona tiene un color rojo vivo. Dolor punzante; empeora al mínimo movimiento.	Bry. 30	C/. 4 h.
❑ Hinchazón muy roja, con brillo y ardor; fiebre con piel seca y caliente; empeora en una habitación caliente y por la tarde y la noche.	Acon. 6 o 30	C/. 2 h.
❑ Cuando falla el Hep. y el dolor es insopportable.	Cham. 30 o 200	C/. 3 h.
❑ Para cortar la duración de la supuración. A veces actúa como un cuchillo. Apostemas de las puntas de los dedos y las falanges.	Myris. 1X o 3X	C/. 2 h.
❑ Diviesos pequeños y dolorosos (diviesos de verano).	Arn. 30 o 200	C/. 4 h.
◊ Para acelerar la supuración.	Hep. 2X o 3X	C/. 2 h.
◊ Para controlar la supuración.	Hep. 1M o 10M	C/. 10 m. (3)

Hep., en bajas potencias no debe darse en la etapa supurativa de la amigdalitis.

Segunda etapa

Cuando se ha producido la supuración

❖ Cuando se ha producido la supuración y no se cura el divieso. Para hacer que llegue la supuración a su proceso de madurez; pacientes frioleros; mejor en tiempo seco y cálido.	Sil. 6X o 6	C/. 3 h.
❑ Para formar una granulación sana, después de Sil.	Fl-ac. 30	C/. 4 h.
❖ Cuando falla Sil. y continúa la supuración; mejora al aire libre y empeora con los cambios de clima.	Calc-sulph. 6X o 30	C/. 3 h.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
❖ Pus abundante, sanguinolento, amarillento, o verdoso; empeora después de tomar un alimento fuerte y con el calor; mejora al aire libre y con el frío.	Puls. 30	C/. 4 h.
❑ Apostemas en pacientes de diatesis tuberculosa.	Cal-c. 200	C/. 4 h.
❑ Cuando el pus es denso y amarillo, sin inflamación.	Calen. 30	C/. 3 h.
❑ Apostemas debajo de la piel. Empeora con aplicaciones calientes y con el calor.	Lyc. 30 o 200	C/. 4 h. (6)
❑ Útil para glándulas que supuran. El pus puede ser abundante, corrosivo y muy líquido.	Rhus tox. 6 o 30	C/. 4 h.
❑ Pus líquido y viscoso. Erupciones en las articulaciones de las extremidades, ingle, cuello y detrás de las orejas.	Graph. 30 o 200	Sem. (3)
❑ Para casos de apostemas recurrentes, fiebre, etc. Para limpiar el sistema y evitar la repetición.	Pyr. 200 o 1M	Sem. (3)
❑ Para cuando hay pus insano con una baja condición de fiebre hepática. Gran sensación de ardor e inquietud.	Ars. 30 o 200	C/. 4 h.
❑ Carbunclos/diviesos con intenso ardor y fiebre alta.	Anthraci. 200 o 1M	C/. 10 m. (3)
❑ En condiciones bajas de apostemas; carbunclos azulados cuando el pus es líquido, oscuro y mal oliente. Se siente sensación de ardor; sensibilidad al tacto.	Lach. 30 o 200	C/. 10 m. (3)
❑ Apostemas dolorosos e inflamados, con tendencia a la gangrena; las glándulas próximas se hinchan, se endurecen y se hacen dolorosas. Se recomienda para apostemas de debajo de las axilas.	Tarent-c. 200 o 1M	Sem. (3)
❑ Pus sanguinolento o amarillo verdoso; dolor fuerte.	Nit-ac. 200 o 1M	C/. 10 m. (3)
❑ Diviesos o panadizos producidos por pinchazos de aguja.	Led. 200 o 1M	C/. 10 m. (3)
❑ Para purificar la sangre; cuando persiste la fiebre baja debida a infección.	Echi. 1X o 30	C/. 4 h.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
❑ Malos efectos del ardor. El pus puede ser sanguinolento, verdoso, grisáceo o amarillento; corrosivo y muy líquido.	Caust. 30 o 200	C/. 4 h.
❑ Úlceras que van madurando lentamente. Dolor y ardor; pus líquido y mal oliente que puede ser sanguinolento, marrón o amarillento. Tendencia a la gangrena. Mejora con la ventilación.	Carbo-veg. 30 o 200	C/. 3 h.
❑ Apostemas y dolores agudos; inflamación, carbunclos crónicos, diviesos; apostemas en articulaciones, sobre todo en cadera izquierda. Pus séptico.	Stram. 200 o 1M	C/. 10 m. (3)
❑ Carbunclos de la región lumbar, con diabetes. Descarga completa de pus por diversas aperturas. Náuseas y vómitos.	Carb-ac. 200	C/. 10 m. (3)
❑ Para diviesos, herpes zóster, ascariasis e intoxicación de la sangre; estreñimiento.	Gnup. 3X o	C/. 4 h.
❑ Cuando el pus es negruzco, líquido, pútrido y mal oliente.	Kali-p. 6X o 30	C/. 3 h.
● Para pacientes sifilíticos y tuberculosos.	Kali-i. 200 1M	C/. 3 h.
❑ Diviesos en las axilas; glándulas hinchadas.	Carbo-an. 30 o 200	Sem. (3)
❑ Para apostemas cerca de los huesos.	Phos. 200 o 1M	C/. 4 h. (6)
❑ Diviesos recurrentes en la parte externa de la oreja, con antiguo historial de sarampión.	Morb. 200	C/. 3 h. (6)
❑ Diviesos en la parte exterior de la oreja; empeora en verano.	Picric acid. 30	C/. 10 m. (3)
❑ Diviesos pequeños y dolorosos; pus verdoso que madura lentamente.	Sec-cor. 30 o 200	C/. 10 m. (3)
● En casos crónicos en los que la descarga de pus es abundante, con adelgazamiento y fiebre hepática (remedio intercurrente).	Sulphur 200	1 dosis
Remedio bioquímico	Calc-sulph. 12X	C/. 4 h.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
----------	----------	--------------------------

Para uso externo:

Para curación, son muy útiles Calen. ext. Ø y Echi. ext. Ø (loción o ungüento).

Para aliviar un dolor insoportable, son muy útiles Arn. Ø y Cassia-s. Ø, como tintura.

Para diviesos reventados, Puls. Ø, Dios. Ø o Bry. Ø (aplicar el remedio como tintura en la herida afectada).

Para reprimir diviesos, es muy útil Calc-caust. 1X.

ARTRITIS

Incluida la gota, la artritis deformans y el reumatismo.

- | | | |
|--|--------------------|------------|
| □ Dolor de las articulaciones de la rodilla; empeora con el movimiento; mejora con el movimiento inicial, pero el dolor continuo de las articulaciones empeora al levantarse de la silla; dolor en los talones; empeora con el movimiento. | Cassia-s. 30 | C/. 4 h. |
| ☆ Ataque agudo de gota en las articulaciones de los pies. Dolor con inflamación rojiza. | Acon. 200 | C/. 2 h. |
| □ Dolor con inflamación; empeora con el movimiento. | Bry.. 200 o 1M | C/. 6 h. |
| ☆ Las dolencias empeoran después de descansar y estar expuesto al frío; mejora con el movimiento. | Rhus tox. 200 o 1M | C/. 4 h. |
| □ Las dolencias empeoran durante la menstruación; empiezan en la época de la menopausia; se nota más en las manos y los pies. | Caul. 30 | C/. 4 h. |
| ● Cuando el origen de las dolencias está en una gonorrea; empeora durante las horas del día. | Med. 1M | Quinc. (3) |
| ● Cuando el origen de las dolencias está en la tuberculosis. | Tub-k. 1M | Quinc. (3) |
| ☆ Dolor de las articulaciones menores, con hinchazón rojiza o pálida; sensibilidad y dolores que cambian; empeora con el movimiento. Es el mejor remedio para la gota en tiempo frío. | Colch. 30 | C/. 4 h. |

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
☒ Cuando deja de actuar Rhus tox.; el dolor es peor en tiempo frío y húmedo y mejora con el movimiento.	Cal-c. 200 o 1M	C/. 6 h. (6)
☒ Nudosidades en articulaciones, dolencias gástricas. En los últimos nódulos se hace indoloro (artritis reumatoide). Lengua con densa capa blanca.	Ant-c. 30 o 200	C/. 6 h.
☐ Dolencias en los tobillos y los pies; rigidez.	Dros. 200	Quinc. (3)
☐ Dolor en los huesos largos; contracción de los ligamentos.	Caust. 30 o 200	C/. 4 h.
☐ El dolor empeora por la noche; en tiempo húmedo; reumatismo de los músculos largos.	Cimic. 30	C/. 4 h.
☐ Reumatismo; empeora en tiempo húmedo y frío. Gota. Dolor en las extremidades y en las articulaciones de la cadera.	Nat-s. 30 o 200	C/. 4 h.
☐ El dolor se desplaza hacia abajo, afectando a la mayor parte de una extremidad, y pasa rápidamente a lo largo del recorrido de los nervios.	Kalm. 30 o 200	C/. 6 h.
☐ El dolor empeora durante el descanso, por la noche y con calor; mejora con el frío, el aire libre y el movimiento.	Puls. 30 o 200	C/. 4 h.
☐ Dolor violento; magulladuras; no se soporta el contacto; da la sensación de que quien se acerca va a golpear la parte afectada.	Arn. 200	C/. 4 h.
☐ Gota del dedo gordo del pie y articulaciones, con hinchazón; dolor al andar; empeora con el calor, la presión y el movimiento. El dolor va subiendo; mejora con compresas frías.	Led. 200	C/. 4 h.
☐ Nudos de gota en articulaciones; dolor frenético en extremidades y contracción de los músculos.	Guaj. 30	C/. 4 h.
☐ Nudosidades crónicas en las articulaciones; las manos se tuercen y deforman, debido a depósitos de agua de soda.	Am-p. 6 o 30	C/. 4 h.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
❑ Dolores de gota, con orina maloliente.	Benz-ac. 6 o 30	C/. 4 h.
❑ Cuando hay sedimentos rojizos en la orina, en pacientes de gota.	Lyc. 30	C/. 4 h.
❑ Dolor fuerte con abultamiento de las articulaciones; empeora con el descanso y cuando se acerca una tormenta.	Rhod. 200 o 1M	C/. 10 min (3)
☆ Casi específico para la gota (para eliminar el ácido úrico y los uratos).	Urt-u. Ø.	8-10 gt. C/. 4 h. en agua caliente.
❑ Deformación artrítica (crónica reumatoide, en especial de los dedos).	Picric acid. 30	C/. 4 h.
☆ Dolores reumáticos o artritis después de una diarrea.	Abrot. 30 o 200	C/. 4 h. (6)
☆ Específico para dolor con entumecimiento. El dolor es tan fuerte que el paciente dice que prefiere morir a soportarlo.	Cham. 200 o 1M	C/. ½ h. (3)
❑ Dolor en diagonal, en el brazo derecho y la pierna izquierda, con sensación de frío, entumecimiento y hormigueo.	Agar. 30 o 200	C/. 4 h.
❑ En personas débiles; dolor ardiente con frío; se siente mejor con calor y al comer, y empeora al aire libre frío.	Caps. 30 o 200	C/. 4 h.
● Dolor insoportable; rigidez. Complejo de superioridad/inferioridad.	Plat. 1M	Sem. (3)
❑ El dolor vuela como una descarga eléctrica; debido a la exposición al tiempo frío y húmedo. Mejora con el calor y el descanso.	Phyt. 30 o 200	C/. 4 h.
❑ Dolor reumático. Empeora después de lavar ropa, en el trabajo de lavandería.	Sep. 30 o 200	C/. 4 h.
❑ Dolor de los huesos largos; puede deberse a lesiones o reumatismo.	Ruta-gt. 200	C/. 6 h.
❑ El dolor empeora al mínimo contacto, concretamente después de pérdida de fluidos vitales como hemorragia, diarrea, vómitos, etc.	China off. 6 o 30	C/. 3 h.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
□ Dolor en las articulaciones pequeñas de las extremidades, con hinchazón. Dolor de espalda; empeora por la mañana, antes de levantarse.	Staph. 30 o 200	C/. 4 h.
□ Dolor en los talones; mejora apoyando en ellos el peso.	Berb-vul. Ø,	8-10 gt. C/. 4 h.
□ Dolor que cambia por todas las partes del cuerpo; empeora con el movimiento.	Stel. Ø,	8-10 gt. C/. 4 h. en agua caliente.
□ Dolor reumático sin hinchazón; dolor en las articulaciones; empeora por la noche.	Iod. 30	C/. 4 h.
● Osteoartritis de las articulaciones grandes con degeneración. Dolor, hinchazón, rigidez e hipersensibilidad de las articulaciones; empeora con el movimiento (suelan las articulaciones) y el frío; mejora con el calor.	Nosode de osteoartritis, 1M o 1002	Sem. (6)
□ Reumatismo muscular crónico de la espalda y el cuello. Dolor fuerte a lo largo del nervio ciático. Alternancia de entumecimiento y dolor.	Gnaph. 30 o 200	C/. 4 h.
□ Atrofia muscular; rigidez.	Stry. 3X o 6X	C/. 4 h.
● Reumatismo acompañado de enfermedades de la piel y picor; no se puede caminar erguido.	Sulphur 200	C/. 10 m. (3)
□ Reumatismo de la articulación de la rodilla; con hormigueo.	Nat-p. 6X o 30	C/. 4 h.
□ Para desarrollo defectuoso de los huesos; mejora con el calor y empeora con el frío.	Cal-f. 12X o 30	C/. 4 h.
Remedios bioquímicos		
	Mg-p. 6X	C/. 4 h.
	Biocom. No. 19	C/. 4 h.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
<h2><u>ASCITIS</u></h2>		
<i>Hidropesía del abdomen</i>		
<p>La ascites es una efusión acuosa en la cavidad del peritoneo, que produce una fuerte hinchazón del abdomen. Los síntomas suelen ser fiebre, inquietud durante la noche, mala digestión, mal olor de boca, náuseas o vómitos, estreñimiento, orina escasa y de color fuerte y dolor en la parte baja de la espalda y zona del hígado.</p> <p>Esta enfermedad se debe normalmente a alguna complicación de otras, como el reumatismo, la anasarca, trastornos cardíacos o hepáticos, albuminuria, trastornos menstruales, etc. Debe aplicarse un tratamiento que esté de acuerdo con los síntomas.</p>		
<input type="checkbox"/> Cuando la enfermedad es consecuencia de excitabilidad; orina oscura y escasa; heces sueltas, como gelatina.	Hell. 30 o 200	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Debilidad, postración e inquietud; sed insaciable, se bebe poca agua con frecuencia.	Ars. 30 o 200	C/. 4 h.
<input checked="" type="checkbox"/> Ascites debida a pérdida de fluidos vitales; tos breve y seca con o sin expectoración; palidez de la piel; frío; pulso flojo débil y lento.	China off. 6 o 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Se siente dolor y sensaciones desagradables en la zona de los riñones.	Zinc-met. 6 o 30	C/. 4 h.
<input checked="" type="checkbox"/> Ascites después de fiebre eruptiva con pérdida de sed y orina escasa. Piel pálida, transparente y entumecida. Empeora con el calor y mejora con el frío.	Apis. 30 o 200	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Hidropesía debida a albuminuria crónica o trastornos hepáticos, etc. o debida a mala nutrición.	Lac-d. 30 o 200	C/. 6 h.
<input type="checkbox"/> Debida a dolencias urinarias; sedimentos arenosos en la orina; retención de orina.	Thlas. bur-p Ø,5-10 gt. C/.	4 h.
<input type="checkbox"/> Con mucha sed y poca orina. Dolencias después de largos períodos de fiebre continua como las tifoideas, etc. se agrava con el frío y las bebidas frías.	Apoc. Ø,	5-10 gt. C/. 4 h.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
★ El paciente no puede tolerar ni siquiera el contacto de la ropa en el abdomen; se echa boca arriba, levantando la ropa del abdomen.	Lach. 30 o 200	C/. 3 h. (6)
	Remedio bioquímico Kali-p. 6X	C/. 3 h.

ASFIXIA

Muerte aparente

Sabemos que algunas veces parece que una persona muere repentinamente, cuando, en realidad, no se trata nada más que de una mera suspensión de la animación y se da el caso de que se produce la muerte verdadera cuando se confunde con una suspensión de esta índole. En todos estos casos, cuando hay la mínima inseguridad para actuar con el máximo cuidado, no debemos hacer absolutamente nada que pueda producir la muerte ni interferir hasta estar seguros de la putrefacción.

La muerte aparente puede ser consecuencia de:

- 1.- Hambre.
- 2.- Caída o lesión.
- 3.- Rayo.
- 4.- Ahogamiento.
- 5.- Sofocación por inhalación de vapores nocivos, químicos etc.
- 6.- Frío o congelación.
- 7.- Enfermedades prolongadas o repentina.
- 8.- Insolación.

1.- Por hambre: Cuando un individuo ha estado sin tomar alimento durante mucho tiempo y se ha suspendido la animación a consecuencia de ello, debe dársele repetidas veces leche caliente. Al principio, hay que dársela gota a gota y aumentar poco a poco hasta darle cucharaditas. Al cabo de poco tiempo se le da una pequeña cantidad de vino y caldo de carne o **Aven**. Ø, de 10 a 15 gotas, en agua caliente. Cuando se ha recuperado la animación y el paciente ha tenido un sueño profundo, debe dársele una pequeña

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
----------	----------	--------------------------

cantidad de alimento. El alimento debe tomarlo a pequeños intervalos y en pequeñas cantidades y recuperará lentamente su modo de vida normal.

- 2.– **Por caída o lesión:** Cuando es consecuencia de una caída o lesión, hay que colocar al paciente con cuidado en una cama, en lugar tranquilo, con la cabeza en alto, y se le debe dar **Arn.** 200 en pequeñas dosis, cada media hora aproximadamente. Se le puede dar **Arn.** por vía oral o frotando en la piel.
- 3.– **Por rayo:** Cuando es consecuencia de un rayo, hay que mantener al paciente al aire libre y echarle agua fría en la cara, el cuello y el pecho. Puede aplicársele una fricción caliente, si está el cuerpo frío. Se le debe hacer respiración artificial, en caso necesario.
- 4.– **Por ahogamiento:** En caso de ahogamiento, hay que desnudar al paciente y frotarlo y cubrir el cuerpo con ropa cálida y mantenerlo en lugar templado. Hay que limpiarle la garganta, la boca y las fosas nasales. Se le debe aplicar calor a la espina dorsal, con una botella de agua caliente o cualquier otra cosa. Hay que frotar constantemente las plantas de los pies del paciente. Se le debe hacer respiración artificial. Puede dársele frecuentemente **Lach.** 30 o 200.
- 5.– **Por sofocación debida a inhalación de vapores nocivos, productos químicos, etc.:** Cuando se trata de inhalación de gases venenosos, dióxido de carbono, etc., debe mantenerse al paciente al aire libre y hacerle inmediatamente respiración artificial. Se le debe dar **Carbo-veg.** 30 o 200. Algunas veces, cuando se trata de gas carbónico venenoso, la cara del paciente parece sonrosada, como si estuviese en perfecta salud, lo que puede inducir a error y es muy peligroso.
- En casos de inconsciencia total, se puede utilizar **Op.** 200 o 1M. Si el cuerpo del paciente está frío, se debe envolver en ropa cálida. Puede utilizarse agua caliente, etc.
- 6.– **Por frío o congelación:** Cuando se suspende la animación como consecuencia de una exposición al frío, hay que retirar al paciente suavemente a un lugar abrigado o habitación fría, ya que un grado moderado de temperatura podría ser un obstáculo para su recuperación. No debe exponerse a corrientes de aire.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
----------	----------	--------------------------

Se puede cubrir al paciente de nieve; pero hay que limpiarle la boca y las fosas nasales en esa posición, para que salga con facilidad la nieve derretida. Si no se dispone de nieve se puede sustituir por un baño de agua fría. El cuerpo puede sumergirse durante poco tiempo y cubrirlo después con ropas húmedas, cubiertas con mantas secas. Según se recupera la animación, se puede mover al paciente con cuidado.

Se le puede dar **Carbo-veg. 200, Ars. 200 o Verat. 200**.

7.- Por enfermedad continuada o repentina: Tratar según los síntomas (ver las diferentes enfermedades).

8.- Por insolación, etc.: Si se trata de la consecuencia de una insolación (exposición prolongada al sol), hay que mantener al paciente en la oscuridad, en un lugar tranquilo, y soltarle la ropa. Se debe cubrir la cabeza con ropa húmeda (mojada en agua caliente), cambiándola con frecuencia, y mojar todo el cuerpo con agua caliente al mismo tiempo. Se le puede administrar unas pocas dosis de **Glon. 6 o 30**, bien sea por vía oral o frotando la piel. Se le debe dar con frecuencia y en pequeñas cantidades agua salada, glucosa o suero con electrolitos.

ASMA

(Ver **Jadeo y Bronquitis**)

La inflamación del tracto bronquial, debida a congestión por tos o alergia, aumento del porcentaje de eosinófilos, etc., son las condiciones patológicas del asma y sus principales dolencias son problemas constantes para respirar, disnea y tos seca con respiración jadeante.

- | | | |
|---|--|----------|
| ★ La disnea se agrava durante el invierno; empeora con exposición al polvo y cambios del tiempo, con bebidas frías, esfuerzos, inhalación de humo y por la mañana. Ronquera. Tos con dolor en el pecho. | Cassia-s. Ø o 30 | C/. 4 h. |
| ◻ Tos seca; empeora con el descanso; disnea a las 4 de la madrugada. | Penic. 200 | C/. 4 h. |
| ★ Durante un ataque agudo, con ansiedad, miedo y disnea. | Acon. Ø e Ip. Ø,
5-10 gt. alternando | C/. ½ h. |

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
● En niños que tienen espasmo, secreción de mucosidad e infección (como remedio intercurrente).	Bac. 1M	Quinc.(6)
● En adultos con espasmo, secreción de mucosidad e infección (como remedio intercurrente).	Tub-k. 1M	Quinc.(6)
● En pacientes psicóticos; empeora en las horas diurnas; mejora poniendo las rodillas en el pecho y al lado del mar.	Med. 200 o 1M	Quinc. (3)
● Para pacientes que han seguido un tratamiento homeopático después de tomar esteroides, etc., efectos negativos de la vacuna; paciente friolero.	Thuy. 200 o 1M	Sem. (3)
✗ Pacientes frioleros; empeora después de tomar bebidas frías o sentirse con ira; ansiedad, inquietud y sed insaciable.	Ars. 30.	C/. 2 h.
◻ En niños que han tenido lombrices.	Cina. 10M o 50M.	Sem. (3)
● Asma bronquial con elevado nivel de eosinófilos; trastornos de tiroides.	Thyr. 1M	Sem. (3)
✗ Mejora estando echado boca arriba con los brazos y las piernas separados.	Psor. 200 o 1M.	Sem. (3)
✗ Empeora al quedarse dormido o después de dormir y al tomar alimentos agrios o vinagre.	Lach. 30 o 200	C/. 3 h. (3)
◻ Disnea excesiva, tos y abundante secreción mucosa; enfisema.	Ant-ar. 6 o 30	C/. 3 h. (6)
● Disnea a media noche y a primeras horas de la mañana; necesidad de abrir las ventanas.	Sulphur 200 o 1M.	Sem. (3)
◻ Problemas respiratorios debidos a fundiciones o polución de tráfico.	Sulo-ac. 30 o 200.	C/. 4 h.
◻ El paciente puede respirar bien sólo cuando está de pie.	Cann-s. 200 o 1M	C/. 4 h. (6)
◻ Asma de picapedreros o trabajadores de seda o algodón (debe usarse con mucho cuidado).	Sil. 30 o 200	C/. 4 h. (SOS)

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
□ Asma producida por el aroma de las flores.	Ail-gt. 30	C/. 4 h.
☆ Deseo de ventilación durante un ataque agudo, aunque el cuerpo esté frío.	Carbo-veg. 30	C/. ½ h.
□ Respiración difícil y agitada; se siente como si cada respiración fuese la última; pérdida de sed.	Apis. 30	C/. 4 h.
□ Ataques durante la estación lluviosa y húmeda, con relajación del intestino en cada ataque.	Nat-s. 6 o 30	C/. 4 h.
□ Debido a nerviosismo, espasmos y constricción del pecho; mejora bebiendo agua.	Cupr-met. 30 o 200	C/. 4 h.
□ Debido a ira; presión sofocante en el pecho.	Cham. 200 o 1M	C/. 4 h.
□ Empeora en tiempo seco y frío; mejora en húmedo.	Hep. 30 o 200	C/. 4 h.
☆ El paciente no puede respirar bien cuando está en la cama.	Grin. Ø, y 5-10 gt., C/. 2 h. Blatta-o. Ø, alternando	
● El asma empeora por la noche; cuando fallan los remedios bien seleccionados.	Syph. 1M	Sem. (3)
□ Debido a la contención de emociones; disgusto (psicosomático); poca expectoración; empeora inhalando humo.	Ign. 1M o 10M	C/. 4 h. (3)
□ Mejora al defecar; empeora al inhalar polvo.	Pothos-foe. . 6 o 30	C/. 4 h.
□ Dificultad para introducir aire en los pulmones. Mejora en el mar; empeora al llegar a tierra; asma de marinero.	Brom. 30 o 200	C/. 4 h.
☆ Necesidad de respirar al mínimo movimiento; para estimular los centros respiratorios y aumentar el oxígeno de la sangre.	Aspid. Ø, 5-10 gt. C/. 2 h.	
□ Debido a dolores fuertes; de origen gástrico; disnea y constricción de pecho.	Sanguinaria 30 o 200	C/. 4 h.
☆ Colapso debido a un ataque agudo; parálisis de los pulmones; cianosis.	Hydr-ac. 30 o 200	C/. ½ h. (3)

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
<input type="checkbox"/> Asma catarral; deseo de estar al aire libre; trastornos uterinos.	Sabin. 30 o 200	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Asma seca, esplénica; disnea y punzadas en el pecho.	Squill. 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Asma histérica; tos; empeora con el calor de la cama.	Nux-m. 30 o 200	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Asma nerviosa, espasmódica. Aumenta al quedarse dormido.	Valer. Ø o 30	C/. 4 h.

Hist. y **Eosinophilinum**, en potencias de **200** o **1M**, son también muy útiles cuando los eosinófilos son elevados.

AVERSIONES

<input type="checkbox"/> A los rostros sonrientes.	Ambra-gr. 200 o 1M	C/. 4 h. (6)
<input type="checkbox"/> A algunas personas.	Am-m. 200	C/. 4 h. (6)
<input type="checkbox"/> A los hijos propios. En los homosexuales, a las mujeres.	Plat. 1M	Sem. (3)
<input type="checkbox"/> A los amigos, durante el embarazo.	Con. 200	Sem. (3)
<input type="checkbox"/> A los padres y la esposa.	Fl-ac. 1M	Sem. (3)
<input type="checkbox"/> A las manzanas.	Ant-t. 200 o 1M	Sem. (3)
<input type="checkbox"/> A los plátanos y las ciruelas.	Bar-c. 200 o 1M	Sem. (3)
<input type="checkbox"/> A la carne, el brandy y los alimentos secos.	Merc. 200 o 1M	Sem. (3)
<input type="checkbox"/> A la cerveza.	Nux-v. 200	Sem. (3)
<input type="checkbox"/> Al brandy; a la col.	Carbo-veg. 200	Sem. (3)
<input type="checkbox"/> Al pan, la mantequilla, los alimentos calientes, el melón.	Nat-m. 200 o 1M	Sem. (3)
<input type="checkbox"/> Aversión al suero y afición a los dulces.	Cina. 200 o 1M	Sem. (3)
<input type="checkbox"/> Aversión a los cereales, leche hervida, cebollas, naranjas, pasteles, especias, pudings y bebidas calientes.	Phos. 200 o 1M	Sem. (3)
<input type="checkbox"/> Aversión al queso y afición a los dulces.	Arg. Nit. 200 o 1M	Sem. (3)

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
❑ Al pollo.	Bac. 200 o 1M	Sem. (3)
❑ Al chocolate; al cacao, a las especias.	Tarent. 200 o 1M	Sem. (3)
❑ Al café; al gruel, a la leche.	Cal-c. 200 o 1M	Sem. (3)
❑ A las bebidas frías.	Ars. 200 o 1M	Sem. (3)
❑ Al agua fría; al ajo, a la cebolla, al vino.	Sabad. 200 o 1M	Sem. (3)
❑ A los alimentos cocinados.	Lyc. 200 o 1M	Sem. (3)
❑ A los huevos.	Ferr-met. 200 o 1M	Sem. (3)
❑ A las grasas; frutas, mermeladas, bebidas calientes, pasteles, especias.	Puls. 200 o 1M	Sem. (3)
❑ Al pescado; bebidas calientes, sal, sopa, dulces.	Graph. 200 o 1M	Sem. (3)
❑ A la miel; a la leche.	Nat-c. 200 o 1M	Sem. (3)
❑ A los helados.	Rad-br. 200 o 1M	Sem. (3)
❑ A los melones; a los pasteles.	Sil. 200 o 1M	Sem. (3)
❑ A los escabeches.	Abies-e. 200 o 1M	Sem. (3)
❑ A la sopa.	Rhus tox. 200 o 1M	Sem. (3)
❑ A los dulces, alimentos que contengan almidón, fresas.	Sulphur 200 o 1M	Sem. (3)
❑ A las verduras.	Mg-c. 200 o 1M	Sem. (3)

AZÚCAR EN LA ORINA

(Ver también *Diabetes melitus*)

- ★ Droga india bien comprobada. Cephid-i. Ø, 5-10 gt. C/. 4 h.
- ★ Remedio capital Syzyg. Ø, 5-10 gt. C/. 4 h.
- ❑ Azúcar en la orina; pies nerviosos. Zinc-p. 30 C/. 4 h.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
❑ Azúcar en la orina; orina abundante; enflaquecimiento, paciente destemplado.	Tarent. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
❑ Con enflaquecimiento exagerado; ganas de tomar agua fría o helada.	Phos. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
★ La droga india probada, llamada “Gur Mar”.	Gymne-syl. Ø,	5-10 gt. C/. 4 h.
Remedios bioquímicos		
	Cal-p. 6X,	C/. 4 h.
	Kali-m. 6X y Nat-m. 6X	

El tratamiento constitucional da buenos resultados en Homeopatía.

BAZO

❑ Hidropesía por abultamiento del bazo; inquietud y sed insaciable.	Ars. 30	C/. 4 h.
❑ Bazo duro y abultado; enflaquecimiento del cuerpo, aunque se coma bien.	Iod. 30	C/. 4 h.
❑ Bazo abultado y dolorido al tacto; ganas de tomar bebidas frías.	Phos. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
❑ Bazo dolorido y abultado; dolor en todo el lado izquierdo; disnea.	Cean. Ø,	5-10 gt. C/. 4 h.
❑ Dolor agudo en la zona del bazo; estreñimiento.	Hydr. Ø o 30	C/. 4 h.
❑ Hinchazón del bazo; empeora en lugares o climas húmedos, sensación de frío; digestión lenta.	China off. 6 o 30	C/. 4 h.
❑ Abultamiento del hígado y el bazo de los niños.	Cal-ar. 6	C/. 4 h.

Remedios bioquímicos

Dolor cortante en la zona del bazo

Dolor punzante en la zona del bazo;
empeora con el movimiento.

Cal-p. 6X

C/. 4 h.

Kali-p. 6X

C/. 4 h.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
<u>BELLEZA, Consejos de</u>		
<i>Medicinas plásticas para mejorar el aspecto físico.</i>		
● Para una piel seca y áspera. Aversión al baño; rascado de las lesiones producidas.	Sulphur 30 o 200	Sem. (3)
● Dolor después de rascarse con piel áspera y seca. El paciente prefiere clima frío.	Psor. 200 o 1M	Sem. (3)
● Ojeras, producidas por un trauma o disgusto.	Nat-m. 200 o 1M	Sem. (3)
☆ Ojos hundidos y cara pálida, debido a pérdida de fluidos vitales.	China 6 o 30	C/. 4 h.
□ Carácter triste y coloración marrón en nariz y barbilla. Puntos amarillos en el pecho. Aspecto cetrino.	Sep. 200	Sem. (3)
☆ Círculos oscuros alrededor de los ojos, debido a debilidad nerviosa o tensión nerviosa prolongada.	Phos. 200	Sem. (3)
□ Puntos negruzcos; piel seca, áspera y escamosa; sensación de ardor. Inquietud.	Ars. 30	C/. 4 h.
□ Puntos azulados o morados; cara pálida, amarillenta. El paciente no puede tolerar ni siquiera la presión de la ropa en la garganta, el abdomen y la cintura.	Lach. 30 o 200	C/. 6 h. (3)
□ Compleción amarilla debida a anemia.	Ferr-met. 3X	C/. 4 h.
□ Cara con palidez mortal, con círculos azules alrededor de los ojos.	Bism. 200	Sem. (3)
□ Verrugas, epiteloma; pecas y manchas; puntos marrones.	Thuy. 200	Sem. (6)
☆ Granos en la cara, con piel seca áspera y escamosa; para limpiar la compleción.	Berb-a. Ø,	4-5 gt. C/. 4 h.
□ Para disolver el tejido de cicatrices.	Thiosin. 3X	C/. 4 h.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
❖ Viejas señales de quemaduras o lesiones; sangra con facilidad; verrugas.	Caust. 30 o 200	C/. 6 h.
Remedio bioquímico Para marcas de nacimiento, cicatrices y piel áspera.	Cal-f. 12X	C/. 4 h.

BLEFARITIS

Inflamación de los párpados

❑ En casos de sífilis; sensibilidad al tacto, al calor y al frío.	Merc-c. 200	C/. 10 m. (3)
❖ Inflamación entre los párpados y las cejas, especialmente en los párpados superiores.	Kali-c. 200	C/. 10 m. (3)
● Inflamación con dolor pulsante; fase de supuración; sensibilidad al tacto y al frío; mejora con el calor.	Hep. 3X , para empezar a echar pus, o 1M , par suprimirlo (debe usarse con mucho cuidado).	
❖ Hinchazón edematoso; párpado inferior; empeora con el calor; pérdida de la sed.	Apis. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
❑ Inflamación en los extremos de los párpados, con pérdida de pestañas.	Petr. 30	C/. 4 h.
❑ Inflamación edematoso; debajo de los párpados; ganas de tomar bebidas frías o heladas.	Phos. 30 o 200	C/. 10 m. (3)
❑ Inflamación de los párpados con profusa lacrimación; empeora con el frío y mejora con el calor; inquietud.	Rhus tox. 30	C/. 4 h.
❑ Con durezas debidas a orzuelos o quistes en los párpados.	Staph. 30 o 200	C/. 6 h. (3)
❑ Hinchazón de párpados debida a tumores; malignidad, etc.	Con. 200 o 1M	C/. 10 m. (3)
❑ Hinchazón, ardor y enrojecimiento de los párpados, por lacrimación fistulosa; paciente friolero.	Sil. 12X o 30	C/. 4 h.
	Remedio bioquímico	
	Ferr-p. 6X y Kali-m. 6X.	C/. 4 h.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
<u>BOCIO</u>		
<input type="checkbox"/> A la edad de la pubertad; especialmente, cuando el paciente es susceptible al frío.	Cal-i. 3X	C/. 4 h.
★ Para pacientes obesos y estreñidos; bocio exoftálmico, no tóxico.	Fuc. Ø,	10-30 gt. C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Bocio exoftálmico; por retención de menstruaciones.	Ferr-i. 3X	C/. 4 h.
★ Duro; con la sensación de que el aire que se inhala pasa por el bocio; dolor en la zona del corazón, sensación de bloqueo en la garganta.	Spong. 30 o 200	C/. 6 h.
● Remedio intercurrente, especialmente en pacientes obesos.	Thyr. 200 o 1M	Quinc. (6)
<input type="checkbox"/> Hinchazón; dolor, con adelgazamiento, aunque se coma bien; empeora durante el periodo menstrual y aumenta gradualmente de tamaño.	Iod. 30 o 200	C/. 4 h.
★ Con síntomas cardiacos, constricción de bocio.	Cat. Ø o 6	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Del lado izquierdo; con problemas de hígado, ictericia.	Chel. Ø o 6	C/. 6 h.
<input type="checkbox"/> Del lado derecho, paciente muy sensible a todas las impresiones; mucho frío.	Hep. 30 o 200	C/. 4 h.
★ Bocio muy grande; del tamaño de un huevo de gallina.	Brom. 6 o 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Duro, hinchado; empeora en luna nueva, paciente muy friolero.	Cal-c. 200 o 1M	Sem. (6)
<input type="checkbox"/> Nodular; bocio hinchado con calor e inflamación.	Phyt. 30 o 200	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Dolor como una opresión; hinchazón redondeada y dura en la parte superior derecha del lóbulo del bocio.	Nat-c. 30	C/. 4 h.

Remedios bioquímicos

Para el bocio duro e hinchado

Cal-f. 12X y Cal-p. 6X C/. 4 h.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
<u>BOSTEZOS</u>		
<input type="checkbox"/> Aunque esté físicamente ocupado; con marcada ansiedad.	Acon. 30 o 200	C/. 2 h.
<input type="checkbox"/> Después de comer; estirando las extremidades.	Nux-v. 30 o 200	C/. 3 h.
<input type="checkbox"/> Aunque duerme bien por la noche; bosteza durante el día, con ganas de dormir.	Lyc. 30 o 200	C/. 3 h.
<input type="checkbox"/> Persona que está siempre pensando en algo; tiene siempre la mente ocupada; debido al flujo constante de ideas, no consigue un sueño profundo, quiere dormir durante el día y bosteza.	Sulphur 200 o 1M	C/. 10 m. (3)
<input type="checkbox"/> Bostezos espasmódicos.	Plat. 200 o 1M	C/. 10 m. (3)
<input type="checkbox"/> Bostezos con disnea.	Brom. 30 o 200	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Adormecimiento sin bostezos.	Chel. 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> El paciente bosteza por cualquier cosa; temblores y escalofríos.	Cina. 30 o 200	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Bosteza y, al mismo tiempo, estira y extiende las manos.	Ruta-gt. 30 o 200	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Bostezos violentos y espasmódicos.	Rhus tox. 200 o 1M	C/. 4 h.

Otros remedios importantes: *Arn.*, *Ign.*, *Nat-m.*, etc.

BRONQUIECTASIA

(Ver también *Bronquitis* y *Asma*)

La dilatación de un bronquio o de los tubos bronquiales se llama bronquiectasia.

<input type="checkbox"/> Tos; empeora con el cambio de posición. Caries dental.	Kreos. 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Se siente mejor con las rodillas en el pecho; empeora durante el día; mejora junto al mar.	Med. 200 o 1M	Quinc. (3)

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
☐ Tos que termina en estornudo; expectoración difícil; mucosidad abundante y densa.	Seneg. Ø,	5-7 gt. C/. 4 h.
☐ Enfisema, con excesiva disnea y tos; dificultad para la expectoración y exceso de secreciones mucosas.	Ant-ar. 6 o 30	C/. 4 h.
☐ Cianosis; congestión de las venas de los pulmones; tos seca, espasmódica, sofocante.	Hydr-ac. 30	C/. 4 h.
	Remedio bioquímico	Sil. 6X o 12X
		C/. 4 h.

BRONQUITIS AGUDA

(Ver también *Tos*)

La inflamación de la membrana mucosa de los tubos bronquiales se llama bronquitis.

Primera etapa

- ★ En personas sanas; por exposición repentina al aire seco y frío; inquietud y sensación de frío, fiebre alta, pulso rápido, miedo e intranquilidad.
 - ☐ Ojos rojos, rostro brillante y rojizo, fiebre alta; respiración entrecortada, rápida y difícil; tos seca y ronquera; piel caliente y seca, pero húmeda en las partes cubiertas.
 - ☐ Fiebre; catarro bronquial inflamatorio, dolor en el pecho y tos seca; el sudor no da alivio; boca llena de saliva.
 - ★ Tos seca que produce dolor de cabeza y fiebre. Sed fuerte con deseo de tomar mucha agua fría en tragos largos. Empeora con el movimiento.
 - En pacientes débiles con fiebre alta.
 - ★ Si no hay mejoría con los remedios mencionados, dar una dosis de **Sulphur 30 o 200** y esperar un día o dos para dar de nuevo los remedios correspondientes a los síntomas.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
----------	----------	--------------------------

Debe darse **Tub. 1M** una vez al mes, durante seis meses, a los pacientes propensos a la bronquitis.

Remedio bioquímico **Ferr-p. 6X y
Kali-m. 6X** **C/. 4 h.**

Segunda etapa

- ❖ Cuando empieza a ceder la tos; las dolencias empeoran con el frío, incluso con tener partes del cuerpo descubiertas. Ataque de tos.
- ❖ Ruidos fuertes en el pecho, debido a la existencia de mucosidad en los tubos bronquiales; lengua limpia; disnea y náuseas.
- ❖ Jadeo; ruidos en el pecho, tos floja, sin expulsar flemas aunque se tosa durante mucho tiempo. Lengua con una capa blanquecina.

Tercera etapa

- ❖ Cuando la mucosidad se pone amarillenta; el paciente se siente mejor al aire libre; pérdida de la sed.
- ❑ Cuando no se expulsan flemas; si se expulsa alguna, sale teñida de sangre; pulso rápido y el paciente se queda muy débil.

BRONQUITIS ALÉRGICA.

(Ver también *Bronquitis crónica* y *Alergias*.

La inflamación de las membranas mucosas de los tubos bronquiales, debida a la reacción alterada producida por un antígeno o alérgeno, se llama Bronquitis Alérgica.

- ❑ Despues de vacunas preventivas (*trivalente, vacuna oral de la polio o B.C.GT.*).

Dros. 1M **Quinc. (3)**
(no dar nunca en etapa aguda)

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
<input type="checkbox"/> Después de la vacuna contra la viruela.	Thuy. 200 o 1M	C/. 10 m. (3)
<input type="checkbox"/> Después de la vacuna contra la difteria.	Diph. 1M	C/. 10 m. (3)
	Remedios bioquímicos	Ferr-p. 6X y Kali-m. 6X
		C/. 4 h.

BRONQUITIS ALÉRGICA.

(Ver también *Bronquitis crónica* y *Alergias*)

La inflamación de las membranas mucosas de los tubos bronquiales, debida a la reacción alterada producida por un antígeno o alérgeno, se llama Bronquitis Alérgica.

<input type="checkbox"/> Después de vacunas preventivas (<i>trivalente, vacuna oral de la polio o B.C.GT.</i>).	Dros. 1M (no dar nunca en etapa aguda)	Quinc. (3)
<input type="checkbox"/> Después de la vacuna contra la viruela.	Thuy. 200 o 1M	C/. 10 m. (3)
<input type="checkbox"/> Después de la vacuna contra la difteria.	Diph. 1M	C/. 10 m. (3)
	Remedios bioquímicos	Ferr-p. 6X y Kali-m. 6X
		C/. 4 h.

BRONQUITIS CRÓNICA

● Para personas que se resfrían constantemente con tos crónica sofocante.	Bac. 200 o 1M	Sem. (3)
★ Jadeo y opresión en el pecho. Se detiene la respiración cuando se queda dormido. Tiene que sentarse para respirar; no puede respirar echado.	Grin. Ø o 6	C/. ½ h. (3)
<input type="checkbox"/> Bronquitis crónica. Dolor al toser, en partes distantes del cuerpo.	Caps. 30	C/. 4 h.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
<input type="checkbox"/> La tos empeora después de media noche; tos dolorosa y seca, que hace que el paciente se sujeté el pecho; empeora al hablar.	Dros. 200	Una sola dosis
<input type="checkbox"/> Cuando la respiración es rápida y difícil. Jadeo, con disnea excesiva; expectoración muy difícil.	Ant-ar. 6 o 30	C/. 4 h. (6)
<input type="checkbox"/> Tos seca y crupal, sin poder arrancar esputos.	Ant-i. 30	C/. 4 h.
❖ Tos con dolor de pecho; mejora bebiendo agua fría. Escape involuntario de orina al toser.	Caust. 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Necesidad de toser durante mucho tiempo, antes de arrancar mucosidad, debido a que ésta es fuerte y densa; escape involuntario de orina.	Squill. 30	C/. 4 h.
❖ Máxima inquietud, con postración. Ganas de beber pocas cantidades de agua en breves intervalos. Tos seca que empeora después de beber; hay que sentarse a media noche. Paciente friolero.	Ars. 30	C/. 4 h.
❖ Cuando el cuerpo se pone morado y frío; el paciente quiere ventilación.	Carbo-veg. 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Expectoración abundante con dilatación de los tubos bronquiales.	Sabal. Ø o 6	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Tos espasmódica y dolorosa con disnea; empeora por la noche.	Naphtin. 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Falta de aliento, después de un ataque de bronquitis.	Chlol. 30	C/. 4 h.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA ★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
<u>BULIMIA</u>		
Apetito excesivo		
❖ Debido a lombrices; se siente hambre incluso después de comer.	Cina. 30 o 200	C/. 4 h.
❖ Empeora sobre todo a las 11 de la mañana; la falta de alimento produce dolor de cabeza.	Sulphur 200	C/. 10 m. (3)
<input type="checkbox"/> Con dolor de estómago; mejora después de comer.	Lach. 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Con diarrea; se siente hambre después de defecar.	Petr. 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Trass de una comida abundante; sensación de prisa.	Arg. met. 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Sensación de vacío, aunque se haya comido mucho; paciente obeso y flojo.	Cal-c. 200	Sem. (3)
<input type="checkbox"/> Se siente fácilmente satisfecho; pero tiene hambre incluso por la noche y come a deshora.	Lyc. 30 o 200	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Apetito voraz, a pesar de estar delgado; se siente el estómago como nadando en el agua.	Abrot. 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Mejora den las comidas y después de ellas; pérdida de peso, aunque se tomen buenos alimentos.	Iod. 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Hambre excesiva; difícil de satisfacer; náuseas por la mañana, antes de comer.	Sep. 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Se siente hambre, aunque el estómago esté lleno; se de sean estimulantes.	Staph. 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Hambre con mucha sed; sensibilidad para la música.	Tarent. 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Se siente hambre; pero sin apetencia.	Rhus tox. 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Hambre con hipo; prefiere ingerir cosas calientes.	Chel. Ø o 6	C/. 4 h.
Remedios bioquímicos		Kali-p. 6X y Nat-p. 6X
C/. 3 h.		

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
----------	----------	--------------------------

CABELLO

(Ver también *Calvicie* y *Canas prematuras*)

- | | | |
|--|------------------------|----------|
| <input type="checkbox"/> Pilosidad desagradable (en el rostro) en las mujeres. | Oleum jac-a. 3X | C/. 4 h. |
| <input type="checkbox"/> Cabello seco, enredado, enmarañado; mal olor del cuero cabelludo. | Psor. 200 o 1M | Sem. (3) |
| <input type="checkbox"/> Dolor del cuero cabelludo; al paciente no le gusta afeitarse, cortarse el pelo ni peinarse. | China 6 o 30 | C/. 4 h. |
| <input type="checkbox"/> Pelo rizado; suave, rojizo; eccema del cuero cabelludo. | Mez. 30 | C/. 4 h. |

Remedios bioquímicos

Para que crezca mejor.

- | | | |
|---|----------------------|----------|
| Estornuda al peinarse; paciente friolero. | Sil. 12X o 30 | C/. 4 h. |
|---|----------------------|----------|

CALAMBRES

Calambres de escritor, etc.

- | | | |
|---|---------------------------|----------|
| ★ Calambre de nadadores de agua fría. Calambres de los músculos de la pantorrilla, durante la noche, al estirar las piernas en la cama. | Rhus tox. 30 o 200 | C/. 4 h. |
| <input type="checkbox"/> Calambres de abdomen. | Aesculus gt. 30 | C/. 4 h. |
| <input type="checkbox"/> Calambres de escritor; dolor en las partes de la mano en que los huesos se apoyan en la superficie; empeora con el frío. | Cycl. 30 | C/. 4 h. |
| <input type="checkbox"/> Calambres debidos a la fatiga; sensación de dolor como si se recibiese un golpe. | Arn. 30 o 200 | C/. 3 h. |

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
□ Con frío helador en las extremidades del cuerpo, como en el cólera, etc.	Camph. Ø o 6	C/. ½ h.
□ Calambres de los músculos de la pantorrilla, plantas de los pies y palmas de la mano, empezando por los dedos de manos y pies; espasmódicos.	Cupr-met. 30	C/. 4 h.
□ Calambres como tirones en la parte superior de los glúteos, estando de pie; sudor frío.	Verat. 30	C/. 4 h.

CÁLCULOS RENALES

(Ver también *Piedras en el riñón*)

La formación de una piedra urinaria suele tener lugar en el riñón y de él pasa por el uréter a la vejiga, produciendo un dolor intenso en su viaje por el uréter. Este dolor tan fuerte se conoce como cólico nefrítico. Cuando el tamaño de una piedra es grande, se queda en el riñón y puede producir un dolor fuerte o leve o ningún dolor. La gota hereditaria o el reumatismo tienen un papel importante en la formación de cálculos renales.

- ★ Durante la etapa aguda; cuando el dolor es insoportable. **Acon. 200 o 1M y Cham. 200 o 1M** (3 dosis de cada uno, alternado C/. 15 m.)
- Ganas de orinar, sin conseguirlo; cólico nefrítico que se extiende hasta los genitales, con orina que gotea; picor en la uretra y en el cuello de la vejiga mientras se orina; sensación de frío.
- ★ Se consigue orinar después de mucho esfuerzo; flujo de orina débil; arena roja en la orina; ardor, dolor cortante en la parte posterior de los riñones, antes de orinar y mientras se orina; mejora después de orinar; peor en el lado derecho. **Lyc. 200 o 1M** C/. 10 m. (3)
- ★ Dolor penetrante, fuerte y pulsante en la zona de un riñón o de los dos; empeora con presión profunda; se extiende desde el riñón a la vejiga y la uretra, con necesidad de **Berb. Ø o superior** C/. 4 h.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
orinar; peor en el lado izquierdo. Dolor de espalda con fuerte decaimiento.		
<input type="checkbox"/> Orina sanguinolenta rojiza o marrón con sedimento blanco y harinoso. Si se deja un tiempo en reposo, la orina parece agua de cal; ardor en la uretra mientras se orina.	Cal-c. 200	C/. 6 h. (3)
<input type="checkbox"/> Para expulsar cálculos renales o de vesícula y detener la formación de piedras.	Calc-ren. 3X o 30	C/. 4 h.
★ Se nota un dolor fuerte cerca del cuello de la vejiga poco después de orinar.	Sars. Ø o 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Dolor agobiante en la espalda y en las caderas, por el paso de los cálculos. Sedimento como polvo de ladrillos en la orina.	Arn. 30 o 200	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> El dolor de los riñones se mete en el pecho. Sedimento marrón oscuro en orina; olor desagradable.	Benz-ac. 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Paso de cálculos con retorcimiento, calambres dolorosos; mejora inclinándose hacia atrás.	Dios. 30	C/. 4 h.
★ Cálculos formados por oxalato de calcio. Arena roja o sedimento en la orina. La orina se enfriá después de salir; olor intolerable, fuerte como orina de caballo.	Nit-ac. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
★ Se puede orinar mejor agachándose con las manos en las rodillas; la orina contiene mucha mucosidad viscosa, densa y blanquecina o un depósito de arena roja; olor muy fuerte parecido al del amoniaco.	Pareir. Ø, 5-10 gt.	C/. 4 h. (3)
<input type="checkbox"/> Orina turbia con sedimentos rojos, arenosos o del color de los ladrillos.	Sep. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
<input type="checkbox"/> Cólico nefrítico; náuseas mortales muy molestas.	Tab. 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Cálculos en la vejiga; el flujo de orina se detiene repentinamente; orina correosa y sanguinolenta. Micción dolorosa con sensación de ardor.	Uva. 30	C/. 4 h.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
★ Dolor agudo y muy fuerte; ardor al orinar; inflamación del tracto urinario.	Canth. 30	C/. 4 h.
□ Se orina con dificultad; se orina cómodamente inclinándose hacia atrás.	Zinc-met. 200	C/. 10 m. (3)
□ Se orina mejor estando echado; no se puede contener la orina; se escapa a gotas cuando se está echado.	Kreos. 30	C/. 4 h.
Remedio bioquímico		
Para el dolor		
Mg-p. 6X		
Para disolver la piedra		
Sil. 12X o 30X y Cal-p. 30X		
C/. $\frac{1}{2}$ h.		

CALVICIE

★ El cabello se rompe; se resquebraja, pierde brillo y belleza, las puntas están secas, con pérdida del lustre natural.	Fl-ac. 200 o 1M	Sem. (3)
★ Caída del cabello; debida a un exceso de caspa; el pelo se cae a mechones, dejando rodales de calva.	Phos. 200 o 1M	Sem. (3)
□ Caída del cabello de la cabeza y otras partes del cuerpo; deja rodales calvos y brillantes.	Sel. 6 o 30	C/. 4 h.
□ Caída del cabello; de la cabeza y otras partes del cuerpo, debido a debilidad.	Acid-phos. 6 o 30	C/. 4 h.
□ Caída de erupciones de cabello; granos cerca del pelo; márgenes.	Sep. 30 o 200	Sem. (3)
□ Caída del cabello de la cabeza, debida a erupciones y pi-cor.	Zinc-p. 30	C/. 6 h.
□ Caída del cabello con calor en la cabeza; el pelo se pone tieso sobre la punta.	Sulphur iod. 6	C/. 4 h.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
<input type="checkbox"/> El cabello pierde brillo y se cae; eccema del cuero cabelludo.	Mez. 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Caída del cabello; pelo enfermizo; sensación de tirones; picor en el cuero cabelludo.	Mg-c. 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Caída de la barba.	Sphing. 6 o 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Caída del cabello, con mucha caspa blanquecina.	Kali-m. 6X o 30	C/. 4 h.
Remedios bioquímicos		
Cuando el pelo se hace fino y se cae		
Caída del pelo a mechones		
Caída del pelo por debilidad, tras larga enfermedad		
Caída del pelo a mechones, dejando rodales calvos con muchas caspas.		

Hemos encontrado resultados muy buenos con los remedios bioquímicos mencionados, dando por separado y juntas 2 tabletas, de 6X de potencia cada una, tres veces al día, durante seis semanas.

CALLOS

★ Dolorosos; especialmente en las plantas de los pies; lengua con una capa blanca gruesa.	Ant-c. 200 o 1M	C/. 6 h. (6)
★ Callos debidos a la presión de los pies; dolorosos.	Sulphur 200	Sem. (3)
<input type="checkbox"/> Callos con molestias y dolor muy fuerte.	Lyc. 200	Sem. (3)
<input type="checkbox"/> Callos en los dedos de los pies; reaparecen después de cortarlos.	Hydr. 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Callos con grietas profundas; heces duras, estreñimiento.	Graph. 30	C/. 4 h.
Remedio bioquímico		
Callos blandos, inflamados y dolorosos		
	Sil. 12X o 30X	C/. 4 h.

Para uso externo: Thuy. Ø.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
CAMINAR		
❑ Agilidad; para estimular la actividad funcional de todos los órganos.	Coff. 30 o 200	Sem. (3)
❑ Espástico; tropiezan las rodillas una con otra.	Lach. 30 o 200	Quinc. (6)
❑ Hace eses; inseguridad cuando no pone atención.	Arg-nit. 30 o 200	Quinc. (6)
❑ Arrastra los pies al caminar.	Nux-v. 30	C/. 6 h.
❑ Lo talones no tocan el suelo al caminar.	Lath-sy. 200	Quinc. (6)
❑ Las piernas parecen pesadas, como si fuesen de plomo.	Med. 200 o 1M	Quinc. (3)
❑ Las piernas parecen pesadas, como si fuesen de madera o de cristal.	Thuy. 200 o 1M	Quinc. (6)
☆ Se echa hacia atrás, sin querer, al caminar.	Merc. 30 o 200	C/. 6 h.
❑ Levanta mucho los pies y los deja caer con fuerza.	Helo-s. 200	Sem. (6)
❑ Cojea involuntariamente.	Bell. 200	C/. 6 h.
❑ Se inclina al caminar.	Arn. 200	Sem. (6)
❑ Es muy difícil caminar por suelo irregular.	Lil-t. 30 o 200	Sem. (6)
❑ Se cae de repente, al caminar.	Mg-c. 30	Sem. (6)

Cuando dejan de actuar las potencias mencionadas, debe utilizarse la inmediata superior.

CANAS PREMATURAS

● Para prevenir el encanecimiento prematuro del cabello.	Thyr. 200 o 1M	C/. 4 h.
☆ Por debilidad; pérdida seminal; en los niños.	Acid-phos. 3X o 30	C/. 4 h.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
❑ Encanecimiento prematuro del cabello; en personas que están sometidas a estrés mental continuo.	Lyc. 30 o 200	Sem. (6)
☆ Despues de una enfermedad agotadora, como las fiebres tifoideas, etc.; miedo a la oscuridad, al ruido, etc.; delirio por las bebidas frías y heladas.	Phos. 200 o 1M	Sem. (3)
● En pacientes psóricos; cuando el pelo se pone gris por rodales.	Psor. 200 o 1M	Sem. (3)
❑ Para oscurecer el pelo que crece con facilidad.	Wies. 30	C/. 4 h.
❑ Cuando se suda mucho por todo el cuerpo; encanecimiento prematuro del pelo.	Pilo. 1M. (Jab. 1M)	Sem. (6)
❑ Encanecimiento prematuro del pelo; hiperacidez.	Sul-ac. 30	C/. 4 h.
☆ Otro remedio bien comprobado	Cean. Ø	5-7 gt. C/. 4 h.
Remedios bioquímicos		
	Cal-p. 6X y Nat-m. 6X	C/. 4 h.

Para uso externo: Arn. Ø, Canth. Ø y Jab. Ø al 10% en aceite de Coco o de Oliva.

CÁNCER

(De diferentes órganos)

Aquí se dan los remedios que tienen una afinidad especial con órganos concretos. Si la totalidad de los síntomas del paciente coinciden en conjunto con un remedio concreto, se le debe dar éste. La repetición debe hacerse sólo con máximo cuidado.

- | | | |
|---|----------------|----------|
| ❑ Cáncer de estómago con vómitos constantes de fluido negro. | Cad-s. 30 | C/. 3 h. |
| ❑ Cáncer de páncreas o de los huesos, especialmente el de mandíbula inferior y tibia. | Phos. 30 o 200 | C/. 3 h. |

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
<input type="checkbox"/> Cáncer de huesos, periósteo, especialmente las articulaciones.	Symph. 6 o 30	C/. 3 h.
<input type="checkbox"/> Úlcera cancerosa; especialmente cuando es consecuencia de la malaria.	Chinin-s. 30 o 200	C/. 3 h.
<input type="checkbox"/> Cáncer de estómago, de axila, de esófago; grietas dolorosas en las comisuras de los labios.	Cund. 30 o 200	C/. 3 h.
<input type="checkbox"/> Cáncer de vejiga, de pecho, predisposición para granos en la adolescencia.	Aster. 30 o 200	C/. 3 h.
<input type="checkbox"/> Cáncer de ciego, píloro o duodeno; contracción dolorosa con distensión duodenal.	Orni. Ø o 6	C/. 3 h.
<input type="checkbox"/> Cáncer de cérvix; sangra con facilidad; sensación de agua hirviendo a lo largo de la espalda.	Ust. Ø o 6	C/. 3 h.
<input type="checkbox"/> Cáncer de cara; efectos negativos de la vacuna. Agotamiento y enflaquecimiento rápidos.	Thuy. 30 o 200	C/. 3 h.
<input type="checkbox"/> Cáncer de pulmones; sueños lascivos perturbadores.	Cob. 30	C/. 3 h.
<input type="checkbox"/> Cáncer de glándulas del cuello; paciente sensible al frío. Sensación de frío en diversas partes.	Cist. 30	C/. 3 h.
<input type="checkbox"/> Cáncer de testículos.	Cad-p. 30	C/. 3 h.
<input type="checkbox"/> Cáncer de vagina; de próstata; no puede controlar la orina; la orina drena constantemente estando echado.	Kreos. 30	C/. 3 h.
● Historial canceroso en la familia o en el paciente.	Carc. 200 o 1M	Quinc. (3)
☆ Diátesis cancerosa; irritabilidad excesiva.	Stry. 200 o 1M	Quinc. (3)
<input type="checkbox"/> Para expulsar el veneno de la lesión efectuada.	Sil. 12X o 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Cuando empieza a engangrenarse; ardor e inquietud.	Ars. 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Cáncer de la parte baja del intestino, con prolapo.	Ruta-gt. 6 o 30	C/. 4 h.

Para uso externo: loción de Hyper.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
----------	----------	--------------------------

CARIES DENTAL

✗ Caries de los dientes de los niños, tan pronto como aparecen; enuresis.	Kreos. 30	C/. 4 h.
✗ Caries de los dientes; dolor y molestias.	Plan-m. 30	C/. 4 h.
✗ Desgaste de los dientes; sangran las encías y son sensibles al frío y al calor.	Merc. 30	C/. 4 h.
● Remedio intercurrente.	Syph. 200 o 1M	Sem. (3)

Remedios bioquímicos

Cal-f. 12X,
Cal-p. 6X y Sil. 12X C/. 4 h.

Para uso externo: Plan-m. Ø o Kreos. Ø.

CASPA

✗ Caspa con picor en la cabeza y dolor de cabeza; empeora bañándose con agua caliente.	Lyc. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
◻ Cuando toda la cabeza está llena de caspa y se cae el pelo en grandes mechones.	Phos. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
● Caspa con picor en la cabeza; pelo seco y rizado.	Med. 200 o 1M	Quinc. (3)
◻ Caspa con picor insoportable; cuero cabelludo sensible, escamas secas.	Ars. 30	C/. 4 h.
● Caspa blanca; escamosa; pelo seco que se cae; empeora con una atmósfera húmeda.	Thuy. 200 o 1M	Sem. (6)
✗ La caspa aumenta a los lados de la cabeza; piel y cuero cabelludo grasos.	Nat-m. 12X o 30	C/. 4 h.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
● Remedio intercurrente; cabello seco, áspero, sin lustre, cuero cabelludo maloliente; picor intolerable.	Psor. 200 o 1M	Quinc. (3)
□ Caspa abundante, escamosa, suda mucho el occipucio.	Sanic. 30	C/. 4 h.
☆ Caspa en rodales circulares, como tiña; picor que no se alivia rascando.	Sep. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
□ Caspa amarillenta y abundante; tiña; eccema en el cuero cabelludo; empeora con el calor.	Kali-s. 6X o 30	C/. 4 h.
□ Caspa abundante y blanquecina.	Kali-m. 6X o 30	C/. 4 h.

Otros remedios útiles: Cal-c., Canth., Graph., Mez., Staph., Sulphur, etc.

CEGUERA

□ Repentina; cuando no se conoce la razón.	Acon. 200 o 1M	C/. 10 m. (3)
□ Ceguera nerviosa; ceguera al color.	Santin. 6	C/. 4 h.
□ Ceguera nocturna.	Ran-b. 30	C/. 4 h.
□ Ceguera diurna.	Both. 30	C/. 4 h.
□ En caso de anemia; paciente débil e histérico.	Ferr-met. 30	C/. 4 h.
□ Debida a un relámpago; miedo, tensión nerviosa, etc.	Phos. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
□ Ceguera nocturna; ve sólo la mitad del objeto.	Lyc. 30 o 200	C/. 6 h. (3)
☆ Ceguera nocturna; miopía creciente.	Phys. 30	C/. 4 h.
□ Ceguera de pacientes de lepra.	Hura. 30	C/. 6 h.

Remedios bioquímicos **Cal-p. 6X y Kali-p. 6X.** C/. 4 h.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
<u>CERA</u>		
<i>En los oídos</i>		
<input type="checkbox"/> Cera en los oídos; dura, de color amarillento, dificulta la audición; pérdida de sed.	Puls. 30 o 200	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Cera; de color blanco amarillento, dura, seca; produce un dolor frenético en los oídos.	Lach. 30 o 200	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Cera rojiza; de color de sangre; audición defectuosa.	Con. 200 o 1M	C/. 10 m. (3)
● Cera rojiza; de mal olor; dolor detrás de los oídos.	Psor. 200 o 1M	C/. 10 m. (3)
<input type="checkbox"/> Exceso de cera en los oídos; sordera y eco de las palabras.	Caust. 200	C/. 10 m. (3)
Remedios bioquímicos.		Calc-sulph. 2X y Sil. 2X C/. 4 h.

CEREBRO

<input type="checkbox"/> Anemia cerebral.	Tab. 30 o 200
<input type="checkbox"/> Inflamación del cerebro.	Arum-t. 30 o 200
<input type="checkbox"/> Lesión del cerebro o sus efectos.	Nat-s. 200o superior.
<input type="checkbox"/> Parálisis cerebral; fatiga cerebral.	Zinc-met. 30 o 200
<input type="checkbox"/> Tumores cerebrales.	Plb. 30 o 200
<input type="checkbox"/> Inflamación del cerebro por lesión.	Ruta-gt. 30 o 200
<input type="checkbox"/> Fatiga cerebral por exceso de trabajo mental.	Kali-p. 6X o 30
<input type="checkbox"/> Miedo al esfuerzo mental; paciente friolero.	Sil. 12X o 30
<input type="checkbox"/> Atrofia cerebral después de tensión nerviosa o susto.	Phos. 30 o 200
<input type="checkbox"/> Afecciones cerebrales en niños durante un ataque de cólera.	Nux-m. 30 o 200

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
<u>CIÁTICA</u>		
(Ver también <i>Artritis, Vértebra dislocada, Lumbago, etc.</i>)		
□ Se siente como si los tendones de la cadera izquierda fueran demasiado cortos; Se cojea al caminar, por esta tensión; empeora al sentarse. El dolor se alivia al echarse.	Am-m. 200	C/. 4 h.
□ El dolor empeora por la noche, al mínimo chirrido, dejando caer la extremidad y con el calor.	Bell. 30 o 200	C/. 3 h.
□ Tirones violentos y dolores muy fuertes; sensación de entumecimiento y dolor en las partes afectadas; empeora en la cama de noche y con el movimiento.	Cham. 200 o 1M	C/. 4 h.
□ Dolor muy fuerte; baja de la cadera al muslo, la pierna y el pie; dolor repentino, como un relámpago, que baja por toda la extremidad; empeora al tocar, con el frío y con movimiento; mejora con el descanso, la presión y el calor.	Coloc. 200 o 1M	C/. 3 h.
☆ Dolor pulsant a lo largo del nervio ciático izquierdo, que corre el hueso de la cadera; piernas cansadas.	Eup-per. 200 o 1M	C/. 3 h.
□ Por lesión del nervio; dolor agudísimo.	Hyper. 30 o 200	C/. 4 h.
☆ Dolor que sube. La extremidad afectada está más fría que el resto del cuerpo. El dolor empeora en la cama, al calentarse; mejora con compresas frías.	Led. 200 o 1M	C/. 4 h.
□ Dolor como un calambre eléctrico; como un disparo, en la parte exterior del muslo; ganas de moverse, pero el movimiento agrava el dolor.	Phyt. 30 o 200	C/. 4 h.
☆ Producido por exposición a la humedad; agota cuando aparece; con entumecimiento; empeora con el descanso; mejora con calor y frotando. El dolor empeora con tiempo frío y húmedo y por la noche.	Rhus tox. 200 o 1M	C/. 6 h.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
❑ Dolor profundo sentado. Empeora con el descanso, después de heridas, contusiones, etc.	Ruta-gt. 30 o 200	C/. 4 h.
❑ Empeora con el frío e incluso con el aire; mejora al cubrirse.	Still. 30 o 200	C/. 4 h.
❑ Por un esfuerzo excesivo; la cama resulta muy dura.	Arn. 30 o 200	C/. 4 h.
❑ El dolor empieza por la región sacro-coxígea; se extiende por las extremidades inferiores y las mantiene con molestias continuamente; empeora con el frío; paciente friolero.	Cal-c. 200 o 1M	C/. 10 m. (3)
❑ Los tendones de las rodillas parecen demasiado cortos; rígidos y contraídos; ganas de estar siempre moviendo los pies; empeora al aire libre; mejora con el calor.	Caust. 30 o 200	C/. 4 h.
❑ Dolor pulsante frecuente; irradia hacia abajo; mejora al estirar la extremidad y moviéndola.	Dios. 30	C/. 4 h.
❖ Entumecimiento que alterna con el dolor; dolor intenso, como dardos, a lo largo de la parte posterior del nervio ciático; empeora con el movimiento.	Gnaph. 200 o 1M	C/. 4 h.
❑ El dolor empeora con el movimiento; al exponerse al aire; el paciente es muy sensible al frío, etc.	Hep. 30 o 200	C/. 4 h.
❑ Dolor muy fuerte en la articulación de la cadera y en la rodilla; sudor abundante que no cede.	Merc. 30 o 200	C/. 4 h.
❑ Ciática del lado izquierdo; empeora al empezar a moverse; se alivia con un movimiento suave; mejora al frotarse y con la presión. Empeora por la tarde, por la noche y en una habitación caliente; mejora al aire libre.	Puls. 200	C/. 4 h.
❖ Debilidad y cojera en las extremidades; sensación de magulladura en los músculos de la cadera; empeora de pie y caminando; irradia hacia abajo.	Kalm. 200	C/. 4 h.
❖ El dolor empeora por la noche; en especial al acercarse la mañana; dolor como si estuviesen royendo el periósteo de la pierna izquierda.	Kali-i. 200 o 1M o incluso superiores	Sem. (6)

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
Remedios bioquímicos	Mg-p. 6X y Cal-p. 6X	C/. 4 h.

CICATRICES

(Ver *Belleza, consejos de y Queloides*)

CISTITIS

Inflamación de la vejiga

★ Remedio capital; ardor intenso en el tracto urinario, la orina sale gota a gota.	Canth. 30	C/. 4 h.
★ Micción frecuente; las últimas gotas arden, orina mezclada con sangre, sólo salen unas gotas cada vez; pérdida de sed.	Apis. 30	C/. 4 h.
□ Necesidad constante de orinar con mucho esfuerzo; el dolor baja hacia el muslo al hacer esfuerzo para orinar.	Pareir. Ø o 6	C/. 4 h.
★ Orina densa y turbia, mezclada con sangre y albúmina; pujos constantes.	There-ch. Ø, 5-10 gt. C/. 4 h.	
● Remedio intercurrente.	Med. 200 o 1M	Sem. (3)
Remedios bioquímicos		
	Ferr-p. 6X, Kali-m. 6X y Kali-p. 6X	C/. 4 h.

CODO DE TENISTA

★ Temblor de brazos después de un esfuerzo; dolor en el codo; rigidez de los brazos.	Rhus tox. 1M o 10MC/. 4 h. (3)
--	--------------------------------

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
◻ Rigidez en general; dolores agudos, como golpes, debajo de la piel; empeora con el movimiento.	Agar. 30 o 200	C/. 4 h.
◻ Dolor frenético; con sensación de torcedura y parálisis; tirones en los dedos.	Ambra-gr. 30 o 200	C/. 4 h.
☆ Dolor muy fuerte en los huesos de los brazos; calambres como tirones; dolor como de magulladuras en los huesos de las muñecas y reverso de las manos. Empeora con el movimiento.	Ruta-gt. 30 o 200	C/. 4 h.
☆ Dolor de codo debido a un golpe.	All-c. 30	C/. 4 h.

COITO-Masculino

(Ver también *Impotencia, Espermatorrea, etc.*)

◻ Aversión al coito debido a impotencia; pacientes estreñidos; propensión a la obesidad.	Graph. 200 o 1M	Sem. (3)
☆ Pérdida o disminución de deseo. Pérdida completa de erección.	Lyc. 200 o 1M	Sem. (3)
● Remedio intercurrente.	Psor. 200	Sem. (3)

Sólo el tratamiento constitucional da los resultados deseados en enfermedades relacionadas con el sexo.

COLAPSO

(Ver también *Desfallecimiento y Pérdida de conocimiento*)

La caída en un estado de depresión física profunda se llama colapso.

Buscar inmediatamente ayuda médica. Los remedios que se mencionan a continuación se pueden administrar, dependiendo de los síntomas, hasta que se dé la ayuda médica adecuada. Procurar descubrir la causa básica y tratar de acuerdo con ella.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
★ Cuando hay frío, tanto interno como externo; después de una exposición repentina al frío; durante el cólera.	Camph. Ø o 30	C/. 15 m. (6)
★ Cuando el paciente quiere ventilación, aunque el cuerpo esté frío.	Carbo-veg. 30 o 200	C/. ½ h.
□ Repentino; debido a miedo o exposición a aire seco y frío.	Acon. 200 o 1M	C/. ½ h.
□ Debido a conmoción (lesión).	Arn. 200 o 1M	C/. ½ h. (3)
□ Por descargas agotadoras, como pérdida de sangre, vómitos excesivos, diarrea, pérdida de semen.	China 30	C/. ½ h.
□ En ataques epilépticos.	Cupr-met. 30 o 200	C/. ½ h.
□ Debido a insolación.	Glon. 30 o 200	C/. ½ h.
★ Con sudor frío.	Verat. 30 o 200	C/. ½ h.
Remedios bioquímicos		Kali-p. 6X, Mg-p. 6X y Nat-m. 12X; en agua templada
<i>Otros remedios útiles: Ars., Phos., Con., Hydr-ac., Op., Coloc., etc.</i>		C/. ½ h.

CÓLERA INFANTIL

□ Dolencias con tos, heces amarillas doradas; el paciente quiere bebidas muy frías.	Phos. 30	C/. ½ h.
★ Cuando hay un olor marcadamente agrio en las heces.	Rheum 30	C/. ½ h.
★ Cuando se tiene mucha sed y ganas de beber poca cantidad de agua. Vómitos con heces frecuentes y líquidas; inquietud.	Ars. 30	C/. ½ h.

Otros remedios útiles: Aethusa 30, Ant-c. 30 Cal-p. 6X o 30, Cham. 30, China 30, Op. 30 o 200, Phos. 30, Podo. 30, etc.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
----------	----------	--------------------------

CÓLERA

El cólera es una enfermedad infecciosa grave, producida por el Bacillus Vibrio Cholerae. Esta enfermedad se transmite por medio del agua y los alimentos contaminados. Empieza por una diarrea que se hace muy pronto completamente líquida y abundante. Hay una pérdida repentina de fluidos. Vómitos fuertes, pulso débil, bajada de la presión sanguínea y orina escasa. Si no se trata debidamente, el paciente puede morir por deshidratación.

❑ Remedio profiláctico.	Cupr-met. 200 y Verat. 200	
		<i>Sem. alternando</i>
★ Remedio capital, cuando el cuerpo se queda frío, con frío interno.	Camph. Ø o 30	<i>C/. ½ h.</i>
❑ Ganas de tomar bebidas frías. Cólico violento, especialmente alrededor del ombligo. Se siente el ano completamente abierto después de defecar.	Phos. 30 o 200	<i>C/. ½ h.</i>
★ Heces blancas, como el agua de arroz; sudor frío y arcadas incontrolables con tirones y espasmos en los dedos.	Verat. 30	<i>C/. ½ h.</i>
★ Cuando persisten una náuseas mortales y sudor frío.	Tab. 30	<i>C/. ½ h.</i>
★ Cuerpo frío y morado. Diarrea espasmódica: el espasmo empieza en las extremidades inferiores y se extiende a los músculos del abdomen y al pecho.	Cupr-met. 30	<i>C/. ½ h.</i>
★ Heces grandes, amarillas, verdosas y malolientes.	Podo. 30	<i>C/. ½ h.</i>
★ Sensación de ardor en todo el cuerpo; inquietud, dificultad para respirar. Aparición rápida del colapso. Ganas de beber pocas cantidades de agua en intervalos frecuentes.	Ars. 30	<i>C/. ½ h.</i>
❑ Cuando cesan los vómitos y continúa la diarrea; frío en las extremidades, aunque el paciente no quiera cubrirlas. Más arcadas que vómitos.	Sec-cor. 30	<i>C/. ½ h.</i>
★ Cuando el cuerpo se queda frío; respiración débil y trabajosa; el paciente quiere ventilación.	Carbo-veg. 30	<i>C/. ½ h.</i>

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
☐ Cuando los síntomas de cólera van acompañados de hipo fuerte y violento.	Cic. 30	C/. ½ h.
☐ Cuando el cólera va seguido de garrotillo.	Spong. 30	C/. ½ h.
Remedios bioquímicos		
	Mag-p., Fer-p. 12X, Kali-m. 6X, Nat-s. 12X, Kali-p. 6X y Nat-m. 12X	C/. ½ h.

Durante la etapa grave, cuando disminuye la fuerza vital, debe darse los remedios mencionados, en breves intervalos, según los síntomas, en potencias más altas (200 o superior).

CÓLICO

(Ver también *Abdominal, dolor*)

☐ Por alimentos en mal estado; sed insaciable, a intervalos frecuentes; angustia e inquietud.	Ars. 30	C/. 2 h.
☒ Debido a acidez y úlceras; el paciente quiere ventilación constante, aire fresco.	Carbo-veg. 30	C/. 4 h.
☒ Dolores cortantes y de agonía; mejora inclinándose como si se doblase.	Coloc. 30	C/. 4 h.
☐ Despues de comer demasiado; especialmente alimentos cargados de especias o leche, etc.	Nux-v. 30	C/. 3 h.
☒ Durante el cólera, con sudor frío.	Verat. 30	C/. 2 h.
☐ Dolor en el abdomen por lombrices.	Cina. 200 o 1M	C/. 6 h.
☐ Debido a flatulencia; mejora inclinándose hacia atrás.	Dios. v. 30	C/. 4 h.
☐ Al comer; dolor ardiente alrededor del ombligo.	Calc-ren. 30	C/. 4 h.
☐ Despues de una operación de abdomen.	Staph. 30	C/. 4 h.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
<input type="checkbox"/> Cuando el dolor aparece y desaparece de repente.	Bell. 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Después de tomar alimentos ricos en grasas con pérdida de sed; ganas de estar al aire libre y fresco.	Puls. 30	C/. 4 h.
✗ Con dolores intolerables; especialmente en una mujer embarazada; empeora después de tener ira.	Cham. 200	C/. 2 h.
<input type="checkbox"/> Dolor fuerte; espasmódico; violento e intermitente.	Cupr-met. 30	C/. 4 h.
Remedio bioquímico	Mg-p. 6X	C/. 2 h.

COLITIS

(Ver también Disentería)

✗ Los síntomas empeoran después de tener ira; sabor amargo. Dolor fuerte cortante en el abdomen que hace que el paciente se doble.	Coloc. 30	C/. 3 h.
✗ Heces líquidas verdosas, que salen con mucha fuerza; abdomen distendido.	Mg-c. 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Heces líquidas amarillentas con flatulencia; empeora después de comer, tomar agua fría o frutas en conserva; digestión lenta.	China 6 o 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Heces flojas y malolientes. El paciente no puede soportar el contacto de la ropa en el abdomen; empeora en primavera y después de dormir.	Lach. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
<input type="checkbox"/> Colitis ulcerosa o simple; después de indignación (como rapto u otros actos inhumanos; etc.).	Staph. 200 o 1M	Quinc. (3)
<input type="checkbox"/> Las heces contienen partículas blancas; distensión de abdomen; dolor en la zona del hígado; hipersensibilidad al olor de los alimentos.	Colch. 30	C/. 4 h.
Remedio bioquímico	Mg-p. 6X	C/. 3 h.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
----------	----------	--------------------------

CONGELACIÓN

Cuando se debe a una exposición al frío (nieve, etc.) el paciente debe estar en una habitación fresca y no exponerse a corrientes de aire.

Si no da señales de vida, debe cubrirse de nieve. Como deben quedar libres la nariz y la boca, hay que ponerlo en una posición en la que se pueda quitar fácilmente la nieve y reanudar el proceso.

En caso de que no se disponga de nieve, conviene darle un baño con agua muy fría, con inmersión del cuerpo durante poco tiempo. Después de esto, se cubre el cuerpo con ropas mojadas en agua fría muy apretadas, y se cubre con una manta. Hay que prestarle la atención debida y frotar el cuerpo adecuadamente.

Este proceso puede durar varias horas, hasta que se compruebe que es imposible la recuperación. Después de la recuperación, se le puede dar **Carbo-veg. 30, Ars. 30 o Verat. 30**, dependiendo de los síntomas.

- | | | |
|---|----------------------------|--------------|
| <input type="checkbox"/> Aunque el cuerpo está muy frío, el paciente quiere ventilación, aire fresco. | Carbo-veg. 30 o 200 | C/. ½ h. (3) |
| <input type="checkbox"/> Cuando el cuerpo se pone frío; sudor frío y cianosis del cuerpo. | Verat. 30 o 200 | C/. ½ h. (3) |
| <input type="checkbox"/> Está inquieto, pero no puede moverse por excesiva debilidad. | Ars. 30 o 200 | C/. ½ h. (3) |

CONJUNTIVITIS

(Ver también *Tracoma*)

Inflamación de la conjuntiva (membrana mucosa que cubre la superficie anterior del ojo).

- | | | |
|--|-----------------------|----------|
| ★ Lagrimeo repentino con inflamación después de exponerse al frío. | Acon. 30 o 200 | C/. 3 h. |
| ★ Ojos enrojecidos con dolor e inflamación; cara enrojecida. | Bell. 30 | C/. 4 h. |
| ★ Descarga líquida irritante de los ojos; el paciente no puede soportar la luz fuerte. | Euphr. 30 | C/. 3 h. |

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
❖ Dolor de cabeza, descarga ocular abundante y purulenta que dificulta la visión y hay que limpiar inmediatamente; inflamación granulomatosa aguda.	Arg. Nit. 30	C/. 4 h.
❑ Párpados hinchados y enrojecidos; empeora con el calor.	Apis. 30	C/. 4 h.
❖ Descarga ocular verdosa amarillenta; empeora con el calor y mejora al aire libre y frío.	Puls. 30	C/. 4 h.
❖ Lacrimación irritante; ardor fuerte y dolor de ojos, sensación de tener un cuerpo extraño en los ojos. Los párpados se pegan.	Merc-c. 30	C/. 4 h.
❑ Descarga ocular blanquecina y correosa.	Kali-bi. 30	C/. 4 h.
❑ Enrojecimiento e inflamación de los ojos; hay que hacer mucha fuerza para abrir los ojos.	Rhus tox. 30	C/. 4 h.
● Picor y ardor en los ojos; empeora al lavarse.	Sulphur 30 o 200	C/. 4 h. (3)
Remedios bioquímicos		
	Kali-m. 6X y Ferr-p. 6X	C/. 2 h. <i>alternando.</i>

Para uso externo: gotas oftálmicas de Euphr.

CONVULSIONES

❑ Convulsiones al ver el agua; especialmente en casos de hidrofobia.	Lys. 200 o 1M	C/. 10 m. (3)
❑ Convulsiones debidas a tosferina.	Cupr-met. 30 o 200	C/. 3 h.
❑ Convulsiones debidas a lombrices, en los niños.	Cina. 200 o 1M	C/. 6 h.
❑ Convulsiones con piel caliente y rojiza, rubor en la cara y ojos brillantes; durante el período de dentición.	Bell. 30	C/. 4 h.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
<input type="checkbox"/> Convulsiones violentas; con torsiones violentas; miedo a la oscuridad.	Stram. 30	C/. 3 h.
<input type="checkbox"/> Torsiones violentas; espalda inclinada hacia atrás formando arco.	Cic. 30 o 200	C/. 3 h.
	Remedios bioquímicos Kali-p. 6X, Mg-p. 6X Nat-p. 6X	C/. 4 h.

En ataques agudos, pueden darse los remedios mencionadas en intervalos cortos.

CORAZÓN, Afecciones del

<input type="checkbox"/> Palpitaciones; echado del lado derecho.	Alum. 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Palpitaciones; mejora al caminar.	Card-m. Ø o 6	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> El paciente se siente como si tuviese el corazón en el lado derecho.	Borx. 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Dolor en el corazón antes, durante y después de orinar; o en los periodos menstruales.	Lith. 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Palpitación y disnea en las enfermedades orgánicas del corazón; empeora cuando se piensa en ello.	Ox-ac. 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Palpitaciones; después de una emoción.	Cal-ar. 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Palpitaciones debidas a anemia; inquietud y sensación de ardor.	Ars. 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Enfermedades del corazón debidas a represión de unas hemorroides o a la menstruación.	Coll. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
<input type="checkbox"/> Degeneración del corazón; el paciente quiere preparados fríos.	Phos. 30 o 200	C/. 6 h. (SOS)

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
❑ Corazón con grasa; siente como si se le subiese el corazón a la garganta.	Phyt. 30	C/. 4 h.
❑ Inflamación del corazón; dolor que empeora al mínimo movimiento.	Bry. 30 o 200	C/. 4 h.
❑ Acción rápida del corazón; se toma conciencia del corazón.	Pyr. 200	1 dosis
❑ Acción lenta del corazón; pulso débil y rápido.	Lat-m.30	C/. ½ h. (3)
❑ Debilidad e irritación del corazón.	Prun-v. 30	C/. 6 h.
Remedio bioquímico	Kali-p. 6X	C/. 4 h.

COREA

Movimientos involuntarios de los músculos
(Ver también Nerviosismo)

❑ Con dolor y adormecimiento.	Asaf. 30	C/. 6 h.
❑ Angular; mejora durante el sueño.	Arg. Nit. 30 o 200	C/. 6 h.
❑ Sacudida de brazos y piernas.	Mygal. 200	Sem. (3)
★ Debido a fuertes emociones; especialmente de los músculos de la cara; empeora al inhalar humo.	Ign. 200	C/. 6 h.
❑ Movimientos de la cabeza hacia atrás y hacia delante; miedo a la obscuridad.	Stram. 200 o 1M	C/. 6 h.
❑ Temblor de manos; sudor abundante que no mejora las dolencias.	Merc. 30 o 200	C/. 6 h.
❑ En pacientes frioleros, débiles y agotados. Empeora con el frío.	Zinc-p. 30	C/. 6 h.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
★ Pérdida de control; movimientos de extremidades; empeora con el sueño; contracción de músculos.	Caust. 30 o 200	C/. 6 h.
Remedios bioquímicos	Kali-p. 6X y Mg-p. 6X	C/. 4 h.

CUERPOS EXTRAÑOS

Piel

- Para expulsar un cuerpo extraño de la piel, en casos recurrentes. Hep. 200 o 1M C/. 10 m. (3)
- Para expulsar un cuerpo extraño de la piel, en casos crónicos. Sil. 200 o 1M C/. 4 h. (6)
- Para expulsar clavos del hierro, etc., clavados en el cuerpo. Led. 200 o 1M C/. 4 h. (6)

CUIDADOS PRE Y POST OPERATORIOS

- Antes de la operación; para prevenir el trauma, consecuencias, etc. Arn. 200 o 1M 1 dosis
- Por trauma quirúrgico. Stront-c. 30 o 200 C/. 10 m. (3)
- Efectos nocivos de la anestesia con cloroformo. Chlf. 200 C/. 10 m. (3)
- Si falla Chlf. Phos. 20 C/. 10 m. (3)
- Efectos nocivos de la anestesia con éter. Ant-tart. 200 C/. 10 m. (3)
- Retención de orina después de la operación. Caust. 30 o 200 C/. ½ h. (3)
- Para lesiones de los nervios; ablación de uñas, amputación o circuncisión. Hyper. 200 C/. 10 m. (3)

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
<input type="checkbox"/> Si falla Hyper.	All-c. 30	C/. 3 h.
<input type="checkbox"/> Después de una amigdalotomía.	Calen. 30	C/. 3 h. (6)
<input type="checkbox"/> Para controlar la hemorragia después de operación.	Phos. 30 o 200	1 dosis
<input type="checkbox"/> Después de la operación; cuando la hemorragia es de color rojo brillante.	Mill. Ø o 30	C/. 3 h.

DEBILIDAD

(Ver también *Enflaquecimiento*)

- Por pérdida de sueño; tensión nerviosa. Phos. 200 C/. 10 m. (3)
- Debilidad en las piernas; después de una diarrea. Bov. 30 C/. 4 h.
- Por agotamiento nervioso; paciente friolero. Cal-c. 200 C/. 4 h. (3)
- Tónico general para el agotamiento nervioso. Kali-p. 6X o 30 C/. 4 h.
- ☆ Sin ninguna causa aparente; después de una enfermedad grave. Alf. tonic antes de las comidas.
- Remedio intercurrente, para pacientes de psoriasis. Psor. 200 o 1M Sem. (3)

DEMENCIA

(Ver también *Manía*)

- Paciente dictador; envidioso; se pone irascible y violento con facilidad. Lyc. 200 o 1M Sem. (3)
- Por alguna lesión de la cabeza; melancolía al oír música; piensa en dispararse y lo intenta. Nat-s. 200 o 1M Sem. (3)
- Por un susto o disgusto; intenta evadirse; aburrido y llora por cualquier motivo insignificante. Ars. 200 o 1M Sem. (3)

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
□ Con parálisis y locuacidad; pendenciero; el paciente se pone violento, zahiere e insulta a los demás por envidia; no soporta el ruido.	Nux-v. 200 o 1M	<i>Sem. (3)</i>
□ Por un dolor insopportable; con convulsiones; suspicaz, delirante y pendenciero.	Verat. 200 o 1M	<i>Sem. (3)</i>
□ Por excesos sexuales; idea exagerada de su propia importancia, de su grandeza y sus logros.	Phos. 200 o 1M	<i>Sem. (3)</i>
□ Cuadro maniaco violento, con aumento de fuerza, inquietud y rapidez, amenazas de muerte y destrucción; pendenciero y malévolos; sensible a la música.	Tarent. 200 o 1M	<i>Sem. (3)</i>
□ Impulsos anormales; insomnio, se queda despierto durante horas en la cama; descubre todo su cuerpo sin pudor.	Hyos. 200 o 1M	<i>C/. 10 m. (3)</i>
□ Se imagina dominado por una fuerza sobrehumana; miedo a que lo envenenen; piensa que los demás hablan de él.	Lach. 200 o 1M	<i>C/. 10 m. (3)</i>
● Juega y lleva trapos y cosas como si no fuese menos que un rey; monomanía.	Sulphur 200 o 1M	<i>C/. 10 m. (3)</i>
□ El paciente se vuelve salvaje; miedo a la oscuridad.	Stram. 1M	<i>C/. 10 m. (3)</i>
□ Imagina que está oyendo música; cierra los ojos y se pierde en una melodía deliciosa; se excita con el baile y con la risa; desvaría al hablar.	Cann-i. 200 o 1M	<i>C/. 10 m. (3)</i>
□ Irascibilidad desmesurada a la mínima ofensa; estalla con violencia; consciente de doble ego.	Anac. or. 200 o 1M	<i>C/. 10 m. (3)</i>
● Remedio intercurrente	Bac. 1M o 10M	<i>Quinc. (3)</i>
Remedio bioquímico	Kali-p. 6X	<i>C/. 4 h.</i>

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
----------	----------	--------------------------

DENGUE

Enfermedad infecciosa eruptiva, con fiebre aguda que, tras una incubación de 3-6 días, aparece bruscamente, con dolores generales, síntomas catarrales y erupción cutánea.

✗ Con dolor agudo en lo profundo de los huesos; mejora con el sudor.	Eup-per. 30	C/. 3 h.
✗ Con dolores musculares e inquietud; mejora con el movimiento.	Rhus tox. 30 o 200	C/. 3 h.
◻ Fiebre biliosa remitente; tiene sed y, después, frío o calor; mejora después de vomitar.	Nyct. Ø o 30	C/. 3 h.
✗ Escalofríos por la espalda; dolor muscular y agotamiento; embotamiento y pesadez de cabeza.	Gels. 30	C/. 3 h.
✗ Dolor como si reventase la cabeza; dolor corporal, sed excesiva; estreñimiento; empeora con el movimiento.	Bry. 30 o 200	C/. 3 h.
◻ Fiebre alta; inquietud con agotamiento, sed insaciable, se bebe agua con frecuencia.	Ars. 30	C/. 3 h.
	Remedio bioquímico	Bio-comb. No.11
		C/. 4 h.

DENTADURA, dolor de la

◻ Mejora al sudar; el dolor se extiende al oído, al temporal y a la mandíbula.	Aphis. Ø o 30	C/. 4 h.
✗ Mejora cuando se tiene agua fría o hielo en la boca; empeora, en cambio con el calor y los fluidos calientes.	Coff. 30 o 200	C/. 2 h.
◻ Con pérdida de sed; mejora teniendo agua fría en la boca; empeora con el calor.	Puls. 30 o 200	C/. 2 h.
◻ Empeora metiendo la mano en agua fría; dolor de muelas de las lavanderas.	Phos. 30 o 200	C/. 10 m. (3)

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
☆ Por caries de la dentadura; aparición muy rápida de caries; caries de los dientes de leche.	Kreos. 30 o 200	C/. 4 h.
☆ Dolor que se extiende a los oídos; sensibilidad al tacto; se sienten los dientes muy largos.	Plan-m. 30	C/. 3 h.
□ Dolor fuerte en la raíz de las piezas estropeadas; empeora con la presión, al masticar; dolor que se extiende a los ojos; hipersensibilidad al tacto y al frío.	Staph. 30 o 200	C/. 4 h.
☆ Por inflamación de las piezas estropeadas; empeora durante la noche y con aplicaciones frías o calientes.	Merc. 30 o 200	C/. 4 h.
□ Dolor fuerte; mejora con el frío y al aire libre, succionando en los dientes.	All-c. 30	C/. 3 h.
□ Empeora al comer; beber agua fría, por la noche; caries.	Ant-c. 30 o 200	C/. 4 h.
□ Empeora tomando algo dulce.	Nat-c. 30 o 200	C/. 4 h.
□ Empeora después de la pérdida de fluidos vitales; al amamantar a un niño.	China off. 30 o 200	C/. 4 h.
□ Insoportable; irradia a los oídos y a la cara; empeora con el calor y tomando café.	Cham. 200	C/. 10 m. (3)
□ Dolor producido por piorrea.	Carbo-veg. 30	C/. 4 h.
□ Para controlar la hemorragia producida por una extracción; caída de dientes y también para reducir el dolor producido por un empaste, etc.	Arn. 200	C/. ½ h. (3)
☆ Dolor pulsante, con boca seca; flemones.	Bell. 30	C/. 4 h.
☆ Dentadura y encías muy sensibles al tacto; sangran con facilidad.	Hep. 30 o 200	C/. 4 h.
□ El dolor se alivia con calor y con fluidos calientes; durante la dentición de los niños.	Mg-p. 30	C/. 4 h.
Remedio bioquímico	Kali-p. 6X	C/. 4 h.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
----------	----------	--------------------------

DENTICIÓN

En la época de la dentición, se produce en el niño una irritación general, pérdida de apetito, diarrea, fiebre, insomnio y pérdida de peso.

En Homeopatía hay algunos remedios muy útiles para las molestias de la dentición.

- | | | |
|--|----------------|--------------|
| ★ Fiebre con inquietud e insomnio; el niño llora porque le duelen los dientes. | Acon. 6 o 30 | C/. 4 h. |
| ★ Se producen onvulsiones durante la dentición; seguidas de sueño; enrojecimiento de la cara con fiebre alta. | Bell. 30 | C/. 3 h. |
| ★ En los niños obesos, dentición lenta; suda mucho la cabeza; paciente friolero. | Cal-c. 200 | Sem. (3) |
| ★ Diarrea. Heces líquidas, verdosas y viscosas; irritabilidad general, el niño quiere estar en brazos continuamente; empeora por la noche. | Cham. 30 o 200 | C/. 4 h. (6) |
| ★ Diarrea; heces abundantes; el niño se toca las encías o se pone algo duro en la boca para morder. | Podo. 30 | C/. 4 h. |

Remedios bioquímicos

Cal-p. 6X o
Biocom. No. 21 C/. 4 h.

Parálisis durante el período de dentición

Kali-p. 6X y
Mg-p. 6X C/. 3 h.

DERMATITIS DE CONTACTO

La dermatitis de contacto se debe a una alergia a un agente de aplicación loCale.

Un remedio útil para la etapa aguda es *Apis. 30* y, para los casos crónicos, *Graph.*, *Nat-m.*, *Sulphur* y *Thuja-oc.*, etc.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
----------	----------	--------------------------

DESEO SEXUAL, en el varón

<input type="checkbox"/> Disminución o pérdida total del deseo	Lyc. 200 o 1M	Sem. (3)
<input type="checkbox"/> Disminución del deseo o indulgencia excesiva en el sexo.	Staph. 200 o 1M	Sem. (3)
<input type="checkbox"/> Deseo excesivo; perturba el sueño.	Canth. 200 o 1M	Sem. (3)
<input type="checkbox"/> Deseo excesivo; se excita con facilidad.	Zinc-met. 200 o 1M	Sem. (3)
<input type="checkbox"/> Deseo excesivo; sin erección.	Calad. 200 o 1M	Sem. (3)
<input type="checkbox"/> Deseo excesivo; miedo al agua.	Lys. 200 o 1M	Sem. (3)
<input type="checkbox"/> Deseo excesivo; no puede controlarse; temblores.	Plat. 200 o 1M	Sem. (3)
<input type="checkbox"/> Deseo sexual con erecciones violentas.	Fl-ac. 200 o 1M	Sem. (3)
<input type="checkbox"/> Deseo sexual excesivo por la mañana.	Ant-c. 200 o 1M	Sem. (3)
<input type="checkbox"/> Deseo sexual excesivo en niños o en ancianos.	Bar-c. 200 o 1M	Sem. (3)
<input type="checkbox"/> Deseo sexual excesivo en pacientes de corea.	Verat-v. 200 o 1M	Sem. (3)
<input type="checkbox"/> Deseo sexual, incluso después de excesos en el coito.	Acid-phos. 200 o 1M	Sem. (3)
<input type="checkbox"/> Se desea un delirio más duradero; miedo a la oscuridad.	Stram. 200 o 1M	Sem. (3)
<input type="checkbox"/> Aumento del deseo sexual a la vista de imágenes eróticas.	Tarent. 200 o 1M	Sem. (3)

DESEO SEXUAL, en la mujer

(Ver también *Masturbación* y *Ninfomanía*)

★ Ninfomanía; deseo sexual insopportable, especialmente en jóvenes solteras. Ganas de abrazar a todo el mundo.	Plat. 200 o 1M	C/. 10 m. (3)
★ Cuando Plat. no alivia los síntomas mencionados; enseña los genitales, deseo sexual insopportable; muy influenciable.	Phos. 200 o 1M	C/. 10 m. (3)

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
<input type="checkbox"/> La paciente enseña los genitales; es indecente, obscena y dice disparates.	Hyos. 200	C/. 10 m. (3)
<input type="checkbox"/> El mínimo roce en los órganos genitales produce un deseo sexual excesivo.	Murx. 30 o 200	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Picor en los genitales; inquietud, excitación sexual; deseo excesivo de besar y abrazar.	Agar. 30 o 200	C/. 4 h.
<input checked="" type="checkbox"/> Gusanos en la vagina que producen picor; deseo sexual excesivo, por rascarse los genitales.	Calad. s. 30 o 200	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Deseo sexual excesivo durante los periodos menstruales.	Stram. 200 o 1M	C/. 10 m. (3)
<input type="checkbox"/> Leucorrea con deseo sexual creciente.	Sep. 200	C/. 10 m. (3)
<input type="checkbox"/> Mujer tímida, llorona, falta de sed y friolera, le gusta que la consuelen, el aire libre y que la abracen.	Puls. 200	C/. 10 m. (3)
<input type="checkbox"/> Aversión al coito, por sequedad de la vagina.	Nat-m. 200	C/. 4 h. (3)

DESEOS

De comer cosas, etc.

<input type="checkbox"/> De morder ropa limpia; alimentos crudos.	Alum. 200 o superior	C/. 6 h. (3)
<input type="checkbox"/> Deseos de grasa; cal, pizarra, lapiceros, tiza, arcilla, etc.	Nit-ac. 30 o 200	C/. 6 h. (3)
<input type="checkbox"/> De sal (comidas muy saladas).	Nat-m. 200 o 1M	C/. 6 h. (3)
<input type="checkbox"/> De huevos.	Cal-c. 200 o 1M	C/. 6 h. (3)
<input type="checkbox"/> De dulces.	Arg. Nit. 30 o 200	C/. 6 h. (3)
<input type="checkbox"/> De salmueras y comidas agrias.	Sep. 200 o 1M	C/. 6 h. (3)
<input type="checkbox"/> De limonada.	Puls. 30 o 200	C/. 6 h. (3)
<input type="checkbox"/> De plátanos.	Ther. 30 o 200	C/. 6 h. (3)

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
<input type="checkbox"/> De bebidas muy frías.	Phos. 200	C/. 6 h. (3)
<input type="checkbox"/> De leche.	Rhus tox 200	Sem. (3)

DESFALLECIMIENTO

(Ver también *Colapso* y *Pérdida de conocimiento*)

<input type="checkbox"/> Debido a un dolor fuerte; ira después de una disputa; paciente hipersensible.	Cham. 200	C/. ½ h. (3)
<input type="checkbox"/> Colapso; con frío extremo, cianosis y debilidad; trauma post-operatorio.	Verat. 30 o 200	C/. ½ h. (3)
<input type="checkbox"/> Por emociones enojosas; trauma o disgusto.	Ign. 200 o 1M	C/. ½ h. (3)
<input type="checkbox"/> Por miedo y excitación; tensión nerviosa.	Phos. 200	C/. ½ h. (3)
<input type="checkbox"/> Después de ser molestado y tocado; sorpresa por pérdidas financieras; por lesión.	Arn. 200 o 1M	C/. ½ h. (3)
<input type="checkbox"/> Por ambiente tenso; supresión de descargas; envidia.	Lach. 200	C/. ½ h. (3)
<input type="checkbox"/> Por ver alfileres y agujas; efectos negativos de la vacuna.	Sil. 200 o 1M	C/. ½ h. (3)
<input type="checkbox"/> Por pérdida de sueño; cuando se va en un vehículo o en un barco.	Cocc. 200	C/. ½ h. (3)
<input type="checkbox"/> Por malas noticias, excitación emocional, miedo aprensión, etc.	Gels. 200	C/. ½ h. (3)
<input type="checkbox"/> Por aprensión, miedo a acontecimientos futuros.	Arg. Nit. 200	C/. ½ h. (3)
<input type="checkbox"/> Después de los efectos del miedo (como después de accidentes, etc.).	Op. 200 o 1M	C/. ½ h. (3)
<input type="checkbox"/> Indignación; honor herido; brutalidad de los demás.	Staph. 200 o 1M	C/. ½ h. (3)
<input type="checkbox"/> Por alegría excesiva.	Coff. 200 o 1M	C/. ½ h. (3)

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
★ Mortificación con ira (algunas veces, el paciente entra en coma después de desaparecer la ira).	Coloc. 200 o 1M	C/. ½ h. (3)
● Remedio intercurrente.	Sulphur 200	C/. 10 m. (3)
□ Por miedo; exposición repentina a una corriente fría y seca.	Acon. 200	C/. 10 m. (3)
□ Por descargas agotadoras (vómito, diarrea, pérdida de sangre o semen, etc.).	China off. 30 o 200	C/. ½ h.
□ En ataques epilépticos; la sensación empieza en las rodillas y sube al hipogastrio.	Cupr-met. 30 o 200	C/. 10 m. (3)
□ Por insolación; calor en la cabeza; por trabajar bajo luz de gas, etc.	Glon. 3X o 6	C/. ½ h. (3)
□ Después de una diarrea; tomando jugos de fruta, etc.	Ars. 200	C/. ½ h. (3)
Remedios bioquímicos		
	Kali-p. 6X y	C/. ½ h.
	Mg-p. 6X	

Descubra la causa verdadera y trátela debidamente.

En casos pertinaces, hay que hospitalizar.

DIABETES

(Ver también Azúcar en la orina)

★ Remedio muy eficaz para azúcar en la sangre.	Syzyg. Ø,	8-10 gt. C/. 4 h.
□ Diabetes con enflaquecimiento.	Uran-n. 3X	C/. 4 h.
□ Cuando la diabetes se debe a debilidad nerviosa; condición apática; debilidad general; especialmente en los hombres.	Acid-phos. Ø o 6	C/. 4 h.
□ Dolencias con excesiva sed; enfermedad que consume; melancolía; estreñimiento; en personas tristes.	Nat-m. 12X o 30	C/. 4 h.
● Remedio intercurrente.	Med. 200 o 1M	<i>Quinc. (3)</i>

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
★ Debilidad general; sed de grandes cantidades de agua; micción abundante y frecuente; forúnculos recurrentes con mucho picor. Picor diabético.	Ceph-d-i. Ø,	5-10 gt. C/. 4 h.
★ Sequedad de boca, aumento de sed; micción frecuente durante la noche; abundancia de orina; debilidad después de orinar; debilidad general; prurito de vulva sin erupciones.	Gymne-syl. Ø,	5-10 gt. C/. 4 h.
□ Sequedad de boca, sin sed. Sed de gran cantidad de agua fría por la noche; micción involuntaria. Debilidad en las piernas; mejora con el descanso y la presión.	Sulphonam. 30	C/. 4 h.

Remedio bioquímico

Nat-s. 12X o 30 C/. 4 h.
Bio-comb. No.7 C/. 4 h.

DIARREA

(Ver también *Gastroenteritis*)

El tratamiento constitucional es muy útil en casos crónicos.

□ Diarrea con espasmos intestinales; heces de olor nauseabundo; sensación de hambre con vacío en el estómago. Sed de grandes cantidades de bebidas frías, aversión a los dulces.	Chloram 30	C/. 4 h.
★ Diarrea repentina con ansiedad e inquietud; dolor de abdomen, debido a una exposición repentina a corrientes de aire seco y frío.	Acon. 30 o 200	C/. ½ h.
□ Diarrea producida por ir en vehículos automóviles; empeora con la falta de sueño.	Cocc. 30	C/. 4 h.
★ Las heces salen como un disparo, o el agua de una manigua; mejora bebiendo agua caliente.	Crot-t. 30 o 200	C/. 3 h.
□ Frío en el recto antes de defecar; empeora de 4 a 8 de la tarde.	Lyc. 30 o 200	C/. 4 h.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
❑ Escalofrío mientras se defeca; olor agrio.	Rheum. 30	C/. 4 h.
❑ Diarrea durante el día y tos por la noche; después de la represión de enfermedades de la piel.	Petr. 30	C/. 4 h.
❑ Diarrea persistente durante mucho tiempo, sin debilitar.	Acid-phos. 6 o 30	C/. 4 h.
❑ Diarrea debida a cáncer (especialmente de recto).	Card-m. Ø, o 30	C/. 4 h.
❑ Diarrea, después de tomar leche hervida.	Sep. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
❑ Diarrea después de tomar pescado.	Chinin-ar. 30	C/. 4 h.
☆ Despues de comer melón o beber agua sucia (de estanques, etc.).	Zing. 30	C/. 4 h.
☆ Por comer alimentos cargados de especias; deseo de defecar sin efecto; no puede tolerar la leche.	Nux-v. 30	C/. 4 h.
❑ Despues de tomar alimentos grasos; pasteles, diversos alimentos no vegetales, etc.; las heces cambian constantemente de consistencia y color; empeora por la noche; perdida de sed con la boca seca.	Puls. 30	C/. 4 h.
☆ Heces líquidas; sin dolor, excesiva debilidad; aumento de sed; sudor en todo el cuerpo; deseos de estar siempre al aire fresco; abdomen hinchado.	China off. 30	C/. 4 h.
☆ Diarrea durante el período de dentición; irritabilidad marcada; empeora con la ira.	Cham. 30 o 200	C/. 4 h. (6)
☆ Imposibilidad de controlar las heces; incluso el intento de expulsar gases va acompañado de heces; aparecen heces en la cama.	Aloe. 30	C/. 4 h.
❑ Diarrea con cólico fuerte; mejora con la presión, se dobla; empeora después de tener ira.	Coloc. 30	C/. 4 h.
☆ Con mucha inquietud; sed excesiva, bebiendo poca agua con mucha frecuencia; alimento tóxico; empeora con alimentos fríos o conservas.	Ars. 30	C/. 3 h.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
□ En personas obesas y flojas; diarrea crónica con apetito devorador, deseos de comer objetos no digeribles, como tiza, carbón, lapiceros, etc.	Cal-c. 200	C/. 4 h. (6)
□ Heces verdosas; los niños de pecho no digieren la leche.	Mg-c. 30	C/. 4 h.
● Diarrea matutina, que saca al paciente de la cama por la mañana con urgencia.	Sulphur 30 o 200	C/. 4 h.
☆ Diarrea producida por excitación o ansiedad debidas a acontecimientos, aprensiones, etc.	Gels. 30	C/. 4 h.
□ Diarrea fuerte; dolor de abdomen y extremidades inferiores; frío en el cuerpo; heces claras y blanquecinas.	Verat. 30	C/. 4 h.
● Diarrea; empeora durante la noche.	Syph. 200	Sem. (3)
Remedio bioquímico		Bio-comb. No.8
		C/. 3 h.

DIENTES

(Ver también *Dentadura y Piorrea*)

□ Se sienten los dientes largos.	Cham. 30 o 200	C/. 4 h.
□ Dentición lenta.	Cal-p. 6X o 30	C/. 4 h.
□ Sensación de frío en los dientes.	Ant-t. 30 o 200	C/. 4 h.
□ Flojos, al masticar.	Nit-ac. 30 o 200	C/. 4 h.
□ Deseo irresistible de apretar los dientes.	Phyt. 30 o 200	C/. 4 h.
□ Rechinar los dientes.	Plb. 30 o 200	C/. 4 h.
□ Erupciones negras en los dientes.	Staph. 30 o 200	C/. 4 h.
□ Sarro de los dientes.	Calc-ren. 30	C/. 4 h.
□ Dolor al utilizar las muelas del juicio.	Cheir. 30	C/. 4 h.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
DISENTERÍA		
(Ver también <i>Colitis</i> y <i>Amebiasis</i>)		
❑ Disentería amébica; sed de pequeñas cantidades de agua en intervalos cortos.	Ars. 30	C/. 4 h.
☆ Disentería amébica; con náuseas y lengua limpia.	Ip. 0/5 o superior (50 mil.)	C/. 4 h.
● Disentería amébica (remedio intercurrente).	Thuy. 200 o 1M	<i>Quinc.</i> (6)
❑ Dolor que baja por muslos y piernas, al defecar.	Rhus tox. 6 o 30	C/. 4 h.
☆ Disentería bacilar; sangre en las heces con pujos y sensación de no haber terminado.	Merc-c. 6 o 30	C/. 4 h.
● Disentería bacilar (remedio intercurrente).	Strep. 200 o 1M	<i>Quinc.</i> (6)
❑ Indigestión con eructos agrios; anorexia, salivación abundante, sabor de boca amargo; lengua con una capa marrón; flatulencia con distensión de abdomen; heces sueltas con mucosidad; necesidad de defecar después de comer; empeora por la noche.	Term-c. 30	C/. 4 h.
☆ Heces con mucosidad; empeora por la noche.	Merc. 30	C/. 4 h.
❑ Disentería crónica, con descarga de pus y sangre.	Staphyl. 200 o 1M	<i>Quinc.</i> (3)
❑ Disentería de campesinos e inmigrantes.	Septi. 30 o 200	C/. 3 h. (6)
☆ Con grandes cantidades de mucosidad; salida de líquido con ruido, dolor en el recto después de defecar, expulsión inadvertida de las heces.	Aloe. 30	C/. 4 h.
❑ Cada vez que se bebe agua fría se siente frío y necesidad urgente de defecar.	Caps. 30 o 0/5 o superior	C/. 4 h.
● Disentería crónica, cuando fallan los remedios indicados; empeora por la mañana.	Sulphur 200	C/. 4 h. (3)

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
★ Dolores violentos, como si te clavasen cuchillos; expulsión de sangre casi pura, en vez de heces normales. Sensación de que se queda el ano abierto.	Phos. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
□ Heces sueltas; líquidas, amarillentas, mezcladas con mucosidad y sangre.	Aegle-f. Ø o 6	C/. 4 h.
Remedio bioquímico	Bio-comb. No.9	C/. 3 h.

DISMENORREA

(Ver *Menstruación*)

DISPEPSIA

(Ver también *Flatulencia*)

Digestión difícil y laboriosa, con dolencias gástricas de carácter crónico.

★ Las náuseas aumentan durante la mañana; vómitos verdosos y amarillentos, con gran debilidad; hambre canina; apetencia de dulces; flatulencia con pesadez de abdomen que empeora después de comer; sabor amargo; indigestión producida por alimentos fritos; hiperacidez con eructos agrios.	Atis. 30	C/. 4 h.
★ Dolor en la región epigástrica, con flatulencia; lengua amarillenta marrón, con señales de los dientes en los bordes.	Penic. 30	C/. 4 h.
□ Con calambres y distensión de abdomen inmediatamente después de comer.	Grat. 30	C/. 4 h.
□ Cuando la dispepsia está producida por comer azúcar y grasas.	Faec. 30	C/. 4 h.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
★ Con dolor gástrico y embotamiento; eructos agrios y náuseas, pérdida de apetito, lengua gorda, floja y sucia.	Hydr. 6 o 30	C/. 4 h.
□ Dispepsia, después de tomar calomelanos.	Podo. 30	C/. 4 h.
□ Dispepsia de alcohólicos.	Nat-s. 12X o 30	C/. 4 h.
Remedio bioquímico Debido a nerviosismo	Kali-p. 6X o 30	C/. 4 h.

DOLOR

(Ver también Artritis, Neuralgia, Neuritis, etc.)

Para el dolor, ver la enfermedad correspondiente y elegir el remedio adecuado. No estamos dando en este capítulo detalles, como hemos hecho con las diferentes enfermedades.

□ Dolor ardiente como consecuencia de la picadura de un insecto; pérdida de sed.	Apis. 30	C/. 4 h. (6)
□ Dolor ardiente; especialmente al orinar.	Canth. 30	C/. 4 h.
□ Dolor repentino con cualquier movimiento en tiempo frío y húmedo.	Actea-rac. 30	C/. 4 h.

Remedio bioquímico	Mg-p. 6X	C/. 4 h.
---------------------------	-----------------	----------

DOLOR DE CABEZA

(Ver también Migraña, Sinusitis, etc.)

★ Con náuseas constantes; lengua limpia.	Ip. 30	C/. 3 h.
★ Con palpitaciones fuertes y aflujo de sangre a la cabeza.	Bell. 30	C/. 3 h.
□ Por comer demasiado; trastornos de estómago; lengua con una capa blanca densa; empeora al bañarse, especialmente con baños de río.	Ant-c. 30 o 200	C/. 4 h. (3)

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
□ Por exponerse al viento seco y frío; repentino, por inquietud.	Acon. 30 o 200	C/. ½ h. (3)
□ Con exudación de los ojos, dolor e hipersensibilidad a la luz fuerte.	Euphr. 30	C/. 3 h.
□ Dolor de cabeza; mejora al echar la cabeza hacia atrás; por lesión nerviosa.	Hyper. 30	C/. 3 h.
□ Dolor de cabeza con martilleo en los oídos; por debilidad nerviosa.	Kali-p. 6X o 30	C/. 3 h.
□ Dolor de cabeza martilleante; empeora durante el ciclo menstrual al ponerse al sol; propio de niñas.	Nat-m. 30 o 200	C/. 4 h.
☆ El dolor empieza por la nuca y sube a la cabeza; el paciente quiere quedarse quieto tranquilamente; mejora al orinar.	Gels. 30 o 200	C/. 3 h.
□ Dolor de cabeza violento, por trabajar con luz de gas; insolación.	Glon. 6 o 30	C/. 2 h.
☆ Como si estallase la cabeza; empeora al detenerse empezar a moverse; mucha sed, estreñimiento.	Bry. 30 o 200	C/. 3 h. (6)
☆ Dolor de cabeza nervioso; después de un disgusto, una frustración; empeora al inhalar humo.	Ign. 200 o 1M	C/. 3 h. (3)
☆ Dolor de cabeza, debido a sinusitis; presión y dolor en la base de la nariz.	Kali-bi. 30	C/. 4 h.
□ Por comer alimentos ricos en grasas, pérdida de sed, mejora al aire libre frío.	Puls. 30	C/. 4 h.
□ Por cansancio ocular; problemas de adaptación de la vista.	Ruta-gt. 30	C/. 4 h.
☆ Despues de tomar bebidas alcohólicas; hábitos sedentarios; paciente friolero.	Nux-v. 30	C/. 4 h.
□ Dolor de cabeza producido por el sol; se agrava desde la salida hasta la puesta del sol; de origen cardiaco.	Kalm. 30 o 200	C/. 6 h.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
□ De niños de escuela; dolor de cabeza aplastante, presión en lo alto de la cabeza.	Acid-phos. 30	C/. 4 h.
□ Dolor de cabeza localizado en la nuca; empeora al caminar y con el ruido.	Pneu. 200	C/. 10 m. (3)
□ Dolor de la frente; dolor neurálgico encima y detrás del ojo derecho; pesadez de cabeza. Mejora con el descanso, echándose y comiendo.	Penic. 30 o 200	C/. 10 m. (3)
● Dolor de cabeza que empeora por la mañana temprano; sensación de vacío de 10 a 11 de la mañana.	Sulphur 200 o 1M	Sem. (3)
Remedio bioquímico	Biocom. No.12	C/. 4 h.

Otros *remedios importantes*: Spig., Sang, Lach., Lyc., Mag-p., Dam., etc.

DOLOR DE ESPALDA

Lumbago

(Ver también Artritis, Ciática, etc.)

□ Dolor repentino de espalda debido a exposición al viento seco y frío.	Acon. 200	C/. 3 h.
✗ Debido a exposición al frío; exceso de ejercicio, torceduras, etc.; empeora al empezar a moverse y mejora con el movimiento continuado.	Rhus tox. 200 o 1M	C/. 3 h.
✗ Con rigidez; empeora con el movimiento y el frío; mejora quedándose quieto.	Bry. 200 o 1M	C/. 6 h.
□ Dolor de espalda debido a lesión o esfuerzo; dolor de magulladura.	Arn. 200 o 1M	C/. 3 h.
□ Punzadas, debilidad y sudor; las dolencias empeoran de 3 a 4 de la madrugada.	Kali-c. 200	C/. 10 m. (3)

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
❑ En pacientes obesos y flojos; empeora con el baño y al exponerse al frío.	Cal-c. 200 o 1M	C/. 10 m. (3)
❑ Dolor en la parte baja de la espalda; mejora durmiendo y descansando; el paciente desea el fresco del aire libre.	Puls. 30 o 200	C/. 4 h.
❑ El dolor de espalda mejora al eructar. Paciente friolero. Aversión a los miembros de la familia.	Sep. 200 o 1M	C/. 10 m. (3)
★ En pacientes frioleros y estreñidos que llevan vida sedentaria; irritables por naturaleza; el dolor empeora con el frío, el movimiento, especialmente al dar la vuelta en la cama el paciente tiene que sentarse y echarse otra vez.	Nux-v. 30 o 200	C/. 4 h.
❑ Dolor en la parte baja de la espalda, debido a estreñimiento y hemorroides. Mejora sólo de pie.	Aesc. 30 o 200	C/. 6 h.
❑ El dolor de espalda empeora con el frío húmedo y estando inclinado durante horas.	Dulc. 200 o 1M	C/. 10 m. (3)
● Dolor fuerte en la parte baja de la espalda y cóccix. No puede ponerse bien de pie. Mejora con la humedad y el frío; empeora por la noche. Ardor en las plantas de los pies.	Sulphur 30 o 200	C/. 10 m. (3)
❑ Dolor reumático en la espalda, el cuello y la zona lumbar y sacra, que baja por los muslos; rigidez y contracción; la espina dorsal está muy sensible; dolor en el omóplato y hombro derechos.	Cimic. 30	C/. 3 h.
❑ Empeora sentado; mejora con el movimiento; hormigueo y sensación de frío en los pies y los dedos.	Chel. 30	C/. 4 h.
❑ Empeora por la noche; mejora con el movimiento y en horas diurnas; el sudor no alivia el dolor.	Merc. 30 o 200	C/. 6 h.
● Dolor en la región sacrolumbar, que se extiende por las extremidades inferiores; empeora durante el día; mejora junto al mar y echado boca abajo.	Med. 200 o 1M	Sem. (3)

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
❖ Dolor en la espalda, especialmente en la región sacro-coxígea, que pasa finalmente a la parte superior del muslo y las nalgas. El paciente cojea y al final el dolor es tan fuerte que no puede andar ni estar de pie; mejora con presión y calor.	Colocynthis 200 o 1M	C/. 10 m. (3)
❑ El dolor empeora con el descanso y durante una tormenta; mejora con calor y comiendo.	Rhod. 200 o 1M	C/. 10 m. (3)
❑ Dolor profundo en los huesos después de la fiebre de malaria, con excesiva sed y frío.	Eup-per. 30 o 200	C/. 3 h.
❑ El dolor de espalda mejora con presión fuerte. El paciente pone algo duro debajo de la espalda, como un libro o una tabla, cuando está sentado o acostado en la cama.	Nat-m. 30 o 200	C/. 4 h.
❑ Dolor de espalda debido a un exceso de actividad sexual.	Symph. 30	C/. 4 h.
❖ Dolor de espalda debido a lesiones de los nervios.		
❑ Dolor violento en las tres vértebras dorsales superiores, que se extiende por los omóplatos; el dolor desciende; dolor lumbar de origen nervioso.	Hyper. 30 o 200	C/. 4 h. (6)
	Kalm. 30 o 200	C/. 3 h.

Remedios bioquímicos

Dolor en la nuca y región cervical,
debilidad y dolor en la espalda.

El dolor de espalda empeora con el descanso; se extiende al sacro; mejora con el calor.

El dolor de espalda mejora con el calor; empeora con el frío.

Cal-p. 6X C/. 3 h.

Cal-f. 6X o 12X C/. 3 h.

Mg-p. 6X C/. 3 h.

DOLORES DE LA CAMA

Estancias prolongadas en cama

❖ En caso de fiebre tifoidea o enfermedad prolongada.

Bapt. Ø o 6 C/. 3 h.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
❖ Al principio, cuando hay sensación de contusión por estar en la cama.	Arn. 30 o 200	C/. 4 h.
❑ Cuando las heridas que se producen son dolorosas y no se soporta ni el tacto. Paciente muy sensible.	Hep. 30 o 200	C/. 10 m. (3)
❑ En casos crónicos; cuando brota continuamente un pus espeso, sanguinolento y de mal olor.	Sil. 12X o 30	C/. 4 h.
❖ Con bordes amoratados; empeora con el tacto. Fluye sangre descompuesta.	Lach. 30 o 200	C/. 4 h. (6)
❑ Cuando se engangrenan las partes afectadas.	Crot-h. 30 o 200	C/. 4 h. (6)
❑ Debido a envenenamiento de la sangre; condiciones sépticas, heridas gangrenosas (la loción de <i>Echi.</i> se puede aplicar como uso externo).	Echi. Ø o 30	C/. 4 h.
● En casos crónicos, cuando se engangrenan las heridas producidas por estar en la cama.	Sulphur 30 o 200	C/. 10 m. (3)
● Remedio intercurrente para pacientes tuberculosos.	Tub-k. 200	Sem. (3)
Remedio bioquímico		Calc-sulph. 6X
		C/. 4 h.

Para uso externo: Se puede usar la loción de Calen., para limpieza general, y el ungüento de Calen., para las curas.

DOLOR DE OÍDOS

Otalgia

❖ Repentina, debida a la exposición a una corriente de aire seco y frío.	Acon. 30 o 200	C/. 2 h.
❑ Dolor intermitente con enrojecimiento de la cara; sensación de calor; afluencia de sangre a la cabeza.	Bell. 30	C/. 2 h.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
❖ Dolor insoportable; empeora con el calor, por la noche y después de un ataque de ira.	Cham. 30 o 200	C/. 2 h.
❖ Dolor fuerte en las trompas de eustaquio; con frío agudo; empeora en interior y con calor.	All-c. 30 o 200	C/. 2 h.
❑ Debido a presión en las orejas por acumulación de cera.	Spig. 30 o 200	C/. 10 m. (3)
❑ Debido a sinusitis; flema correosa, espesa, filante.	Kali-bi. 30	C/. 4 h.
❑ Debido a granos en las orejas; perforación, descarga de pus fétido; empeora con el frío.	Hep. 200	C/. 10 m. (3)
❖ Con descarga densa amarillenta; mejora en sitios fríos y al aire libre frío.	Puls. 30 o 200	C/. 3 h.
Remedios bioquímicos		
	Kali-m. 6X y Ferr-p. 6X alternando	C/. 2 h.

Para uso externo: gotas óticas de aceite de gordolobo.

Otros remedios útiles: Coloc., Sulphur, Syph., Pyr., etc.

ECCEMA

Inflamación superficial de la piel, con vesícula, enrojecimiento, edema, costras, escamas y prurito.

❖ Agudo; erupciones con tendencia a formación de escamas.	Rhus tox. 30 o 200	C/. 3 h. (3)
❖ Muy doloroso; con grietas y descarga viscosa; estreñimiento.	Graph. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
❖ En los bordes del pelo; duro, rojo e inflamado. Empeora tomando sal y junto al mar.	Nat-m. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
❑ Debido a infección de estafilococos y estreptococos.	Sul-ac. 30	C/. 4 h. (3)
❖ Con pus amarillento; empeora con el calor; mejora con el frío y al aire libre.	Puls. 30 o 200	C/. 4 h. (3)

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
● Erupciones secas y escamosas; empeora en el cuero cabelludo y la cara y con el calor de la cama. Descarga clara, fétida, que pela la piel; aspecto sucio.	Psor. 200	C/. 10 m. (3)
□ Eccema de barba; exudación líquida con picor; empeora al lavarse.	Ars-i. 30	C/. 3 h. (3)
□ Con costras gruesas; en cabeza, oídos, cara y cuerpo; al rascarse va cambiando de sitio el picor.	Staph. 30 o 200	C/. 3 h. (3)
□ Con trastornos digestivos, hepáticos o urinarios; la piel se pone gruesa y dura.	Lyc. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
□ Erupciones de los dedos de manos y pies, como viruela; con caída de las uñas.	Borx. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
□ En los bordes del pelo; erupciones parecidas a la viruela.	Hydr. 30	C/. 4 h. (3)
□ Sin picor. La exudación forma una costra dura de color limón.	Cic. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
● Crónico; con irritación; empeora por la noche con el calor de la cama.	Sulphur 30 o 200	C/. 4 h. (3)
□ Con enrojecimiento; irritabilidad y angustia. Sed insaciable.	Ars. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
□ Muy doloroso; en los codos y las rodillas; respiración plena.	Merc. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
□ Despues de Merc. ; pustular; paciente sensible; mejora con el calor; empeora con el frío.	Hep. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
□ Eccema en las palmas; ampollas; ardor y picor fuerte.	Ran-b. 30	C/. 4 h. (3)
★ Repetir el remedio con mucho cuidado en enfermedades de la piel para evitar un agravamiento o utilizar varias veces potencias cincuentamilesimales.		

Remedios bioquímicos

Kali-m. 12X, C/. 4 h.
Kali-s. 6X,
Nat-m. 12X y Nat-p. 6X.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
----------	----------	--------------------------

EDEMA

Hinchazón hidrópica

(Ver Ascites, Laringitis, Pleuresía y Enfermedades del Riñón y del Corazón)

Es una retención de fluido (agua y sales de sodio) en tejidos subcutáneos. Puede deberse a varias razones y enfermedades. Para su tratamiento, véanse las diversas enfermedades.

Remedios importantes: Apis., Ars., China off., Conv., Hell., Liat.. y Merc., etc. Restringir la sal. La leche descremada puede usarse libremente. Son esenciales el descanso y el calor. La dieta debe ser ligera y fácil de digerir. La vegetariana es buena.

EMBARAZO

Dolencias

- | | | |
|---|----------------|---------------|
| <input type="checkbox"/> Afecciones de oídos durante el embarazo. | Caps. 30 | C/. 4 h. (3) |
| <input type="checkbox"/> Temblores al principio del embarazo; nerviosismo. | Cimic. 30 | C/. 4 h. (3) |
| <input type="checkbox"/> Sufrimiento debido a presión mecánica; dolor como de magulladuras. | Arn. 30 o 200 | C/. 4 h. (3) |
| <input type="checkbox"/> Aflujo de sangre a la cabeza; pérdida de conciencia. | Glon. 30 | C/. 4 h. (3) |
| <input type="checkbox"/> Hemorroides y estreñimiento durante el embarazo. | Coll. 30 o 200 | C/. 4 h. (3) |
| <input type="checkbox"/> Calambres en los dedos y las plantas de los pies, con frío. | Cal-c. 200 | C/. 10 m. (3) |
| <input type="checkbox"/> Calambres en el abdomen y las piernas durante el embarazo. | Vib. 30 | C/. 4 h. |
| <input type="checkbox"/> Durante el embarazo, al ver el agua se vomita. | Phos. 30 o 200 | C/. 10 m. (3) |
| <input type="checkbox"/> Durante el embarazo, hinchazón y entumecimiento de las manos y los pies. | Sang. 30 o 200 | C/. 4 h. (3) |

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
<input type="checkbox"/> Sensación de que se abre la boca del útero.	Lach. 200	1 dosis (SOS)
<input type="checkbox"/> Dolor de muelas durante el embarazo.	Sep. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
<input type="checkbox"/> La paciente pierde la vista durante el parto.	Cupr-met. 200 o 1M	C./10 m. (3)
<input type="checkbox"/> Sofocos y convulsiones durante el parto.	Hyos. 200	C/. ½ h. (3)
<input type="checkbox"/> Imposibilidad de andar durante el embarazo.	Bell-p. 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Para vómitos pertinaces en el embarazo.	Cupr-ar. 30	C/. 4 h. (3)

EMISIÓN SEMINAL

Eyaculación

(Ver también *Espermatorrea*)

<input type="checkbox"/> Eyaculación sanguinolenta y nocturna.	Merc. 200	C/. 4 h. (3)
<input type="checkbox"/> Eyaculación fría durante el coito.	Nat-m. 200 o 1M	Sem. (3)
<input type="checkbox"/> Eyaculación difícil, muy rápida.	Zinc-met. 200 o 1M	Sem. (3)
<input type="checkbox"/> Falla la eyaculación durante el coito.	Graph. 200 o 1M	Sem. (3)
<input type="checkbox"/> Eyaculación; espumosa.	Mur-ac. 200 o 1M	Sem. (3)
<input type="checkbox"/> Erección previa, dolorosa.	Sulphur 200 o 1M	Sem. (3)
<input type="checkbox"/> Eyaculación muy tardía, precoz.	Cal-c. 200 o 1M	Sem. (3)
<input type="checkbox"/> Eyaculación de color limón.	Hura. 30 o 200	Sem. (3)
<input type="checkbox"/> Eyaculación lechosa con olor muy fuerte.	Lach. 200 o 1M	Sem. (3)
<input type="checkbox"/> Eyaculación de olor anormal o inodora.	Sel. 30 o 200	Sem. (3)
<input type="checkbox"/> Eyaculación como orina vieja.	Nat-p. 200	Sem. (3)
<input type="checkbox"/> Eyaculación de color marrón rojizo.	Fl-ac. 200 o 1M	Sem. (3)

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
<input type="checkbox"/> Eyaculación pegajosa.	Staph. 200 o 1M	Sem. (3)
<input type="checkbox"/> Eyaculación repentina.	Phos. 200 o 1M	Sem. (3)

ENCEFALITIS

Inflamación del cerebro

La inflamación del cerebro se produce por varias razones: trauma, diversos tipos de infecciones, infecciones víricas, reacciones alérgicas, etc. El remedio constitucional o indicado, dependiendo de los síntomas, es útil.

En casos graves, es preferible la hospitalización.

Acon., Cupr-met., Eup-per., Bell., Nux-v., Hyos., Op., Stram., Verat-v., Zinc-met., Hell., etc., son los principales remedios homeopáticos para esta enfermedad.

Se necesita descanso completo en una habitación oscura, ventilada y tranquila y una dieta ligera, fácil de digerir y nutritiva.

ENCÍAS

<input type="checkbox"/> Encías esponjosas, sangran con facilidad; caries de los dientes.	Kreos. 30	C/. 4 h.
<input checked="" type="checkbox"/> Ulceras y sangrado de las encías; mal aliento, enfermedad de las encías, sensibilidad al calor y al frío.	Merc. 30	C/. 4 h.
<input checked="" type="checkbox"/> Absceso de las encías; debido a enfermedades dentales u otras causas.	Hekla. 3X o 6X	C/. 4 h.
<input checked="" type="checkbox"/> Inflamación y dolor como palpitaciones en las encías, con sensación de calor.	Bell. 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Sangran las encías; empeora por la mañana y con la presión; encías de color púrpura.	Lach. 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Picor en las encías; las molestias son mayores después de una tormenta.	Rhod. 30	C/. 4 h.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
<input type="checkbox"/> Ulceración y sangrado de las encías; la sangre no coagula con facilidad.	Phos. 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Las encías se retraen y sangran con facilidad; piorrea.	Carbo-veg. 3X o 6	C/. 4 h.
Remedios bioquímicos Hinchazón y sangrado de las encías.	Ferr-p. 6X y Kali-m. 6X (alternando)	C/. 4 h.

Para uso externo: Poner en las encías Glyc. 70% + Arn. Ø, Calen. Ø y Echi. Ø 30%.

ENCÍAS, SANGRADO

(Ver *Hemorragia de encías*)

ENFERMEDADES DE LOS NIÑOS.

(Ver distintas enfermedades)

- Niño mongólico. Retrasado mental y físicamente; irritable; falta de concentración. **A.D.N. 1M o 1002** Quinc.(6)
Los remedios constitucionales son útiles para todo tipo de complicaciones de niños.

ENFERMEDADES DEBIDAS A UNA CAUSA

(Ver diferentes enfermedades, *Enfermedades profesionales*, etc.)

- Enfermedades producidas por llevar mucho peso los trabajadores, etc. **Ruta gr. 30 o 200** C/. 6 h.
 Efecto de bebidas frías; (cuando se tiene mucho calor; por tomar agua o bebidas frías). **Bell-p. 30** C/. 4 h.
 Por ayunar.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
----------	----------	--------------------------

ENFERMEDADES PROFESIONALES

Aquí se dan los remedios importantes que tienen afinidad especial en las enfermedades debidas a trastornos profesionales o factores de causa.

- | | | |
|--|---|--------------|
| <input type="checkbox"/> Dolor de garganta de actores; subastadores, clérigos, oradores. | Arum-t. 30 | C/. 4 h. |
| <input type="checkbox"/> Tos de personas estudiadas o escritores (ratones de biblioteca); trastornos gástricos debidos a preocupaciones o vida sedentaria. | Nux-v. 30 | C/. 6 h. |
| <input type="checkbox"/> Dolor de cabeza de personas estudiadas o jóvenes estudiantes. | Cal-p. 6X o 30 | C/. 6 h. |
| <input type="checkbox"/> Fatiga mental y dolor de cabeza de maestros y hombres de negocios. | Pic-ac. 30 | C/. 6 h. |
| <input type="checkbox"/> Debilidad debida a agotamiento físico y mental. | Coca. Ø o | C/. 4 h. |
| <input type="checkbox"/> Ronquera de los clérigos; dolor de muelas de las lavanderas. | Kali-p. 6X, 5-10 gt. C/. 4 h. (3) y Phos. 30 o 200 | |
| <input type="checkbox"/> Estreñimiento de los emigrantes; de los compositores. | Plat. 200 o 1M | C/. 4 h. (3) |
| <input type="checkbox"/> Enfermedades del nervio óptico y de la retina de los fundidores. | Merc. 30 | C/. 4 h. |
| <input type="checkbox"/> Asma de los mineros, por inhalación de polvo de carbón. | Nat-ars. 30 | C/. 4 h. |
| <input type="checkbox"/> Agotamiento de las nodrizas, por dar mucho tiempo de mamar y por pérdida de sueño. | Cocc. 30 | C/. 6 h. |
| <input type="checkbox"/> Asma de marinero, que mejora en el mar. | Brom. 30 | C/. 4 h. |
| <input type="checkbox"/> Muchachas de servicio que se ponen anémicas cuando llegan a la ciudad. | Puls. 30 | C/. 6 h. |
| <input type="checkbox"/> Nerviosismo de cantantes y de locutores. | Gels. 30 | C/. 4 h. |

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
❑ Enfermedades de pulmones de los albañiles; tos, asma, bronquitis, etc. (usar con cuidado).	Sil. 6X o 30	C/. 6 h.
❑ Inexperiencia de las vendedoras	Squill. 30	C/. 6 h.
❑ Remedio de las lavanderas.	Sep. 200	C/. 6 h.
❑ Remedio de los sastres.	Ruta-gt. 30	C/. 6 h.
❑ Remedio de tintoreros y pintores.	Plb. 30	C/. 6 h.
❑ Remedio de los tejedores.	Goss. 30	C/. 6 h.

ENFLAQUECIMIENTO

(Ver también *Marasmo y Debilidad*)

Pérdida extrema de peso debida a desarreglos constitucionales crónicos, etc.

❑ Aprende tarde a andar y hablar; adelgazamiento, especialmente en el cuello.	Nat-m. 30 o 200	Quinc. (3)
❑ Enflaquecimiento de las extremidades inferiores, que se va extendiendo hacia arriba.	Abrot. 30 o 200	Quinc. (3)
❑ Pérdida de peso, aunque se coma bien.	Iod. 30 o 200	Quinc. (3)

Remedios bioquímicos

Cal-p. 6X y Nat-m. 6X

El tratamiento constitucional es muy útil. Hay que prestar la atención adecuada también a la dieta.

ENURESIS

❑ Mojar la cama inmediatamente después de dormirse; paciente friolero.	Sep. 200	C/. 10 m. (3)
★ Inconscientemente, durante la primera parte de la noche.	Caust. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
❑ En pacientes nerviosos, cuando falla Caust.	Gels. 30	C/. 4 h.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
<input type="checkbox"/> En niños obesos y flojos; sudan con facilidad, propensión a resfriados.	Cal-c. 200 o 1M	<i>Sem. (3)</i>
<input checked="" type="checkbox"/> Se moja la cama; empeora después de sarampión; paciente caluroso; disposición mutable; pérdida de sed y ganas de estar al aire libre.	Puls. 30 o 200	<i>C/. 4 h. (6)</i>
<input checked="" type="checkbox"/> Orina de baja densidad y olor fuerte, como de caballo; se orina en la cama varias veces durante el sueño.	Benz-ac. 3 o 6	<i>C/. 4 h.</i>
<input checked="" type="checkbox"/> Se orina en la cama durante el sueño profundo, soñando que lo hace en el lugar adecuado; caries en los dientes.	Kreos. 30 o 200	<i>C/. 4 h. (6)</i>
<input type="checkbox"/> Se orina habitualmente la cama, con sueños o pesadillas.	Equis-a. 30	<i>C/. 4 h.</i>
<input checked="" type="checkbox"/> Se orina en la cama con luna llena; cuando falla un remedio bien seleccionado. Paciente psórico.	Psor. 200 o 1M	<i>Sem. (3)</i>
<input type="checkbox"/> El paciente se despierta después de orinarse en la cama soñando.	Lac-c. 200	<i>Sem. (3)</i>
<input type="checkbox"/> Debido a estranguria (la orina sale gota a gota, con pujos y dolor).	Mag-aust. 200	<i>C/. 10 m. (3)</i>
<input type="checkbox"/> Micción involuntaria durante el sueño; miedo a estar solo, aprehensión.	Lyc. 30 o 200	<i>C/. 10 m. (3)</i>
<input type="checkbox"/> Se orina en la cama debido a que tiene lombrices.	Cina. 30 o 200	<i>C/. 4 h.</i>
Remedios bioquímicos		
	Calc. p. 6X,	<i>C/. 4 h.</i>
	Kali-p. 6X y Nat-ars. 6X	

ENVENENAMIENTO

(Ver también Alergias, e Intoxicación por alimentos)

<input type="checkbox"/> Por gases de carbón vegetal.	Am-c. 3 o 6	<i>C/. ½ h.</i>
<input type="checkbox"/> Por radiación atómica.	Phos. 6 o 30	<i>C/. ½ h.</i>

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
<input type="checkbox"/> Por cloroformo.	Acet-ac. 30 o 200	C/. ½ h.
<input type="checkbox"/> Por alimentos; por ptomaína; por comer fruta demasiado madura.	Ars. 30	C/. ½ h.

Otros remedios importantes: Carbo-veg., Verat., Rhus tox., Crot-t. y Merc.., etc.

EOSINOFILIA

El aumento del número de células eosinófilas en la sangre se llama eosinofilia. Puede deberse a muchas razones, como asma bronquial, enfermedades de la piel, filariasis, fiebre del heno alérgica, anemia perniciosa, eosinofilia tropical etc.

● Expectoración escasa o difícil; el paciente no tolera la mínima oposición. Alteraciones de tiroides.	Thyr. 200 o 1M	Sem. (3)
<input type="checkbox"/> Disnea, sofocos; empeora con cualquier presión en la garganta; durante y después del sueño; empeora tomando vinagre y alimentos agrios.	Lach. 0/5 y superior	C/. 6 h.
● Remedio intercurrente.	Thuy. 200 o 1M	Sem. (3)
<input type="checkbox"/> Trastornos digestivos con manifestaciones alérgicas.	Hist. 200 o 1M	Sem. (3)
<input type="checkbox"/> Disnea en tiempo húmedo; todo frío o fresco produce dolencias; empeora después de comer arroz, plátanos, etc.	Nat-s. 200 o 1M	Sem. (3)
<input type="checkbox"/> Un remedio homeopático bien comprobado es muy útil en casos agudos o crónicos.	Cassia-s. Ø o 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Disnea con jadeo; empeora con frío de cualquier tipo; paciente hipersensible al frío, al tacto, etc.	Hep. 30 o 200	C/. 6 h.

Remedios bioquímicos	Nat-m., 12X y	C/. 2 h.
	Nat-s. 12X alternando	

Otros remedios útiles: Sil., Ars., Ip., Bac., Tub-k., Phos., Med. y Syph., etc. *La leche contiene la secreción interna de la glándula tiroides, por lo que hay que evitarla.*

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
----------	----------	--------------------------

EPILEPSIA

Una enfermedad nerviosa con pérdida de conciencia y convulsiones tónicas y clónicas.

<input type="checkbox"/> Empeora antes de la menstruación.	Oena. 30	C/. 4 h.
✗ Durante las fases lunares; afecciones espasmódicas, calambres, convulsiones, etc., empezando por los dedos de pies y manos.	Cupr-met. 30 o 200	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Durante el sueño, por la noche.	Bufo. 30 o 200	C/. 4 h. (6)
<input type="checkbox"/> Por miedo; gritos fuertes o estado de inconsciencia.	Op. 200 o 1M	C/. 6 h. (3)
<input type="checkbox"/> Por lombrices; picor en la nariz y en el ano.	Cina. 200 o 1M	Sem. (3)
<input type="checkbox"/> Por represión de erupciones.	Agar. 30 o 200	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Por un amor desafortunado; trauma o disgusto.	Ign. 200 o 1M	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> por lesión en la cabeza.	Nat-s. 200 o 1M	Quinc. (3)
<input type="checkbox"/> Por trastornos menstruales.	Cedr. 200	Sem. (3)
<input type="checkbox"/> Con hinchazón de estómago; los pulgares se vuelven hacia dentro durante el ataque; empeora con el tacto o la violencia.	Cic. 30	C/. 4 h.

Remedio bioquímico

Kali-m. 6X, C/. 4 h.
Kali-p. 6X y Mg-p. 6X

En ataques agudos, pueden darse los remedios antes mencionadas, a intervalos cortos.

EPISTAXIS

Hemorragia nasal

✗ Remedio capital. La hemorragia empeora con el mínimo movimiento (beneficio especialmente en los más jóvenes).	Bry. Ø,	5-6 gt. C/. 3 h.
---	---------	------------------

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
★ Hemorragia fácil y pasiva; empeora sonándose la nariz; la sangre no coagula con facilidad; sed de agua o bebidas frías.	Phos. 200	Sem. (3)
★ Sangre de color rojo vivo; náuseas; lengua limpia.	Ip. 6 o 30	C/. ½ h. (3)
□ Sangre de color oscuro; no coagula con facilidad; empeora al lavarse la cara o las manos.	Am-c. 30	C/. 4 h.
□ Con enrojecimiento de la cara; afluencia de sangre hacia la cabeza.	Bell. 30 o 200	C/. ½ h.
□ Hemorragia persistente (repetida); dolores de ardor e irritabilidad.	Ars. 30	C/. 6 h.
★ Epistaxis de la menopausia.	Lach. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
□ Sangre oscura y coagulada; hemorragia tan abundante que produce desfallecimiento y pitidos en los oídos; el paciente quiere ventilación.	China 30	C/. ½ h.
□ Por relajación de vasos capilares; hinchazón del cuerpo; empeora por la noche y por la mañana.	Bov. 30	C/. 4 h.
★ Epistaxis con sangre de color rojo vivo; se agrava con el calor del sol; después de toser.	Cyn-d. Ø o 6	C/. 3 h.
Remedio bioquímico	Ferr-p. 3X	C/. 4 h.

Para uso externo: Se pueden echar de 10 a 15 gotas de Fic-r. Ø, Tri-p. Ø, Ham. Ø o Mill. Ø, en un bastoncito de algodón empapado en hielo y aplicarlo por fuera y por dentro de las fosas nasales.

ERECCIONES

(Ver también otras enfermedades masculinas)

- | | | |
|--|-----------------------|--------------|
| □ Erecciones de día y de noche; por la noche; incompleta durante el coito, aunque el deseo sea fuerte; erecciones violentas. | Phos. 30 o 200 | C/. 4 h. (3) |
|--|-----------------------|--------------|

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
<input type="checkbox"/> Erecciones por la mañana.	Am-c. 200	C/. 6 h.
<input type="checkbox"/> Erecciones estando de pie; dolorosas, después del coito.	Acid-phos. 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Erecciones con temblores y deseo fuerte; retraso; deseo.	Bar-c. 200	Sem. (3)
<input type="checkbox"/> Erecciones después de una polución nocturna.	Nit-ac. 200	Sem. (3)
✗ Erecciones durante el sueño; excesivas; fuertes; violentas.	Fl-ac. 200	Sem. (3)
<input type="checkbox"/> Erecciones con ganas de orinar.	Rhus tox. 30 o 200	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Erecciones al caminar; dolorosas durante el coito.	Hep. 30 o 200	C/. 6 h.
<input type="checkbox"/> Erecciones después del coito.	Sep. 200 o 1M	Sem. (3)
<input type="checkbox"/> Erecciones dolorosas; nocturnas, excesivas; durante el insomnio; fuertes; violentas.	Canth. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
<input type="checkbox"/> Erecciones con retención de orina.	Coloc. 200 o 1M	Sem. (3)
<input type="checkbox"/> Erecciones con pensamientos eróticos; fuertes y violentas con dolor de cabeza.	Pic-ac. 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Erecciones frecuentes, con pérdida de fluido prostático.	Puls. 30 o 200	C/. 4 h.
✗ Erecciones incompletas durante el coito; pérdida o disminución de deseo.	Lyc. 200 o 1M	Sem. (3)
<input type="checkbox"/> Incompletas en el coito; retrasadas; estreñimiento.	Graph. 200 o 1M	Sem. (3)
<input type="checkbox"/> Erecciones violentas por la mañana; el pene se relaja durante el coito.	Nux-v. 30 o 200	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Erecciones que fallan al intentar el coito.	Arg. Nit. 200 o 1M	Sem. (3)
<input type="checkbox"/> Erecciones dolorosas; sobre-excitación.	Cann-i. 200 o 1M	Sem. (3)
<input type="checkbox"/> Con frío del escroto.	Caps. 200 o 1M	Sem. (3)
<input type="checkbox"/> Erecciones estando sentado.	Cann-i. 200 o 1M	Sem. (3)
<input type="checkbox"/> Erecciones después de dormir; excitación intensa de los órganos sexuales.	Lach. 200 o 1M	Sem. (3)

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
<input type="checkbox"/> Erecciones sin deseo sexual, al defecar.	Thuy. 200 o 1M	Sem. (3)
<input type="checkbox"/> Erecciones fuertes cuando se desnuda en una habitación fría.	Lys. 200 o 1M	Sem. (3)
<input type="checkbox"/> Erecciones violentas; paciente arrogante; desprecio por los demás.	Plat. 1M	Sem. (3)
☆ Falta de erección; partes frías, relajadas; pérdida de deseo.	Agn. 30 o 200	C/. 6 h.
<input type="checkbox"/> Falta de erección; erecciones cuando se está medio dormido.	Calad. 30 o 200	C/. 6 h.
<input type="checkbox"/> Falta de erección; en pacientes obesos, flojos y frioleros.	Cal-c. 200 o 1M	Sem. (3)

ERISIPELA

La erisipela es una infección aguda estreptocóquica de la piel. Sus síntomas principales son fiebre, frío, dolor de cabeza, vómitos y calor en la piel. Los síntomas de la infección aparecen con edema en los tejidos subcutáneos.

<input type="checkbox"/> Erupciones con sensación de dolor y magulladura en todo el cuerpo; la cama resulta muy dura.	Arn. 30 o 200	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Aparece repentinamente por exposición a una corriente de aire seca y fría; fiebre alta, inquietud y miedo a la muerte.	Acon. 30 o 200	C/. 2 h.
<input type="checkbox"/> Síntomas con edema, piel pálida y brillante; dolores con ardor y punzadas; bolsas en los párpados, como si estuviesen hinchados; mejora con el frío; empeora con el calor.	Apis. 30 o 200	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Erupciones vesiculares; ardor con frío y fiebre; inquietud; erupciones en la cara con ardor. Empeora con la humedad y el frío; mejora con movimiento.	Rhus tox. 30 o 200	C/. 4 h.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
◻ Picor intenso; no se soporta rascarse; se siente como si hubiese insectos corriendo por la cara. Alternancia de tos y erupciones.	Crot-t. 30 o 200	C/. 6 h.
◻ Cuando las erupciones se infectan o engangrenan. Secretión acre; ardor en las erupciones; mejora con el calor. Ansiedad, inquietud y postración.	Ars. 30 o 200	C/. 4 h.
◻ Erupciones suaves, de color rojo vivo, con dolor palpitante; piel muy roja y seca.	Bell. 30	C/. 3 h.
✗ Erupciones en la cara, con ampollas y ardor muy fuerte; el mínimo contacto aumenta la sensación de ardor.	Canth. 30	C/. 3 h.
◻ Dolores con aliento maloliente y sudor; saliva amarga o salada.	Merc. 30	C/. 4 h.
✗ Erisipelas después de una vacuna. Sudor abundante, sólo en las partes no cubiertas.	Thuy. 200	C/. 4 h. (3)
◻ Síntomas acompañados de delirio; una raya roja, estrecha, bien definida, en medio de la lengua.	Verat-v. 30	C/. 4 h.
◻ Cuando desaparecen repentinamente las erupciones. Calambres, convulsiones espasmódicas.	Cupr-met. 30	C/. 4 h.
◻ Cuando las erupciones se infectan y no se curan; gran cantidad de pus en las erupciones.	Hipoz. 30	C/. 4 h.
◻ Erupciones color púrpura, moteadas y malolientes; empeoran después de dormir. Paciente locuaz, suspicaz y envidioso. No puede tolerar ni siquiera el tacto suave en la garganta.	Lach. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
✗ Erisipela recurrente en la cara. La piel está separada de los músculos por un fluido fétido. Los síntomas se desarrollan con una rapidez insólita.	Crot-h. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
◻ Erupciones con la sensación de que se mueve un ratón por debajo de la piel.	Sec-cor. 30 o 200	C/. 4 h. (3)

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
<input type="checkbox"/> Erisipelas gangrenosas; mejoran con el frío.	Bapt. 6 o 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Gran sensibilidad al mínimo contacto, corriente de aire o ruido. Propensión a la inestabilidad y a la ira.	Hep. 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> En pacientes que son tranquilos, pero irritables; lloran fácilmente y les gusta la simpatía y el aire libre. Falta de sed. Empeora con el calor.	Puls. 30	C/. 4 h.
● Cuando fallan los remedios elegidos. Sensación de ardor, empeora con el calor. El paciente siente hambre, especialmente de 10 a 11 de la mañana. Empeora en contacto con el agua, lavándose, etc.	Sulphur 200	C/. 10 m. (3)
<input type="checkbox"/> Erupciones con fluido viscoso transparente; fiebre por la noche. Heces duras y estreñimiento.	Graph. 30	C/. 4 h. (3)
Remedios bioquímicos		
	Ferr-p. 6X, Kali-p. 6X y Kali-s. 6X	C/. 3 h.

ERUCTOS

- ★ Hediondos; se repite el sabor de la comida; lengua con una capa blanquecina, como si se hubiese pintado.
 - ★ Por hiperacidez; eructos rancios, agrios, pútridos; mejoran con expulsión de gas y si se está al aire libre fresco.
 - Después de tomar alimentos grasos; verduras, fruta, pastes y alimentos no vegetales; pérdida de sed con sequedad de boca.
 - Difíciles; producen agotamiento; empeoran tomando dulces.
 - Con mal sabor de boca y mal aliento.
- | | |
|--|--|
| | Ant-c. 30 o 200 C/. 4 h. (3)
Carbo-veg. 30 o 200 C/. 4 h. (3)
Puls. 30 o 200 C/. 4 h. (3)
Arg. Nit. 30 o 200 C/. 4 h. (3)
Carb-ac. 30 C/. 4 h. |
|--|--|

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
● Eruptos vacíos; empeoran tomando leche; remedio intercurrente.	Sulphur 30 o 200	C/. 4 h. (3)
□ Con dolor de estómago, después de comer.	Abies-n. 30	C/. 4 h.

ESCARLATINA

Enfermedad infectocontagiosa, epidémica y exantemática, debido al S. emolítico. Comienza con dolor de garganta, fiebre y anginas y, después, erupción con placas anchas e irregulares en cuerpo, extremidades, cara y cuello, que confluyen.

(Ver también *Fiebre*)

☆ Remedio capital.	Bell. 30	C/. 3 h.
□ No aparecen las erupciones propias; se convierte en escarlatina maligna; amenaza de parálisis cerebral. Cuerpo rojo; malignidad, con hinchazón de garganta.	Am-c. 30	C/. 3 h.
□ Con dolores que alternan de un lado a otro.	Lac-c. 30 o 200	C/. 3 h. (3)
□ Casos de envenenamiento de la sangre; pulso rápido y débil; postración.	Mur-ac. 30	C/. 3 h.
● En casos pertinaces; remedio intercurrente.	Psor. 200	C/. 3 h. (3)
□ Fiebre con inquietud; la punta de la lengua está roja y seca.	Rhus tox. 30	C/. 3 h.

Remedio bioquímico

Con piel caliente y seca

Ferr-p. 6X

C/. 3 h.

ESCORBUTO

Es una forma de diátesis hemorrágica, debida a que se sigue una dieta deficiente en vitamina C. Las membranas mucosas de la boca se irritan, se inflaman y se secan, salen úlceras superficiales o se ponen las encías esponjosas y sangran. Éste es uno de los síntomas de la enfermedad.

□ En casos de escorbuto o boca dolorida; cuando las encías son débiles y sangran con facilidad.	Merc. 30	C/. 4 h.
---	----------	----------

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
<input type="checkbox"/> Con boca dolorida; producido por mercurio o piorrea.	Carbo-veg. 3X o 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Mucha debilidad; estado febril bajo, ardor en las úlceras y ansiedad.	Ars. 30	C/. 4 h.
	Remedios bioquímicos	Kali-m. 6X y Nat-p. 6X

ESCOZOR DE BARBERO

(Ver también otras enfermedades de la piel)

<input type="checkbox"/> Grietas que sangran; piel sensible, seca y áspera.	Petr. 30	C/. 4 h.
☆ Erupciones papulosas. El paciente siente el pelo de punta.	Sulphur iod. 3X o 30	C/. 4 h.
☆ Casos pertinaces con excesivo ardor y escozor, con hinchazón y rojez en la lesión afectada.	Rad-br. 30	C/. 4 h.
☆ Ardor y escozor con erupciones vesiculares; empeora con la humedad, en las estaciones lluviosas y con el frío.	Rhus tox. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
<input type="checkbox"/> Con descargas pegajosas; pequeñas heridas que supuran; la parte no afectada de la piel está dura.	Graph. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
<input type="checkbox"/> Erupciones escamosas. Apostemas debajo de las erupciones; empeora con calor y aplicaciones cálidas.	Lyc. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
☆ Erupciones en forma de anillo; mucho escozor y mal olor en las partes afectadas.	Tell. 6 o 30	C/. 3 h.
<input type="checkbox"/> Cuando reaparecen las grietas después de la supuración y empieza a drenar líquido; aspecto azulado y amoratado de la lesión formada.	Lach. 30 o 200	C/. 10 m. (3)
<input type="checkbox"/> Empeora después de afeitarse. La exudación se convierte en una costra dura de color limón.	Cic. 30	C/. 4 h.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
● Cuando las dolencias empeoran después de lavarse la cara o bañarse.	Sulphur 30 o 200	C/. 10 m. (3)
● Cuando hay dolor y escozor.	Psor. 200	C/. 10 m. (3)

ESPERMATORREA

Descarga involuntaria de semen
(Ver también *Emisión seminal*)

☆ Por debilidad; después de excesos sexuales.	Acid phos. Ø o 6	C/. 4 h.
☆ En personas solteras; solterones viejos.	Con. 200	Quinc. (3)
□ Órgano sexual frío y relajado.	Agn. Ø o 30	C/. 4 h.
□ Frecuente; durante el sueño; emisiones seminales acompañadas de sueños eróticos.	Phos. 30 o 200	Sem. (3)
□ Gotea el fluido prostático mientras se hacen esfuerzos para defecar.	Cal-sil. 30	C/. 6 h.
● Por supresión de una gonorrea; remedio intercurrente.	Med. 200 o 1M	Quinc. (3)
□ Emisión con sueños voluptuosos y fuerte tensión nerviosa.	Zinc-p. 30	C/. 4 h.
● Remedio intercurrente; erecciones y poluciones matutinas; paciente psórico.	Psor. 200 o 1M	Quinc. (3)

ESPINA DORSAL

Afecciones de la
(Ver también *Vértebra dislocada, Dolor de espalda y Espondilosis*)

□ Dolor de espalda; con debilidad paralítica.	Cocc. 30 o 200	C/. 4 h.
□ Dolor de espalda, de abajo a arriba.	Con. 200 o 1M	C/. 4 h.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
<input type="checkbox"/> Dolor de espalda; empeora con la ira e indignación; dolor nervioso en la espina; dolor en el omóplato, cuando está en reposo; sensación de que tiran del omóplato derecho.	Coloc. 200 o 1M	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Dolor de espalda; calambres dolorosos en la zona de los riñones; efectos paralíticos.	Caust. 200 o 1M	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Dolor de vértebras cervicales y dorsales superiores.	Cimic. 30 o 200	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Dolor en el sacro, por lesiones del cóccix:	Hyper. 200 o 1M	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Dolor a lo ancho de los hombros.	Cann-i. 200 o 1M	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Dolor en la zona lumbo-sacra; empeora con el mínimo movimiento.	Bry.. 200 o 1M	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Dolor en toda la espina o en la región sacra.	Nux-m. 30 o 200	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Dolor en la articulación del hombro.	Staph. 200 o 1M	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Dolor de cóccix al sentarse.	Kali-bi. 30 o 200	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Dolor con entumecimiento en el cóccix, al sentarse; dolor en la región umbilical, que se desplaza hacia atrás.	Plat. 200 o 1M	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Dolor lacerante; como si se tuviese agujas en la espina dorsal.	Crot-t. 30 o 200	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Dolor frenético; baja por toda la espina dorsal.	Cina. 30 o 200	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Dolor en medio de la espina dorsal.	Mur-ac. 30 o 200	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> El dolor mejora al caminar y al ejercer presión con algo duro; frío helador entre los omóplatos.	Sep. 200	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Dolor como un disparo, que sube desde la espina dorsal al occipucio.	Phos. 200	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Dolor violento; con opistótonos.	Nat-s. 200 o 1M	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> El dolor mejora con el calor; dolor con frío en la espina dorsal.	Mg-p. 12X o 30	C/. 4 h.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
<input type="checkbox"/> El dolor empeora al tocar y hacer presión.	Kali-c. 30 o 200	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Dolor como un disparo que baja a los glúteos o a la cadera.	Lac-c. 200	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Ardor doloroso; como si se tuviese una plancha caliente en la espina.	Alum. 30 o 200	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> El dolor mejora al ponerse derecho e inclinarse con fuerza hacia atrás, con síntomas en el recto.	Aeth. 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Dolor reumático en los hombros.	Sang. 30 o 200	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Dolor entre los omóplatos.	Cic. 30 o 200	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> El dolor mejora con el calor; empeora con el descanso y el frío.	Rhus tox. 200 o 1M	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Dolor entre los omóplatos; ardor doloroso.	Ars. 30 o 200	C/. 4 h.
<input checked="" type="checkbox"/> Dolor en el omóplato izquierdo; el dolor empeora al acostarse; mejora con el calor.	Tub-k. 200 o 1M	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Punzadas entre los omóplatos.	Nit-ac. 30 o 200	C/. 4 h.
Remedios bioquímicos		Cal-p. 6X y Sil. 30X
		C/. 4 h.

ESPONDILOSIS

Artrosis vertebral

(Ver también Espondilosis cervical)

El término “espondilosis” se utiliza para denominar un trastorno producido por una degeneración crónica de una vértebra. Los cambios degenerativos se producen en los discos intervertebrales. Puede afectar a un solo disco o a varios. La espondilosis puede interferir en la aportación de sangre a la espina dorsal y producir trastornos mayores.

- ❖ Remedio capital para la espondilosis cervicale. Inflamación de vértebras; se siente como si rompiesen los huesos con un cuchillo; debilidad paralítica de la espina dorsal y

Acid-phos. 30 C/. 4 h.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
general; empeora con esfuerzo; pérdida de fluidos vitales; mejora con calor.		
<input type="checkbox"/> Dolor en la zona lumbar y sacra; dolor que se extiende al omóplato derecho.	Chloram. 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Dolor en la región cervical, con molestias frontales y dorsales; empeora por la mañana y antes de la menstruación.	Pneu. 200	C/. 6 h.
● Espondilosis dorsal y lumbar; para corregir deformaciones de huesos. Paciente gordo, débil, flojo y friolero; lesión de la parte inferior de la espina dorsal; reblandecimiento y debilidad de huesos.	Cal-c. 200 o 1M	Sem. (6)
● Remedio intercurrente. Para corregir deformaciones de las vértebras. Ardor doloroso; empeora en la región sacro-coxígea y en el cóccix.	Sulphur 200 o 1M	Sem. (3)
<input type="checkbox"/> En personas delicadas que crecen muy rápidamente; anémicas, de color de cera, ganas de tomar sal y cosas frías; miedo a la oscuridad; espina dorsal curva. Ardor, golpes de dolor que suben por la espina dorsal al occipucio. Vértigo después de levantarse; dolor de espalda; empeora con el esfuerzo.	Phos. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
<input type="checkbox"/> Debilidad de la espina dorsal; cuando los huesos están necrosados; se rompe con facilidad. Dolor de cóccix; sudor fétido en los pies; paciente tímido, friolero, hipersensible; para corregir la curvatura de los huesos; vértigo al mirar hacia arriba; mejora con el calor.	Sil. 200 o 1M	Sem. (3)
<input type="checkbox"/> Dolor de espalda; entre los hombros y en las zonas lumbar y sacra; exceso de trabajo; solteros crónicos; debilidad del cuerpo y la mente; vértigo, cuando se está echado y al darse la vuelta.	Con. 200 o 1M	Sem. (3)
★ Dolor en la región sacro-coxígea y el cóccix; empeora con el calor; rigidez e hinchazón de las articulaciones. Efectos	Kali-i. 200 o 1M	Sem. (3)

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
nocivos del mercurio; empeora con el calor; mejora con el movimiento y al aire libre.		
❑ Vértigo con sensación de que algo da vueltas por la cabeza. Dolor y debilidad en la región sacro-coxígea; mejora al echarse, caminando y haciendo presión en la espalda.	Sep. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
❑ Dolor y debilidad en la región sacro-coxígea; ardor en la espina dorsal, que baja a las caderas; empeora al caminar; de 3 a 4 de la mañana.	Kali-c. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
❖ Dolor de espalda por levantar un peso excesivo; se moja con el sudor; región sacro-coxígea rígida y magullada. El dolor mejora después de movimiento continuo y con el calor; empeora con el frío y el descanso.	Rhus tox. 200 o 1M	C/. 4 h.
❑ Molestias y dolor en la región lumbar; empeora al levantarse de una silla; espalda rígida y tensa; dolor en los omóplatos; dolor frenético y como si tirasen; mejora con tiempo cálido y húmedo.	Caust. 30 o 200	C/. 6 h.
❖ Dolor de los huesos de la espalda, como si se rompiesen; dolor ardiente en la región lumbar; vértigo; empeora con el movimiento, especialmente cuando se cierran los ojos con presión, con el ruido y con el mínimo chirrido.	Ther. 30	C/. 4 h.
❑ Dolor en la región sacro-coxígea; en las vértebras lumbares y sacras; como si se rompiesen las cervicales; empeora al caminar; magulladuras en los hombros y en los brazos; empeora con el insomnio.	Cocc. 30	C/. 4 h.
❑ Dolor en la región sacrocoxígea; en las vértebras sacras y lumbares; confusión mental; dolor que sube desde la nuca; empeora después de mojarse.	Dulc. 200 o 1M	C/. 10 m. (3)
❑ Dolor en la zona lumbo-sacra; empeora con el mínimo movimiento; vértigo; punzadas y rigidez en la región sacrocoxígea.	Bry. 30 o 200	C/. 4 h.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
□ Dolor en la zona del sacro. Vértigo, al caminar al aire libre; empeora con el frío; mejora con el calor.	Nux-v. 30 o 200	C/. 3 h.
□ Dolor en el cóccix y en el sacro al sentarse; imposibilidad de inclinarse por el dolor que tiene entre los omóplatos. Vértigo con náuseas cuando se levanta de una silla; mejora con el calor.	Kali-bi. 30 o 200	C/. 4 h.
☆ Dolor en los nervios de la espina dorsal; dolor como si tirasen del omóplato izquierdo cuando se descansa; dolor entre los omóplatos; dolor como si tirasen de los músculos cervicales izquierdos. Vértigo cuando se gira la cabeza hacia la izquierda; empeora después de encolerizarse.	Coloc. 200 o 1M	C/. 10 m. (3)
● Dolor de espalda y frío a lo largo de la espina dorsal; mejora con el calor. Vértigo al moverse, se cae hacia delante si cierra los ojos; mejora caminando al aire libre.	Mg-p. 12X o 30	C/. 4 h.
□ Dolor fuerte desde el cerebro hasta el cóccix; el dolor empeora al tocar o hacer presión; sensación de caminar o flotar en el aire.	Lac-c. 200	C/. 10 m. (3)
O Espalda inclinada hacia atrás, como un arco; dolor como sacudidas y frenético en el cóccix, especialmente durante las menstruaciones. Vértigo con gastralgias y espasmos musculares.	Cic. 30	C/. 4 h.
☆ Entumecimiento y dolor en las extremidades; dolor frenético en el nervio ciático. Entumecimiento que alterna con dolor.	Gnaph. 200 o 1M	C/. 6 h.
□ Cuello tenso y rígido con tirones dolorosos; nuca rígida; empeora antes de las tormentas.	Rhod. 200 o 1M	C/. 10 m. (3)
□ Dolor de las vértebras dorsales superiores, lumbares y sacras; la espina dorsal está muy sensible, rigidez y contracción del cuello y la espalda; empeora con el movimiento, el frío y durante el periodo menstrual.	Led. 200 o 1M	C/. 10 m. (3)

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
● Dolor intolerable en la espalda; empeora durante el día y mejora junto al mar; cuello rígido.	Med. 200 o 1M	<i>Quinc. (3)</i>
□ Cuando se tienen magulladuras dolorosas, debidas a haber llevado mucho peso; esfuerzo excesivo, lesiones de los huesos y torceduras; empeora al acostarse, con el frío y con la humedad.	Ruta-gt. 30 o 200	<i>C/. 6 h.</i>
□ Dolor de cóccix; sensación de tener el sacro dislocado; mejora al acostarse del lado derecho. Miedo al moverse hacia abajo.	Sanic. 30	<i>C/. 4 h.</i>
□ Espondilosis cervical; crujidos en las vértebras.	Mag-art. 30 o 200	<i>C/. 6 h.</i>
□ Espondilosis por excesos sexuales; lesión del hueso de la espina dorsal.	Symp. 6 o 30	<i>C/. 4 h.</i>
☆ Dolor en la región lumbar; magulladuras, se siente como si las vértebras estuviesen dislocadas; no se puede caminar erguido, por el dolor de espalda.	Arn. 200 o 1M	<i>C/. 6 h.</i>
□ Dolor en la región lumbar; rigidez de espalda; empeora con el calor, al inclinarse hacia atrás, al enfadarse y por la noche.	Cham. 200	<i>C/. 6 h.</i>
□ Dolor de la región lumbar; dolor repentino en la nuca y la espalda, entre los hombros y el sacro, al levantarse; vértigo; mejora al aire libre.	Puls. 30 o 200	<i>C/. 6 h.</i>
● Sin esperanza de recuperación; empeora con el aire frío; mejora con el calor; el paciente se pone ropa de abrigo, incluso en verano.	Psor. 200 o 1M	<i>Sem. (3)</i>
● El paciente siente como si tuviese los huesos de cristal.	Thuy. 200 o 1M	<i>Sem. (3)</i>
□ Por commoción de la espina dorsal; dolor de las vértebras sacras y del cóccix.	Hyper. 30 o 200	<i>C/. 6 h.</i>
Remedio bioquímico		<i>C/. 4 h.</i>
Cal-p. 6X, Cal-f. 12X y Mg-p. 6X		

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
----------	----------	--------------------------

ESPONDILOSIS CERVICAL

Vértebra dislocada

(Ver también *Vértebra dislocada*, etc.)

★ Vértigo; empeora cerrando los ojos, debido a la degeneración de la espina dorsal.	Ther. 30	C/. 4 h.
★ Con debilidad muscular; sudor en las manos, especialmente en los solteros.	Con. 200 o 1M	C/. 3 h. (3)
★ Con entumecimiento; empeora por la noche.	Kali-i. 200 o 1M	C/. 3 h. (3)
★ Remedio capital; dolor agudo con debilidad.	Acid-phos. 30	C/. 4 h.
● Remedio intercurrente.	Psor. 200 o 1M	Sem. (3)
★ Dolor en la nuca; mejora con el movimiento y empeora con el reposo, con el frío y la humedad y después de beber agua muy fría.	Rhus tox. 200 o 1M	C/. 4 h.

Remedios bioquímicos	Cal-f. 12X y Cal-p. 6X	C/. 4 h.
-----------------------------	---------------------------	----------

ESTERILIDAD FEMENINA

Estado de una mujer que no concibe, cualquiera que se su causa.

□ Sin cambios estructurales.	Mand. 30	C/. 4 h.
★ Cuando no se produce la concepción porque una mucosidad (leucorrea) blanca, densa, mucilaginosa, de reacción ácida, destruye la movilidad del espermatozoide; siente como si fluyese agua caliente por la vagina. Se adelantan las menstruaciones y son dolorosas, abundantes o prolongadas. Casos crónicos de erosión del cuello del útero.	Borx. 30	C/. 4 h.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
★ Remedio bioquímico para síntomas similares.	Nat-p. 6X	C/. 4 h.
◻ Para excitar la actividad de los ovarios y la sensación de placer, especialmente en mujeres altas, delgadas y muy sensibles.	Phos. 200	Quinc. (3)
◻ Inflamación y endurecimiento de los ovarios; albumen como una descarga fuerte, corrosiva, de reacción ácida; dolor palpitante, corrosivo, frenético en útero y ovarios. Poco deseo sexual; dolor e hinchazón en los pechos, antes y después de las menstruaciones. Vértigo al girar la cabeza a un lado.	Con. 200	Quinc. (3)
◻ En casos de dismenorrea y hemorragia uterina fuerte. El cuello de la vejiga está como hinchado con ganas fuertes de orinar.	Mit. Ø,	5-7 gt. C/. 4 h.
★ Casos de menstruación escasa y retrasada, con fuerte dolor de espalda y en la zona sacra; atonía uterina.	Goss. Ø,	5-10 gt. C/. 4 h.
● Sudor, insomnio y debilidad general después de cada relación sexual. Menstruaciones adelantadas, abundantes y duraderas; leucorrea abundante, acre y cremosa, día y noche. Paciente gorda y débil.	Cal-c. 200 o 1M	Quinc. (3)
◻ Menstruaciones escasas, pálidas, tardías y, en algunas ocasiones, desaparecen durante varios meses. Estreñimiento; piel enfermiza que tarda en curar, tendencia a eccemas, grietas en las comisuras de los labios y de los párpados.	Plb. 30	C/. 6 h.
◻ Cólico doloroso; durante la menstruación, irradia hacia las ingles y el ano. Estreñimiento.	Graph. 30 o 0/5	C/. 6 h.
◻ Historial de abortos repetidos. Contracciones del útero que estimulan el parto.	Caul. 30	C/. 6 h.
★ En casos de debilidad funcional de los órganos reproductores; abortos, poco después de empezar cada embarazo; dismenorrea membranosa.	Vib. Ø o 6	C/. 4 h.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
Para tonificar el útero. Dolor de espalda, cortante, opresivo y contraído parcialmente desde el útero y desde los ovarios; irritabilidad de la vejiga; presión frecuente y dolorosa en el cuello de la vejiga.	Eupatorium purp. 30	C/. 4 h.

Otros *remedios útiles*: Aur., Puls., Sep., Helon., Frax., Kali-c., Alet., Sec-cor., Lil-t., Cham., Apis., Plat., Ham., Thyr., Nat-m., Kali-br., Bar-c., Onos., Sal-n., Staph., Med., Thuy., Joan., Sulphur, Syph. y Tub-k., etc.

ESTORNUDOS

(Ver también *Resfriado, catarro y coriza y Tos y Alergias*)

★ Por exposición repentina a corrientes de aire seco y frío.	Acon. 30 o 200	C/. 2 h.
★ Con ardor, descarga que desuella; ansiedad y sed frecuente insaciable.	Ars. 30	C/. 3 h.
★ Estornudos con dolor del cuerpo; sensación de frío por la espina dorsal; vértigo y pereza.	Gels. 30	C/. 3 h.
★ Los estornudos empeoran al entrar en una habitación caliente; mejoran al aire libre.	All-c. 30	C/. 3 h.
● Remedio intercurrente.	Bac. 1M	1 dosis

ESTRABISMO

Es la imposibilidad de hacer que coincidan los ejes visuales de los dos ojos en un punto y un ojo sigue al otro en todos sus movimientos. Si el ojo que tiene estrabismo se desvía hacia dentro, se llama “estrabismo convergente” y, si lo hace hacia fuera, “divergente”; si desvía hacia arriba, “sursumvergente” y, si lo hace hacia abajo, “deorsumvergente”.

El uso de remedios homeopáticos ha reducido en las etapas iniciales la tendencia al estrabismo permanente. En casos pertinaces, se necesita recurrir a la cirugía.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
□ En casos de estrabismo convergente de un niño, especialmente si es de naturaleza espasmódica o está producidos por convulsiones.	Cicuta vir. 30	C/. 4 h.
□ Estrabismo convergente; periódico y consecuencia de espasmos de los rectos internos.	Jab. 30	C/. 4 h.
□ Por tener lombrices.	Cina. 30 o 200	C/. 4 h.
	Remedio bioquímico	
	Mg-p. 6X	C/. 4 h.

Otros *remedios importantes*: Cycl., Spig., Apium, Agar., Bell., Gels., Hyos., Nux-v., Stram. y Psor., etc.

ESTREÑIMIENTO

(Ver Evacuación de heces)

□ Estreñimiento crónico; abundancia de flatos, distensión de abdomen.	Coca. Ø, en agua templada.	10 gt. C/. 6 h.
★ Debido al ayuno y la vida sedentaria; deseos, sin ningún resultado, varias veces al día.	Nux-v. 30 o 200	C/. 6 h.
★ Heces duras, debido a sequedad y falta de peristaltismo del tracto intestinal. Ganas de tomar alimentos secos.	Alum. 0/7 o superior (potencia de 50 milesimal).	C/. 6 h.
□ Heces duras; secas como si estuviesen quemadas y de aspecto grande. Falta de deseo de defecar; aumento de sed con ganas de beber gran cantidad de agua en intervalos largos.	Bry. 30 o 200	C/. 6 h.
★ Tónico para el movimiento intestinal correcto.	Cas-s. Ø	10-15 gt. C/. 4 h.
□ Se siente mejor cuando tiene estreñimiento; paciente obeso, flojo y friolero.	Cal-c. 200	C/. 4 h. (3)
□ El paciente puede defecar solamente de pie.	Caust. 30 o 200	C/. 6 h.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
☐ Estreñimiento con sensación de hundimiento en el estómago. Lengua blanca y sucia.	Hydr. Ø o 6	C/. 4 h.
☆ En paciente frioleros faltos de energía vital; las heces retroceden cuando empiezan a salir.	Sil. 12X o 30	C/. 4 h.
Remedio bioquímico		C/. 4 h.

Otros remedios útiles: Sel., Sulphur, Graph., Op., Mag-carb., etc.

EVACUACIÓN DE HECES

(Ver también *Estreñimiento, Diarrea, Disentería, Cólera, etc.*)

☐ Dolor espasmódico del esfínter después de evacuar; heces gelatinosas; se tiene aversión al olor de la comida.	Colch. 30	C/. 4 h.
☐ Las heces salen con mucho dolor y esfuerzo; heces de color de escayola.	Hep. 30	C/. 4 h.
☐ Evacuación dolorosa, con mucha flatulencia; olor de diarrea, como de huevos podridos; de color marrón oscuro.	Psor. 200	Sem. (3)
☐ Dolor intolerable en el recto al defecar y después.	Paeon. Ø o 6	C/. 4 h.
☐ Dolor en el perineo, al defecar; tiene que ir a defecar después de comer; olor de las heces fuerte y duradero.	Sang. 30 o 200	C/. 4 h.
☐ Sólo se defeca cuando se echa hacia atrás, con dolor.	Med. 200 o 1M	Sem. (3)
☐ Sólo se defeca de pie; heces duras, estreñimiento.	Alum. 30 o 0/5 y superior	C/. 4 h.
☐ Sólo se defeca de pie.	Caust. 30 o 0/5 y superior	C/. 6 h.
☐ Dolor y ardor en el perineo después de defecar.	Nit-ac. 30	C/. 4 h.
☐ Tiene que ir a defecar después de beber algo; sed después de defecar.	Caps. 30	C/. 4 h.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
❑ Imposibilidad de hacer esfuerzo, por debilidad paralítica de los músculos del recto; debilidad y palpitación después de defecar; heces frías.	Con. 30 o 200	C/. 4 h.
❑ Con protrusión de estómago; sangre negra, en parte sólida y, en parte fluida; lengua con capa blanca.	Ant-c. 30 o 200	C/. 4 h.
❑ Intervalos largos entre las defecaciones; las heces son malolientes y sanguinolentas, con dolor muscular.	Arn. 200	C/. 4 h.
❑ Heces con pus; sueltas, fangosas, como algo triturado, muy calientes.	Cal-p. 6X o 6	C/. 4 h.
❑ Heces involuntarias, por un susto; heces duras y secas.	Op. 200 o 1M	C/. 4 h. (3)
❑ Se defeca después de una excitación; al orinar.	Hyos. 200	C/. 4 h. (3)
❑ Con prisa; por la mañana temprano.	Sulphur 200	C/. 4 h. (3)
❑ Ganas de defecar, sin hacer nada; irritabilidad.	Nux-v. 30	C/. 4 h.
❑ Heces como posos de café.	There-ch. Ø o 6	C/. 4 h.
❑ Heces secas; claras.	Coll. Ø o 30	C/. 4 h.
❑ Heces blandas y difíciles de expulsar.	Nux-m. 30	C/. 4 h.
❑ Heces grumosas, con puntos de mucosidad.	Graph. 30 o 1M	C/. 4 h.
❑ Heces repentinamente, ruidosas, a borbotones.	Nat-s. 30 o 200	C/. 4 h.
❑ Las heces retroceden cuando casi han salido.	Sil. 12X o 30	C/. 4 h.
❑ Las heces cambian de color; no hay dos iguales.	Puls. 30 o 200	C/. 4 h.
❑ Heces verdosas; olor agrio.	Nat-p. 6X o 30	C/. 4 h.
❑ Las heces salen sin sentirse, aunque sean sólidas.	Aloe. 30	C/. 4 h.
❑ Se defeca inmediatamente después de lavarse la cabeza.	Tarent. 200 o 1M	C/. 10 m. (3)

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
----------	----------	--------------------------

EXPOSICIÓN, Afecciones de

(Ver también *Resfriado, catarro y coriza, etc.*)

<input type="checkbox"/> A clima seco y frío.	Acon. 30 o 200	C/. ½ h.
<input type="checkbox"/> Con fiebre alta después de cortarse el pelo.	Bell. 30	C/. ½ h.
<input type="checkbox"/> Al aire húmedo.	Dulc. 30 o 200	C/. 10 m. (3)
<input type="checkbox"/> Como tónico estimulante de las defensas.	Aven. Ø	10-15 gt. C/. 2½ h.

Remedio bioquímico	Ferr-p. 6X	C/. ½ h. en agua caliente
---------------------------	-------------------	------------------------------

FARINGITIS

(Ver otros problemas de la garganta)

<input type="checkbox"/> Faringitis con úlceras como puntas de alfiler que sangran con facilidad.	Bell. 30	C/. 3 h.
<input type="checkbox"/> Con catarro crónico de faringe; dolor de garganta.	Sil. 12X o 30	C/. 4 h.
☆ Con mucosidad fuerte, correosa y blanquecina.	Kali-bi. 30	C/. 4 h.
☆ Cuando hay parálisis de los músculos de la faringe.	Lach. 30	C/. 4 h.
☆ Con puntos blanquecinos sobre las úlceras de la garganta.	Phyt. 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Con sequedad de garganta; aumento de la sed; estreñimiento.	Nat-m. 30	C/. 4 h.

Remedios bioquímicos.	Kali-m. 6X y Ferr-p. 6X	C/. 4 h.
------------------------------	------------------------------------	----------

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
<u>FIEBRE (simple)</u>		
✗ En su primera etapa; por exposición a una corriente seca y fría.	Acon. 30 o 200	C/. 2 h.
✗ Fiebre alta; con pérdida de sed, cambio de humor; mejora al aire libre.	Puls. 30 o 200	C/. 3 h.
✗ Cara sonrojada con fiebre alta; por amigdalitis aguda, etc.	Bell. 30	C/. 3 h.
✗ Con jaqueca que viene de la nuca; adormecimiento, pérdida de sed, ganas de estar echado tranquilamente; mejora después de orinar.	Gels. 30 o 200	C/. 3 h.
✗ Con inquietud y sed de pequeñas cantidades de agua en intervalos cortos; sensación de ardor.	Ars. 30 o 200	C/. 3 h.
✗ Con dolor de todo el cuerpo; sed excesiva, bebiendo grandes cantidades de agua de una vez o en intervalos largos; estreñimiento; empeora con el movimiento; mejora con el descanso.	Bry. 30 o 200	C/. 3 h.
❑ Por insolación o exposición al calor.	Glon. 6 o 30	C/. 4 h.
❑ Por infección urinaria; micción frecuente con ardor.	Canth. 30	C/. 4 h.
✗ Con náuseas y vómitos; falta de sed, lengua limpia. Esquema irregular de fiebre.	Ip. 30	C/. 2 h. (3)
✗ Fiebre después de mojarse; con mucha inquietud; mejora con el movimiento, dolor fuerte en el cuerpo; punta triangular de la lengua, roja.	Rhus tox. 30 o 200	C/. 3 h.
❑ Fiebre después de una herida; sensación de dolor y de conmoción (como si se hubiese recibido un golpe) en todo el cuerpo.	Arn. 30 o 200	C/. ½ h. (3)
❑ Ganas de beber agua fría cuando se tiene frío y falta de sed en periodo de calor; ganas de ventilarse.	Carbo-veg. 30	C/. ½ h. (3)

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
□ Sed, solamente durante la etapa fría de la fiebre.	Caps. 30	C/. 2 h.
☆ Desproporción entre el pulso y la temperatura; fiebre alta; fiebre séptica.	Pyr. 200 o 1M	C/. 10 m. (3)
□ Fiebre con dolor de cabeza; dolor en el cuerpo y estreñimiento; sabor amargo en la boca; empeora por la mañana; náuseas y vómitos inmediatamente después de desayunar; sensación de ardor en las manos; fiebre con frío; empeora por la noche.	Amoora rohutika 30	C/. 4 h.
□ Fiebre con frío, peor de 8 a 10 a. m. y de 2 a 4 p. m.; debilidad después de la fiebre; lengua blanca; dolor de cabeza con presión; sed de agua fría.	Caesal-b. 30	C/. 4 h.
□ Fiebre con pesadez de párpados; pereza, sin ganas de trabajar; irritabilidad; empeora con esfuerzo mental o físico.	Sulfonam. 30	C/. 4 h.
Remedio bioquímico		
	Ferr-p. 6X y Kali-s. 6X, alternando	C/. 2 h. (6)
	Biocom. No.11	C/. 2 h.

FIEBRE DEL HENO

(Ver también *Rinitis alérgica*, , *Resfriado, catarro y coriza*)

□ De repente; después de estar expuesto a una corriente de aire seca y fría.	Acon. 30	C/. ½ h. (3)
□ Coriza, con estornudos violentos; hormigueo en la garganta.	Sabad. 30	C/. 2 h.
□ Descarga nasal acuosa, con irritación y estornudos violentos y dolorosos; inquietud y sed insaciable.	Ars. 30	C/. 3 h.
☆ Destilación nasal y de los ojos, estornudos fuertes; dolor de los labios y las fosas nasales; empeora en lugares cerrados y por la mañana; mejora al aire libre.	All-c. 30	C/. 2 h.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
☆ Estornudos violentos, descarga nasal suave; pero la de los ojos produce ardor; empeora al aire libre.	Euphr. 30	C/. 4 h.
☆ Estornudos fuertes; drenaje nasal por la mañana; descarga con sensación de desuello; los ojos parecen calientes y pesados; se tiene todo el cuerpo dolorido; pérdida de la sed; pesadez en las extremidades; mejora después de orinar.	Gels. 30	C/. 4 h.
☆ Paciente friolero e irritable; irritación de nariz, ojos y cara; estornudos a golpes violentos; nariz atascada por la noche.	Nux-v. 30	C/. 4 h.
● Paciente sensible al frío; catarro crónico.	Psor. 200 o 1M	3 Sem. (3)
□ Estornudos constantes; nariz atascada o destilación de nariz y ojos; empeora al aire libre, con la humedad y cuando se está caliente y se enfriá uno.	Dulc. 30 o 200	C/. 4 h.
☆ Nariz atascada; estornudos; empeora por la noche; punzadas en la nariz, con ganas de hurgarse en la nariz o con destilación nasal abundante, que pone la nariz irritada y dolorida.	Arum-t. 30	C/. 4 h.
Remedio bioquímico	Nat-m. 6X o 12X	C/. 3 h.

FIEBRES TIFOIDEAS

(Ver también *Fiebre*)

1^a. etapa (*Invasión*)

Normalmente, los remedios que se dan a continuación cubren casi el 90% de los casos y reducen la duración del tratamiento, si se dan a tiempo.

☆ Debilidad; delirio leve; dolor de cabeza, espalda y extremidades; empeora con el movimiento; lengua con una capa	Bry.. 6 o 30	C/. 3 h.
--	--------------	----------

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
blanquecina; labios secos y sedientos; con o sin sed de beber grandes cantidades de agua de vez en cuando; estremecimiento; inquietud e insomnio, se sueña mucho con negocios; orina escasa y de color fuerte.		
☆ Postración extrema, tanto muscular como nerviosa, con ganas de estar echado; adormecimiento; temblores en general; los músculos no quieren obedecer; poca o ninguna sed; heces normales; orina abundante; goteo de los párpados.	Gels. 6 o 30	C/. 3 h.
☆ Postración y dolor, como si tuviese magulladuras; el paciente se queda dormido mientras contesta en una conversación; expresión estúpida, embrutecida, como de borracho; lengua con una capa y una raya bien definida en el centro, que, al principio, es blanca y, después, se vuelve marrón con bordes rojos; heces sueltas; el cuerpo se siente como si estuviese esparcido; se sacude, como para juntarlo; orina abundante, insuficiente, oscura y de mal olor.	Bapt. Ø o 30	C/. 3 h.
● Diarrea; lengua seca como una tabla, con el triángulo de la punta rojo; delirio y estupor con murmullo; inquietud; mejora con el movimiento; el paciente se sacude y cambia de posición.	Rhus tox. 6 o 30	C/. 3 h.
□ El paciente siente mucho frío, aunque no soporta estar en una habitación caliente; lengua blanca, sin sed; llora con facilidad; retraso en las menstruaciones.	Puls. 30	C/. 4 h.
□ Fiebre alta con cara enrojecida; friolero, ganas de estar bien cubierto; nervioso, sensible e irritable (normalmente, los hombres).	Nux-v. 6 o 30	C/. 4 h.
□ Condición estúpida, indiferente y apática; se echa boca arriba; no quiere hablar; diarrea sin dolor, amarillenta o blanca, heces líquidas con distensión del abdomen, con ruido (normalmente, en hombres casados).	Acid-phos. 6 o 30	C/. 4 h.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
□ Apático; deprimido; se duerme al contestar; sensación de estupor, de magulladura; la cama resulta dura.	Arn. 6 o 30	C/. 3 h.
En casos graves:		
● Quejidos, estupor, insensibilidad casi completa; duerme con la boca abierta; lengua seca u oscura, tiembla y castañetea los dientes; heces fétidas; si hay hemorragia, es de sangre oscura descompuesta, como copos de paja quemada; no puede soportar nada en la garganta ni en el pecho; se agrava con el sueño.	Lach. 30	C/. 3 h.
□ Postración; la fuerza vital muy agotada; inquietud y ansiedad, movimientos constantes de cabeza y extremidades, mientras el tronco se mantiene quieto por la debilidad; la lengua puede estar roja, seca, cuarteada o negra y rígida; mucha sed de beber poca agua a intervalos cortos; ardor de estómago, heces líquidas, marrones o sanguinolentas y de mal olor; empeora a media noche.	Ars. 30	C/. ½ h.
□ Etapa de colapso; postración, letargo, disolución de la sangre, condiciones paralíticas; rostro con palidez de muerte, hundido, frío; puede haber hemorragia nasal, de boca o de ano; abdomen distendido, con ruidos de movimiento de gases; diarrea involuntaria, ruidos en el pecho, con mucosidad; la circulación es débil y la sangre se estanca en los capilares. Se produce coloración azul cianótica en la cara, en los labios y en la lengua; sudor frío; ganas permanentes de ventilarse y tomar más oxígeno.	Carbo-veg. 30 (China sigue a Carbo-veg.)	C/. ½ h.
□ Por debilidad, el paciente está constantemente deslizándose en la cama; con gemidos y quejas; mandíbula inferior caída; lengua muy encogida, curtida; pulso paralizado, con intermitencia cada tres latidos; heces sanguinolentas involuntariamente.	Acid-mur. 30	C/. 3 h.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
□ Mal olor de todas las excreciones y secreciones; pulso desproporcionado para la temperatura; lengua roja, como carne cruda, al rojo vivo.	Pyr. 6 o 30	C/. ½ h. (3)
Remedios bioquímicos		
	Ferr-p. 6X, Kali-p. 6X y Kali-m. 12X	C/. 3 h.

FILARIASIS

Es un estado enfermizo debido a la presencia de filaria, que horada la piel produciendo irritación e hinchazón. Al principio de la filariasis, la aparición se manifiesta por hinchazón dolorosa del contenido escrotal. Es común la hinchazón aguda de las glándulas linfáticas de la zona inguinal y femoral.

- ★ En casos de origen reciente; episodios frecuentes de adenolinfangitis; empeora con el esfuerzo; hinchazón como de una cuerda. **Rhus tox. 30 o 200** C/. 4 h.
- ★ Paciente caliente; sed excesiva, bebiendo grandes cantidades a largos intervalos; empeora con el movimiento; edema local de todo tipo, especialmente fibrótico. **Bry. 30 o 200** C/. 4 h.
- ★ Con edema brillante; falta de sed, sensación de ardor; empeora con el calor. **Apis. 30 o 200** C/. 4 h.
- Intolerancia al sol; ganas de tomar demasiada sal en todos los preparados; sed en aumento. Irritabilidad mental; aversión a la simpatía; empeora junto al mar. **Nat-m. 30 o 200** C/. 4 h.
- ★ En pacientes calientes; deseo de frío; falta de sed y sequedad en la boca; cambio de humor; llanto al contar los síntomas; disposición amable y apacible. **Puls. 30 o 200** C/. 4 h.
- ★ Con enfermedades de genitales masculinos; hidrocelia; empeora con las tormentas. **Rhod. 200 o 1M°** Sem. (3)

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
● Con ardor local o generalizado; mejora con el frío; deseo de tomar dulces; frío acompañado de problemas gástricos o enfermedades de la piel.	Sulphur 30 o 200	Sem. (3)
❑ Sudor abundante que no se alivia; sed con boca húmeda; tendencia a supurar; tenesmo rectal y heces que contienen mucosidad; edema en las piernas que se pone duro.	Merc. 30 o 200	C/. 4 h.
❑ Paciente friolero; deseo de tomar alimentos calientes, dulces; dispepsia flatulenta; siempre tiene prisa; empeora con el calor.	Lyc. 200 o 1M	Sem. (3)
	Remedio bioquímico.	Cal-f. 12X
		C/. 4 h.

FIMOSIS

La estrechez de la apertura del prepucio, cuando éste no puede retrotraerse para que salga el glande, se llama fimosis.

Remedios importantes: Nit-ac., Acon. , Apis., Bell., Hep., Merc., Sulphur, Med. y Tub-k., etc.

FÍSTULA DE ANO

Fístula significa tubo y la fistula de ano es un canal parecido a un tubo que se abre normalmente en el ano o cerca de él. La fistula puede ser ciega, interna o abierta. Suele aparecer como consecuencia de un absceso simple o tuberculoso del tejido que rodea el recto. Este absceso se abre hacia el intestino y hacia la superficie de la piel.

● Al empezar el tratamiento (también intercurrente).	Tub-k. 200 o 1M	Quinc. (6)
❑ Etapa inicial de formación de pus, con dolor palpitante; rojez en el ano.	Bell. 30 y Merc. 30, alternando	C/. 3 h.
❖ Cuando ha pasado la primera etapa y hay dolor intenso; el absceso se hace purulento.	Hep. 30	C/. 4 h.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
◻ Cuando aparece la etapa ulcerosa y el paso se convierte en cavidad; descarga fétida y acuosa.	Sil. 12X o 30	C/. 4 h.
● En pacientes tuberculosos (remedio intercurrente) sensibles al frío.	Bac. 200 o 1M	Quinc. (3)
☆ Cuando se siente un martilleo intenso y doloroso en el recto.	Lach. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
◻ Dolor y ardor intenso; heces verdosas.	Nit-ac. 200 o 1M	Sem. (3)
● En fistula ciega; heces amarillentas, verdosas, sin dolor.	Sulphur 200 o 1M	Sem. (3)
◻ Con dolor muy fuerte alrededor del ano; para mejorar el drenaje de las heces.	Berb. Ø, 5-10 gt.	C/. 4 h.
◻ Ardor y dolor en el recto; hemorroides grandes crónicas; mejora en clima húmedo.	Caust. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
Remedio bioquímico.		
		Cal-p. 6X o 12X y C/. 4 h. Calc-sulph. 6X (Cuando no hay dolor)

Para uso externo: loción de Hydrastis o Caléndula.

FISURA ANAL

● aL empezar el tratamiento (también intercurrente).	Tub-k. 1M o 10M	Quinc. (6)
☆ Con sensación de que se clavan astillas en el ano; heces muy malolientes.	Nit-ac. 30 o 200	Sem. (3)
☆ Se siente en el recto como si hubiese cristales rotos; ardor cuatro horas después de defecar.	Rat. 6 o 30	C/. 4 h.
☆ Fisura debida a estreñimiento fuerte; heces duras con mucosidad.	Graph. 30 o 200	C/. 6 h.
◻ Punzadas en el ano en todo momento; rezuma mucho.	Paeon. Ø o 30	C/. 4 h.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
❑ Fisura debida a sequedad de todas las membranas mucosas del cuerpo; boca húmeda o emanación de la nariz o los ojos.	Nat-m. 30	C/. 4 h.
❑ Las heces bajan con dificultad, con espasmos y pinchazos, cuando han salido en parte, se vuelven hacia dentro.	Sil. 12X o 30	C/. 4 h.
● Rojez marcada alrededor del ano y con ardor constante y necesidad de defecar.	Sulphur 30 o 200	C/. 6 h.
	Remedios bioquímicos.	Cal-f. 12X y Sil. 30X C/. 4 h.

FLATULENCIA

(Formación de gases)

(Ver también *Dispepsia*)

✗ Flatulencia con hinchazón y ruido fuerte en el abdomen.	Thuy. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
✗ Dolor de estómago y flatulencia; se agrava con el olor de los alimentos.	Colch. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
✗ Con el abdomen distendido, afectando al bajo vientre; mejora eructando y ventoseando. Empeora de 4 a 8 p.m.	Lyc. 30	C/. 4 h.
✗ Flatulencia en la parte superior del abdomen, con presión hacia arriba; todo lo que se come produce gases y mejora eructando y ventoseando; empeora por la noche y después de echarse.	Carbo-veg. 30	C/. 4 h.
✗ Flatulencia y distensión del abdomen; no se alivia al ventosear; digestión lenta.	China 30	C/. 4 h.
❑ Cuando se forman los gases alrededor del ombligo. No se emiten flatos por la boca ni por el ano, durante mucho tiempo.	Raph. 30	C/. 4 h.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
★ Con eructos fuertes.	Asaf. 30	C/. 4 h.
□ Flatulencia con ardor como el sabor de la pimienta roja en la parte superior del abdomen y sube a la garganta.	Caps. 30	C/. 4 h.
□ Toda la comida o bebida que se toma se convierte en gas; dispepsia flatulenta.	Nux-m. 30	C/. 4 h.
★ Flatulencia debida a la vida sedentaria; efectos negativos del alcohol. Ganas de defecar, sin conseguirlo, con estreñimiento.	Nux-v. 30	C/. 4 h.
□ Flatos malolientes; las heces, aunque sean en poca cantidad, salen con gases; con mucho ruido en el abdomen.	Aloe. 30	C/. 4 h.
□ Acumulación de flatulencia en la región del hipocondrio; empeora al encolerizarse.	Cham. 30 o 200	C/. 4 h.
● Flatulencia; huele como huevos podridos; <i>es remedio intercurrente y el más eficaz.</i>	Psor. 30	C/. 3 h. (3)
★ Abdomen distendido, no se alivia al ventosear; ganas de tomar dulces; eructos sonoros.	Arg. Nit. 30	C/. 4 h.
Remedio bioquímico.	Biocom. No. 25	C/. 4 h.

GANGRENA

La gangrena ocurre por la obstrucción del suministro de sangre, la lesión o infección de un tejido.

□ Seca; especialmente de los dedos de los pies y de los pies. La zona se pone fría y entumecida; mejora con aplicaciones frías.	Sec-cor. 30 o 200	C/. 4 h.
□ Gangrena de mejilla; fiebre tifoidea como síntoma.	Bapt. 30 o 200	C/. 4 h.
□ Seca; especialmente de pulmones y útero, con dolor y sensación de ardor; mejora con aplicaciones calientes; inquietud y posturación.	Ars. 30 o 200	C/. 4 h.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
☐ Cuando la parte afectada se pone roja o azul, debido al envenenamiento de la sangre; se descompone la sangre.	Lach. 30	C/. 4 h.
☐ Húmeda; la parte afectada emite una descarga sucia; rezuma libremente.	Crot. 30	C/. 4 h.
☐ Húmeda. Enrojecimiento y frío helador; la parte afectada despidió una descarga sucia; el paciente quiere aire fresco y ventilación.	Carbo-veg. 30	C/. 4 h.
☐ Especialmente de pulmones y útero en la vejez; mejora con el calor.	Kreos. 30	C/. 4 h.
☐ Gangrena de la mejilla; aversión a los alimentos; hipo, eructos pútridos frecuentes; lengua marrón, vómitos; descargas sucias y repugnantes.	Acid-mur. 30	C/. 4 h.
☐ Gangrena después de heridas mecánicas.	Sul-ac. 30	C/. 4 h.
	Remedio bioquímico	
	Sil. 30X	C/. 4 h.

Para uso externo: Loción de Echi. a.

GARGANTA, molestias de

(Ver también Ronquera)

❖ Por exposición a corrientes de aire frío y seco; repentina con ansiedad y miedo.	Acon. 30 o 200	C/. 3 h.
☐ Sequedad y ardor en la garganta; sed insaciable de pequeñas cantidades de agua con frecuencia.	Ars. 30	C/. 3 h.
❖ Con exceso de saliva; formación de pus, sin dolor, en la garganta.	Merc. 30	C/. 3 h.
☐ Dolor fuerte; empeora al intenta tragar saliva en vacío; sólo se pueden tragar líquidos; amígdalas hinchadas.	Bar-c. 200 o 1M	C/. 10 m. (3)

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
☆ Por congestión; garganta roja, caliente e hinchada, con ardor.	Bell. 30	C/. 3 h.
☆ Con formación de pus; dolor penetrante y como golpes; paciente hipersensible al frío, al tacto, etc.	Hep. 30	C/. 3 h.
□ Con inflamación de color púrpura en la garganta; no se soporta la presión de la ropa en la garganta.	Lach. 30	C/. 4 h.

Para uso externo: ***Hacer gárgaras tres veces al día, con Phyt. Ø, de 8 a 10 gotas en medio vaso de agua templada.***

GARROTILLO

El garrotillo se convierte en una enfermedad peligrosa si no se atiende a tiempo. Se trata de una inflamación peculiar de las membranas que cubren el tubo respiratorio, que termina en la secreción de una membrana opaca, densa y viscosa, como la clara de huevo cocida, cuando se desarrollan plenamente los síntomas. Estos síntomas pueden aparecer como un resfriado común después de estar expuesto a cambios atmosféricos fríos o húmedos, a una corriente de aire frío, etc., con tos, estornudos, ronquera y fiebre. Al poco tiempo, la tos se hace profunda, con ronquera y un sonido como si la respiración pasase por un tubo metálico.

- Ataque repentino; empeora después de estar expuesto a una corriente de aire seco y frío (*primer día de tratamiento*). Acon. 200 C/. 15 m. (3)
- Ataque repentino (*segundo día de tratamiento*). Spong. 200 C/. 4 h. (3)
- Cuando la tos es floja, con mucho ruido (*tercer día de tratamiento*). Hep. 200 C/. 4 h. (3)
- ❖ Los mejores resultados se obtienen dando una dosis de **Acon. 200**, en primer lugar; al cabo de 3 horas, una dosis de **Hep. 200**, y, al cabo de 4 horas, una dosis de **Spong. 200** y, después de esto, **Hep. 200** y **Spong. 200**, alternando C/. 4 h. (2 dosis cada vez).

- Cuando hay muchos ruidos en el pecho; lengua con capa blanca, expectoración difícil. Ant-tart. 200 C/. 10 m. (3)

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
<input type="checkbox"/> Ruido en el pecho; lengua limpia.	Ip. 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Ataques recurrentes, cuando hay formación de membrana; flema fibrosa.	Kali-bi. 30 o 200	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Tos espasmódica.	Cupr-met. 30	C/. 4 h.
Remedios bioquímicos (En etapa aguda)		C/. 3 h.
Ferr-p. 6X, Mag-p., 6X y Kali-m. 6X		

GASTROENTERITIS

(Ver *Diarrea*)

GLÁNDULAS MAMARIAS

<input type="checkbox"/> Sin desarrollar; con útero y ovarios infantiles. Para que se desarrollem mejor los órganos femeninos.	Pitu-gl. 200	Quinc. (6)
★ Pechos sin desarrollar y arrugados; con útero y ovarios infantiles; debilidad general y sexual.	Sabal. Ø, 5-10 gt.	C/. 4 h.
★ Pechos sin desarrollar, con útero y ovarios infantiles; dolor en los pechos y picor en los pezones.	Onos.	Mensual (3)
★ Atrofia; mamas laxas y encogidas, dolorosas al tacto.	Con. 200 o 1M	Sem. (6)
★ Atrofia; tumores dolorosos, con secreción indebida de leche. Pechos muy grandes, con tumor.	Chim. Ø o 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Abscesos; fistula de glándulas mamarias; picor doloroso. Ganas de tomar bebidas frías.	Phos. 200	C/. 4 h. (3)
<input type="checkbox"/> Erupciones de las glándulas mamarias; sensación de ardor y presión por todas partes.	Piper-n. 30	C/. 4 h.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
★ Dolor detrás de las glándulas mamarias; empeora con el calor; pérdida de sed; ganas de estar al aire libre.	Puls. 30 o 200	C/. 4 h.
● Glándulas mamarias sensibles; dolores agudos y cortantes en los ovarios; empeora por la noche.	Syph. 200 o 1M	Sem. (3)
□ Dolor de las glándulas mamarias.	Symp. 6 o 30	C/. 4 h.
□ Ulceración de las glándulas mamarias; picor y ardor.	Paeon. Ø o 6	C/. 4 h.
□ Dolor en el espacio que hay entre los dos senos; debajo de las glándulas mamarias; insomnio sexual y trastornos gástricos.	Raph. 30 o 200	C/. 4 h.
★ Tumores de los pechos; duros y sensibles; cuando mama el niño, se extiende el dolor desde los pezones a todo el cuerpo.	Phyt. 30 o 200	C/. 4 h.
□ Concavidades en los pechos; paciente friolera.	Sil. 12X o 30	C/. 4 h.

GLÁNDULAS, enfermedades de las

(Ver *Bocio* y *Amigdalitis*)

★ Dureza de piedra en las mamas de la mujer, con nudos duros, bocio, etc.	Cal-f. 12X o 30	C/. 4 h.
□ Por ulceración de los ganglios cervicales.	Rhus-v. 30	C/. 4 h.
□ Edurecimiento de las glándulas paratiroides; abultamiento del bocio y otras glándulas.	Brom. 30	C/. 4 h.
□ Hinchazón de las glándulas inguinales.	There-ch. Ø o 6	C/. 4 h.
□ Endurecimiento de las glándulas submasilares.	Pin-s. 6 o 30	C/. 4 h.
□ Glándulas duras como piedras; debilidad progresiva; especialmente en solterones, tanto hombres como mujeres.	Con. 200 o 1M	Sem. (3)

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
◻ Hinchazón de las glándulas del lado izquierdo; dureza y enrojecimiento.	Merc-bin-i. 3X o 6	C/. 4 h.
☆ Abultamiento de las glándulas; amígdalas, tiroides, etc.	Cal-i. 3X o 6	C/. 4 h.
◻ Hinchazón de las glándulas del lado derecho; dureza y enrojecimiento.	Merc-p-i. 3X o 6	C/. 4 h.
● Remedio intercurrente.	Tub-k. 200 o 1M	Sem. (3)
Remedio bioquímico:		
Olor escrofuloso de las glándulas		Cal-p. 6X, Kali-m. 6X y Sil. 30X
		Nat-p. 6X

GONORREA

Salida involuntaria de líquido mucopurulento, contagioso, con dolor y ardor de uretra. Enfermedad de transmisión sexual, causada por *Neisseria gonorrhoeae*. Es la enfermedad más común y más frecuente, transmitida en las relaciones sexuales, incluido el sexo oral y anal.

◻ Reprimida; para restablecer la exudación o cuidar los efectos nocivos de la supresión o miasma psicótico.	Med. 200 o 1M	Sem. (3)
◻ Secundaria; historial de gonorrea repetitiva e impotencia.	Agn. 200	Sem. (3)
◻ Ardor al orinar; necesidad frecuente; cierre espasmódico del esfínter de la vejiga.	Cann-s. 200 o 1M	Sem. (3)
◻ Ardor intenso; excitación sexual, necesidad constante de orinar, orina sanguinolenta.	Canth. 30 o 200	C/. 4 h.
◻ Resulta muy difícil empezar a orinar; ardor y quemazón durante la micción y cansancio después.	Chim. Ø o 200	C/. 4 h.
◻ Orina frecuente; ardor después de orinar; orina escasa y rojiza, inflamación de la uretra.	Kali-bi. 30 o 200	C/. 4 h.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
❑ Cistitis, con dolor fuerte en el tracto urinario y la vejiga; casi sale sangre, en vez de orina.	Nit-ac. 30 o 200	C/. 4 h.
❑ Fuerte descarga sucia debida a la supresión de la gonorrea; hematuria; orina fuerte, dolor cortante al pasar la orina.	Puls. 30 o 200	C/. 4 h.
❑ Retención de la orina; orina que desuella; orina blanca, rojiza.	Sulphur 30 o 200	C/. 4 h. (3)
❑ Descarga clara, verdosa; quemazón al orinar; dolores reumáticos.	Thuy. 200 o 1M	Sem. (3)
Remedios bioquímicos		Ferr-p. 6X, Kali-m. 6X, C/. 4 h. Nat-p. 6X y Sil. 30X

GORDURA

(Ver también *Obesidad*)

❑ Con apetito excesivo; obesidad después de una operación abdominal; ganas de comer huevos; paciente friolero.	Cal-c. 200 o 1M	C/. sem. (6)
❑ Si falla Cal-c.; recomendado para personas que sufren bocio.	Fuc. Ø, 20-30 gt.	C/. 4 h.
❑ Acompañado de piel malsana. Obesidad durante la menopausia; estreñimiento.	Graph. 200	C/. 6 h.
❑ En personas tímidas y emotivas; pérdida de sed, se encuentra mejor al aire libre.	Puls. 200	C/. 6 h.
● Por mal funcionamiento de la glándula tiroides.	Thyr. 200 o 1M	Quinc. (6)
❑ Para reducir grasas del cuerpo (disponible también en tabletas).	Phyt. berry Ø, 10-15 gt.	C/. 4 h.
❑ Obesidad; aunque se reduce la carne, los músculos se ponen más duros y firmes.	Calo. 30 o 200	C/. 6 h.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
❑ Obesidad; especialmente en nalgas y muslos.	Am-m. 200	C/. 6 h.
❑ Obesidad por problemas gástricos; estreñimiento; la lengua tiene una capa blanca densa, como si la hubiesen pintado de blanco.	Ant-c. 200	C/. 6 h.
Remedios bioquímicos		Cal-p. 6X, Nat-m. 12X C/. 4 h. y Sil. 30X

GOTA

(Ver *Artritis*, etc.)

GRANOS

(Ver *Acné*)

GRIPE

(Ver también *Resfriado, catarro y coriza*)

- ❖ Remedio capital; inquietud, con postración y mucha sed a intervalos cortos. **Ars. 30** C/. 4 h.
- Remedios intercurrentes. **Influ. 200 y Sulphur 200**
- ❖ Primera etapa, con frío y estornudos; pesadez y cansancio del cuerpo y las extremidades; pérdida de sed; parece que estalla la cabeza; se siente alivio al arrojar grandes cantidades de orina pálida. **Gels. 30 o 200** C/. 4 h.
- ❖ Dolores fuertes en las extremidades y la espalda; los huesos parecen rotos, estalla la cabeza; escalofríos en la espalda, irritación en el globo ocular. **Eup-per. 30 o 200** C/. 3 h.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
<input type="checkbox"/> Postración rápida; fiebre alta, síntomas gástricos; enrojecimiento de la cara; nerviosismo.	Kali-p. 6X o 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Tos seca; dolor de cabeza que empeora al mínimo movimiento; ganas de estar quieto y solo; mejora con la presión; lengua con capa blanca; mucha sed.	Bry.. 30 o 200	C/. 4 h.
❖ Paciente muy friolero; siente frío hasta en la cama; el mínimo movimiento o exposición aumenta la sensación de frío; escalofríos después de beber; dolor en las extremidades y la espalda; se atasca la nariz por la noche.	Nux-v. 30 o 200	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Dolor fuerte en la espalda y los muslos; frío que no se puede quitar con ningún fuego ni calor; pulso rápido, con temperatura desproporcionadamente alta; inquietud; pulsaciones violentas; se siente todo el cuerpo magullado.	Pyr. 200	C/. 3 h. (3)
Remedios bioquímicos		
	Ferr-p. 6X, Kali-m. 6X y Nat-s. 12X	C/. 3 h.

GUSTO

<input type="checkbox"/> Todo sabe amargo, excepto el agua.	Acon. 30 o 200	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Todo sabe amargo; en pacientes de tuberculosis.	Stann.. 30 o 200	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Amargan hasta los dulces.	Rumex. 30 o 200	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Se tiene un sabor amargo en la boca; pero los alimentos y las bebidas tienen un sabor normal.	Nux-v. 30 o 200	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> El azúcar sabe amargo.	Sang. 30 o 200	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Las ciruelas saben amargas.	Iod. 30 o 200	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> El agua sabe amarga.	Ars. 30 o 200	C/. 4 h.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
----------	----------	--------------------------

HALITOSIS

<input type="checkbox"/> Descargas pútridas y aliento fétido.	Carb-ac. 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Con sabor metálico y salivación excesiva.	Merc. 30	C/. 4 h.
● Remedio intercurrente.	Psor.	Sem. (3)
	Remedio bioquímico	Kali-p. 6X

HEMATURIA

Cualquier condición en la que la orina contenga sangre o glóbulos rojos (hemorragia del sistema urinario que puede deberse a infecciones, etc.) se llama hematuria. La hemorragia puede proceder de los riñones, el uréter, la vejiga o la uretra. Por eso, hay empezar siempre por buscar la causa y poner después el tratamiento adecuado.

<input type="checkbox"/> Al principio; flujo de sangre de color rojo chillón, con fiebre y ansiedad.	Acon. 30 o 200	C/. 2 h.
<input type="checkbox"/> Debido a alguna lesión mecánica o infección; dolor en el paso urinario.	Arn. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
✗ Cuando se deba a hemorragia de los riñones; sedimentos como café molido en la orina; presión en la vejiga, que se extiende a los riñones.	There-ch. Ø	5-7 gt. C/. 3 h.
✗ Con sedimentos rojos en la orina; debido a hemorragia de los riñones, la vejiga o la uretra.	Ocimum can. 30 o 200	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Con sedimentos oscuros, espesos, como polvo de ladrillos en la orina; retención de orina; algunas veces, este remedio sustituye el uso del catéter.	Thlas. bur-p. Ø,	5-7 gt. C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Cuando la orina contiene sangre de color rojo chillón; náuseas constantes, lengua limpia.	Ip. Ø o 30	C/. 3 h.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
□ Sin dolor ni ninguna otra molestia; acompañada de temperatura por debajo de lo normal.	China sulph 30	C/. 4 h.
□ Los pacientes se desmaya por hemorragia excesiva; le apetece la ventilación; sangre oscura y grumosa.	China off. Ø o 6	C/. ½ h.
□ Sangre de color rojo brillante, grumosa; sale repentinamente a borbotones.	Erig. Ø,	5-7 gt. C/. 3 h.
☆ Dolor de ardor antes, durante y después orinar; aumenta después de beber agua; se orina gota a gota.	Canth. 30	C/. 4 h.
□ Cuando se debe a excesos de vino y bebidas alcohólicas; o a problemas imprevistos de hemorroides; dolor de espalda y picor en la uretra; paciente friolero.	Nux-v.	C/. 4 h.
□ Orina sanguinolenta, con sensación de ardor; dolor en la zona del los riñones y el hígado. El paciente ansía las bebidas frías.	Phos. 30 o 200	C/. 4 h.
Remedios bioquímicos		C/. 3 h.
	Ferr-p. 3X. y Kali-p. 6X	

HEMORRAGIA DE ENCÍAS

☆ Dolor de encías; hemorragia después de una extracción dental.	Arn. 200 o 1M	C/. ½ h. (3)
☆ Encías hinchadas y sensibles al calor y el frío; empeora por la noche; encías enfermizas, exceso de saliva.	Merc. 30	C/. 4 h.
☆ Hemorragia fácil y pasiva, la sangre no coagula con facilidad.	Phos. 30 o 200	C/. 6 h. (3)
□ Hemorragia excesiva de las encías. Flatulencia; eructos picantes y ácidos.	Sal-ac. 30	C/. 4 h.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
❑ Drenaje de sangre densa y descompuesta. Encías hinchadas, porosas, sensibles al tacto que sangran con facilidad; empeora por la mañana.	Lach. 30 o 200	C/. 6 h. (3)
❑ Encías contraídas que sangran fácilmente; piorrea.	Carbo-veg. 3X o 6	C/. 3 h.
Remedio bioquímico	Ferr-p. 3X	C/. 4 h.

HEMORRAGIA NASAL

(Ver *Epistaxis*)

HEMORRAGIA VAGINAL

❑ Continúa la hemorragia (al día siguiente) después del coito.	Kreos. 30 o 200	C/. 10 m. (3)
❑ Hemorragia en la vagina después de amamantar; paciente friolera.	Sil. 6X o 30	C/. 4 h.
Remedios bioquímicos	Ferr-p. 3X y Nat-m. 6X	C/. 4 h.

HEMORROIDES

(Ver *Hemorroides sanguíneas* y *Hemorroides secas*)

HEMORROIDES SANGRANTES

● Remedio capital: hemorragia y estreñimiento.	Sulphur 1M	Sem. (3)
★ Para hemorroides sanguíneas; sólo mientras dura la hemorragia.	Dol. Ø,	4-5 gt. C/. 6 h.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
★ Si no da resultado Dolichos Ø ; sangre de color rojo vivo.	Mill. Ø, o 200	5-10 gt. C/. 4 h.
□ Sangre de color rojo vivo; la droga india comprobada.	Fic-r. Ø,	5-10 gt. C/. 4 h.
★ Sangre oscura grumosa (venosa); dolor; hemorroides y palpitaciones en el recto.	Ham. Ø,	5-10 gt. C/. 4 h.
★ Cuando la hemorragia es pequeña y sale con las heces.	Phos. 200	C/. 10 m. (3)
★ Con estreñimiento o alternando con diarrea; pérdida de apetito; en especial, durante el embarazo; hemorroides dolorosas y sanguinantes.	Coll. 30 o 200	C/. 4 h.
□ Antigua medicina india para hemorroides sanguinantes.	Blumea od. Ø,	5-10 gt. C/. 4 h.
□ Hemorroides dolorosas y sanguinantes; dolor fuerte después de defecar, que dura varias horas.	Nit-ac. 200 o 1M	C/. 10 m. (3)
□ Con ardor; picor, escozor y punzadas en el ano al defecar.	Caps. 30	C/. 4 h.
□ Hemorroides ciegas y sanguinantes; empeora durante el climaterio.	Aesc. 30 o 200	C/. 4 h.
Remedio bioquímico	Ferr-p. 3X	C/. 4 h.

HEMORROIDES SECAS

- Remedio capital para las hemorroides secas o ciegas; picor y ardor en el ano. **Sulphur 200 o 1M** *Quinc. (3)*
- ★ Hemorroides; con dolor de la región lumbo-sacral; el ano parece como lleno de palitos o como si arrastrasen un pincho. **Aesc. 6 o 30** C/. 4 h.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
❑ Hemorroides; como cebollas, de color púrpura; golpes y palpitaciones en el ano.	Lach. 30 o 200	C/. 4 h. (6)
✗ Estreñimiento, debido a llevar una vida sedentaria. Ganas frecuentes de defecar, con picor y punzadas en el recto; golpes y presión después de defecar; empeora tomando bebidas alcohólicas; después de hacer un esfuerzo mental o de comer.	Nux-v. 30	C/. 4 h.
❑ Hemorroides con sensación de mordisco; dolor de ano; fisuras y ulceración en el ano. Ano húmedo debido a que rezuma constantemente.	Paeon. Ø o 6	C/. 4 h.
❑ Hemorroides con prolapso de ano. Protrusión del recto después de defecar.	Podo. 30 o 200	C/. 4 h.
✗ Fisuras profundas o superficiales en el ano. Dolor después de defecar, como si hubiese trocitos de vidrio clavados en el ano y en el recto. Calor y dolor en el ano, tan fuertes que el paciente no puede estarse quieto. Constricción del orificio.	Rat. 6 o 30	C/. 4 h.
❑ Las hemorroides se salen como racimos de uvas, después de defecar; se alivian con agua fresca.	Aloe. 6 o 30	C/. 4 h.
❑ Hemorroides mucosas (sale mucus por el ano); lengua con una capa blanquecina.	Ant-c. 30 o 200	Sem. (3)
✗ Hemorroides con punzadas y ardor; mejoran con aplicaciones frías.	Apis. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
❑ Hemorroides con ardor doloroso; mejoran con aplicaciones calientes.	Ars. 30	C/. 4 h.
✗ Hemorroides; cualquier problema del ano o el recto que produce un dolor insoportable al andar.	Caust. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
❑ Sensación de que nos meten por el recto un hierro al rojo vivo; mejora al aplicar agua fría.	Kali-c. 30 o 200	C/. 4 h. (3)

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
<input type="checkbox"/> Hinchazón y protrusión de las hemorroides con hemorragia; aunque no haya estreñimiento. El paciente está muy incómodo por la formación de gases. Hemorroides con mucha sensibilidad al tacto; no soporta ni el contacto de la ropa.	Acid-mur. 30 o 200	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Ano húmedo, con fisuras y dolorido; rodeado de verrugas fofas. Contracción violenta con ardor y punzadas en el ano, seguidas de dolores muy fuertes.	Thuy. 200 o 1M	Sem. (6)
<input type="checkbox"/> Las hemorroides se salen siempre que orina el paciente.	Bar-c. 200 o 1M	Sem. (3)
Remedio bioquímico	Cal-f. 12X	C/. 4 h.

HERNIA

Se llama hernia a la protrusión de un órgano o parte de él o de cualquier otra estructura a través de la pared de la cavidad que suele contenerla.

<input type="checkbox"/> Hiato; con dolor de abdomen; empeora al echarse; el paciente se siente mejor al aire libre.	Puls. 30 o 200	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Inguinal; dolorosa; suele ir acompañada de estreñimiento, paciente friolero.	Sil. 12X o 30	C/. 4 h.
☆ Inguinal; del lado izquierdo; umbilical; empeora por la mañana y cuando se tiene estreñimiento; paciente friolero e irritable.	Nux-v. 30 o 200	C/. 4 h.
☆ Inguinal o estrangulada; del lado derecho; paciente propenso a tener problemas gástricos.	Lyc. 30 o 200	C/. 4 h.
● Cuando fallan los remedios bien elegidos.	Cocc. 200	C/. 4 h. (3)
<input type="checkbox"/> Inguinal; tristeza, pensamientos suicidas.	Aur. 200 o 1M	Sem. (3)
<input type="checkbox"/> Encarcelada; con inquietud y ardor doloroso.	Acon. 200	C/. 4 h.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
<input type="checkbox"/> Encarcelada o estrangulada; el paciente no puede tolerar el contacto de la ropa sobre el abdomen.	Lach. 30 o 200	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Incrcerada o estrangulada; con incomodidad y flatos fétidos; mejora al soltar flatos o eructar.	Carbo-veg. 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Encarcelada; con inquietud y sensación de ardor; sed insaciable, se bebe a sorbos pequeños y frecuentes.	Ars. 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Estrangulada; con náuseas mortales.	Tab. 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Estrangulada; otros tipos de hernia; con dolor en la zona del ombligo.	Plb. 30	C/. 4 h.
★ Encarcelada o estrangulada; con vómitos de materia feCale.	Op. 200 o 1M	C/. 4 h. (3)
★ Para todos los tipos de hernia; cuando las paredes del abdomen son delgadas.	Cal-c. 200 o 1M	Sem. (3)
<input type="checkbox"/> Hernia de la vejiga.	Staph. 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Hernia femoral.	Wies. 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Hernia umbiliCale.	Gran. 30	C/. 4 h.

HERPES ZÓSTER

Es una infección producida por el virus Herpes de la varicela, que se caracteriza por una erupción de grupos de vesículas en una parte del cuerpo que sigue el recorrido de un nervio. Esta situación se limita por sí misma; pero puede ir acompañada o seguida de fuertes dolores post-herpéticos.

★ Remedio capital (con fiebre, inquietud, picor, ardor y hormigueo).	Rhus tox. 30 o 200	C/. 3 h.
★ Con dolor y punzadas, inquietud y ansiedad.	Ars. 30 o 200	C/. 4 h.
★ Del lado derecho; con ardor muy fuerte.	Canth. 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> De espalda; hipersensible al frío.	Cist. 30	C/. 4 h.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
□ En las piernas; dolor y palpitaciones que empeoran con el calor.	Com. 30	C/. 4 h.
□ Picor y ardor doloroso con enrojecimiento de la piel; formación de vesículas y pústulas; desecación, desescamación y caída de la pústulas.	Crot-t. 30	C/. 4 h.
□ Ardor en la cara; mejillas inflamadas, con sensación de aburrimiento y como si royesen escarbasen de las encías a los oídos; picor y hormigueo en las mejillas.	Euph. 30	C/. 4 h.
□ Especialmente en el lado izquierdo; se rezuma una descarga pegajosa; estreñimiento.	Graph. 30 o 200	C/. 4 h.
□ Del lado derecho, seguido de trastornos gástricos.	Iris. 30	C/. 4 h.
☆ Facial, en primavera y otoño; de color púrpura.	Lach. 30 o 200	C/. 4 h.
□ Para aliviar el dolor y evitar que aparezcan brotes nuevos. Del lado derecho, extendiéndose por el abdomen.	Merc. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
□ Con dolor y picor; ardor después de rascarse; costras marrones en las erupciones.	Mez. 30	C/. 4 h.
□ Empeora después de tomar bebidas frías o con el humo del tabaco; trastornos gástricos; se agrava por la noche, pasando a un estado más sereno, decaído y llorón.	Puls. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
□ Con ardor y picor fuertes; empeora con el contacto y el movimiento; precede una neuralgia intercostal, debida a alcoholismo.	Ran-b. 30	C/. 4 h.
● Por gonorrea suprimida; ardor después de rascarse.	Thuy. 200	C/. 3 h. (3)
□ Con dolor lacerante; herpes supurante.	Zinc-met. 30	C/. 4 h.
□ Erupciones; hinchazón; ardor y punzadas; mejora con aplicaciones frías.	Apis. 30	C/. 4 h.
□ Por trastornos digestivos; hábitos sedentarios; vida licenciosa en cuanto a las mujeres y el vino.	Nux-v. 30	C/. 4 h.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
❑ Violento; empeora con las bebidas calientes; miedo a la oscuridad.	Stram. 30	C/. 4 h.
❑ Herpes de labios de los genitales.	There-ch. 30	C/. 4 h.
❑ Neuralgia facial después del herpes zóster.	Kalm. 30	C/. 4 h.
	Remedio bioquímico	
	Kali-m. 6X y Nat-m. 12X	C/. 4 h.

HIDROCEFALIA

Acumulación anormal de fluido cerebroespinal dentro del cráneo, que puede afectar a las cavidades ventriculares y espacios generales. Debido a esta distensión, los huesos del cráneo se expanden y se deforma el cráneo. Esta complicación puede ser congénita o adquirida.

❑ Aflujo de sangre a la cara y la cabeza; cara enrojecida; fiebre, dolor de cabeza fuerte.	Bell. 30	C/. 4 h.
★ Acumulación de fluido rápido; el paciente grita de dolor; pérdida de sed.	Apis. 30 o 200	C/. 4 h.
★ Fontanelas abultadas; supresión de la orina; movimiento constante e involuntario de una pierna.	Apoc. Ø o 30	C/. 4 h.
● Cuando hay un historial de tuberculosis en la familia del paciente.	Tub-k. 1M	Quinc. (3)
❑ Movimiento de cabeza; sacudidas de los músculos durante el sueño; nerviosismo en los pies; el paciente mete la cabeza en la almohada y grita.	Zinc-met. 30 o 200	C/. 6 h.
❑ Suspensión de los sentidos; inconsciencia con gritos; supresión de la orina; los ojos no reaccionan a la luz; movimiento involuntario de la mitad del cuerpo; inicio de una etapa de parálisis.	Hell. 30 o 200	C/. 6 h.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
□ Despues del sarampión o la escarlatina; sudor en la cabeza, sin alivio; quejidos; el paciente mueve constantemente la cabeza.	Merc. 30 o 200	C/. 6 h.
● Historial de tuberculosis o sífilis en la familia; dolor fuerte de cabeza; mejora al aire libre.	Kali-i. 30 o 200	C/. 6 h.
● Estupor; sudor frío; el paciente grita mientras duerme; histórico de supresión de erupciones.	Sulphur 200 o 1M	C/. 10 m. (3)
□ Suda toda la cabeza; la cara y las manos están frías; sudor maloliente en los pies; sueño con sobresaltos; paciente friolero.	Sil. 30 o 200	C/. 4 h.
□ En casos crónicos; el paciente se siente peor durante el sueño y después de él.	Lach. 200 o 1M	Sem. (3)
□ Sudor del cuero cabelludo durante el sueño; cabeza grande; ganas de comer huevos. Niño débil, aunque esté gordito.	Cal-c. 200 o 1M	Quinc. (3)
Remedio bioquímico	Cal-p. 6X	C/. 4 h.

HIDROCELE

(Ver también *Orquitis*)

Acumulación de fluido seroso en una cavidad que tiene forma de bolsa. Concretamente, se llama hidrocele a la hidropesía de la túnica serosa del testículo.

- ★ Por lesión, punzadas en el escroto; testículos duros, hinchados y sensibles. **Arn. 200 o 1M** Sem. (6)
- ★ Congénita; testículos hinchados; dolor muy fuerte; testículos cuelgan; el izquierdo queda más bajo. **Puls. 200 o 1M** Sem. (6)
- Con endurecimiento de los testículos; especialmente en la juventud. **Sulphur iod. 3X o 6** C/. 4 h.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
❖ Testículos pesados y doloridos; aumentan de tamaño; duros, en especial después de alguna lesión.	Con. 200 o 1M	Sem. (6)
❖ Testículos recogidos hacia arriba; hinchados, dolorosos, duros; peor el del lado derecho; cuando el aire está frío y antes de una tormenta.	Rhod. 200 o 1M	Sem. (6)
❖ Hinchazón y dolor intenso en el testículo derecho, como si se tuviese una magulladura; atrofia de los testículos; tristeza.	Aur. 200 o 1M	Sem. (6)
◻ Punzadas en los testículos cuando se está sentado; tensión dolorosa en la ingle, desde el testículo derecho, a lo largo del cordón espermático.	Bry.. 200	C/. 6 h.
◻ Lasitud; parece que va a desprenderse para siempre; el dolor mejora al caminar.	Fl-ac. 200 o 1M	Sem. (6)
◻ Hidrocele con enfermedades de la piel; estreñimiento.	Graph. 200 o 1M	Sem. (6)
◻ Testículos juntos; el dolor empeora al acostarse y por la noche, presión en los cordones espermáticos; caídos.	Sil. 200 o 1M	Sem. (6)
● Remedio intercurrente	Sulphur 200 o 1M	Quinc. (3)
Remedio bioquímico	Cal-f. 12X	C/. 4 h.

HIDROFOBIA

Rabia

No se ha establecido un tratamiento homeopático para la hidrofobia. Hay que llevar al paciente rápidamente al hospital.

Cuando se ha desarrollado la enfermedad, requiere, en primer lugar, “la eliminación de toda causa de excitación; la separación del paciente de todo lo que se piense que puede alterarlo o inquietarlo; el mantenimiento de la máxima tranquilidad; que se le dé un trato cariñoso (en vez de medidas coercitivas) y que se procure un ambiente tranquilo, para que el paciente esté tranquilo” (Bollinger).

Hasta hospitalizarlo, se puede intentar darle los remedios siguientes.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
❑ Cara congestionada; mirada fija y violenta, pupilas dilatadas, sensibilidad a la luz del sol y objetos brillantes; dolor de garganta, espasmos de garganta, ronquera, voz de perro; imposibilidad de tragar; opresión, inquietud, alucinaciones; mordiscos y castañeteo de dientes, convulsiones.	Bell. 30 o 200	C/. ½ h.
❑ Cuando no se puede tragar por la inflamación y no sólo por espasmos de la garganta; después del dolor que se produce al tragar, dan espasmos; también cuando hay priapismo.	Canth. 200 o 1M	C/. 10 m. (3)
❑ Cuando la piel se pone rojiza, con bordes duros e hinchados. Miedo al agua.	Hydroph. 200 o 1M	C/. 10 m.(3)
❑ Convulsiones generales, más fuertes que los espasmos de garganta. Se interrumpe el sueño, como por un susto, seguido de convulsiones.	Hyos. 200 o 1M	C/. 10 m. (3)
❑ Miedo a peligros imaginarios; mucha movilidad e inquietud, con quejidos; miedo a la oscuridad.	Stram. 200 o 1M	C/. 10 m. (3)
❑ En la peor etapa del desarrollo de la enfermedad.	Lach. 200 o 1M	C/. 10 m. (3)

HIPERACIDEZ

(Ver *Acidez*)

HIPERPIREXIA

(Ver *Fiebre*)

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
HIPERTENSIÓN		
Presión Alta de la Sangre		
❖ Remedio capital; con nerviosismo (durante el embarazo, aplíquese con precaución).	Rauw. Ø,	5-10 gt. C/. 4 h.
❖ Con depresión; tendencia suicida y síntomas cardiacos.	Aur. 200 o 1M	C/. 10 m. (3)
❖ Con arterioesclerosis y paresia senil.	Aur-i. 30	C/. 6 h.
❖ Con senilidad y cambios de conducta seniles.	Bar-c. 200 o 1M	Sem. (3)
❖ Presión sistólica alta y diastólica, muy baja.	Bar-m. 3X o 6X	C/. 4 h.
❖ Con constricción en la región del corazón y dolor inguinal.	Cat. Ø o 30	C/. 3 h.
❖ Para pacientes obesos y débiles; sudor en la cabeza, las palmas de las manos y las plantas de los pies, ganas de comer huevos; paciente friolero.	Cal-c. 200 o 1M	Sem. (3)
❑ En la senectud; solterones y solteronas.	Con. 200 o 1M	Sem. (3)
❖ Palpitación al menor esfuerzo; disnea, insomnio y problemas gástricos.	Crat. Ø o 30	C/. 4 h.
❑ Debido a un trauma (ruptura sentimental, etc.); problemas emocionales.	Ign. 200 o 1M	C/. 4 h. (3)
❑ Por congestión cerebral; dolor de cabeza fuerte, desfallecimiento y vértigo.	Glon. 3X o 6	C/. ½ h.
❑ De origen sifilitico; dolor lacerante en la cabeza y los huesos.	Kali-i. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
❑ De origen gástrico; flatulencia; ganas de tomar dulces y comidas calientes; empeora de 4 a 8 p.m.	Lyc. 30 o 200	C/. 4 h.
❑ Por un trauma o disgusto; hipertiroidismo, bocio, mal de Addisson, diabetes, etc. Ganas de tomar preparados salados.	Nat-m. 200 o 1M	C/. 10 m. (3)

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
<input type="checkbox"/> En casos de sífilis; angina de pecho; vértigo, disnea y endocarditis.	Nat-i.. 30 o 200	C/. 10 m. (3)
<input type="checkbox"/> En personas altas, inteligentes, hipertensas; ganas de tomar cosas frías y heladas, miedo a la oscuridad y a las tormentas, etc.	Phos. 30 o 200	C/. 10 m. (3)
<input type="checkbox"/> Con degeneración esclerótica, especialmente de la médula espinal.	Plb-i. 30 o 200	C/. 6 h.
<input type="checkbox"/> Por un disgusto; aprensión, pereza, pérdida de la sed, etc.	Gels. 30 o 200	C/. 3 h.
☆ En la etapa de la menopausia; empeora después de dormir; gran locuacidad.	Lach. 30 o 200	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Dolor de cabeza, como si fuese a estallar; mejora con aplicaciones frías y presión; vértigo; palpitaciones del corazón; empeora cuando se está solo; insomnio con pesadez de cabeza; hinchazón edematosa en la cara y las piernas.	Boerh-d. Ø o 6	C/. 4 h.
Remedio bioquímico	Cal-f. 12X, Sil. 12X y Kali-p. 6X	C/. 4 h.

HIPERTENSIÓN ESENCIAL

- ☆ Hipertensión esencial (sin ningún síntoma concreto). **Crat. Ø, Glon. Ø, 5 gt. C/. 4 h.
y Passi. Ø,**
- Por presión sistólica alta y diastólica baja. **Visc. Ø, 5-10 gt. C/. 4 h.**

Para la hipertensión esencial debe darse un tratamiento constitucional.

HIPO

- ☆ Despues de fumar, de comer o con problemas emocionales. **Ign. 200 o 1M C/. 10 m. (3)**
- ☆ Despues de fumar; empeora despues de tomar bebidas calientes. **Verat. 30 o 200 C/. 10 m. (3)**

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
<input type="checkbox"/> Después de fumar; empeora después de tomar bebidas frías o cuando se tiene fiebre; inquietud.	Ars. o 200	C/. ½ h.
☆ De origen gástrico; paciente friolero.	Nux-v. 30 o 200	C/. ½ h. (3)
<input type="checkbox"/> Después de la provocación más ligera, como reír, hablar o comer.	Caj. 30	C/. 3 h.
<input type="checkbox"/> Violento y ruidoso; asociado con convulsiones.	Cic. 30 o 200	C/. 2 h.
<input type="checkbox"/> Después de comer; asociado con convulsiones; empeora por la noche, durante un post-operatorio; histérico.	Hyos. 30 o 200	C/. 3 h.
Remedio bioquímico Espasmódico, con dolor		Mg-p. 6X C/. ½ h. en agua caliente

HIPOCONDRIASIS

(Ver diferentes enfermedades)

Atención exagerada a cualquier sensación insólita corporal o mental; una falsa creencia en que se está sufriendo alguna enfermedad. Como, en Homeopatía, el tratamiento está orientado siempre hacia la enfermedad, puede ser válido cualquier remedio que sea constitucional para la persona afectada.

HIPOTENSIÓN

Presión sanguínea baja

- ☆ Debida a pérdida de fluido; descargas agotadoras (vómitos, diarrea, y pérdida de sangre o semen, etc. excesivos). **China off. 30** C/. 4 h.
- ☆ Por baja vitalidad; flatulencia en la parte superior del abdomen, deseos de estar en aire fresco. **Carbo-veg. 6 o 30** C/. 4 h.
- Desmayos al calor del sol, ganas de tomar sal; sed excesiva y estreñimiento. **Nat-m. 12X o 30** C/. 4 h.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
□ Ganas de comer dulces; flatulencia en la parte inferior del abdomen; diatesis de ácido úrico.	Lyc. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
□ Con pulso lento y débil; vértigo, peso y opresión en el corazón, como si nos apretasen en él.	Visc. Ø o 30	C/. 4 h.
☆ Con palpitaciones y ritmo cardíaco irregular; sensación de que deja de latir y deja de moverse.	Gels. 30	C/. 4 h.
□ Por actividad sexual excesiva.	Acid-phos. 30	C/. 4 h.
Remedio bioquímico Para jóvenes que tienen un crecimiento rápido	Cal-p. 6X	C/. 3 h.

HIPOTIROIDISMO

La glándula tiroides sintetiza, almacena y segregá dos hormonas: la tiroxina y la tri-iodo-tiroxina. El iodo es un componente esencial de estas hormonas. La disminución de la función de la glándula tiroides se llama hipotiroidismo. Los principales síntomas son edema, aumento de peso y ensanchamiento de la piel, además de trastornos mentales. Es más frecuente en mujeres de 30 a 50 años.

☆ Falta de confianza en sí mismo; ausencia mental, propensión a sentirse ofendido; pérdida de memoria; se encuentra mejor después de comer.	Anac. 30 o 200	C/. 6 h.
☆ Timidez, conducta infantil; aversión a las personas extrañas; paciente friolero.	Bar-c. 200 o 1M	Sem. (3)
□ Historial de abortos; aumento de peso; edema de las extremidades y la cara.	Pyr. 200 o 1M	Sem. (3)
● En casos crónicos; como remedio intercurrente.	Tub-k. 1M	Quinc. (3)
☆ En personas solteras; obligadas al celibato; solterones de ambos sexos.	Con. 200 o 1M	Sem. (3)
☆ Melancolía, irritabilidad e inquietud; ganas de tomar dulces; no soportan que se les lleve la contraria.	Thyr. 3X o 30	C/. 4 h.
□ Con inquietud; adelgaza, aunque coma bien.	Iod. 30	C/. 4 h.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
☒ Miedo a la oscuridad y a las tormentas de truenos; pacientes delicados, anémicos; afición a los preparados fríos y salados.	Phos. 200	Sem. (3)
☒ Para pacientes calientes; sudan con facilidad; empeora con tiempo cálido y húmedo. Mejora con el movimiento, el ejercicio y cerca del mar.	Brom. 30	C/. 4 h.
Remedios bioquímicos.		Cal-p. 6X, Sil. 6X y Cal-f. 12X
HISTERIA		C/. 4 h.

☒ Cambios de humor; tan pronto ríe como llora.	Ign. 200 o 1M	C/. 10 m. (3)
☒ Por supresión o descarga repentina.	Asaf. 200	C/. 4 h. (3)
☒ Aprieta las mandíbulas; enfermedad por causas psíquicas; efectos nocivos de la tristeza, el miedo, la angustia, etc.	Nat-m. 200	C/. 4 h. (3)
☒ Se para de repente la respiración; empeora al ascender; disfunción de la pituitaria y de la tiroides.	Cal-c. 200 o 1M	C/. 10 m. (3)
☒ Sacude la cabeza hacia delante; bajo de forma.	Nux-m. 30 o 200	C/. 6 h.
☒ Estupor profundo; intento de desaparecer; manías obscenas y lascivas; el paciente se destapa.	Hyos. 200	C/. 4 h.

Remedio bioquímico	Cal-p. 6X, Kali-p. 6X y Nat-m. 12X	C/. 4 h.
---------------------------	---	----------

HORARIO

Agravación de los síntomas a una hora concreta

Como el horario altera al paciente en su conjunto, es muy útil tenerlo en cuenta para hacer una selección adecuada del remedio.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
<input type="checkbox"/> Empeora a medianoche; durante el descanso.	Rhus tox.	
<input type="checkbox"/> Empeora desde las 12 de la noche a las 3 de la madrugada.	Dros.	
<input type="checkbox"/> Empeora de 1 a 2 de la madrugada.	Ars.	
<input type="checkbox"/> Empeora antes de las 3 de la madrugada.	Nux-v., Thuy.	
<input type="checkbox"/> Empeora de 2 a 3 de la madrugada.	Kali-bi.	
<input type="checkbox"/> Empeora de 3 a 4 de la madrugada.	Hyper.	
<input type="checkbox"/> Empeora hacia las 3 de la madrugada.	Kali-c.	
<input type="checkbox"/> Empeora durante el día.	Med.	
<input type="checkbox"/> Empeora de 10 a 11 de la mañana.	Gels., Nat-m.	
<input type="checkbox"/> Empeora hacia las 11 de la mañana.	Ip., Sulphur	
<input type="checkbox"/> Empeora por la mañana.	Ign.	
<input type="checkbox"/> Empeora hacia las 2 de la tarde.	Cal-c.	
<input type="checkbox"/> Empeora hacia las 3 de la tarde.	Bell.	
<input type="checkbox"/> Empeora hacia las 4 de la tarde (fiebre).	Puls.	
<input type="checkbox"/> Empeora de 4 a 5 de la tarde.	Carbo-veg.	
<input type="checkbox"/> Empeora de 4 a 6 de la tarde.	Apis.	
<input type="checkbox"/> Empeora de 4 a 8 de la tarde.	Lyc.	
<input type="checkbox"/> Empeora de 5 a 6 de la tarde	Hep.	
<input type="checkbox"/> Empeora hacia las 7 de la tarde.	Rhus tox.	
<input type="checkbox"/> Empeora antes de las 12 de la noche.	Acon.	
<input type="checkbox"/> Empeora a las 12 de la noche.	Syph.	
<input type="checkbox"/> Empeora durante toda la noche, especialmente en la primera parte.	Merc..	

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
----------	----------	--------------------------

HUESOS, Afecciones de los

Incluidas lesiones y caries

★ Para todo tipo de lesiones de huesos.	Ruta-gt. 30	C/. 4 h.
★ Para huesos fracturados o rotos.	Symp. 3X o 6	C/. 4 h.
□ Caries; debida a la supresión del sudor de pies.	Sal-ac. 30	C/. 4 h.
□ Caries de los huesos cervicales.	Aur. 200	Sem. (3)
□ Caries de la espina dorsal.	Cal-c. 200 o 1M	Sem. (3)
□ Tuberculosis ósea.	Dros. 200 o 1M	Quinc. (3)

Remedios bioquímicos

Para fracturas y caries de huesos, etc.

Cal-p. 6X y Sil. 12X C/. 4 h.

Para caries de huesos; sudor abundante y mal oliente en la frente y los pies.

ICTERICIA

Coloración amarillenta de piel, mucosas y secreciones, debida a la existencia de un tipo de pigmentos biliares en la sangre.

□ Ictericia de un niño recién nacido; durante el embarazo. Dolor fuerte en la zona del hígado, con fiebre e inquietud.	Acon. 30	C/. 3 h.
□ Ictericia de un recién nacido. El niño llora mucho; mejora al cogerlo en brazos.	Cham. 30 o 200	C/. 4 h.
★ Al principio, cuando hay náuseas e indigestión con lengua limpia.	Ip. 30	C/. 3 h. (6)
★ Con dolores como repentino en el abdomen; molestias después de comer alimentos no vegetales; sed excesiva y estreñimiento.	Bry. 30 o 200	C/. 4 h. (6)

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
★ mal sabor; vómitos y dolor suave de cabeza; sensación de dolor en el hipocondrio al echarse del lado izquierdo. Lengua con una capa blanca, especialmente en el centro.	Card-m. Ø o 30	C/. 4 h.
★ Inflamación y dolor repentino en el hígado, que irradia en todas direcciones; hígado sensible al tacto; ojos pálidos.	Chel. Ø o 30	C/. 4 h.
□ Con náuseas constantes; ictericia, especialmente en el clímerio. Orina con espuma negra.	Lach. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
★ Cuando la ictericia se debe a catarro gástrico; hígado hinchado y sensible; digestión lenta; ictericia debida a excesos sexuales; pérdida de fluidos vitales.	China off. 6 o 30	C/. 4 h.
□ Ictericia debida a problemas gástricos; vida demasiado agitada. Ganas frecuentes de defecar, aunque sin efecto; paciente friolero.	Nux-v. 30 o 200	C/. 4 h.
● Remedio intercurrente.	Sulphur 30 o 200	Sem. (3)
□ Despues de abuso de quinina; sed insaciable e inquietud.	Ars. 30	C/. 4 h.
□ Ictericia complicada con una afección de hígado; heces malolientes, como greda, sucias y líquidas.	Podo. 30	C/. 4 h.
□ Flujo de sangre oscura por la nariz, la boca, el útero, el intestino, etc. Ictericia negra maligna.	Crot. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
□ Piel manchada de color amarillo, con la cara de color marón oscuro; hambre canina.	Iod. 30	C/. 4 h.
□ Ictericia con trastornos de hígado. Heces negras como el alquitran.	Lept. 30	C/. 4 h.
□ Ictericia con problemas muy arraigados del cerebro y de los pulmones, asociados con anemia.	Phos. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
□ Pérdida de apetito; con náuseas y vómitos; indigestión cuando se toma leche; dolor en el hipocondrio derecho; heces secas y duras; conjuntiva amarilla.	Asim. Ø o 30	C/. 4 h. (3)

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
<input type="checkbox"/> Para la “ictericia hemolítica”.	T.N.T. 200	Sem. (3)
	Remedios bioquímicos	
	Ferr-p. 6X, Kali-m. 6X y Nat-s. 12X	C/. 4 h.

IMPOTENCIA MASCULINA

✗ Falta de erección y deseo; para tonificar el sistema sexual.	Nuph. Ø, 5-10	C/. 4 h.
✗ Debida a la masturbación; erecciones sólo cuando se está medio dormido.	Calad. s. 30 o 200	C/. 6 h.
✗ Debido a edad avanzada; pérdida total del deseo (incluso en un joven); eyaculación precoz.	Lyc. 200 o 1M	Quinc. (3)
✗ Por excesos sexuales; debilidad e importancia.	Kali-br. 30	C/. 6 h.
✗ Por excesos sexuales; pene arrugado; espermatorrea; sensación de culpa.	Staph. 30 o 200	C/. 6 h.
<input type="checkbox"/> Por lesión.	Arn. 200 o 1M	Sem. (3)
<input type="checkbox"/> En personas obesas y fofas; por coitos frecuentes; aumento del deseo.	Cal-c. 200 o 1M	Quinc. (3)
<input type="checkbox"/> Por sífilis; en personas divertidas.	Kali-i. 30 o 200	C/. 6 h.
<input type="checkbox"/> Impotencia por debilidad; crecimiento de la glándula prostática.	Sabal. Ø. 5-10 gt.	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Por lesión de la espina dorsal.	Hyper. 200 o 1M	Quinc. (3)
✗ En jóvenes que temen al matrimonio, por haber tenido en el pasado una sexualidad licenciosa.	Anac. 200	Sem. (3)
<input type="checkbox"/> Impotencia con diabetes melitus.	Mosch. 30 o 200	Quinc. (3)
✗ Por pérdida excesiva (crónica) del fluido seminal; por onanismo.	Acid-phos. Ø o 30	C/. 4 h.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
□ Por pérdida excesiva (aguda) del fluido seminal; se excita con fantasías lascivas.	China	C/. 4 h.
□ Impotencia con pensamientos lascivos. Estreñimiento, puede defecar solamente con ayuda mecánica, como puede ser el dedo, lavativas, etc.	Sel. 30	C/. 4 h.
□ Envejecimiento prematuro, debido al abuso de la fuerza sexual; Genitales fríos, relajados, sin deseo ni erección; después de reprimir una gonorrea.	Agn. 30 o 200	C/. 4 h.
□ Debilidad sexual por depresión nerviosa; para tonificar el sistema sexual.	Dam. Ø,	5-10 gt. C/. 4 h.
□ Impotencia neurasténica. Erecciones fuertes y duraderas.	Yoim. Ø,	5-10 gt. C/. 4 h.
● Con eyaculaciones nocturnas, seguidas de mucha debilidad.	Med. 200 o 1M	Quinc. (3)
☆ Debida a supresión del deseo (solterones) o excesiva indulgencia.	Con. 200 o 1M	Quinc. (3)
Remedios bioquímicos		C/. 4 h.
Cal-p. 30X y Kali-p. 30X		

INDIGESTIÓN

La indigestión puede ser el resultado de malos hábitos de comer y beber o de la mala elección de la dieta, bien sea habitual o esporádica. La tensión mental, mal compensada con períodos adecuados de ocio y relajación; el miedo y la ansiedad; la ira y el resentimiento; la impaciencia y la irritación; todo esto y otras emociones nocivas son poderosos perturbadores del ritmo digestivo y del bienestar. Estas tensiones producen indigestión de tres formas. Interfieren en el tono de los músculos de la pared del estómago y del intestino, lo que produce espasmos y una distensión excesiva.

□ Indigestión por tomar té en exceso.	Thuy. 30 o 200	C/. 4 h.
□ Con constricción del esófago.	Abies-n. 30	C/. 4 h.
☆ Con de flatulencia; mejora al soltar flatos.	Carbo-veg. 30	C/. 4 h.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
✗ Por comer demasiado; hábitos sedentarios.	Nux-v. 30 o 200	C/. 4 h.
✗ Después de tener hambre; mejora al doblarse.	Coloc. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
✗ Por prevención; tomando dulces.	Arg. Nit. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
◻ Cuando se va a algún sitio o se oyen noticias inesperadas; por aprensión.	Gels. 30 o 200	C/. ½ h. (3)
✗ Después de tomar café; sed excesiva y estreñimiento.	Nat-m. 30 o 200	C/. 3 h. (3)
✗ Por comer verduras en conserva; sed insaciable; sensación de ardor en el estómago y el abdomen, sin alivio.	Ars. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
✗ Cardialgia; dolor y plenitud en la boca del estómago dos o tres horas después de comer; mal aliento y mal sabor de boca; sensación de que se nos hace un agujero o de que se nos clava algo en el vientre; empeora después de tomar bebidas frías, estrés emocional; mejora después de comer.	Anac. 30 o 200	C/. 4 h.
✗ Malestar en la boca del estómago después de comer, con pesadez, como si tuviese una piedra; movimiento de líquidos; bilis; dolor suave en la zona del hígado; cardialgia; hipo; sed, con ganas de beber grandes cantidades de agua, pero se vomitan las bebidas calientes; mejora cuando se está quieto boca arriba; se piensa en negocios.	Bry. 30 o 200	C/. 4 h.
◻ Dolor constrictor en la boca del estómago; unas dos horas después de comer; se tiene constantemente arcadas y ganas de tragarse; se cae la baba al dormir; eructos con sabor a comida ácida; se sienten náuseas y debilidad; se tienen temblores por la mañana; mucho ardor y entumecimiento.	Graph. 30	C/. 4 h.
◻ Ardor, pesadez y presión en la boca del estómago, aunque se tome poco alimento; entumecimiento fuerte; eructos frecuentes; desfallecimiento matutino; ataques de bilis; dolor persistente en la zona de hígado; ganas de tomar vinagre, vino o alimentos cargados de especias; empeora al caminar; mejora después de comer.	Hep. 30	C/. 4 h.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
<input type="checkbox"/> Dolor constante en la boca del estómago; como si se tuviese un objeto de puntas duras; se siente uno muy mal; nada le sabe bien, se vomita todo lo que se toma, se siente como si quemase la lengua; empeora después del desayuno y comiendo verduras.	Hydr. 6 o 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Cardialgias y peso en el estómago inmediatamente después de tomar alimentos, con un dolor que se extiende por detrás entre los omóplatos; puede haber pequeños puntos doloridos y blandos debajo de las costillas del lado izquierdo; mejora después de tomar alimento.	Kali-bi. 30	C/. 4 h.
☆ Entumecimiento fuerte, sensación de haber comido mucho o tener una piedra en el estómago, 1 o 2 horas después de haber comido; se regurgita el alimento; eructos con el sabor de los alimentos tomados; ardor de estómago; se vomita la comida tomada unas horas antes; empeora en una habitación caliente y comiendo alimentos fuertes y calientes; mejora de momento tomando cosas frías.	Puls. 30 o 200	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Por nerviosismo, disgusto o contratiempo.	Ign. 30 o 200	C/. 4 h.
Remedios bioquímicos		Cal-p. 6X y Sil. 12X C/. 4 h.

INOCULACIÓN

Efectos nocivos

<input type="checkbox"/> Escarlatina	Ail-gt. 200	C/. 10 m. (3)
<input type="checkbox"/> Difteria	Merc-cy. 200	C/. 10 m. (3)
<input type="checkbox"/> Fiebre tifoidea	Bry. 200	C/. 10 m. (3)

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
<input type="checkbox"/> Tosferina	Puls. 200	C/. 10 m. (3)
<input type="checkbox"/> Fiebre amarilla	Ars. 200	C/. 10 m. (3)

INQUIETUD

(Ver también *Ansiedad*)

- ❖ Repentina, con ansiedad e imaginación fuerte; después de exponerse a una corriente de aire seca y fría. **Acon. 200 o 1M** C/. 10 m. (3)
- ❖ Con debilidad y agotamiento; sed insaciable, bebiendo poco con mucha frecuencia. **Ars. 30 o 200** C/. 4 h. (3)
- ❖ Aprensión muy grande por la noche; inquietud, sacudidas por la noche en la cama. **Rhus tox. 200 o 1M** C/. 4 h. (6)

Remedio bioquímico	Kali-p. 6X	
		C/. 4 h.

INSOLACIÓN

- Exposición de la cabeza al sol; especialmente cuando se está dormido; aumento de sed; ojos y cara enrojecidos; ansiedad; inquietud, miedo a la muerte. **Acon. 30 o 200** C/. $\frac{1}{2}$ h.
- Con dolor de cabeza fuerte y pulsante; empeora con chirridos. Aflujo de sangre a la cabeza. **Bell. 30** C/. $\frac{1}{2}$ h.
- ❖ Cabeza muy caliente con el resto del cuerpo a temperatura normal; ojos enrojecidos, ataque repentino; emisión involuntaria de heces y orina. **Arn. 30** C/. $\frac{1}{2}$ h.
- Cuando el cuerpo se pone frío con postración completa de las fuerzas vitales. Sudor frío y calambres en los músculos. **Camph.a Ø,** 5-10 gt. C/. $\frac{1}{2}$ h.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
□ Confusión mental después de insolación con postración y temblores; se oscurece la visión; dolor de cabeza más fuerte en el occipucio.	Gels. 30	C/. ½ h.
☆ Náuseas muy fuertes; vómitos, dolor de cabeza muy fuerte y pulsante; da la sensación de que se expande el cerebro.	Glon. 3X o 6	C/. ½ h.
□ Rostro oscuro; rojo y cargado de sangre; ojos casi cerrados; inconsciencia.	Op. 200 o 1M	C/. ½ h. (3)
□ Repentina; con congestión rápida, pesadez y cabeza cargada. Vómitos; sudor frío en el rostro, manos y pies.	Verat-v. 30	C/. ½ h.
☆ Vértigo; dolor de cabeza, náuseas, vómitos y pérdida de la visión; empeora con el movimiento, abriendo los ojos y con el ruido.	Ther. 30	C/. ½ h.
□ Repentina; congestión violenta de la cabeza, como si estuviese vendada; dolor, como si estallase la cabeza, con postración.	Cat. Ø o 30	C/. ½ h.
Remedios bioquímicos		
	Nat-m. 6X y Kali-p. 6X	C/. ½ h.

INSOLACIÓN, Consecuencias

- ☆ El calor del sol y los cambios eléctricos de la atmósfera hacen que el paciente se sienta peor; dolor de cabeza como martilleo; el paciente se encuentra débil en verano. **Lach. 200** C/. 10 m. (3)
- ☆ El paciente se encuentra peor en agua caliente; dolor de cabeza; no puede pensar con propiedad cuando está al sol. **Nat-c. 200** C/. 10 m. (3)
- ☆ Se siente peor al sol y al calor; paciente anémico, caquético y desfallece fácilmente al sol; sed excesiva; estreñimiento. **Nat-m. 200** C/. 10 m. (3)

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
❑ Las molestias empeoran al salir el sol. El paciente se siente con más energías al ponerse.	Sel. 30	C/. 4 h.
★ Se olvida de las calles y carreteras que conoce, a causa de la insolación.	Glon. 3X o 30	C/. 4 h.
Remedio bioquímico	Nat-m. 6X	C/. 4 h.

INSOMNIO

❑ Insomnio durante la etapa de la menopausia	Senc-atc.. 30	C/. 4 h.
★ No puede dormir en las primeras horas de la noche; está completamente despierto, con la mente activa; insomnio por excitación.	Coff. 30	C/. 6 h.
★ No puede dormir después de las 3 de la madrugada; insomnio debido a agotamiento mental o hábitos sedentarios; duerme con sueños y sin descansar.	Nux-v. 30 <i>al acostarse durante 7 días</i>	
❑ Por miedo o pánico; insomnio después de un trauma o un susto; inquietud y sacudidas en la cama.	Acon. 30	C/. 4 h.
❑ Por cansancio, bien sea físico o mental; la cama parece muy dura; se mueve buscando una posición cómoda para descansar.	Arn. 30 o 200	C/. ½ h. (3)
❑ Insomnio después de medianoche, por ansiedad e inquietud; tiene que levantarse y pasear.	Bell. 30	C/. 4 h.
❑ Tiene sueño, pero no puede dormir; el niño se quita la ropa a patadas, se mueve; si duerme, no descansa, por sueños que dan miedo.	Ars. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
❑ Insomnio e inquietud, especialmente en la primera parte de la noche; se levanta y pasea por la casa; cuando llega la hora de acostarse, se queda completamente despierto.	Cham. 30 o 200	C/. 4 h.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
❑ Insomnio debido a un disgusto del pasado; después, sueña con ladrones y atracadores.	Nat-m. 200 o 1M	C/. 10 m. (3)
❑ Insomnio debido a un trauma repentino; frustración.	Ign. 200 o 1M	C/. 10 m. (3)
❑ Tiene sueño y no puede dormir; el ruido de los relojes, aunque estén lejos, no le deja dormir; encuentra la cama caliente; se mueve en vano buscando un rodal frío en la cama.	Puls. 30 o 200	C/. 4 h.
❑ Inquietud en la primera parte del sueño; le entra un sueño profundo cuando es hora de levantarse; siente mucho calor en la cama; se destapa, siente frío y se tapa de nuevo; se pone las manos en la cabeza durante el sueño.	Op. 30 o 200	C/. 4 h.
Remedios bioquímicos		Kali-p. 6X y (Ferr- p. 30X <i>Todos los días, al acostarse</i>

INTOXICACIÓN POR ALIMENTOS

☆ Por comer melón o beber agua impura.	Zing. 30	C/. ½ h.
☆ Por comer preparados helados; conservas o fruta pasada.	Ars. 30	C/. ½ h.
☆ Despues de comer alimentos pasados o ahumados; el paciente quiere agua fresca, ventilación.	Carbo-veg. 30	C/. ½ h.
☆ Despues de comer alimentos pesados o grasos; alimentos surtidos o no vegetales, chocolates, etc.	Puls. 30	C/. ½ h.

IRITIS

Inflamación del iris.

❑ Por exposición a viento seco y frío.	Acon. 30 o 200	C/. 2 h.
❑ Por lesión traumática.	Arn. 200	C/. 4 h. (3)

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
<input type="checkbox"/> A causa de la sífilis; brotes parecidos a verrugas en el iris.	Thuy. 200	C/. 4 h. (3)
<input type="checkbox"/> Después de mojarse y de una operación de cataratas; párpados hinchados; los ojos lagrimean al abrirllos.	Rhus tox. 30 o 200	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Dolores fuertes en los ojos y alrededor de ellos; empeora por la noche y en tiempo húmedo; sensibilidad excesiva a la luz; iris descolorido; pupila contraída.	Merc. 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Inflamación marcada; de origen sifilítico, especialmente después de un tratamiento de mercurio.	Kali-i. 6 o 30	C/. 6 h.
<input type="checkbox"/> Con dolor fuerte; el dolor parece profundizar hasta los huesos que rodean los ojos.	Aur. 200	C/. 4 h. (3)
<input type="checkbox"/> El dolor se produce en el ángulo interno del ojo y se extiende por las cejas y pasa alrededor de los ojos.	Cinnb. 200	C/. 4 h. (3)
<input type="checkbox"/> Cuando se extiende la inflamación a los tejidos de alrededor y la córnea; y se forma pus en la cámara anterior; mejora con el calor.	Hep. 200	C/. 4 h. (3)
<input type="checkbox"/> Despues de estar expuesto al frío; dolor agudo y palpitante en los ojos, que se extiende por la cabeza o la cara; empeora con el movimiento.	Bry.. 30	C/. 3 h.
<input type="checkbox"/> Dolor quemante; empeora por la noche; mejora con el calor.	Ars. 30	C/. 3 h.

Otros remedios útiles: Argentum nit., Asaf., Bell., Cedr., China, Crot-t., Nux-v., Puls., Sil., Staph., Sulphur, Ter. y Zinc-met., etc.

IRRITABILIDAD

Incomodidad

<input type="checkbox"/> Irritación cuando no nos comprenden; antes de convulsiones.	Bufo. 200 o 1M	C/. 10 m. (3)
--	-----------------------	---------------

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
<input type="checkbox"/> La irritación empeora con la contradicción; cuando se obliga a responder.	Nux-v. 200 o 1M	C/. 10 m. (3)
<input type="checkbox"/> Irritación violenta; golpea a los amigos y a quienes lo atienden.	Tarent. 200 o 1M	Sem. (3)
<input type="checkbox"/> Persona irritable; pendenciera y obstinada.	Kali-c. 200 o 1M	Sem. (3)
<input type="checkbox"/> Irritación con temblores; persona irritable, malévola, vengativa y terca.	Nit-ac. 200 o 1M	Sem. (3)
<input type="checkbox"/> Irritación por cosas sin importancia; afecciones glandulares, hipertrofia de la tiroides en la pubertad.	Cal-i. 200	C/. 10 m. (3)
<input type="checkbox"/> Irritación; lucha violenta; decaimiento y agotamiento.	Mosch. 200	C/. 10 m. (3)
<input type="checkbox"/> Irritabilidad; temperamento obstinado; maldad.	Carc. 200 o 1M	Sem. (3)
<input type="checkbox"/> Iracundo; difícil de complacer; pendenciero.	Hep. 1M	Sem. (3)
<input type="checkbox"/> Iracundo; irritable y obstinado; se encuentra mejor en espacios abiertos y fríos.	Kali-s. 200	C/. 10 m. (3)
<input type="checkbox"/> Irritación después del coito; obstinado; persona obesa y floja.	Cal-c. 200 o 1M	Sem. (3)
<input type="checkbox"/> Irritación durante el embarazo.	Nux-m. 200 o 1M	C/. 10 m. (3)
<input type="checkbox"/> Irritación; tendencias violentas; ganas de matar.	Iod. 1M	Sem. (3)
<input type="checkbox"/> Iracundo, irritable; persona abusiva y cruel.	Kali-i. 1M	Sem. (3)
<input type="checkbox"/> Iracundo; con cambios de humor; arranques repentinos.	Croc. 200	C/. 10 m. (3)
<input type="checkbox"/> Iracundo; mal temperamento; se irrita sin razón; no sonríe ni disfruta nunca.	Tub-k. 1M	Sem. (3)
<input type="checkbox"/> Las cosas mal hechas lo irritan; hipersensibilidad.	Staph. 1M	Sem. (3)
<input type="checkbox"/> Disputas con compañeros y maestros, aunque sin mucha importancia; necesita atención.	Phos. 200 o 1M	Sem. (3)

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
<input type="checkbox"/> Irritabilidad en los niños; desea algo nuevo (juguetes, etc.) frecuentemente y lo rechaza cuando lo consigue; cambios de humor.	Cham. 200 o 1M	C/. 10 m. (3)
<input type="checkbox"/> Indiferente a los miembros de la familia, a los niños y a los seres queridos; empeora antes de la menstruación.	Sep. 200	Sem. (3)

JADEO

(Ver también Asma y Bronquitis)

<input type="checkbox"/> Con lengua sucia; mucho ruido, debido a mucosidad, respiración corta, disnea.	Ant-tart. 30 o 200	1 dosis
<input type="checkbox"/> Con lengua limpia; náuseas y vómitos; tos con jadeo; pecho lleno de flemas.	Ip. 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Acumulación de mucosidad; tos floja; dificultad para respirar; empeora con el frío y en aire frío.	Hep. 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Jadeo, ruidos; con ruidos en la laringe.	Brom. 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Inspiración difícil; jadeo, tos crupal; el frío se extiende hacia abajo, desde la cabeza a la garganta y los bronquios.	Iod. 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Con expectoración abundante y purulenta; la tos empeora por la tarde, con esfuerzos para vomitar y dolor en el pecho.	Kreos. 30 o 200	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Jadeo; empeora al acostarse, después del primer sueño, con tos espasmódica.	Aral. 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Remedio intercurrente; para casos crónicos.	Bac. 200 o 1M	Quinc. (3)
<input type="checkbox"/> Jadeo y opresión en el pecho en bronquitis agudas; expectoración pertinaz, abundante y blanquecina; rales sibilantes.	Grin. 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Jadeo; dificultad para toser, mucosidad abundante (especialmente en personas de edad).	Seneg. Ø o 30	C/. 4 h.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
❑ Jadeo; tos y ruidos en el pecho; constrictión espasmódica del pecho; empeora tras comer o beber.	Nux-v. 30 o 200	C/. 4 h.
❑ Jadeo; tos, con relajación de la vulva; mejora con calor; empeora con frío y de 3 a 4 de la madrugada.	Kali-c. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
❑ Jadeo; ataques fuertes de tos con obstrucción sofocante de la respiración y estornudos.	Just. Ø o 30	C/. 4 h.
❑ Ruido fuerte, como si los pulmones estuviesen llenos de mucosidad; sobre todo en catarro bronquial de los niños.	Lyc. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
❑ Por picor de garganta; expectoración viscosa, verdosa, abundante y purulenta; empeora con tiempo húmedo	Nat-s. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
● Tos torturante, espasmódica; remedio intercurrente; se pone ropa de abrigo, incluso en verano.	Psor. 200 o 1M	C/. 10 m. (3)
❑ Rales, hasta que se expectora algo.	Carbo-an. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
❑ Con expectoración abundante de mucosidad; empeora al pasar del calor al frío.	Dulc. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
● Dolor y presión en el pecho; catarro de faringe; empeora por la mañana.	Sulphur 30 o 200	C/. 4 h. (3)
❑ Expectoración mucopurulenta; inquietud y sed insaciable.	Ars. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
❑ Acumulación de mucosidad en la garganta; picor en el fondo de la garganta.	Caust. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
❑ Acumulación de mucosidad en la laringe; silbidos, náuseas y ruidos en el pecho.	Kali-bi. 30 o 200	C/. 4 h.
❑ Flema suelta que no se puede arrancar. La tos empeora por la tarde y después de acostarse.	Sep. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
❑ Con esputos verdosos, fétidos y de sabor dulce.	Stann.. 30	C/. 4 h.
Remedios bioquímicos		
	Ferr-p. 6X y Kali-m. 6X	C/. 4 h.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
LACTANCIA		
□ Flujo abundante de leche; pechos inflamados, rojos, cálientes, hinchados, blandos, a veces duros como piedras; cara sonrosada; piel caliente y seca.	Bell. 30 o 200	C/. 4 h.
✗ Flujo copioso de leche acuosa; el niño la rechaza; o leche escasa con pechos hinchados; paciente friolero, aversión al aire frío; pálido, flojo, débil, propenso a sudar, especialmente por la cabeza durante la noche.	Cal-c. 200	C/. 4 h. (3)
✗ Disminución de la secreción de leche; disminuye el tamaño de los pechos; se encuentra muy deprimida y abatida; tiene mucha sed	Lac-d. 30 o 200	C/. 6 h.
✗ Flujo de leche excesivo; pezones muy doloridos, siente dolor al amamantar, el dolor se extiende por todo el cuerpo; pechos duros, con puntos duros, posiblemente debido a formación de pus.	Phyt. 30	C/. 4 h.
✗ Leche escasa; al amamantar siente un dolor que se extiende por el pecho, el cuello y la espalda; secreción continua de leche después del destete y siente los pechos dilatados, tensos y doloridos; la paciente es apacible y llorosa; aversión al calor con poca ventilación y preferencia por el aire libre y frío.	Puls. 30 o 200	C/. 4 h.
□ Supresión de la leche; descarga de sangre por los pezones cuando trata de dar de mamar al niño; el niño no quiere la leche y vomita después de tomarla; pechos inflamados, de color rojo en el centro y sonrosados en el resto, duros y sensibles al tacto.	Sil. 30 o 200	C/. 4 h.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
<h3><u>LAGRIMEO</u></h3>		
<input type="checkbox"/> Facilidad para echar lágrimas; empeora en espacios cerrados; mejora al aire libre.	All-c. 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Lágrimas acres; irritan los ojos.	Euphr. 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Lágrimas ardientes; por bloqueo del conducto naso-lacrimal; empeora con el frío.	Rhus tox. 30 o 200	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Cuando falla Rhus tox. ; paciente friolero.	Sil. 30 o 200	C/. 4 h.
Remedio bioquímico		Nat-m. 6X o 12X
		C/. 4 h.

Otros *remedios importantes*: Merc-c., Petr., Fl-ac.; Sulphur, Nat-m., Ars., Hydr., etc.

LARINGITIS

(Ver también *Ronquera*)

<input type="checkbox"/> Con fiebre inflamatoria; laringe sensible al tacto y a la aspiración de aire; voz ronca.	Acon. 30	C/. 4 h.
☆ Laringitis de los cantantes; pérdida de la voz; mejora con mucho calor o en lugar caliente; empeora al descansar.	Ant-c. 30 o 200	C/. 4 h.
☆ Laringitis aguda; cuerdas vocales al rojo vivo; dolor en la laringe al hablar.	Bell. 30	C/. 4 h.
☆ Laringitis crónica de los cantantes; al levantar la voz da tos; inflamación e hinchazón de la pared posterior y el revestimiento de la laringe; ronquera y pérdida de voz.	Arg. Nit. 30 o 200	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Ardor doloroso en la laringe; tos seca y ronca en paroxismos rápidos, sobre todo durante el día, disminuyendo por la noche y en cama caliente.	Ars. 30	C/. 4 h.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
❖ Inflamación de la laringe y la faringe; dolor constante e hinchazón interna; voz ronca, profunda y débil o afonía.	Arum-t. 30	C/. 4 h.
❖ Catarro laríngeo de los cantantes; los músculos de la laringe se niegan a actuar, no se puede hablar en voz alta; empeora por la mañana y a última hora de la tarde.	Caust. 30 o 200	C/. 4 h.
❑ Laringitis catarral violenta; tos ronca, parece que la laringe se va a hacer pedazos y desgarrarse.	All-c. 30	C/. 4 h.
❑ Constricción de la laringe al hablar; sensación de tener una pluma en la laringe.	Dros. 30 o 200	C/. 10 m. (3)
❖ Punzadas y dolor que se extienden de un oído a otro al tragar; ronquera fuerte con tos bronca de perro; secreción muco-purulenta escasa y persistente, difícil de expectorar; afonía con ligeros espasmos sofocantes; empeora por la mañana.	Hep. 30 o 200	C/. 4 h.
❑ Ulceración de la laringe y la tráquea; voz alterada, ronca; tos ronca, irritante, con disnea; estrechez y constricción en la laringe y la tráquea, con dolor y ronquera.	Iod. 30	C/. 4 h.
❑ Laringitis crónica; gran irritación de los tubos aéreos; tos seca, torturante, especialmente por la noche; paciente obeso, flojo y friolero.	Cal-c. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
❑ Laringitis edematosas; ronquera, irritación y sequedad de laringe; sensibilidad al tacto; sensación de tener un grumo en la garganta con sensación de sofoco.	Lach. 30 o 200	C/. 4 h.
❖ Laringitis sifilítica; hinchazón fuerte en la zona, con coloración oscura, mucha expectoración y tos.	Merc. 30 o 200	C/. 4 h.
❑ Tos laríngea crónica; sin expectoración; sensación de picor como si hubiese una úlcera pequeña, generalmente en un lado; tos pertinaz seca durante todo el día.	Nit-ac. 30 o 200	C/. 4 h.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
□ Cosquilleo fuerte en la laringe al hablar; tos seca, espasmódica, con constricción de la garganta; punzadas en la garganta; frío al toser.	Phos. 30 o 200	C/. 4 h. (6)
☆ Tos seca, irritante, con ardor y picor en la laringe; hinchazón de las glándulas submaxilares; inflamación de la laringe; dificultad para respirar, como si se tuviese un tapón en la garganta; gran sequedad en la laringe, con tos seca de perro.	Spong. 30	C/. 4 h.
□ Tisis de laringe, con tos continua, entrecortada e irritante y jadeo.	Stann.. 30	C/. 4 h.
☆ Expectoración de mucosidad de la laringe; voz ronca, picor en la garganta; la tos aumenta al presionar en la laringe; empeora por la tarde.	Rumex. 30	C/. 4 h.
□ Laringitis edematosas aguda; sequedad de garganta con dolor, hinchazón y enrojecimiento; expectoración con mucosidad densa.	Sang. 30 o 200	C/. 4 h.
□ Laringitis crónica con congestión; hinchazón de los tejidos y aumento de secreción de un fluido glutinoso; empeora por la mañana; laringitis folicular con descarga que se estira como un hilo.	Kali-bi. 30 o 200	C/. 4 h.
□ Inflamación folicular; irritación de la laringe y tos seca; ardor y picor de garganta; edema de laringe.	Kali-i. 30 o 200	C/. 4 h.
□ Mal aliento; pérdida de la voz; ronquera con expectoración blanca y viscosa.	Kali-m. 12X o 30	C/. 4 h.
● Remedio intercurrente	Sulphur 200	Sem. (3)
Remedios bioquímicos	Ferr-p. 6X y Kali-m. 6X	C/. 4 h.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
<u>LENGUA</u>		
❑ Resquebrajada y negruzca (azulada en las fiebres tifoideas); con sed de beber pequeñas cantidades con frecuencia.	Ars. 30 o 200	C/. 4 h.
❑ Seca; con ganas de beber grandes cantidades de agua a intervalos largos.	Bry. 30 o 200	C/. 4 h.
❑ Seca; sin sed, se siente mejor al aire libre.	Puls. 30 o 200	C/. 4 h.
❑ Blanca; con una capa densa; problemas gástricos.	Ant-c. 30 o 200	C/. 4 h.
❑ Triángulo de la punta de la lengua enrojecido.	Rhus tox. 30 o 200	C/. 4 h.
❑ Débil, húmeda y con sed; con señales de los dientes.	Merc. 30 o 200	C/. 4 h.
❑ Lisa, como si estuviese barnizada.	Pyr. 200 o 1M	C/. 10 m. (3)
❑ Con una raya roja en el centro.	Verat-v. 30 o 200	C/. 4 h.
❑ Húmeda; de color sucio amarillento, con señales de los dientes; estreñimiento.	Hydr. Ø o 30	C/. 4 h.
❑ Fría; azulada.	Camph.a Ø o 30	C/. 4 h.
❑ Azulada y negruzca; con rayas.	Bufo.. 30 o 200	C/. 4 h.
❑ Seca; rígida, curtida.	Bapt. Ø o 30	C/. 4 h.
❑ Seca; negruzca; se saca con dificultad; el paciente se siente peor después de dormir.	Lach. 30 o 200	C/. 4 h.
❑ Seca; pálida y viscosa.	Acid-phos. 30	C/. 4 h.
❑ Seca; se pega al paladar.	Nux-m. 30 o 200	C/. 4 h.
❑ Cuelga fuera de la boca.	Stram. 200 o 1M	C/. 10 m. (3)
❑ Con una capa blanca; con señales de los dientes; diarrea.	Podo. 30	C/. 4 h.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
□ Se saca y se mete como una serpiente.	Cupr-met. 30 o 200	C/. 10 m. (3)
□ Sensación de tener pelos en la lengua.	Sil. 200 o 1M	C/. 10 m. (3)
□ Limpia, con náuseas y vómitos.	Ip. 30	C/. 4 h.
	Remedios bioquímicos	
	Grisácea, blanca, seca	Kali-m. 6X
	Seca, inflamada, de color rojo oscuro, con señales de los dientes	Ferr-p. 6X

LEPRA

Es una infección granulomatosa crónica producida por el *Mycobacterium leprae*. Hay dos tipos de lepra, que se dan de forma más o menos estable: la lepromatosa y la tuberculoide. El primer síntoma de infección es la aparición de erupción en la piel. La enfermedad va progresando poco a poco y después disminuye o desaparece la sensibilidad de la zona afectada.

☆ Remedio capital (para empezar el tratamiento).	Sulphur CM	<i>Mensual (3)</i>
● Remedio intercurrente.	Bac. 1M	<i>Quinc. (6)</i>
□ Abultamiento de la piel; formación de escamas.	Hydrc. 30 o 200	<i>C/. 4 h.</i>
□ Con depresión; pérdida de las ganas de vivir y tendencias suicidas.	Aur. 200 o 1M	<i>Mensual (3)</i>
□ Se adormecen los dedos de las manos y de los pies; se suda por la noche.	Ars-i. 30 y más	<i>C/. 6 h.</i>
☆ Resquebrajamiento y emisión de un fluido denso; la música hace llorar al paciente.	Graph. 200 o 1M	<i>Quinc. (6)</i>
□ Molestias con entumecimiento de las manos y los pies. Ulceración serosa, fétida y sanguinolenta.	Strych-gt. Ø	<i>5-7 gt. C/. 4 h.</i>
● Abultamiento de la piel; origen sifilítico.	Thyr. 200 o 1M	<i>Sem. (6)</i>
□ Las partes afectadas están frías. Pérdida de sensibilidad.	Sec-cor. 200 o 1M	<i>Quinc. (6)</i>

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
◻ Granos en todas las partes salientes de huesos.	Hura. CM	Mensual (3)
☆ Tubérculos gangrenosos; abultamiento de la piel; calor en el estómago.	Calo. 200 o 1M	Sem. (6)
● Remedio intercurrente; cuando hay una historia tuberculosa en la familia.	Tub-k. 1M	Sem. (6)
	Remedios bioquímicos.	Cal-f. 12X y Sil. 30X
		C/. 4 h.

Otros remedios importantes: Anac., Ars., Elaeisis, Crot-h., Syph., etc.

LESIONES

Traumas, Cortes, Heridas, etc.

☆ Remedio capital; abarca incluso la inconsciencia; dolores de contusiones y tumefacción de las partes blandas.	Arn. 200 o 1M	C/. 3 h. (3)
☆ Lesión de los tejidos profundos; torceduras y magulladuras.	Bell-p. 6 o 30	C/. 4 h.
◻ Efectos nocivos de las lesiones de cabeza; por ponerse o caer de cabeza.	Nat-s. 200 o 1M	C/. 10 m. (3)
◻ Lesión de los tejidos fibrosos; tendones y músculos, torceduras y estiramientos excesivos.	Rhus tox. 30 o 200	C/. 4 h.
◻ Lesión del periósteo y los huesos; torceduras de tobillos y muñecas; rodilla de criada.	Ruta-gt. 30 o 200	C/. 6 h.
◻ Heridas abiertas por lesiones.	Calen. 30	C/. 4 h.
◻ La herida se pone negra, en vez de curarse.	Carbo-veg. 30	C/. 4 h.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
★ Para evitar el tétano; heridas punzantes por astillas, pica-duras de insectos, arañazos, etc.	Led. 200 o 1M	C/. 10 m. (3)
□ Para las heridas dolorosas que no se curan.	Nit-ac. 30	C/. 4 h.
□ Lesión de córnea.	Op. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
□ Para ayudar a la unión rápida de huesos fracturados; le-sión ocular sin señales marcadas.	Symph. 6 o 30	C/. 4 h.
□ Ulcera de córnea por golpe; heridas por cortes con objetos afilados.	Staph. 30 o 200	C/. 4 h.
★ Lesiones de la espina dorsal; lesiones de nervios; dedos machacados por una puerta o una máquina, etc.	Hyper. 200 o 1M	C/. 10 m. (3)
□ Cuando las heridas pequeñas sangran mucho; sangre de color rojo vivo, como cuando se saca una muela, etc.	Phos. 30 o 200	C/. 10 m. (3)
□ Rezuma la sangre por las vendas.	Stront-c. 30	C/. 4 h.
□ Estado de toxemia y septicemia, con fiebre e inquietud.	Pyr. 200 o 1M	C/. 10 m. (3)
★ Neuralgia en un muñón; nervios expuestos; después de una amputación.	All-c. 30 o 200	C/. 4 h.
□ Cuando el paciente se vuelve inconsciente; por trauma después de enfriarse la herida y el cuerpo.	Camph. Ø, 5 gt.	C/. 15 m. (3)
□ Cuando Camph. Ø no responde y el cuerpo se queda frío; el paciente quiere ventilación.	Carbo-veg. 30 o 200	C/. 15 m. (3)
□ Cuando falla también Carbo-veg. y el cuerpo se queda frío.	Verat. 30 o 200	C/. 15 m. (3)
□ Cataratas por lesión.	Con. 30 o 200	Quinc. (3)
Remedios bioquímicos		
	Cal-p. 6X y Kali-p. 6X	C/. 4 h.

Para uso externo: Aplicar Ferr-p. 1X, en spray, en zonas afectadas, para controlar la hemorragia. Puede hacerse un vendaje con loción o ungüento de Calen.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas

Frecuencias
y (dosis)

Remedios

LEUCEMIA

Se conoce como leucemia la proliferación progresiva de leucocitos anormales en los tejidos hemotisulares, sangre y otros órganos. Cursan por una afección aguda, con anemia fuerte, hemorragias y aumento ligero de los nodos linfáticos del bazo.

Para el tratamiento homeopático hay que buscar el remedio adecuado basado en la totalidad de síntomas que presenta el paciente. Los principales son **Cean., Nat-m., Nat-s., Oci-sa., Phos., Bac., Malar., Oci., Tub-k., Sulphur, Syph., Rad-br., Med. y Camocin, etc.**

El tratamiento debe estar supervisado por un homeópata experto.

LEUCODERMIA

Vitílico, decoloración blanquecina de la piel

- | | | |
|--|---------------------------|------------|
| <input type="checkbox"/> Remedio capital | Arsenic sul-fl. 3X | C/. 4 h. |
| <input type="checkbox"/> Remedio intercurrente | Tuber. bov. 1M | Quinc. (6) |

Son útiles Aur., Bac., Hydrc., Lyc., Nat-m., Nit-ac., Sep., Thuy. y otras medicinas constitucionales. La leucoderma es una enfermedad que requiere un estudio profundo y sólo puede ayudar el tratamiento constitucional.

LEUCORREA

Secreción vaginal mucosa y blanca.

- | | | |
|---|------------------------|----------|
| <input type="checkbox"/> Leucorrea asociada con diabetes mellitus; descarga densa blanquecina; mancha la ropa; menstruación irregular, dolorosa, escasa, oscura y grumosa, con dolor de espalda; empeora con el movimiento; mejora con el descanso. | Abrom-a. 30 | C/. 4 h. |
| <input type="checkbox"/> La descarga deja manchas de puntos amarillos en la ropa. | Chel. 6 o 30 | C/. 4 h. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Descarga acre, amarilla, por infección de tricomonas; produce dolor de la parte baja de la espalda; empeora entre periodos. | Kreos. 30 o 200 | C/. 4 h. |

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
★ Acre, parecida a cuajada o a clara de huevo; con sensación de que fluye agua templada.	Borx. 3X o 30	C/. 4 h.
★ Remedio capital; leucorrea con dolor de espalda.	Ovi-p. 3X	C/. 4 h.
□ Descarga acre, que desuella, amarillenta o verdosa, con estreñimiento. Sensación de parto, como si se fuese a salir todo por la vagina.	Sep. 200 o 1M	Sem. (3)
□ Descarga lechosa, cremosa, suave o acre; a veces, con ardor. En mujeres apacibles y llorosas; pérdida de la sed con sequedad en la boca.	Puls. 30 o 200	C/. 6 h.
□ Leucorrea con ardor, picor y sensación de estar en carne viva; empeora por la noche.	Merc. 30 o 200	C/. 4 h.
★ Leucorrea como leche, con ardor y picor en la zona, antes y después de la menstruación; en niñas jóvenes; pies fríos y húmedos; paciente friolero.	Cal-c. 200 o 1M	Sem. (3)
★ Descarga acre, filamentosa, abundante y transparente que corre hasta el talón con ardor; empeora durante el día y después de la menstruación; mejora al lavarse.	Alum. 0/7 o superior	C/. 6 h.
□ En mujeres obesas, descarga blanca abundante; con picor alrededor de los genitales y estreñimiento.	Graph. 200 o 1M	Sem. (3)
□ Descarga blanquecina no irritante; menstruaciones tardías y escasas.	Penic. 200	C/. 4 h. (3)
● Remedio intercurrente; la paciente se siente peor por la noche; cuando hay un historial de aborto.	Syph. 200 o 1M	Quinc. (3)
Remedio bioquímico		
	Cal-p. 6X, Kali-m. 6X y Nat-m. 12X	C/. 4 h.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
<u>LLANTO</u>		
<input type="checkbox"/> Llora día y noche; difícil de complacer.	Apis. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
<input type="checkbox"/> Llora a las 11 de la mañana.	Sulphur 30 o 200	C/. 4 h. (3)
<input type="checkbox"/> Llora dormido; por una contradicción.	Nux-v. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
<input type="checkbox"/> Llora toda la noche; ríe por el día; alternando con caricias, en la oscuridad.	Stram. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
<input type="checkbox"/> Llora cuando está solo; empeora con el consuelo; recuerda acontecimientos desagradables del pasado y llora.	Nat-m. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
<input type="checkbox"/> Llora en voz alta; sollozos; de 4 a 8 de la tarde; cuando se le dan las gracias.	Lyc. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
<input type="checkbox"/> Llora por nada; cuando se le habla de su enfermedad; mientras da de mamar; cuando se le interrumpe, con coriza, al responder a una pregunta; mejora con el consuelo.	Puls. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
<input type="checkbox"/> Llora por ansiedad; al oír música.	Graph. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
<input type="checkbox"/> Deja de llorar sólo cuando lo cogen; obstinado.	Cham. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
<input type="checkbox"/> Llora sin saber por qué; sin razón; inquietud.	Rhus tox. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
<input type="checkbox"/> Llora cuando no consigue lo que pide o lo tocan.	Cina. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
<input type="checkbox"/> Llora por pequeñeces; las personas de edad, sin ninguna razón; cuando se tocan sus sentimientos.	Caust. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
<input type="checkbox"/> Llora antes de toser; hipersensible al tacto, al frío,.	Hep. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
<input type="checkbox"/> Llora de alegría; complejo de superioridad.	Plat. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
<input type="checkbox"/> Llora cuando se encuentra con la gente; pensamientos suicidas.	Aur-m. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
<input type="checkbox"/> Llora periódicamente; cada cuatro semanas.	Con. 30 o 200	C/. 4 h. (3)

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
<input type="checkbox"/> Llora después de tener poluciones (masturbación).	Ust. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
<input type="checkbox"/> Llora durante el embarazo.	Mg-c. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
<input type="checkbox"/> Llora al hablar; durante el día.	Med. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
<input type="checkbox"/> Llora cuando le hablan; estallidos violentos de pasión; debido a su indignación.	Staph. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
<input type="checkbox"/> Llora cuando camina al aire libre.	Sep. 30 o 200	C/. 4 h. (3)

LOMBRICES

<input type="checkbox"/> Remedio capital: para empezar el tratamiento. <i>Desde el 2º. día, Santin. 3X y Nat-p. 6X, dos veces cada uno, durante una semana o más, según sea necesario.</i>	Cina. 1M, Santin. 3X y Nat-p. 6X	C/. 15 m. (3).
<input type="checkbox"/> Para la tenia; con hambre voraz.	Anan. 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Cuando las lombrices se mueven por el perineo y entran en la vagina e inducen a la masturbación.	Calad. s. 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Rechinan los dientes; distensión del abdomen con dolor; empeora después de comer; picor alrededor del ano; enuresis nocturna; ganas de tomar dulces.	Emb-r. Ø o 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Contra los oxiuros.	Teuc. 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Contra ascárides.	Abrot. 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Contra la lombriz intestinal.	Chen-a. Ø o 6	C/. 4 h.
<input checked="" type="checkbox"/> Remedio intercurrente.	Sulphur 200 o 1M	Sem. (3)
Remedios bioquímicos		
	Nat-p. 6X y Kali-m. 6X	C/. 4 h.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
----------	----------	--------------------------

LUMBAGO

(Ver *Dolor de espalda*)

LUPUS

Erosión de la piel.

- | | | |
|--|------------------|----------|
| ● Remedio capital; también intercurrente | Rad-br. 30 o 200 | C/. 4 h. |
| □ Capa marrón en la nariz; aversión a las personas queridas y a la familia. | Sep. 30 o 200 | C/. 6 h. |
| □ Empeora al ponerse al sol. Lupus eritematoso diseminado. | Nat-c. 30 o 200 | C/. 4 h. |
| □ Lupus con sensación de ardor, inquietud y agotamiento; mejora con el calor; empeora con el frío. Sed insaciable. | Ars. 30 o 200 | C/. 4 h. |

Otros remedios importantes: Cal-c., Graph., Lyc., Merc., Nat-m., Rhus tox., Sil., Staph., Sulphur y Syph., etc.

MALARIA

Fiebre

(Ver *Paludismo*)

Enfermedad producida por cuatro especies de un esporococo del género plasmodium. Cada especie produce enfermedades distintas.

- | | | |
|---|---------------------|----------|
| □ La fiebre se produce cada dos días o cada semana. Muchas sed, antes de tener mucho frío, que cesa tan pronto como empieza el frío; no se siente sed durante la etapa de calor que vuelve durante el periodo de sudor; empeora con el movimiento; mejora con el calor. | China off. 30 o 200 | C/. 3 h. |
|---|---------------------|----------|

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	<i>Frecuencias y (dosis)</i>
❖ Paroxismo regular; sed en todas las etapas; temblores fuertes mientras dura el frío. Lengua limpia; sudor abundante y agotador. Dolor en la espalda (espina); empeora durante la etapa de frío.	China sulph. 1X o superior	C/. 4 h. (6)
❖ Dolores fuertes en los huesos, como si se rompieran. Náuseas y vómitos cuando se acaba el frío. Mucha sed; al beber se producen náuseas y vómitos en cualquier etapa (frío, calor o sudor); mejora después de sudar, excepto el dolor de cabeza. La lengua tiene una capa gruesa amarillenta; sabor amargo.	Euph. 30 o 200	C/. 4 h.
❖ Frío sin sed (no hay sed en casi ninguna etapa); sacudidas violentas; escalofríos por la espina dorsal, el paciente quiere que lo cojan. Etapa de calor y sudor larga y agotadora; dolor en la nuca. Dolor en los músculos y debilitamiento de la fuerza muscular; ganas de estar quieto echado y dormir; somnolencia; no hay sudor; mejora después de orinar.	Gels. 30 o 200	C/. 3 h.
❖ Cuando no hay síntomas claros para aplicar un remedio (no está claro el paroxismo), unas cuantas dosis de Ip. 30 pueden despejar el caso, especialmente después de (suspensión)/abuso de quinina o en caos de reincidencia. Náuseas, vómitos y disnea y lengua limpia en todas las etapas.	Ip. 30 o 200	C/. 3 h.
❖ Mucha sed con dolor de cabeza como pulsaciones, antes de la etapa de frío y durante la de calor. Mucho frío pertinaz entre las 10 y las 11 de la mañana. Los labios y las uñas se ponen azules, como consecuencia del temblor. Sudor abundante, que alivia todos los síntomas, menos el dolor de cabeza.	Nat-m. 30 o 200	C/. 4 h. (6)
❖ Frío y sed; empeora con el calor y el movimiento. Fiebre (etapa de calor) con muy poca o nada de sed. El sudor alterna con calor seco o poco sudor.	Apis. 30 o 200	C/. 4 h.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
❑ Paroxismo irregular; poco frío o nada; falta de sudor; mucha inquietud; sed insaciable, se bebe con frecuencia en pequeñas cantidades; mejora después de sudar o con el calor.	Ars. 30 o 200	C/. 4 h.
❑ Frío con mucha sed y frío externo, se bebe a intervalos largos en grandes cantidades cada vez; estreñimiento. Puntadas dolorosas en el pecho y en la zona del bazo; sudor agrio al mínimo esfuerzo; Irritabilidad; ganas de estar quieto echado.	Bry. 30 o 200	C/. 3 h.
❑ Frío seguido de sudor. Frío helador. Un pie frío y otro, caliente. Durante la etapa de calor, sed y ganas de beber cosas calientes (vómitos después de tomar bebidas frías); empeora de 4 a 8 de la tarde.	Lyc. 30 o 200	C/. 4 h.
❑ Frío sin sed. Mucho calor (con sed); pero el paciente no puede moverse ni destaparse; siente mucho frío; mejora con el calor y después de sudar.	Nux-v. 30 o 200	C/. 4 h.
★ Paroxismo que cambia continuamente con intermitencia; frío a las 4 de la tarde, sin sed; con el sudor empeora el lado izquierdo; siente mucho calor en la cama, quiere destaparse; sed durante la etapa de calor, se humedece los labios con la lengua; sed durante la etapa de calor solamente.	Puls. 30 o 200	C/. 4 h.
❑ Tos seca y agotadora una hora antes del frío y continúa hasta que se pasa el frío. Frío y calor extremos. El frío empieza en los muslos y entre los hombros, por encima de los omóplatos y por la espalda y sube por la espina dorsal. Inquietud, cambia de postura constantemente; erupciones de urticaria; mejora en la etapa de sudor y con el calor.	Rhus tox. 30 o 200	C/. 4 h.
❑ Frío con periodicidad cronométrica con dolor de los huesos; el frío dura mucho tiempo, día y noche.	Aran. 30 o 200	C/. 4 h.
❑ Paroxismo regular; periodicidad cronométrica (a la misma hora). Sed y ganas de tomar bebidas calientes durante	Cedr. 30 o 200	C/. 4 h.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	<i>Frecuencias y (dosis)</i>
la etapa de calor; dolor insopportable y/o entumecimiento de las piernas y de todo el cuerpo durante la etapa de calor; ojos rojos.		
<input type="checkbox"/> Sed antes del frío; temblor y frío después de beber, el frío empieza en la espalda y se extiende por todo el cuerpo; después, calor sin sed y sudor frío.	Caps. 30 o 200	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Paroxismo irregular; frío con sed, calor sin sed. El paciente prefiere que lo ventilen, en vez de beber agua durante la etapa de calor; frío en las piernas, aunque esté tapado con una manta. Sudor abundante, agrio y de mal olor.	Carbo-veg. 30 o 200	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Casos crónicos; paroxismo irregular; Frío, calor y sudor sin seguir ninguna norma. Fiebre seguida de mucho calor y una insensibilidad muy grande seguida de abundante sudor. Los pies están fríos y húmedos; temblores y sed; empeora por la tarde.	Sep. 30 o 200	C/. 4 h.
● Remedio intercurrente. Casos crónicos, cuando no están claros los síntomas. Frío con temblores, sin calor ni sed; las palmas de las manos y las plantas de los pies están calientes y con ardor.	Sulphur 200	C/. 4 h. (3)
<input type="checkbox"/> La fiebre empeora por la noche; capa blanquecina en la lengua. Ganas de tomar cosas ácidas, picantes, etc. El paciente quiere dormir. Es frecuente que sienta frío con trastornos gástricos.	Ant-c. 30 o 200	C/. 6 h. (6)
● Paroxismo irregular. Durante la etapa de calor, el cuerpo se cubre de sudor muy caliente y huele mal.	Psor. 200 o 1M	C/. 10 m. (3)
<input type="checkbox"/> El frío empieza por la espalda; la fiebre aumenta rápidamente, mucho calor y sudor abundante; la fiebre no baja con el sudor. Inquietud. Fiebre y pulso desproporcionados.	Pyr. 200 o 1M	C/. 10 m. (3)
	Remedios bioquímicos	
	Kali-p. 6X, Nat-m. 12X y Nat-s. 2X	C/. 4 h.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
----------	----------	--------------------------

Otros *remedios importantes*: Fl-ac., Arn., Calad., Cal-c., Caust., Cham., Chel., Cimex, Ferr-ar., Cina., Iod., Malar., Nyct., Stram., Verat-v., Wye, etc.

MANÍA

(Ver también *Demencia*)

Se llama Manía a un desorden emocional caracterizado por una gran actividad psicomotriz y excitación.

- El paciente se mueve constantemente; no puede estar quieto en un sitio; risa incontrolable. **Cann-i. 200 o 1M** C/. 10 m. (3)
- Abusivo; destructivo, rasga la ropa; canta canciones y le gusta la música. **Tarent. 200 o 1M** C/. 10 m. (3)
- Después de excesos sexuales; con una idea exagerada de su propia importancia. **Phos. 200** C/. 10 m. (3)
- Después de alguna lesión; tiene miedo a que lo toquen o se le acerque alguien. **Arn. 200** C/. 10 m. (3)
- Por insolación; gran locuacidad; empeora despues de dormir. **Lach. 200 o 1M** C/. 10 m. (3)
- Remedio intercurrente; monomanía; empeora por la mañana temprano. **Sulphur 200 o 1M** Sem. (3)

Remedio bioquímico **Kali-p. 6X** **C/. 4 h.**

MARASMO

(Ver también *Enflaquecimiento*)

Reducción desproporcionada de peso y de todos los tejidos del cuerpo de más del 10%, en el adulto. La forma proteica es la más frecuente.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
☆ Enflaquecimiento marcado de las piernas que asciende por los músculos; debilidad en el cuello que no puede mantener la cabeza; piel floja y suelta; mejora cuando se produce diarrea.	Abrot. 30 o 200	C/. 6 h. (3)
☆ Enflaquecimiento marcado del cuello; deshidratación; estreñimiento; ganas de tomar mucha sal.	Nat-m. 30 o 200	C/. 4 h.
□ Enflaquecimiento con buen apetito; debilidad después de un esfuerzo físico o mental.	Pic-ac. 30	C/. 4 h.
☆ Enflaquecimiento con hinchazón de glándulas y abultamiento del abdomen; timidez.	Bar-c. 200 o 1M	Sem. (3)
□ Adelgaza, aunque come bien; articulaciones hinchadas y deformadas.	Iod. 30 o 200	C/. 4 h.
● Remedio intercurrente; cuando hay algún historial de tuberculosis en la familia; susceptible a los cambios del tiempo.	Tub-k. 200 o 1M	Sem. (3)
□ Enflaquecimiento de los niños; deficiente mental; excitable y nervioso.	Ambra-gr. 30 o 200	C/. 4 h.
☆ Enflaquecimiento progresivo; le gustan mucho los dulces que no le convienen; mucha flatulencia.	Arg. Nit. 30 o 200	C/. 4 h.
□ Enflaquecimiento rápido; diarrea poco después de comer o beber algo; ardor de estómago.	Ars. 30	C/. 4 h.
☆ Enflaquecimiento del cuello y la cara; mucha flatulencia; ganas de tomar dulces y bebidas calientes.	Lyc. 30 o 200	C/. 4 h.
□ Enflaquecimiento; no puede digerir la leche, aunque la desea; ganas de comer carne.	Mg-c. 30 o 200	C/. 4 h.
□ Enflaquecimiento por asimilación insuficiente; mal olor de los pies, paciente friolero.	Sil. 30 o 200	C/. 4 h.
□ En niños alimentados con biberón.	Nat-p. 6X o 30	C/. 4 h.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
Remedios bioquímicos		
	Cal-p. 6X y Nat-m. 12X	C/. 4 h.

MARCAS DE NACIMIENTO

(Ver *Belleza, consejos de*)

Aunque es imposible curar cualquier marca de nacimiento desagradable, hay algunas medicinas homeopáticas (constitucionales y sintomáticas) que ayudan considerablemente.

MAREO EN VIAJES

★ Con náuseas al viajar por carretera; en coche, tren, barco o avión; con hastío e inclinación al vómito.	Cocc. 30	C/. ½ h.
□ Náuseas mortales; vómitos, desfallecimiento y sensación de abatimiento; empeora con el olor del tabaco; mareo en barco.	Tab. 30	C/. ½ h.
★ Con náuseas constantes y lengua limpia.	Ip. 30	C/. ½ h.
□ En avión; miedo al movimiento descendente.	Borx. 30	C/. ½ h.
□ Náuseas, con acumulación de agua en la boca; dolor con el estómago vacío; mejora comiendo; empeora sentándose erguido; rigidez muscular.	Nux-v. 30 o 200	C/. ½ h.
□ Náuseas y dolor que parece que revienta la cabeza; aversión por la comida; vómitos secos.	Petr. 30	C/. ½ h.
□ Náuseas con vómitos, acompañadas de pérdida de apetito y vértigo al intentar levantarse; cuero cabelludo sensible al tacto; mareo en avión.	Rhus tox. 30 o 200	C/. ½ h.
□ Mareo de montaña.	Coca. 6X o 30	C/. 2 h.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
<u>MAREOS MATUTINOS</u>		
Vómitos, etc., durante el embarazo		
(Ver también Mareos en viajes y Vómitos)		
☆ Vómitos persistentes con trastornos gástricos, precedidos de náuseas, sabor amargo y estreñimiento.	Symp-race. 30	C/. 4 h.
☆ Empeora al echarse; lengua limpia; náuseas; boca húmeda con saliva.	Ip. 30	C/. 3 h.
□ Flatulencia y lengua con una capa; vómitos; empeora por la mañana y después de comer.	Nux-v. 30	C/. 4 h.
□ Empeora al ver agua; se vomita el agua en cuanto se calienta en el estómago.	Phos. 30 o 200	C/. 10 m. (3)
☆ Vómitos pertinaces, náuseas constantes y vómitos con inquietud.	Lac. vac-def. 30	C/. 4 h.
☆ Con sed frecuente e insaciable; inquietud; vómitos que empeoran después de comer o beber.	Ars. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
□ Náuseas y vómitos muy fuertes; desfallecimiento y debilidad en el epigastrio.	Lob. 6 o 30	C/. 4 h.
Remedios bioquímicos		
	Ferr-p. 6X, Nat-m. 12X y Nat-p. 6X	C/. 4 h.

MASTOIDITIS

(Ver Proceso mastoideo)

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
<u>MASTURBACIÓN FEMENINA</u>		
(Ver <i>Ninfomanía</i>)		
❖ Masturbación que produce leucorrea y trastornos histéricos; paciente miedosa y tímida.	Puls. 200 o 1M	Sem. (3)
❖ Costumbre de masturarse, deseo sexual excesivo.	Orig. 30 o 200	C/. 6 h.
❖ Costumbre de masturarse por picor de la vulva y la vagina.	Calad. s. 30 o 200	C/. 2 h.
❑ Para eliminar los efectos negativos de la masturbación excesiva; melancolía sexual; aspecto de culpabilidad en la cara.	Staph. 30 o 200	C/. 4 h.
❑ Melancolía sexual por el hábito de masturarse; excitación voluptuosa que se extiende por el abdomen; complejo de superioridad.	Plat. 200 o 1M	Sem. (3)
❑ Costumbre de masturarse por prurito de vulva; empeora por la noche; mejora durante la menstruación.	Zinc-met. 30	C/. 4 h.
❑ Costumbre de masturarse por prurito de vulva; vagina seca y dolorida; tristeza.	Nat-m. 30 o 200	C/. 4 h.
● Masturbación debida a picor del clítoris; pensamientos sexuales.	Sulphur 200 o 1M	C/. 4 h. (3)
Remedios bioquímicos		
Cal-p. 30X y Nat-m. 12X		C/. 4 h.

Otros *remedios importantes*: Acid-phos., Phos., Lach., Gels. y Tub-k., etc.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
<u>MASTURBACIÓN MASCULINA</u>		
□ Hábito de masturbarse durante el sueño; complejo de superioridad.	Plat. 1M	Quinc. (3)
☆ Deseo excesivo de masturbarse; después de abusar, depresión de espíritu; fatiga con debilidad nerviosa. Disminución del poder sexual.	Cal-c. 200 o 1M	Sem. (3)
□ Debilidad producida por la masturbación, debido a pérdida excesiva de semen; palidez y expresión enfermiza; cara pálida y cetrina; ojos hundido, con un contorno azulado y oscuro; sudor abundante y debilitador; suda con facilidad al mínimo esfuerzo.	China off. 6 o 30	C/. 4 h.
□ El paciente está cansado y no se siente fresco por la mañana al levantarse; estreñido y friolero.	Nux-v. 200 o 1M	C/. 6 h.
☆ Casos crónicos de masturbación. Rostro hundido; aspecto de sentirse culpable, expresión del rostro abatida; pérdida de memoria y tristeza; hipocondriasis; eyaculaciones nocturnas; dolor de espalda; debilidad en las piernas.	Staph. 200 o 1M	Sem. (3)
● Remedio intercurrente; pensamientos sexuales e inclinación a masturbarse.	Sulphur 200 o 1M	Quinc. (3)
● Efectos negativos de la masturbación; impotencia y paso inseguro; no puede mantenerse de pie, debilidad en las piernas; adormecimiento. Facultades intelectuales muy disminuidas. Pérdida absoluta de la memoria.	Kali-br. 30	C/. 4 h.
□ Debilidad y abatimiento; debilidad nerviosa y temblor. Incomodidad por la sensación de culpabilidad que le produce su costumbre de masturbarse.	Phos. 200 o 1M	Sem. (3)
☆ Ganas incontrolables de masturbarse; malos efectos y debilidad, debidos a la masturbación. El paciente crece demasiado rápido y es muy alto.	Acid-phos. 6 o 30	C/. 4 h.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
<input type="checkbox"/> Efectos negativos de la masturbación; sensación de cansancio y pesadez en todo el cuerpo, especialmente en las extremidades. Fatiga mental, agotamiento mental y físico.	Pic-ac. 30	C/. 4 h.
	Remedios bioquímicos Cal-p. 30X y 12X Nat-m.	C/. 4 h.

MENINGITIS

Es la inflamación de las membranas del cerebro o de la espina dorsal. Puede deberse a un trauma o a diversos tipos de infecciones por microorganismos como meningococos, pneumococos, estafilococos, diversos tipos de bacilos, infecciones tuberculosas y víricas o de origen sifilítico, etc. Suele aparecer repentinamente, con dolores fuertes de cabeza y fiebre alta, vómitos y rigidez, al principio; en los días segundo y tercero, sigue la fiebre alta con dolor de espalda y de las extremidades y dolor de cabeza muy fuerte y muchas veces la tirantez del cuello da paso a rigidez y dilatación de las pupilas con un dolor de cabeza insoportable, delirio, fotofobia e inquietud. Los síntomas van avanzando progresivamente hacia un final fatal.

- En la meningitis cerebro-espinal, la cabeza, el cuello y la espina dorsal se inclinan hacia atrás. **Cic. 30** C/. 4 h.

En Homeopatía, el tratamiento constitucional da buenos resultados. Acon., Apis., Arn., Bell., Bry., Cal-c., Cupr-met., Eup-per., Glon., Hell., Nat-s., Sulphur, Syph., Tub-k., Zinc-met., etc. son los mejores remedios.

El tratamiento debe ser temporal y es preferible la hospitalización.

MENOPAUSIA

- Aversión al baño; cansancio, pérdida de peso; sensación de calor y picor. **Sulphur 200** C/. 4 h. (3)
- ★ Paciente melancólica, irritable y charlatana. Sensación de ardor por todo el cuerpo. No soporta ni el contacto de la ropa. Hemorragia de color oscuro. Dolor de cabeza angustioso, palpitaciones y hemorroides. Empeora después de dormir. **Lach. 200 o 1M** Sem. (3)

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
❑ Predisposición al llanto; cambios de temperamento. Mucho sudor en habitaciones cerradas y calientes; pérdida de la sed; ganas de estar al aire libre y frío.	Puls. 200 o 1M	Sem. (3)
❑ Sensación de cansancio por exceso de trabajo; paciente floja, pálida, relajada y friolera.	Cal-c. 200 o 1M	Sem. (3)
❑ Paciente alta, delgada, propensa a la depresión; no le gusta la simpatía. Dolores de parto, hemorragia con prolapsio de útero; leucorrea con dispepsia o estreñimiento. Flujos cálidos; tendencia a desfallecer.	Sep. 200 o 1M	Sem. (3)
❑ Dolor en los huesos cortos por la mañana, con acidez; lengua con una capa sucia; mal sabor de boca y mal aliento; palidez y frío; empeora con tiempo frío y húmedo. Neuralgia facial por supresión de la leucorrea; mejora en la costa.	Med. 200 o 1M	Sem. (3)
❑ Reumatismo de los músculos de la espalda y dolor en el cuello. Dolor de cabeza fuerte, la paciente se siente como si se le abriese la coronilla de la cabeza.	Actea-racemosa 30	C/. 4 h.
☆ Los síntomas físicos desaparecen al desarrollarse los síntomas mentales. Paciente arrogante y orgullosa; desprecio por los demás. Hemorragia excesiva de sangre con grumos negros y dolor de ovarios. Ninfomanía.	Plat. 200 o 1M	Sem. (3)

Remedio bioquímico **Kali-p. 6X** C/. 4 h.

MENSTRUACIÓN

Incluida la Dismenorrea, etc.

- ☆ Oscura; grumosa; menstruaciones abundantes o escasas; sólo durante el día; primeras menstruaciones retrasadas y dolorosas; intermitentes e irregulares; cambios de humor; preferencia por el aire libre.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
❖ Adelantadas y abundantes; copiosas; durante la noche o estando echada; con frecuencia; intermitente; dolorosa.	Kreos. 30 o 200	C/. 3 h. (3)
❑ Menstruación oscura; acre, como si desollase; sólo durante la noche, después de acostarse.	Bov. 30 o 200	C/. 4 h.
❑ Abundante y oscura; empeora después de hacerse una lesión.	Ham. 30	C/. 3 h. (3)
❑ Oscura; grumosa, dolorosa y frecuente, debida a desplazamiento del útero; sólo durante la noche.	Tri-p. Ø o 6	C/. 3 h.
● Abundante; a borbotones y frecuente; empeora después de hacer ejercicio, cada 2 semanas o al cabo de pocos días; dura una semana o más.	Med. 200 o 1M	Mensual (3)
❑ Abundante; de mal olor, grumosa y dolorosa, debida a fibroma uterino; difícil de lavar.	Plat. 200 o 1M	C/. 3 h. (3)
❑ Menstruación de color rojo vivo; abundante, grumosa, dolorosa y frecuente; empeora en la menopausia; se alivia caminando; historial de abortos.	Sabin. 30 o 200	C/. 6 h.
❑ Menstruaciones de color rojo vivo, mezcladas con coágulos oscuros; de mal olor.	Bell. 30	C/. 4 h.
❑ Menstruaciones de color rojo vivo, a borbotones; náuseas o vómitos, lengua limpia.	Ip. 30	C/. 4 h.
❖ Menstruaciones de color rojo vivo, copiosas y frecuentes.	Mill. Ø o 30	C/. 4 h.
❑ Menstruaciones de color rojo vivo; la paciente quiere beber agua fría.	Phos. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
❑ Menstruaciones acres, parece que desuellan; copiosas después de un aborto; frecuentes; intermitentes.	China 6 o 30	C/. 4 h.
❑ Menstruaciones copiosas; duran hasta el periodo siguiente; negras y grumosas; irregulares.	Sec-cor. 30	C/. 4 h.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
◻ Menstruaciones profusas y adelantadas; abundantes con grumos oscuros y distensión abdominal.	Nux-v. 30 o 200	C/. 6 h.
◻ Adelantadas y abundantes, rojo vivo, larga duración con dolor de cabeza; empeoran después de hacer ejercicio; se adelanta en jóvenes y duran mucho tiempo; se retrasan en adultas.	Cal-p. 12X o 30	C/. 3 h. (3)
● Abundantes; duran una semana o más, son frecuentes, cada dos semanas; intermitentes.	Sulphur 200 o 1M	C/. 4 h. (3)
◻ Amenorrea; sangre oscura y grumosa; abundante, frecuente; retrasada, primeras menstruaciones retrasadas; agotadoras, sangre pálida y diluida.	Ferr-met. 3X o 6	C/. 4 h.
☆ Irregular; dolorosa, retrasada y frecuente; empeora con el ejercicio.	Sep. 30 o 200	C/. 3 h. (3)
☆ Adelantada; abundante y frecuente; cada dos semanas; durante la lactancia; dura una semana o más; vuelve después de una excitación; se suprime después de trabajar con agua o mojarse.	Cal-c. 200 o 1M	C/. 3 h. (3)
◻ Menstruaciones abundantes; oscuras, frecuentes, intermitentes e irregulares; sólo durante el día; de mal olor, dolorosas y densas, estando de pie.	Lil-t. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
◻ Flujo menstrual suprimido después de un susto o un trauma; en jóvenes que tienen pléthora; menstruaciones abundantes con sangrado por la nariz; retrasadas; miedo e inquietud.	Acon. 30 o 200	C/. 3 h.
◻ Menstruaciones frecuentes y copiosas; de mal olor; sangrado pasivo.	Helon. Ø o 6	C/. 4 h.
☆ Todas las molestias mejoran en la menstruación; puede ser abundante o escasa; dolorosa sólo durante un periodo muy corto ; oscura, con grumos y negra.	Lach. 200 o 1M	C/. 3 h. (3)

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
◻ Abundante; empeora después de un lesión o del coito; dolores como de magulladuras.	Arn. 200 o 1M	C/. 3 h. (3)
◻ Menstruaciones abundantes; se retrasan o desaparecen; empeoran estando sentada; se siente mejoría después de empezar el flujo.	Zinc-met. 30 o 200	C/. 3 h. (3)
◻ Oscuras, grumosas, correosas, de mal olor, dolorosas y frecuentes; empeora con el mínimo movimiento.	Croc. Ø o 6	C/. 4 h.
☆ Retrasadas; especialmente en las primeras menstruaciones; irregulares, dolorosas, pálidas y escasas; estreñimiento.	Graph. 30 o 200	C/. 3 h. (3)
◻ Retrasadas y dolorosas; el flujo agrava las molestias; dolor neurálgico, reumático; escasa o se suprimen por emociones o fiebre.	Actea-rac. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
☆ Retrasadas; escasas; se interrumpen con el frío; poniendo las manos en agua fría; los pechos aumentan de tamaño y están doloridos durante el ciclo menstrual.	Con. 200 o 1M	C/. 3 h. (3)
◻ Retrasadas o interrumpidas; por poner las manos en agua fría; se interrumpen después de beber leche.	Lac-d. 200	C/. 3 h. (3)
◻ Se adelantan o se retrasan; agotadoras, escasas o abundantes; estreñimiento; hemorragia entre periodos.	Thlas. bur-p Ø o 6	C/. 4 h.
◻ Abundante; periodos más abundantes alternativos; frecuente y dolorosa; muy pequeña (el primer día), el segundo día, con vómitos; cólico menstrual, con grandes coágulos.	Cycl. 30	C/. 4 h.
◻ Dolorosa y escasa; aumenta cuando está sentada y disminuye al caminar.	Alum. 30 o 0/5 (50 mi.)	C/. 4 h.
☆ Menstruaciones con dolor neurálgico; dismenorrea y dolores que pasan a otras partes del cuerpo.	Caul. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
◻ Se adelanta; oscura y correosa, con dolor neurálgico; mejora al empezar al flujo; cólico menstrual; dismenorrea membranosa.	Mg-p. 12X o 30	C/. 3 h.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
❑ Las menstruaciones duran mucho tiempo; densas y oscuras; irregulares.	Nux-m. 200	C/. 3 h. (3)
❑ Adelantadas y abundantes; se repiten si se hace mucho ejercicio, se camina mucho o se tiene estreñimiento, etc.; hemorragia entre periodos.	Ambra-gr. 200	C/. 3 h. (3)
❑ Dolorosas; sólo durante un día o una hora; retrasada y escasa; amenorrea con oftalmia.	Euphr. 30 o 200	C/. 4 h.
❑ La menstruación aparece sólo por un día; escasa, dolor de estómago y espalda en la menstruación.	Bar-c. 200	C/. 4 h. (3)
❑ Con grumos; correosa, pasiva y de color rojo vivo; abundante después de un aborto; empeora a la mínima provocation.	Ust. Ø o 6	C/. 4 h.
❑ Adelantada y abundante; desaparece al bañarse en un río o en una piscina; lengua con una capa blanquecina gruesa.	Ant-c. 200	C/. 4 h. (3)
★ Suprimida con cólico; mejora doblándose o presionando.	Coloc. 200	C/. 3 h. (3)
❑ Irritante, adelantada, abundante y prolongada; se corta al mojarse los pies.	Rhus tox. 200 o 1M	C/. 3 h. (3)
❑ Adelantada y abundante; hemorragia nasal en vez de menstruaciones; empeora con el movimiento.	Bry. 30 o 200	C/. 4 h.
❑ Completamente agotada durante la menstruación, le cuesta trabajo hablar; muy duraderas, aunque no abundantes.	Carbo-an. 200	C/. 3 h. (3)
❑ Menstruaciones que se adelantan o se retrasan; escasas o abundantes; con dolor en los genitales; dolor que empieza en la espalda y pasa al labio genital izquierdo.	Kali-c. 200 o 1M	C/. 3 h. (3)
❑ A borbotones, agotadora, con cólico, como si se rozasen piedras duras; irregular y dolorosa.	Cocc. 30 o 200	C/. 4 h.
❑ Escasa; adelantada o retrasada; coágulos de sangre negra; el flujo menstrual agrava las molestias.	Thuy. 200 o 1M	C/. 3 h. (3)

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
❑ Frecuente; se adelanta o se retrasa; sólo durante el día; no hay menstruación por la noche; escasa y maloliente.	Caust. 200 o 1M	C/. 3 h. (3)
❑ Frecuente y a borbotones; dolorosa y correosa; pechos hinchados y doloridos antes de la menstruación y mejoran después de ella; menstruación excesiva; descarga de mucus sanguinolento después de menstruaciones en luna nueva.	Lac-c. 200 o 1M	C/. 3 h. (3)
❑ Menstruaciones durante el periodo de lactancia; mientras de da de mamar al niño.	Sil. 200 o 1M	C/. 3 h. (3)
❖ Membranosa; adelantada y abundante, con espasmos en el abdomen; náuseas y dolor de estómago que se extiende a la espalda.	Borx. 30	C/. 4 h.
❑ Adelantada con olor denso y fuerte; maloliente; prematura y demasiado abundante.	Carbo-veg. 30 o 200	C/. 3 h. (3)
● Menstruaciones malolientes; mamas hinchadas y doloridas.	Psor. 200 o 1M	1 C/. mes (3)
❑ Menstruaciones dolorosas; suprimidas; cólico antes de aparecer la descarga.	Verat-v. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
❑ Dismenorrea; menstruaciones que se retrasan por norma.	Pneu. 30 o 200	C/. 3 h. (3)

METRITIS

Inflamación del útero

❑ Debida a pérdida excesiva de sangre por el útero; inquietud y agotamiento.	Ars. 30	C/. 4 h. (6)
❖ Despues de un aborto; hipersensibilidad al mínimo choque; cara sonrojada.	Bell. 30 o 200	C/. 4 h.
❖ Despues de un parto prematuro o de un aborto. Dolor desde el sacro al pubis, que sube por la vagina.	Sabin. 30 o 200	C/. 4 h. (3)

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
❑ Con dolor como pulsaciones y sensibilidad excesiva al dolor; presión, frío, etc.,	Hep. 30	C/. 4 h.
❑ Con ardor doloroso e hinchazón; metritis puerperal, con cistitis.	Canth. 30	C/. 4 h.

METRORRAGIA

(Ver también *Aborto*)

Hemorragia uterina fuera de los períodos menstruales.

★ Producida por una caída; sangre negruzca; se produce fuera de los períodos menstruales; dolor de abdomen.	Ham. Ø o 30	C/. 3 h.
❑ Despues de un aborto, hemorragia en pequeñas cantidades, coagulada; dolores fuertes.	Cham. 30 o 200	C/. 3 h. (3)
❑ Por amenaza de aborto en el tercer mes; repentina, sin que haya otro problema de salud.	Kreos. 30 o 200	C/. 3 h. (3)
❑ Por prolápso de útero; después del coito; por lesión mecánica.	Arn. 30 o 200	C/. 3 h. (3)
❑ Crónica; empeora antes o después de un aborto.	Lyc. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
❑ En pacientes frioleras, obesas y flojas; amenaza de aborto.	Cal-c. 200 o 1M	C/. 4 h. (3)
❑ Sangre de color rojo vivo; dura mucho tiempo; náuseas y vómitos con lengua limpia.	Ip. Ø o 30	C/. 4 h.
❑ Con endurecimiento del útero; dolor como el de parto; seguido de gran agotamiento.	Carbo-an. 30	C/. 4 h.
★ Dolorosa; por exceso de ejercicio; hemorragia abundante, como agua sucia.	Nit-ac. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
❑ Durante el embarazo; falta de sed, sensación de calor y punzadas dolorosas.	Apis. 30 o 200	C/. 4 h. (3)

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
★ Durante el embarazo; por falta de sueño; coágulos de sangre con cólico espasmódico.	Cocc. 30	C/. 4 h.
★ Sangre abundante; emanación prolongada y continua de sangre fluida y negruzca.	Sec-cor. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
Remedios bioquímicos	Cal-p. 6X y Ferr-p. 3X	C/. 4 h.

MIASMAS

Hay tres miasmas en Homeopatía que son la causa de todas las enfermedades crónicas. Son **Psora**, **Syphilis** y **Sycosis**. No damos aquí detalles, porque es un tema muy amplio que justifica otro libro.

MIEDO

(Ver también *Ansiedad*)

<input type="checkbox"/> A caer; a moverse hacia abajo.	Borx. 200 o 1M	Sem. (3)
<input type="checkbox"/> A objetos puntiagudos; cuchillos y tenedores, etc.	Spig. 200 o 1M	Sem. (3)
<input type="checkbox"/> A los perros, a los animales.	Bell. 200 o 1M	Sem. (3)
<input type="checkbox"/> A estar solo; a las tormentas, a los fantasmas, etc.	Phos. 200	Sem. (3)
<input type="checkbox"/> A presentarse en público; a un examen, etc.	Arg. Nit. 30 o 200	C/. 10 m. (3)
<input type="checkbox"/> Miedo a fallar (examen, etc.).	Gels. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
<input type="checkbox"/> A los aeroplanos que vuelan por encima de la cabeza.	Acon. 200	C/. 10 m. (3)
<input type="checkbox"/> En los niños, a acostarse solos.	Caust. 30 o 200	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Miedo a estar solo; se está mejor al aire libre, aunque el paciente sea friolero.	Puls. 30 o 200	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Miedo a la pobreza.	Cal-f. 200 o 1M	Sem. (3)

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
❑ Miedo a los accidentes.	Carbo-veg. 200	Sem. (3)
❑ Si falla Carbo-veg.	Psor. 200	Sem. (3)
❑ Miedo a que lo toquen.	Arn. 200 o 1M	Sem. (3)
❑ Miedo al cólera.	Lach. 200 o 1M	Sem. (3)
❑ Miedo al agotamiento; a una enfermedad contagiosa, a ir al dentista.	Cal-c. 200 o 1M	Sem. (3)
❑ Miedo a cortarse al afeitarse.	Calad. 200 o 1M	Sem. (3)
❑ Miedo a la oscuridad.	Stram. 200 o 1M	Sem. (3)
❑ Miedo a la muerte; a una minusvalía, insatisfacción por la vida.	Pneu. 200	C/. 10 m. (3)
● Remedio intercurrente.	Sulphur 200 o 1M	Sem. (3)

MIGRAÑA

(Ver también *Dolor de cabeza*)

Como la migraña es una enfermedad muy molesta, damos los síntomas con detalle.

- ★ Por trabajo mental; por frío, por llevar la cabeza descubierta, por presión, por estar sentado recto o por insolación.
Glon. 30 C/. 3 h.
- ★ Por nervios; individuos biliosos y con problemas gástricos. Migraña producida por esfuerzo mental excesivo en profesores y estudiantes. Migraña del lado derecho, en especial la migraña del domingo, visión borrosa, hemiopía; ceguera; con frecuencia, ardor doloroso en todo el tracto gastrointestinal, con vómitos ácidos violentos en el momento más grave del ataque; empeora con tiempo cálido, en primavera y en otoño; mejora después de vomitar o de dormir lo suficiente por la noche.
Iris. 200 o superior C/. 10 m. (3)

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
❑ Para hipocondriacos irritables de mal temperamento; co-lericos, neuropáticos; por abuso del alcohol, el café, las especias, el tabaco, por sufrir vejaciones y disgustos, exceso de ejercicio mental, problemas de negocios, excesos sexuales, hábitos sedentarios y corrientes de aire frío y seco.	Nux-v. 30 o 200	C/. 4 h.
☆ Para personas (irritables y miedosas) que tienen marcados problemas vasomotores durante el preclimaterio y la menopausia. Expresión de cansancio, congestión de cabeza, mejillas con marcas rojas; dolor punzante y rítmico por encima del ojo derecho, con frecuencia se repite cada ocho días; por la mañana temprano, dolor que empieza en la nuca y se extiende hacia arriba, localizándose en la zona del ojo; aparece y desaparece con el sol; sensación de congestión fuerte.	Sang. 200	C/. 10 m. (3)
❑ Para pacientes débiles, obesos e irritables; suelen ser apáticos, de humor variable, cambios extraños de carácter (egocéntricos); memoria débil, debido a trastornos durante el periodo del climaterio, consecuencias de abuso del tabaco. Personas de complexión poco profunda; mancha amarilla, como silla de montar, en la nariz; dolor localizado en el temporal izquierdo; punzadas dolorosas.	Sep. 200	C/. 10 m. (3)
☆ Para personas neuropáticas, llenas de miedos a los ruidos, los cambios del tiempo o los gusanos; con palidez en el rostro; localizado por encima del ojo izquierdo; especialmente en la pupila izquierda (neuralgia ciliar); dolor periódico agudo, como golpes y punzadas, que hace llorar, desde el occipucio hasta el ojo izquierdo; va aumentando lentamente en intensidad, con el sol. Vómitos de bilis en el punto más grave del ataque que va mejorando según declina el sol. Sensación de que se tiene la cabeza abierta con una sutura sagital.	Spig. 200 o 1M	C/. 10 m. (3)

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
★ Del lado izquierdo; empeora durante el sueño y después de él; antes de la menstruación; calor; durante la menopausia.	Lach. 200 o 1M	C/. 10 m. (3)
● Remedio intercurrente	Bac. 200 o 1M	Quinc. (3)

Otros remedios importantes: Bell., Bry.. Carbo-veg., Nat-m., Syph., Sulphur, Thuy., Phos. y Med., etc.

MIOPÍA

Cortos de vista

Es una situación en la que, como consecuencia de un error de refracción o de alargamiento del globo ocular, se concentran rayos paralelos delante de la retina.

Remedios importantes: Con., Lil-t., Phos., Acid-phos., Phys., Puls., Cal-c., China off., Nit-ac., Agar., Carbn-s., etc.

MORDEDURAS

De animales, picaduras de insectos, etc.

Hasta que se disponga de un tratamiento médico concreto, se pueden dar, en caso necesario, cualquiera de las siguientes medicinas, dependiendo de los síntomas.

<input type="checkbox"/> Picadura de abeja (puede aplicarse como uso externo la loción Urt-u.).	Apis. 30	C/. 3 h.
<input type="checkbox"/> Picadura de avispa.	Arn. 200	C/. ½ h. (3)
<input type="checkbox"/> Picadura de mosquito.	Staph.	C/. 3 h.
<input type="checkbox"/> Picadura de serpiente venenosa.	Bell. 200 y Strych-gt Ø o Euph-po. Ø, en dosis de 10 gotas cada 15 m. (6). También es útil Lycps-v. Ø y Cedr. 200 cada media hora.	C/. 10 m. (6) Merc. 200 alternando

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
❑ Picadura de pulga.	Pulx. 30	C/. 2 h.
❑ Picadura de mosquito.	Canth. 200	C/. 15 m. (3)
❑ Mordedura de perro; mordedura de animales rabiosos.	Lys. 200	C/. 10 m. (3) En uso externo, loción de Echi.
❑ Mordedura de rata o picadura de escorpión.	Led. 200	C/. ½ h. (3)

NARIZ

❑ Dolor e hinchazón de los huesos nasales; caries y ulceración. Mal olor de la nariz; descarga nasal maloliente, de color amarillo verdoso, parecida a pus.	Merc. 30	C/. 4 h.
❑ Punta de la nariz de color rojo brillante; cosquilleo en las fosas nasales.	Caps. 30	C/. 4 h.
❑ Nariz dura y roja; fosas nasales doloridas, con costras y úlceras.	Kali-c. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
❑ Nariz embotada; obstruida, muy seca; con descarga de mocos amarillos; con tapones en las fosas nasales, como si fuese a estallar la nariz; la nariz parece pesada; septo ulcerado.	Kali-bi. 30	C/. 4 h.
❑ Picor de nariz; el paciente se frota y se rasca la nariz continuamente.	Cina. 30 o 200	C/. 4 h.
❑ Ardor de nariz; resoplar y el frío crónico afectan a la parte posterior de la nariz.	Cist. 30	C/. 4 h.
● Hinchazón e inflamación de la nariz; aletas rojas y nariz con sarna; ulceración de las fosas nasales.	Sulphur 30 o 200	C/. 4 h. (3)
❑ Fisuras en la nariz; ulceración de las fosas nasales; verrugas y ampollas en la nariz.	Caust. 30 o 200	C/. 4 h. (3)

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
<input type="checkbox"/> Entumecimiento de la nariz; caries de los huesos nasales; la punta de la nariz está hinchada, enrojecida y brillante.	Asaf. 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Presión descendente en la nariz; punta hinchada, rojiza y brillante.	Borx. 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Erupciones de nariz; fosas nasales rojas y escoriadas.	Mez. 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Nariz con úlceras, dolorosa e hinchada; la punta está dura; caries; descarga fétida.	Aur. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
<input type="checkbox"/> Con descarga de moco verde; huesos nasales doloridos; presión dolorosa en la raíz de la nariz.	Puls. 30 o 200	C/. 4 h.
● Estornudos violentos; cuando fallan remedios bien elegidos.	Op. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
<input type="checkbox"/> Pólipos nasales grandes y pedunculados.	Cal-p. 12X o 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Epitelioma o pólipos de nariz; dolor y hemorragia nasal.	Con. 30 o 200	C/. 4 h.

NÁUSEAS

<input type="checkbox"/> Se alivian al comer; especialmente en mujeres pálidas y anémicas.	Lact-ac. 30	C/. 3 h.
★ Náuseas; empeoran cuando se huelen o ven alimentos, al echarse de un lado o por la mañana, antes de comer.	Sep. 30 o 200	C/. 3 h. (3)
★ Náuseas con vértigo; al cerrar los ojos, con el mínimo movimiento, por espondilosis.	Ther. 30	C/. 3 h.
★ Náuseas mortales; empeoran al abrir los ojos; al mínimo movimiento, al oler el humo del tabaco.	Tab. 30 o 200	C/. 3 h. (3)
<input type="checkbox"/> Al mirar hacia arriba, con falta de sed; empeora en una habitación cálida; mejora con el frío, al aire libre.	Puls. 30 o 200	C/. 3 h.
<input type="checkbox"/> Despues de una operación de abdomen; el paciente anhela el tabaco.	Staph. 30 o 200	C/. 3 h. (3)

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
✗ Náuseas con vómitos; empeora después de comer o beber; por intoxicación por alimentos; inquietud.	Ars. 30	C/. 3 h.
◻ Durante el embarazo, empeora por la mañana, con digestión débil.	Carbo-veg. 30	C/. 3 h.
◻ Náuseas con vómitos por la mañana; después de comer; quiere vomitar, pero no puede.	Nux-v. 30	C/. 3 h.
✗ Náuseas constantes con lengua limpia y húmeda.	Ip. 30	C/. 3 h.
	Remedio bioquímico	
	Sil. 30X	C/. 3 h.

En los estados agudos, pueden darse los remedios mencionados cada media hora.

NEFRITIS

Inflamación de los riñones

(Ver también Riñones)

◻ Nefritis debida a cualquier enfermedad aguda, con tenesmo constante.	Ter. Ø,	5-10 gt. C/. 3 h.
✗ Nefritis aguda, con amenaza de uremia. Albúmina y elementos renales en la orina. En las enfermedades de corazón, los riñones, que antes trabajaban bien, resultan afectados.	Eel serum 30	C/. 4 h.
◻ En la etapa inicial; con dolores agudos en la zona de los riñones después de una exposición.	Acon. 30 o 200	C/. 2 h.
● Con dolor de la zona de los riñones (remedio intercurrente).	Med. 200 o 1M	Quinc. (3)
◻ Dolores como golpes, que se extienden por la vejiga con el calor, y distensión de la zona de los riñones; orina de color rojo.	Bell. 30 o 200	C/. 3 h.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
★ Con ardor; escozor y dolor, como si arrancasen algo, desde los riñones hasta la ingle; dificultad para orinar.	Cann-s. 200 o 1M	C/. 10 m. (3)
★ Con dolor cortante; tenesmo y ardor fuerte; la orina sale gota a gota, mezclada con sangre, o se deja de orinar por completo.	Canth. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
□ Con dolores agudos y punzadas; pérdida involuntaria de orina al toser y estornudar, etc.	Kali-c. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
★ La zona de los riñones está delicada; el dolor irradia desde los riñones al abdomen, la vejiga y las extremidades inferiores. La orina contiene albúmina, mucosidades y ácido fosfórico.	Solid. Ø	4-5 gt. C/. 4 h.
□ Por lesiones mecánicas, como commociones continuas y severas.	Arn. 30 o 200	C/. 4 h.
★ Náuseas excesivas con distensión extrema del abdomen; micción escasa y dolorosa. Orina de color rojo vivo; contiene sangre en descomposición, albúmina y azúcar.	Colch. 30	C/. 4 h.
□ En casos crónicos, cuando hay endurecimiento de las glándulas; paciente hipersensible al dolor y al frío, etc.	Hep. 30 o superior.	C/. 4 h.
□ Cuando hay diarrea y tenesmo con endurecimiento de las glándulas; orina oscura, escasa, sanguinolenta y albuminosa.	Merc. viv. 30	C/. 4 h.
□ Cuando la complicación viene después de la supresión de una descarga de hemorroides; hábitos sedentarios y exceso de estimulantes; estreñimiento; se suben los testículos y el cordón espermático.	Nux-v. 30	C/. 4 h.
★ Por supresión de las menstruaciones; se pierde orina al toser o estornudar; empeora al echarse.	Puls. 30	C/. 4 h.
★ Por pérdida de sueño; noche en vela; en mujeres que están amamantando.	Cocc. 30	C/. 4 h.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
❑ Con sed excesiva; inquietud y agotamiento; la orina contiene albúmina, células epiteliales, fibrina, pus y sangre, etc.	Ars. 30	C/. 4 h.
	Remedios bioquímicos. Ferr-p. 6X y Kali-m. 6X	C/. 4 h.

NERVIOSISMO

(Ver también *Ansiedad*)

✗ Con ansiedad; mejora después de comer.	Anac. 30 o 200	C/. 4 h.
❑ Con ansiedad muy fuerte; impaciencia extrema, miedos; intolerancia al dolor, a la música y al mínimo ruido; confusión mental; se agolpan los pensamientos y las ideas.	Acon. 30 o 200	C/. 3 h.
✗ Por disgustos debidos a los acontecimientos; miedo a la altura, a la multitud, a los lugares cerrados y al agua; miedo a un reconocimiento médico, etc.	Arg. Nit. 30 o 200	C/. 3 h. (3)
❑ Como consecuencia de un enfado o un disgusto; paciente desdichado, propenso a quejarse, desesperado; salta al mínimo ruido; crítico con los demás, olvidadizo; muy simpatético.	Caust. 200	C/. 3 h. (3)
❑ Con mal temperamento; inquietud extrema; no le agrada nada, intolerante con todo.	Cham. 200	C/. 3 h. (3)
✗ Incapaz de adaptarse a la vida; depresión después de gripe; parece que tiene la mente paralizada; apático, indolente; miedo a caerse; trémulo, tembloroso, aprensivo.	Gels. 30 o 200	C/. 4 h.
✗ Despues de un trauma repentino de estrés; deprimido e irritable; cambia de humor; rumia sus disgustos en secreto; no puede olvidar el pasado; llora sin querer; suspira; no puede soportar el dolor.	Ign. 200 o 1M	C/. 3 h. (3)

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
□ Por esfuerzo prolongado; lasitud y depresión; aversión a juntarse con la gente.	Kali-p. 6 o 30	C/. 4 h.
□ Con indigestión; persona friolera, tensa, activa; frustrada; pendenciera, crítica, hipersensible; quiere arrojar las cosas.	Nux-v. 30	C/. 6 h.
□ Llorón; paciente apacible y quisquilloso; efectos de malas noticias, inquietud, malestar emocional; desea estar acompañado.	Puls. 200	C/. 4 h. (3)
Remedio bioquímico	Kali-p. 6X	C/. 4 h.

NEUMONÍA

□ Por exposición a corrientes de aire secas y frías; con fiebre alta, ansiedad e inquietud; expectoración de color rojo brillante.	Acon. 30 o 200	C/. 3 h.
☆ Cuando la bronquitis se convierte en neumonía; sensación de debilidad en el pecho; capa blanquecina en la lengua.	Ant-t. 30 o 200	C/. 10 m. (3)
☆ Lengua limpia; tos espasmódica con vómitos; bronconeumonía.	Ip. 30	C/. 3 h.
□ Por formación excesiva de bilis; tos crónica o tosferina después del sarampión.	Chel. 6 o 30	C/. 3 h.
☆ Expectoración abundante, maloliente, pertinaz, como pus y con rayas de sangre; frío en el pecho y dolor punzante que se desplaza; empeora de 3 a 4 de la madrugada.	Kali-c. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
☆ Expectoración oxidada; cuando se produce una exudación crupal; sed excesiva y estreñimiento; empeora con el movimiento.	Bry.. 30 o 200	C/. 4 h. (3)

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
<input type="checkbox"/> Cuando empieza la destrucción de los tejidos de los pulmones; el paciente quiere aire fresco y ventilación, aunque tenga el cuerpo frío.	Carbo-veg. 30 o 200 C.	<i>3 h. (3)</i>
<input type="checkbox"/> Cuando tiene lugar una hepatización.	Iod. 30	<i>C. 3 h.</i>
<input type="checkbox"/> Con sensación de debilidad en el pecho; flemas de sabor dulce que atraen a las moscas.	Stann.. 30 o 200	<i>C. 3 h.</i>
<input type="checkbox"/> Cuando cuesta trabajo respirar por una hepatización extrema; disnea marcada.	Lyc. 30 o 200	<i>C. 4 h. (3)</i>
<input type="checkbox"/> Cuando quedan algunos puntos en el pulmón, después de la recuperación; pérdida de sed; el paciente se siente mejor al aire libre y frío.	Puls. 30	<i>C. 4 h. (3)</i>
Remedios bioquímicos		
	Ferr-p. 6X y Kali-s. 6X	<i>C. 4 h.</i>

NEURALGIA FACIAL

Dolor del Nervio Facial

<input type="checkbox"/> Aparece repentinamente; después de estar expuesto a corrientes frías y secas.	Acon. 30 o 200	<i>C. 3 h.</i>
<input type="checkbox"/> Ataques periódicos; ardores dolorosos; empeora alrededor de los ojos y de los temporales; empeora con el frío; mejora con al calor.	Ars. 30 o 200	<i>C. 3 h.</i>
★ Neuralgia facial; dolor como dardos en los huesos de las mejillas, en la nariz, en las mandíbulas, en los temporales o en el cuello; aflujo de sangre a la cabeza.	Bell.	<i>C. 3 h.</i>
<input type="checkbox"/> Ataques periódicos; sensibilidad extrema y dolor de piel; por pérdida de fluidos.	China off. 30	<i>C. 3 h.</i>

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
★ Violenta; dolor insopportable, como si se clavasen dardos, especialmente en el lado izquierdo de la cara, que se extiende a la cabeza y los temporales; empeora al tocarlo.	Cham. 200 o 1M	C/. 10 m. (3)
□ Dolor hacia el lado derecho de la cara; empeora por la tarde de 4 a 8 y con el calor.	Lyc. 30 o 200	C/. 10 m. (3)
★ Neuralgia facial con frío y letargo en el lado afectado de la cara; pérdida de sed; empeora por la tarde.	Puls. 30 o 200	C/. 4 h.
★ Dolor punzante a lo largo del nervio; mejora con el calor y la presión.	Mg-p. 6X o 30	C/. 3 h.
□ El dolor mejora sólo con el calor muy fuerte.	Mez. 30	C/. 4 h. (3)
★ Neuralgia del lado izquierdo; ardor, picor, dolor intollerable.	Spig. 30 o 200	C/. 4 h.
● Empeora por la noche (remedio intercurrente).	Syph. 200 o 1M	Sem. (3)
Remedio bioquímico	Ferr-p. 6X y Mg-p. 6X	C/. 4 h.

Hay otros remedios para el dolor en general que se pueden aplicar dependiendo de los síntomas.

NEURITIS

Inflamación de los nervios

□ Remedio capital; por lesión de los nervios.	Hyper. 30 o 200	C/. 4 h.
□ Aparece de repente, con inquietud y miedo; empeora con el ruido o la luz.	Acon. 30 o 200	C/. 2 h.
□ Debida a exposición al sol o al calor; mejora con el movimiento y descubriendo la cabeza.	Glon. 3X o 6	C/. 2 h.
□ Mejora con la presión y el calor; empeora con el frío.	Mg-p. 6X o 30	C/. 4 h.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
❑ Debida a congestión; aflujo de sangre a la cabeza; cara enrojecida.	Bell. 30	C/. 3 h.
❑ Por trastornos de útero; síntomas reflejos.	Cimic. 30	C/. 4 h.
❑ Neuritis intersticial; sensibilidad al aire y al tacto.	Ran-b. 30	C/. 4 h.

NINFOMANÍA

(Ver también *Masturbación femenina*)

Deseo sexual incontrolable en la mujer.

❑ El coito aumenta el deseo sexual; empeora durante la menstruación.	Tarent. 200 o 1M	Sem. (3)
❑ Empeora antes de las menstruaciones y durante ellas; es incapaz de controlarse.	Verat. 30	C/. 4 h.
❑ Empeora antes de las menstruaciones y durante el embarazo; es fácil de inducir al coito.	Phos. 200	Sem. (3)
❖ En muchachas jóvenes; se ven obligadas a masturbarse, por su excesivo deseo sexual.	Orig. 30	C/. 4 h.
❖ Durante las menstruaciones y después de suprimirlas; necesidad sexual excesiva.	Plat. 200 o 1M	Sem. (3)
❖ El clítoris está erecto después de masturbarse, con deseo excesivo; empeora antes de la menstruación.	Cal-p. 12X o 30	C/. 4 h.
❖ Hinchazón e irritación de la vulva con deseo excesivo; manía sexual.	Canth. 30 o superior	C/. 4 h.
❑ Cuando no se soporta el peso de la ropa en la cintura; mujer locuaz y celosa; especialmente en la menopausia.	Lach. 200 o 1M	Sem. (3)
❑ Deseo excesivo, con enfermedades del útero; prolapso y pulsación en el cuello del útero.	Lil-t. 30 o 200	C/. 4 h. (3)

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
❑ Excitación sexual excesiva, con ensanchamiento y endurecimiento del útero; el mínimo contacto produce una excitación sexual violenta.	Murx. 200 o 1M	C/. 4 h. (3)
❑ Ninfomanía; pensamientos libidinosos y sueños lascivos; pasión sexual.	Sal-n. Ø o 30	C/. 4 h.
❑ Excitación insaciable, con gran violencia; miedo a la oscuridad.	Stram. 200 o 1M	C/. 4 h. (3)
	Remedio bioquímico	Cal-p. 200X
		C/. 4 h.

OBESIDAD

Corpulencia

(Ver también Gordura)

❑ Lengua con una capa gruesa blanquecina; el paciente se siente agotado en tiempo cálido.	Ant-c. 200	C/. 6 h.
❑ Con una estatura demasiado alta en los niños; pacientes frioleros.	Sil. 30X o 30	C/. 4 h.
❑ Cuando la lengua está siempre con una capa blanca; con trastornos de hígado.	Kali-m. 30X o 6	C/. 4 h.
★ Pacientes gordos, débiles y frioleros. La cabeza sudá mucho; empeora por la noche, con el ejercicio; se fatiga con facilidad; los pies están fríos y húmedos; apetece comer huevos; sensibilidad al clima frío y húmedo.	Cal-c. 200 o 1M	C/. 4 h.
❑ Especialmente, para mujeres gordas que se aproximan a la menopausia; sensibles al tiempo frío; abultamiento del hígado y el bazo.	Cal-ar. 200	C/. 6 h.
★ Pacientes obesos que sufren estreñimiento; flatulencia; bocio o tiroides demasiado desarrollados.	Fuc. Ø, 10-20 gt.	C/. 4 h.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
● Remedio intercurrente; especialmente cuando se debe la obesidad a problemas de tiroides.	Thyr. 200 o 1M	Sem. (3)
☆ Pacientes obesos, frioleros, estreñidos, especialmente mujeres que tienen un historial de retrasos en la menstruación; propensión a tener enfermedades de la piel; sienten frío; con la misma facilidad, se quedan helados y sienten mucho calor.	Graph. 200 o 1M	Sem. (6)
<input type="checkbox"/> Para mujeres gordas; se sienten completamente agotadas (tanto si hacen algo como si no).	Lac-d. 200	Sem. (6)
<input type="checkbox"/> Para reducir peso (carne y grasa); para hacer unos músculos duros y firmes.	Calo. 30 o 200	C/. 6 h.
☆ Para absorber tejidos anormales, brotes nuevos y grasas.	Phyt. berry Ø,	10 gt. C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Pacientes obesos con debilidad de corazón; sensibles al frío; aversión al agua; hábitos poco higiénicos; predisposición a los resfriados.	Am-c. 200	C/. 6 h.

Otros *remedios importantes*: Am-br., Caps., Ferr-met., Thir., Kali-br., Kali-c. y Med., etc.

OBSTRUCCIONES AL FLUJO DE FUERZA VITAL

(Ver diferentes enfermedades)

Los efectos de las adicciones, como el alcoholismo, el exceso de medicación, las quemaduras, la cauterización, el uso del cloroformo, de las enfermedades epidémicas, como el sarampión, la viruela, la tosferina, las fiebre tifoideas, etc. y de comer alimentos cocinados en vasijas de aluminio, ingerir la cubierta de cera de los alimentos, de las heridas viejas, los disgustos, los traumas mentales, la diabetes, etc., suelen ser malos y están considerados como impedimentos graves para curar un caso. En Homeopatía, hay algunas medicinas que, de acuerdo con la ley de los semejantes, sirven para eliminar las condiciones enfermizas de las intoxicaciones mencionadas y efectos nocivos debidos a brotes agudos de enfermedades crónicas y otras razones. Para hacer frente a estos casos con más seguridad, lea "Practical Management of the Sick", de Dr. Sandhu.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
----------	----------	--------------------------

OÍDOS

(Ver *Otorrea, Sordera, etc.*)

OJOS, Afecciones de los

(Ver también *Ardor, Lesiones, otros capítulos relacionados*)

<input type="checkbox"/> Punzadas en los ojos; dolores agudos y penetrantes; iritis sifilítica; se sangra por los ojos mientras se suena la nariz.	Nit-ac. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
<input type="checkbox"/> Se pegan los ojos al estornudar.	Gamb. 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Atrofia de retina.	Carbn-s. 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Desprendimiento de retina.	Naphtin. 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Destellos, como una chispa eléctrica, delante de los ojos; sensación de que se mueven estrellas brillantes delante de los ojos.	Croc. 30	C/. 4 h. (3)
<input type="checkbox"/> Congestión de retina por enfermedad cardiaca.	Cat. 30	C/. 4 h. (3)
<input type="checkbox"/> Ojos al rojo vivo; apoplejía de retina.	Glon. 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Sangrado de los ojos; dolor como si se hubiese recibido un golpe.	Arn. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
<input type="checkbox"/> Edema; ardor con lacrimación irritante.	Ars. 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Congestión de ojos.	Ail-gt. 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> No se puede soportar la luz; lacrimación suave.	All-c. 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Picor en los ojos; empeora con el movimiento.	Bry. 30 o 200	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Dolor continuo en los ojos.	Caps. 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Dolor en el ojo izquierdo; ojos amarillos (debido a ictericia).	Chel. 6 o 30	C/. 4 h.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
<input type="checkbox"/> Neuralgia en todo el ojo derecho.	Sang. 30 o 200	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Neuralgia post-orbital; por vacunas.	Thuy. 200 o 1M	C/. 4 h. (3)
<input type="checkbox"/> Puntos oscuros delante de los ojos; parece que se tiene un velo o una gasa delante de los ojos.	Sulphur 30 o 200	C/. 4 h. (3)
<input type="checkbox"/> Ojos enfermizos en general. Tirantez en los ojos; retinitis; lombrices.	Cina. 30 o 200	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Cianosis alrededor de los ojos; diplopia, sensibilidad a la luz.	Crot. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
<input type="checkbox"/> Ojos pegados; inflamación pustular, fotofobia.	Rhus tox. 30 o 200	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Ojos sombríos y fatigados por leer mucho o hacer un trabajo delicado; espasmos de los párpados.	Ruta-gt. 6 o 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Picor de ojos, descargas suaves, densas, abundantes y amarillas; párpados inflamados; empeora con el calor.	Puls. 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Sensación de que tiran de los ojos hacia fuera; debilidad en los ojos; epiteloma de los párpados.	Con. 200	Sem. (3)
<input type="checkbox"/> Orzuelos. Inflamación del canto externo; eccema en los párpados.	Graph. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
<input type="checkbox"/> Sensación de humo ante los ojos; párpados pesados, disminución de la agudeza visual.	Gels. 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Se sienten los ojos muy grandes; glaucoma; neuritis óptica.	Plb. 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Fluido líquido y sanguinolento de los ojos; aspecto ardiente, chispeante, penetrante; ardor en los ojos.	Canth. 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Sensación de frío detrás de los ojos.	Cal-p. 12X o 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Inflamación de la membrana conjuntiva; oftalmia purulenta; ulceración catarral.	Arg. Nit. 30 o 200	C/. 4 h. (3)

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
❑ Ardor de ojos con aversión a la luz; cantes dolorosos.	Am-c. 30	C/. 4 h.
❑ Frío; movimiento lento de los ojos; los objetos parecen más pequeños de lo que son.	Plat. 200 o 1M	Sem. (3)
❑ Pérdida de visión por hemorragia.	China off. 6 o 30	C/. 4 h.
❑ Opacidad; puntos y úlceras en la córnea; dilatación crónica de las pupilas.	Cal-c. 200	Sem. (3)
❑ Tracoma; párpados hinchados, rojos, edematosos; lacrimación caliente.	Apis. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
❑ Orzuelos repetitivos; dolor en el canto interior.	Staph. 30	C/. 4 h.
❑ Inflamación de la glándula lacrimal derecha.	Sil. 12X o 30	C/. 6 h.
❑ Chispas delante de los ojos; estrabismo; ojos calientes, cansados.	Mg-p. 12X o 30	C/. 4 h.
❑ En la mitad superior los objetos se mantienen invisibles.	Aur. 200 o 1M	Sem. (3)
❑ Trastornos visuales con jaqueca.	Nat-p. 12X o 30	C/. 4 h.
❑ Colores y puntos brillantes delante de los ojos.	Kali-bi. 30	C/. 4 h.
❑ Hinchazón entre las cejas y los párpados.	Kali-c. 200 o 1M	Sem. (3)
❑ Bizquera después de convulsiones.	Hyos. 200	C/. 6 h.
❑ Ojos hundidos; movimientos espasmódicos en los párpados; eccema en los párpados.	Mez. 30	C/. 4 h.
❑ Orzuelos en los párpados, cerca del canto interno; ceguera de día o de noche; ojos entreabiertos durante el sueño.	Lyc. 30 o 200	C/. 6 h. (3)
❑ Parálisis de los párpados.	Caust. 30 o 200	C/. 6 h. (3)
❑ Los párpados parecen muy pesados al abrirlos; puntos negros en el campo de visión.	Sep. 30 o 200	C/. 6 h.
❑ Dolor en los cantes exteriores; pústulas en la córnea y los párpados.	Ant-c. 30 o 200	C/. 4 h. (3)

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
❑ Mirada fija; miedo a la oscuridad.	Stram. 200 o 1M	C/. 6 h. (3)

OJOS, Ardor

✗ Por frío intenso, ardor, escozor en los ojos; con descarga suave.	All-c. 30	C/. 4 h.
✗ Con descarga irritante; inquietud y sed insaciable de beber poca agua a intervalos cortos.	Ars. 30	C/. 4 h.
❑ Dolor de todo el cuerpo, pesadez, letargo, escalofríos por la espina dorsal, congestión de cabeza, pérdida de sed. Ganas de acostarse tranquilamente; mejora al orinar.	Gels. 30	C/. 4 h.
❑ Enrojecimiento y ardor; párpados hinchados con palpaciones; empeora después de estar echado.	Bell. 30	C/. 4 h.
❑ Ardor e hinchazón de párpados; descarga irritante.	Euphr. 30	C/. 4 h.

OLOR CORPORAL

(Ver *Halitosis*)

❑ Debido a sudor, etc., especialmente en la frente.	Cal-c. 200	C/. 4 h. (3)
❑ Mal olor del cuerpo, como a queso, con piel sensible.	Hep. 30	C/. 4 h.
❑ Con sudor excesivo y viscoso que mancha de amarillo la ropa, sin que alivie las dolencias.	Merc. 30	C/. 4 h.
● Con piel de aspecto enfermizo; aversión al baño.	Sulphur 30 o 200	C/. 4 h. (3)
✗ Mal olor de pies, manos y axilas; paciente friolero.	Sil. 30 o 200	C/. 4 h.
● Remedio intercurrente.	Psor. 200	Sem. (3)

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
<u>ORINA</u>		
<i>Afecciones</i>		
<input type="checkbox"/> Ardor, antes y después de la micción.	Canth. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
<input type="checkbox"/> Ardor en la uretra cuando no se está orinando; molestias en personas recién casadas.	Staph. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
<input type="checkbox"/> Ardor; punzadas dolorosas antes, durante y después de la micción.	Cann-i. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
<input type="checkbox"/> Dificultad para orinar; coma urémica.	Plb. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
<input type="checkbox"/> Orina abundante con debilidad.	Cal-p. 6X o 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Retención de orina con la vejiga llena.	Op. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
<input type="checkbox"/> No se puede orinar; excepto cuando se está de pie, micción involuntaria por parálisis del esfínter; se escapa orina al toser. Retención de orina después de una operación.	Caust. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
<input type="checkbox"/> Orina alcalina y correosa; se tiene la sensación de que la orina se queda en la vejiga, incluso después de orinar.	Kali-bi. 30 o 200	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Gotea la orina estando sentado; necesidad frecuente de orinar, con micción escasa y ardor. Sólo se puede orinar de pie; descarga de gases al orinar.	Sars. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
<input type="checkbox"/> Necesidad de orinar; con fiebre próxima; pulso desproporcionado para la temperatura.	Pyr. 200 o 1M	C/. 4 h. (3)
<input type="checkbox"/> La orina gotea en vertical y el paciente tiene que esperar antes de empezar a orinar.	Hep. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
<input type="checkbox"/> No puede orinar sin esfuerzo; orina frecuentemente durante el día.	Lil-t. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
<input type="checkbox"/> Tiene que esperar mucho tiempo para orinar; ganas frecuentes de orinar.	Lyc. 30 o 200	C/. 4 h. (3)

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
<input type="checkbox"/> Sólo puede orinar echado; orina con frecuencia y en abundancia.	Kreos. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
<input type="checkbox"/> Sólo puede orinar mientras defeca; frecuente y abundante.	Acid-mur. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
<input type="checkbox"/> Dolor en el cuello de la vejiga al orinar; ganas de orinar, sin poder.	Nux-v. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
<input type="checkbox"/> Orina involuntaria en el primer sueño; sedimento rojo en la orina, que se pega al recipiente.	Sep. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
<input type="checkbox"/> Se orina al caminar, al toser, al estornudar; no puede orinar en presencia de nadie.	Nat-m. 12X o 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Orina muy ácida; sale a gotas; densa con pus; ardor doloroso en la uretra.	Arn. 30 o 200	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> La orina gotea mientras está sentado o caminando; el paciente se encuentra mejor al aire libre frío.	Puls. 30 o 200	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> El paciente grita y se queja antes de orinar; orina caliente y con escozor.	Borx. 30 o 200	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> La orina sale con irritación de la uretra.	Ferr-p. 6X o 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Orina maloliente; hematuria.	Sal-ac. 30 o 200	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Orina fétida; ardor al orinar.	Bapt. 30 o 200	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Orina irritante; con olor a amoniaco; orina de color marrón oscuro y escasa.	Asaf. 30 o 200	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Orina gelatinosa; amarillenta, como de ictericia.	Crot. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
<input type="checkbox"/> Orina turbia; descarga involuntaria de la orina, por parálisis del cuello de la vejiga.	Dulc. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
<input type="checkbox"/> Orina albuminosa; turbia, con sedimento; huele a violetas; hematuria.	There-ch. Ø o 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Orina con arena roja; lechosa; con depósitos de arena.	Lyc. 30 o 200	C/. 4 h. (3)

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
<input type="checkbox"/> Orina fría; olor fuerte; el paciente siente frío al orinar.	Nit-ac. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
<input type="checkbox"/> Orina muy coloreada; fluye muy lentamente; tenesmo doloroso al orinar.	Med. Ø o 30 o 1M	C/. 4 h. (3)
<input type="checkbox"/> Orina como tinta; pálida, como agua de cal; retención de la orina.	Chel. Ø o 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Orina muy amarilla o marrón oscura; se enturbia cuando ha salido.	Colch. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
<input type="checkbox"/> Orina con frecuencia por la noche y se corta 5 o 6 veces, antes de que se vacíe la vejiga.	Thuy. 200 o 1M	C/. 4 h. (3)
<input type="checkbox"/> El contacto de la orina produce picor; ganas de orinar constantes, pero se expulsa poco.	Merc. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
<input type="checkbox"/> Picor durante la micción; gotea después de la micción; descarga de mucosidad con la orina.	Petr. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
<input type="checkbox"/> Sangre en la orina; tenesmo persistente de la vejiga.	Merc-c. 30	C/. 3 h.
☆ Orina dolorosa y constricción de la uretra; acompañada de dolor de espalda.	Cuc-c. 30	C/. 3 h.
<input type="checkbox"/> Dolor de uretra, cuando no se orina; orina de color amarillo claro y turbia.	Nat-c. 30	C/. 4 h.
● Cada vez que orina el paciente, siente un dolor muy fuerte que le hace saltar, como si le hubiesen metido un objeto afilado debajo de la uña del dedo gordo del pie.	Sulphur 30 o 200	C/. 4 h. (3)
<input type="checkbox"/> Sólo puede orinar cuando está de rodillas, con las rodillas muy separadas.	Verat. 30	C/. 4 h.
● Remedio intercurrente para todo tipo de afecciones urinarias.	Morg-p. 200 o 1002 Quinc. (3)	
<input type="checkbox"/> Molestias urinarias en un paciente sifilítico.	Syph. 200 o 1M	Sem. (3)

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
<u>ORQUITIS</u>		
(Ver también <i>Hidrocele</i>)		
Inflamación de los testículos.		
✗ Aguda; por exposición a corrientes secas y frías.	Acon. 30 o 200	C/. 4 h.
✗ Con dolor e hinchazón de la parte baja del testículo derecho.	Arg. Nit. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
◻ Con dolor como si apretasen los testículos; testículos duros e inflamados.	Bapt. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
✗ El dolor aparece y desaparece de repente; cara enrojecida.	Bell. 30	C/. 4 h.
◻ Testículos muy duros. Dolor contusivo al tocarlos, con sensación de que machacan, hinchazón de la mitad derecha del escroto y el testículo.	Clem. 30	C/. 4 h.
✗ Orquitis debida a contusión; testículos duros y abultados.	Con. 200 o 1M	C/. 10 m. (3)
◻ Hinchazón y dureza de los testículos y el escroto con coloración roja brillante; dolor como si tirasen de los testículos y de la médula espinal.	Merc. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
◻ Dolor nocturno, punzante como astillas, e inflamación de los testículos, con irradiación en el cordón espermático.	Nit-ac. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
✗ Orquitis crónica; se sienten los testículos como aplastados; empeora con las tormentas.	Rhod. 200 o 1M	C/. 10 m. (3)
✗ Molestias después de la supresión de una gonorrea, con dolor en el cordón espermático.	Spong. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
Remedios bioquímicos		
	Ferr-p. 6X y Kali-m. 6X	C/. 4 h.

Otros *remedios importantes*: Nus vomica, Phyt., Lyc., Puls., Arn., Aur-m-n. y Aur., etc.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
<u>ORZUELOS</u>		
(Ver también <i>Quistes de párpados</i>)		
Son unos granitos oscuros y pequeños que crecen en los párpados, con inflamación y dolor. Pueden supurar un poco o convertirse en un quiste y reaparecer varias veces.		
<input type="checkbox"/> Orzuelos con picor; empeoran forzando los ojos; lacrimación con ardor de ojo; mejoran con aplicaciones frías; sensación de tener polvo en los ojos.	Aegle-m. Ø o 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Remedio capital para los orzuelos.	Cal-pic. 3x o 6	Tres veces al día
☆ Orzuelos; en especial del párpado superior, recurrentes; empeoran con el calor; mejoran con el frío.	Puls. 30 o 200	C/. 4 h.
☆ Orzuelos; recurrentes, ulcerosos, no supuran; se quedan duros como un nódulo, pueden convertirse en quistes si no se tratan bien.	Staph. 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Orzuelos condilomatosos y duros.	Thuy. 200 o 1M	C/. 10 m. (3)
<input type="checkbox"/> Orzuelos cerca del ángulo interno del ojo.	Aur-s 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Orzuelos, recurrentes, dolorosos y con supuración; empeoran con el frío; mejoran con el calor.	Hep. 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Orzuelos; párpados hinchados.	Alum. silic. 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Orzuelos pustulares que supuran; ardor y enrojecimiento de los ojos.	Sil. 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Para disolver la formación de quistes.	Thiosin. 3X	C/. 3 h.
<input type="checkbox"/> Orzuelos en el canto interno, con lagrimeo de los ojos.	Nat-m. 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Orzuelos en el párpado superior derecho.	Am-c. 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Orzuelos; sensación de ardor; mejoran con fomentos calientes.	Ars. 30	C/. 4 h.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
<p style="text-align: center;">Remedio bioquímico Tanto para quistes como para orzuelos.</p>		Calc. fluor 12X o 30 X C/. 4 h.

OSTEOMIELITIS

Inflamación de la médula ósea, del hueso y el cartílago epifisial adyacentes.

Remedios importantes: Arn., Alum., silicat., Hyper., Sil., Med., Bry., Plb., Cic., Cupr-ar., Stry., etc.

OTORREA

Descarga de los oídos

- | | | |
|---|-----------------------|--------------|
| <input type="checkbox"/> Enrojecimiento e hinchazón en ambos oídos; después de pasar la escarlatina; dolor fuerte en el oído izquierdo al masticar. | Apis. 30 o 200 | C/. 4 h. (3) |
| <input type="checkbox"/> Otorrea con descarga abundante, purulenta y sucia; acompañada de ardor y picor en el canal y sensación de que se arrastra algo por los oídos. | Ars. 30 o 200 | C/. 4 h. (3) |
| <input type="checkbox"/> Otorrea con descarga maloliente y huesos enfermizos (caries, etc.). | Asaf. 30 o 200 | C/. 4 h. (3) |
| <input type="checkbox"/> Aguda; cuando aparecen síntomas agudos en una enfermedad crónica. | Bell. 30 | C/. 4 h. |
| <input type="checkbox"/> Otitis subaguda con mucha descarga purulenta y maloliente; miedo al movimiento hacia abajo, debido a anemia cerebral. | Borx. 30 | C/. 4 h. |
| <input type="checkbox"/> Descarga acuosa, maloliente y densa; sale pus fétido de los oídos; hinchazón interior de los oídos que empieza en la oreja y se extiende hasta la mitad de la mejilla. | Cist. 30 | C/. 4 h. |

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
□ Con sordera catarral y dolor desde la garganta hasta el oído medio; el paciente se siente friolero y pierde la sed; mejora al orinar.	Gels. 30	C/. 4 h.
□ Con descarga densa y mucosa; la mucosidad va cayendo desde la parte posterior de las ventanas de la nariz a la garganta; estreñimiento.	Hydr. 30	C/. 4 h.
☆ Descarga de pus denso, amarillo, fétido; picor en lo profundo del oído, con dolor punzante; punzadas como dardos desde el oído a la garganta.	Kali-bi. 30 o 200	C/. 4 h.
□ Descarga irritante, maloliente; acompañada de dolor fuerte en el hueso temporal.	Kali-i. 30 o 200	C/. 6 h.
☆ Con excoriación y ulceración del meato; sensibilidad al frío; secreción abundante; flujo de pus y sangre de los oídos; amigdalitis o molestia en las parótidas; ruidos y pulsaciones en el oído afectado.	Merc. 30 o 200	C/. 4 h.
☆ Otorrea maloliente, purulenta; dificultad para oír; mejora cuando se va en un vehículo.	Nit-ac. 30 o 200	C/. 6 h.
● Otorrea maloliente y purulenta; descarga amarilla y fétida; se forman costras y un picor insoportable.	Psor. 200 o 1M	Sem. (3)
□ Otorrea maloliente, acuosa y cuajada; con dolor en el interior de la nariz y costras en el labio de arriba; picor en la trompa de eustaquio.	Sil. 30 o 200	C/. 6 h.
☆ Otitis media con ruptura de tímpano; descarga de pus, que puede ser inodoro al principio y después se hace maloliente, con un olor como de salmuera de pescado.	Tell. 30	C/. 4 h.
□ Otorrea acuosa y purulenta; olor a carne podrida; el oído interno parece hinchado, con pérdida creciente de audición.	Thuy. 200 o 1M	Sem. (3)
□ Otorrea de pus fétido; picores frecuentes y agudos en el oído derecho, cerca del tímpano.	Zinc-met. 30 o 200	C/. 6 h.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
❖ Con dolor intenso como a golpes y pus hediondo; paciente muy sensible al tacto, al dolor, al frío, etc.	Hep. 30	C/. 4 h.
❖ Con dolor y pus verdoso; mejora al aire libre y frío.	Puls. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
❑ Descarga crónica maloliente de los oídos; origen sifilítico.	Aur-ar. 30 o 200	C/. 10 m. (3)
Remedios bioquímicos		
	Cal-p. 6X, Kali-m. 6X y Sil. 30X	C/. 4 h.

OVARIOS, afecciones de los

❑ Molestias en los ovarios después de estar expuesta a corrientes secas y frías; ansiedad y miedo.	Acon. 30 o 200	C/. 4 h.
❑ Fase de supuración; resfriado frecuente; dolor como palpitaciones y punzadas.	Hep. 30 o 200	C/. 4 h. (6)
❖ Ardor en la zona de los ovarios; necesidad constante de orinar.	Canth. 30	C/. 4 h. (6)
❑ Neuralgia ovárica; dolor intenso que obliga a la paciente a doblarse; inquietud.	Coloc. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
❖ Punzadas dolorosas en los ovarios al hacer una inspiración profunda; empeora al mínimo movimiento; estreñimiento y sed excesiva.	Bry. 30 o 200	C/. 6 h.
❖ Dolor como palpitaciones; aparece y desaparece de repente; profundo decaimiento, con sensación de que se va a salir la vulva; empeora con la mínima agitación.	Bell. 30	C/. 4 h.
❖ Ardor, dolor lacerante, como si hubiese carbón encendido en esa zona; se alivia con aplicaciones calientes; inquietud.	Ars. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
❖ Hinchazón de los ovarios, especialmente en el derecho; punzadas y ardor; empeora al toser; pérdida de la sed y orina escasa.	Apis. 30 o 200	C/. 4 h. (3)

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
❖ Ovaritis crónica; dolor lacerante; dolor e hinchazón de los pechos antes de las menstruaciones; flujo de orina intermitente.	Con. 200 o 1M	Sem. (3)
❖ Neuralgia ovárica, inflamación y endurecimiento; empieza por el ovario izquierdo y después pasa al derecho. Dolor que se alivia con una descarga del útero. Dolor neurálgico (ovario izquierdo) con ablandamiento; empeora con la presión, incluso la de la ropa.	Lach. 30 o 200	C/. 6 h. (3)
❑ Hinchazón y endurecimiento del ovario izquierdo, con la dureza de una piedra; dolor fuerte al tocar; estreñimiento.	Graph. 30 o 200	C/. 6 h. (3)
❑ Ovario hinchado con dolor difuso angustioso en todo el abdomen.	Ham. Ø o 30	C/. 4 h.
❑ Endurecimiento e hinchazón del ovario, con leucorrea densa, amarilla y ardorosa; la paciente se siente mejor después de comer.	Iod. 30 o 200	C/. 4 h.
❖ Dolor punzante en el ovario izquierdo; sed con boca humeda; sudor que no mejora.	Merc. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
❑ Ovaritis debida a supresión de menstruaciones después de mojarse los pies; frío y pérdida de la sed; la paciente se encuentra mejor al aire libre y frío.	Puls. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
❖ Ovaritis debida a la masturbación; cara de culpabilidad.	Staph. 30 o 200	C/. 4 h. (6)

PALPITACIONES

(Ver también Corazón, Afecciones del)

❑ Palpitaciones violentas en la zona del corazón.	Aeth. 30	C/. 4 h.
❑ Palpitaciones con náuseas, dolor de cabeza y excitación nerviosa.	Brom. 30	C/. 4 h.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
❑ En pacientes que sufren de hemorroides; dispepsia o flacitud.	Coll. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
☆ Palpitaciones con sensación de estenocardia.	Cat. Ø o 30	C/. 3 h.
☆ Palpitaciones; empeoran con el ejercicio o una excitación.	Crat. Ø o 30	C/. 3 h.

Los dos remedios anteriores actúan como tónico cardíaco y pueden darse alternativamente.

Otros *remedios importantes*: Acon. , Ars., Carbo-veg., Phos., Sulphur, Gels. y Arg. Nit., etc.

PALUDISMO

(Ver *Malaria*)

PANADIZOS

(Ver también *Apostemas y diviesos*)

Se llama panadizos a los abscesos que se arraigan cerca de la punta de los dedos, muchas veces debajo de la uña, con dolor e hinchazón. Pueden empezar como un tumor duro, como un brote que se pone duro y doloroso rápidamente.

❑ En casos agudos; para eliminar el absceso.	Myris. Ø o 3X	C/. 2 h.
❑ Antes de que empiece a supurar; empeora con el calor.	Merc. 30	C/. 3 h.
☆ Dolor pulsante muy fuerte; para que empiece a supurar.	Hep. 3X	C/. 2 h.
❑ Cuando el acceso está arraigado a fondo; dolor atroz; para que empiece a supurar.	Sil. 30	C/. 3 h.
❑ Lesión de color rojo oscuro o morado, con dolor fuerte.	Lach. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
❑ Negruzco; dolor, ardor doloroso; mejora con el calor y en ambiente templado.	Ars. 30 y Carbo-veg. 30, alternando.	C/. 2 h.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
★ Cuando se forman unos granos fungiformes en la zona afectada; con dolor intenso.	Nit-ac. 30 o 200	C/. 4 h.
□ Cuando el dolor es intolerable después de quedar expuestos los nervios.	All-c. 30	C/. 3 h.
□ Cuando se debe a heridas de las uñas; con lesión fría; mejora con compresas frías.	Led. 30 o 200	C/. 3 h.
□ Mejora con aplicaciones frías; empeora con el calor, como si saliese de la herida vapor caliente.	Fl-ac. 30 o 200	C/. 3 h. (3)
Remedio bioquímico	Sil. 12X	C/. 4 h.

PÁNCREAS

□ Inflamación y catarro del páncreas con aflujo de sangre a la cabeza.	Bell. 30	C/. 3 h.
□ Aumento de tamaño del páncreas; especialmente por afeciones escrofulosas.	Cal-i. 30	C/. 4 h.
□ Páncreas contraído; vómitos excesivos e indigestión; pérdida de peso y masa corporal, aunque se coma bien.	Iod. 30	C/. 4 h.
★ Degeneración grasa de corazón e hígado; indigestión y ganas de tomar bebidas frías y heladas.	Phos. 30 o 200	C/. 10 m. (3)
★ Páncreas inflamado; sensación de ardor en todo el tubo digestivo. Vómitos ácidos con materia dulzona e indigestión.	Iris. 30	C/. 4 h.
Remedio bioquímico	Kali-p. 6X	C/. 4 h.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
PAPERAS		
(Ver también <i>Fiebre</i>)		
✗ Cuando la lesión es fuerte y dolorosa; piel pálida; dolor repentino en los oídos y al tragarse.	Phyt. 30 o 200	C/. 4 h. (6)
✗ Cuando el oído está afectado y dolorido; empeora con el calor, mejora con aire frío; pérdida de sed.	Puls. 30 o 200	C/. 4 h. (6)
✗ <i>Remedio preventivo</i> ; también para empezar el tratamiento.	Parot. 200 o 1M	1 dosis
✗ Hinchazón e inflamación con fiebre; inquietud; punta de la lengua, roja.	Rhus tox. 30 o 200	C/. 4 h. (6)
❑ Cara y cuello sonrojados, con sudor.	Pilocar-mur. 3X o 6	C/. 4 h.
❑ Aparece de repente; después de estar expuesto a corrientes de aire seco y frío; fiebre con inquietud y miedo.	Acon. 30 o 200	C/. 4 h.
✗ Hinchazón al rojo vivo y caliente; punzadas dolorosas que se extienden hacia los oídos; cara sonrojada.	Bell. 30 o 200	C/. 4 h.
✗ Hinchazón pálida; lengua floja, húmeda y con marcas de los dientes; salivación excesiva con sed.	Merc. 30 o 200	C/. 4 h. (6)
❑ Asociadas con fiebre; sarampión, viruela, etc; dolor insopportable; ansiedad, inquietud y sed insaciable, bebiendo poco; pero con mucha frecuencia.	Ars. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
✗ Cuando la hinchazón se pone de color púrpura; hinchazón fuerte y muy dolorosa.	Lach. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
❑ Cuando la hinchazón se pone más dura; el paciente quiere ventilación y aire fresco.	Carbo-veg. 30	C/. 4 h.
Remedio bioquímicos		C/. 4 h
	Ferr-p. 6X y Kali-m. 6X	

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
<u>PARÁLISIS</u>		
<i>De diferentes partes del cuerpo, debida a causas mentales p sicopatológicas y no a causas físicas</i>		
<p>★ Con insensibilidad; especialmente del cerebro; como consecuencia de miedo, accidentes, etc.</p> <p>□ Parálisis de los párpados; laringe, los músculos no quieren obedecer.</p> <p>□ Parálisis de los brazos; gran debilidad y abatimiento; efectos nocivos de los disgustos o del miedo.</p> <p>★ Parálisis de las partes no dobles; vejiga, laringe, faringe o lengua, etc.</p> <p>□ Parálisis de los intestinos; los síntomas aparecen de repente.</p> <p>□ Parálisis del cerebro; del lado izquierdo; el paciente no puede soportar nada ajustado en ninguna parte del cuerpo.</p> <p>□ Parálisis de párpados y cara; postración extrema.</p> <p>□ Parálisis de los músculos del ojo; lado izquierdo de la cara; calor en la cara.</p> <p>□ Parálisis facial, dolor pegajoso en las extremidades; se arrastran los pies al caminar y se sienten temblores.</p> <p>□ Parálisis de las piernas, que va ascendiendo; mucha debilidad; sensación de cansancio y pesadez en todo el cuerpo.</p> <p>□ Parálisis de las extremidades con pesadez y pérdida de sensación; inquietud.</p> <p>□ Parálisis de un lado, mientras se tienen convulsiones en el otro; miedo a la oscuridad.</p>		
	Op. 1M o superior	C/. 10 m. (3)
	Gels. 200	C/. 10 m. (3)
	Nat-m. 200	C/. 10 m. (3)
	Caust. 30 o 200	C/. 4 h. (6)
	Phos. 200	C/. 10 m. (3)
	Lach. 200	C/. 10 m. (3)
	Cad-s. 200	C/. 10 m. (3)
	Seneg. 30	C/. 4 h.
	Nux-v. 30 o 200	C/. 6 h.
	Pic-ac. 30	C/. 4 h.
	Rhus tox. 200 o 1M	C/. 4 h.
	Stram. 200 o 1M	C/. 4 h.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
☒ Parálisis de muñecas o músculos sueltos, que se va disipando; empieza en el extensor.	Plb. 30 o 200	C/. 6 h.
☒ Parálisis de viejos pacientes; propensos al frío; comportamiento infantil.	Bar-c. 200 o 1M	C/. 10 m. (3)
☐ Parálisis que va de abajo a arriba; especialmente en solterones de ambos sexos.	Con. 200 o 1M	C/. 10 m. (3)
☐ Parálisis no dolorosa de las extremidades; parálisis de los nervios respiratorios, con cianosis. Por falta de vitalidad, no reaccionan los pulmones.	Laur. 30 o 200	C/. 4 h. (3)

Remedios bioquímicos

Cal-p. 6X, C/. 4 h.
Kali-p. 6X y Mag-p. 6X

PARTO

Es el proceso de expulsión de un feto del útero, a la terminación normal del embarazo.

☒ Cuello del útero rígido, grande, grueso, duro, como una franja; nerviosismo; calambres uterinos fuertes arrítmicos y espasmódicos, que muchas veces se debilitan después de la etapa inicial.	Caul. 200	C/. 10 m. (3)
☒ Inquietud y miedo; la paciente se enfada violentamente al reconocerla, etc.	Acon. 200 o 1M	C/. 10 m. (3)
☐ Después de una inquietud prolongada; la paciente se debilita y agota; quiere calor y que la tapen.	Ars. 200	C/. 10 m. (3)
☒ Paciente nerviosa, de mal humor e irritable; es difícil de tratar y dice groserías y grita.	Cham. 200 o 1M	C/. 10 m. (3)
☐ Siente dolor fuerte; grita, pide ayuda y generalmente hace mucho ruido y arma jaleo, pero no es tan irascible e irritable como con Cham.	Coff. 200	C/. 10 m. (3)

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
❑ Paciente triste; llora y suspira y toma respiraciones profundas. La paciente parece incapaz de hacer que le entre el aire en los pulmones.	Ign. 200 o 1M	C/. 10 m. (3)
❑ Náuseas muy fuertes, especialmente acompañadas de dolores fuertes cortantes en la zona del ombligo.	Ip. 30 o 200	C/. 10 m. (3)
☒ La paciente golpea con un pie el suelo, la cama o la silla y se mueve cuando tiene dolores. Llora y se queja mucho.	Actea-rac. 30 o 200	C/. 4 h.
❑ La paciente está triste; llora, se siente desfallecer y quiere mucho aire fresco.	Puls. 200	C/. 10 m. (3)
❑ La paciente quiere que la tapen; dolores acompañados de escalofríos; posible historial antiguo de mareo en vehículos, depresión o prolapso.	Sep. 200 o 1M	C/. 10 m. (3)
❑ Despues de los dolores, se excita al mínimo movimiento, como puede ser una respiración profunda; labios sedientos, boca seca; dolor como si fuese a estallarle la cabeza.	Bry. 200 o 1M	C/. 10 m. (3)
❑ Se da en la última etapa (y otra dosis después de sacar la placenta, para aliviar el malestar de los genitales).	Arn. 200 o 1M	C/. 10 m. (3)
❑ Despues del dolor; se excita al poner al niño al pecho; el dolor se extiende de izquierda a derecha.	Con. 200	C/. 10 m. (3)
❑ Despues de los dolores; por la noche; difícilmente durante el día; mejora al cambiar de posición y al taparse bien.	Rhus tox. 200 o 1M	C/. 10 min. (3)
❑ Despues de los dolores, contracciones espasmódicas del cuello del útero, con calambres fuertes; dolores que irradian bajando por las piernas.	Vib. 30 o 200	C/. 10 m. (3)

PECHOS

Afecciones
(Ver *Glándulas mamarias*)

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
----------	----------	--------------------------

PÉRDIDA DE CONOCIMIENTO

(Ver también *Colapso* y *Desfallecimiento*)

- | | | |
|---|------------------------|---------------|
| <input type="checkbox"/> Cuando un niño recién nacido no respira y se pone morado sin ninguna obstrucción visible. | Laur. 6 o 30 | C/. 15 m. (3) |
| <input type="checkbox"/> Despues de inhalar gas de carbón vegetal. | Bov. 30 | C/. 15 m. (3) |
| <input type="checkbox"/> Despues de beber alcohol o inhalar gas de carbón. | Carbn-s. 30 | C/. 15 m. (3) |
| <input type="checkbox"/> Por pérdida excesiva de sangre o fluidos vitales. | China 30 o 200 | C/. ½ h. |
| ● Cuando, en el fondo, hay miasmas sifilíticos (si hay un cambio orgánico en el corazón o en los pulmones, evítese Syph.) | Syph. 10M | 1 dosis |
| <input type="checkbox"/> Si descienden el pulso y la orina. | Hell. 200 o 1M | C/. 4 h. (3) |
| <input type="checkbox"/> Si se debe a represión de un enfado. | Coloc. 200 o 1M | C/. 4 h. (3) |
| <input type="checkbox"/> Si se debe a un susto o un rayo. | Phos. 200 o 1M | C/. 15 m. (3) |
| ● Remedio intercurrente. | Sulphur 200 | 1 dosis |
| <input type="checkbox"/> Cuando hay un historial de alta presión sanguínea; depresión y debilidad de cabeza. | Aur. 10M | C/. 15 m. (3) |

Remedios bioquímicos

Kali-m. 6X y Ferr-p. 6X C/. 4 h.

PERIODICIDAD

Apariencia periódica de síntomas

Aquí se dan los remedios que tienen una afinidad periódica especial. Hemos hecho una descripción detallada de esos remedios en las diferentes enfermedades y aquí damos solamente los más importantes.

- Anualmente.

Tarent.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
<input type="checkbox"/> Todas las primaveras.	Crot-h.	
<input type="checkbox"/> Cada ocho días.	Iris.	
<input type="checkbox"/> Con regularidad.	Rhus tox.	
<input type="checkbox"/> Durante toda la noche.	Syph.	
<input type="checkbox"/> Durante todo el día.	Med.	
<input type="checkbox"/> Empeora todos los inviernos; piel resquebrajada.	Petr.	
<input type="checkbox"/> Tos todas las mañanas.	Alum.	
<input type="checkbox"/> Diarrea al levantarse; 9 de la mañana.	Nat-s.	
<input type="checkbox"/> Diarrea a las 5 de la mañana; se agrava de mañana.	Sulphur	
<input type="checkbox"/> Empeora después de medianoche; cada cuatro días.	Ars.	
<input type="checkbox"/> Empeora de 2 a 4 de la madrugada.	Kali-c.	
<input type="checkbox"/> Empeora de 3 a 5 de la madrugada; misma hora.	Kali-bi.	
<input type="checkbox"/> Empeora de 8 a 11 de la mañana.	Nat-m.	
<input type="checkbox"/> Empeora de 6 a 7 de la mañana; orina abundante.	Bry..	
<input type="checkbox"/> Las molestias se repiten a intervalos regulares; por la tarde; calor.	Puls.	
<input type="checkbox"/> Las molestias se repiten a intervalos regulares; cada tres días; cada veintiún días; fiebre.	China sulph.	
<input type="checkbox"/> Las molestias se repiten a intervalos regulares; cada siete días; por la mañana.	Sulphur	
<input type="checkbox"/> Las molestias se repiten a intervalos regulares de diez días.	Phos.	
<input type="checkbox"/> Las molestias se repiten a intervalos regulares; cada catorce días; después de dormir.	Lach.	
<input type="checkbox"/> Las molestias se repiten a intervalos regulares; cada veintiocho días.	Nux-v.	

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
----------	----------	--------------------------

PERITONITIS

(Ver también *Fiebre*,)

Inflamación de la membrana serosa que cubre el abdomen.

- | | | |
|--|---------------------------|--------------|
| <input type="checkbox"/> Por exposición a corrientes frías y secas; fiebre alta con dolor del peritoneo. | Acon. 30 o 200 | C/. 4 h. |
| <input type="checkbox"/> Con hinchazón grande y dolor de abdomen; empeora con el tacto o la presión; congestión local. | Bell. 30 | C/. 4 h. |
| <input type="checkbox"/> Peritonitis con fiebre y sensación de ardor; empeora con el movimiento; sed excesiva de grandes cantidades de agua a intervalos largos. | Bry.. 30 o 200 | C/. 6 h. |
| <input type="checkbox"/> Cuando una fiebre simple se convierte en tifoidea; lengua seca con el triángulo de la punta rojo, inquietud; mejora con el movimiento. | Rhus tox. 30 o 200 | C/. 4 h. |
| <input type="checkbox"/> En la etapa supurativa con sudor intenso que no cede; fiebre, con heces sueltas. | Merc. 30 | C/. 4 h. |
| <input type="checkbox"/> El paciente no puede soportar el contacto más ligero ni la presión de la ropa en el abdomen. | Lach. 30 o 200 | C/. 4 h. (3) |
| <input type="checkbox"/> Con mucho frío en el cuerpo; calambres en las extremidades y ganas de tomar bebidas frías; vómitos y fiebre. | Verat. 30 | C/. 4 h. |

Remedio bioquímico **Ferr-p. 6X** C/. 3 h.

PESADILLAS

- | | | |
|--|------------------------|----------|
| <input type="checkbox"/> El paciente grita durante el sueño, como si estuviese amenazado, y se agarra a su madre o a quien lo cuida. | Borx. 30 o 200 | C/. 4 h. |
| <input type="checkbox"/> El paciente se despierta con frecuencia por la noche, mastica y traga; le suda mucho la cabeza. | Cal-c. 200 o 1M | Sem. (3) |

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
<input type="checkbox"/> El paciente empieza a llorar de repente, porque sueña algo que le produce miedo.	Cham. 200	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> El paciente chilla y tiembla mientras duerme, por una pesadilla.	Kali-br. 30 o 200	C/. 4 h.
● El paciente sueña en voz alta.	Sulphur 200 o 1M	Sem. (3)
<input type="checkbox"/> Tiene pesadillas y sueña que discute con personas fallecidas.	Cedr. 200	Sem. (3)
<input type="checkbox"/> Pesadillas con la sensación de que tiene una piedra encima (en sueños).	Kali-c. 200 o 1M	Sem. (3)
<input type="checkbox"/> Pesadilla cuando el paciente está acostado con los ojos medio cerrados.	Op. 200 o 1M	Sem. (3)
<input type="checkbox"/> Pesadilla, con imposibilidad de moverse.	Rhus tox. 200 o 1M	Sem. (3)
Remedios bioquímicos.		
	Ferr-p. 6X, 6X	C/. 4 h.
	Kali-p. 6X y Mag-p.	

PICOR

(Ver también Sarna y Prurito)

<input type="checkbox"/> Picor por todo el cuerpo, sin erupciones.	Dol. 30	C/. 4 h.
● El picor empeora al desnudarse; rascarse da alivio, pero produce ardor.	Sulphur 30	C/. 4 h.
☆ Picor de barbero; los brazos están cubiertos de picor y erupción; picor de oídos, nariz y uretra.	Sulphur iod. 6 o 30	C/. 4 h.
☆ Picor de los escrotos; empeora al tocarse o caminando.	Crot-t. 30 o 200	C/. 4 h.
● Mejora con un baño caliente; empeora por la noche.	Syph. 200 o 1M	Sem. (3)
● Picor intenso e incesante; empeora por la noche y cuando se piensa en él.	Med. 200 o 1M	C/. 10 m. (3)

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
● Picor con dolor; el cuerpo tiene siempre un olor desagradable, incluso después de bañarse; piel sucia, casi siempre húmeda, como si tuviese un baño de aceite, y seca también.	Psor. 200 o 0/6 o superior (a 50 mil.)	C/. 6 h.
□ Ardor y picor; empeora con el calor; urticaria como erupciones.	Rhus tox. 30	C/. 4 h.
Remedio bioquímico	Biocom. No. 20	C/. 4 h.

PIEDRAS EN LA VEJIGA

● Ganas de orinar frecuentes; empeora por la noche; orina escasa, de mal olor y de color fuerte. Flujo de orina lento por inactividad de la vejiga.	Med. 200 o 1M	C/. 10 m. (3)
□ Catarro de la vejiga, con mucosidad densa y correosa; huele a descompuesto.	Hydr. 30	C/. 4 h.
✗ Ardor y dolor cortante; necesidad de orinar frecuente.	Canth. 30	C/. 4 h.
□ Orina escasa; orina frecuente; empeora echándose boca arriba, tenesmo; el paciente se encuentra mejor al aire libre frío.	Puls. 30	C/. 4 h.
□ La orina gotea con retención; aunque la vejiga no esté vacía. Orina espasmódica.	Nux-v. 30	C/. 4 h.
✗ Necesidad constante de orinar; tan pronto como se acumulan unas gotas de orina en la vejiga; no se puede controlar esta necesidad; pérdida de sed.	Apis. 30	C/. 4 h.

PIEDRAS EN LA VESÍCULA

✗ Remedio capital; dolor por debajo del hombro derecho. Hígado sensible al tacto y la presión; cara amarillenta y vómitos.	Chel. 30	C/. 4 h.
--	-----------------	----------

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
★ Remedio capital para cálculo en el cólico de vesícula.	Chol. 3X	C/. 4 h.
★ Piedras en la vesícula; ictericia, molestias como de tener cargada la zona del hígado.	Card-m. Ø o 6	C/. 3 h.
□ Dolor violento en la zona del hígado; sensibilidad al tacto, pies fríos continuamente.	Lyc. 200 o 1M	Sem. (3)
□ Piedras en la vesícula e ictericia; aversión a la comida; sensación de mucho frío.	Nux-v. 30	C/. 4 h.
□ Cólico biliar; se desvive por bebidas o agua frías.	Phos. 200	Sem. (3)
□ Cólico biliar; picazón, dolor en la región del hígado con malestar de riñones. Dolores como sacudidas y tirones; dolor espasmódico reducido a un punto pequeño.	Berb. Ø o 30	C/. 4 h.
□ Dolor fuerte; empeora con el movimiento o sonidos chirriantes, rostro sonrojado.	Bell. 30	C/. 4 h.
□ Frío intenso; dolor como punzadas de derecha a izquierda, con mucho sudor.	Cal-c. 30 o 200	Sem. (3)
★ Recurrencia periódica del cólico. Heces sin digerir; hígado sensible al tacto y la presión; pérdida de apetito, aunque se siente hambre.	China 6, 6 <i>C/. 6 h. el primer mes; en el 2º, potencia 30 en días alternos</i>	
□ Cólico biliar; dolores cortantes que cambian al pezón derecho; mejora al inclinarse hacia atrás.	Dios. v. 30	C/. 4 h.
□ Piedras en la vesícula; molestia en el estómago después de comer, náuseas y arcadas secas constantemente; heces blancas y sueltas.	Podo. 30	C/. 4 h.
□ Cólico biliar; piedras en la vesícula; estreñimiento; para prevenir la formación de piedras en la vesícula.	Chion. Ø o 6	C/. 6 h.
● Remedio intercurrente	Med. 200 o 1M	Quinc. (3)
Remedio bioquímico	Mag-p. 6X y Nat-s. 12X	C/. 4 h.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
----------	----------	--------------------------

PIEDRAS EN LOS RIÑONES

(Ver *Cálculos renales*)

PIEL

(Ver también *Eccemas, Psoriasis, Sarna, Apostemas y diviesos, Escozor del barbero*)

<input type="checkbox"/> Cuarteada; eccema doloroso; estreñimiento	Graph. 30 o 0/5	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Heridas que tienden a supurar; paciente hipersensible al tacto, al frío, etc.	Hep. 30	C/. 6 h.
<input type="checkbox"/> Picor insoportable; se alivia rascándose, pero produce ardor.	Sulphur 30 o 0/5	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Deseo irresistible de rascarse y al rascarse se produce sangre.	Arum-t. 30	C/. 6 h.
<input type="checkbox"/> Cuando el olor de las heces y del cuerpo es desagradable y se tienen problemas de piel.	Pyr. 200	C/. 10 m. (3)

Remedio bioquímico **Biocom. No. 20** C/. 4 h.

PIOJOS

★ Para los piojos de la cabeza y de las partes íntimas.	Staph. Ø o 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Piojos de la piel; difícil de curar; se reproducen con mucha rapidez.	Lyc. 30 o 200	C/. 4 h.
● Pelo sin lustre y sucio; piojos de cabeza. Remedio intercurrente.	Psor. 200 o 1M	Sem. (3)
★ Piojos de la cabeza. El olor fuerte es un síntoma importante.	Carb-ac. 30	C/. 4 h.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
❑ Piojos de la cabeza; el cuero cabelludo huele mal; humedad y erupciones en la cabeza.	Vinc. 30	C/. 4 h.
● Remedio intercurrente.	Bac. 200 o 1M	Sem. (3)

Para uso externo: Staph. Ø en aceite. Relación 1: 9 (coco, mostaza oliva, etc.).

PIORREA

Flujo o derrame de pus, por inflamación purulenta del periósteo de los alveolos dentarios, con necrosis progresiva y flojedad y desprendimiento de los dientes.

● Remedio capital.	Calen. 30	C/. 4 h.
☆ Encías esponjosas con boca húmeda; mal olor, con exceso de saliva y sed.	Merc. 30	C/. 4 h.
❑ Granos en las encías; inflamación dolorosa, sensibilidad al aire frío.	Sil. 1 Rhod. 2X o 30	C/. 4 h.
❑ Salivación abundante; dolor de muelas, mejora al comer; empeora con el aire frío y el contacto.	Plan-m. 30	C/. 4 h.
❑ Decaimiento rápido de los dientes con hemorragia de encías esponjosas; boca maloliente.	Kreos. 30	C/. 4 h.
☆ Un buen remedio para la piorrea.	Calc-ren. 30	C/. 4 h.
❑ Supuración de las encías con formación de pus.	Gunp. 3X o 6	C/. 4 h.
☆ Encías retráidas; sangran con facilidad.	Carbo-veg. 3X o 6	C/. 4 h.
Remedio bioquímico		Sil. 12X o 30X
		C/. 4 h.

Para uso externo (para dar masaje a las encías): Calen. Ø, Echi. Ø, Arn. Ø, Glyc., 9.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
----------	----------	--------------------------

PLEURESÍA

El tratamiento debe seguirse únicamente bajo el control de un médico con experiencia.

✗ Con fiebre alta, por exposición a una corriente seca y fría.	Acon. 30 o 200	C/. 4 h.
✗ Con punzadas dolorosas en el pecho; empeora con el movimiento; mejora con el calor y el descanso.	Bry. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
✗ Con constricción del pecho; pérdida de sed; empeora con el calor.	Apis. 30	C/. 4 h. (3)
◻ Con punzadas dolorosas en el pecho; empeora doblándose hacia delante; las flemas tienen sabor dulce y atraen a las moscas.	Stann. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
● Con punzadas dolorosas en el pecho; empeora al echarse boca arriba y por la mañana.	Sulphur 30 o 200	1 dosis
✗ Con punzadas dolorosas en el pecho; empeora al echarse del lado izquierdo; ganas de beber agua fría.	Phos. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
◻ Con punzadas dolorosas en el pecho; empeora al caminar y con el calor.	Kali-i. 30	C/. 4 h. (3)

Remedios bioquímicos

Ferr-p. 6X,	C/. 4 h.
Kali-m. 6X y Cal-p. 12X	

Otros *remedios importantes*: Ars-i., Tub-k., Nat-s. y Acal., etc.

PÓLIPOS DE NARIZ

✗ Remedio capital; mal olor o pérdida del olfato; mucosidad abundante en la nariz; obstrucción nasal.	Lem-m. Ø o 30	C/. 4 h.
✗ Bloqueo del lado de la nariz del que se acuesta el paciente; empeora en tiempo húmedo.	Teucr. 30	C/. 4 h.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
★ Pólips nasales que sangran con facilidad; estornudos frecuentes; mal olor imaginario; ganas de tomar bebidas frías.	Phos. 200	Sem. (3)
□ Pólips nasales con pérdida del olfato; hinchazón en la raíz de la nariz. Paciente sensible al frío; empeora con el cambio de tiempo; dolor de cabeza del lado derecho.	Sang. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
□ Pólips mucosos que sangran con facilidad; coriza fluida, seca o acre; paciente friolero.	Cal-c. 200 o 1M	Sem. (3)
□ Bloqueo de la nariz; fosas nasales inflamadas; paciente friolero, propenso a tener frío; perforación del septo.	Sil. 6X o 30	C/. 4 h.
Remedio bioquímico	Cal-p. 6X o 12X	C/. 4 h.

PÓLIPOS DE OÍDO

□ Pólips del oído izquierdo; sensible al aire; dolor que hace llorar, desde la mejilla hasta el interior del oído.	Lach. 30 o 200	C/. 4 h.(3)
□ Paciente propenso a pólipos de oído; catarro postnasal y estreñimiento.	Hyd. 30	C/. 4 h.
● Pólips del oído medio; otitis crónica.	Thuy. 200 o 1M	Sem. (3)
□ Pólips del meato externo.	Merc-c. 30	C/. 4 h.
Remedio bioquímico	Kali-s. 6X	C/. 4 h.

PÓLIPOS DE ÚTERO

★ Pólips de útero o de vagina; empeoran en tiempo húmedo.	Teucr. 30	C/. 4 h.
□ Los pólipos de útero se salen al defecar.	Con. 200 o 1M	C/. 10 m. (3)
● En pacientes gordas y flojas; sensibles al frío.	Cal-c. 200 o 1M	Sem. (3)

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
<input type="checkbox"/> Cuando los pólipos sangran con facilidad.	Phos. 30 o 200	Sem. (3)
Remedio bioquímico	Cal-p. 6X	C/. 4 h.

PRESIÓN SANGUÍNEA ALTA

(Ver *Hipertensión*)

PRESIÓN SANGUÍNEA BAJA

(Ver *Hipotensión*)

PREVENCIÓN DE PROCESOS

Remedios preventivos

<input type="checkbox"/> Del cólera	Cupr-met. 30.	Mañana y noche. Una vez en tres días (6)
<input type="checkbox"/> De la conjuntivitis	Bell. 30,	Mañana y noche. Una vez en tres días (6)
<input type="checkbox"/> De la varicela	Vario. 200	C/. 10 m. (3)
<input type="checkbox"/> Cuando falla Vario.	Ant-tart.. 200	C/. 10 m. (3)
<input type="checkbox"/> De la gastroenteritis	Ars. 200.	C/. 10 m. (3)
<input type="checkbox"/> De la gripe	El primer día, Influ. 30 o 200, C/. 10 m. (3); A partir del siguiente, Ars. 6, mañana y noche (12)	
<input type="checkbox"/> De la hepatitis infecciosa	Ferr-p. 12X, Chel. 6,	C/. 4 h., y C/. 6 h. (12)

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
<input type="checkbox"/> De la ictericia		1 ^{er} . día, Merc. 200 , C/. 10 m. (3); siguientes, Kali-m. 6X , C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> De la malaria	Malar. 200 o 1M	C/. 10 m. (3)
<input type="checkbox"/> Si falla Malaria off	Nat-m. 200	Sem. (3)
<input type="checkbox"/> Del sarampión	Puls. 30 o 200	1 vez en 2 o 3 días (6)
<input type="checkbox"/> De la Fiebre cerebral	Bell. 200	Sem. (3)
<input type="checkbox"/> Del tétano	Led. 200 e Hyper. 200 , alterna-ndo C/. 3 h.	
<input type="checkbox"/> De las cataratas	Cal-f. 12X , C/. 4 h. y Nat-m. 6X + Cal-p. 6X + Kali-p. 6X , dos ta-bletas de cada, mañana y noche.	
<input type="checkbox"/> Del resfriado	Acon. 6 o 30 , al principio, cada media hora; después, C/. 6 h., y después, Ferr-p. 6X , C/. 2 h.	
<input type="checkbox"/> De la difteria	Diph. 200 o 1M	1 dosis
<input type="checkbox"/> De la filaria	Caps. 30 , C/. 6 h. durante 3-4 días; después, Cal-f. 30XC , C/. 6 h.	
<input type="checkbox"/> De las paperas		1 dosis de Parot. 200 y después Pilo. 6 , C/. 6 h. (6)
<input type="checkbox"/> De la peste	Tarent. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
<input type="checkbox"/> De la polio	Lath. 200 , una dosis el primer mes; en el 2 ^o , 1M , y, en el 3 ^o , 10 M .	
<input type="checkbox"/> De la meningitis	Bell. 30 y Ferr-p. 12X	C/. 3 h. (6) C/. 3 h.
<input type="checkbox"/> De la viruela	Vario. 200	C/. 10 m. (3)

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
□ De la amigdalitis	Bar-c. 200 o 1M	Quinc. (6)
□ De la tuberculosis	Tub-k. 10M, el primer mes; 50M, en el 2º., y CM, en el 3º. 1 dosis de cada	
□ De la fiebre tifoidea	Typh. 200 o 1M	C/. 10 m. (3)
□ De la tosferina	Pert. 200 o 1M	C/. 10 m. (3)

PROCESO MASTOIDEO

★ Etapa de inflamación; la parte afectada se pone roja y caliente.	Bell. 30 o 200	C/. 4 h.
★ Dolor e hinchazón con amenaza de absceso arraigado y caries de la mastoides.	Caps. 30, en casos agudos, y potencias superiores, en los crónicos	C/. 3 h. (6)
□ En pacientes diabéticos; para controlar procesos destructivos.	Fl-ac. 30 o 200	C/. 6 h.
★ Inflamación e hinchazón del lado izquierdo o que empieza por el lado izquierdo; dolor muy fuerte, como si estuviesen royendo; empeora por la noche.	Merc. bin iod. 3X	C/. 3 h.
★ Inflamación dolorosa, muy sensible a las impresiones externas, al tacto y al aire frío; dolor como si se tuviese una astilla.	Hep. 30 o 200	C/. 4 h.
□ Hinchazón dolorosa al tacto, con dolor como tirones; dificultad para tragar y tos.	Sil. 30 o 200	C/. 4 h.
● Remedio intercurrente	Sulphur 200 o 1M	Sem. (3)
Remedio bioquímico	Calc-sulph. 6X	C/. 4 h.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
<h3>PROLAPSO DE RECTO</h3>		
Protrusión de la membrana mucosa del recto, por el ano.		
★ Antes de defecar o en ese momento; estreñimiento y diarrea alterna.	Podo. 10M o 50M	Quinc. (3)
<input type="checkbox"/> Al orinar; por hemorroides, especialmente en los niños.	Acid-mur. 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Con endurecimiento, distensión e hinchazón del abdomen.	Merc. 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> En personas que llevan una vida sedentaria y siguen una dieta estimulante y toma bebidas también estimulantes.	Nux-v. 30 o 200	C/. 6 h.
● Remedio intercurrente.	Sulphur 200 o 1M	C/. 10 m. (3)
<input type="checkbox"/> En personas que sufren de hemorroides; después de defecar; dolor de la parte baja de la espalda.	Aesc. 30	C/. 4 h.
★ Diarrea seguida de prolusión de recto.	Bell. 30	C/. 4 h.
★ En niños que tienen estreñimiento y son propensos a los resfriados.	Hydr. 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Prolusión de recto; empeora cuando las heces son blandas.	Ign. 200 o 1M	C/. 10 m. (3)
	Remedio bioquímico	
	Cal-f. 12X	C/. 4 h.

Otros remedios importantes: Lyc., Cal-c. y Tub-k., etc.

PROLAPSO DE ÚTERO

Es una situación en la que la matriz cae de su posición natural por haberse relajado sus ligamentos, como consecuencia de un parto difícil y de abultamiento o inflamación de la matriz. El órgano cae hasta asomar por el orificio de la vagina e incluso salirse.

En casos recientes, el reposo en posición recostada permitirá que las partes afectadas recuperen su estado original. En los casos más antiguos, debe aplicarse alguna ayuda y una especie de suppositorio vaginal.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
❖ Sensación de peso en el útero; presión, sensación de descaimiento; sensación de caída en el epigastrio.	Sep. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
❖ Si falla Sep.; La paciente siente como si se le saliese la pelvis por la vagina y se sujetara la vulva con la mano. Ganancias constantes de orinar.	Lil-t. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
<input type="checkbox"/> Por commoción; sensación de magullamiento.	Arn. 200 o 1M	C/. 10 m. (3)
<input type="checkbox"/> Cuando los ligamentos del útero están relajados por pesadez del útero.	Frax. Ø,	5-10 gt. C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> La paciente se siente peor en la menstruación; después de levantar peso. Depresión o ideas suicidas.	Aur. 200 o 1M	C/. 10 m. (3)
❖ Asociado con prolapso de recto; por debilidad.	Podo. 30 o 200	C/. 6 h.
<input type="checkbox"/> En pacientes tímidas y lloronas; empeora después de acostarse; la paciente se siente mejor con frío y al aire libre.	Puls. 30 o 200	C/. 6 h.
<input type="checkbox"/> Sensación de abatimiento; dolor en la parte izquierda de los ovarios; no puede llevar ropa ajustada en la cintura.	Lach. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
<input type="checkbox"/> Sensación de abatimiento; menstruaciones abundantes y malolientes; se siente peor al oír chirridos.	Bell. 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Menstruaciones adelantadas y escasas; sensación de abatimiento; empeora con el coito.	Pneu. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
Remedios bioquímicos		
Cal-f. 12X y Cal-p. 3X		C/. 4 h.

Otros remedios importantes: Aloe s. o Cotrina, Agar., Aesc., Arg. met., Helon., Murx. y Syph., etc.

Los ejercicios físicos, en especial los del Yoga, son útiles; pero hay que aprenderlos con un guía experto.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
----------	----------	--------------------------

PRÓSTATA

☆ Remedio capital; para inflamación o aumento de tamaño de la glándula prostática.	Sabal. Ø,	5-10 gt. C/. 4 h.
● El paciente puede orinar con facilidad solamente de pie; especialmente en solteros de edad.	Con. 200 o 1M	Sem. (3)
□ Aunque se tienen muchas ganas de orinar, la orina sale en pequeñas cantidades.	Staph. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
□ Gran tenesmo con agrandamiento de la próstata; pérdida de sed con sequedad de boca.	Puls. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
● En la vejez; comportamiento infantil, timidez por naturaleza.	Bar-c. 200 o 1M	Sem. (3)
□ Cáncer de la glándula prostática.	Cist. 30 o 200	C/. 4 h.
□ Cáncer de la glándula prostática, cuando gotea la orina estando acostado.	Kreos. 30 o 200	C/. 3 h. (3)
● Remedio intercurrente	Sulphur 200 o 1M	Quinc. (3)

PRURITO GENITAL

Picor de los órganos genitales

(Ver también *Picor*)

□ Granos en la vulva; picor cuando la paciente está al calor de la cama.	Aeth. 30	C/. 4 h.
□ Picor en el orificio de la uretra; prurito de vagina, de ano, de escroto y de hombro.	Alum. 30	C/. 4 h.
☆ Picor de escroto y de genitales; hinchazón de labios genitales; prurito de vulva durante el embarazo.	Ambra-gr. 30	C/. 4 h.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
<input type="checkbox"/> Picor y ardor de ano; picor de genitales.	Am-c. 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Picor con dolor al rascarse; picor de pene; de la punta del glande; picotazos, picor como de sal en el lado izquierdo del escroto.	Ant-c. 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Picor de genitales; pústulas en la parte externa de los genitales.	Ant-t. 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Picor y punzadas en interior y exterior de la vulva.	Cal-c. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
★ Prurito de vulva; especialmente por masturbación, con deseo sexual fuerte, durante el climaterio.	Canth. 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Arrastre y picor en el recto y en el perineo; punzadas y picor en el ano; picor y araños en el escroto y el glande.	Chel. 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Prurito de vulva; acompañado de hemorroides; estreñimiento pertinaz durante la dismenorrea o en el embarazo; empeora al echarse.	Coll. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
<input type="checkbox"/> Picor violento de genitales incluso dentro de la vagina; empeora inmediatamente después de la menstruación.	Con. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
★ Picor del glande y el escroto; empeora al caminar; picor intenso en genitales femeninos; empeora por la noche; mejora al rascar muy suavemente.	Crot-t. 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Picor del monte de Venus.	Euph. 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Prurito de recto; por la noche, salen las lombrices por el ano.	Ferr-met. 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Prurito de ano; picor dentro y alrededor de él, en el perineo.	Fl-ac. 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Prurito de ano con humedad y tendencia a formar vesículas pequeñas; picor de vulva; empeora antes de las menstruaciones.	Graph. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
<input type="checkbox"/> Picor de ano; duele como si estuviese en carne viva; prurito de las partes genitales femeninas.	Ham. 30	C/. 4 h.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
□ Prurito de vulva; falta de aliento, calor, enrojecimiento y picor; labios hinchados y cubiertos por un depósito sucio blanquecino.	Helon. 30	C/. 4 h.
□ Picor de pene en el frenillo del prepucio; picor de vulva; heridas pequeñas que supuran.	Hep. 30	C/. 4 h.
□ Prurito de vulva; con leucorrea abundante y excitación sexual.	Hydr. 30	C/. 4 h.
□ Picor nocturno irresistible; necesidad de rascarse que produce insomnio.	Iod. 30	C/. 4 h.
□ Picor en la zona del monte de Venus.	Kali-c. 30	C/. 4 h.
☆ Picor; dolor y escozor entre los labios y la vulva.	Kreos. 30	C/. 4 h.
☆ Picor de ano; empeora después de dormir.	Lach. 30	C/. 4 h.
□ Excoriación ligera y picor de los labios externos; a veces da la sensación de que está producido porque hay algo vivo en esa zona.	Lac-c. 30	C/. 4 h.
□ Picor de vagina con sensación de tener llenas esas partes; punzadas en la zona del ovario izquierdo.	Lil-t. 30	C/. 4 h.
□ Picotazos, picor cuando se está caliente durante el día; picor, erupción en el ano dolorosa al tacto; picor de la superficie interior del prepucio.	Lyc. 30	C/. 4 h.
□ Picor de genitales y escroto; se extiende al ano; empeora al sentarse; mejora el ejercicio y movimiento.	Mg-m. 30	C/. 4 h.
□ Picor de escroto que no se alivia al rascarse.	Mur-ac. 30	C/. 4 h.
□ Picor, dolor y humedad entre el escroto y los muslos; leucorrea que produce picor con tez amarillenta; picor de los genitales externos femeninos, con caída del cabello.	Nat-m. 12X o 30	C/. 4 h.
□ Caída del vello púbico; picor, hinchazón y ardor de la vulva y la vagina.	Nit-ac. 30	C/. 4 h.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
◻ Picor entre el escroto y los muslos; en el perineo; dolor y humedad en los órganos genitales femeninos, con picor violento.	Petr. 30	C/. 4 h.
◻ Picor dentro del útero; prurito de vulva.	Plat. 200	C/. 4 h. (3)
● Por amenorrea; durante el embarazo; granos, picor violento; granos, emanación de fluido; empeora en la cama y con el calor; se rasca hasta hacerse sangre, con lo que se siente alivio.	Psor. 200	C/. 4 h. (3)
◻ Picor y ardor en la parte interior y superior del prepucio; empeora por la noche, por menstruaciones retrasadas; mejora lavándose con agua fría.	Puls. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
◻ Empeora con el frío; mejora con calor, más hormigueo que ardor.	Rumex. c. 30	C/. 4 h.
◻ En recién casadas, con ganas frecuentes de orinar; punzadas y picor en la vulva.	Staph. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
● Picor con ardor; empeora por las tardes y en la cama; empeora después de rascarse.	Sulphur 30 o 200	C/. 4 h. (3)
◻ Picor intenso de la vulva y la vagina; empeora por la noche, con sequedad y calor de las partes.	Tarent. hisp. 30	C/. 4 h. (3)
◻ El paciente no puede dormir por el picor fuerte que siente en el ano; se sacude y da vueltas por la noche; a veces se debe a oxiuros.	Teucr. 30	C/. 4 h.
◻ Picor excesivo durante la menstruación; induce a la masturbación, con nerviosismo en los pies.	Zinc-met. 30	C/. 4 h.
Remedio bioquímico		Biocom. No. 20
		C/. 4 h.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
----------	----------	--------------------------

PSORIASIS

Un estado que se caracteriza por erupciones maculopapulosas circunscritas, marcadas y confluyentes, rojizas y con escamaciones plateadas. Las lesiones se producen especialmente en codos, rodillas, cuero cabelludo y tronco. El examen microscópico muestra paraqueratosis, hiperacantosis.

- | | | |
|--|-------------------------------|------------------|
| ● Remedio capital (para empezar el tratamiento); aversión al baño; en pacientes pensadores y cargados de espaldas. | Sulphur 10M o 50M | 1 vez al mes (3) |
| ● Remedio intercurrente; en casos crónicos y obstinados. | Carc. 1M o 10M | 1 vez al mes (3) |
| <input type="checkbox"/> En individuos cautos, estreñidos e indecisos; las heridas pequeñas supuran. | Graph. 200 o 1M | C/. 10 m. (3) |
| <input type="checkbox"/> Individuos hipersensibles al frío y a otros cambios; prefieren el calor. | Hep. 200 o 1M | C/. 10 m. (3) |
| <input type="checkbox"/> Con abultamiento extenso y exfoliación de la piel. | Hydrc. 200 | C/. 6 h. |
| ● Empeora con aplicaciones frías y mejora con el calor; sensación de ardor. | Ars. 0/7 o superior | C/. 6 h. |
| ● En casos crónicos, cuando fallan los remedios bien seleccionados; ardor y picor. | Rad-br. 200 o superior | Quin. (3) |

Remedios bioquímicos En condiciones de alergia

Cuando se abultan las costras

Nat-m. 12X y Nat-s. 12X C/. 4 h.

Cal-f. 12X y Kali-s. 6X C/. 4 h.

Otros remedios importantes: Nit-ac., Psor., Syph., Sep., Med., Petr., Thuy., Thyr., Ars-br., Kali-ar., Nat-m. y Oci-sa., etc.

PTERYGIUM

Es un abultamiento vascular, triangular, de una parte de la conjuntiva que tiene su áuspicio apoyada en el borde de la córnea. Su situación más frecuente es sobre el músculo recto interno. El pterygium crece muy lentamente y tiene tendencia a extenderse por la córnea, aunque raramente parece pasar del centro de la pupila.

El tratamiento constitucional homeopático es muy satisfactorio.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
<input type="checkbox"/> Remedio capital.	Zinc-s. 1M y más	Quin. (6)
<input type="checkbox"/> Si está producido por la exposición al frío y la humedad; paciente friolero, gordo y flojo.	Cal-c. 200 o 1M	Sem. (6)
<input type="checkbox"/> Con escrófulas y abultamiento glandulares.	Chim. 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Dolores machacantes y punzantes en el canto interior del ojo; lagrimo abundante y fotofobia marcada; empeora con el aire frío y por la noche; mejora en una habitación caliente.	Zinc-met. 30	C/. 4 h.

Otros remedios importantes: Am-br., Arg. Nit., Ars., Lach., Nux-m., Psor., Rat., Spig., Staph., Sulphur, Tell., etc.

PULSO

Afecciones del

<input type="checkbox"/> Rápido y constante; en casos de hemorragia interna, sensación de frío e inquietud.	Ars. 30 o 200	C/. ½ h. (3)
<input type="checkbox"/> Pulso irregular; después de levantarse.	Petr. 30 o 200	C/. 6 h.
<input type="checkbox"/> Desproporcionado con la temperatura.	Pyr. 200 o 1M	C/. 10 m. (3)
<input type="checkbox"/> Pulso excitado y frecuente; sensación de frío intenso; palpitaciones cada cuatro o cinco pulsaciones.	Nux-v. 30 o 200	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Frecuente; mientras se está en la cama.	Sul-ac. 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Rápido; después de medianoche.	Benz-ac. 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Rápido; después de comer.	Lyc. 200 o 1M	C/. 10 m. (3)
<input type="checkbox"/> Frecuente; durante el descanso.	Mg-m. 200	C/. 10 m. (3)
<input type="checkbox"/> Frecuente; después de defecar.	Con. 200	C/. 10 m. (3)
<input type="checkbox"/> Pesado y lento; el cuerpo tiene un frío helador; en enfermedades agotadoras.	Verat-v. 30	C/. ½ h.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
❑ Palpitaciones cada dos latidos.	Spig. 200	C/. 6 h.
❑ Palpitaciones cada tres latidos; irregular, después de hacer un esfuerzo, echado del lado izquierdo; sed excesiva y estreñimiento.	Nat-m. 20 o 200	C/. 4 h.
❑ Palpitaciones cada tres o cuatro latidos.	Nit-ac. 200	C/. 10 m. (3)
❑ Palpitaciones cada tres o cuatro latidos.	Cimic. 30	C/. 4 h.
❑ Palpitaciones cada seis o siete latidos.	Acid-mur. 30	C/. 4 h.
❑ Palpitaciones cada diez latidos; empeora con el esfuerzo, aprensión.	Gels. 30	C/. 4 h.
❑ Palpitaciones cada diez a trece latidos.	Cina. 200 o 1M	C/. 10 m. (3)
❑ Lento; por la tarde; estreñimiento.	Graph. 30 o 200	C/. 6 h.

QUELOIDES

Crecimiento fibroso, similar a un tumor, que suele aparecer en algunas cicatrices.

- ★ Remedio capital; para disolver los tejidos de la cicatriz. **Thiosin.** 3X C/. 4 h.
- ❑ Cuando hay grietas profundas en los queloides; estreñimiento. **Graph.** 30 o 200 C/. 4 h.
- ★ Para disolver los tejidos de las cicatrices; en pacientes frioleros. **Sil.** 200 o 1M Sem. (6)
- En constituciones tuberculosas; cuando hay una historia de tuberculosis en la familia. **Tub-k.** 1M Quinc. (6)
- ❑ Queloides con bordes rojos; picor; empeora con el calor; sudor maloliente. **Fl-ac.** 30 o 200 C/. 6 h.
- Cuando se pierde el amor a la vida por el aspecto desagradable de los queloides; pensamientos suicidas. **Aur.** 200 o 1M Sem. (3)

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
<input type="checkbox"/> Por heridas o quemaduras viejas.	Caust. 30 o 200	C/. 6 h.
<input checked="" type="checkbox"/> Remedio intercurrente, cuando hay dolor en los queloides.	Nit-ac. 200 y superior Quinc. (6)	
	Remedio bioquímico	
	Cal-f. 12X	C/. 4 h.

QUEMADURAS

<input type="checkbox"/> Remedio capital para quemaduras de cualquier tipo.	Canth. 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Quemaduras del sol; afluencia de sangre a la cabeza, cara enrojecida.	Bell. 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Quemaduras de rayos X.	Phos. 200 o Cad-i. 30	C/. 4 h. (3)
<input type="checkbox"/> Cuando hay miedo a la muerte y ansiedad por las quemaduras. La zona quemada está caliente e hinchada, con fiebre.	Acon. 30 o 200	C/. 15 m. (6)
<input checked="" type="checkbox"/> Si la parte afectada tiende a gangrenarse.	Sil. 30 o Sulphur 30	C/. 3 h. (3)
<input type="checkbox"/> Si se forma pus; la parte afectada se vuelve muy sensible.	Hep. 200	C/. 10 m. (3)
<input type="checkbox"/> Quemaduras debidas a agua o aceite calientes; cuando no se han formado ampollas.	Urt-u. 30	C/. 2 h.

Para uso externo: Loción Canth. Si se forman heridas, aplicar loción de Calen.

QUEMADURAS SOLARES

<input type="checkbox"/> Con enrojecimiento; calor y dolor pulsante.	Bell. 30	C/. 3 h.
<input type="checkbox"/> Después de un día al sol; cuando se espera reacción.	Canth. 6 o 30	C/. 3 h.
<input type="checkbox"/> Cuando el paciente está en coma; por fatiga al sol.	Op. 200 o 1M	C/. 10 m. (3)

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
<input type="checkbox"/> Efectos crónicos de una insolación; sed excesiva y estremimiento.	Nat-m. 6X o 30	C/. 3 h.
<input type="checkbox"/> Con dolor fuerte de cabeza, decaimiento y vómitos.	Glon. 3X o 6	C/. ½ h.
<input type="checkbox"/> Con sudor frío en la frente; náuseas, dolor pulsante y pérdida de movimientos.	Verat. 30	C/. ½ h.

QUERATITIS, SIN ULCERACIÓN

Es una inflamación, con aumento de espesor y enturbiamiento de la córnea; pero aún sin ulceración de ésta.

<input type="checkbox"/> Cuando los ojos arrojan un líquido denso, pegajoso, abundante y blanquecino.	Kali-bi. 30 o 200	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Con sensibilidad excesiva a la luz; neuralgia ciliar.	Lac-f. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
<input type="checkbox"/> Con lágrimas irritantes y dolor insoportable en la córnea.	Merc. 30 o 200	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Cuando los ojos están muy sensibles al tacto y a la luz; descarga amarillenta y densa, con opacidad de la córnea.	Hep. 30 o 200	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Opacidad de la córnea; lágrimas abundantes e irritantes; dolores fuertes; empeora por la noche. Tendencia superficial a la ulceración.	Nit-ac. 30 o 200	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Con dolor que empeora por la noche; mejora después de bañarse con agua fría.	Syph. 200 o 1M	Sem. (3)
<input type="checkbox"/> En pacientes obesos, fofos y frioleros; empeora con el frío.	Cal-c. 200 o 1M	Sem. (3)
● Remedio intercurrente	Sulphur 200 o 1M	Sem. (3)
Remedio bioquímico	Kali-m. 6X o 12X	C/. 4 h.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
----------	----------	--------------------------

QUISTES DE PÁRPADOS

(Ver también *Orzuelos*)

<input type="checkbox"/> Quistes en los ojos.	Kali-i. 30 o 200	C/. 6 h.
<input checked="" type="checkbox"/> Recurrente; después de tener orzuelos.	Staph. 200	C/. 6 h.
Remedio bioquímico	Cal-f. 12X o 30	C/. 4 h.

RAQUITISMO

Su característica esencial es una irritación del tejido osteo-plástico, que tiene como consecuencia su hipertrofia con menos sales minerales de las necesarias para la formación de huesos sanos.

<input type="checkbox"/> Antojos poco normales; se defeca flojo y suelto o tiene un estreñimiento muy fuerte, con mucho esfuerzo; ausencia de sudor; cabello seco y deslustrado; lentitud al caminar, al hablar y al masticar; cabeza grande; fontanelas abiertas; bañado en sudor frío; apetito voraz.	Alum. 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Curvatura de las vértebras lumbares; estrabismo; pupilas dilatadas; dolor de garganta al tragar; vientre abultado y prominente.	Bell. 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Se mastica con lentitud y dificultad; sudor abundante en la cabeza; fontanelas abiertas; abdomen abultado; diarrea blanquecina y espumosa; curvatura de la espina dorsal y deformaciones en las extremidades.	Cal-c. 200 o 1M	Sem. (6)
<input type="checkbox"/> Las fontanelas se quedan muy abiertas; diarrea y enflaquecimiento del niño; debilidad general.	Cal-p. 12X o 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Cuando los muslos están notablemente delgados y la enfermedad está en sus primeras etapas; con ligera flexibilidad de los huesos.	Nat-m. 12X o 30	C/. 4 h.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
----------	----------	--------------------------

Otros *remedios importantes*: Phos., Asaf.; Aur-m., Hep., Iodum, Sulphur, Fl-ac., Lact.ac., Lyc., Merc., Mez., Acid-phos., Sep., Sil., Staph., Symph., Ther., etc.

REMEDIOS DEL LADO DERECHO

Remedios importantes: Anacardium, Apis., Bry., Caust., Chel., Cinnb., Con., Dolichos, Equis-a., Ferr-p., Iod., Kali-c., Lith., Lyc., Mg-p. , Merc., Phyt., Podo., Rhus tox., Sang. y Tarent., etc.

REMEDIOS DEL LADO IZQUIERDO

Medicinas que tienen una afinidad especial con los órganos del lado izquierdo del cuerpo. Para repetición, etc., ver las enfermedades correspondientes.

- Afecta al brazo izquierdo, la pierna izquierda y el lado izquierdo del abdomen. **Asaf.** 30 o 200
- Dolor desde el lado izquierdo del estómago hacia la espalda. **Alst.** 30 o 200
- Aparecen los síntomas en el lado izquierdo y, después, en el derecho. **Benz-ac.** 30 o 200
- Molestias del lado izquierdo (punzadas en el bazo). **Bell-p.** 30 o 200
- Edema de la mano izquierda y el pie izquierdo. **Cat.** 30 o 200
- Ciática del lado izquierdo, después de gripe. **Iris.** 30 o 200
- Sudor predominante en el lado izquierdo. **Jab.** 30 o 200
- Neuralgia intercostal del lado izquierdo, con entumecimiento de todo el brazo izquierdo. **Kalm.** 30 o 200
- Reumatismo del lado izquierdo; dolores agudos en el lóbulo inferior del pulmón izquierdo. **Ox-ac.** 30 o 200

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
❑ Enrojecimiento y calor en el lado izquierdo de la cara, mientras el derecho está pálido y frío.	Par. 30 o 200	
❑ Síntomas del lado izquierdo; empeoran a las tres de la tarde.	Thuy. 30 o 200	
❑ Neuralgias paroxísticas, especialmente en el lado izquierdo, aunque la ciática esté en el derecho.	Coloc. 30 o 200	
❑ Neuralgias por el abdomen; empeora en el lado izquierdo.	Nux-v. 30 o 200	
❑ Dolores del lado izquierdo.	Colch. 30 o 200	
❑ Dolores de la zona inframamaria izquierda, que hacen pensar en problemas de ovarios.	Cimic. 30 o 200	
❑ Problemas del lado izquierdo de la garganta; difteria, dolor de garganta, úlceras, etc.	Merc-bin iod. 30	
❑ Dolor del lado izquierdo de la cabeza; neuralgia del quinto par intracraneal.	Spig. 30 o 200	
❑ Problemas del lado izquierdo de la garganta.	Lach. 30 o 200	

REPRESIONES

Efectos negativos
(Ver también otras enfermedades relevantes)

❑ Manía; por represión de erupciones.	Zinc-met. 200 o 1M	C/. 10 m. (3)
❑ Demencia; por represión de erupciones.	Sulphur 200 o 1M	C/. 10 m. (3)
❑ Convulsiones o cataratas, etc.; después de reprimir el sudor de pies.	Sil. 200 o 1M	C/. 10 m. (3)
❑ Asma; debida a represión del sudor de pies.	OI-an. 200	C/. 10 m. (3)
❑ Gonorrea; efectos posteriores de ella.	Med. 200 o 1M	C/. 10 m. (3)

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
❑ Hemorroides; debidas a represión de leucorrea.	Am-m. 30 o 200	C/. 4 h.
❑ Sordera; debida a represión de la sífilis.	Kreos. 30 o 200	C/. 10 m. (3)
❑ Quemaduras; efectos posteriores de ellas.	Caust. 30 o 200	Sem. (3)
❑ Picores; debidos a la represión de erupciones.	Ars. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
❑ Tics nerviosos; debidos a la represión de erupciones.	Zinc-met. 200	C/. 10 m. (3)
❑ Efectos negativos de insultos; humillación o indignación.	Staph. 200 o 1M	C/. 10 m. (3)
❑ Problemas de riñones; después de difteria, escarlatina o fiebre tifoidea.	There-ch. Ø o 30	C/. 4 h.
❑ Reumatismo; después de supresión de diarrea.	Abrot. 30 o 200	C/. 4 h. (3)

RESACA

(Ver también *Alcoholismo*)

❑ Remedio capital para la resaca.	Nux-v. 30 o 200	C/. ½ h.
❑ Congestión de la cabeza, después de beber vino.	Sil. 200	C/. 10 m. (3)
❑ Deseo insaciable de beber un licor que antes aborrecía el paciente.	Med. 200 o 1M	Sem. (6)

Remedio bioquímico Kali-p. 6X C/. 4 h.

RESFRIADO, CATARRO Y CORIZA

Primera etapa

- ★ Frío helador en todo el cuerpo; tanto dentro como fuera. Camph. 6 o 30 C/. ½ h.
Para dar calor al sistema.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
❖ Frío debido a la exposición repentina a viento frío y seco. Sensación de frío, jaqueca, lagrimeo y estornudos; inquietud y miedo; sensación de fiebre.	Acon. 30 o 200	C/. 2 h.
❖ Instilación nasal durante el día y bloqueo por la noche, con sensación de frío.	Nux-v. 30	C/. 3 h.
❖ Frío con estornudos y descarga abundante por ojos y nariz; empeora con el calor y en locales cerrados; mejora al aire libre.	All-c. 30	C/. 3 h.
◻ Sequedad de nariz con jaqueca; empeora con el movimiento; aumento de sed; labios secos; estreñimiento.	Bry. 30 o 200	C/. 3 h.
◻ Estornudos; descarga acuosa de nariz y ojos; molestias de garganta con deseo constante de tragarse saliva; mal olor de boca; fiebre y sudor que no se alivian. Empeora por la noche.	Merc. 30	C/. 3 h.
❖ Lagrimeo y ardor de ojos, con flujo nasal; descargas irritantes.	Euphr. 30	C/. 3 h.
❖ Sensación de frío, aunque la cara está caliente; inquietud y sed insopportable. Se bebe con frecuencia en pequeñas dosis; mejor con bebidas calientes.	Ars. 30	C/. 3 h.
❖ Descargas nasales que irritan el labio superior. Nariz llena de flema; se respira por la boca.	Arum-t. 30	C/. 3 h.
❖ Frío; descarga nasal y estornudos; enrojecimiento y dolor en la frente; lagrimeo.	Sabad. 30	C/. 4 h.
◻ Frío; dolor de garganta; cara rojiza, afluencia de sangre a la cabeza.	Bell. 30	C/. 4 h.
❖ Dolor, embotamiento, frío en la espalda; estornudos, descarga nasal suave y densa, fiebre; mejora al orinar.	Gels. 30	C/. 3 h.
❖ Coriza con estornudos y dolor en los huesos de las extremidades, con molestias en la carne.	Euph. 30	C/. 3 h.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
❑ Frío; mejora con un baño frío.	Calc-sulph. 30	C/. 4 h.
❑ Emanación nasal al comer.	Trom. 30 o 200	C/. 6 h.
❑ Emanación nasal al acostarse.	Thuy. 30 o 200	C/. 6 h.
❑ Coriza seco; moqueo de los niños, bloqueo nasal.	Samb. 30	C/. 4 h.
	Remedios bioquímicos	
	Cal-p. 6X y Ferr-p. 6X, alternando	C/. 3 h.

Segunda etapa

❑ Descarga nasal; amarillenta o verdosa; correosa.	Kali-bi. 30	C/. 4 h.
❑ Mucosidad nasal verdosa amarillenta; pérdida del gusto y la sed; mejora al aire libre.	Puls. 30	C/. 4 h.
❑ Descarga nasal densa y amarilla; catarro post-nasal; estreñimiento.	Hydr. 30	C/. 4 h.
❑ Secreción nasal como un chorro; aumento de sed; estreñimiento; el frío lo agrava hasta media noche y mejora después.	Nat-m. 30 (en etapa aguda Bry. 30)	C/. 4 h.
❑ En pacientes obesos y flojos; empeora después del baño; paciente friolero.	Cal-c. 200	C/. 6 h.
❑ Descarga nasal líquida al principio, que se hace densa y amarilla. Dolor de garganta al tragiar, como si estuviese llena de astillas; sensibilidad al frío.	Hep. 30	C/. 4 h.
● Empeora con el frío a primeras horas de la mañana; catarro crónico y seco; aversión al baño.	Sulphur 200	Sem. (3)
● Catarro crónico; coriza seco, con bloqueo nasal; empeora con el cambio del tiempo y el frío.	Psor. 200	Sem. (3)
● Casos crónicos con historia de tuberculosis.	Tub-k. 200 o 1M	Quinc. (6)
● Casos crónicos pertinaces, cuando fallan los remedios indicados.	Bac. 1M	Sem. (3)

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
Remedios bioquímicos		
Flema amarillenta; empeora con el calor.	Kali-s. 6X	C/. 4 h.
Sesación de frío en la cabeza con descarga verde amarillenta.	Cal-p. 6X o 12X	C/. 4 h.
Para catarro agudo o crónico.	Cal-p. 6X y Nat-m. 12X	C/. 4 h.

RETINA, Enfermedades de la

- Desprendimiento de retina; exudación de la retina; retina inflamada. Dolor y molestias en la cabeza y alrededor de los ojos; tristeza. **Naphtin. 30 o 200** C/. 10 m. (3)
 - Cuando los ojos son sensibles a la luz, el paciente ve un halo parecido a un anillo alrededor de la luz; inflamación de la retina; ganas de tomar bebidas frías. **Phos. 200 o 1M** Sem. (3)
 - Inflamación de la retina; dolor fuerte y agudo alrededor del ojo; empeora con el movimiento. **Bry. 30 o 200** C/. 4 h.
 - La parte superior de la visión parece cubierta por un cuerpo negro; visible la mitad inferior; infiltración de la retina; depósitos en la retina. **Aur. 200 o 1M** Sem. (3)
 - Fluido debajo de la retina. Dolor pasivo en la parte inferior del globo ocular, con aflujo de sangre a la cara y la cabeza. Punzadas dolorosas en el ojo. Hinchazón edematosas de los párpados. **Apis. 200** Sem. (3)
- El desprendimiento de la retina de la coroides suele ser consecuencia de una exudación serosa; pero también puede producirse por cualquier otra exudación o hemorragia debajo de la retina y también por un tumor.
- Inflamación de la retina con inquietud, especialmente después de medianoche, con ganas de beber pequeñas cantidades de agua. Orina escasa y albuminosa. **Ars. 30** C/. 4 h.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
❑ Inflamación de retina durante el embarazo; oscurecimiento repentino de la visión; desprendimiento de retina por lesión o miopía.	Gels. 30	C/. 4 h.
❑ Hemorragias dentro de la retina con inflamación.	Lach. 30 o 200	C/. 10 m. (3)
❑ Sangre en la retina en casos de envenenamiento por serpientes; inflamación de la retina.	Crot. 200	C/. 10 m. (3)
❑ Sensibilidad repentina a la luz; dolor de ojos y de retina.	Bell. 30	C/. 3 h.
❑ Retina hipersensible a la luz; dolor profundo en el ojo.	Con. 200	C/. 10 m. (3)
❑ Desprendimiento de retina por lesión traumática. Hemorragia de retina.	Arn. m. 200 o 1M	C/. 10 m. (3)

Otros remedios importantes: Dig., Rhus tox., y Syph., Ruta e Hyper., etc.

REUMATISMO

(Ver *Artritis*)

RINITIS ALÉRGICA

(Ver también *Resfriado, Catarro y coriza, Sinusitis, y Tos*)

La “alergia” puede considerarse como una alteración de la capacidad de reacción de un individuo ante ciertas sustancias, a las que las personas normales no son sensibles hasta el extremo de producir síntomas. El propio Hahnemann vislumbró estas reacciones alérgicas al hablar de “idiosincrasias”, que define como constituciones corporales peculiares que, a pesar de ser sanas en todo lo demás, tienen una disposición para entrar en un estado más o menos mórbido con algunas cosas que parecen no producir ninguna alteración en otros muchos individuos.

- ❖ Alergia al polvo; al humo, a los perfumes y a los atomizadores, etc., normalmente en la región nasofaríngea, que hace estornudar y produce bloqueo de la nariz y tos.

Hist. 1M Sem. (3)

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
❑ Alergia al polvo; coriza con abundante descarga nasal y estornudos por la tarde, fuerte jaqueca frontal; lágrimas con picor en los ojos.	Just. 30	C/. 4 h.
☆ Coriza abundante y acuosa; picor retronal.	Sol-lycpr. 30	C/. 4 h.
	Remedios bioquímicos	
	Nat-m. 12X y Nat-s. 12X	C/. 3 h.

RIÑONES

❑ Nefritis aguda. Orina oscura y escasa; retención de orina con dolores punzantes en los riñones. Fiebre e inquietud.	Acon. 30 o 200	C/. 3 h.
☆ Orina escasa con albúmina; nefritis aguda; albuminuria; falta de sed.	Apis. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
☆ Dolor fuerte en los riñones, que se extiende a la vejiga y la uretra.	Berb. Ø o 30	C/. 4 h.
☆ Nefritis con irritación de la vejiga; ardor insoportable, orina caliente, sanguinolenta, albuminosa. Ganas constantes de orinar.	Canth. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
☆ Dolor en la parte superior del riñón derecho, que se extiende hacia abajo y hacia delante.	Oci. 30	C/. 4 h.
❑ Orina escasa, con albúmina. Dificultad para respirar, en especial después de medianoche y al acostarse. Agotamiento excesivo al mínimo esfuerzo.	Ars. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
❑ En primera etapa, orina sanguinolenta, ardor fuerte y dolor en la uretra y en la zona de los riñones, al orinar; orina con sedimentos como café molido.	There-ch. Ø, 5-7 gt.	C/. 4 h.
❑ Hidropesía con nefritis. Pulso lento y débil; sensación de que se para el corazón. Orina escasa y oscura.	Dig. 30	C/. 4 h.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
❑ Neuralgia del riñón derecho. Dolor del lado derecho del cuerpo, con ganas de orinar, sin expulsar nada.	Nux-v. 30 o 200	C/. 4 h.
❑ Supresión de la orina que pasa sólo gota a gota. Dolor espasmódico que aparece y desaparece de repente, con sensación de calor en la vejiga.	Bell. 30	C/. 4 h.
❑ Afecciones de riñón, asociadas con neumonía o catarro pulmonar. Dolor constante en la zona del riñón derecho, con orina sanguinolenta.	Phos. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
☆ Olor repulsivo en la orina; sedimentos de color marrón oscuro en la orina. Dolor fuerte de riñones, que penetra en el pecho.	Benz-ac. 30	C/. 4 h.

RONQUERA

(Ver también *Laringitis* y *Molestias de la garganta*)

Una voz excepcionalmente grave y áspera.

❑ Ronquera, debida a la exposición repentina a una corriente de aire seco y frío.	Acon. 30 o 200	C/. 2 h.
☆ Por uso excesivo de la voz; de los políticos, cantantes, etc.	Arn. 30 o 200	C/. 3 h.
☆ De cantantes profesionales; laringitis crónica.	Arg. Nit. 30 o 200	C/. 4 h.
❑ Cuando falla Arg. Nit.	Magn-act. 30	C/. 4 h.
☆ Repentina; ronquera violenta con sensación de que raspa la garganta.	Bell. 30	C/. 4 h.
❑ Por efectos de parálisis; no se puede soportar el contacto de la ropa en la garganta.	Lach. 30	C/. 4 h. (3)
☆ Por catarro; se pierde orina al toser; esputos constantes.	Caust. 30	C/. 4 h. (3)

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
✗ Por histeria; trastornos emocionales; por inhalar humo.	Ign. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
◻ Por parálisis de las cuerdas vocales.	Ox-ac. 6 o 30	C/. 4 h.
✗ Ronquera con dolor de garganta; empeora al comer dulces; se aclara la garganta constantemente.	Spong. 30	C/. 4 h. (3)
✗ Pérdida total de la voz; acompañada de tos floja; pérdida de la sed con garganta seca; mejora al aire libre y con el frío.	Puls. 30	C/. 4 h.
◻ Ronquera de los cantantes; en cuanto empiezan a cantar.	Sel. 30 o 200	C/. 10 m. (3)
◻ Tendencia a que la ronquera aparezca y desaparezca.	Wye. 6 o 30	C/. 4 h.
✗ Ronquera con esputos constantes en los oradores públicos. Empeora cantando y hablando, debido a una exposición repentina.	Arum-t. 30	C/. 4 h.
◻ Ronquera debida a una exposición, con sudor abundante frío y húmedo; empeora por la tarde; ganas de tomar bebidas frescas y frías.	Phos. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
✗ Ronquera durante el ciclo menstrual; sensación de fiebre y de sueño.	Gels. 30	C/. 4 h.
● Remedio recurrente para pacientes psóricos (hipersensibles y propensos a los resfriados).	Psor. 200 o 1M	Sem. (3)
◻ Ronquera debida a una exposición repentina.	Borx. 1X o 30	C/. 10 m. (3)
◻ Ronquera debida a una exposición al calor.	Ant-c. 30	C/. 4 h.
◻ Ronquera; mejora al hablar.	Rhus tox. 30	C/. 4 h.
◻ Ronquera, por frío o congestión de las cuerdas vocales; lengua limpia; náuseas persistentes.	Ip. 30	C/. 4 h.
◻ Ronquera debida a exposición; acompañada de vómitos y mucha hambre.	Cina. 30 o 200	C/. 4 h.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
◻ Pérdida completa de la voz; ardor de garganta, como si se tuviese vapor caliente, exceso de salivación.	Merc. 30	C/. 4 h.
◻ Con irritación de garganta; irritación localizada en un punto.	Sabad. 30	C/. 4 h.
● Cuando fallan los remedios bien elegidos; el paciente se siente molesto por la noche.	Syph. 1M	Sem. (3)
Remedio bioquímico		
Cal-p. 6X Ferr-p. 6X y Kali-m. 6X		C/. 4 h.

RONQUIDOS

El ronquido es un ruido bronco y vibrante que se produce por la vibración del paladar o, algunas veces, de las cuerdas vocales.

● Remedio intercurrente.	Bac. 200 o 1M	Quinc. (3)
☆ Por pólipos nasales; rinitis atrófica crónica.	Lem-m. Ø o 6	C/. 4 h.
☆ En casos de rinitis crónica; nariz roja e hinchada; catarro acre y corrosivo; descarga sanguinolenta maloliente.	Hipoz. 30	C/. 4 h.
◻ Ronquidos cuando el paciente está inconsciente o en coma; respira por la boca; estreñimiento.	Op. 200	C/. 3 h. (3)
◻ Con dolores de parto; después de tener convulsiones; paciente lloroso; se siente mejor al aire libre.	Puls. 30	C/. 4 h.
Remedio bioquímico		C/. 4 h.
Sil. 12X		

SABAÑONES

☆ Dolorosos; empeoran en agua fría y en invierno.	Agar. 30	C/. 4 h.
☆ Cuando hay grietas que sangran con facilidad; empeoran en invierno y en clima frío.	Petr. 30	C/. 4 h.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
❑ Con picor; empeoran con el calor; mejoran con frío y al aire libre.	Puls. 30	C/. 4 h.
❖ Enrojecimiento e hinchazón de la piel; picor y ardor; inquietud.	Rhus tox. 30	C/. 4 h.
	Remedios bioquímicos	Cal-p. 6X y Cal-f. 12X

Para uso externo: Rhus-v. Ø y Glycerine, en 1:9.

SALIVACIÓN

Aunque estos remedios no se pueden dar exclusivamente para la salivación, pueden ser útiles cuando la salivación anormal va asociada con otras enfermedades.

❑ Se escupe conntemente por acumulación de saliva en la boca.	Am-c. 30	C/. 4 h.
❑ Saliva picante; excesiva.	Arum-t. 30	C/. 4 h.
❑ Saliva jabonosa; espumosa.	Bry. 30	C/. 4 h.
❑ Saliva abundante; traga constantemente; lengua limpia.	Ip. 30	C/. 4 h.
❑ Saliva correosa; abundante; gotea de la boca al hablar.	Iris. 30	C/. 4 h.
❑ Saliva abundante; sucia y sanguinolenta.	Nit-ac. 30	C/. 4 h.
❑ Saliva dulzona; acuosa, espumosa, como algodón; mal sabor; empeora por la mañana; falta de sed.	Puls. 30	C/. 4 h.

Remedio bioquímico **Nat-m. 12X** C/. 4 h.

Otros remedios importantes: Alum., Brom.; Cham.; Graph.; Hep., Nux-v., Sep., Ign., Jab.; Lac-c., Sulphur, Stann., Rhus tox., Merc.., Kreos. y Sil., etc.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
----------	----------	--------------------------

SARAMPIÓN

Es una enfermedad infecciosa vírica, que tiene como síntomas coriza aguda, lagrimeo de los ojos, dolor de garganta, tos, sensación de frío, fiebre y erupción. Cuando aparece la erupción, puede subir la fiebre a 40°, con lagrimeo y fotofobia. Los síntomas pueden durar de 4 a 8 días. Si no se trata debidamente, puede aparecer bronquitis capilar y neumonía.

<input type="checkbox"/> Remedio profiláctico	Morb. 200	C/. 10 m. (3)
☆ Fiebre alta con catarro; conjuntiva roja; tos seca; erupción con ardor. Inquietud y ansiedad.	Acon. 30 o 200	C/. 3 h.
☆ Lagrimeo abundante; falta de sed y sequedad en la boca; mejora al aire libre fresco.	Puls. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
☆ Fiebre con inquietud; punta de la lengua roja; mejora con el movimiento.	Rhus tox. 30 o 200	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Ruidos en el pecho, disnea, tos floja con dificultad para expectorar; capa blanquecina en la lengua	Ant-t. 30 o 200	C/. 10 m. (3)
☆ Erupción al rojo vivo; piel caliente y seca; congestión y aflujo de sangre a la cabeza; garganta dolorida.	Bell. 30	C/. 3 h.
☆ Tos seca y dura con punzadas en el pecho. Adormecimiento, delirio; lengua sucia; labios secos; estreñimiento. Sed, con ganas de beber grandes cantidades de agua; empeora con el movimiento.	Bry. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
<input type="checkbox"/> Fiebre alta; retira la ropa de la cama a patadas; ojos dolidos, lacrimosos e irritados; pérdida de sed; mejora con el frío.	Apis. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
<input type="checkbox"/> Lágrimas calientes y ardientes, con fotofobia; descarga suave de nariz y dolor de cabeza como palpitaciones.	Euphr. 30	C/. 4 h.
☆ Alterna el frío y el calor; inquietud, adormecimiento y abotargamiento; mejora al orinar.	Gels. 30	C/. 4 h.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
❑ Tos crupal con ruidos en el pecho. Hipersensibilidad al tacto, al frío, a las corrientes de aire, etc.	Hep. 30/ o 200	C/. 3 h.
❑ Sarampión con descarga purulenta correosa y pegajosa de los ojos y los oídos.	Kali-bi. 30	C/. 4 h.
❑ Tos seca agotadora, con ganas de vomitar. Opresión en el pecho y no puede echarse del lado izquierdo; ganas de tomar bebidas frescas o frías.	Phos. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
Remedios bioquímicos.		Ferr-p. 6X y Kali-m. 6X C/. 3 h.

SARNA (Picor)

Es una infección parasitaria de varias capas del epitelio de la piel. Los síntomas empiezan con picor e inflamación/erupción de la piel. La infección afecta a la piel, empezando normalmente en pliegues, con erupciones en los dedos de las manos y los pies.

❖ Remedio capital; picor con ardor o dolor después de rasarse.	Sulphur 2X o 6	C/. 4 h.
❖ Erupciones pustulares; especialmente en los pliegues de los codos; el picor empeora con el calor y por la noche.	Merc. 30. Sulphur 30 C/. 4 h. y Merc. 30. Puede alternarse	
❑ Dolor en los pliegues de la piel; orina involuntaria al toser o caminar; mejora en clima húmedo.	Caust. 30 o 200	C/. 4 h.
❑ Erupciones en las corvas; pústulas con ardor y picor; mejora con el calor.	Ars. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
❑ Erupciones pustulares azuladas; el paciente se siente peor después de dormir.	Lach. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
❑ Casos crónicos; cuando se repite el picor todas las primaveras; ardor en el esófago.	Sul-ac. 30	C/. 4 h.
❑ Picor de los órganos genitales; insensibilidad en la piel; entumecimiento de los brazos.	Ambra-gr. 30	C/. 4 h.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
□ Picor; erupciones pequeñas, rojizas; empeora con el frío y después de descansar.	Rhus tox. 30	C/. 4 h.
● Casos crónicos; picor y molestias; remedio intercurrente.	Psor. 0/6 y superior	C/. 4 h.
□ Erupciones pustulares dolorosas; sensibilidad al tacto; paciente friolero.	Hep. 30	C/. 4 h.
□ Picor intenso; se rasca hasta sangrar; el picor empeora con el calor de la cama.	Mez. 30	C/. 4 h.
☆ Sarna con descarga parecida a la miel; estreñimiento.	Graph. 30	C/. 4 h.

Para uso externo: aplicar Sulphur Ø mezclado con aceite o una solución de benzoato de Benzilo y hay que lavar la ropa del paciente en agua hirviendo durante 3 o 4 días.

SARPULLIDO

☆ Sarpullido con mucho picor; forúnculos recurrentes en verano.	Syzyg. Ø o 30	C/. 4 h.
☆ Diviesos; sensación de magulladura, dolor (uno tras otro); como cortes.	Arn. 30 o 200	C/. 4 h.
● Erupciones como cortes; cuando se cura una, aparece otra; maduran lentamente.	Sulphur 30 o 200	C/. 4 h.
☆ Sarpullido, color rojizo, calor y aflujo de sangre a la cabeza.	Bell. 30	C/. 4 h.
□ Erupciones con ardor y punzadas; pérdida de sed; empeora con el calor.	Apis. 30	C/. 4 h.
□ Sarpullido o erupciones con ardor y dolor; ardor al orinar.	Canth. 30	C/. 4 h.
□ Erupciones con ardor y picor fuerte; estreñimiento.	Graph. 30	C/. 4 h.
□ Erupciones de color púrpura con vesículas pequeñas alrededor.	Lach. 30 o 200	C/. 4 h. (3)

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
☒ Erupciones de color cobrizo y rojo, que se ponen azules con el frío; el picor empeora por la noche.	Syph. 200	C/. 10 m. (3)
☒ Erupciones secas y escamosas; aspecto sucio; picor intenso; empeora con el calor de la cama.	Psor. 200	C/. 4 h. (3)
☐ Erupciones secas; sed excesiva y estreñimiento.	Nat-m. 30	C/. 4 h.
☐ Erupciones con picor; empeoran por la noche, con calor y sudor.	Merc. 30	C/. 4 h.
☐ Erupciones con picor; empeoran con el calor; heces muy duras y estreñimiento.	Alum. 30 o de 0/5 en (50 milésimas) adelante.	C/. 4 h.
☐ Picor que reaparece constantemente.	Sep. 30	C/. 4 h.
☐ Erupciones por todo el cuerpo; empeoran con clima húmedo y al lavarse.	Dulc. 200	C/. 10 m. (3)
☐ Erupciones sólo en las partes cubiertas del cuerpo.	Thuy. 200 o 1M	C/. 4 h. (3)
Remedio bioquímico		Nat-m. 12X
		C/. 4 h.

SED EXCESIVA

☐ Con temperatura alta y ansiedad.	Acon. 30 o 200	C/. 2 h.
☐ Con ganas de tomar bebidas frías; grandes cantidades de una vez.	Bry. 30 o 200	C/. 4 h.
☐ Por haber tomado demasiada sal; estreñimiento.	Nat-m. 30 o 200	C/. 4 h.
☐ Boca y garganta secas; ganas de tomar leche.	Rhus tox. 30 o 200	C/. 4 h.
☐ Insaciable; bebe con frecuencia cantidades pequeñas.	Ars. 30	C/. 4 h.

Remedios bioquímicos

Kali-p. 6X y
Nat-m. 12X

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
----------	----------	--------------------------

SED, Ausencia de

- | | | |
|--|-----------------------|----------|
| <input type="checkbox"/> Con inflamación de garganta. | Apis. 30 o 200 | C/. 4 h. |
| <input type="checkbox"/> Incluso con temperatura alta. | Gels. 30 o 200 | C/. 2 h. |
| <input type="checkbox"/> Aunque tenga la boca seca. | Puls. 30 o 200 | C/. 4 h. |

Aunque no podemos prescribir un remedio basándonos únicamente en la falta de sed, ayuda a seleccionar

SENSACIONES

Sentir la translación a la conciencia de los efectos de un estímulo que excita cualquiera de los órganos de los sentidos.

- | | | |
|--|-------------------------|--------------|
| <input type="checkbox"/> Sensación de hormigueo; picor y punzadas; entumecimiento. | Acon. 30 o 200 | C/. 4 h. |
| <input type="checkbox"/> Sensación de que se arrastran bichos por la cama; la cama resulta muy dura; de que se mueve el cerebro dentro del cráneo; ansiedad e inquietud. | Ars. 30 o 200 | C/. 4 h. (3) |
| <input type="checkbox"/> Sensación de que corren perros y gatos por la habitación. | Aeth. 200 o 1M | Sem. (3) |
| <input type="checkbox"/> Sensación de que no se adapta a este mundo. | Aur. 200 o 1M | Sem. (3) |
| <input type="checkbox"/> Sensación de que le sube una rata por la pierna. | Ail-gt. 30 o 200 | Sem. (3) |
| <input type="checkbox"/> Sensación de que se cae. | Bell. 200 | Sem. (3) |
| <input type="checkbox"/> Sensación de que corren bichos por los labios. | Borx. 200 o 1M | Sem. (3) |
| <input type="checkbox"/> Sensación de estar desparramado. | Bapt. 30 o 200 | C/. 4 h. (3) |
| <input type="checkbox"/> Sensación de tener agua en el pecho; hierro al rojo vivo encima; de acortamiento de la extremidad derecha; de tener un agujero en el estómago por el que pasa el aire; de caerse de la cama; como si se tuviese algo vivo en la cabeza. | Crot-casc. 200 | C/. 4 h. (3) |

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
<input type="checkbox"/> Sensación de que se es transparente; de hinchazón gradual; de tener una doble existencia; como si se extendiesen el tiempo y el espacio.	Cann-i. 200 o 1M	C/. 4 h. (3)
<input type="checkbox"/> Sensación de que corren hormigas por todo el cuerpo.	Cist. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
<input type="checkbox"/> Sensación de que se para el corazón.	Cic. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
★ Sensación de que la habitación es muy pequeña.	Cycl. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
<input type="checkbox"/> Sensación de que hay una nube negra cubriendo al paciente.	Cimic. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
<input type="checkbox"/> Sensación de que se arrastran gusanos por el estómago.	Cocc. 200	C/. 4 h. (3)
<input type="checkbox"/> Sensación de que nos sube un ratón por las piernas y los brazos.	Cal-p. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
<input type="checkbox"/> La sensación de temblor mejora al moverse.	Dros 200 o 1M	C/. 4 h. (3)
<input type="checkbox"/> Sensación de que nos sigue alguien; de martilleo.	Lach. 200 o 1M	C/. 4 h. (3)
<input type="checkbox"/> Sensación de temblor; empeora con el movimiento.	Nux-v. 200	C/. 4 h. (3)
<input type="checkbox"/> Sensación de sofoco.	Vib. 200	C/. 4 h. (3)
<input type="checkbox"/> Sensación de que el paciente tiene muchos brazos y pies que cubren toda la cama.	Pyr. 200 o 1M	C/. 4 h. (3)
<input type="checkbox"/> Sensación de tener agua fría en el cuerpo.	Ran-b. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
<input type="checkbox"/> Sensación de que caminan insectos por la superficie del cuerpo.	Phos. 200	C/. 4 h. (3)
<input type="checkbox"/> Sensación de tener algo vivo en el cuerpo; como si las piernas fuesen de madera; como si el cuerpo fuese quemadizo.	Thuy. 200 o 1M	C/. 4 h. (3)
<input type="checkbox"/> Sensación de que hay alguien más en la cama.	Petr. 200 o 1M	C/. 4 h. (3)
<input type="checkbox"/> Sensación de que la cama es muy pequeña.	Sulphur 200 o 1M	C/. 4 h. (3)
<input type="checkbox"/> El paciente se siente coo en un sitio extraño.	Op. 200 o 1M	C/. 4 h. (3)

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
❑ Sensación de tener la lengua escaldada.	Plat. 200 o 1M	C/. 4 h. (3)
❑ Sensación de que nos baja agua fría por fuera del esófago.	Verat. 200 o 1M	C/. 4 h. (3)
❑ Sensación de tener ropa mojada en piernas y pies.	Verat-v. 200 o 1M	C/. 4 h. (3)
❑ Sensación de que se va a volcar un cubo de agua cuando se da la vuelta en la cama.	Orni. 200 o 1M	C/. 4 h. (3)
❑ Sensación de que está borracho; le estalla el cráneo.	Mez. 200 o 1M	C/. 4 h. (3)
❑ Sensación de que cae agua caliente del pecho al abdomen.	Sang. 200 o 1M	C/. 4 h. (3)
❑ Sensación de que le muerden los perros la carne y los huesos.	Nit-ac. 200 o 1M	C/. 4 h. (3)
❑ Sensación de que caminan arañas por la mano.	Visc. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
❑ Sensación de que las cosas y la gente son negras.	Stram. 200 o 1M	C/. 4 h. (3)

SEPTICEMIA

Envenenamiento de la sangre

★ Cuando se debe a heridas; las venas se ponen de un color más oscuro y la fiebre sube de 36° a 40°. Infección que empieza en el útero; después de nacer el niño.	Echi. Ø o 30	C/. 2 h.
★ Dolor muscular; inquietud; gran debilidad y postración. En especial con fiebre de larga duración, como la tifoidea, etc.	Bapt. 6 o 30	C/. 4 h.
❑ Paciente hipersensible al tacto; no puede tolerar el contacto de la ropa; empeora después de dormir. Heridas magulladas y laceradas, gangrena y carbunclos, etc. con fiebre alta.	Lach. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
❑ Por magulladuras; la cama parece muy dura; inquietud y magulladuras dolorosas.	Arn. 200 o 1M	C/. 4 h. (3)

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
☒ Fiebre séptica; pulso rápido, desproporcionado con la temperatura; descargas malolientes.	Pyr. 200	C/. 10 m. (3)
☒ Fiebre séptica con excesiva sed de beber poca agua a intervalos cortos; ansiedad e inquietud; sensación de ardor; descarga putrida.	Ars. 30	C/. 3 h.
☒ Septicemia después de operaciones quirúrgicas; pérdida de fluidos vitales, frío en el cuerpo y ganas de ventilarse.	Carbo-veg. 30	C/. 3 h.
Remedio bioquímico	Kali-p. 6X	C/. 4 h.

SEQUEDAD DE BOCA

☒ Sequedad de boca; como si ardiese.	Med. 200	Sem. (3)
☒ Sequedad de boca; como piel quemada.	Hyos. 30 o 200	C/. 4 h.
☒ Sequedad de boca y lengua.	Kali-bi. 30	C/. 4 h.
☒ Sequedad extrema de boca; de las membranas mucosas, la nariz, la boca y la garganta.	Wye. 30	C/. 4 h.
☒ Con sed excesiva; ganas de tomar grandes cantidades de agua en intervalos largos; estreñimiento.	Bry.. 30 o 200	C/. 4 h.
☒ Con sed excesiva; pequeñas cantidades de agua en intervalos cortos; inquietud.	Ars. 30 o 200	C/. 4 h.
☒ Sequedad de boca, sin sed; la lengua se pega al cielo del paladar por la sequedad.	Nux-m. 30 o 200	C/. 4 h.
☒ En pacientes diabéticos.	Acid-phos. 6 o 30	C/. 4 h.
☒ Sequedad de boca, sin sed.	Puls. 30 o 200	C/. 4 h.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
<u>SÍFILIS</u>		
□ En casos agudos o en la etapa secundaria, cuando el chancro es duro; la ulceración se extiende en profundidad, sangra con facilidad; descarga amarillenta y fétida; catarro nasal crónico con descarga acre, verdosa y maloliente; dolor e hinchazón en los huesos nasales.	Merc. 30 o 200	C/. 4 h.
□ Cuando falla Mer-sol ; chancro maloliente, de contorno irregular, con bordes en zig-zag; aparece como en carne viva; pero la úlcera es más profunda que cuando se aplica Merc. Chancho muy sensible al tacto y lleno de granulaciones; sangra al mínimo contacto y al vestirse; orina maloliente.	Nit-ac. 30 o 200	C/. 6 h.
□ Cuando el chancho y el bubón llevan mucho tiempo duros, con hinchazón de glándulas; las encías están hinchadas y delicadas.	Merc-bi-i. 3X o superior	C/. 4 h.
□ Chancros sin dolor con fuerte hinchazón de las glándulas inguinales; para prevenir los síntomas secundarios de la sífilis.	Merc-p-i. 3X o superior	C/. 4 h.
□ Cuando se extiende el chancho con rapidez y emite pus acre y corrosivo que hace que se extiendan las úlceras con degeneración las partes adyacentes.	Merc-c. 3X o superior	C/. 4 h.
□ En casos graves, cuando el goma tumoral afecta a los tejidos nerviosos; los bordes de los chancros están duros y emiten pus cuajado. Dolor fuerte en los huesos; empeora por la noche.	Kali-i. 200 o superior	C/. 6 h.
□ Cuando las úlceras son muy sensibles al tacto; sangran con facilidad; la descarga huele como queso muy curado; dolores punzantes.	Hep. 30 o 200	C/. 6 h.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
<input type="checkbox"/> Con chancros muy sensibles al mínimo contacto; no se soporta ni siquiera el vendaje; chancro gangrenoso, fagedénico, rodeado de una lesión azulada.	Lach. 30 o 200	C/. 6 h.
<input type="checkbox"/> Para el chancro indoloro; úlceras en las piernas que no se curan fácilmente; erupciones de color cobrizo en la cabeza.	Lyc. 30 o 200	C/. 6 h.
<input type="checkbox"/> Debilidad y enflaquecimiento; el paciente quiere ventilación o estar al aire libre; secreciones sucias.	Carbo-veg. 30 o 200	C/. 4 h.
● Remedio intercurrente.	Syph. 200 o 1M	Quinc. (3)
Remedios bioquímicos		
	Kali-m. 3X y Sil. 30X	C/. 4 h.

Otros *remedios importantes*: Anac., Ars., Asaf., Bad, Phyt. y Aur., etc.

SÍNTOMAS CARACTERÍSTICOS OPUESTOS

<input type="checkbox"/>	A. Se estropean las coronas de las muelas. B. Se estropean las raíces de las muelas.	Staph., Merc.. Thuy, Mez.
<input type="checkbox"/>	A. Boca seca, sin sed. B. Boca húmeda con sed	Puls. Merc..
<input type="checkbox"/>	A. La enfermedad empieza en el lado izquierdo y pasa al derecho B. La enfermedad empieza en el lado derecho y pasa al izquierdo.	Lach. Lyc.
<input type="checkbox"/>	A. La tos se agrava al pasar de aire caliente a frío. B. La tos se agrava al pasar del aire libre a un sitio caliente.	Phos. Bry..
<input type="checkbox"/>	A. Coriza acre, con lagrimeo blando. B. Lagrimeo acre, con coriza blanda.	All-c. Euphr.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA ★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
<input type="checkbox"/> A. El dolor se agrava con el movimiento. B. El dolor mejora con el movimiento.	Bry.. Rhus tox.	
<input type="checkbox"/> A. La tos se agrava con bebidas frías. B. La tos mejora con bebidas frías.	Spong. Cupr-met.	
<input type="checkbox"/> A. El dolor de muelas mejora con el calor. B. El dolor de muelas mejora con agua fría.	Mg-p. Coff., Nat-s., Bism.	
<input type="checkbox"/> A. El cólico mejora al inclinarse hacia delante. B. El cólico mejora al inclinarse hacia atrás.	Coloc. Dios. v.	
<input type="checkbox"/> A. La tos se agrava al espirar. B. La tos se agrava al inspirar.	Acon. n., Caust. Spong.	
<input type="checkbox"/> A. Empieza a sudar tan pronto como cierra los ojos para dormir. B. Suda al levantarse.	Con., China off. Samb.	
<input type="checkbox"/> A. Estreñimiento durante la menstruación y antes de ella. B. Diarrea durante la menstruación y antes de ella.	Sil. Bov., Verat., Am-c.	
<input type="checkbox"/> A. El niño es bueno durante el día y se pone inquieto y llorón durante toda la noche. B. El niño llora durante todo el día y duerme toda la noche.	Psor., Jal. Lyc.	

SÍNTOMAS, Dirección de

<input type="checkbox"/> En diagonal.	Agar., Both.
<input type="checkbox"/> En diagonal; desde arriba, hacia la izquierda y, desde abajo, hacia la derecha.	Ant-tart., Stram.
<input type="checkbox"/> Diagonalmente; arriba, a la derecha, y abajo, a la izquierda.	Ambra-gr., Brom., Med., Phos., Sul- ac.,

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
<input type="checkbox"/> Hacia abajo.	Borx., Cat., Kalm., Lyc., Sanic.	
<input type="checkbox"/> Hacia fuera.	Kali-c. Sulphur	
<input type="checkbox"/> Hacia arriba.	Con., Benz., Eup-per., Led.	
<input type="checkbox"/> Primero, a la izquierda, y después, a la derecha.	Lach.	
<input type="checkbox"/> Mitad inferior del cuerpo.	Bac.	
<input type="checkbox"/> Los síntomas cambian de lado.	Lac-c.	

SÍNTOMAS PECULIARES

Ya hemos dado los síntomas peculiares de diferentes enfermedades, por lo que no vamos a repetirlos aquí.

<input type="checkbox"/> La cama resulta muy dura.	Arn. 30 o 200	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Se siente alivio cuando se piensa en los dolores.	Camph. 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Todos los síntomas empeoran después de tomar café.	Caust. 200 o 1M	Sem. (3)
<input type="checkbox"/> Ganas de comer carbón.	Cic. 30 o 200	C/. 6 h.
<input type="checkbox"/> Habla con rapidez y salta de tema.	Lach. 200 o 1M	Sem. (3)
<input type="checkbox"/> Sensación de tener vacíos la cabeza, el pecho o el abdomen.	Cocc. 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Movimiento como de ventilación en las aletas de la nariz.	Lyc. 30 o 200	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Se siente mejor cuando tiene estreñimiento.	Cal-c. 200	Sem. (3)
<input type="checkbox"/> Se siente mejor después de hacer un ejercicio violento; bajar, etc.	Sep. 200 o 1M	Sem. (3)
<input type="checkbox"/> Se siente siempre mejor inmediatamente ANTES de un ataque grave de cualquier enfermedad.	Psor. 200 o 1M	Quinc. (3)

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
----------	----------	--------------------------

SINUSITIS

(Ver también *Resfriado, catarro y coriza*)

La inflamación de los senos paranasales se llama sinusitis. Puede ser masilar, frontal o etmoidal, dependiendo de la situación de la lesión de senos concreta. Puede ser aguda o crónica.

<input type="checkbox"/> Sinusitis frontal del lado derecho; descarga densa, amarillenta; empeora con el frío, la humedad y el esfuerzo.	Penic. 30 o 200	C/. 6 h.
<input type="checkbox"/> Sinusitis después de una operación de maxilar.	Hekla.3X o 6X	C/. 4 h.
☆ En sinusitis agudas o crónicas; catarro con descarga coqurea.	Kali-bi. 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Dolor de cabeza muy fuerte; desde la raíz de la nariz, extendiéndose a la frente, con náuseas; mucosidad seca.	Nat-m. 30	C/. 4 h.
☆ El dolor empieza en la parte posterior de la cabeza y se fija encima de los ojos; empeora con la ventilación.	Sil. 1M	Sem. (6)
<input type="checkbox"/> Resfriado crónico con pérdida de olfato y flema amarilla verdosa; mejora en el frío y al aire libre.	Puls. 30 o 200	C/. 4 h.
● Remedio intercurrente.	Bac. 200 o 1M	Quinc. (3)
<input type="checkbox"/> Los dolores empeoran por la mañana temprano; aversión a bañarse.	Sulphur 200	Sem. (3)
Remedios bioquímicos	Kali-m. y Sil. 30X	C/. 4 h.

SORDERA

Pérdida de audición

☆ Repentina; debida a exposición a corrientes de aire seco y frío.	Acon. 200 o 1M	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Sólo al sonido de la voz.	Chen-a. 30 o 200	C/. 4 h.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
❑ Sordera únicamente al sonido de la voz humana.	Phos. 30 o 200	C/. 4 h.
❑ Sordera de obstrucción en lugares ruidosos; puede oír mejor cuando va en vehículo.	Graph. 30 o 200	C/. 6 h.
❖ Con bloqueo de las trompas de eustaquio.	Merc-d. 30 o 200	C/. 6 h.
❑ Debido a supresión de descargas o eccema.	Lob. 30 o 200	C/. 6 h.
❑ Después de la escarlatina; paciente hipersensible al frío, el tacto, etc.	Hep. 30 o 200 (alternando con Bell. 200)	C/. 6 h.
❑ Sensación de que los oídos están llenos; como si tratase de salir algo; mejora al frío y al aire libre.	Puls. 30 o 200	C/. 6 h.
❖ Debida a parálisis del nervio auditivo.	Caust. 30 o 200	C/. 6 h.
❑ Debida a una commoción o trastorno nervioso.	Mg-c. 30 o 200	C/. 4 h.
❑ Con los pies fríos y sudorosos; sensible al cambio del tiempo; paciente friolero.	Cal-c. 200 o 1M	Sem. (3)
● Remedio intercurrente.	Sulphur 200 o 1M	Sem. (3)
Remedios bioquímicos		
	Ferr-p. 6X, Kali-m. 6X y Sil. 30X	C/. 4 h.

SUDOR

Afecciones

❑ No suda nunca; heces duras y estreñimiento.	Alum. 200 o 0/5 o superior	C/. 6 h.
❑ Suda por las partes descubiertas; o por cualquier parte, excepto la cara; no suda por las partes cubiertas; huele a miel.	Thuy. 200 o 1M	C/. 10 m. (3)
❑ Sudor frío, grasiento; mientras come; las molestias aumentan con el sudor; abundante, sin alivio.	Merc. 30 o 200	C/. 4 h.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
❑ Abundante; después de enfermedades graves. Sudor que mejora.	Psor. 200 o 1M	C/. 4 h. (3)
❑ Sudor constante; molestias gástricas.	Colch. 30 o 200	C/. 4 h.
❑ Con mucha sed y debilidad; al estar cubierto.	China 6 o 30	C/. 4 h.
❑ Con sensación de que escuece la piel.	Cham. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
❑ Con vómitos.	Camph.a 30	C/. 4 h. (3)
❑ Con palpitaciones; sudor con sangre y dolor martilleante.	Lach. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
❑ Con picor al levantarse; suda, pero no puede soportar estar cubierto; sudor caliente en las manos y en los pies; empeora con el calor de la cama.	Led. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
❑ Ligero; en todo el cuerpo; con ansiedad y miedo.	Acon. nap. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
❑ No suda nunca, ni siquiera en verano.	Nux-m. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
❑ Sudor parcial; sudor frío en las manos, en el cuello y en el pecho.	Cal-p. 6X o 30	C/. 4 h.
❑ Sólo en las partes cubiertas.	Bell. 30	C/. 4 h.
❑ No puede soportar estar descubierto mientras suda.	Aeth. 30	C/. 4 h.
❑ Sudores fríos; en los pies y en las piernas; paciente hipersensible.	Hep. 30 o 200	C/. 4 h.
❑ Sudores fríos; en los brazos y en las manos; con hambre voraz.	Acid-phos. Ø o 30	C/. 4 h.
❑ Sudor frío y pegajoso.	Verat-v. 30	C/. 4 h.
❑ Calor en un solo lado de la cara; empeora con el calor.	Puls. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
❑ Sudor pegajoso.	Cann-i. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
❑ El sudor mancha las sábanas de amarillo; paciente tuberculoso.	Tub-k. 200	C/. 4 h. (3)

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
<input type="checkbox"/> Sudor por todo el cuerpo después de comer; sudor de las axilas.	Nit-ac. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
<input type="checkbox"/> Siente hambre cuando suda.	Sang. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
<input type="checkbox"/> El sudor mejora al caminar; mancha de amarillo.	Chel. Ø o 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Empeora al caminar al aire libre; olor a especias.	Rhod. 30 o 200	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> El sudor desaparece al hacer algún movimiento y empieza el calor; olor a cebollas.	Lyc. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
<input type="checkbox"/> Suda sólo cuando se levanta.	Sep. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
<input type="checkbox"/> Suda al oír música; le gusta la música.	Tarent. 200	C/. 4 h. (3)
<input type="checkbox"/> Sudor en la frente; quiere ventilación.	Carbo-veg. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
<input type="checkbox"/> Sudor en las piernas.	There-ch. Ø o 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Olor a ajo en las axilas.	Sulphur 30 o 200	C/. 4 h. (3)
<input type="checkbox"/> Sudor ofensivo; como carroña.	Pyr. 200	C/. 4 h. (3)
<input type="checkbox"/> En partes doloridas.	Kali-c. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
<input type="checkbox"/> Sudor que atrae las moscas.	Calad. s. 30	C/. 4 h. (3)
<input type="checkbox"/> Mancha las sábanas; en puntos, con rigidez.	Sel. 30	C/. 4 h. (3)

Los síntomas mencionados, si aparecen en cualquier enfermedad, ayudan mucho para seleccionar correctamente un remedio homeopático.

SUEÑO, Afecciones del

<input type="checkbox"/> Agravación de los síntomas durante el sueño o después.	Lach. 200 o 1M	C/. 10 m. (3)
<input type="checkbox"/> Agravación de los síntomas por pérdida del sueño; por amamantar niños, etc.	Cocc. 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Mejoría de los síntomas después de dormir bien.	Phos. 200	C/. 10 m. (3)

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
<u>SUEÑOS</u>		
<i>Aquí se dan los remedios importantes que sirven para curar muchas enfermedades, cuando se tiene repetidamente un sueño concreto.</i>		
❑ Con charcos de sangre.	Sol-t. 200 o 1M	Sem. (3)
❑ Con caídas desde altura; que está pesado; con infortunios.	Thuy. 200 o 1M	Sem. (3)
❑ Con animales negros; con bestias, oro, agradable.	Puls. 200 o 1M	Sem. (3)
❑ Que otra persona está en la cama contigo.	Petr. 200 o 1M	Sem. (3)
❑ Que estaba ciego; con un león.	Phys. 200 o 1M	Sem. (3)
❑ Con negocios; que vaga por el campo.	Rhus tox. 200 o 1M	Sem. (3)
❑ Con desacuerdos; hambre, esfuerzo mental intelectual.	Ign. 200 o 1M	Sem. (3)
❑ Miedo; que te sigue un perro, que hay un terremoto, con hechos pasados, luchas, que te persiguen, con ladrones.	Sil. 200 o 1M	Sem. (3)
❑ Que destacas en trabajo mental; con fuego.	Anac. 200 o 1M	Sem. (3)
❑ Con una fiesta; alegría.	Asaf. 200 o 1M	Sem. (3)
❑ Con la huida de un peligro.	Zinc-met. 200 o 1M	Sem. (3)
❑ Volar.	Apis. 200 o 1M	Sem. (3)
❑ Con cuchillos.	Lach. 200 o 1M	Sem. (3)
❑ Con matrimonio; agradable.	Op. 200 o 1M	Sem. (3)
❑ Pesadilla; desagradable.	Sulphur 200 o 1M	Sem. (3)
❑ Agradable.	Cal-c. 200 o 1M	Sem. (3)
❑ Con disputas.	Nux-v. 200 o 1M	Sem. (3)
❑ Con ladrones; atracadores; que está sediento.	Nat-m. 200 o 1M	Sem. (3)

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
<input type="checkbox"/> Serpientes; te muerden.	Bov. 200	Sem. (3)
<input type="checkbox"/> Con truenos y tormentas; con amenazas.	Ars. 200	Sem. (3)
<input type="checkbox"/> Que quieres hablar y no puedes.	Mg-c. 200	Sem. (3)
<input type="checkbox"/> Con agua.	Am-m. 200	Sem. (3)

SUICIDIO, Tendencia al

(Ver también *Tristeza*)

<input type="checkbox"/> Tendencia al suicidio; por ahorcamiento; después de medianoche.	Ars. 200 o 1M	C./4 h. (3)
<input type="checkbox"/> Ideas que llevan al suicidio; ira.	Carbo-veg. 200	C./4 h. (3)
<input type="checkbox"/> Deseos de suicidio; con un hacha.	Naja. 200 o 1M	C./4 h. (3)
<input type="checkbox"/> Disposición al suicidio; habla de suicidarse, pero le falta valor.	Nux-v. 200	C./4 h. (3)
<input type="checkbox"/> Predisposición al suicidio; por ahogamiento.	Rhus tox. 200 o 1M	C./4 h. (3)
<input type="checkbox"/> Predisposición al suicidio; por un desengaño amoroso; ganas de salir corriendo.	Hyos. 200 o 1M	C./4 h. (3)
<input type="checkbox"/> Predisposición al suicidio; con miedo a la muerte.	Nit-ac. 200 o 1M	C./4 h. (3)
<input type="checkbox"/> Predisposición al suicidio; echándose al fuego.	Hep. 200 o 1M	C./4 h. (3)
<input type="checkbox"/> Predisposición al suicidio; con un cuchillo, durante la menstruación, por huelga de hambre.	Merc. 200 o 1M	C./4 h. (3)
<input type="checkbox"/> Predisposición al suicidio; con una navaja de afeitar; miedo a la oscuridad.	Stram. 200 o 1M	C./4 h. (3)
<input type="checkbox"/> Predisposición al suicidio, por dolor; ganas de lanzarse desde la altura, desde una ventana.	Aur. 200 o 1M	C./4 h. (3)

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
<input type="checkbox"/> Predisposición al suicidio; mientras está sudando, por apuñalamiento.	Cal-c. 200 o 1M	C./4 h. (3)
<input type="checkbox"/> Predisposición al suicidio; por veneno.	Bell. 200 o 1M	C./4 h. (3)
<input type="checkbox"/> Predisposición al suicidio; por tristeza, por indignación, de un tiro.	Staph. 200 o 1M	C./4 h. (3)
<input type="checkbox"/> Predisposición al suicidio después de ver sangre o una navaja.	Alum. 200 o 1M	C./4 h. (3)
	Remedio bioquímico	
	Kali-p. 6X o 12X	C./4 h. (3)

TABAQUISMO

<input type="checkbox"/> Para reducir las ganas de fumar; mientras se usa de forma discontinua.	Tab. 30	C./ 4 h.
<input type="checkbox"/> Es adicto al tabaco; pero no soporta su olor.	Lob. Ø,	5-10 gt. C./ 4 h.
<input type="checkbox"/> Muchas ganas de fumar; angustia al respirar, como si tuviese asma.	Calad. s. 30	C./ 4 h.
<input type="checkbox"/> Para producir desagrado por el tabaco en los que tienen la costumbre de masticarlo.	Plan-m. 30	C./ 4 h.

TALASEMIA

Cualquier componente de un grupo de trastornos hereditarios del metabolismo de hemoglobina, en el que hay un detrimiento de la síntesis neta de una cadena de globina particular, sin cambio de la estructura de dicha cadena; existen varios tipos genéticos y el cuadro clínico correspondiente puede variar desde una anormalidad hematológica apenas detectable hasta una anemia grave y fatal. Los síndromes Lepore de hemoglobina son imposibles de distinguir clínicamente; pero las cadenas de globina-no- α están alteradas estructuralmente.

<input type="checkbox"/> Para aumentar el periodo de tiempo entre transfusiones de sangre sucesivas; anemia aplástica.	T.N.T. 200	Sem. (12)
--	-------------------	-----------

El tratamiento homeopático constitucional es útil en casos de Talasemia.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
----------	----------	--------------------------

TARTAMUDEO

Se llama tartamudeo a la mala pronunciación o la trasposición de algunas consonantes, en especial la *l*, la *r* y la *s*. Los casos crónicos son difíciles de curar.

<input type="checkbox"/> Remedio capital; pronuncia mal y traspone letras y sílabas; tartamudeo en palabras ricas en consonantes; ceceo; paresia de la lengua y los labios.	Caust. 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Temblor, pesadez y debilidad paralítica de la lengua; tartamudea al hablar.	Bell. 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> El paciente se irrita cuando no lo comprenden; tartamudea al hablar.	Bufo. 30	C/. 6 h.
<input type="checkbox"/> Dificultad para pronunciar algunas letras o palabras concretas; dificultad especial para pronunciar las palabras segundas y terceras.	Lach. 30 o 200	C/. 3 h.
<input type="checkbox"/> Habla rápido y tartamudeando.	Merc. 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Tartamudeo; habla con dificultad.	Sec-cor. 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Repite varias veces la primera sílaba de la primera palabra; después, habla con normalidad.	Spig. 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Tartamudeo, habla con dificultad y de un modo ininteligible.	Stram. 200	C/. 6 h.

TESTÍCULOS, Afecciones de los

<input checked="" type="checkbox"/> No descienden en los jóvenes.	Thyr. 1M	C/. 10 m. (3)
<input type="checkbox"/> Remedio comprobado para testículos que no descienden.	Aur-m-n. 3X	C/. 4 h. Durante 2-3 meses

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
----------	----------	--------------------------

TÉTANOS

- | | | |
|---|-------------------|--------------|
| ★ Despues de heridas punzantes; para prevenirlo. | Led. 200 o 1M | C/. ½ h. (3) |
| □ Tétanos con frío mortal. | Camph.a 200 o 1M | C/. ½ h. (3) |
| □ Tétanos con tirones en las comisuras de los labios. | Stry. 200 o 1M | C/. ½ h. (3) |
| □ Convulsiones tetánicas. | Verat-v. 200 o 1M | C/. ½ h. (3) |

Remedios bioquímicos

Kali-p. 3X y	C/. ½ h. (3)
Mg-p. 3X	

El tétanos es una enfermedad fatal. Una vez desarrollados los síntomas plenamente, es difícil de curar. Se debe hospitalizar al paciente que esté en estado agudo y darle el remedio indicado mientras tanto.

TIÑA

- | | | |
|---|----------------|---------------|
| ★ Remedio capital | Bac. 200 o 1M | Sem. (3) |
| ★ Cuando va acompañada de acidez, indigestión y arcadas; pérdida de apetito; aversión al baño. | Sulphur 200 | C/. 10 m. (3) |
| ★ Cuando el cuerpo y el sudor tienen un mal olor a ajos. | Tell. 30 | C/. 4 h. |
| ★ Tiña en la cara; puntos aislados en las partes superiores del cuerpo; mejora con el calor o con aplicaciones calientes. | Sep. 200 | Sem. (3) |
| ● Con picor fuerte; se rasca hasta sangrar, con lo que mejora; mal olor de las heridas. | Psor. 200 o 1M | Sem. (3) |
| □ Tiña en el cuero cabelludo; se cae el pelo a trozos; piel seca y áspera; inquietud; sed insaciable. | Ars. 30 | C/. 4 h. |
| □ Tiña con sudor fétido; empeora en tiempo cálido y húmedo. | Dulc. 30 o 200 | C/. 6 h. (3) |

Remedio bioquímico

Nat-m. 12X o 30X	C/. 4 h.
------------------	----------

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
----------	----------	--------------------------

Otros *remedios importantes*: Tub-k. k., Cal-c., Hyd., Chr-ac., Nat-c., y Clem., etc.

TIROTOXICOSIS

El estado producido por cantidades excesivas de la hormona tiroideas endógena o exógena.

<input type="checkbox"/> Pierde peso, aunque coma bien.	Iod. 30 o 200	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Pierde peso, aunque coma bien; empeora después de un trauma o un disgusto.	Nat-m. 30 o 200	C/. 4 h.
● Remedio intercurrente.	Thyr. 200 o 1M	Sem. (3)

Los remedios constitucionales, como **Cal-c.**, **Lach.** y **Puls.**, etc., son muy útiles.

TORCEDURAS

Llamamos torcedura a una lesión de una articulación, con posible ruptura de algunos ligamentos o tendones; pero sin dislocación ni fractura.

<input type="checkbox"/> Acompañada de magulladura dolorosa	Arn. 30 o 200	C/. 3 h.
★ Torceduras de articulaciones y tendones; el dolor empeora con el frío; mejora con el calor.	Rhus tox. 200	C/. 3 h.
<input type="checkbox"/> De muñecas y tobillos.	Ruta gr. 30 o 200	C/. 3 h.
Remedios bioquímicos		C/. 4 h.
Cal-p. 6X y Mg-p. 6X		

Para uso externo, utilizar: Arn. y Rhux tox. Ø en aceites vegetales, a 4:6.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
<u>TOS</u>		
(Ver también Ronquera, Jadeo, etc.)		
<input type="checkbox"/> Tos con sensación de tener polvo en la garganta.	Chel. 6 o 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Tos seca y violenta, debida a exposición a viento frío y seco; inquietud y miedo en la mente.	Acon. 30 o 200	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Oír música produce tos.	Ambra-gr. 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> La tos produce dolor en sitios distantes.	Caps. 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Flojedad en el cerebro, al toser.	Carbo-an. 30 o 200	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Tos seca durante el sueño; empeora con la ira.	Cham. 30 o 200	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Cada paroxismo de dolor excita tos nerviosa.	Hura. 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Cada vez que el paciente se queda quieto al caminar, tose; empeora al inhalar humo; se siente somnoliento después de cada ataque de tos	Ign. 30 o 200	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> La tos empeora en las bajadas, en comparación con las subidas; empeora de 4 a 8 pm.	Lyc. 30 o 200	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> La tos mejora al echarse.	Mang. 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Tos por la noche y diarrea durante el día.	Petr. 30	C/. 4 h.
★ Empeora con la inspiración y sólo durante el día.	Rumex. c. 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> La tos termina siempre en estornudo.	Seneg. 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Tos seguida de hipo.	Tri-p. 6 o 30	C/. 4 h.
★ Tos seca y dolorosa, con dolor de cabeza; empeora con el movimiento y el llanto. Sed excesiva; estreñimiento.	Bry. 30 o 200	C/. 4 h.
★ Tos con ronquera y pérdida de voz; ganas de beber agua muy fría.	Phos. 30 o 200	C/. 4 h.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
❖ Con flema viscosa y pegajosa; sinusitis crónica; dolor de oídos al toser.	Kali-bi. 30	C/. 4 h.
❖ La tos empeora de 2 a 4 a.m.	Kali-c. 30 o 200	C/. 4 h.
❖ La tos empeora en una habitación cálida; mejora al aire libre; pérdida de sed con sequedad de boca.	Puls. 30	C/. 4 h.
❖ Tos seca; silbidos como el de una sierra en un tablero de pino.	Spong. 30	C/. 4 h.
❖ Escape de orina al toser; mejora con frío y humedad; tos seca.	Caust. 30 o 200	C/. 4 h.
❖ La tos empeora después del primer sueño (1-2 horas después de dormir).	Aral. Ø o 30	C/. 4 h.
❖ Tos con náuseas constantes y jadeo; lengua limpia.	Ip. 30	C/. 4 h.
❖ Estertores en el pecho; dificultad para arrancar flemas; lengua con capa blanquecina; tos y bostezos alternativamente.	Ant-tart. 30	C/. ½ h. (3)
❑ Tos seca por la noche con espasmos; la cara se pone rojiza al toser, con congestión de la cabeza.	Bell. 30	C/. 4 h.
❖ Tos después de estar expuesto al aire frío; sensación de tener un cuerpo extraño en la garganta con dolor al tragar; paciente muy sensible al frío, al tacto, etc.	Hep. 30	C/. 4 h.
● Los síntomas cambian constantemente y los remedios seleccionados no tienen eficacia; se tiene frío a la mínima exposición.	Tub. 200	Sem. (3)
❑ Tos espasmódica con picor de laringe, con arcadas y vómitos de mucosa; después de una enfermedad inflamatoria como el sarampión, etc.	Carbo-veg. 30	C/. 4 h.
● Tos seca, dura; empeora por la noche; mejora durante el día y moviéndose lentamente.	Syph. 200 o 1M	Sem. (3)

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
<input type="checkbox"/> Flema amarillenta y de sabor dulce; debilidad y vacío en el pecho.	Stann.. 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> A los niños se les corta la respiración al toser; se les pone la cara morada intentando respirar. Tos rápida y corta, como un disparo.	Co-r. 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Tos después del sarampión o de suprimir una fiebre intermitente.	Eup-per. 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Tos con mucosa densa y viscosa; empeora en una habitación cálida y tomando bebidas calientes. Se produce cuando se está en agua fría; pero se alivia con bebidas frías y lavándose la cara con agua fría.	Coc-c. 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Tos seca, con ganas de tomar bebidas calientes y saladas.	Lac-c. 30 o 200	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> La tos mejora fumando; respiración entrecortada después del ataque; tose cuando llora o después.	Tarent. 30 o 200	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Tos catarral; pérdida involuntaria de orina; estornudos.	Squill. 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Tos seca; empeora cuando entra en la laringe aire, humo de tabaco o niebla y al hablar.	Menth. 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Tos explosiva; persistente y recurrente después de la gripe.	Stry. 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Tos durante el embarazo; espasmódica.	Vib. 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Tos seca, necesidad de encorvarse para toser; no hay expectoración con la tos.	Kali-m. 6X o 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Muchos estertores mucosos al toser; empeora con el baño y por la mañana.	Sulphur 200	Sem. (3)
Remedio bioquímico	Bio-comb. No.6	C/. 4 h.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
----------	----------	--------------------------

TOSFERINA

(Ver también *Tos*)

- | | | |
|--|-----------------------|--------------|
| ● Para iniciar el tratamiento; remedio intercurrente | Syph. 1M | 1 dosis |
| ✗ Remedio preventivo (dar una dosis después de <i>Syph. 1M</i> , en casos agudos) | Pert. 200 o 1M | 1 dosis |
| ❑ Tosferina con vómitos de mucosidad resistente y correosa; empeora con calor y por la noche; mejora tomando bebidas frías y en una habitación fría. | Coc-c. 30 | C/. 4 h. |
| ❑ Cuando se empieza a comer; tos y vómitos después de tomar unas pocas cucharadas. | Bry. 30 o 200 | C/. 4 h. |
| ✗ Remedio capital (ataques violentos repentinos). | Dros. Ø o 6 | C/. 4 h. (3) |
| ❑ En niños pequeños; empeora a la mínima respiración, aire o niebla. | Menth. 30 | C/. 3 h. |
| ❑ Con sudor frío y viscoso intermitente; espasmódica. | Cupr-ar. 30 | C/. 3 h. |
| ✗ Con sequedad de garganta; dolor de estómago y lágrimas antes del golpe de tos; empeora con el frío. | Bell. 30 | C/. 4 h. |

Remedios bioquímicos **Mg-p. 6X y Cal-p.**

TRACOMA

Conjuntivitis granular
(Ver también *Conjuntivitis*)

Se conoce como conjuntivitis granular. Es muy contagioso y está producido por varios virus.

- | | | |
|---|-------------------|---------------|
| ❑ Descarga acre de los ojos; empeora al aire libre; los párpados se pegan por la noche. | Cal-c. 200 | C/. 10 m. (3) |
|---|-------------------|---------------|

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
<input type="checkbox"/> Grietas en las comisuras de los párpados, lagrimeo abundante; estreñimiento.	Graph. 30 o 200	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Con ulceración de la córnea y de los párpados; paciente hipersensible al aire libre y al frío. Catarro crónico de la conjuntiva.	Hep. 30 o 200	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Párpados granulados, descarga amarillenta y viscosa; empeora por la tarde y por la noche.	Kali-bi. 30 o 200	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Con descarga blanda, amarilla y viscosa; mejora al aire libre frío; empeora con el calor.	Puls. 30 o 200	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Conjuntivitis catarral; empeora en las comisuras interiores.	Zinc-met. 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Conjuntivitis; catarral y purulenta; párpados granulares.	Cupr-s. 30	C/. 4 h.
Remedios bioquímicos		
	Ferr-p. 6X y Kali-m. 6X	C/. 4 h.

TRASTORNOS MENTALES

(Ver también *Demencia* y *Manía*)

- No ríe ni sonríe nunca; cambios de humor. Tendencias suicidas después de ver un cuchillo o sangre. **Alum. 200 o 1M** C/. 10 m. (3)
- Se siente feliz con la desgracia de los demás; incordiante; muy sensible a los desórdenes; quiere las cosas en orden. **Ars. 200 o 1M** C/. 10 m. (3)
- La música alegre pone triste al paciente; molestias por una lesión de cabeza. **Nat-s. 200 o 1M.** C/. 10 m. (3)
- Niño que llora sin lágrimas; estallidos de pasión violentos; se deleita con temas sexuales; aspecto de culpabilidad. **Staph. 200 o 1M** C/. 10 m. (3)

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
<input type="checkbox"/> La música le hace llorar y temblar; siente como si su alma y su cuerpo estuviesen separados.	Thuy. 200 o 1M	C/. 10 m. (3)
<input type="checkbox"/> Irritable; habla siempre de negocios.	Bry. 200 o 1M	C/. 10 m. (3)
<input type="checkbox"/> Apacible, condescendiente, lloroso; fácil de desanimar; melancolía religiosa; pérdida de las sed; le gusta el aire libre y frío.	Puls. 200 o 1M	C/. 10 m. (3)
<input type="checkbox"/> Cambios continuos de humor; suspira y solloza; le afectan las decepciones.	Ign. 1M o 10M	C/. 10 m. (3)
<input type="checkbox"/> Falta de afecto natural; aversión a los seres queridos, incluso a su cónyuge y sus hijos.	Sep. 200 o 1M	C/. 10 m. (3)
<input type="checkbox"/> Ideas suicidas sin amor a la vida; sensación de que nada vale la pena.	Aur. 200 o 1M	C/. 10 m. (3)
<input type="checkbox"/> Alternancia rápida del estado mental; risa histérica y manías agradables.	Croc. 200 o 1M	C/. 10 m. (3)
<input type="checkbox"/> Ansiedad y complejo de inferioridad; miedo a estar solo; pronuncia o escribe mal las palabras.	Lyc. 200 o 1M	C/. 10 m. (3)
<input type="checkbox"/> Manía por supresión de una neuralgia; sueña con peligros inminentes.	Actea-rac. 200 o 1M	C/. 10 m. (3)
● Remedio intercurrente	Sulphur 200 o 1M	<i>Quinc.</i> (3)
	Remedio bioquímico	Kali-p. 6X
		C/. 4 h.

TRISTEZA

(Ver también *Suicidio*)

<input type="checkbox"/> Tristeza con tendencia al llanto, por un disgusto.	Caust. 200 o 1M	C/. 3 h. (3)
<input type="checkbox"/> Tristeza; por la mañana, después de dormir, después de caminar; al sol.	Lach. 200 o 1M	C/. 3 h. (3)

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
❑ Tristeza; en el crepúsculo y por la noche, en las oscuridad, sin ninguna razón.	Phos. 200 o 1M	C/. 3 h. (3)
❑ Tristeza; por la tarde, con ideas suicidas.	Aur. 200 o 1M	C/. 3 h. (3)
❑ Tristeza; en la cama, por la noche, después de un disgusto, cuando hace calor, no puede llorar.	Nat-m. 200 o 1M	C/. 3 h. (3)
❑ Tristeza; cuando está solo, con inquietud.	Ars. 200 o 1M	C/. 3 h. (3)
❑ Tristeza; por ira, en una habitación caliente.	Puls. 200 o 1M	C/. 3 h. (3)
❑ Tristeza; después de comer; irritabilidad.	Nux-v. 200 o 1M	C/. 3 h. (3)
❑ Tristeza; por supresión de erupciones, por la mañana.	Sulphur 200 o 1M	C/. 3 h. (3)
❑ Tristeza; cuando está en casa, durante el descanso.	Rhus tox. 200 o 1M	C/. 3 h. (3)
❑ Tristeza; con impotencia, melancolía.	Kali-br. 200 o 1M	C/. 3 h. (3)
❑ Tristeza; por picores; desesperación.	Psor. 200 o 1M	C/. 3 h. (3)
❑ Tristeza; por un desengaño amoroso; después de mortificación, con suspiros.	Ign. 200 o 1M	C/. 3 h. (3)
❑ Tristeza; por masturbación; pérdida de fluidos vitales.	Acid-phos. 30 o 200C	C/. 3 h. (3)
❑ Tristeza; por retrasos de la menstruación, agotamiento nervioso.	Kali-p. 6X o 30	C/. 3 h. (3)
❑ Tristeza; periódica cada catorce días; mientras se suda; falta de interés.	Con. 200 o 1M	C/. 3 h. (3)
❑ Tristeza; durante el embarazo; complejo de superioridad.	Plat. 200 o 1M	C/. 4 h. (3)
	Remedio bioquímico	Nat-m. 30X
		C/. 4 h.

TROMBOSIS CORONARIA

Un trombo es un coágulo, formado en un vaso sanguíneo o en una de las cavidades del corazón, compuesto por constituyentes de la sangre. Puede cerrar un vaso o estar pegado a la pared de un vaso o del corazón, obstruyendo la circulación.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
----------	----------	--------------------------

Buscar ayuda médica inmediatamente y, mientras tanto, puede darse alguno de los remedios siguientes, dependiendo de los síntomas.

- | | | |
|---|--------------------|--------------|
| <input type="checkbox"/> Tensión y contracción en el pecho, dolores parecidos a los de contusión. | Arn. 200 | C/. ½ h. (3) |
| <input type="checkbox"/> Constricción en la zona del corazón, como si éste estuviese oprimido por una banda apretada. | Cat. Ø o 30 | C/. ½ h. (6) |
| <input type="checkbox"/> Con entumecimiento del brazo izquierdo y parálisis del mismo lado. No se puede soportar ropa estrecha en el cuello ni en la cintura. | Lach. 200 | C/. ½ h. (3) |
| <input type="checkbox"/> Trombosis coronaria debida a los efectos negativos de la ira. | Coloc. 200 | C/. ½ h. (3) |

Remedios bioquímicos

Mg-p. 6X,	C/. ½ h.
Ferr-p. 6X y Kali-m. 6X	

Otros remedios útiles: Am-c., Apis., Bar-c., Bell., Both., Cal-ar., Kali-m., Lil-t., Lyc., Hyos., Med., Merc., Op., Phos., Sec-cor., Sulphur, etc., son también remedios útiles.

TUBERCULOSIS.

Es una enfermedad producida por la presencia de bacilos del *Micobacterium Tuberculosis*. Puede afectar a cualquier tejido u órgano del cuerpo. Su asiento más común es en los pulmones. Los síntomas generales son los mismos de la septicemia: fiebreéctica, sudor y enflaquecimiento. Es una enfermedad que puede ser rápidamente mortal, debido a la diseminación general de los bacilos del tubérculo por la sangre, produciendo la formación de millares de tubérculos en los diversos órganos y tejidos y presentando los síntomas de una toxemia profunda.

En Homeopatía, el tratamiento de la tuberculosis se basa en la ley de los semejantes, que consiste en aplicar drogas que reducen la resistencia a la tuberculosis de las personas normales, si se dan en dosis ordinarias durante mucho tiempo. La debilidad de esa resistencia se revela en algunas características constitucionales, mucho antes de que se desarrolle realmente la enfermedad. Las personas tuberculosas se ven afectadas por el clima húmedo, el esfuerzo excesivo, la pérdida de fluidos vitales y otros muchos factores.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
□ Pleuresía, punzadas dolorosas y edema por encima de los párpados; el paciente se siente peor a las 3 de la madrugada.	Kali-c. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
□ Hemotisis; ganas de tomar bebidas frías o heladas.	Phos. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
□ Pérdida de peso y enflaquecimiento; aunque se coma bien.	Iod. 30 o 200	C/. 6 h.
□ Olor acre del aliento; al toser, por un absceso de los pulmones.	Caps. 30	C/. 4 h.
	Remedio bioquímicos	
	Kali-p. 6X, Nat-p. 6X y Mg-p. 6X	C/. 4 h.

Otros remedios importantes: Acal., Ars-i., Bac., Brom., Bar-c., Cal-c., Dros., Sil., Sep., Sulphur, Symph., Merc., Ther. y Tub-k., etc.

TUMORES

□ Vómitos con náuseas en casos de tumores intracraneales.	Ferr-met. 30	C/. 4 h.
□ Tumores fibrosos de los párpados; fibromas uterinos.	Teucr. 30	C/. 4 h.
□ Tumor de cráneo, con materia mórbida; cerca del cuello.	Bar-c. 30 o 200	C/. 4 h.
□ Tumor con dolor insoportable.	Stram. 200 o 1M	C/. 6 h.
□ Nódulos, dolorosos o no, debajo de la piel por todo el cuerpo; dolor lacerante en el tumor.	Con. 200 o 1M	Sem. (3)
□ Tumor maligno de útero; sangra con facilidad.	Crot. 200 o 1M	Sem. (3)
□ Tumor de rodilla.	Cal-f. 12X o 30	C/. 4 h.
□ Fibroma de útero.	Ust. Ø o 30	C/. 4 h.
□ Tumor glandular donde no suele haber glándulas.	Lap-a. 30	C/. 4 h.
□ Tumor duro de piel.	Mang. 30	C/. 4 h.
□ Tumor de frente; tibia y otros sitios.	Still. Ø o 30	C/. 4 h.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
❑ Tumor fibroso de mama.	Thyr. 200 o 1M	Sem. (3)
❑ Tumor abdominal.	Kali-i. 30 o 200	C/. 6 h.
Remedios bioquímicos		
	Cal-p. 6X, Cal-f. 12X y Sil. 30X	C/. 4 h.

ÚLCERAS

(Ver también *Apostemas* y *diviesos*)

❑ Úlceras fistulosas; con aureola inflamada roja y dura; descarga más sangre que pus, de mal olor.	Caust. 30	C/. 4 h.
❑ Degeneración gangrenosa de las úlceras.	Kreos. 30	C/. 4 h.
❑ Úlceras gástricas con hemotisis.	Orni. Ø o 30	C/. 4 h.
❑ Úlceras sifilíticas; empeoran en tiempo frío.	Petr. 30 o 200	C/. 4 h.
❑ Úlceras muy rojas; úlceras oscuras y brillantes.	Lac-c. 30 o 200	C/. 4 h.
❑ Úlcera amarillenta, en lo profundo de las amígdalas; localizada; úlcera antigua de pierna; de muñeca.	Kali-bi. 30 o 200	C/. 4 h.
❖ De color púrpura; con rodales negruzcos; con tejidos débiles relajados; capilaridades estancadas.	Carbo-veg. 30 o 200	C/. 4 h.
❖ Úlcera oscura, pútrida; ulceración de superficie mucosa.	Bapt. 30	C/. 4 h.
❑ Úlcera con costras gruesas y amarillentas; con vesículas alrededor.	Mez. 30	C/. 4 h.
● Úlcera con sensación de frío; cuando se ha seguido un tratamiento alopático prolongado y no responde a la medicación indicada.	Merc. 1M o superior	1 dosis
❖ Úlcera sin ninguna sensación; por ingestión de opio.	Op. 30 o 200	C/. 4 h.
❑ La úlcera mejora con frío; empeora con el calor.	Led. 30 o 200	C/. 4 h.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
◻ Para ayudar a la descarga y curar la úlcera del paladar blando; sensible al tacto, al frío, etc.	Hep. 30	C/. 4 h.
☆ Úlcera muy sensible, de color púrpura; no puede soportar ni el contacto de la ropa.	Lach. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
◻ Úlcera interna; por abuso del mercurio.	Arg. Nit. 30	C/. 4 h.
☆ Úlcera bucal; aftas; lesiones leves que supuran y se ulceran.	Borx. 30	C/. 4 h.
◻ Úlcera crónica de estómago; úlceras sucias de la piel.	Brom. 30	C/. 4 h.
◻ Úlcera de pulmones; la tos o los problemas respiratorios empeoran de 3 a 4 de la madrugada.	Kali-c. 30	C/. 6 h.
◻ Úlcera de piernas; por las uñas y los talones.	Sil. 12x o 30	C/. 4 h.
◻ Úlcera de membranas mucosas; de estómago e intestinos.	Sal-ac. 30	C/. 4 h.
◻ Úlcera de cara y labios; debilidad excesiva.	Con. 200	C/. 6 h.
◻ Úlcera muy sensible; úlcera con bordes duros que resaltan; sangra con facilidad.	Asaf. 30	C/. 4 h.

ÚLCERAS BUCALES

(Ver también *Aftas*)

☆ Úlceras pequeñas de tipo aftoso; sangran si se tocan; boca caliente y delicada.	Borx. 6 o 30	C/. 4 h.
☆ Salivación excesiva; encías esponjosas que sangran con facilidad; sabor de boca dulce metálico; sed con la boca húmeda.	Merc. 6 o 30	C/. 4 h.
☆ Aftas con aflujo de sangre hacia la cabeza.	Bell. 30	C/. 4 h.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
<input type="checkbox"/> Ampollas pequeñas o úlceras de extraordinaria sensibilidad; mejoran teniendo fluidos fríos en la boca.	Nat-s. 12X o 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Las úlceras tienen unas puntas finas como alfileres; saliva fuerte y maloliente.	Nit-ac. 30	C/. 4 h.
Remedios bioquímicos		Ferr-p. 6X, Kali-m. 6X C/. 4 h. y Nat-p. 6X

ÚLCERAS PÉPTICAS

Incluidas la gástrica y la de duodeno

La ulceración gastro-intestinal se debe a la reacción bioquímica del ácido hidroclorhídrico y la pepsina. Es más frecuente en personas que llevan una vida agitada y en los fumadores. La complicación empeora después de tomar aspirina y drogas alopatías fuertes. El síntoma principal es el dolor en el epigastrio. La repetición frecuente del remedio es peligrosa en los casos crónicos.

<input type="checkbox"/> Sed extrema; con irritabilidad extrema del estómago; dolor muy fuerte, con calor ardiente; dolor con ansiedad insopportable.	Ars. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
<input type="checkbox"/> Punzadas, dolor ulceroso debajo de las costillas cortas del lado izquierdo; empeora con el tacto y con una inspiración profunda; Sensación de agarrar, con ardor y calor en el epigastrio; muchas ganas de tomar dulces, lo que agrava las molestias.	Arg. Nit. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
<input type="checkbox"/> Sensibilidad en la región del epigastrio; acidez cuando se está echado boca arriba y caminando; ardor; no apetece ningún tipo de comida; dispepsia ácida con ardor de corazón; ardor de estómago que se extiende a la espalda con distensión excesiva por gases.	Carbo-veg. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
<input type="checkbox"/> Estómago y abdomen distendidos enormemente y tensos después de cada comida. Ruidos en el abdomen después de comer, con molestias y heces sueltas.	Nit-ac. 30 o 200	C/. 6 h. (3)

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
❑ Ganas de tomar comidas ácidas y cargadas de especias; eructos vacíos; vómitos como café molido, mezclados con una materia oscura y ácida; empeora con tiempo cálido.	Phos. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
❑ Ulceración gástrica con hemorragia; el dolor empeora cuando los alimentos pasan el píloro. Sensación dolorosa de pesadez en el epigastrio.	Orni. Ø,	5-7 gt. C/. 4 h.
Remedio bioquímico	Nat-p. 6X	C/. 4 h.

Otros remedios importantes: Colch., Staph., Syph., Pyr. y demás remedios constitucionales. Las mezclas alcalinas, como la leche, etc. son útiles para neutralizar el ácido. En casos complicados, es preferible la opinión de un experto. El tratamiento debe estar dirigido exclusivamente por un médico de experiencia.

UÑAS

❑ Uñas desiguales, onduladas y con puntos.	Cal-c. 200 o 1M	Sem. (6)
☆ Las uñas de las manos y de los pies se ponen gruesas, quebradizas, negras y se caen.	Graph. 30 o 200	C/. 6 h.
❑ Las uñas crecen con mucha rapidez; deformes, desiguales, quebradizas y se rompen con facilidad.	Fl-ac. 30 o 200	C/. 6 h.
☆ Las uñas se ponen como si fuesen de cera; torcidas, blandas y quebradizas.	Thuy. 200 o 1M	Sem. (6)
❑ Uñas arrugadas y quebradizas.	Ambra-gr. 30 o 200	C/. 6 h.
❑ Uñas descoloridas y torcidas.	Nat-ars. 30 o 200	C/. 6 h.
❑ Uñas flojas; doloridas y muy sensibles.	Hep. 30 o 200	C/. 4 h.
❑ La raíz de las uñas está dolorida; debilidad general y anemia.	Cal-p. 6X o 30	C/. 4 h.
❑ Uñas y pelo enfermizos; sensible al mínimo tacto.	Mg-c. 30	C/. 6 h.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
❖ Las uñas de las manos están doloridas, con hinchazón y dolor de las falanges.	Myris. 3X o 6	C/. 3 h.
❑ Uñas dolorosas; crecen hacia la carne.	Mag-aust. 30	C/. 6 h.
❖ Las uñas crecen con lentitud; mejoran con clima húmedo.	Caust. 30 o 200	C/. 6 h.
❑ Uñas frías y azules; dolorosas, sabañones en los pies.	Nit-ac. 30 o 200	C/. 6 h.
❖ Uñas arruinadas; puntos blancos en las uñas, uñas incrustadas en los pies; afecciones de las uñas de los dedos de las manos.	Sil. 12X o 30	C/. 6 h.
❑ Caída de las uñas; erupción vesicular entre los dedos de las manos y de los pies.	Hell. 30 o 200	C/. 6 h.
Remedios bioquímicos		Nat-m. 12X y Sil. 30X C/. 4 h.

URTICARIA

Es una erupción o una irritación picante, normalmente de origen sintomático. Puede deberse a un estado de hipersensibilidad a los alimentos o drogas, focos de infección, agentes físicos (calor, frío, luz, fricción) o estímulos psíquicos. Se da en personas hipersensibles o alérgicas. Es esencial el tratamiento constitucional.

❖ Despues de tomar alimentos fuertes, grasos, carne, etc.; mejora al aire libre frío; pérdida de sed.	Puls. 30 o 200	C/. 3 h.
❑ Despues de tomar alimentos conservados en lata; frutas ácidas, helados, frutas pasadas de maduración; mejora con el calor.	Ars. 30 o 200	C/. 3 h.
❑ Despues de tomar fresas.	Ox-ac. 30	C/. 3 h.
❑ Despues de tomar hongos.	Absin. 30	C/. 3 h.
❖ Con ardor fuerte e hinchazón; despues de comer cangrejos; sin sed; orina con frecuencia.	Urt-u. Ø o 30	C/. 3 h.
❑ Despues de comer pescado en mal estado.	Carbo-veg. 30 o 200	C/. 3 h.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
□ Despues de tomar leche.	Sep. 30 o 200	C/. 3 h.
□ Despues de tomar Aspirina, Anacin, etc.	Antip. 30	C/. 3 h.
□ Despues de tomar Quinina; exceso de sal o despues de una represión de la malaria.	Nat-m. 30 o 200	C/. 3 h.
□ Despues de picar un mosquito; mejora lavando la zona con agua helada.	Led. 30 o 200	C/. 3 h.
□ Despues de desnudarse, en tiempo frío; mejora con el calor.	Rumex. 30 o 200	C/. 3 h.
□ Por cambio de tiempo, exposición al tiempo frío y húmedo; picor fuerte al desnudarse.	Dulc. 30 o 200	C/. 4 h.
□ Repentina; despues de exponerse a una corriente fría de aire seco y sed con ansiedad.	Acon. 30 o 200	C/. 2 h.
□ Despues del baño; picor al entrar en calor, perturba el sueño.	Bov. 30	C/. 2 h.
☆ Todas las primaveras; mejora con el calor. Se agrava al quitarse la ropa.	Rhus tox. 30 o 200	C/. 3 h.
☆ Con hinchazón fuerte y repentina y con ardor; empeora con el calor; pérdida de sed.	Apis. 30 o 200	C/. 3 h.
● Al principio del invierno; mal olor del cuerpo, incluso despues de bañarse.	Psor. 200 o 1M	C/. 10 m. (3)
□ Por catarro gástrico; lengua con una capa densa blanquecina; empeora con el calor.	Ant-c. 200	C/. 10 m. (3)
☆ Urticaria crónica; sarpullido de todo el cuerpo con picor.	Astac. 30	C/. 3 h.
□ Despues de tomar bebidas alcohólicas; paciente afable y friolero; se encuentra mejor con el calor.	Nux-v. 30 o 200	C/. 3 h.
□ Urticaria sin picor.	Uva. Ø o 30	C/. 4 h.
□ Por represión de fiebre intermitente.	Elat. 30	C/. 3 h.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
<input type="checkbox"/> Sarpullido de urticaria con ardor; fiebre; empeora con el calor y con ropa de lana; mejora con el frío.	Hygroph-s. 30	C/. 4 h.
Remedios bioquímicos.	Kali-m. 6X y Nat-m. 6X	C/. 4 h.

ÚTERO

(Ver también *Prolapso de útero*)

<input type="checkbox"/> Ardor en el útero con menorragia.	There-ch. Ø o 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Calambres en el útero; dolores como de parto; convulsiones histéricas por irritación uterina.	Vib. 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Ardor doloroso en el útero; molestias después de dilatación y curiterapia (D & C).	Arn. 30 o 200	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Congestión de útero; contracciones débiles; aborto habitual por debilidad uterina.	Caul. 30 o 200	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Apretones y pellizcos en el útero; hemorragia uterina; intolerancia al dolor.	Cham. 30 o 200	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Hemorragia de útero, de color vivo y correosa.	Lac-c. 200	C/. 4 h. (3)
<input type="checkbox"/> Hemorragia de útero, oscura y correosa.	Croc. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
<input type="checkbox"/> Hemorragias del útero abundantes, claras, en grumos, con náuseas y lengua limpia.	Ip. Ø o 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Dolores fuertes neurálgicos del útero, empeoran con el contacto o con una sacudida; desplazamiento del útero.	Lil-t. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
<input type="checkbox"/> Vulva dolorida y con picores; picor fuerte del útero, con excesivo apetito sexual.	Plat. 200 o 1M	C/. 4 h. (3)
<input type="checkbox"/> Cáncer; con hemorragias uterinas abundantes.	Iod. 30 o 200	C/. 4 h.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
❑ Tumores uterinos fibrosos; efectos negativos de reprimir el deseo sexual; úlcera en el cuello del útero; hemorragia después del coito.	Kreos. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
❑ Pólipos y debilidad en el útero; prolapso debido a debilidad.	Cal-p. 12X o 30	C/. 4 h.
❑ Siente como si se le saliese todo por el útero; hemorragias a borbotones y calientes.	Bell. 30 o 200	C/. 4 h.
❑ Epilepsia uterina e hysteria; se siente mejor después de empezar el flujo del útero.	Cimic. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
❑ Para expulsar lo que queda en el útero después de dilatación y curetaje (D & C) en post-operatorios.	Pyr. 200 o 1M	C/. 4 h. (3)
❑ Trastornos uterinos de doncellas; solteronas.	Con. 200 o 1M	C/. 4 h. (3)

VACUNAS, Afecciones producidas por

● Remedio capital; efectos nocivos de las vacunas.	Thuy. 200 o 1M	C/. 10 m. (3)
❑ Cuando falla Thuy. para cuidar los efectos nocivos de la vacuna.	Ant-tart. 200	1 dosis
☆ Abscesos o convulsiones, después de la vacuna.	Sil. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
❑ Hinchazón de todo el cuerpo después de la vacuna; pérdida de sed.	Apis. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
☆ Fiebre con inflamación de la piel de la zona donde se puso la vacuna.	Bell. 30	C/. 4 h. (3)
❑ Piel seca y áspera, incluso años después de la vacunación.	Maland. 200	Sem. (6)
❑ Eccema y erupciones con picor después de la vacunación.	Mez. 30	C/. 4 h.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
<input type="checkbox"/> Para aliviar erupciones y picor de la cara y otras partes, después de la vacunación.	Sars. 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Queloides o formación de costras después de la vacunación.	Vac. 200	Sem. (6)

VAHÍDOS

(Ver también *Vértigo*)

<input type="checkbox"/> Vahídos al ver correr el agua.	Ferr-p. 6X o 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Por agotamiento y debilidad nerviosa.	Kali-p. 6X o 30	C/. 4 h.

VARIACIONES TÉRMICAS

Efectos del calor y el frío

<input type="checkbox"/> Siente mucho frío cada vez que bebe.	Caps. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
<input type="checkbox"/> Aunque esté frío el cuerpo, quiere ventilación.	Carbo-veg. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
<input type="checkbox"/> Siente frío, pero mejora con él; el paciente se siente mejor metiendo los pies en agua fría; empeora cuando está caliente en la cama.	Led. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
<input type="checkbox"/> Se encuentra peor con el frío.	Sep. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
<input type="checkbox"/> Siente mucho frío al mínimo movimiento; aunque haga frío, no lo siente; mejora con el calor.	Nux-v. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
<input type="checkbox"/> El paciente se siente peor en una corriente de aire.	Bell. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
<input type="checkbox"/> Desea estar destapado; ardor en las plantas de los pies y en las palmas de las manos.	Sulphur 30 o 200	C/. 4 h. (3)

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
<input type="checkbox"/> Sensación de ardor; se alivia con el calor; se encuentra mejor cuando está caliente en la cama.	Ars. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
<input type="checkbox"/> Siente muchísimo calor; sin calor interno.	Ign. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
<input type="checkbox"/> El paciente no puede soportar el calor; sol.	Glon. 30 o 200	C/. 4 h. (3)

VEJIGA Y URETRA

(Ver también *Cistitis*)

<input type="checkbox"/> Dolor ardiente. La orina sale gota o gota.	Canth. 30	C/. 3 h.
<input type="checkbox"/> Dolor ardiente; empeora con el descanso; es mejor pasear al aire libre.	There-ch. Ø	7-8 gt. C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Dolor ardiente en la uretra al orinar; mucha sed: se bebe con frecuencia en pocas cantidades.	Ars. 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Parálisis de la vejiga; escape de orina al toser o estornudar.	Caust. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
<input type="checkbox"/> Debilidad en la vejiga: falta de fuerza para expulsar.	Op. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
<input type="checkbox"/> Deseo constante de orinar; orina lechosa, escasa y caliente.	Lil-t. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
<input type="checkbox"/> Sensación de tener la vejiga llena; sensación constante de no poder contenerse.	Sep. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
<input type="checkbox"/> Inflamación de la vejiga con mucha dificultad para orinar.	Con. 200	C/. 10 m. (3)
<input type="checkbox"/> Dolor en la vejiga con rigidez de los músculos cervicales. Rigidez de espalda; se alivia el dolor echado boca arriba.	Stry. 3X o 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Prolapso de vejiga.	Pyrus. 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Hematuria, aunque no haya razón patológica; debilidad de vejiga.	Bell. 30	C/. 4 h.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
❑ Hemorragia de la vejiga.	Rhus-a. 30	C/. 4 h.
❑ Piedras en la vejiga, con dolor agudo en las fosas renales.	Calc-ren. 30 e Hydrang. Ø, alternando	C/. 3 h.
Remedio bioquímico Dolor debido a hemorragia de la uretra o la vejiga.	Ferr-p. 3X	C/. 4 h.

VENAS VARICOSAS

★ Remedio capital; incluso para úlceras varicosas.	Ham. 30	C/. 4 h.
❑ Cuando las partes afectadas están amoratadas y doloridas; punzadas dolorosas; mejora al aire libre y frío.	Puls. 30	C/. 4 h.
❑ Con sensación de ardor como de fuego; empeora a media-noche; mejora con el calor.	Ars. 30	C/. 4 h.
❑ Casos crónicos; empeora con el calor; mejora con el frío y al caminar.	Fl-ac. 30	C/. 4 h.

VERRUGAS

❑ Verrugas en el prepucio.	Cinnb. 30	C/. 4 h.
❑ Remedio capital para las verrugas.	Cal-cn. 3X	C/. 4 h.
❑ Callosas; sólidas, lisas o rugosas; especialmente en la cara, la punta de la nariz y los dedos.	Caust. 200	C/. 6 h.
❑ Verrugas pequeñas alrededor del ano.	Aur-m. 3X	C/. 4 h.
● Cuarteadas; como una coliflor, húmeda, en racimos; sangran con facilidad al mínimo roce.	Thuy. 200	C/. 6 h.
❑ Blanda; esponjosa, callosa; sangra con facilidad; sensación de picor y de punzadas, olor a queso rancio.	Cal-c. 200 o 1M	C/. 6 h.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
<input type="checkbox"/> Secas; supurantes; sensación de punzadas.	Kali-sil. 30	C/. 4 h.
● Duras; dolorosas; el paciente siente hambre de 9 a 10 de la mañana; miedo al baño.	Sulphur 200 o 1M	C/. 10 m. (3)
<input type="checkbox"/> En el reverso de las manos; grandes, lisas o carnosas, en la palma de la mano.	Dulc. 200 o 1M	C/. 10 m. (3)
<input type="checkbox"/> Cubriendo toda la cara; granos en todo el cuerpo.	Mg-s. 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Callos con decoloración amarillenta y verrugas; especialmente en las manos; crecimientos epiteliales.	Nat-c. 30 o 200	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Verrugas dolorosas en las palmas de las manos; callos de color amarillento.	Ferr-pic. 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Verrugas en forma de higo; pedunculadas; secas, como una coliflor; origen sifilítico.	Staph. 200 o 1M	C/. 6 h.
<input type="checkbox"/> Grandes, dentadas, condilomatosas, pedunculadas; sangran fácilmente; dolorosas.	Nit-ac. 200 o 1M	C/. 6 h.
● En casos crónicos, cuando hay un historial de malignidad en el paciente o su familia.	Carc. 200 o 1M	1 dosis
Remedios bioquímicos		
En la palmas de las manos	Nat-m. 6X o 12X	C/. 4 h.
En el reverso de las manos	Kali-m. 6X o 12X	C/. 4 h.

Para uso externo: Thuy. Ø

VÉRTEBRA DISLOCADA

(Ver también *Dolor de espalda, Espondilosis, etc.*)

<input type="checkbox"/> Remedio capital (para empezar el tratamiento); espina dorsal muy sensible; espasmos en los músculos del cuello y de la espalda; dolor de magulladura; empeora al moverse, pero tiene que mantenerse en movimiento.	Arn. 200 o 1M	C/. 4 h. (3)
---	---------------	--------------

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
❑ Aparece un dolor fuerte repentinamente, después de exponerse a una corriente de aire frío y seco; empeora con cualquier movimiento y por la noche; paciente sediento; inquietud; paciente quisquilloso, irritable y asustado.	Acon. 200	C/. 3 h.
❑ Dolor ardiente, punzante y escozor; toda la espalda se siente cansada y magullada; empeora con el calor y al mínimo movimiento y por la noche; el paciente está inquieto, irritable y deprimido; quiere destaparse y estar al aire frío.	Apis. 30 o 200	C/. 3 h. (3)
❑ Dolor cortante o muy fuerte en el cuello, en la espina dorsal o en la cadera; no deja de andar de un lado para otro, buscando comodidad; parece que la cama sube y baja; empeora con el descanso.	Bell. 30 o 200	C/. 3 h.
❑ Dolor en la nuca, en la espalda y en las extremidades; después de estar expuesto al aire frío, en especial al viento del este; mejora con el calor y con el mínimo movimiento; mucha sed de grandes cantidades de agua a intervalos largos.	Bry.. 200	C/. 3 h. (3)
❖ Dolor como si nos tirasen de las extremidades y nos las desgarrasen; especialmente en las corvas, con rigidez y debilidad; las extremidades inferiores están inquietas por la noche; mejora en tiempo cálido y húmedo, con viento frío, con las corrientes y tomando café.	Caust. 30 o 200	C/. 3 h. (3)
❑ Dolor insoportable; el paciente dice que prefiere morir a sufrir el dolor.	Cham. 30 o 200	C/. ½ h. (3)
❑ El dolor se desplaza; se siente especialmente en los dedos y en las muñecas; dolor al sentarse en la parte baja de la espina dorsal; empeora con aire frío; el paciente está de mal humor y apático.	Kali-bi. 30 o 200	C/. 3 h.
❖ Dolor punzante y cortante; dolor punzante cuando se está descansando; se extiende a lo largo de la espalda y por los muslos; empeora al caminar; se siente como si la espalda	Kali-c. 200	C/. 3 h. (3)

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA ★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
fuese a romperse; nota alivio haciendo presión en la región sacrocoxígea.		
□ Dolor que cambia rápidamente y se extiende por el centro; asociado con fuerte rigidez; mejora con el frío; empeora con el calor y el movimiento.	Led. 200	C/. 3 h. (3)
□ El dolor aparece después de mojarse o hacer un esfuerzo excesivo; especialmente en la parte inferior de la espalda; duele al darse la vuelta en la cama, los músculos parecen paralizados; calambres en corvas o plantas de los pies por la noche; empeora con el frío seco que precede a la lluvia.	Nux-v. 30 o 200	C/. 3 h.
□ Dolor como un disparo en la nuca o en cualquier otro sitio; el cuello y la nuca suenan al moverlos; se sienten pesadas las piernas durante el día y duelen por la noche.	Puls. 200	C/. 3 h. (3)
☆ Dolor producido por un esfuerzo excesivo o por exposición al frío o la humedad; el dolor de espalda se alivia inclinando el cuerpo hacia atrás; las puntas de los dedos se sienten entumecidas al coger algún objeto; el dolor y la rigidez empeoran después de descansar y mejoran con el movimiento continuo.	Rhus tox. 200 o 1M	C/. 3 h.
☆ El dolor empeora al caminar por una superficie desigual, en solterones viejos de ambos sexos.	Con. 200	C/. 4 h. (3)
□ Vértebra con prolapso; dolor en la región lumbar; empeora al toser.	Am-c. 200	C/. 4 h. (3)
□ Se siente como si se caminase sobre lana o algodón, debido a una degeneración de la médula espinal; heces duras, estreñimiento.	Alum. 200	C/. 4 h. (3)
● En pacientes gordos, flojos y frioleros; empeora al bañarse y exponerse al frío.	Cal-c. 200 o 1M	C/. 4 h. (3)

Remedios bioquímicos

Cal-p. 6X, C/. 4 h.
Nat-m. 12X y Sil. 30X

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
VÉRTIGO		
(Ver también <i>Vahídos</i>)		
❖ Vértigo; empeora con el ruido, con náuseas al cerrar los ojos; mareo al viajar en barco.	Ther. 30	C/. 4 h.
❑ Vértigo; empeora cuando se viaja en automóvil o en barco; al abrir los ojos, con ruidos en los oídos.	Petr. 30	C/. 3 h.
❖ Vértigo; por movimiento hacia abajo; miedo a caer.	Borx. 30	C/. 4 h.
❑ Vértigo; con insomnio; empeora al levantarse del asiento.	Aeth. 30	C/. 4 h.
❑ Vértigo; con los ojos desenfocados; empeora al sentarse; mejora al caminar.	Alum. 30	C/. 4 h.
❑ Vértigo; con sensación de caída y dolor de cabeza; durante espasmos epilépticos.	Cal-p. 6X o 30	C/. 4 h.
❑ Vértigo; con dolor de hígado; inclinación a caer hacia delante.	Chel. 30	C/. 4 h.
❖ Vértigo; con los ojos abiertos; al moverse, al girar la cabeza; de viejos solterones.	Con. 30 o 200	C/. 4 h.
❑ Vértigo; se oscurece la visión; empeora al caminar y al mirar a través de objetos transparentes.	Cycl. 30	C/. 4 h.
❑ Vértigo; con pérdida momentánea de la conciencia; después de cenar.	Nux-v. 30 o 200	C/. 4 h.
❑ Vértigo; al levantarse de un asiento, al moverse; mejora al quedarse quieto tranquilamente.	Bry. 30 o 200	C/. 4 h.
❑ Vértigo; al ver correr el agua; al cruzar un puente.	Ferr-p. 12X o 30	C/. 4 h.
❖ Vértigo; al ver objetos que se mueven, por paresia de acomodación, pérdida del sueño.	Cocc. 30	C/. 4 h.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
❑ Siente como si fuese a caerse hacia el lado izquierdo con vértigo; con vahidos en posición horizontal.	Sal-ac. 30	C/. 4 h.
☆ Vértigo; por la mañana; con sensación de que se cae cuando está de pie; en hombres casados, por pérdida excesiva de semen.	Acid-phos. 30	C/. 4 h.
❑ Vértigo; empeora con los ojos cerrados, después de dormir, supresión de descargas.	Lach. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
☆ Vértigo; empeora después de levantarse por la mañana, al mirar hacia arriba.	Puls. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
❑ Vértigo; empeora al aire libre, después de comer, por la tarde.	Phos. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
❑ Vértigo; empeora al darse la vuelta hacia el lado derecho.	Cean. Ø o 30	C/. 4 h.
Remedio bioquímico		Kali-p. 6X
		C/. 4 h.

VIRUELA

Enfermedad vírica y contagiosa que se caracteriza por erupciones vesiculares y pustulares. Los primeros síntomas son decaimiento, temblor, dolor de cabeza y espalda, tos con dolor de garganta, ronquera, fiebre, etc.

☆ Remedio preventivo.	Maland. 200	1 dosis
❑ Fiebre con inquietud y sed excesiva; miedo a morir y ansiedad.	Acon. 30 o 200	C/. 3 h.
☆ Fiebre alta con enrojecimiento de ojos y cara; aflujo de sangre hacia la cabeza.	Bell. 30	C/. 3 h.
❑ Etapa inicial con embotamiento, vértigo y adormecimiento; náuseas o vómitos y fiebre.	Gels. 30	C/. 4 h.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
❑ Fiebre alta con ardor, cara caliente y enrojecida, y falta de sed; mejora con el frío.	Apis. 30	C/. 4 h.
❖ Erupciones y fiebre con ganas de acostarse tranquilo; labios secos, lengua con una capa; estreñimiento; sed de grandes cantidades de agua a intervalos largos.	Bry.. 30 o 200	C/. 4 h.
❖ No aparecen las erupciones y se produce una ansiedad muy fuerte; ira o delirio, etc.; el paciente quiere salir fuera.	Hyos. 30 o 200	C/. 3 h.
❑ Cuando se forma pus en erupciones con dolor; erupciones húmedas e hinchadas.	Merc. 30	C/. 4 h.
❑ Pérdida de fuerza, inquietud y ardor doloroso; sed insaciable de pequeñas cantidades de agua a intervalos cortos.	Ars. 30	C/. 4 h.
❖ Cuando aparecen síntomas de fiebre parecidos a las tifoideas. Enrojecimiento del triángulo de la punta de la lengua; inquietud.	Rhus tox. 30 o 200	C/. 4 h.
❑ El paciente se colapsa por las complicaciones; ganas de que lo ventilen; cuerpo frío.	Carbo-veg. 30	C/. ½ h.
Remedio bioquímico	Ferr-p. 6X	C/. 4 h.

VIRUELA LOCA

➊ Remedio preventivo.	Vario. 200	C/. 10 m. (3)
❑ Fiebre alta con ansiedad y cara brillante y rojiza.	Acon. 30 o 200	C/. 2 h.
❑ Fiebre sin sed, aunque la garganta esté seca; deseo de estar al aire libre y fresco.	Puls. 30	C/. 4 h.
❑ Fiebre con dolor de cabeza y cara rojiza y brillante; afluencia de sangre a la cabeza.	Bell. 30	C/. 3 h.
❑ Picor en las erupciones; la punta de la lengua se pone roja; inquietud.	Rhus tox. 30	C/. 4 h.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
<input type="checkbox"/> Cuando desaparece la fiebre y empiezan a secarse las erupciones.	Merc. 30	C/. 4 h. (3)
Remedios bioquímicos	Kali-m. 6X y Ferr-p. 6X alternando	C/. 2 h.

VISIÓN, Afecciones de la

<input type="checkbox"/> Diplopia; por exceso de actividad sexual; por masturbación; pérdida de visión con náuseas.	Sep. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
<input type="checkbox"/> Diplopia, alternando con sordera, al mirar fijamente los objetos.	Cic. 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Diplopia después de la difteria; afecciones cardíacas; se siente peor después de dormir.	Lach. 30	C/. 4 h. (3)
<input type="checkbox"/> Diplopia durante el embarazo; se cierran los párpados.	Gels. 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Trastornos de acomodación; miopía, sensación de debilidad en los ojos.	Phys. 6 o 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> El paciente ve los colores del arco iris; visión nublada; mejora al frotarse los ojos; pérdida de visión por masturbación.	Acid-phos. 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Ve serpientes; visión obstruida por mucosidad.	Arg. Nit. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
<input type="checkbox"/> Pérdida de la visión para los colores; ceguera repentina precedida de vértigo.	Bell. 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Pérdida de visión, por bebidas alcohólicas.	There-ch. Ø o 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Pérdida de visión sin causa; después de mirar fijamente objetos blancos.	Tab. 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Pérdida de visión con epistaxis.	Ox-ac. 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Pérdida de visión por inflamación del ojo.	Manc. 30	C/. 4 h.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
<input type="checkbox"/> Pérdida de visión por usar demasiado los ojos; por un disgusto; por hemorragia de la retina; diplopia con náuseas.	Crot-t. 30 o 200	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Pérdida de la visión después de un desvanecimiento repentino.	Plb. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
<input type="checkbox"/> Pérdida de la visión con dolor de cabeza; diplopia al sonarse la nariz.	Caust. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
<input type="checkbox"/> Pérdida de visión después de un dolor de cabeza; visión borrosa, las letras se juntan al leer.	Sil. 12X o 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Pérdida de visión en pacientes hidrocefálicos.	Apoc. Ø o 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Pérdida de visión al leer; histerismo; por rayo, por tabaco; halo alrededor de la luz; visión borrosa.	Phos. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
<input type="checkbox"/> Pérdida de visión, por atrofia del nervio óptico; diplopia; se ve una imagen debajo de otra.	Syph. 200 o 1M	Sem. (3)
<input type="checkbox"/> Pérdida de visión; periódica; flotan puntos negros delante de los ojos.	Merc. 30 o 200	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Pérdida de visión por neuritis retro-vulvar; después de fiebres malarías.	Chinin-s. 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Pérdida de visión por estar echado al sol. Los objetos parecen rojos, rayados.	Con. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
<input type="checkbox"/> Visión borrosa, confusa; sensible a la luz.	Ther. 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Visión oscura, confusa; ve innumerables estrellas; diplopia.	Cycl. 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Los objetos parecen negros, se necesita más luz; los objetos pequeños parecen grandes.	Stram. 30 o 200	C/. 4 h. (3)
<input checked="" type="checkbox"/> Ve puntos de fuego; remedio intercurrente.	Psor. 200 o 1M	C/. 4 h. (3)
<input type="checkbox"/> Ve chispas, fuego y zig-zags alrededor de los objetos.	Nat-m. 12x o 30	C/. 4 h.
<input type="checkbox"/> Los objetos parecen muy amarillos; fotofobia.	Kali-bi. 30	C/. 4 h.

★ MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA★

Síntomas	Remedios	Frecuencias y (dosis)
<h3><u>VÓMITOS</u></h3>		
★ Con ardor doloroso en el estómago; sed insaciable, bebe poca agua a intervalos cortos; arcadas y miedo a morir.	Ars. 30	C/. 2 h.
★ Con náuseas constantes y lengua limpia.	Ip. 30	C/. 2 h.
□ Despues de beber alcohol; vómitos agrios una hora después de haber comido.	Kali-bi. 30	C/. 2 h.
★ Náuseas y vómitos; empeora después de comer en exceso; vómitos durante el embarazo.	Nux-v. 30 o 200	C/. 2 h.
★ Con la cara bañada con sudor frío; náuseas y vómitos durante el embarazo.	Lob. 30	C/. 2 h.
□ Vómitos violentos con asma mortal.	Tab. 30	C/. 2 h.
□ Vómitos violentos y forzados de líquido ácido y, sucio con alimentos; con distorsión dolorosa de la cara y sudor frío.	Verat. 30	C/. 2 h.

La peste

SOS–1994

Damos el paso necesario de incluir este capítulo como un addendum a este libro, debido a la gravedad del retorno de la peste después de más de 50 años.¹

Naturalmente, este tema no está basado en nuestra experiencia. Lo hemos sacado de varios libros y periódicos, incluso de hace 100 años. Se advierte al lector que consulte una buena *Materia Medica* para tener más detalles.

Síntomas de la peste

La enfermedad empieza repentinamente, sin prodromos, sin una norma, seguida inmediatamente por una gran postración, fiebre y dolor en el lugar donde ha de aparecer después el bubón. Los síntomas que se sienten después del brote son jaqueca, mucha sed, vómitos, diarrea y debilidad y, como norma, una depresión mental fuerte. La piel se pone roja y seca y, algunas veces, amarillenta. Se tiene mala cara y los ojos rojos y hundidos. El paciente presenta un aspecto embotado, pesado, estupefacto. A veces tiene una expresión de terror. Se hincha la lengua y se pone roja y cubierta de una capa grisácea, como un forro. De vez en cuando, se agrava la enfermedad con un delirio violento y los pacientes se ponen maniáticos. En otras ocasiones, están tranquilos e indiferentes a lo que los rodea, debido a un agotamiento de las facultades mentales. Entonces aparecen los bubones o abultamientos de las glándulas linfáticas.

Variedades de peste

Las principales variedades de esta enfermedad son tres: la bubónica, la neumónica y la gastrointestinal.

1.– **Bubónica:** El 70% de los casos corresponden a este grupo. La infección se produce por la piel.

1.– Se refiere a la India.

- 2.- **Neumónica:** Es aún más grave que la bubónica. El esputo de los pacientes atacados por esta variedad es prácticamente un auténtico caldo de cultivo de los bacilos de la peste. La infección se produce por medio del aire. La aparición está marcada estrechamente por tos y algo de disnea, con fiebre ligera. La temperatura sube enseguida a 40° o más y, en pocas horas, el paciente empieza a escupir gran cantidad de esputos densos teñidos de sangre. Aparece rápidamente la disnea, la depresión cardiaca, el pulso se acelera y hay signos de inquietud, somnolencia y principios de delirio. Los signos de la auscultación son los mismos de la neumonía catarral. La enfermedad se agrava rápidamente y casi siempre es mortal a los tres días.
- 3.- **Gastrointestinal:** Esta variedad, como la neumónica, no tiene bubones externos y suele ser mortal rápidamente. Las glándulas se hinchan, se agrandan y se inflaman y la membrana mucosa de los intestinos se cubre con un mucus denso, moteado de pequeñas hemorragias.

Diversas etapas de la peste y remedios homeopáticos

- 1.- Al principio y en la primera etapa de la enfermedad: se requiere Acon., Bell., Ign., Merc., Rhus tox., Pyr., Hyos., Dulc., Verat vir., Ferr-p., Kali-m. y Phos. (si la enfermedad continúa sin control, tiene tendencia a invadir el cerebro, el corazón u otros órganos internos del cuerpo).
- 2.- Si afecta al cerebro: Bell., Naja-t., Stram., Op., Nux-m., Ail-g., etc.
- 3.- Si afecta al corazón: Acon., Cal-ar., Naja-t., Crot-h., Kali. p., Hydr-ac., Dig., Morph-pur., etc.
- 4.- Para casos graves: Ant. tart., Cal-ar., Carbo-veg., Crot-h., Lach., Merc cyn., Naja-t., Phos., Sec-cor., etc.
- 5.- Otros remedios útiles: Arg. Nit., Anthraci., Apium, Ars., Bad., Buboинum, Echi., Kali-chl., Phyt., Tarent-c., Hep., Sil., Iod., etc.

Terapia de los remedios homeopáticos principales

Curación y prevención de la peste bubónica: calor externo con frío interno, golpes repentinos de calor, fiebre con jaqueca e hinchazón de las glándulas en las axilas y la ingle. **Ign.** 200, semanalmente (6).

Para curación y prevención de la peste bubónica, especialmente en el periodo de invasión: frío seguido de fiebre muy alta, con mucha sed, inquietud, dolor de cabeza, delirio, sudor y retención de orina. **Tarent-c.** 200, S.O.S.

Para la peste neumónica: expectoración con espuma, aspecto pálido, orina coloreada con motas de sangre, mucus frío, sabor agrio o dulce, dificultad para respirar, especialmente por la tarde, inspiración difícil. Ansiedad en el corazón, con náuseas. Sangrado de órganos internos y de todas las cavidades, por una sangre que no coagula. Fiebre con escalofríos y golpes de calor en todo el cuerpo, sudor abundante en la cabeza, las manos y los pies. Gran apetencia de agua y bebidas frías. **Phos.** 30 o 200, C/. 3 h. (3).

Pestim 200 o **Plaiguinum** 200 es un nosode (preparado con los bacilos de la enfermedad) y está considerado como el remedio profiláctico.

Combatir la fiebre con **Pyr.** 200, cada media hora (3).

Para combatir el miedo y la angustia, **Acon.** 30 o 200, C/. ½ h. (3).

Algunos consejos para evitar la peste

- 1.- Mantener la casa escrupulosamente limpia, prestando una atención muy especial a la expulsión de las aguas fecales y la eliminación de basuras.
- 2.- La limpieza personal ha de ser meticulosa. Dale una propina a la lavandera para que limpie bien tu ropa, las sábanas y todo lo demás.
- 3.- Deja que entre aire fresco y la luz suficiente a cada rincón de tu casa, en especial a los dormitorios y a la sala de estar.
- 4.- No dejes que se acumule suciedad en los rincones de tu casa. Son los lugares preferidos por las ratas.
- 5.- Pon todos los días la ropa de cama al sol y déjala que se caliente.
- 6.- No tomes medicinas por miedo a la peste, porque esto puede debilitar tu constitución y hacerte vulnerable a las enfermedades. Si quieres tomar medicinas preventivas, consulta a tu médico homeópata.
- 7.- El miedo a la enfermedad no debe perturbar tu mente, pues esto puede hacerte más susceptible a un ataque de la peste. La tranquilidad y la serenidad mental deben mantenerse por todos los medios. Muchas veces encontramos personas que tienen mucho miedo, porque han oído hablar de casos de la enfermedad en el vecindario y no es raro que la contraigan por ese miedo.
- 8.- Toma los alimentos en el momento oportuno y que sean muy nutritivos, del mismo modo que debes tomar substancias fáciles de digerir. Hay que evitar por todos los medios alimentos o bebidas que hayan estado en contacto con casos de peste o con las personas que atienden a estos pacientes. Hay que asegurarse de que los alimentos son frescos y el agua potable está filtrada. No dejes que se queden en tu despensa substancias corrompidas ni permitas que las ratas infecten tu almacén de alimentos.

Bibliografia utilizada por el Dr. Pérez Fuertes

Materia Medica clínica.- Farrington

Materia Medica.- B.Bijnovsky

Materia Medica.- Lathoud

Repertorio de Kent

Terapéutica Homeopática.- Hering

Guia Homeopática.- K. Hochstetter F.

Syntesis.- Repertorium Homeopathicum Syntheticum

