

LATHOUD JOSEPH AMÉDÉE, MATERIA

MEDICA (LTD) ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

ABROTANUM

Artemisia, abrotnum macho, o abrótno (lombriguera) de los jardines, o citronella, es una planta herbácea, vivaz, de la familia de las Sinantéreas, que tiene mucha relación con las absyntias; es común en nuestros jardines (campos) y posee un olor fuerte de citronella que comparte con la melisa (toronjil, o apiastro), planta también aromática.

Se prepara con hojas frescas recogidas durante el verano (julio y agosto en Europa), y por maceración en alcohol a 90º, una tintura madre a partir de la cual obtenemos, por diluciones hahnemannianas sucesivas, las diferentes dinamizaciones del remedio.

Acción general y características

Abrotnum es un medicamento de gran profundidad de acción y los casos que parecen pertenecerle más SOBREVIENTEN LUEGO DE LA SUPRESIÓN BRUSCA DE LAS MANIFESTACIONES LOCALES DE UNA ENFERMEDAD.

Sus rasgos más evidentes (patentes, sorprendentes) son : ALTERNANCIA Y METÁSTASIS : alternancia de diarrea y de CONSTIPACIÓN, alternancia de crisis reumáticas y hemorroidales; alternancia de crisis reumáticas y disentería; de calambres y cólicos.

En cuanto a metástasis señalaremos la gastritis, la nefritis, la meningitis, o una hepatitis o atrepsia, que sobrevienen luego de la detención brusca de una diarrea o una enterocolitis suprimidas por astringentes constipantes; o bien el caso de un reumatismo articular o agudizado de golpe por un tratamiento local, y entonces sobreviene una afección cardíaca; en estos casos habrá que recurrir a abrotnum, lo mismo que a kalmia, ledum, spigelia, etc.; en otros términos, el reumatismo mal tratado "ha sido llevado al corazón"; en tales casos de endocarditis aguda, abrotnum compete con kalmia, spongia y sepia.

Por otra parte, la acción de abrotnum es muy marcada en la ESFERA VEGETATIVA : DEPRESIÓN DE LAS FUNCIONES DE NUTRICIÓN, EMACIACIÓN y también ATREPSIA.

Pero existe la particularidad que el ENFLAQUECIMIENTO es progresivo, como ocurre en arg. nitr.

Esta es la característica que hace indicar el remedio en la atrepsia de los lactantes : el niño, demacrado, no puede sostener su cabeza, su debilidad es extrema; ya no se tiene en pie y tiene una fiebre hética que indica un desfallecimiento gradual, se acaba, cae, es todo vientre; mientras tanto tiene un apetito voraz pero no asimila nada; ocurre como en lycop., natr. mur., iodium y verat. ver., pero en éstos la delgadez ha progresado de arriba *hacia* abajo, mientras que en abrotnum han comenzado a enflaquecer las extremidades inferiores.

Corresponde a la DIATESIS GOTOSA.

Modalidades

Agravación

- a) Por el frío, la humedad, los cambios de tiempo.
- b) Por el movimiento general del cuerpo, si bien el dolor reumático se calma por el movimiento únicamente de la articulación afectada, a condición que el resto del cuerpo permanezca inmóvil.
- c) Por la noche, sobre todo después de medianoche.
- d) Por la supresión de las excreciones.

Mejoría

- a) Por el calor.
- b) Por las deposiciones blandas.

Síntomas mentales

Depresión mental y ansiedad; dificultad para pensar.

Como efectos secundarios tenemos : locuacidad, excitación, mal humor.

Niños gruñones, irritables.

Cara

Cara arrugada, como aspecto de viejo; ojos hundidos con ojeras azuladas.

Barritos en la cara, en sujetos demacrados.

Aparato digestivo

Hay un apetito tremendo; deseo de pan mojado en leche; HAMBRE VORAZ Y SIN EMBARGO ENFLAQUECE.

Sensación como si el estómago colgara, flotara; dolores agudos, ardientes, picantes, o sensación de frío; agravación a la noche.

Gran distensión del abdomen que está hinchado.

Nudos ganglionares.
 Deposiciones que contienen restos de alimentos no digeridos.
 Alternancia de diarrea y CONSTIPACIÓN.
 Hemorroides que sobrevienen después de la supresión brusca de dolores reumáticos con deseos frecuentes de evacuar.
 Hemorroides procedentes, ardientes al tacto.
 Cólicos hemorroidales con dolores en el sacro.
 Secreciones sanguinolentas del ombligo del recién nacido.
 Aparato respiratorio
 El aire frío causa sensación de crudeza en el aparato respiratorio.
 Epistaxis en los jóvenes.
 Pleuresía, al persistir del lado enfermo una sensación de compresión que impide respirar libremente (después de aconit. y bryonia).
 Órganos genitales
 Hidrocele de los niños (hidrocele infantil).
 Aparato circulatorio
 Dolores lancinantes y graves en la región cardíaca; metástasis de reuma cardíaco.
 Pulso débil y corto.
 Espalda y extremidades
 Dificultad para moverse.
 Reuma articular; articulaciones hinchadas, dolorosas, SENSIBLES AL MOVIMIENTO GENERAL DEL CUERPO AUNQUE SE SIENTA MEJOR AL MOVER SOLAMENTE LA ARTICULACIÓN AFECTADA; agravación por la noche sobre todo después de medianoche, por la humedad, los cambios de tiempo.
 Picazón, hormigueo y sensación de frío en los dedos del pie.
 Piel
 Marchita, arrugada, flácida, barritos.
 Actúa bien después de hepar sulf. calc. en las forunculosis.
 Sabañones con gran comezón.

ACETICUM ACIDUM

Aceticum acidum o ácido acético, es un líquido incoloro de olor vivo y penetrante pero agradable, sabor cálido y picante, volátil, inflamable, y sumamente ávido de agua, alcohol, éter y glicerina.
 Se preparan las tres primeras dinamizaciones siguiendo los procedimientos habituales de la dilución hahnemanniana, sirviéndonos del agua destilada; no es sino a partir de la cuarta dilución, que, para obtener dinamizaciones más elevadas, nos valemos del alcohol.
 Acción general del medicamento
 Acetic acidum produce un estado de ANEMIA PROFUNDA CON SÍNTOMAS HIDRÓPICOS, GRAN DEBILIDAD, FRECUENTES DESFALLECIMIENTOS, DISNEA, DEBILIDAD CARDIACA, VÓMITOS, MICCIONES PROFUSAS Y TRANSPIRACIÓN ABUNDANTE (Boericke).
 Adelgazamiento, debilidad, anemia, pérdida del apetito, sed ardiente, orina pálida, abundante, forman conjunto que reclama acetic acidum (Kent).
 También tiene la propiedad de disolver los depósitos albuminoideos y serosos (Boericke).
 Es un gran remedio HEMORRAGIPARO; sangrías en diversas mucosas : nariz, estómago, recto, pulmones, etc. (Kent).
 Muchos síntomas derivados de una PICADURA DE INSECTO o de una mordedura han sido curados por acet. acid. (Kent).
 Recordemos, en fin, que el VINAGRE es un antiguo remedio para combatir LOS MALOS EFECTOS DEL CLOROFORMO (Kent).
 Características
 1) CONSTITUCIÓN Y TIPO : Acetic. acid. es particularmente útil en los sujetos de tez pálida, serosa, enfermizos, delgados, muy debilitados durante años, más o menos tuberculinizados; tienen una musculatura miserable, relajada.
 2) AGOTAMIENTO Y DEBILIDAD : Accesos de desfallecimiento en sujetos anémicos (Kent).
 Gran postración después de un traumatismo (sulf. acid.) después de shock quirúrgico o anestesia (Allen).
 Marasmo y otras enfermedades agotadoras, debilitantes, en los niños (abrotanum, sanicula, tuberc.) (Allen).
 3) SENSACIÓN DE CALOR QUE VIENE Y SE VA, COMO UN ORGASMO. (Kent).
 4) GRAN SENSIBILIDAD AL FRÍO.
 Síntomas mentales
 Humor gruñón; se queja sin cesar.
 Confusión mental.

La enferma no reconoce sus propios hijos; olvida lo que acaba de ocurrir, experimenta crisis de angustia, cree estar aburrida, fastidiada y molestanda constantemente, que va a ocurrir alguna desgracia (Kent).

Irritable; hostigado por las preocupaciones de su actividad profesional.

Delirio alternado con estupor (acompañando fenómenos abdominales, comola tifoidea).

Cabeza

Dolores de cabeza nerviosos por abuso de narcóticos, tabaco, café, alcohol.

Aflujo de sangre a la cabeza con delirio.

Distensión de las arterias temporales.

Cara

Pálida, serosa, demacrada; a veces una mejilla roja y la otra pálida.

A veces las mejillas están calientes y vivamente coloreadas por el flujosanguíneo, cara rojo vivo, húmeda.

Los ojos hundidos con ojeras negras.

Sudor en la frente, por zonas.

Labios color púrpura oscuro.

Ojos

Conjuntivitis membranosa (Sieffert).

Aparato digestivo

BOCA :

Lengua descolorida, húmeda, floja, que parece salirse de la boca.

Dolor a la altura de la raíz de la lengua.

Salivación abundante.

Scialorrea.

FARINGE :

El niño tiene sed pero no puede tragar ni una cucharadita de agua.

Falsas membranas blancas en la garganta.

ESTOMAGO :

SED INTENSA INSACIABLE.

El niño grita por beber agua fría de noche : sed intensa, devoradora, de grandescantidades de agua por vez, en la hidropesía, la diabetes, la diarrea crónica, pero NO TIENE SED CUANDO TIENE FIEBRE. (Allen).

Rechazo de cosas saladas y frías; las cosas frías le pesan en el estómago.

Los vegetales excepto la papa no le sientan bien; lo mismo el pan y más aún la manteca. (Clarke).

Le parece que todo lo que hay en su estómago fermenta.

VIOLENTO DOLOR ARDIENTE EN EL ESTOMAGO SEGUIDO POR GRAN FRÍO EN LA PIEL,

SUDORFRÍO SOBRE LA FRENTE. (Clarke).

Vomita después de ingerir cualquier clase de alimento.

Rechazo seguro con vómitos.

Vómitos del embarazo, pirósis y salivación profusa día y noche(lact. acid.) donde la salivación es peor de noche; (merc. solub.) (Clarke).

Vómitos de sangre y de todo alimento ingerido.

Dolor ardiente de estómago, como de úlcera (Cáncer de estómago).

ABDOMEN Y DEPOSICIONES :

En el vientre se instala un gran dolor como de distensión, flatulencia o hidropesía, doloroso al tocar (Kent).

Cólicos.

Tiene la sensación de que al acostarse de espaldas el vientre se le hunde, y ello le produce disnea, está mejor acostado boca abajo (amon. carb.) (Allen).

Ascitis.

Hemorragia intestinal.

Diarrea copiosa, agotadora, acompañada por gran sed, bebe copiosamente sin que ello parezca dañarle aparentemente; en la hidropesía, tífus, tisis, la sed va acompañada a veces de abundantes sudores nocturnos; diarrea con edema en piernas y pies, en los tuberculosos; diarrea con cólicos y dolor de abdomen.

Aparato urinario

Orina en cantidades aumentadas, pálida, a menudo fosfatada.

*Acet. ac. ha curado diabetes con o sin glicosurea, cuando hay sed violenta, insaciable, inextinguible, gran debilidad y marcado enflaquecimiento. (Kent).

Órganos genitales

Debilidad sexual con pérdidas seminales, espermatorea que acompaña las deposiciones; relajamiento de los órganos genitales.

Menstruación abundante, o flujo menstrual acuoso.

En los casos de clorosis, donde acetic. ac. es indicado por los otros síntomas, el flujo menstrual puede ser poco abundante.

Hemorragia uterina con gran sed.
 Leche azulada, de gusto y olor ácidos, muy pobre.
 Aparato respiratorio
EPISTAXIS :
 Especialmente después de una caída o golpe.
 Ronquera con irritación laríngea.
 Las paredes laríngeas y de la tráquea se cubren de una exudación fibrinosa como en el verdadero crup o la verdadera difteria; respiración sibilante con estertores en la garganta; tos crupal agravada a cada inspiración (Clarke).
 Tos seca, crónica, cortante, en sujetos enfermizos, pálidos, como los que "han heredado tisis", con edema en las extremidades, diarrea y disnea, sudores nocturnos.
 Sensación de quemadura en el estómago y pecho; estertores en el pecho; bronquitis crónica (Kent).
 Broncorrea profusa (Boericke).
 Hemorragias pulmonares; hemoptisis.
 Espalda y extremidades
 Dolor de espalda calmado al acostarse sobre el abdomen.
 No puede dormir acostado de espaldas (arsenic. alb. duerme mejor acostado de espaldas) (Allen).
 Mielitis con orina abundante; dolor calmado solamente cuando está acostado sobre el vientre. (Clarke).
 Hinchazón edema tosa de piernas y pies.
 Piel
 Piel pálida, color cera, edema tosa.
 Piel caliente, ardiente, seca, o recubierta de abundante transpiración.
 Disminución de la sensibilidad cutánea en la superficie del cuerpo.
 Hinchazones varicosas.
 Fiebre
 Fiebre hética con abundante transpiración nocturna, placa roja sobre la mejilla izquierda.
 No tiene sed durante la fiebre.
 Pulso corto, imperceptible, muy débil, frecuente.
 Relaciones
 Antídoto los vapores de los anestésicos (AMYIL), del óxido de carbono y del gas; igualmente opio y stramonium.
 El vinagre de vino antidota a carbolic. acid.
 Actúa bien después de cinchona, en las hemorragias; y después de digitalis en la hidropesía.
 Agrava los síntomas de arnica, bell., lach., y merc., especialmente el dolor de cabeza de bell.
 Complementarios
 China.
 Antídotos
 Aconit., natrum mur., nux vom., sepia, tabacum. NO VA BIEN CON acetic. acid., borax, caustic., nux vom., ranunc. bulb., y sarsaparilla.

ACONITUM NAPELLUS

Aconitum napellus, o aconit napel, o capuchon, madriette o carro de venus, planta vivaz de la familia de las Ranunculáceas, crece en toda Europa, especialmente en países montañosos : Francia, Suiza, Alemania, Alpes, Jura, Vosgos, en estado salvaje.
 En los jardines se suele cultivar también como planta ornamental.
 El segundo nombre, napellus, le viene por la forma de su raíz, que semeja un pequeño nabo.
 Se prepara la tintura madre con la planta entera, recogida hacia el fin de su floración (en Europa, en agosto).
 Además de las sustancias comunes a todos los vegetales, a saber : almidón, goma, cera, clorofila, etc., materias albuminoideas, grasas, resinosas etc., el acónito contiene algunos alcaloides a los cuales debería sus principales propiedades.
 Estos alcaloides son la aconitina y la napellina.
 Acción general del medicamento
 "El acónito posee una inmensa esfera de acción que involucra gran número de estados mórbidos, pero el remedio no les conviene sino en un instante especial de su evolución porque su acción no ofrece un desarrollo continuo de efectos que se pueda comparar a una enfermedad completa". (Espanet).
 Su mayor acción consiste en una exageración de la actividad arterial, una marcada hiperhemia sanguínea, que se traduce en agitación psíquica y mental y gran ansiedad.
 Es el medicamento que mejor se adapta al elemento inflamatorio, al elemento fluxión sanguínea, a la hiperhemia arterial; es el ANTIFLOGÍSTICO por excelencia (se le ha llamado "lanceta homeopática"), pero que no conviene sino en el PERIODO DE FORMACIÓN DE ESE ESTADO, pues una vez localizada la congestión ya no es el

remedio indicado, dado que ha tenido lugar o bien un trabajo de hepatización, de transudación o una alteración cualquiera de los tejidos (Espanet).

Afecta igualmente los nervios sensitivos, en cuya esfera produce HORMIGUEOS, picazones, seguidos de ADORMECIMIENTO.

Estudiando sus características, veremos que es el gran remedio del dolor.

El medicamento actúa de igual modo de una manera marcada sobre los nervios MOTORES.

"No produce parálisis, pero sí ESPASMOS casi siempre de CARÁCTER TÓNICO.

En el envenenamiento por acónito, el trismus es un síntoma común; además el enfermo se queja a menudo de otros síntomas que indican la prescripción de acónito, como constricción en la garganta, calambres y otros síntomas locales (En algunas intoxicaciones aconíticas puede encontrarse, cuando son agudas y violentas, un estado de opistótonos completo cuyo estado pseudotetánico puede ser verificado casi solamente por la estricnina).

"Conviene además notar sobre todo la acción de acónito sobre los NERVIOS VASO MOTORES en cuya esfera se encuentra una influencia excitante igual que en los demás centros músculo-motores.

Es principalmente por esta acción sobre los nervios vaso motores que se explica su homeopaticidad en la fiebre asténica y los otros, síntomas hiperhémicos tan característicos del remedio, y que también los cura, recordando fielmente su empleo en las experimentaciones. (Hughes).

Características

CONSTITUCIÓN Y TIPO : Muy indicado en los niños en que la actividad de la vida vegetativa reclama la del sistema arterial; muy indicado también en adolescentes y adultos cuya circulación arterial goza de toda su plenitud de acción; menos indicado en la edad madura, en que la actividad vital se concentra principalmente en el aparato digestivo.

Acónito no se adapta casi en nada en los viejos, en los que predomina el sistema venoso y con él los síntomas de una decadencia incesante e irreparable.

Puede decirse de una manera más general que los sujetos que obtienen el mayor provecho del empleo de este medicamento son los de constitución sanguínea, formas atléticas, bien alimentados, vivaces, alegres, despreocupados o por el contrario que se entristecen fácilmente, inquietos, tímidos, como consecuencia de privaciones o sufrimientos que han deteriorado su constitución volviéndola más nerviosa; pero en todos ellos predomina la tez fuertemente coloreada, y generalmente los ojos y cabellos pardos o negros.

"Personas jóvenes, vigorosas, congestivas, pletóricas, sensibles a los cambios atmosféricos y que caen bruscamente enfermas después de haber estado expuestas y a sea a un viento frío y seco muy intenso (p. ej. congestiones pulmonares de invierno), o a un calor extremo (empacho gástrico o gastrointestinal del verano)". (Nash).

"Los pletóricos y los vigorosos de corazón fuerte, cerebro activo, circulación enérgica, y que sufren una enfermedad repentina a raíz de exposición a un brusco cambio atmosférico, he aquí la clase de individuos que necesitan acónito". (Kent).

BRUSQUEDAD, VIOLENCIA Y RAPIDEZ DE LA CRISIS : Acónito desencadena una tormenta que sube bruscamente, en extremo intensa y pasa rápido.

"Los males curados por acon. se producen repentinamente, luego de exposición aun viento frío y seco, p. ej. : el paciente, parece estar amenazado de muerte súbita y violenta, pero cura rápidamente.

En los individuos vigorosos a los que afecta, estas congestiones inflamatorias parecen ser repelidas por una reacción violenta y rápida.

Por otra parte, acónito no tiene en su esencia ninguna de las manifestaciones que ordinariamente suelen seguir a una inflamación; si el enfermo cura, no le queda rastro de su enfermedad.

Así podemos encontrar pruebas de su brusquedad y violencia en cada órgano del cuerpo : cerebro, pulmones, hígado, riñones, sangre, etc." (Kent).

EXTREMA INQUIETUD Y GRAN AGITACIÓN CON ANGUSTIA TERRIBLE Y MIEDO A LA MUERTE : La agitación muy marcada, la extrema inquietud, tan característica del remedio y que acompañan todos sus síntomas, se encuentran más a menudo en los estados violentos de su fiebre y no hay mejor cuadro esquemático de la fiebre de acon. que éste, dado por HERING : "Calor con sed; pulso duro, pleno, frecuente; impaciencia ansiosa imposible de calmar, el paciente está fuera de sí tirándose de un lado a otro con angustia".

Esta agitación es tan violenta como importante; es uno de los síntomas claves del remedio y no es tan característica en ningún otro remedio de nuestra Materia Médica, salvo en rhus tox. y en ars. que Nash coloca junto a acónito en lo que llamó el "TRIO DE LA AGITACIÓN".

Junto a su extrema agitación, acónito tiene una PROFUNDA ANGUSTIA, UN TEMOR INDEFINIBLE, pero sobre todo UN GRAN MIEDO A LA MUERTE, y es ESTE TEMOR CASI MAS QUE LA ENFERMEDAD EN SI, LO QUE PRODUCE EN EL ENFERMO ESTA AGITACIÓN TAN CARACTERÍSTICA.

"Siente la violencia de su enfermedad pues está bajo la influencia de un retismo arterial muy fuerte, de una gran excitación; el temor se refleja en su actitud y la acción cardíaca es tan agotadora que piensa que va a morir; lo que experimenta significa para él la muerte que tanto teme.

Cuando vemos este temor, esta agitación, esta ansiedad intensa, esta crisis tan aguda, tan violenta y tan repentina, estamos en presencia de un caso cuyo enfermo muere por el veneno del acónito y tiene necesidad de aconit." (Kent).

Esta violenta angustia, este temor a la muerte, son signos de aconit.; en rhus tox. la agitación es más simplemente la consecuencia de la modalidad más particular de este remedio : a saber, la gran mejoría producida por el movimiento. Por otra parte la agitación de ars. alb. se caracteriza por extrema postración y vitalidad reducida; es una agitación pasiva.

Ninguno de estos dos remedios tiene la angustia profunda, el temor irrazonable, sobre todo nocturno, de aconit.

Este temor a la muerte que puede notarse no sólo en los estados febriles agudos de aconit. sino también en otras manifestaciones que justifican el remedio, le imprimen un carácter tal que lo han indicado como excelente para combatir los síntomas provenientes de un temor, de un susto, ya sean recientes o no.

Opium es otro medicamento bueno para los efectos del temor tales como diarrea o convulsiones, vértigos, temblores, etc.; ambos remedios son muy diferentes en sus otras manifestaciones, al punto que resulta fácil, distinguir el uno del otro.

Gels., puls., y verat. son útiles según las demás características del caso, para las diarreas causadas por susto.

Para, los efectos crónicos de un susto, hay que acordarse de natr. mur., silic., phosph. (Farrington).

Ignatia es también un buen medicamento para tratar las consecuencias nerviosas de un susto.

Agnus castus tiene, como aconit. miedo a la muerte, tristeza con impresión de un fin rápido y próximo, todo ello acompañado de melancolía sexual.

Cactus tiene miedo a la muerte; como agnus castus es triste, melancólico, de mal humor pero tiene esa sensación de constricción al nivel del corazón, como una mano de hierro que lo oprime, que los otros remedios no tienen.

Phosph. también tiene miedo a la muerte cuando está solo; a ello se agrega una gran debilidad nerviosa, enflaquecimiento y un conjunto característico físico y moral que le da una fisonomía propia y no da lugar a confundirlo.

Por último ars. alb. puede compararse a aconit. no sólo por su agitación sino por una misma sensación de miedo, de temor a la muerte, pero tiene su debilidad particular y otras características que evitan que sea confundido con acónito.

SINTAMOS, ESTADOS PATOLÓGICOS, PROVENIENTES DE UNA EXPOSICIÓN AL FRÍO SECO : Las afecciones y enfermedades de toda clase causadas por un viento frío y seco son especialmente curadas por acon.

"Si la generalización en terapéutica no constituyese un error podría decirse que acon. es la panacea de las enfermedades debidas al enfriamiento, por lo cual es indicado al comienzo de las enfermedades que siguen a una exposición al viento frío y seco.

Conviene en particular en los malestares causados por los vientos septentrionales, el cierzo, el frío seco de las alturas, corrientes de aire en valles elevados o de montaña.

Es indicado con más precisión para las constituciones pletóricas, sanguíneas, en los bebés mofletudos, no así en los pálidos y enfermizos" (Kent).

Para su comparación, he aquí los otros remedios principales del aire seco y frío : bryon., caust., hepar sulf., calc., y nux vom.; he aquí algunos opuestos, es decir, del tiempo húmedo : nux mosch., natr. mur., sulph., y rhus tox. (Nash).

EL DOLOR DE acónito : Acon. provoca y cura un dolor INTOLERABLE, AGUDO, DESGARRANTE, ACOMPAÑADO DE LA AGITACIÓN EXTREMA DEL REMEDIO, SU ANGUSTIA Y SU TEMOR.

Es violento como todo lo que produce acon., el enfermo se tira para todos pues no puede soportarlo ni ser tocado ni descubierto : "lanza gritos de dolor, la intensidad de los dolores de acon. es sorprendente" (Kent).

Además este dolor EMPEORA DE NOCHE, HACIA LA MEDIANOCHE, como los otros síntomas de acónito.

El dolor viene acompañado de HORMIGUEO, ADORMECIMIENTO, PICAZÓN, o bien alterna con estos síntomas.

En fin, la noción de EXPOSICIÓN AL AIRE SECO Y FRÍO es importante en su etiología.

El dolor es tan violento que cree no poder seguir soportándolo y se desespera, se agita, pensando que va a morir; esto hace pensar en chamom., donde el dolor sobreviene antes de medianoche, acompañado de adormecimiento de la región afectada y a menudo el adormecimiento alterna con el dolor, intolerable, exasperado, no tiene ningún temor a la muerte; por el contrario, prefiere la muerte a continuar sufriendo así.

Coffea, no presenta la inflamación de acon. ni la moral de chamom.; es ante todo, un hipersensible, que se desespera cuando sufre.

Conviene notar que actea rac. y ran. bulb. que pertenecen a la misma familia botánica que acon., presentan los mismos dolores agudos y bruscos, pero carecen de su agitación y ansiedad tan características.

Modalidades

Lateralidad

Izquierda

Agravación

POR EL VIENTO FRÍO Y SECO Por la noche, hacia medianoche; los síntomas del remedio : agitación, angustia, dolores, etc., empeoran de noche, hacia medianoche, cosa curiosa, los otros dos remedios del trío de agitación, rhus tox., ars. alb., tienen la misma agravación nocturna, hacia medianoche; **EN UNA HABITACIÓN CALUROSA;** Estando acostado de costado; **POR EL VINO Y LOS ESTIMULANTES; POR EL HUMO DE TABACO;** Por la música, el ruido, la luz; Por el miedo y emociones violentas.

Mejoría

Al aire libre; DURANTE EL REPOSO, DESPUÉS DE UNA TRANSPIRACIÓN CALIENTE.

Síntomas mentales

Ansiedad con miedo que acompaña los menores sufrimientos.

Miedos : a la muerte, a las tinieblas, de atravesar la calle, de viajar, y de una muchedumbre.

Temor de que algo le pase; miedo siempre presente, indefinible, irrazonable, con sensación de angustia.

Timidez después de un susto.

Este miedo perpetuo torna su vida miserable, pues dicho temor lo encontramos tanto en las enfermedades febriles agudas, como en su vida habitual.

Inquietud física y moral : se tira de un lado a otro cuando se acuesta, sin que ello mejore.

Está persuadido, de que su enfermedad es mortal, y predice día y hora de su muerte.

Agitación con gran excitabilidad nerviosa.

Delirios agudos.

La música lo pone triste y le resulta insoportable.

Indiferencia total hacia todos durante el embarazo (Hering).

Sueño

Insomnio causado por un calor general demasiado grande, que se acompaña de AGITACIÓN E INQUIETUD.

No puede dormirse, pues su pensamiento le trabaja sin cesar.

Sueño malo, agitado, con pesadillas, sueños angustiosos, sobresaltos durante el sueño, sobre todo después de medianoche.

Cabeza

CEFALEA CONGESTIVA, cabeza torpe y pesada y al nivel de la frente hay una sensación como si un cuerpo extraño fuese empujando fuera de la cabeza.

Sensación de plenitud con calor intenso como de agua en ebullición, acompañada por violentos latidos del corazón, arterias, pulso y sienes, con fiebre, agitación, angustia, miedo.

Cabeza muy caliente exteriormente. (belladona).

Después de exposición al sol o de haber tomado frío, o de la supresión de un coriza, en una persona pletórica puede encontrarse esta cefalea congestiva.

Peor durante la noche, hablando, levantándose, bebiendo, mientras mejora al aire libre.

VIOLENTO DOLOR DE CABEZA FRONTAL, SUPRAORBITARIO; CONGESTIÓN DEL CEREBRO CON DOLOR DE CABEZA CONGESTIVO, ANSIEDAD, AGITACIÓN Y CARA CALIENTE, ROJA,

CONGESTIONADA, a veces con COLORACIÓN ENTRE NEGRO Y AZUL como en ver. virid., pero mientras el pulso de acon., es lleno, duro, tenso y rápido, el de verat. vir. es lento, flojo, débil y a menudo irregular : por otra parte la cefalea de verat. vir. es también diferente : la cabeza parece que estallar como si el cerebro fuese demasiado voluminoso y las pupilas se dilatan, mientras que en aconit. es sólo a la altura de la frente que el cerebro parece salirse.

Cefalea con orina abundante (ipeca, gelsem.).

VÉRTIGO AL LEVANTARSE DE LA POSICIÓN HORIZONTAL, al agacharse sobre todo en habitación calurosa, a veces con vértigo y síncope.

Vértigos que sobrevienen bruscamente después de un susto, exposición al sol, por supresión brusca de reglas por el frío.

Cara

CARA ROJA, VULTUOSA, UNA MEJILLA PUEDE ESTAR ROJA Y CALIENTE, LA OTRA PÁLIDA Y FRÍA, como en chamomilla.

NEURALGIA FACIAL, SOBRE TODO A LA IZQUIERDA.

CUYOS DOLORS AGUDOS, DESGARRANTES, INSOPORTABLES, SE ACOMPAÑAN DE HORMIGUEOS, como si se pasearan insectos por la piel.

NEURALGIA A FRIGORE, congestiva, aguda, a la altura del trigémino izquierdo; dolores insoportables que llevan al enfermo a la desesperación, cortantes, ardientes, punzantes, violentos; peores de noche, hacia medianoche; se acompañan de hormigueo y adormecimiento, "de agua helada que corre a lo largo del nervio" (Kent).

La cara está roja, hinchada, congestionada, y existe la agitación propia del remedio.

Puede compararse a Spigelia que es útil en la neuralgia facial peor del lado izquierdo, con sensación de quemadura intensa, dolor punzante, insoportable, acompañado por excitación intensa, pero no existen los hormigueos de acon.

Colchicum, que tiene dolores en la mitad izquierda de la cara hasta la oreja y cabeza, con hormigueos de piel y la cara de aspecto congelado; la mejilla del costado enfermo está roja, hinchada y transpira; hay mucho eretismo nervioso con dolores, que parecen insoportables : pero no hay la agitación tan característica de acon. verbasum tiene una neuralgia facial que afecta sobre todo el costado izquierdo con lagrimeo, coriza y sensación como si las partes doloridas, estuviesen oprimidas con pinzas, lo que no encontramos en acon. agaricus tiene una neuralgia facial con dolores semejantes a agujas de hielo pinchándole las mejillas e irritando el nervio; dolores lancinantes,

desgarrantes, agudos, como provocados por una astilla; por otra parte esta neuralgia NO afecta a una mejilla más que a otra.

Platina tiene una neuralgia facial acompañada por hormigueos y adormecimiento; pero estos dolores aparecen y desaparecen progresivamente, lo cual está muy lejos de la brusquedad de acon., son sobre todo frecuentes del lado derecho; en fin, el tipo de medicamento es una gran indicación para su elección, lo mismo que para lachesis, en que la lateralidad izquierda de los dolores de la neuralgia facial pueden hacer pensar en aconit.; la acompañan igualmente flujos de calor; pero son los dos únicos síntomas que tienen en común; todos los demás conducen a una clara diferenciación.

ADORMECIMIENTO, PARÁLISIS HEMIFACIAL DESPUÉS DE EXPOSICIÓN A UN VIENTO FRÍO Y SECO, acompañados de la sensación característica de hormigueo.

Acon. no es útil más que al comienzo del caso; y no tarda en ceder su lugar a causticum.

Ojos

Inflamación brusca y violenta, SIN SUPURACIÓN.

Conjuntivitis aguda después de exposición a un viento frío y seco.

Párpados vivamente inflamados, rojos; lagrimeo abundante después de exposición a frío seco o después de la extracción de un cuerpo extraño; (arnica).

Hipersensibilidad a la luz; ojos brillantes, rojos, inyectados.

Oídos

Las inflamaciones del oído, propias de acon., son agudas, sobrevienen bruscamente, con violencia, después de una exposición al viento frío y seco.

El oído externo está caliente, dolorido, hinchado; dolores agudos, intolerables, acompañados de la fiebre y agitación características del remedio.

Excesiva sensibilidad a los ruidos; la música resulta intolerable.

Aparato digestivo

BOCA :

Boca seca CON SED INSACIABLE Y VIOLENTOS DESEOS DE AGUA FRÍA; TODO TIENE GUSTO AMARGO, excepto el agua (china : todo, incluso el agua es amargo).

Sensación de adormecimiento en zona labial.

LENGUA CUBIERTA POR UNA CAPA BLANCA (antim. crud.).

Encías calientes e inflamadas.

Dientes MUY SENSIBLES AL FRÍO.

ODONTALGIA con dolores pulsátiles que se extienden a todo el maxilar después de exposición al frío seco.

FARINGE :

La garganta de acon. es ROJA Y SECA, contraída, con SENSACIONES DE ADORMECIMIENTO, PICAZÓN, DOLORS ARDIENTES, PUNZANTES.

AMÍGDALAS HINCHADAS Y SECAS, y en su zona LA MUCOSA TAMBIÉN ES MUY ROJA.

Acon. es el remedio de las anginas que sobrevienen de repente a la noche en sujetos pletóricos, congestivos, que han estado expuestos a viento frío y seco.

El enfermo se despierta bruscamente no pudiendo ya tragar ni respirar; garganta hinchada, amígdalas hipertrofiadas; mucosa faríngea roja subido; dolor intenso al tragar comparable a una quemadura; fiebre alta, agitación y ansiedad.

ESTÓMAGO :

Acon. TIENE UNA SED INEXTINGUIBLE Y QUIERE AGUA FRÍA; todo le parece amargo; sólo el agua tiene buen sabor, y siempre que sea fría.

Bryonia también tiene sed de agua fría en cantidades grandes, pero a intervalos largos; mientras que natr. mur. que también tiene sed y bebe grandes cantidades de agua lo hace a intervalos cortos.

Ars. alb. es otro medicamento muy sediento que bebe pequeñas cantidades de agua a la vez, lo hace con frecuencia a intervalos cortos, mientras que china, que bebe poco a la vez, lo hace a intervalos largos, pues todo lo siente amargo, hasta el agua.

Pérdida del apetito, anorexia.

Náuseas, vómitos, acompañados de gran angustia, calor, agitación, mucha sed, transpiración profusa y micciones en aumento.

Vómitos biliosos, o mucosos, o de sangre rojo vivo.

Sensación de presión en el estómago con disnea o sensación de quemazón que sube por el esófago.

ABDOMEN Y DEPOSICIONES :

Mientras los trastornos dispepticos de acon. son de poca importancia, sin características grandes muy netas, el vientre es la parte más afectada.

Ventre CALIENTE, TENSO, TIMPANIZADO, sobre todo MUY SENSIBLE AL TACTO, difícilmente palpable.

HAY VIOLENTOS DOLORS ESPONTÁNEOS, AGUDOS, LANCINANTES, ardientes principalmente A LA ALTURA DEL OMBLIGO; SOBREVIENTEN SOBRE TODO DESPUÉS DE EXPOSICIÓN AL FRÍO SECO. CÓLICOS QUE NO CALMAN EN NINGUNA POSICIÓN, no pasa como en bryonia que calman por la presión.

Coloc. calma si el paciente se tira hacia adelante, doblándose en dos.

Hemorroides sangrantes con enrojecimiento y tumefacción.

Deposiciones líquidas, acuosas, frecuentes, semejantes a espinacas picadas, condeseos urgentes y tenesmo.

Diarrea mucosanguinolenta con fiebre, agitación, insomnio; el niño se queja agritos y ninguna posición le calma.

Diarrea que aparece generalmente en verano después de haber abusado de bebidas frías, o después de haber suprimido bruscamente una transpiración abundante; en el otoño, en noches frías que suceden a días calurosos; en este último caso, merc. sigue bien a acon.

Aparato urinario

Retención de orina con dolores renales, agitación, después de exposición al frío o de traumatismo (arnica).

Orina escasa, caliente, roja, dolorosa con agitación y ansiedad, en una inflamación aguda; sensación de quemadura en la uretra con ansiedad al comienzo de la micción.

A veces después de aplicar fórceps, el recién nacido no orina; grita y está agitado; acon. es útil en estos casos.

MASCULINO :

Frecuentes erecciones y emisiones : dolores desgarrantes en los testículos, que están hinchados y duros.

Orquitis de aparición brusca en sujetos pletóricos, acompañada de fiebre, agitación y el miedo ansioso típico del medicamento.

FEMENINOS :

Vagina seca, roja, sensible.

Ovarios congestionados y dolorosos.

Metritis con dolores muy agudos.

REGLAS MUY ABUNDANTES Y PROLONGADAS; A VECES CORTAS, O REEMPLAZADAS

POREPISTAXIS en mujeres pletóricas y vigorosas, muy sensibles.

Antes de las reglas, enrojecimiento y congestión facial, pulso pleno y acelerado; humor cambiante, a veces triste, a veces alegre.

Durante las reglas, dolores congestivos; a veces verdaderos cólicos menstruales fuerzan a la paciente a doblarse en dos; llamaradas de calor con ansiedad.

Después de las reglas, leucorrea abundante, amarilla, viscosa, sanguinolenta.

Amenorrea súbita a raíz de un susto, cólera, emoción fuerte, o gran alegría; o después de exposición al frío intenso y seco, en mujeres pletóricas.

Miedo a la muerte; agitación ansiosa durante el embarazo; tiene miedo de que su parto vaya mal y que termine en accidente mortal.

Después del parto, hemorragia con sangre rojo brillante abundante, con agitación ansiosa y temor de morir.

Aparato respiratorio

NARIZ :

CORIZA con muchos estornudos después de exposición al aire frío y seco.

Generalmente, la noche que sigue a esta exposición hay gran sequedad de la nariz con muchos estornudos y poco o muy poco derrame acuoso.

Todo esto se acompaña de escalofríos seguidos de fiebre, con piel seca, agitación, dolor en la raíz nasal, sensación de quemadura en la garganta.

El coriza de acon. es del tipo agudo al principio; sólo un remedio puede compararsele, camphora, que también tiene un comienzo súbito luego de un cambio brusco de tiempo; nariz tapada y seca, el aire inspirado parece más frío que normalmente; hay cefalea frontal, escalofríos, y el enfermo siente frío en todo el cuerpo; está congelado y no puede entrar en calor, lo cual es bien distinto del calor seco y agitación de acon.

Epistaxis congestiva, con sangre roja, brillante.

LARINGE :

Laringitis aguda; laringe muy sensible al tacto y al aire inspirado; dolores y espasmos agravados por la inspiración.

En la laringitis de spongia la laringe no sólo duele al tocarla, sino con los movimientos del cuello, al volver la cabeza.

Tos crupal; CRUP PROVENIENTE DE HABER TOMADO FRÍO DURANTE EL DÍA EN NIÑOS

PLETÓRICOS; la tos aparece durante el primer sueño entre 21 y 23 hs., antes de medianoche; es ronca, violenta y casi sofocante al instante; el niño agitado, excitado y ansioso, lleva sus manos a la garganta porque se ahoga.

Spongia tiene síntomas muy semejantes, pero el espasmo laríngeo proviene en forma menos violenta, menos rápida, la sofocación se produce en forma paulatina y progresiva, y la respiración estridulosa no se interrumpe durante los paroxismos; además la tos de spongia es característica : puede en verdad compararse al "ruido de una sierra cortando madera de abeto" (Nash).

Por otra parte, si la tos crupal es ardiente, como si la tráquea estuviese llenada de mucosidad que el paciente no puede expectorar, y si además la tos aparece o es más marcada después de medianoche, es decir hacia la madrugada, hay que pensar en hep. sulf. calc.

Por último, no hay que confundir este estado crupal laríngeo de acon. con los de iodium o bromium.

BRONQUIOS Y PULMONES :

Acon. ES CONVENIENTE EN TODOS LOS ESTADOS INFLAMATORIOS DE BRONQUITIS Y PULMONES : EN LOS ESTADOS CONGESTIVOS QUE SOBREVIENTEN BRUSCAMENTE CON MANIFESTACIONES VIOLENTAS, EN SUJETOS PLETÓRICOS, SANGUÍNEOS, VIGOROSOS, FUERTES.

DOLORES AGUDOS, LANCINANTES, ARDIENTES, QUE OBLIGAN AL ENFERMO A ACOSTARSE DE ESPALDAS, después de exposición al viento frío y seco, con disnea y angustia.

El enfermo no puede acostarse de costado, sobre todo del lado afectado pues entonces el dolor aumenta.

EL PUNTO QUE DA LUGAR A LA ELECCIÓN DE acon., ES LA MITAD SUPERIOR DEL PULMÓN IZQUIERDO.

TOS GENERALMENTE SECA Y BREVE, SIBILANTE, CRUPAL, AGRAVADA POR LA NOCHE, sobre todo antes de medianoche, peor por los vientos fríos y secos, por las corrientes de aire, bebiendo, fumando; NADA PARECE CALMARLE; se acompaña de disnea, fiebre, dolores agudos, angustia y agitación.

HEMOPTISIS DE SANGRE ROJA, BRILLANTE, CLARA, A VECES ABUNDANTE, CONFIEBRE, ANSIEDAD Y TEMOR; acon. responde a la hemoptisis congestiva de comienzos de la tuberculosis, primer indicio de una fiebre característica y sobre todo el miedo angustioso de una muerte cercana, acompañan a la agitación de acon. arnica, que tiene hemoptisis de sangre roja, brillante, espumosa y mezclada de tos; sobre todo la noción etiológica de un traumatismo es primordial para la elección del remedio.

Bell. también tiene hemoptisis de sangre rojo vivo caliente, acompañada de una sensación como si el pecho estuviese inundado de sangre; acompañado sobre todo de violenta congestión de cabeza propia del remedio, tan característica, y generalmente consecutiva a supresión intempestiva de las reglas.

La hemoptisis de cactus grandifl. se acompaña de tos convulsiva, palpitations y sensación de constricción particularmente a la altura del corazón, lo que permite elegir con seguridad el remedio.

Ipeca puede presentar después de exposición al viento frío y seco o a la humedad, escalofríos seguidos por esputos sanguinolentos abundantes, rojo vivo provocados por cosquilleo de laringe acompañado de tos seca, quintosa; hay disnea, angustia, cara lívida, sin que estos síntomas tengan la violencia de acon. ledum pal. tiene hemoptisis abundante de sangre rutilante; se acompaña de dolor ardiente en un punto del pecho donde parece provenir la sangre y de tos hueca, fatigante, provocada por cosquilleo en laringe o tráquea; abunda entre los borrachos o los reumáticos, en los que alterna con crisis reumáticas.

Por último, millefolium tiene también una hemoptisis de sangre abundante, rojo vivo, pero carente de tos, fiebre y dolores; solamente tiene en el pecho una sensación de hervidero como si de él subiera sangre caliente.

Aparato circulatorio

Los trastornos circulatorios de acon. son importantes.

Hay en primer término TRASTORNOS VASO MOTORES marcados y que se traducen por LLAMARADAS DE CALOR EN TODO EL CUERPO, SENSACIÓN DE CALOR ARDIENTE O DE FRÍO DE HIELO.

Cuando el paciente se sienta en el lecho, su cara que estando acostado era roja y congestionada, se vuelve de una palidez mortal con tendencia al síncope.

Otro síntoma es que el enfermo puede presentar UNA MEJILLA ROJA Y LA OTRA PÁLIDA (chamom.).

PULSO PLENO, TENSO, DURO SALTÓN, A VECES INTERMITENTE.

PALPITACIONES BRUSCAS Y VIOLENTAS ACOMPAÑADAS DE AGITACIÓN, ansiedad y temor a la muerte.

PESADEZ DOLOROSA EN LA REGIÓN PRECORDIAL CON IRRADIACIÓN AL BRAZO IZQUIERDO, ADORMECIMIENTO Y HORMIGUEOS.

Acon. es muy indicado en ENDOCARDITIS Y AORTITIS, al comienzo cuando los signos que presenta el enfermo, se acompañan de disnea intensa, con ansiedad, angustia, agitación y miedo a la muerte.

Además se encuentra con frecuencia en agotados nerviosos o en mundanos neuróticos, crisis de ansiedad o de angustia indefinible acompañadas de palpitations que desaparecen con acon.

Con respecto a los medicamentos para la aortitis cuyos síntomas pueden evocarlos de acon. debemos pensar en spig., naja, cactus, spongia, amyl. nitros., ars. alb., arnica, cuprum; etc.

Espalda y extremidades

Rigidez de la nuca, dolores agudos en la espalda, que sobrevienen en forma brusca después de haber tomado frío, acompañados de hormigueo a lo largo de la columna vertebral como si insectos caminaran sobre la piel.

Acon. es un remedio indicado en las neuralgias a frigore que sobrevienen bruscamente y atacan especialmente a personas congestivas y pletóricas.

Los dolores son agudos, muy intensos al comienzo, acompañados de hormigueo y adormecimiento.

Si predomina la inflamación, hay sensación de calor; si sólo existe neuralgia, hay sensación de frío; pies fríos como hielo, manos y pies fríos, o más a menudo, manos calientes y pies fríos.

Acon. es útil EN EL PERÍODO INICIAL DE LA CIÁTICA, cuando es causada por intempestiva exposición al aire frío y seco.

Los dolores que se producen de repente, son agudos, desgarrantes, intolerables; se acompañan de la extrema agitación y angustia características del remedio con sensaciones de hormigueo, adormecimiento, picazón, o bien los dolores alternan con estos últimos síntomas.

Todos ellos empeoran de noche, sobre todo hacia medianoche, y se agravan por el movimiento, mientras que el enfermo se siente algo calmado estando sentado.

Inflamación reumática aguda de las articulaciones, al comienzo principalmente del lado izquierdo; dolores agudos, desgarrantes, con enrojecimiento y tumefacción de las partes afectadas; gran sensibilidad al tacto y agravación nocturna con agitación ansiosa.

La etiología a frigore tiene verdaderamente un gran valor para la elección del remedio.

Lugares especialmente afectados : cuello, espalda y riñones.

En el reumatismo del hombro otros dos remedios deben distinguirse de acon. : ferrum met., que ataca especialmente el hombro izquierdo, pero el dolor es sobre todo muscular, haciéndose sentir más sobre el deltoides y agravándose al levantar el brazo; sanguin., que contrariamente a ferrum ataca al hombro derecho y es particularmente articular.

Convulsiones durante la dentición; el niño se muerde los puñitos y lanzagritos agudos; la cara enrojece, si bien puede haber una mejilla roja y otra pálida, como en chamom.

Piel seca, ardiente y fiebre elevada.

Piel

La piel es sede de síntomas más o menos generalizados.

Por otra parte es siempre seca, roja, ardiente, caliente, hinchada, brillante.

Puede presentar también un aspecto similar al de la rubéola.

Por último, las partes cubiertas se cubren de abundante transpiración.

Fiebre

La fiebre de acon. es típica : sobre todo, más marcada a la noche, hacia medianoche.

Presenta en sus tres fases las siguientes características : ESCALOFRÍOS DESDE LAS EXTREMIDADES AL PECHO Y CABEZA; agravados por el movimiento.

CALOR SECO; piel roja, caliente, ardiente, pero seca; cara roja, pero palidece al sentarse el paciente en el lecho; sed intensa de grandes cantidades de agua; extrema agitación con gran angustia y temor, especialmente de morir; el enfermo, imposible de calmar, está fuera de sí, se tira para todos lados sintiendo dolores angustiosos, SUDORES EN LAS PARTES CUBIERTAS SOLAMENTE.

El enfermo debe cubrirse tan pronto como comienza la transpiración; Y UNA VEZ QUE LA TRANSPIRACIÓN SE HAYA GENERALIZADO LA INDICACIÓN DE ACON. CESA.

Relaciones

Los ácidos, frutas ácidas, vino, limonada, café, modifican la acción de acon.

El vinagre en gran cantidad antidota sus efectos tóxicos.

Remedios que le siguen bien

Abrot., arnica, ars., bell., bryon., cactus, calcar., cocculus, canth., coffea, hepar, ipeca, kali brom., merc., puls., rhus tox., sepia, spig., spong., sulf., silic.

Complementarias

Coffea; sulfur (que es el crónico de acon.).

Antídotos

Acetic acid., bell., berb., coff., nux vom., paris, sulf.

ACTEA RACEMOSA

Actea racemosa, o cimifuga racemosa, o actea en racimos, planta de la familia de las Ranunculáceas, crece en los altos roquedales, en lugares frescos y sombríos; regiones montañosas del Canadá, Géorgia, y en los Estados del Oeste de América.

La tintura madre, de la que obtenemos todas las dinamizaciones, se prepara con la raíz de la planta recogida antes de su floración.

Algunos autores aconsejan agregar las bayas a las raíces para preparar dicha tintura madre.

Acción general del medicamento

Act. racem. actúa de manera preeminente sobre el SISTEMA NERVIOSO POR MEDIO DEL CUAL PROVOCA SINTOMAS CEREBRALES Y MEDULARES RELACIONADOS CON TRASTORNOS PELVIANOS, ESTADOS MÓRBIDOS REFLEJOS DEL ÚTERO Y SUS ANEXOS ACOMPAÑADOS POR TRASTORNOS NERVIOSOS.

Dice Kent : "Los síntomas de este remedio se asemejan a los de las enfermedades que sobrevienen en las mujeres y en particular en los ESTADOS HISTÉRICOS Y REUMÁTICOS"; estos últimos se explican por el hecho de que la índole de los dolores registrados en la patogenesia del remedio hacen pensar en las ALGIAS REUMATOIDES, y efectivamente en la práctica act. racem. se muestra muy eficaz en el reuma, MUY PARTICULARMENTE EN EL QUE AFECTA AL TEJIDO MUSCULAR.

CARACTERÍSTICAS

1) CONSTITUCIÓN Y TIPO : Act. racem. es UN REMEDIO ESENCIALMENTE FEMENINO : los síntomas que presenta al estudiarlo están SIEMPRE LIGADOS ÍNTIMAMENTE AL FUNCIONAMIENTO DEL APARATO

GENITAL, ya se trate de síntomas producidos durante las reglas o luego de su supresión; PERIODOS MENSTRUALES Y MENOPAUSIA SON LOS MOMENTOS PRINCIPALES DEL MEDICAMENTO; cuanto más abundante sea el flujo menstrual y mayores sean los sufrimientos de la enferma.

2) SINTAMOS MENTALES QUE TIENEN CARÁCTER HISTÉRICO :La enferma tiritita, escalofríos nerviosos, sin frío; desfallece, habla profusamente cambiando de tema sin cesar.

Está apenada, lanza suspiros o bien está triste y con insomnio.

Cree que va a enloquecer.

Estos trastornos nerviosos se acompañan a menudo con trastornos uterinos e irregularidades en las funciones menstruales.

Además LOS SINTAMOS MENTALES ALTERNAN CON LOS FÍSICOS.

3) DOLORES AGUDOS, LANCINANTES, EN DIVERSAS PARTES DEL CUERPO, DOLORES FUGACES, QUE CAMBIAN DE LUGAR, SEMEJANTES A DESCARGAS ELÉCTRICAS (DOLORES FULGURANTES) :

Los dolores de act. racem. son agudos, lancinantes, como descargas eléctricas, en las masas musculares o a lo largo de los trayectos nerviosos, pero siempre relacionados con irritaciones provenientes del útero u ovarios; se agravan durante las reglas, por el frío húmedo, y se manifiestan mayormente de noche; generalmente mejoran por el calor y la presión.

DOLORES MUSCULARES CALAMBROIDES, MIALGIA, "DOLOR MUSCULAR, SENSACIÓN DEMAGULLADURA EN GENERAL, CON TIRONES Y ESTREMECIMIENTO.

El estremecimiento ha incitado a algunos médicos a *vel* alguna semejanza con la corea en estos estados histero-reumatoideos; el reumatismo se transformará un día en corea y, además, los movimientos coreicos; continuarán extendiéndose y progresarán a menudo juntos con el entumecimiento y el dolor". (Kent).

Modalidades

Lateralidad

IZQUIERDA

Agravación

POR EL FRÍO; el paciente de act. racem. está siempre con escalofríos .

"Es una mujer fácilmente afectada por el frío; sensible al tiempo frío y húmedo, despierta y desarrolla el estado reumático no sólo en músculos y articulaciones sino también a lo largo de los nervios y en todo el organismo (dulcam.).

Es sensible al frío en todo el cuerpo, SALVO EN LA CABEZA; y al sentir frío se agrava en su estado general.

Sin embargo EL DOLOR DE CABEZA MEJORA AL AIRE LIBRE Y POR EL FRÍO, lo que constituye una excepción y una particularidad, pues la regla general es la agravación por el frío" (Kent).

En phosph. encontramos una modalidad general que recuerda a esta última; mientras que todos los síntomas son agravados por el frío y mejoran por el calor, los síntomas de la cabeza y estómago tienen modalidad opuesta, a saber, mejoran por el frío y se agravan por el calor.

DURANTE LAS REGLAS :Cuanto más abundante es el flujo más sufre la enferma.

Lach. presenta lo contrario : mejora durante la menstruación, sintiéndose mejor cuanto más abundante es el flujo.

Mejoría

Por el calor, excepto la cabeza : Comiendo (anacard. etc.).

Síntomas mentales

LOCUCIDAD INCESANTE, LA ENFERMA HABLA CON VOLUBILIDAD, AGITÁNDOSE CONTINUAMENTE, HABLA A TONTAS Y A LOCAS PASANDO DE UN TEMA A OTRO CON RAPIDEZ, sin detenerse sobre ninguno, y ESTA INCOHERENCIA DE LENGUAJE CORRESPONDE PERFECTAMENTE A SU DESEQUILIBRIO MENTAL.

Lach. presenta la misma locuacidad y volubilidad en el lenguaje, pero se expresa con lógica; palabras convenientemente elegidas, frases cortas jamás acabadas, las ideas se suceden rápidamente, una palabra recién pronunciada hace pensar ya en otra cosa y su conversación no es sino el resultado de una sucesión ininterrumpida de asociación de ideas extremadamente rápida.

Lach. es también desconfiada y suspicaz como act. racem.; cree que la conversación que se hace a su alrededor es en perjuicio suyo; es celosa y vengativa.

Su tristeza es profunda pero solo de mañana, y tiene relación con la agravación nocturna del remedio : por último, y a la inversa de act. racem., todos sus trastornos desaparecen tan pronto aparece el flujo menstrual.

Paris quadr. presenta una locuacidad tan abundante como la de act. y lach., pero tiene además una disposición particular para considerar a los que lo rodean de manera desdenosa y despreciativa; las alucinaciones sensoriales de este remedio no son, por otra parte, visuales y táctiles, como las de act. racem., sino olfativas; agreguemos por último un síntoma muy particular del remedio y que facilita el diagnóstico; la mitad derecha del cuerpo está fría, mientras que la mitad izquierda está caliente.

En los intervalos de estos estados de excitación, act. rac. está TRISTE, DEPRIMIDA; TRISTEZA, MELANCOLÍA, DESALIENTO, SENSACIÓN COMO SI ESTUVIESE RODEADA POR UNA NIEBLA OSCURA, a la vez que CREE TENER PLOMO SOBRE LA CABEZA (Kent).

Esta impresión guarda relación con el estado de fatiga cerebral de la enferma y que puede acentuarse hasta llegar a verdadera confusión mental con excitación y delirio.

TRISTEZA AGOBIANTE; DESALIENTO, FLAQUEA BAJO EL PESO DE LA PENA; se siente y se deja llevar a una profunda tristeza, como en psor. o puls.

Esto pasa en seguida, o bien es agravado por el movimiento, por el miedo, por la excitación o por enfriamiento.

A veces esta melancolía, esta tristeza, que lleva a la enferma a sentarse sola en un rincón y permanecer allí triste y silenciosa, puede aparecer en una nerviosa o en una histérica, a continuación de la desaparición brusca de una sensación de dolor muscular de magulladura generalizada, con tirones y estremecimientos; si es interrogada, rompe a llorar y tratará de explicar vanamente su tristeza agobiante.

HUMOR CAMBIANTE : la parte moral como la física, cambian continuamente; los síntomas alternan o cambian.

TEMORES, ANGUSTIAS, AGITACIÓN, EXCITACIÓN, SOSPECHAS CONSTANTES en una histérica; gran depresión con sueños angustiosos a causa de una desgracia que le parecerá inminente, teme viajar en un vehículo cerrado porque tiene miedo de no poder salir a tiempo en caso de accidente.

TEME ENLOQUECER Y ESTA IDEA LA PERSIGUE; siente perder su control mental, divaga, y los estremecimientos musculares y movimientos coreiformes que en ella descubre son para ella una manifestación objetiva de su desequilibrio nervioso, lo que nota perfectamente y la afecta.

Los medicamentos que podemos relacionar con act. racem. en esta angustia por una locura próxima son : alum., calc. ostr., acon., arg. nitr., lil. tigr., mancin., medorr., etc.

A este temor de enloquecer se agrega una DESCONFIANZA INJUSTIFICADA; es suspicaz, no quiere tomar remedios por temor a que le hagan daño y está siempre bajo la aprensión de una desgracia inminente.

Visiones extrañas de ratas, ratones, diablos; cree que le corren ratones sobre la piel.

Los estados mentales arriba descriptos, que SUCEDEN A LA DESAPARICIÓN, DE UNA CRISIS

REUMATOIDEA, constituyen una característica de gran valor; el reuma mejora, pero hace eclosión el cuadro mental (Kent).

Algunas veces, LA APARICIÓN DE UN FLUJO EXONERANTE como la DIARREA, PUEDE IMPEDIR LA APARICIÓN DE TAL ESTADO MENTAL, una vez mejorado el reuma.

Sueño

INSOMNIO PERTINAZ; cuando puede dormir, SU SUEÑO ES AGITADO, no puede permanecer tranquila y cambia constantemente de lugar; al mismo tiempo, es perturbada por sueños angustiosos sobre una desgracia inminente.

Cabeza

CEFALALGIA CON SENSACIÓN DE PRESIÓN DE ADENTRO HACIA AFUERA, COMO SI LA CÚSPIDE DEL CRÁNEO FUERA A ESTALLAR.

SENSACIÓN DE MAGULLADURA, DE DOLOR, EN TODA LA CABEZA.

DOLOR A TRAVÉS DEL CEREBRO CON SENSACIÓN PARTICULAR DE DOLOR EN LA

REGIÓN OCCIPITAL, pudiendo descender a lo largo de los músculos del cuello.

CEFALEA FRONTAL CON DOLORS LANCINANTES, PRINCIPALMENTE ARRIBA DEL OJO

DERECHO EXTENDIÉNDOSE A LAS SIENES Y A LA ÓRBITA OCULAR; neuralgia infraorbitaria derecha,

CEFALEA MENSTRUAL, en mujeres nerviosas antes y durante las reglas, sobre todo cuando coexisten los trastornos uteroováricos característicos; agravación durante las reglas, cuanto más abundante es el flujo mayor es el dolor; agravación por el más leve movimiento de cabeza y hasta del ojo, por la luz, al más ligero ruido, hasta por el tic tac de un reloj; mejora al frío o estando acostado al aire libre, si bien los dolores pueden ir acompañados de escalofríos.

Jaquecas con las características de la cefalea del remedio, en hombres agotados por trabajo cerebral continuo, que hayan abusado del alcohol, etc.

Por NEURALGIA INFRAORBITARIA DERECHA, diferentes remedios pueden compararse a act. racem. :

sanguin. tiene neuralgia que comienza en el occipucio y se localiza sobre el ojo derecho con náuseas, vómitos o escalofríos, y con la sensación, como en actea, como si la cabeza fuese a estallar; pero los dolores se alivian apoyando fuertemente el occipucio contra un cuerpo duro; la jaqueca es periódica, repitiéndose en períodos regulares fijos, y viene acompañada por distensión de las venas temporales del lado afectado.

La hemicrania derecha de puls. aparece generalmente después de trastornos gástricos causados por ingestión de alimentos grasos, o bien aparece cuando las reglas tardan en venir; se acompaña de escalofríos y lagrimeo del lado afectado, y a veces de epistaxis; empeora de noche y al calor, mejorando al aire libre y por la presión.

Silicea presenta también un dolor neurálgico en la nuca que termina por fijarse sobre el ojo derecho; sobreviene periódicamente durante las reglas y se acompaña de una sensación de frío general intenso; cuando está en su apogeo, el cuero cabelludo se torna tan sensible que no puede tolerar el menor contacto; por lo demás, la enferma de silic. se siente siempre calmada por el calor, y por ello observamos que se envuelve bien la cabeza.

La jaqueca supraorbitaria de iris vers. siempre es precedida por una sensación de manchas delante de los ojos y se acompaña de náuseas y vómitos amargos y ácidos; frecuentemente pasa de derecha a izquierda, sobreviene

periódicamente cada 7 días y en particular en los estudiantes agotados por trabajo cerebral continuo sin ejercicio físico compensatorio.

La neuralgia supraorbitaria derecha de chelid. es periódica; comienza por la mañana al despertar, prosigue durante el día con bostezos y escalofríos, para terminar en ligera transpiración.

Los ojos duelen al moverlos y a menudo el paciente se queja de dolor en la punta del omóplato derecho, característico del remedio; por último la orina es de un tinte amarillo oscuro.

Actea rac. y puls. son los remedios menstruales; el primero conviene a las reglas adelantadas y abundantes, el segundo a las tardías y escasas.

Sanguin. es el medicamento más a menudo indicado en la menopausia.

Iris vers. conviene sobre todo a las agotadas, y juntamente con chelid. conviene en las jaquecas llamadas biliosas que se acompañan de trastornos digestivos.

Mencionamos aún kali bichrom. que tiene cefalea frontal particularmente derecha, fijada en un pequeño punto que podrá cubrirse con la punta de un dedo, y que está relacionada con trastornos digestivos.

Aparato digestivo

No hay aquí síntomas muy característicos y numerosos.

Sin embargo conviene notar los siguientes: Sensación epigástrica de desfallecimiento, de vacío en el hueco epigástrico, a menudo con vómitos flemosos matutinos, en mujeres que sufren de agotamiento nervioso o en relación con trastornos útero-ováricos.

Apetito disminuido con náuseas, eructos, vómitos.

Sensación dolorosa en el vientre, que está como magullado.

Alternativas de diarrea y CONSTIPACIÓN; alternancias de diarrea con dolores físicos, reumáticos.

Aparato urinario

En esta esfera lo único notable es la vejiga irritable con emisión abundante de orina clara como el agua, principalmente al terminar una jaqueca.

Órganos genitales

Sensación de pesadez, de caída, en el útero (Kent).

Dolores que cruzan la pelvis de una cadera a otra (Boericke).

Dolores en la región uterina que pasan como un relámpago de un costado al otro de la pelvis (Kent).

La constitución histeroreumatoidea, que es el tipo de act. rac., tiene numerosos **DESORDENES MENSTRUALES**; **DESIGUALDAD DEL FLUJO**, que puede ser abundante, lento o suprimido; **DOLORES FUERTES DURANTE LAS REGLAS**; cuanto más abundante es el flujo mayor es el dolor.

Por otra parte, hay que tener en cuenta que act. racem. **SUFRE SIEMPRE DURANTE LAS REGLAS**; los síntomas mentales más fuertes, los dolores reumáticos más agudos, las sacudidas y calambres musculares más penosos, la agitación, todos los dolores sobrevienen a lo largo de los trastornos nerviosos, las sensaciones de dolor, etc. aumentan o hacen su aparición durante las reglas.

Además act. racem. es muy impresionable: un temor, una emoción o un golpe de frío son suficientes para suprimir las reglas que pueden ser reemplazadas por una jaqueca supraorbitaria derecha, o por flujo acompañado de dolores en el vientre que irradian a las ingles, acompañados de sensación de pesadez en el útero más marcada al caminar.

Por último, las reglas de act. racem. generalmente abundantes aunque a veces escasas, **SON SIEMPRE AGOTADORAS**.

DOLOR EN LA REGIÓN OVARICA; NEURALGIAS OVARICAS en mujeres que simbolizan el cuadro del remedio con sacudidas musculares, y **DOLORES QUE VAN HASTA LA CARA ANTERIOR DE LOS MUSLOS A LO LARGO DE LOS CUALES SUBEN O BAJAN** (Boericke).

Act. racem. cura toda clase de **TRASTORNOS DEL EMBARAZO** en mujeres de su constitución.

Los síntomas alternan unos con otros de manera tan marcada que la alternancia depende de la naturaleza del caso.

Durante el embarazo la mujer nerviosa y susceptible de act. racem. presenta un estado mental caracterizado por la irritabilidad de su carácter, tristeza, melancolía, y un temor exagerado por el parto próximo.

Durante el parto, en su primera etapa, la parturiente está temblorosa; luego aparecen manifestaciones histéricas; los dolores son irregulares, comienzan bien y terminan mal, cambian de lugar dejando el útero para localizarse en una cadera, o adquieren tal intensidad que hacen gritar a la enferma; la vulva está sensible y hay contracciones espasmódicas de la vagina que entorpecen el parto; por último, por la irregularidad de los dolores la dilatación se hace mal; algunas dosis de act. racem. bastan entonces para regularizar los dolores, facilitar la dilatación y conducir el parto hacia un buen fin.

Cauloph. es aquí un medicamento muy parecido.

Aparato circulatorio

PULSO ONDULANTE, RÁPIDO.

Acción cardíaca irregular; corazón nervioso.

PALPITACIONES AL MENOR MOVIMIENTO; el corazón anda ligero, irregular, parece que se fuera a detener bruscamente, por momentos; pueden observarse síntomas de angina de pecho pues la enferma de act. racem. se queja frecuentemente de un dolor **VIVO AGUDO BAJO EL SENO IZQUIERDO CON IRRADIACIÓN AL**

BRAZO DE IGUAL LADO; a veces ese dolor queda circunscripto y sin importancia, sin ser influenciado por la respiración; otras veces es violento y extendido, siendo por el contrario, agravado por la respiración pudiendo parecer un foco pleural; este dolor empeora durante las reglas y el embarazo; pueden doler ambos senos; pero el dolor del izquierdo es más marcado y se extiende por debajo de la glándula; por último este estado es peor durante la menopausia, en que se acompaña de adormecimiento del brazo izquierdo.

Otros remedios producen las mismas sensaciones : conium presenta dolor bajo el seno izquierdo acompañado de dolores calambroides y como de pellizco en el útero; los senos están abultados y dolorosos principalmente antes de las reglas.

La enferma sufre puntadas en el pezón y pueden constatarse induraciones en la glándula.

El dolor sub-mamario de ustil. maid. tiene sensación de tirón despertando a la enferma a las 3 de la mañana y obligándola a darse vuelta de espaldas o sobre el costado derecho para sentirse aliviada; este dolor suele acompañar a las pérdidas intermenstruales, a las hemorragias de la menopausia o post partum.

Sambuc. tiene dolor sub-mamario lancinante con disnea, que mejora con la presión, con un vendaje apretado o estando sentada; hay abundantes sudores al despertar.

Señalemos el dolor sub-mamario de puls. casi siempre de origen cardíaco, sensación de que le tiran de un hilo.

El de Mosch., que es siempre provocado por la tos; por último al dolor de cauloph. que, de todos, configura aquí el remedio más aproximado a act. racem.

en razón de elegir los órganos genitales femeninos; ambos presentan movimientos coreiformes, dolores reumáticos.

Cauloph. en las pequeñas articulaciones, y act. rac. en los grandes músculos; ambos tienen neuralgias supraorbitarias, cauloph., a la izquierda y act. racem. a la derecha; cauloph. presenta una debilidad que puede llegar a la atonía, mientras que act. racem. presenta una excitación que puede llegar a la manía; pero los síntomas mentales de este último son tan particulares que evitan todo error.

Espalda y extremidades

Dolor en la nuca; nuca rígida; DOLORES EN PARTE POSTERIOR DE CABEZA Y CUELLO.

La cabeza es tirada para atrás por contracción de los músculos de la nuca (Kent).

Dolores reumáticos en músculos de cuello y espalda; la enferma se siente rígida, paralizada, contracturada.

SENSIBILIDAD DE ESPINA DORSAL después de ejercicio deportivo, después de haber cosido a máquina, escrito a máquina o tocado el piano; dolor peor a la mañana al inclinar la cabeza hacia adelante.

Sensibilidad al tacto de las apófisis de 4a., 5a. y 8a. vértebras dorsales; la más ligera presión en esta región produce dolor intenso y puede llegar a provocar vómitos.

DOLORES TIRONEANTES EN MÚSCULOS LUMBARES Y SACRALES QUE SE EXTIENDEN A LOS MUSCULOS; más acentuados cuando la enferma permanece parada, calmados momentáneamente por el movimiento, acompañados de sensación de adormecimiento que generalmente se relaciona con una irritación de útero u ovarios.

Dolores violentos que descienden por la espalda; reumatismo de espalda.

IMPOSIBILIDAD DE ACOSTARSE SOBRE LA ESPALDA POR LA CONTRACCIÓN MUSCULAR EN ESTA REGIÓN.

Los músculos sobre los que la paciente se acuesta y sobre los que asienta el peso del cuerpo sufren sacudidas que le impiden el sueño, no puede permanecer inmóvil en el lecho; resultado : un estado de agitación e inquietud que contribuye en mucho a agravar el desequilibrio mental de la paciente.

Entumecimiento DE LOS MIEMBROS : DOLORACIÓN : TEMBLORES, ESPASMOS, CONVULSIONES

HISTÉRICAS; sacudidas musculares espasmódicas que constituyen una verdadera COREA se manifiestan por la noche.

DOLORES REUMÁTICOS MUSCULARES, particularmente localizados en LA REGIÓN DE LOS GRANDES MÚSCULOS DEL VIENTRE.

RIGIDEZ Y DOLOR DEL TENDÓN DE AQUILES. benz. acid. tiene un dolor localizado semejante, pero estamos frente a un caso de reuma gotoso con crujidos en las articulaciones; además la orina tiene un olor característico que indica netamente el remedio.

El dolor en el tendón de Aquiles de muriat. acid. se acompaña de debilidad y pesadez en los miembros inferiores.

Ruta tiene dolor en el tendón de AQUILES con sensación de contracción como si el tendón fuese demasiado corto y asociado a una gran laxitud.

Dolores violentos de ciática desde la cadera y a lo largo de toda la cara posterior de la pierna izquierda, tan grandes que obligan a la enferma a abandonar el lecho.

Relaciones

Antídotos

Aconitum; baptisia.

[AESCULUS HIPPOCASTANUM](#); Error! Marcador no definido.

Se obtiene este medicamento dinamizando, según los procedimientos Hahnemannianos, una tintura madre preparada con el fruto bien conocido del Castaño de Indias.

Es un remedio más conocido por la precisión de su campo de actividad que por la extensión de su acción terapéutica.

Acción general del medicamento

En toda la extensión del remedio encontramos una especie de PLÉTORA, de PLENITUD VASCULAR que afecta tanto a las extremidades como al resto del cuerpo.

Es un estado de congestión venosa que es el signo dominante del remedio; manifiesta su acción sobre todo sobre el hígado y sistema portal produciendo congestión e infartos venosos; ello determina lentitud en el funcionamiento de ciertos órganos tales como el cerebro o el tubo digestivo, como también dilataciones vasculares; de ahí la presencia de hemorroides y várices.

Esta congestión venosa entorpece las facultades del enfermo atrasando el funcionamiento orgánico y así se comprenderá cómo todo lo que aumenta la estasis venosa, por ej. el sueño o un baño caliente agravará al enfermo, mientras que todo lo que acelera la circulación le producirá una mejora, por ej. un ejercicio moderado o un baño frío. "Determina sobre todo, y ahí está su acción principal y característica, congestión del hígado y del sistema portal, con CONSTIPACIÓN, congestión de las venas hemorroidales y sensación de congestión en todos los órganos del bajo vientre". (Nash).

Por último digamos que bajo la acción del remedio, LAS MUCOSAS ESTÁN HINCHADAS Y SECAS : "las mucosas de la boca, garganta y recto están hinchadas, arden y parecen en carne viva". (Allen).

Características

CONSTITUCIÓN Y TIPO : Aesc. hip. es particularmente indicado en individuos con tendencia a tener HEMORROIDES ACOMPAÑADAS DE SENSACIÓN DE PLENITUD, que es la consecuencia de un estado congestivo venoso semejante al que determina el remedio, descrito bajo "Acción General...".

ESTA SENSACIÓN DE PLENITUD QUE PREDOMINA EN LA REGIÓN PELVIANA, SE ENCUENTRA TAMBIÉN EN DIFERENTES PARTES DEL CUERPO : es como si hubiera afluencia excesiva de sangre : corazón, pulmones, cerebro, piel.

CONGESTIÓN VENOSA (PRINCIPALMENTE PORTAL Y HEMORROIDAL) : La plétora venosa, especialmente localizada en el sistema portal y venas hemorroidales es el eje a cuyo alrededor gira toda la patogenesia del remedio.

"Allí donde se localiza, el COLOR ES PÚRPURA OSCURO, ROJO AZULADO; inflamación de la garganta caracterizada por una coloración muy oscura; tendencia a producir várices, ulceración de estas venas varicosas y estas lesiones son rodeadas por una zona oscura muy marcada; úlceras varicosas en las piernas limitadas por una aureola rojo oscuro muy marcada; las hemorroides son púrpura oscuro como si quisieran ulcerarse.

Aesc. CARECE DE ACTIVIDAD EN SUS ESTADOS INFLAMATORIOS, ES LENTO Y PASIVO.

Algunos remedios producen un alto grado de enrojecimiento en una pequeña inflamación, en los cuales todo transcurre con violencia y rapidez; en aesc. la acción es lenta, las actividades tisulares son reducidas, el corazón sufre, las venas están congestionadas". (Kent).

DOLORES CAMBIANTES : DOLORES AGUDOS, VIVOS, DESGARRANTES, QUE CAMBIAN DE LUGAR, QUE VAN RÁPIDAMENTE DE UN PUNTO AL OTRO, como puls., y kali carb.; son superficiales, COMPLETAMENTE A FLOR DE PIEL; parecen a veces seguir la trayectoria de un nervio; ENTONCES MEJORAN POR APLICACIONES CALIENTES.

Otras veces son PROFUNDOS, PERSISTENTES, en cuyo caso, y contrariamente a los superficiales, MEJORAN POR EL FRÍO Y SE AGRAVAN POR EL CALOR COMO TODO EL CONJUNTO DEL REMEDIO, salvo la excepción antedicha : el enfermo busca el frío que contrae sus vasos habitualmente distendidos y activa su circulación.

Estos dolores se acompañan también a veces de HORMIGUEOS, principalmente en las extremidades.

Modalidades

Agravación

a) DURANTE EL SUEÑO : De ahí trastornos al despertar, con confusión mental, mira a su alrededor con asombro, no reconoce a las personas y se pregunta dónde está y qué significa lo que ve.

Aesc. es especialmente útil en niños que despiertan asustados y confundidos, como en lycop.; la sensación de plenitud de las venas es a veces peor durante el sueño, después de acostarse o tenderse, y mejora con un poco de ejercicio físico, moviéndose, haciendo algo, estando ocupado, mejora (Kent).

b) POR EL CALOR O EL FRÍO : De una manera general el calor agrava a aesc.; sus síntomas son generalmente producto de la temperatura, sobre todo los dolores, por lo menos los profundos, pues los superficiales, contrariamente a la regla general del remedio, mejoran por el calor.

Mejoría

a) POR EL FRÍO, que facilita la circulación.

b) POR EJERCICIO MODERADO; salvo los dolores de riñones y espaldas, que se agravan por el movimiento.

Todos los remedios venosos presentan estas modalidades fundamentales; mejoría por el frío y ejercicio moderado, y agravación por el calor.

Ya vimos más arriba cómo puls. se asemeja en principio a aesc.

Es interesante trazar un paralelo distintivo entre ellos.

Puls. es un remedio de acción más profunda que aesc. cuyo paciente es uncongestionado; su aspecto es el de un pletórico, de un sanguíneo, mientras que puls. muestra cianosis de las extremidades bajo el aspecto de plétora sanguínea; por otra parte, las mucosas de puls. segregan abundante mucosidad suave, no irritante, mientras que las de aesc. son turgescientes, rojo oscuro y secas; parece tener una circulación totalmente bloqueada y no eliminar toxinas, causa de su estado, mientras puls. busca desprenderse de ellas, mediante la secreción de sus mucosas.

Síntomas mentales

Aesc. tiene su mentalidad confusa al despertar; permanece cierto tiempo aturdido antes de estar completamente despierto; por la mañana se siente más pesado física e intelectualmente.

Su actividad cerebral se encuentra como suspendida; todo pensamiento es para él un esfuerzo; todo trabajo le parece ser de una gran dificultad.

Hay pérdida de memoria con aversión al trabajo.

ESTA TRISTE, IRRITABLE, DESANIMADO; PIERDE FÁCILMENTE SU HUMOR Y RECUPERA TARDIAMENTE EL CONTROL DE SI MISMO; ES GRUÑÓN. (chamom.).

Estos síntomas mentales desaparecen o mejoran grandemente si el enfermo hace ejercicio combatiendo así la éstasis venosa que los determina.

Cabeza

Dolores de cabeza terribles, con pesadez; le parece que su cerebro está comprimido; se hacen sentir principalmente atrás de la cabeza y dan la sensación de que existiese una compresión en ese lugar.

Sensación de plenitud de la cabeza con cefalea frontal que se extiende de derecha a izquierda y sensación de constricción de la piel frontal; sensación de plenitud congestiva en la cabeza con dolores sordos, pesados, terribles, en la frente.

Dolores neurálgicos en la región supraorbitaria derecha.

Punzadas en el parietal izquierdo, luego en el derecho.

Hormigueos en el cuero cabelludo.

Estos signos se encuentran frecuentemente en los hemorroidarios.

Aparato digestivo

BOCA Y FARINGE :

La mucosa ESTA SECA, TURGESCENTE, AZUL ROJIZO, el paciente sufre al tragar, hay sensación de quemazón violenta con enrojecimiento y sequedad de la mucosa faríngea, acompañada de dolores con picazón en las orejas; tendencia a tragar frecuentemente con sensación dolorosa de quemadura, pinchazos, sequedad y contracción de las pilas; mucha sensibilidad al aire frío inspirado.

LENGUA CARGADA Y DOLORIDA COMO SI HUBIESE SUFRIDO UNA QUEMADURA.

DISTENSIÓN DE LAS VENAS FARINGEAS.

FARINGITIS FOLICULAR EN CONEXIÓN DE CONGESTIÓN HEPÁTICA la congestión portal de aesc. puede venir acompañada de diversos trastornos localizados en garganta y recto, en que se constata la lateralidad característica y la estrecha relación entre los síntomas descriptos; la desaparición de los signos faríngeos produce signos recto-hemorroidales y viceversa.

ESTÓMAGO :

Eructos agrios, amargos.

Deseos de vomitar.

Pirósis y vómitos alimenticios después de las comidas.

Gran desorden gástrico de la digestión, y analizando estos síntomas se ve que este remedio puede clasificarse junto a phosph. y ferrum. (Kent).

En cuanto termina de comer siente los alimentos agriarse y son rechazados hasta que el estómago se siente libre de ellos.

Así ocurre con phosph., ferrum, ars., y aesc., lo mismo que con algunos otros. (Kent).

ABDOMEN, RECTO Y DEPOSICIONES :

EL HÍGADO ESTA DOLORIDO Y HAY SENSACIÓN DE PLENITUD EN EL HIPOCONDRIO DERECHO.

RECTO SECO Y CALIENTE; sensación como si estuviese LLENO DE AGUJITAS, DOLOROSAS COMO SI SOPORTASE PUNTAZOS DE CUCHILLO; HEMORROIDES QUE SANGRAN RARA VEZ, DOLOROSAS, ARDIENTES, color púrpura. (Allen).

HEMORROIDES CON SENSACIÓN DE PLENITUD, DE SEQUEDAD Y PINCHAZOS DOLOROSOS COMO SI EL RECTO ESTUVIESE LLENO DE ESPINAS; puede haber también SENSACIÓN DE GOLPES Y LATIDOS, común a todos los trastornos pelvianos de aesc. NO HAY TENDENCIA A PROLAPSO, cómo se encuentra en ignat., aloë, podoph., sino UN DOLOR DORSAL CARACTERÍSTICO Y DESPROPORCIONADO CON LO QUE SE VE DE LAS HEMORROIDES. (Nash).

Existe un número de medicamentos cuyos trastornos hemorroidales se asemejan a los de aesc.; aloe presenta los mismos signos de aesc. menos la picazón; sus hemorroides son muy grandes, muy sensibles, prominentes, como uvas; siempre mejoran por baños o aplicaciones frías y aparecen a menudo luego de la desaparición de una eczema. Se acompañan siempre de una secreción mucosa como gelatina, la que sobreviene generalmente una hora después de la deposición.

Las hemorroides de ignat. como las de aesc., se acompañan de dolores picantes como si en el recto hubiese un paquete de agujas, pero también acusan una sensación particular de contracción una o dos horas después de la evacuación; un esfuerzo moderado durante la deposición provoca el prolapso hemorroidal; el dolor y el flujo sanguíneo se producen cuando la evacuación es blanda, en ignat. todo es paradójal.

También kali carb. tiene dolores picantes en el proceso hemorroidal como producidos por agujas en el recto; pero el paciente se queja principalmente de un ardor semejante a un hierro candente en el recto, que empeora al toser y mejora sentándose en el agua fría o mediante una compresión, así resulta que mejora andando a caballo; los dolores rectales picantes no son sino una localización particular de los frecuentes dolores de kali carb.; muriat. ac. tiene caracteres semejantes a aesc.: hemorroides azuladas, ardientes, acompañadas de los pinchazos ya descriptos, y de prurito, pero no existe sensación de plenitud; hay que destacar la extrema sensibilidad de las hemorroides, de tal modo que el menor contacto, aun para el aseo, resulta dolorosamente penoso; generalmente se agravan caminando y montando a caballo, inversamente a kali carb., mejorando por aplicaciones calientes.

Collins. tiene también sensación de agujas en el recto, picazón y sensación de plenitud pero el paciente presenta un estreñimiento tenaz; estas hemorroides que se notan después del parto o en el embarazo, sangran mucho, mejoran por el calor y suelen acompañarse de trastornos cerebrales y cardíacos.

Sulfur es el remedio más semejante a aesc.; ambos presentan las mismas características; sin embargo puede distinguirse el ardor rectal de sulf., durante la evacuación, que es más agudo que el de aesc. pero habrá que distinguir a estos remedios por sus grandes características generales.

Puede ocurrir un error en la elección entre ambos remedios, pero debe tenerse presente que, siendo sus relaciones tan estrechas, para curar definitivamente a un paciente de aesc. deberá prescribirse una o más dosis altas de sulfur, que es el remedio crónico de aesc.

A la prescripción del primero sigue infaliblemente la del segundo.

En aesc. la característica es generalmente la CONSTIPACIÓN, EVACUACIONES SECAS, DURAS, QUE CUESTA EVACUAR, y la evacuación se acompaña de un característico dolor SACRO-LUMBAR.

Pueden existir también DESEOS INEFICACES.

Finalmente, las deposiciones son seguidas de una sensación de PLENITUD RECTAL y de un intenso DOLOR ARDIENTE EN EL ANO durante varias horas.

Órganos genitales

MASCULINOS :

Prostatitis crónica con frecuentes emisiones nocturnas de orina.

FEMENINOS :

SENSACIÓN DE LATIDOS CONSTANTES DETRÁS DE LA SINFISIS PUBIANA; SENSACIÓN DE LATIDOS Y DE PLENITUD EN EL ÚTERO; DOLOR LUMBO-SACRAL característico, que puede acompañar a una INFLAMACIÓN O DESPLAZAMIENTO DEL ÚTERO, o alguna forma maligna de LEUCORREA (Nash). Prolapso uterino con leucorrea, color oscuro, y violento dolor de espaldas en la región lumbo-sacral, con gran fatiga al andar (Allen).

Dolor tirante en la pelvis con abundante leucorrea y dolor opresivo en las caderas al caminar; el útero parece obstruido y esto ocurre lo mismo antes que durante las reglas.

Dolores en el vientre y caderas durante la menstruación.

Dolores uterinos con sensación de latidos en el hipogastrio.

Viejos casos de leucorrea con secreción de mucus amarillo oscuro, espeso, pegajoso; leucorrea con dolores de espalda y articulaciones sacro-iliacas (Kent).

Aparato respiratorio

NARIZ :

Produce un CORIZA ANÁLOGO AL DE ars. alb., acuosa, clara, poco abundante y muy ardiente.

La excoriación del labio superior es menos marcada que en ars. alb. y puede venir acompañada de sensación de desolladura de garganta que empeora al aire frío.

LARINGE Y PECHO :

Tos relacionada con trastornos hepáticos.

Sensación de calor en el pecho.

Aparato circulatorio

Los trastornos congestivos que hemos descripto al estudiar las características y la acción general del medicamento, tienen resonancia sobre la circulación propiamente dicha.

El enfermo tiene PALPITACIONES; siente LATIR SU CORAZÓN y tiene SENSACIÓN DE PULSACIONES EN LAS EXTREMIDADES; éstas constituyen un elemento importante para la elección del remedio; cuando estas

pulsaciones acompañan a los signos habituales del remedio, sobrevienen á menudo POR UN ESFUERZO; por ej. : DOLORES LUMBO-SACRALES CON PULSACIONES Y GOLPETEOS AL SUBIR UNA ESCALERA.

Espalda y extremidades

Constante dolor "sordo" de espaldas en sacro y caderas, MUY AGRAVADO AL CAMINAR O AGACHARSE (Nash).

Este dolor a través del sacro y caderas durante la marcha es un signopropio de aesc.

Es común en los hemorroidarios sentir un dolor en la nuca y en la basedel cerebro y, cuando comienzan a caminar, sufren dolores persistentes en sacro y caderas; este dolor es característico.

DOLOR DE ESPALDAS "SORDO", EN FORMA DE GOLPES, VIOLENTO Y CONSTANTE; EL CAMINAR RESULTA CASI IMPOSIBLE; APENAS SE PUEDE TENER EN PIE AGARRADO Y CAMINAR DESPUÉS DE HABERSE LEVANTADO DE UN ASIENTO; AL QUERERSE LEVANTAR DEBE HACER MUCHOS ESFUERZOS DOLOROSOS (sulf., petrol., agaric.). (Kent).

Durante el embarazo SENSACIÓN DE TENER LA ESPALDA MUY DÉBIL, COMO SICEDIERA AL CAMINAR O AGACHARSE; está obligada a sentarse o a acostarse. (calc. phosph.).

Sensación de parálisis en brazos, muslos y columna vertebral (Allen).

DOLORES FUERTES QUE SE DESPLAZAN DE UNO A OTRO LUGAR, SIEMPRE CALMADOS POR EL CALOR, QUE AFECTAN LAS ARTICULACIONES DE MANOS, MUÑECAS Y CODOS; los dolores gotosos a menudo revisten estos caracteres.

Dolores venosos profundos, acompañados de sensación de hormigueo y plenitud, y a menudo pulsaciones en las extremidades; las venas están muy marcadas, azuladas, distendidas.

ÚLCERAS VARICOSAS CUYO BORDE ES ROJO OSCURO y de evolución lenta (fluoric acid).

Relaciones

Cuando collins. mejora pero no cura las hemorroides aesc. es el remedio indicado si se le prescribe entonces.

Es útil después de nux vom. cuando éste mejora sin curar.

Sigue bien a sulfur, el cual a su vez actúa bien después de aesc.

AETHUSA CYNAPIUM

Aethusa cynapium, o pequeña cicuta, o falso perejil, planta anual de la familia de las Umbelíferas, crece en lugares cultivados o en jardines abandonados.

A menudo es confundida con el perejil y esta confusión ha dado lugar a graves accidentes; se la puede reconocer por su tallo rojizo en la base, por sus hojas de un verde más oscuro que el perejil comestible y que exhalan un olor desagradable al frotarlas entre los dedos, inversamente al olor aromático a agradable del perejil comestible; por último, se la reconoce también por sus involucelas o verticilos de brácteas unilaterales colgantes.

La tintura madre, cuyas diferentes dinamizaciones se obtienen por dilución Hahnemanniana, se prepara con las puntas de los tallos en flor.

Acción general del medicamento

Aethusa cynap. desarrolla particularmente bien su acción en el niño mediante SINTOMAS CEREBRALES Y NERVIOSOS RELACIONADOS CON TRASTORNOS GASTROINTESTINALES BIEN EVIDENTES tales como vómitos, diarrea pertinaz, con facies hipocrática, gran postración, frecuentes convulsiones, tos que aparece violentamente durante los calores del verano en niños con alimentación mal balanceada y a los que se les da demasiado pecho.

Una característica del efecto del remedio es SU VIOLENCIA; así son los vómitos, las convulsiones, los dolores y el delirio.

Otra característica del remedio es la POSTRACIÓN Y SOMNOLENCIA; hay tanta debilidad mental como física y un excelente síntoma mental lo constituye la INCAPACIDAD DE PENSAR Y FIJAR LA ATENCIÓN; prescripto sobre la base de este síntoma, el remedio ha ayudado mucho a escolares en su estudio (Clarke).

La postración podrá ser muy marcada como la de ars. alb. pero la ausencia de sed en aeth. evitará confundir ambos remedios (Nash).

Finalmente, la INTOLERANCIA A LA LECHE, síntoma característico, puede resultar el síntoma más importante del remedio, y es más marcado en los niños, en los que la encontramos principalmente DURANTE LA DENTICIÓN O DURANTE LOS GRANDES CALORES DEL VERANO; LA LECHE ES VOMITADA NI BIEN INGERIDA; LUEGO DE LO CUAL, POR LOS GRANDES ESFUERZOS REQUERIDOS, EL NIÑO QUEDA DEPRIMIDO Y SUMIDO EN UN SOPOR o bien, LA LECHE QUEDA UN TIEMPO EN EL ESTOMAGO PARA SER FINALMENTE EXPULSADA EN GRANDES CUAJARONES ÁCIDOS, a veces tan grandes que el niño parece expulsarlos con dificultad; este estado puede conducir al cólera infantil con diarrea verde, cólicos, convulsiones, atrepsia rápida y muerte.

Kent ofrece una buena descripción en el siguiente caso de aeth, en el niño : "Bruscamente, durante los calores del verano el niño ya no digiere la leche; antes que pueda ser digerida, es vomitada y al mismo tiempo aparecen deposiciones líquidas amarillo-verdosas; casi en seguida toma una facies hipocrática impresionante, de una palidez

azul-blancuzca marcada sobre todo alrededor de nariz y labios, ojos hundidos, rasgos faciales muy profundos, con aspecto moribundo; cae en profundo sueño del que despierta sólo para mamar nuevamente, pero en seguida vuelve a vomitar; la leche ingerida produce otra diarrea y se vuelve a dormir aniquilado; y si no interviene aeth. el niño no tardará en morir.

"A veces en medio de este estado puede haber convulsiones, delirio y excitación".

Modalidades

Agravación

De 3 a 4 de la madrugada y durante la mañana; por el calor del verano.

Después de haber comido o bebido ESPECIALMENTE LECHE.

Después de haber vomitado, de defecar, de una convulsión.

Mejoría

Al aire libre y acompañado.

Síntomas mentales

Es agotado, ansioso, grita, delira.

Extrema postración; gran debilidad; el niño no puede quedarse sentado, no puede tener la cabeza derecha (abrot.); postración con gran deseo de dormir.

INCAPACIDAD DE PENSAR Y FIJAR LA ATENCIÓN; fatiga cerebral (picri. ac.).

Idiotéz en los niños.

Inconsciencia, delirio, le parece ver ratas y ratones correr por la habitación.

Cara

La cara muestra una expresión de gran ansiedad, de dolor; los rasgos son profundos, marcados, la línea que limita el labio superior desde los ángulos de las fosas nasales hasta las comisuras labiales, está profundamente delineada.

Facies hipocrática.

Aparato digestivo

AUSENCIA COMPLETA DE SED, como en apis y puls., y a la inversa de ars. alb., lo que permite su diferenciación, pues ambos tienen la misma postración y ansiedad marcadas.

Marcada INTOLERANCIA POR LA LECHE; no puede digerirla bajo ninguna forma; la vomita cuajada ni bien la ha ingerido; DESPUÉS DEL VOMITO, ESTA EXTREMADAMENTE DEBILITADO, POSTRADO, EN UN SOPOR, IGUAL QUE DESPUÉS DE LAS DEPOSICIONES O DE LAS CONVULSIONES.

Esta intolerancia por la leche relaciona al remedio con calc. ostr., magn. mur., magn. carb., sulfur, carb. veg., etc. los que no obstante pueden diferenciarse fácilmente de aeth. por sus características particulares.

DIARREA ACUOSA, VERDE, precedida de cólicos, acompañada de tenesmo y seguida de gran postración y profunda somnolencia.

Espalda y extremidades

Convulsiones durante las cuales el pulgar se cierra hacia el interior del puño, la cara se enrojece, los globos oculares están bajos en vez de ser girados hacia arriba o al costado; las pupilas están fijas y dilatadas; hay espuma en los labios; los maxilares están apretados; el pulso es corto, lento y duro (Allen).

Relaciones

Aeth. puede compararse a ant. crud., ars. alb., calc. ostr., y sanic.

Complementarios

Calc.

Antídotos

LOS ÁCIDOS VEGETALES. ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

AGARICUS MUSCARIUS

Agaricus muscarius, llamado también amanita muscaria, o agaricus matamoscas, o falso Fungus, es un hongo del género amanita y de la familia de las Agaricáceas.

Es muy común en Francia y Norte de Europa, lo mismo que en el Asia; se lo encuentra en lugares secos donde crece preferentemente.

Posee un alcaloide altamente venenoso, la muscarina, y por su semejanza con el agaricus aurantiacus u hongo verdadero que es comestible, da lugar a graves errores, provoca grandes envenenamientos.

Tampoco hay que confundirlo con el agárico blanco o polyporus officinalis, de empleo conocido para calmar las transpiraciones de los tísicos.

El Agárico Blanco, también denominado polyporus officinalis Fries (Basidiomicetas), es un hongo que crece sobre los abetos y las malezas de los Alpes y el Delfinado.

Encierra, además de una especie de resina, un principio activo : la agaricinao ácido agaricínico, cuya acción farmacodinámica puede sintetizarse de esta manera : se ejerce principalmente sobre el bulbo raquídeo y centros vaso motores a los que excita, produciendo en ellos la elevación de la tensión sanguínea y la reducción del tono cardíaco, al que paraliza en seguida con caída de tensión.

Agota la secreción sudoral paralizando, según Hofmeister, el sistema nerviosoperiférico de las glándulas sudoríparas. Hay que anotar que no actúa sobre las secreciones salivares o intestinales, alas que parece dejar indemnes.

Sin embargo a veces se nota una hipersecreción salivar y sobre todo intestinal,pero ello es probablemente debido a que se ha empleado agaricina impura, mezclada con la resina de la planta, de efectos drásticos.

Para preparar el remedio, se procede a limpiar el pie y el sombrero delhongo, luego se los corta en pedacitos que se ponen a macerar en alcohol; la tintura madre así obtenida, sirve para producir las sucesivas dinamizaciones.

Acción general del medicamento

Agaricus parece ejercer su influencia EMBRIAGADORA como el alcohol, el opio o el hachich; la exaltación con desordenes funcionales que conducen a la supresión de la actividad, a causa de este tipo de EMBRIAGUEZ, se manifiesta no sólo en los centros cerebrales sino también en otras partes del sistema nervioso; los NERVIOS SENSITIVOS pierden lo que Hughes denomina su poder de resistencia; ejerciendo la más leve presión sobre cualquier punto del cuerpo, persiste la sensación de dolor aún después que la presión ha cesado.

Los NERVIOS MOTORES sufren grandemente; las contracciones coreicas muy marcadas son otra consecuencia de la acción de agaric., y también se han desarrollado en ciertos experimentadores síntomas de afección medular profunda que se transmiten principalmente a las vías motrices.

Agaric., parece envenenar también LA SANGRE; se han notado numerosossíntomas de alteraciones septicémicas en los individuos que están bajo su influencia venenosa.

Por último, y como otra consecuencia de su acción, LAS MUCOSAS estánirritadas y se cubren de una mucosidad amarilla, mientras SOBRE LA PIEL SE DESARROLLA una erupción liquenoidea con prurito, picazón y sensación de quemadura.

Características

CONSTITUCIÓN Y TIPO : Agaric., conviene a individuos rubios o castaño claros con piel y músculos blandos.

También se prescribe a menudo a personas ancianas, cuya circulación es débil e indolente (Allen).

Es particularmente útil en los bebedores, especialmente para sus doloresde cabeza y las secuelas de todo exceso (lobelia, nux vom., ranunc.) (Allen).

ESPASMOS, SACUDIDAS MUSCULARES Y TEMBLORES :Puede encontrarse este importante grupo de síntomas en cualquier parte del cuerpo, afectando a cualquier grupo de músculos.

Estos espasmos o sacudidas musculares pueden originar verdaderos síntomas deCOREA para cuyo tratamiento agaric. se menciona en primer lugar : MOVIMIENTOS COREICOS MUY VARIADOS; SENSACIÓN DE COMEZÓN EN LOS PÁRPADOS O CUALQUIER OTRA PARTE DEL CUERPO, COMO SI DICHAS PARTES SE HUBIESEN CONGELADO; PÁRPADOS EN CONSTANTE MOVIMIENTO Y COLUMNA VERTEBRAL SENSIBLE AL TACTO.

SACUDIDAS EN GRUPOS MUSCULARES VARIADOS; INCOORDINACION DE MOVIMIENTO, DEBILIDADGENERAL Y TEMBLOR.

He aquí un conjunto de síntomas muy marcados en el medicamento y la resultantecasi constante de su acción sobre el sistema nervioso.

Podemos evocar otros medicamentos juntamente con agaric. para eltratamiento de la corea : ars. alb. es útil en los casos obstinados de corea, en que se agrega un particular síntoma de inquietud en las piernas, obligando al paciente a cambiar de lugar los pies frecuentemente, o caminar para calmarse.

Cimicif., cuando la corea afecta sobre todo los movimientos del costadoizquierdo y cuando la enfermedad está asociada a mialgias, o es consecuencia de un desplazamiento uterino.

Crocus es el medicamento de las histéricas con constricciones coreiformes deciertos grupos musculares.

Cuprum para las coreas periódicas con movimientos convulsivos que comienzan conlos dedos de las manos o los pies, o en los mismos pies, para extenderse progresivamente en seguida a todo el cuerpo.

Ignat. es útil en la corea de origen emotivo.

Mygala lasiod, presenta el siguiente cuadro sintomático : tendencia a debilidadmental o depresión; dolor intenso en la frente; constricciones y espasmos constantes en los músculos de brazos y piernas, preferiblemente del lado derecho; falta de control muscular; cuando el paciente trata de pone la mano sobre la cabeza, al llegar a ella su mano es violentamente proyectada hacia adelante, atrás o un costado; cuando realiza un esfuerzo para hablar sus palabras salen bruscamente, como una explosión.

Stram. es el remedio para la corea de eclosión violenta; la expresión facialcambia continuamente, de repente ríe, de repente parece asombrado, saca la lengua rápidamente; la cabeza sufre un movimiento alternante que la lleva hacia adelante o hacia atrás; movimientos de torsión espasmódica en todo el cuerpo, extremidades sin cesar en movimiento y giros graciosos; puede haber tartamudeo, se asusta fácilmente, despierta aterrorizado o estando dormido levanta espasmódicamente la cabeza de la almohada.

Tarentula tiene movimientos espasmódicos constantes en todo el cuerpo, tan violentos que a veces debe permanecer acostado.

Puede haber localización en pierna y brazo derechos; los movimientos persisten durante el sueño; agravación, por el ejercicio y el tacto, mejora por la música.

Verat. vir. es útil cuando además de contracciones espasmódicas se presentan las características propias del remedio.

Zincum met. es el medicamento de la corea que aparece después de un susto o por supresión de una erupción; las sacudidas son peores al atardecer, después de haber bebido vino o durante el reposo; constante agitación de los pies.

Zizia (thapsium aureum) se prescribe cuando los movimientos coreicos prosiguen durante el sueño.

Sensaciones particulares.

SENSACIÓN DE REPTACIÓN, DE ESTREMECIMIENTO, COMO HORMIGAS QUE CORRIEN, no sólo a flor de piel sino en lo más profundo de los músculos.

SENSACIÓN COMO SI LE TOCAREN Y PINCHAREN CON AGUJAS DE HIELO.

Modalidades

Lateralidad

Dolores en diagonal; izquierda superior y derecha inferior.

Agravación

AL AIRE FRÍO; muy sensible al frío; por la mañana; antes de una tormenta; POR EL ESFUERZO MENTAL; el prurito, ardor, pinchazos pueden ser desencadenados por ejercicio mental intenso, y se calman por el movimiento. POR EL COITO; todos los síntomas de agaric. se agravan por la relación sexual, especialmente los que interesan a la médula; es muy útil para las casadas jóvenes que padecen un desfallecimiento histérico después de la relación sexual.

Otros remedios que presentan esta agravación : calad., china, kali carb., nux vom., phosph., posph. ac., selen., y sepia.

Mejoría

Por el movimiento lento.

Síntomas mentales

INDIVIDUOS QUE DAN LA IMPRESIÓN DE DESARROLLO CEREBRAL TARDÍO; NIÑOS QUE TARDAN EN APRENDER, HABLAR Y CAMINAR, combinando en su psiquismo los caracteres de otros remedios : natr. mur., que tarda en aprender a hablar, y calc. ostr. que es lento para aprender a caminar, debido al mal desarrollo óseo; en cambio, en agaric. esto es debido a un desarrollo lento de la inteligencia; toda la esfera psico-mental está como paralizada.

Esto nos recuerda a borax y sobre todo a baryta carb., pero en estos dos últimos sus grandes particularidades impiden toda confusión.

Paciente inquieto, áspero, triste, desalentado, a veces despreocupado.

Gran variabilidad en el humor, irritabilidad, depresión mental consecuencia de surmenage o trabajo intelectual prolongado.

Pereza y terror al trabajo intelectual, que lo agrava; horror a conversar, le parece no poder encontrar las palabras para expresar sus ideas; confusión mental y pérdida de memoria.

Delirio alternativamente alegre o triste con gran locuacidad; habla, canta, ríe, profetiza, hace versos; o bien presenta un delirio furioso; quiere salir de su lecho, cueste lo que cueste; delirio acompañado de carfología.

Sueño

Durante el día ESTA SOMNOLIENTO y bostezo sin cesar.

Ammon. carb. tiene somnolencia durante el día e insomnio de noche, con grandebilidad general.

Ant. crud. tiene gran somnolencia diurna particularmente en ancianos, donde se presenta con trastornos gástricos propios del remedio.

China está somnolienta de día, acompañada de gran debilidad ocasionada por pérdida de líquidos humorales.

Lycop., tiene a veces somnolencia diurna, pero con las demás características del remedio.

Natr. carb. se despierta temprano y está somnolienta todo el día, y tiene una gran debilidad causada por los calores estivales.

Phosph. es somnolienta después de comer, y de noche el sueño es entrecortado por frecuentes despertares.

En cuanto a agaric., de día es somnolienta y de noche tiene sueño agitado y liviano, que en nada repara sus fuerzas, por el contrario le irrita; tiene infinidad de sueños entrecortados por despertares frecuentes, y así, a la mañana no se decide dejar el lecho.

Cabeza

CONSTANTEMENTE EN MOVIMIENTO, como durante la corea.

Puede haber ERUPCIONES SOBRE EL CUERO CABELLUDO, EXCEMATOSAS CON COSTRAS.

También puede haber COMEZONES SIN EXCEMA NI COSTRAS, peor de mañana al levantarse, que le obligan a rascarse; después de rascarse, sensación de FRÍO HELADO en la región pruriginosa.

Baryta carb. tiene mucho prurito en el cuero cabelludo, más detrás de las orejas y en la nuca.

Lycop. tiene crisis violentas de comezón en el cuero cabelludo, particularmente después de haber tenido calor, en seguida de un ejercicio violento.

Mezer. tiene gran comezón en el cuero cabelludo con la siguiente característica : el rascarse hace cambiar de lugar al prurito, y no lo mejora; al contrario, lo agrava.

Oleander tiene prurito en el cuero cabelludo, principalmente en parte posterior de la cabeza y detrás de las orejas, y el rascado calma temporalmente la sensación.

No olvidemos a sulfur entre estos remedios con la característica de que el rascado produce sensación de voluptuosidad y en seguida, una desagradable sensación de ardor.

Cefalalgia como si un clavo estuviese clavado en el lado derecho de la cabeza.

Dolor como si la cabeza estuviese atravesada con agujas de hielo.

Vértigo como el de la embriaguez.

Principalmente de mañana al aire libre; la luz solar produce inmediatamente vértigo que le hace caer.

Ojos

MOVIMIENTO CONSTANTE DE LOS PÁRPADOS.

NYSTAGMUS, peor al leer o mirar fijo (ars. alb., cicuta, puls., sulfur).

Errores de apreciación de figuras y colores (Kent).

Oídos

Prurito en las orejas con enrojecimiento y dolor ardiente como de sabañones.

Cara

RUBOR en las mejillas con comezón y ardor como de sabañones.

Espasmos en músculos faciales.

CÓREA.

NEURALGIA FACIAL con sensación de agujas de hielo pinchando el nervio afectado. (v. aconit.).

Aparato digestivo

TEMBLOR LINGUAL QUE DIFICULTA LA PALABRA; la lengua tiembla, es agitada por contracciones y sacudidas espasmódicas que impiden articular.

Al sacar la lengua, tiembla como en lachesis.

Trastornos gástricos con punzadas dolorosas en la región hepática.

Órganos genitales

Fríos y arrugados.

Gota militar.

Agaric. es útil en la comezón, pinchazos en la uretra. (petrol.).

LA ORINA PARECE FRÍA AL PASAR POR LA URETRA.

AGRAVACIÓN POR EL COITO; malestares después del coito, excitación sexual, excesos, etc.

En el hombre, debilidad, en la mujer desfallecimientos.

SENSACIÓN DE PESADEZ EN EL BAJO VIENTRE, como si el útero fuera a caer (sepia, murex, lilium), en una mujer agitada, nerviosa, delgada y espigada, acompañada de la reptación del remedio y sensación de picazón.

Todos los síntomas generales **EMPEORAN DURANTE LAS REGLAS** (act. rac.) y mejoran antes o después de ellas; agravación de los síntomas cardíacos y prolapso uterino al término de las reglas (Kent).

Leucorrea abundante, ácida, escoriante.

Comezón y ardor en los senos.

Aparato respiratorio

NARIZ :

Coloración rojo azulado de la extremidad nasal como si estuviese congelada, pudiendo haber también sensación de prurito y ardor.

Para los ancianos bebedores cuya nariz presenta estas características, además de agaric. son útiles ledum y lachs (Kent).

Catarro crónico con sequedad o costras.

LARINGE, TRAQUEA, PULMONES :

Tos seca, frecuente, espasmódica, provocada por cosquilleo en laringe y tráquea por la noche, al quedarse dormido.

Violento ataque de tos que puede ser detenido por fuerza de voluntad.

Expectoración de bolitas mucosas.

TOS QUE TERMINA EN ESTORNUDO.

Senega tiene tos desgarrante con sensibilidad en las paredes pectorales y termina en estornudo.

Squilla marina tiene tos violenta, fatigante, con abundante expectoración salada y viscosa, acompañada de estornudo; además al toser deja escapar, involuntariamente, un poco de orina.

Respiración corta y oprimida.

Aparato circulatorio

Palpitaciones cardíacas dolorosas.

Sensación dolorosa como si el tórax resultase estrecho.

Pulso intermitente e irregular.

Espalda y extremidades

Rigidez DE LA COLUMNA VERTEBRAL, SENSACIÓN DE QUE SE VA A QUEBRAR AL AGACHARSE.

DOLORES DE TODA CLASE A LO LARGO DE ELLA ardientes y punzantes.

Sensibilidad de la espina dorsal al tacto, especialmente en la nuca y entre los hombros (aescul.).

SENSACIÓN DE HIELO O DE AGUA FRÍA CORRIENDO A LO LARGO DE LA COLUMNA VERTEBRAL.

Abies canad. tiene sensación de agua fría entre los hombros con sensación de que la sangre fuese agua helada.

Lil. tig. tiene sensación de agua fría en la espalda con dolores y temblores.

Lycop. tiene sensación de agua fría y tirones entre los hombros.

Puls. tiene sensación de agua fría con dolores latentes en nuca y cuello.

PAREZIA MUSCULAR, ESPASMOS, SACUDIDAS MUSCULARES, TEMBLORES, DEBILIDAD GENERAL; INCOORDINACION DE MOVIMIENTOS, MOVIMIENTOS TORPES DE MANOS Y DEDOS : AL TOMAR LOS OBJETOS SE LE CAEN (apis).

Temblores de manos.

Movimientos coreicos en los brazos que pueden estar débiles y entumecidos.

Gran debilidad de miembros inferiores; paresia con tendencia a aumentar y provocar verdadera parálisis.

Dolores en las piernas como de sacudidas eléctricas.

ENROJECIMIENTO EN LOS DEDOS CON COMEZÓN Y ARDOR COMO DE SABAÑONES.

Piel

PRURITO INTENSO EN TODO EL CUERPO, PRINCIPALMENTE OREJAS, CARA, NARIZ, DEDOS DEL PIE, CON ENROJECIMIENTO, PRURITO Y SENSACIÓN DE ARDOR, como si estuviese congelada.

Agaric. es indicado para los sabañones, con ars. alb., que tiene sabañones con hinchazón, comezón y ardor, peor por el frío, mejor por el calor.

Nitr. ac., tiene sabañones ulcerados extremadamente sensibles sobre todo por la noche, y que sangran fácilmente.

Petrol. tiene sabañones con prurito y ardor como fuego, y extremidades digitales agrietadas todos los inviernos.

Carbo. an., tiene sabañones que empeoran a la noche, en el lecho y por el frío.

Apis es el remedio de los sabañones empeorados por el calor y mejorados por el frío.

Sulfur es indicado para los sabañones que empeoran por el calor de la cama.

Relaciones

Antídotos

Absinthium, camphora, coffea, rhus tox.

AGNUS CASTUS

Agnus castus, o agnocasto, o sauzgatillo común, es un arbusto de la familia de las Verbáceas, cultivado en muchos jardines por la vistosidad de sus hojas, pero que se encuentra en estado salvaje en toda la región mediterránea, Provenza, Grecia, donde crece en terrenos arenosos y al pie de las rocas.

En la antigüedad, los griegos consideraban a esta planta como al símbolo de la castidad, y las mujeres en ausencia de sus esposos cubrían el lecho con hojas de este arbusto; así le dieron el nombre de "agnos" que significa casto, al cual le fue más tarde adicionado el término latino "castus", que significa lo mismo.

La tintura madre se prepara con las hojas y bayas frescas.

Acción general del medicamento

El punto de acción del remedio son los ÓRGANOS GENITALES; disminuye la vitalidad sexual a la vez que causa una gran depresión mental y marcada pérdida de la vitalidad nerviosa.

El remedio actúa en ambos sexos indistintamente, si bien parece desarrollar mejor su acción en la mujer, y los excesos genitales, la masturbación, etc., *rean* un campo favorable a la acción de esta droga.

SUJETOS DE CONSTITUCIÓN LINFÁTICA, PREMATURAMENTE ENVEJECIDOS, GASTADOS POR EXCESOS SEXUALES O HÁBITOS SOLITARIOS, CON GRAN DEBILIDAD SEXUAL, ÓRGANOS GENITALES FLÁCIDOS E INERTES; SUJETOS TRISTES, DESANIMADOS, APÁTICOS, QUE SE LAMENTAN DE SU VIDA DESPERDICIADA.

En estos sujetos no tardan en desarrollarse síntomas angustiosos : pierden la memoria, están ansiosos, desesperados, con ideas de suicidio, a veces temen infundadamente una muerte próxima.

Dolores de cabeza, cara y dientes; hormigueo de piel; síntomas nerviosos muy numerosos; fobia, dolores desgarrantes de cabeza; el menor alimento les causa trastornos gástricos, náuseas.

Los músculos están blandos; vísceras abdominales caídas; gran debilidad en colon y recto, y el resultante escaso poder de expulsión causa CONSTIPACIÓN.

La deposición sale a medias, vuelve a entrar, como en silicea, sanicula y thuya es gruesa y dura; flatulencia perpetua con gases ruidosos y malolientes; prurito, excoriaciones y ardor en el ano.

Tos cortante, sudores nocturnos, músculos cansados y extremidades frías.

"El ejercicio y el frío aumentan los malestares, quieren estar tranquilos y quietos.

A menudo se vuelven neurasténicos.

En fin, necesitan el remedio.

"El hombre joven que ha abusado sexualmente, principalmente abusos solitarios, que ha tenido blenorragia, que sufre de frigidez sexual y emisiones seminales durante las deposiciones; de recién casados ya son impotentes, su joven esposa no les causa ninguna erección aún cuando haga poco tiempo que haya tenido algún éxito clandestino; todo se reduce a algunas erecciones matinales; está extremadamente deprimido, desolado, su corazón desgarrado, y se lamenta de su vida pasada; agnus castus arreglará todo esto.

"La mujer joven que haya practicado onanismo, no encuentra goce alguno con su esposo a pesar de amarlo.

A veces no tiene reglas, o presenta algunas hemorragias uterinas; vagina relajada, prolapso uterino frecuente con leucorrea parecida a clara de huevo.

También esto se arregla con agnus castus.

"En este tipo de mujeres la leche no aparece después del alumbramiento se hace escasa y se retira al poco tiempo.

Este remedio le devolverá una leche abundante" (Kent).

Para concluir, falta enunciar un síntoma particular que menciona Allen : la paciente siente permanentemente olor a arenque o almizcle, lo cual es imaginario.

Estos fenómenos de parosmia relacionan al remedio con : anacard., que tiene perversión imaginaria del olfato y percibe olores como a madera quemada o estiércol de paloma; bell., kali bichr., merc., phosph., puls., etc.

Relaciones

Calad., y selen., ACTÚAN BIEN DESPUÉS DE agn. cast. en el tratamiento de la debilidad de los órganos genitales e impotencia (Allen).

ALLIUM CEPA

Allium cepa, o cepa vulgaris, o cebolla, es una hortaliza de la familia de las Liliáceas, lo suficientemente conocida por lo que no se necesita mejor descripción.

Se preparan las diferentes dinamizaciones homeopáticas partiendo de latintura madre obtenida con el bulbo fresco macerado en alcohol.

Acción general y características

Considerada en conjunto, allium cepa provoca CATARRO AGUDO DE LAS MUCOSAS DE LOS OJOS, NARIZ, LARINGE Y HASTA DE UNA PORCIÓN DEL TUBO DIGESTIVO, CON SECRECIONES EXAGERADAS Y DOLORS NEURÁLGICOS.

Modalidades

Lateralidad

IZQUIERDA.

Agravación

Al atardecer y a la noche, a la hora de acostarse tiene este remedio la mayor agravación.

EN HABITACIÓN CALIENTE : todos los malestares se agravan por el calor, empeoran en habitación caliente, con excepción de la picazón de garganta que a veces es excitada por el aire frío; pero el paciente está mejor al aire frío y es sensible al calor.

Mejoría

EN HABITACIÓN FRÍA, AL AIRE LIBRE.

Cabeza

Dolor de cabeza catarral, principalmente en la frente, que empeora en habitación caliente y a la noche, acompañado de sensación de confusión, de plenitud, de pesadez.

Ojos

Ojos enrojecidos, hinchados, arden con PROFUSO LAGRIMEO pero SIN IRRITACIÓN, MIENTRAS QUE LA SECRECIÓN NASAL ES BASTANTE IRRITANTE (euphrasia es lo contrario); GRAN FOTOFobia.

Oídos

Dolor de oídos con punzadas en la trompa de Eustaquio, coriza; dolores profundos en la garganta que se extienden a los oídos, y la inflamación del resfrío de cabeza tiende a llegar a garganta, laringe y oídos.

Dolor de oídos que pueden llegar a secreción purulenta; el coriza produce ruidos y tintineos en los oídos.

Dolores picantes en los oídos con coqueluche, laringitis y coriza.

Puls. tiene una afinidad tan grande para el oído que cura el dolor de oídos en casi todos los niños que gritan lastimeramente; pero los gruñones, que nunca se contentan, que rechazan todo lo pedido, que golpean a su niñera o enfermero, requieren chamom.; la mayoría de los dolores de oído en los niños puede curarse con puls., chamom., y all. cepa (Kent).

Aparato digestivo

La cebolla es un medicamento extremadamente FLATULENTO.

Cólicos gaseosos; dolores cortantes, picantes, desgarrantes, que el niño siente en el bajo vientre, que lo hacen tiritar y lo obligan a doblarse en dos.

Cólicos que nacen en la región hepática y se extienden a todo el vientre, peores alrededor del ombligo y sentados (Kent).

Ano sensible, sangra a veces.

Aparato respiratorio

NARIZ :

All. cepa es empleado principalmente en los resfríos que comienzan por coriza, luego se inflama la garganta, la laringe y finalmente los grandes bronquios.

Este tipo de resfrío, llamado a veces gripe o influenza es provocado por vientos fríos húmedos y penetrantes; a veces hay dolor de cabeza congestivo.

Sensación de aspereza en la nariz, lagrimeo abundante pero suave, mientras por las fosas nasales corre un líquido acuoso sumamente irritante, con muchos estornudos.

Esta sensación de aspereza gana rápidamente la garganta, la laringe, el pecho y al cabo de 24 hs se presenta una tos desgarrante excitada por una sensación de picazón en la laringe, principalmente cuando el paciente está acostado por la noche en una habitación caliente.

Es asombroso lo rápido que all. cepa destruirá este catarro (Kent).

Coriza con secreción que comienza con muchos ESTORNUDOS; luego aparece secreción acuosa constante, goteando de la nariz, ardiente como fuego, excoriando el labio superior y los bordes nasales, mientras el lagrimeo ocular es suave (euphrasia es lo contrario); al mismo tiempo la congestión de la mucosa nasal es tal que el paciente experimenta sensación de latidos y ardor; siente además dolores en los maxilares, toda la cara y hasta la cabeza; los ojos no pueden tolerar la luz.

En fin, la coriza comienza en la fosa nasal izquierda para en seguida pasar a la derecha y el enfermo se siente afiebrado, ardiente, sediento.

Catarro con fiebre de heno; en la época propicia el coriza comienza con estornudos matinales violentos y GRAN SENSIBILIDAD AL OLOR DE LAS FLORES.

All. cepa podrá no curar radicalmente la enfermedad, hará desaparecer en cambio los síntomas desagradables de la misma.

La crisis primaveral anual debe considerarse como la eclosión de una enfermedad crónica.

En este caso, el tratamiento del mal crónico deberá comenzar una vez desaparecida la fiebre de heno y el catarro.

En este período puede atacarse con éxito y constitucionalmente la enfermedad, cuyo transcurso se notarán crisis y síntomas bien diferentes a los del estado agudo (Kent).

LARINGE Y BRONQUIOS :

Laringitis aguda con ronquera, sensación de aspereza y desgarramiento en cada acceso de tos.

Excitación por cosquilleo de laringe provocado por inhalaciones o aspiraciones de aire frío y en habitación caliente estando acostado.

Tos espasmódica.

Tos ronca, resonante, espasmódica, excitada por picazón laríngea.

La tos produce dolores laríngeos tan agudos que el paciente hace esfuerzos por contenerla.

Sensación de que la tos le desgarrar la garganta.

Coqueluche con sensibilidad dolorosa de laringe; el niño se agita y temetose por los dolores que le causa.

A veces esta coqueluche viene acompañada de trastornos gástricos : vómitos, flatulencia; el niño emite gases ofensivos y se dobla en dos por el cólico (Kent).

Así como el aire frío aumenta la tos y la dificultad para respirar, el calor aumenta la picazón y el dolor y provoca también tos.

En consecuencia : si la picazón laríngea, la tos proveniente de inspirar aire frío, la agravación en habitación caliente, agravación nocturna con tos que desgarrar la laringe, están reunidos en un paciente, all. cepa es el remedio.

Expectoración mucosa blanca, espumosa, sobre todo de noche sensación de obstrucción de la respiración en medio de la parte superior pectoral.

Espalda y extremidades

Neuritis traumática del tipo encontrado en un muñón después de una amputación : dolores insoportables que agotan las fuerzas del paciente (Kent).

Relaciones

Antídotos

Arnica, chamom, verat. alb., nux vom., thuya.

Complementarios

Phosph., puls., thuya, sarsap.

Comparables

Acon., euphr., gels., ipeca, cali hydr.

Remedios que siguen bien

Calc., silicea.

Remedios con los que no se aviene

All. sativa, aloe, scilla.

ALOES SOCOTRINA

Aloes o aloe socotrina, planta Liliácea, florece en verano en países meridionales.

Las diferentes dinamizaciones homeopáticas se obtienen partiendo de latintura madre preparada con el jugo espeso de la planta.

Acción general del medicamento

Actúa sobre el SISTEMA VENOSO y los órganos donde dicho sistema predomina, HÍGADO y BAZO.

Pero sus efectos se sienten principalmente en el sistema de la vena porta; por la PLÉTORA que causa provoca en ambos sexos IRRITACIÓN DE TODOS LOS ÓRGANOS DEL BAJO VIENTRE con marcada predilección por el APARATO GENITAL FEMENINO.

Dice kent : "aloe" se parece mucho a aesculus en que provoca un infarto, unaplétora venosa que produce una sensación de plenitud en todo el organismo, localizándose más en las venas del sistema portal con gran sensación de congestión hepática, abdominal, intestinal y rectal".

Dice Manquat en su Tratado de Terapéutica: "aloe congestiona el recto por intermedio de las venas hemorroidales, y en particular los órganos genito-uritarios juntamente con todos los del bajo vientre; puede resultar una sensación de pesadez renal y en las caderas, hemorroides en los predispuestos a ellas, deseos frecuentes de orinar y hasta aborto.

Gubler atribuye la congestión rectal, acción biliar sobre la misma región, y efecto de la éstasis venosa del hígado sobre las venas mesentéricas".

En resumen, aloe causa efectos fisiológicos de superactividad, deplenitud venosa tal, que por la intensidad de su irritación probablemente corresponda mejor al período agudo de los cuadros en los que es indicado, debidos a congestión y plétora venosas.

Características

CONSTITUCIÓN Y TIPO : "Es indicado para los grandes comilones, pletóricos, sedentarios, intoxicados por las sales de uratos y oxalato de cal; para los diabéticos, cuya orina reduce el licor de FEHLING, algunas dosis de aloe y de oxalic acid. bastan para descongestionar el hígado, ese gran amo del metabolismo alimenticio, y el bulbo, particularmente en la base del 40. ventrículo, con lo que los pseudo-diabéticos se sienten mejor y su orina se normaliza. (Dr. Amieux en "La Revue Française d'Homéopathie" - Abril 1924).

Restablece el equilibrio fisiológico cuando el paciente ha ingerido demasiadas drogas, especialmente cuando a raíz de ello no se distinguen los síntomas patológicos de los drógaes.

"ES UN CLARIFICADOR DE SINTAMOS" como sulfur y a veces nux vom. (Dr. Amieux, loc. cit.).

LAS DEPOSICIONES Y LOS SINTAMOS INTESTINALES son tan importantes que aveces ellos solos determinan la indicación del remedio : SENSACIÓN DE PLENITUD EN HÍGADO, ABDOMEN E INTESTINOS, LO MISMO QUE EN EL RECTO.

A esto se unen las HEMORROIDES.

Siente DOLORS ABDOMINALES QUE LE OBLIGAN A EVACUAR, como nux vom.; dolores que circundan el ombligo y se irradian al recto.

Trastornos disintéricos o diarreicos; en la diarrea, LAS HECES SON EXPULSADAS EN UN CHORRO ACUOSO AMARILLO, OFENSIVO, EXCORIANTE, ARDIENTES COMO FUEGO Y DEJAN EL ANO DOLORIDO, o bien la materia expulsada es como gelatina.

DIFÍCIL RETENCIÓN DE LAS HECES, pues la materia escapa espontáneamente.

No puede dar salida al gas sin que al mismo tiempo salgan heces.

Con esta diarrea de aloe, LOS GASES DISTIENDEN CONSIDERABLEMENTE EL ABDOMEN produciendo sensación de hinchazón y plenitud por lo que el paciente debe ir con frecuencia al baño.

Esta PERDIDA DEL TONO ESFINTERIANO ANAL ha permitido resultados brillantes en pequeños que al comenzar a caminar dejan escapar involuntariamente heces bajo la forma de pequeñas masas mucosas y sustancias *amarillas*.

Esta pérdida de tono del esfínter se presenta no sólo en las formas diarreicas, sino bajo la forma de fragmentos duros y redondos, sin que el paciente se de cuenta de ello.

En resumen, TODA INGESTIÓN OBLIGA AL PACIENTE A EVACUAR CON PRISA Y PRECIPITACIÓN.

Esta diarrea puede ser ocasionada también por comer OSTRAS FUERA DE ÉPOCA, durante grandes calores o en la época de su reproducción.

BEBER AGUA da igual resultado.

El efecto de comer ostras puede ser alejado o atemperado con lycop., pero si dalugar a algún tipo benigno de cólera, el remedio es aloe.

Modalidades

Agravación

DESPUÉS DE HABER COMIDO O BEBIDO : ello provoca cólicos, diarrea, aunque a veces los cólicos pueden ser seguidos de CONSTIPACIÓN.

POR LA CERVEZA; el remedio es útil para los malestares causados por la cerveza aún en viejos bebedores (kali bichr).

POR LAS OSTRAS (lycop).

A LA MAÑANA TEMPRANO.

POR LA VIDA SEDENTARIA y el CALOR (igual que todos los remedios venenosos).

Mejoría

POR UN VIENTO O POR UNA DEPOSICIÓN.

POR EL TIEMPO FRÍO Y EL AGUA FRÍA, que excitan la circulación.

Síntomas mentales

Sumamente excitable durante el sufrimiento, localizado en el vientre; fácilmente enervado e irritable por las crisis de cólicos; descontento y enojado consigo mismo; irritado por sus males, la vida es para ellos una carga; aversión por el movimiento, odia a la gente.

Estos síntomas son propios de los viejos bebedores cansados, flemosos, hipocondríacos.

Cabeza

Congestión manifiesta simultáneamente con congestión y plétora intestinal, consecuencia de éstasis venosa unida a la del sistema portal; dolor de cabeza frontal, pesadez sobre los ojos y náuseas, todo agravado a cada paso que da (bell., bryon.), y por el calor, en cambio mejora por el frío y aplicaciones frías.

Puede alternar con lumbago, que puede venir luego de una deposición insuficiente.

Cuando hay plétora y retención oxalúrica, el paciente tiene cefalea o lumbago, o ambas cosas, y si la eliminación de oxalatos y uratos se hace bien, se produce la descongestión y liberación de la cabeza, aunque persista el malestar intestinal y uterino.

Cara

La cara de aloe puede ser pálida o turgesciente, signos de congestión venosa o de subictericia de origen hepático.

Los labios pueden estar enrojecidos, como en sulfur, hinchados, agrietados o resquebrajados.

Los ojos son brillantes, a veces rojos y saltones; mirada vacilante que expresa ansiedad; a veces siente necesidad de cerrar los párpados como si la visión de objetos le fatigase.

La punta de la nariz puede estar roja, no así el resto de la cara.

Aparato digestivo

ESTOMAGO:

La necesidad de desintoxicarse continuamente le hace desear cosas jugosas; por lo mismo, la saturación por plétora le hace rechazar alimentos, particularmente la carne.

La congestión gástrica es causa de náuseas y dolor de cabeza.

Igualmente, por la plétora, después de comer tiene flatulencia con latidos en el recto e irritación sexual.

Cuando da un traspie o pisa mal, dolor fuerte en la boca del estómago. (Dr. Amieux).

ABDOMEN :

Aloe es eminentemente UN REMEDIO HEPÁTICO.

Es el congestionante del sistema portal, según se le suministre en dosis ponderables u homeopáticas. (Dr. Amieux).

SENSACIÓN DE DISTENSIÓN, PLENITUD, CON FLATULENCIA Y BORBORIGMOS.

Sensación de que el vientre va a estallar, y los fuertes borborigmos pueden ser percibidos por una persona que se halle cerca.

GRAN DISTENSIÓN DEL COLON QUE METEORIZA EL ABDOMEN.

La distensión continúa aún después de la expulsión de gas en cantidad.

CÓLICOS EN EL PLANO SUPERIOR ABDOMINAL que obligan a estar sentado y doblado endos, lo cual calma (coloc.).

Los dolores pueden llegar a los costados del abdomen, no encontrando el paciente ninguna posición que le calme.

SENSACIÓN DE DEBILIDAD EN EL VIENTRE COMO DE DIARREA. (Podoph.).

Como en sulfur, puede existir gran deseo de evacuar, que lo despierta temprano.

RECTO Y DEPOSICIONES :

Necesidad urgente de evacuar, para sólo dar paso a un gas caliente que procura calma por poco tiempo, pues el deseo reaparece pronto (natr. sulf.) (Kent).

Gases ofensivos, ardientes, copiosos; gases abundantes y heces pequeñas (agar); al expulsar gas, sensación de que la materia saliese con él (oleand., mur. ac., natr. mur.) (Allen).

Diarrhea con sustancia amarilla en forma de gelatina transparente o sanguinolenta; a veces esa sustancia sale sin que el sujeto se aperciba de ello.

LA DEPOSICIÓN SALE INVOLUNTARIAMENTE según el Dr. Amieux; ello se debe al edema de mucosa ano-rectal que encontramos a menudo.

Antes de la deposición, abundante gas y borborigmos; puede haber también dolores y cólicos sobre todo a la derecha del abdomen.

Durante la deposición, abundante gas y tenesmo; si hubo cólicos antes, después de la deposición sudores y sensación de debilidad; caída posible del recto, calmada con agua fría (muriat. ac. tiene igual síntoma pero calmado con agua caliente).

Hemorroides color azulado con mucho prurito que calma por el agua fría.

(Las hemorroides de muriat. ac. calman con agua caliente).

Aparato urinario

Sensación de pesadez y agrandamiento de la próstata.

No hay que olvidar que aloe es un oxalúrico y un urémico.

Órganos genitales

MASCULINOS :

La congestión venosa del bajo vientre ocasiona gran irritación sexual.

FEMENINOS :

Reglas muy frecuentes y abundantes, con sensación de adormecimiento en el recto, sobre todo estando de pie.

El útero le pesa, y por eso no puede caminar. (sepia, etc.).

Dolores como de parto, principalmente en los riñones, que se extienden alas piernas.

Espalda y extremidades

Dolores en la parte baja de la espalda, aumentados por el movimiento.

Puntadas a través del sacro.

LUMBAGO ALTERNANDO CON DOLOR DE CABEZA Y HEMORROIDES.

Sensación de malestar en los miembros.

Dolores de arrancamiento en las articulaciones.

Planta del pie dolorosa al caminar.

Relaciones

En los estados venosos, aloe tiene relaciones muy íntimas con sulfur, y estudiando los remedios cuidadosamente veremos que también con kali bichr., sulf., aesc., y aloe existe gran relación en las partes estomacal e intestinal.

Aloe NO ES, SIN EMBARGO, un remedio constitucional de acción tanprofunda y larga como sulf., pero tampoco es de tan corta duración como acon. o bell.

Los malestares de aloe aparecen con rapidez moderada.

Se parece a bryon. al no actuar sobre la fuerza vital tan profundamente como sulf. (Kent).

Complementarios

Sulfur.

Remedios que le siguen bien

Kali bichr., sepia, sulf., sulf. ac.

Remedio al cual no se aviene

All. sativa.

Antídotos

Camphora, lycop., nux vom., sulfur.

ALUMINA

Es un óxido de aluminio que durante mucho tiempo fue confundido con la cal o la sílice, y su identificación se debe a Guyton de Morveau que fue el primero en aislarlo del alumbre.

En la naturaleza está presente en muchas formas; casi puro en el corindón, elzafiro, el rubí, y combinado en los feldespatos, las micas, las arcillas y en numerosos otros compuestos naturales.

La alúmina pura se obtiene en estado de hidrato gelatinoso precipitando una solución de sal soluble de aluminio por el carbonato de amonio.

La alúmina anhidra se precipita calcinando el hidrato de alúmina o también el alumbre amoniacal.

Se presenta bajo la forma de un polvo blanco muy fino, suave al tacto, sin color ni sabor, que se adhiere a la lengua.

Es insoluble en el agua.

Las tres primeras dinamizaciones se preparan por trituration, y las más altas, por dilución hahnemanniana.

Acción general del medicamento

SOBRE EL SIMPÁTICO Y NERVIOS QUE PARTEN DE LA MEDULA.

LOS MÚSCULOS inervados por ellos CARECEN DE ENERGÍA; GRAN DEBILIDAD EN TODA

LA ECONOMÍA; dificultad en la deglución, estado de parálisis esofágica, dificultad en levantar y mover los brazos, parálisis de un costado del cuerpo o paraplegia, parálisis vesical o rectal.

Al principio es una inactividad general durante un tiempo más bien largo, y termina en estado de completa parálisis.

TODO ES MAS LENTO EN EL PACIENTE DE ALUMINA; conductibilidad nerviosa disminuida; un pinchazo en las extremidades es sentido un instante después.

Los demás sentidos están igualmente debilitados, conduciendo a un adormecimiento general de la conciencia, estupefacción de la inteligencia a neta pereza mental; todo lo que impresiona llega al espíritu con marcada lentitud (Kent).

MUCOSAS SECAS, no obstante, puede haber por un tiempo MUCOSIDAD ESPESA, AMARILLA, DIFÍCIL DE ARRANCAR.

Características

CONSTITUCIÓN Y TIPO : El remedio actúa sobre los individuos secos, DELGADOS, POSTRADOS.

De aspecto ARRUGADO Y DESECADO; que dan la impresión de VIEJOS PREMATUROS; o REALMENTE VIEJOS.

Niñas cloróticas en el momento de la pubertad, chicos delicados, alimentados artificialmente.

GRAN CONSTIPACIÓN, A CAUSA DE INACTIVIDAD RECTAL; HASTA LAS DEPOSICIONES BLANDAS REQUIEREN GRANDES ESFUERZOS PARA SU EXPULSIÓN.

Como bryon., mucosas muy secas y no siente necesidad de evacuar; ambos actúan en sujetos delgados y "secos".

Ambos se complementan, y se prescriben principalmente en la CONSTIPACIÓN infantil, juntamente con anacard., sepia, silic., veratr., para esta pérdida de poder expulsivo rectal (Nash).

Modalidades

Lateralidad

Izquierda superior, derecha inferior.

Agravación

POR LA MAÑANA AL LEVANTARSE : hora de agravación de la sintomatología; la orina es expulsada con lentitud, miembros incapacitados, paciente dolorido, atontado, confusión mental, duda de su propia identidad.

EN UNA HABITACIÓN CALIENTE.

DESPUÉS DE HABER COMIDO PAPAS.

Periódicamente, en particular en tiempo frío y seco, y sobre todo el cambio a tiempo seco; a veces lo mejora la humedad (Dr. O. Luser).

Mejoría

AL AIRE LIBRE; no obstante, la falta de calor vital le hace buscar el calor y ropas abrigadas.

POR LAS ABLUCIONES FRÍAS.

Síntomas mentales

CONFUSIÓN MENTAL, EL PACIENTE ES INCAPAZ DE TOMAR DECISIÓN.

Y la acción sobre el sistema nervioso cerebro-espinal se resume así : perturbaciones de la coordinación; la personalidad psíquica, sobre todo la intelectual, esfera de la representación y del juicio, perturbada en su proceso de asociación e interrumpida.

Estas interrupciones están en relación con los otros reflejos de la médula (Dr. O. Luser).

JUICIO TRASTORNADO; incapacidad de entender; lo que sabe o sabía, no le parece ya cierto.

No sabe distinguir la verdad del error; ideas confusas, sus pensamientos no son claros.

SE EQUIVOCA AL HABLAR Y AL ESCRIBIR.

PERTURBACIÓN DE LA CONCIENCIA DE SU PROPIA PERSONALIDAD; inseguro de su propia identidad.

Cuando habla o mira, cree que es otra persona la que habla o mira.

Vive bajo un estado de prisa.

Nada marcha o se hace a su gusto; EL TIEMPO PASA LENTAMENTE.

Una hora le parece medio día.

Arg. nitr. tiene un síntoma semejante, siempre apurado, no termina nada.

A cann. ind. un segundo de tiempo le parece una eternidad, junto a gran excitación y locuacidad.

Medorr. también tiene sensación de que el tiempo pasa lentamente; es un antiguo gonorreico que mejora a la orilla del mar.

Nux vom. considera que el tiempo no pasa bastante rápido.

ES IMPULSIVO; temor al ver sangre o instrumentos en punta.

Cualquier instrumento que pueda servir para un homicidio, le provoca ideas suicidas. (Kent).

ESTA TRISTE, SE LAMENTA SIN CESAR; SE ATAREA SIN DARSE TREGUA; esto se acompaña siempre de un estado de precipitación; cambia frecuentemente de lugar, quiere irse, se va, vuelve, a veces no recuerda ni su nombre, y teme enloquecer; a veces ya se cree loco.

Esto lo vemos también en act. rac., calc., ostr., acon., arg. nitr., lil. tig., mancin., medorr. etc.

A veces el estado mental mejora un poco y el mal humor se transforma en un estado de TRANQUILIDAD,

CALMA, para dar nuevamente paso inmediato al estado anterior.

La mayoría de los síntomas mentales aparecen al despertar, los niños despiertan ASUSTADOS, como en aesc., lycop., y lach.

Cabeza

DOLOR DE CABEZA CON NAUSEAS Y VÓMITOS, mejoran comiendo (anac.).

VÉRTIGOS, propios de gente agotada por la fatiga, o de viejos gastados.

Al cerrar los ojos, VÉRTIGO semejante al de las afecciones medulares cuando hay esclerosis de cordones posteriores.

Síntomas semejantes *a* los de la ATAXIA LOCOMOTRIZ; al comienzo de la ataxia alum. detendrá el proceso mórbido.

Cara

Cara pálida con LLAMARADAS DE CALOR DESPUÉS DE COMER; o alternancias rápidas de palidez y enrojecimiento.

Erupción con pequeños puntos pruriginosos, con sensación de telaraña sobre la piel (bar. carb., bromium, borax, graph.), o sensación de tensión como de una fina capa de albúmina seca (phosph. etc.).

Los labios secos, hendididos, agrietados.

Aparato digestivo

BOCA :

Seca, especialmente de mañana al despertar.

Puede haber acumulación de saliva amarga, o dulzona, o ácida.

GARGANTA Y ESÓFAGO :

Garganta seca y dolorida; mucosa seca, como barnizada; alimentos deglutidos con dificultad; sensación COMO SI TUVIESE UNA ASTILLA O ESPINA DE PESCADO; (hep. sulf., calc., nitr. ac., arg. nitr., natr. mur., dolich.).

ANGINA CRÓNICA DE LOS ORADORES.

La angina de alum. se desarrolla en individuos flacos con ronquera, sensación de carne viva en la garganta, deseos de escupir frecuentemente, especialmente después de esforzarse por expectorar esputos mucosos, espesos y viscosos; este estado se calma temporalmente con alimentos y bebidas calientes.

Arg. nitr. se le parece mucho, y presenta granulaciones en la garganta.

SENSACIÓN DE OPRESIÓN LARÍNGEA Y ESOFÁGICA, con dificultad para tragar.

ESTÓMAGO:

AVERSIÓN A LA CARNE (graph., puls. y arnica).

TAMPOCO LE AGRADAN LAS PAPAS, que agravan su tos, y le causan diarrea y flatulencia.

Coloc. también se agrava con papas y farináceos (Kent).

LA SAL, EL VINO, VINAGRE, PIMIENTA Y LICORES también lo agravan ni bien terminados ingerirlos.

Otros remedios espinales como zinc. tienen la misma agravación por los licores, que prácticamente los envenena y agrava todos sus males.

En cambio desea LEGUMBRES, FRUTAS Y ALIMENTOS SEMILIQUIDOS.

GENERALMENTE SIENTE, con deseos de cosas no comestibles, como cal. carbon, lo mismo que calc. carb., cic. vir., nux. vom. Y nitr. ac.

En realidad, NO SIENTE DESEOS DE COMER; come muy poco a la vez.

Puede decirse que EN ESTE REMEDIO NO EXISTE LA DIGESTIÓN.

Tendencia catarral y ulcerativa de la mucosa gástrica, y a indigestarse a menor ingestión.

Erucciones frecuentes, amargos o ácidos; vómitos alimenticios biliosos o mucosos; todo esto puede acompañarse de náuseas, vértigos, pirosis y flatulencia (Kent).

ABDOMEN Y DEPOSICIONES :

Ambos hipocondrios afectados, principalmente el derecho, pues en alum. el HÍGADO es sede de muchos síntomas.

CONSTIPACIÓN POR INACTIVIDAD RECTAL POR PERDIDA DE SU PODER EXPULSIVO (Anac., sepia, silic., natr. mur.).

HASTA UNA DEPOSICIÓN BLANDA CUESTA MUCHO EXPULSAR.

El deseo de mover el vientre se presenta mucho tiempo antes con dolores, requiere grandes esfuerzos.

Pero puede haber también ausencia absoluta de deseo (opium, bryon., collins., sanic.).

Fiebre tifoidea con hemorragias intestinales en coágulos consistentes en pedruzcos de hígado (Nash).

Fisuras anales (nitr. ac., caust., graph.).

Aparato urinario

Orina pálida, turbia, abundante, con sedimento blanquecino como tiza.

Orina ardiente como corrosiva.

Necesidad frecuente con tenesmo.

Orina expulsada durante los esfuerzos para defecar, o solamente puede orinar con gran esfuerzo.

Sensación de debilidad vesical; para lograr orinar debe multiplicar sus esfuerzos.

Órganos genitales

MASCULINOS :

Debilidad, impotencia y emisiones nocturnas.

Órganos gastados por abusos funcionales.

SENSACIÓN DE PLENITUD Y AUMENTO DE VOLUMEN DE LA PRÓSTATA, con sensación de pesadez perineal.

Sensación desagradable en la región prostática después del coito; malestares continuos antes, durante y después del coito.

DESEO SEXUAL PERDIDO O DISMINUIDO.

Secreción prostática durante las deposiciones difíciles.

Erecciones nocturnas dolorosas.

FEMENINOS :

Reglas demasiado precoces, cortas, pobres, pálidas, seguidas de gran agotamiento (carb. an., coccul.).

Antes y durante las mismas, cólicos, dolores de cabeza y otros (Jahr.) Leucorrea tan profusa que a veces chorrea por las piernas (luesinum); aumenta de intensidad al aproximarse las reglas.

Espalda y extremidades

EXCESIVAMENTE DÉBIL Y FÁCILMENTE AGOTADO; le cuesta estar de pie y siente necesidad constante de sentarse.

Dolores de espalda como si un hierro candente le atravesara las vértebras.

Dolores lancinantes del sacro a la nuca.

Pesadez en los brazos, parecen paralizados.

Puntadas rápidas y repetidas en el antebrazo.

Comezón bajo las uñas que se rompen.

Pesadez y debilidad en las piernas; apenas puede arrastrarse; cuando camina tambalea y debe sentarse.

Calambres en las pantorrillas.

Entumecimiento en los talones al andar, y en los pies si cruza las piernas al sentarse.

Dolores en el dedo gordo del pie.

Piel

SECA, ARRUGADA, AGRIETADA.

Erupciones de todo tipo.

Se marchita y hay tendencia a ulceraciones, fisuras e induraciones.

Erupciones que pican por el calor de la cama (sulfur).

El paciente se rasca hasta sangrar, a continuación de lo cual le aparecerán costras o erupciones.

Ars., dolich., alum., y mezer. tienen mucho prurito y sienten alivio rascándose hasta sangrar.

Relaciones

Complementarios

Bryonia, del cual alum. es el crónico; ferr.

Antídotos

Ipeca, chamom., camphora.

AMBRA GRÍSEA

Ambra grísea o ámbar gris es una concreción intestinal de los cachalotes, que no debe confundirse con el ámbar amarillo que es una resina fósil.

Se lo encuentra en pequeñas masas que flotan en el mar o son arrojadas a las costas de la India, África y Francia; el más estimado es el procedente de Sumatra y Madagascar.

Parece cera algo endurecida, su color es intenso y agradable, y su sabor recuerda el de la grasa vieja.

Las tres primeras dinamizaciones se obtienen por trituración hahnemanniana; las más elevadas a partir de la tercera, por diluciones hahnemannianas sucesivas.

Acción general del medicamento

No llega a afectar la vía vegetativa como para producir lesiones orgánicas y se localiza casi únicamente SOBRE EL SISTEMA NERVIOSO, determinando un ESTADO NEUROPÁTICO DE TIPO DEPRESIVO, astenia general con calambres, tirones, ESPASMOS MUSCULARES a veces intensos.

Dice Farrington que donde no haya síntomas nerviosos, no debe darse este medicamento.

Características

CONSTITUCIÓN Y TIPO : Afecciones en niños excitables, nerviosos y débiles, individuos delgados y flacos, de temperamento muy nervioso y cuyo nerviosismo exagerado parece determinar su desnutrición; viejos nerviosos que pierden la memoria (Farrington).

"Individuos PREMATURAMENTE VIEJOS.

Gente de 50 años con síntomas propios de los 80; vejez prematura.

Temblor y debilidad característicos de la senilidad.

Temblor, tambaleo, estado mental con pérdida de memoria propia de una vida en plena declinación.

Habla de una cosa, sin esperar respuesta pasa a otra, saltando de una a otra idea.

Estado de espíritu soñador, de senilidad.

El remedio es útil para la gente joven cuya inteligencia no ha caído aún en la locura, pero está muy debilitada (Kent).

ENTUMECIMIENTO : Muchas molestias del remedio tienen esta característica propia de los ancianos; sensibilidad disminuida y circulación débil (Kent).

HEMORRAGIAS, SANGRÍAS FÁCILES :Abundan en este remedio; por nariz, útero, vejiga, indicando circulación perezosa en que la sangre filtra a través de las mucosas atónicas (Kent).

El remedio es útil en las ENFERMEDADES NERVIOSAS en que hay FALTA DERECCIÓN como consecuencia de debilidad nerviosa, en cambio psorinum se usa cuando la falta de reacción se debe puramente a un vicio constitucional.

Modalidades

Monolateralidad

Transpiración de un solo lado, o del lado afectado solamente.

Al costado derecho de la cabeza hay un punto en que al tocar los cabellos se sufre como si allí hubiese una llaga; hipersensibilidad de un solo lado del cuerpo (Kent).

Agravación

a) POR PRESENCIA DE OTRAS PERSONAS, IGUAL QUE POR LA CONVERSACIÓN; por ej. : Una mujer cuidada por una enfermera, es incapaz de mover el vientre en su presencia.

Natr. mur. no puede orinar si no está solo.

Confusión espiritual frente a otras personas.

Tan pronto como el sujeto se encuentra entre gente siente las mejillas cálidas, tiembla, sus nervios se excitan y sus ideas se desvanecen (Kent).

b) POR LA MAÑANA.

c) DESPUÉS DE HABER COMIDO.

d) Por bebidas CALIENTES y en habitación CALIENTE.

e) ESTANDO ACOSTADO.

f) POR LA MÚSICA, que no tolera porque lo agrava mentalmente y le produce dolores de espalda.

La música parece una sustancia que lo aprisiona (Kent).

Acon., graph., natr. carb., sabina, sepia, thuya).

Mejoría

POR EL AIRE FRESCO, alimentos y bebidas frías, y levantándose del lecho.

Síntomas mentales

Curiosidad momentánea, cambiante, que SALTA DE UN TEMA AL OTRO.

Pacientes que pasan de una pregunta a otra sin esperar las respuestas.

Frecuentemente se encuentra este cuadro entre las damas elegantes de la sociedad moderna.

CONFUSIÓN CON RÁPIDA EVASIÓN DE IDEAS.

Esfuerzos tremendos para poder reflexionar.

Si consigue hacerlo, se sienta para enumerar con pesadez lo más desagradable de su espíritu, de lo que no puede librarse.

Natr. mur. siente alivio al comunicar sus infortunios, pero ambr. gris. no logra.

ALTERNANCIA DE DEPRESIÓN MENTAL CON VEHEMENCIA DE CARÁCTER.

Frente a tal estado el paciente piensa que pierde la inteligencia, y por último decae para aquietarse en un rincón

MELANCÓLICO, TRISTE, DESESPERADO, no desea continuar viviendo.

Esto suele durarle días, CON LLANTO (puls).

A menudo este estado anímico es el resultado de ACUMULACIÓN DE MALESTARES MENTALES, DESGRACIAS, MALOS NEGOCIOS O DESORDENES DOMÉSTICOS.

Al contrario de un tísico, no tiene caquexia pero sí gran postración nerviosa y mental.

Nada le consuela, se considera perdido para siempre, es incapaz de razonar y ver su situación con filosofía; ya no le interesan sus negocios, ni sus amigos, se pregunta si la vida merece ser vivida. (Kent).

Sueño

Insomnio después de inquietud o preocupación por los negocios; debe levantarse.

Podrá ir a acostarse muy cansado, pero tan pronto su cabeza toma contacto con la almohada, comienza a estar preocupado y el sueño se le va (Farrington).

Durante el sueño el cuerpo está frío, tiene temblores y sacudidas en las piernas.

Cabeza

Por la mañana, cuero cabelludo dolorido, seguido de sensación de entumecimiento (Kent).

Sobre el costado derecho hay un punto dolorido como si fuese una llaga (Kent).

Cefalea compresiva que comienza en ambas sienes.

Puntadas y dolores desgarrantes, todo agravado por el ejercicio, mejorando por el reposo y acostado.

Dolor de cabeza al sonarse la nariz.

Dolor en eminencia frontal y ojo izquierdo (Kent).

VÉRTIGO SIMPLE, INDEFINIBLE, DE LOS VIEJOS.

Ojos

Picazón en los párpados como si se formara un orzuelo.

Dificultad para ver, como si las cosas estuviesen cubiertas por niebla.

Visión disminuida causada por una especie de parálisis senil o debilita mientonervioso de la vista (Kent).

Sensación de quemadura en el ojo derecho y en los párpados.

Dolores desgarrantes con punzadas cortas, en y sobre el ojo derecho; presiónsobre la ceja izquierda, punzadas agravadas después de haber comido, y lagrimeo.

Oídos

Agudeza del oído desminuída; sordera sin afección orgánica.

Facultades auditivas tan alteradas que la música AGRAVA LOS SINTAMOS, debido aperturbación de los nervios auditivos.

Oír música congestiona la cabeza y agrava la tos.

Calc. ostr. tiene tal sensibilidad, que el solo tocar un piano produce doloresen diversas partes del cuerpo, principalmente en la laringe (Kent).

Aparato digestivo

BOCA Y FARINGE :

Sequedad bucal con sed.

Dolores laríngeos al tragar.

Sensación de crudeza en la garganta.

Agravados por la mañana.

A la sequedad se une acumulación mucosa que el paciente trata de expulsar,con provocación de tos.

Náuseas y a veces vómitos (Kent).

ESTOMAGO :

Agravación después de haber comido y de bebidas calientes, especialmente leche.

Después de haber comido, tos y bostezos.

Vómitos a cada acceso de tos.

Después de evacuar, sensación de debilidad y angustia estomacal (Kent).

Eructos con tos violenta y convulsiva.

Eructos ácidos y o agrios; distensión estomacal después de medianoche. (Boericke).

ABDOMEN Y EVACUACIONES :

Distensión de vientre con gran flatulencia, especialmente después de las comidas.

A veces esto despierta al paciente durante la noche, con borborismos y dolorespunzantes intestinales; vientre frío, o sensación de que la pared abdominal interna está fría (Kent).

Sensación de presión hepática profunda; agravación por la mañana,después de haber comido y de cada deposición.

CONSTIPACIÓN INVETERADA en personas de edad, principalmente CUANDO LESES IMPOSIBLE

AGUANTAR A ALGUIEN CERCA EN EL MOMENTO DE EVACUAR.

Deseos frecuentes e ineficaces de evacuar, lo que lo vuelve ansioso y no lepermite soportar a nadie cerca.

Después de evacuar, el paciente experimenta sensación de presión, o debilidad yvacío en el vientre, que se calma mediante un escape de gas o un eructo (Kent).

Aparato urinario

Al ser emitida la orina parece turbia, amarillo-marrón, y al enfriarse deja sedimento oscuro; puede ser abundante, de olor ácido, orina sanguinolenta que deja sedimento rojizo.

Durante la micción, sensación de ardor, escozor, comezón y titilación en uretray vulva.

Órganos genitales

Comezón voluptuosa en el escroto.

Erecciones matinales violentas sin deseos, con entumecimiento de la región genital.

REGLAS DEMASIADO ABUNDANTES Y FRECUENTES, CON PICAZÓN DE LA REGIÓN GENITAL;

dolores y picazón con hinchazón de labios; aumento de las várices de las piernas, si las hubiere.

FLUJO SANGUÍNEO ABUNDANTE ENTRE PERIODOS MENSTRUALES.

Secreción sanguínea entre reglas, POR EL MENOR INCIDENTE, después de unamarcha prolongada o ejercicio violento.

ESTAR ACOSTADA LE AGRAVA ESTOS SINTAMOS.

Aparato respiratorio

NARIZ :

Hemorragia nasal por la mañana temprano.

Sensación de sequedad nasal durante largo rato, con frecuente irritación comodespués de un estornudo.

BRONQUIOS Y PULMONES :

Sensación de comezón, con carraspera y de dolor en laringe y tráquea.

Sensación de comezón que comienza en la garganta.

Tos espasmódica VIOLENTE, CON ERUCTOS Y ENRONQUECIMIENTO.

Esta tos es de origen principalmente nervioso, y se acompaña de síntomas talescomo temblor, nerviosidad y excitación, que podrían hacer creer en perturbaciones cerebro-espinales.

Tos por irritación por constricción de laringe, paroxística, semejante alcoqueluche; con mucosidad blanca.

Disnea asmática, causada por la música, malas ideas, ansiedad, agravadas cuando un extraño se le acerca o entra en la habitación, al excitar su sistema nervioso.

Tos reflejo de influencias mentales, seguida de eructos o vómitos (Farrington).

Asma y disnea con síntomas cardíacos al menor ejercicio, o tentativa de coito (Kent).

Este medicamento es útil en el asma acompañada de trastornos cardíacos: sensación de opresión en el costado izquierdo del pecho, no como cactus, que tiene sensación de que le oprimen el corazón (Farrington).

Dolor opresivo profundo y desgarrante en el costado izquierdo del pecho (Kent).

Sensación de comezón y de crudeza en el pecho, que se desplaza si el paciente toca y rasca en el lugar (Kent).

Aparato circulatorio

Palpitaciones cardíacas y temblores al menor ejercicio, a la menor excitación, escuchando música y al menor esfuerzo mental.

Percibe el palpar hasta en las extremidades; pulsaciones y latidos en las extremidades.

Las palpitaciones conducen a disnea (Kent).

Piel

Comezón y doloración particularmente en la región genital; en los pequeños orificios: ojos, ano, etc.

Adormecimiento de la piel.

Espalda y extremidades

Miembros que se entumecen fácilmente a la menor compresión.

Las piernas al cruzarlas, los brazos al dormir sobre ellos.

Dolor de carne viva entre muslos y en hueso poplíteo.

Pesadez de miembros inferiores, debilidad paralítica; el sujeto envejece, llega a la senilidad.

Tendencia a dormirse, entumecimiento y circulación perezosa con pérdida de fuerza muscular (Kent).

Entumecimiento de miembros, piernas inseguras, tambaleo (Farrington).

Relaciones

Hay muchas semejanzas con *actea rac.*, *asa foet.*, *cocea*, *ignat.*, *phosph.*, *valer.*, y *mosch.*

Este último le sigue muy bien.

LOS ÁCIDOS VEGETALES. ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

AGARICUS MUSCARIUS

Agaricus muscarius, llamado también amanita muscaria, o *agaricus matamoscas*, o falso Fungus, es un hongo del género amanita y de la familia de las Agaricáceas.

Es muy común en Francia y Norte de Europa, lo mismo que en el Asia; se lo encuentra en lugares secos donde crece preferentemente.

Posee un alcaloide altamente venenoso, la muscarina, y por su semejanza con el *agaricus aurantiacus* u hongo verdadero que es comestible, da lugar a graves errores, provoca grandes envenenamientos.

Tampoco hay que confundirlo con el agárico blanco o *polyporus officinalis*, de empleo conocido para calmar las transpiraciones de los tísicos.

El Agárico Blanco, también denominado *polyporus officinalis* Fries (Basidiomicetas), es un hongo que crece sobre los abetos y las malezas de los Alpes y el Delfinado.

Encierra, además de una especie de resina, un principio activo: la agaricina o ácido agaricínico, cuya acción farmacodinámica puede sintetizarse de esta manera: se ejerce principalmente sobre el bulbo raquídeo y centros vaso motores a los que excita, produciendo en ellos la elevación de la tensión sanguínea y la reducción del tono cardíaco, al que paraliza en seguida con caída de tensión.

Agota la secreción sudoral paralizando, según Hofmeister, el sistema nervioso periférico de las glándulas sudoríparas.

Hay que anotar que no actúa sobre las secreciones salivares o intestinales, a las que parece dejar indemnes.

Sin embargo a veces se nota una hipersecreción salivar y sobre todo intestinal, pero ello es probablemente debido a que se ha empleado agaricina impura, mezclada con la resina de la planta, de efectos drásticos.

Para preparar el remedio, se procede a limpiar el pie y el sombrero del hongo, luego se los corta en pedacitos que se ponen a macerar en alcohol; la tintura madre así obtenida, sirve para producir las sucesivas dinamizaciones.

Acción general del medicamento

Agaricus parece ejercer su influencia EMBRIAGADORA como el alcohol, el opio o el hachich; la exaltación con desordenes funcionales que conducen a la supresión de la actividad, a causa de este tipo de EMBRIAGUEZ, se manifiesta no sólo en los centros cerebrales sino también en otras partes del sistema nervioso; los NERVIOS

SENSITIVOS pierden lo que Hughes denomina su poder de resistencia; ejerciendo la más leve presión sobre cualquier punto del cuerpo, persiste la sensación de dolor aún después que la presión ha cesado.

Los NERVIOS MOTORES sufren grandemente; las contracciones coreicas muy marcadas son otra consecuencia de la acción de agaric., y también se han desarrollado en ciertos experimentadores síntomas de afección medular profunda que se transmiten principalmente a las vías motrices.

Agaric., parece envenenar también LA SANGRE; se han notado numerosos síntomas de alteraciones septicémicas en los individuos que están bajo su influencia venenosa.

Por último, y como otra consecuencia de su acción, LAS MUCOSAS están irritadas y se cubren de una mucosidad amarilla, mientras SOBRE LA PIEL SE DESARROLLA una erupción liquenoidea con prurito, picazón y sensación de quemadura.

Características

CONSTITUCIÓN Y TIPO : Agaric., conviene a individuos rubios o castaños claros con piel y músculos blandos.

También se prescribe a menudo a personas ancianas, cuya circulación es débil e indolente (Allen).

Es particularmente útil en los bebedores, especialmente para sus dolores de cabeza y las secuelas de todo exceso (lobelia, nux vom., ranunc.) (Allen).

ESPASMOS, SACUDIDAS MUSCULARES Y TEMBLORES : Puede encontrarse este importante grupo de síntomas en cualquier parte del cuerpo, afectando a cualquier grupo de músculos.

Estos espasmos o sacudidas musculares pueden originar verdaderos síntomas de COREA para cuyo tratamiento agaric. se menciona en primer lugar : MOVIMIENTOS COREICOS MUY VARIADOS; SENSACIÓN DE COMEZÓN EN LOS PÁRPADOS O CUALQUIER OTRA PARTE DEL CUERPO, COMO SI DICHAS PARTES SE HUBIESEN CONGELADO; PÁRPADOS EN CONSTANTE MOVIMIENTO Y COLUMNA VERTEBRAL SENSIBLE AL TACTO.

SACUDIDAS EN GRUPOS MUSCULARES VARIADOS; INCOORDINACIÓN DE MOVIMIENTO, DEBILIDAD GENERAL Y TEMBLOR.

He aquí un conjunto de síntomas muy marcados en el medicamento y la resultante casi constante de su acción sobre el sistema nervioso.

Podemos evocar otros medicamentos juntamente con agaric. para el tratamiento de la corea : ars. alb. es útil en los casos obstinados de corea, en que se agrega un particular síntoma de inquietud en las piernas, obligando al paciente a cambiar de lugar los pies frecuentemente, o caminar para calmarse.

Cimicif., cuando la corea afecta sobre todo los movimientos del costado izquierdo y cuando la enfermedad está asociada a mialgias, o es consecuencia de un desplazamiento uterino.

Crocus es el medicamento de las histéricas con constricciones coreiformes de ciertos grupos musculares.

Cuprum para las coreas periódicas con movimientos convulsivos que comienzan con los dedos de las manos o los pies, o en los mismos pies, para extenderse progresivamente en seguida a todo el cuerpo.

Ignat. es útil en la corea de origen emotivo.

Mygala lasiod., presenta el siguiente cuadro sintomático : tendencia a debilidad mental o depresión; dolor intenso en la frente; constricciones y espasmos constantes en los músculos de brazos y piernas, preferiblemente del lado derecho; falta de control muscular; cuando el paciente trata de poner la mano sobre la cabeza, al llegar a ella su mano es violentamente proyectada hacia adelante, atrás o un costado; cuando realiza un esfuerzo para hablar sus palabras salen bruscamente, como una explosión.

Stram. es el remedio para la corea de eclosión violenta; la expresión facial cambia continuamente, de repente ríe, de repente parece asombrado, saca la lengua rápidamente; la cabeza sufre un movimiento alternante que la lleva hacia adelante o hacia atrás; movimientos de torsión espasmódica en todo el cuerpo, extremidades sin cesar en movimiento y giros graciosos; puede haber tartamudeo, se asusta fácilmente, despierta aterrorizado o estando dormido levanta espasmódicamente la cabeza de la almohada.

Tarentula tiene movimientos espasmódicos constantes en todo el cuerpo, tan violentos que a veces debe permanecer acostado.

Puede haber localización en pierna y brazo derechos; los movimientos persisten durante el sueño; agravación, por el ejercicio y el tacto, mejora por la música.

Verat. vir. es útil cuando además de contracciones espasmódicas se presentan las características propias del remedio.

Zincum met. es el medicamento de la corea que aparece después de un susto o por supresión de una erupción; las sacudidas son peores al atardecer, después de haber bebido vino o durante el reposo; constante agitación de los pies.

Zizia (thapsium aureum) se prescribe cuando los movimientos coreicos prosiguen durante el sueño.

Sensaciones particulares.

SENSACIÓN DE REPTACIÓN, DE ESTREMECIMIENTO, COMO HORMIGAS QUE CORRIEN, no sólo a flor de piel sino en lo más profundo de los músculos.

SENSACIÓN COMO SI LE TOCAREN Y PINCHAREN CON AGUJAS DE HIELO.

Modalidades

Lateralidad

Dolores en diagonal; izquierda superior y derecha inferior.

Agravación

AL AIRE FRÍO; muy sensible al frío; por la mañana; antes de una tormenta; POR EL ESFUERZO MENTAL; el prurito, ardor, pinchazos pueden ser desencadenados por ejercicio mental intenso, y se calman por el movimiento. POR EL COITO; todos los síntomas de agaric. se agravan por la relación sexual, especialmente los que interesan a la médula; es muy útil para las casadas jóvenes que padecen un desfallecimiento histérico después de la relación sexual.

Otros remedios que presentan esta agravación : calad., china, kali carb., nux vom., phosph., posph. ac., selen., y sepia.

Mejoría

Por el movimiento lento.

Síntomas mentales

INDIVIDUOS QUE DAN LA IMPRESIÓN DE DESARROLLO CEREBRAL TARDÍO; NIÑOS QUE TARDAN EN APRENDER, HABLAR Y CAMINAR, combinando en su psiquismo los caracteres de otros remedios : natr. mur., que tarda en aprender a hablar, y calc. ostr. que es lento para aprender a caminar, debido al mal desarrollo óseo; en cambio, en agaric. esto es debido a un desarrollo lento de la inteligencia; toda la esfera psico-mental está como paralizada.

Esto nos recuerda a borax y sobre todo a baryta carb., pero en estos dos últimos sus grandes particularidades impiden toda confusión.

Paciente inquieto, áspero, triste, desalentado, a veces despreocupado.

Gran variabilidad en el humor, irritabilidad, depresión mental consecuencia de surmenage o trabajo intelectual prolongado.

Pereza y terror al trabajo intelectual, que lo agrava; horror a conversar, le parece no poder encontrar las palabras para expresar sus ideas; confusión mental y pérdida de memoria.

Delirio alternativamente alegre o triste con gran locuacidad; habla, canta, ríe, profetiza, hace versos; o bien presenta un delirio furioso; quiere salir de su lecho, cueste lo que cueste; delirio acompañado de carfología.

Sueño

Durante el día ESTA SOMNOLIENTO y bostezo sin cesar.

Ammon. carb. tiene somnolencia durante el día e insomnio de noche, con grandebilidad general.

Ant. crud. tiene gran somnolencia diurna particularmente en ancianos, donde se presenta con trastornos gástricos propios del remedio.

China está somnoliento de día, acompañado de gran debilidad ocasionada por pérdida de líquidos humorales.

Lycop., tiene a veces somnolencia diurna, pero con las demás características del remedio.

Natr. carb. se despierta temprano y está somnoliento todo el día, y tiene una gran debilidad causada por los calores estivales.

Phosph. es somnoliento después de comer, y de noche el sueño es entrecortado por frecuentes despertares.

En cuanto a agaric., de día es somnoliento y de noche tiene sueño agitado y liviano, que en nada repara sus fuerzas, por el contrario le irrita; tiene infinidad de sueños entrecortados por despertares frecuentes, y así, a la mañana no se decide dejar el lecho.

Cabeza

CONSTANTEMENTE EN MOVIMIENTO, como durante la corea.

Puede haber ERUPCIONES SOBRE EL CUERO CABELLUDO, EXCEMATOSAS CON COSTRAS.

También puede haber COMEZONES SIN EXCEMA NI COSTRAS, peor de mañana al levantarse, que le obligan a rascarse; después de rascarse, sensación de FRÍO HELADO en la región pruriginosa.

Baryta carb. tiene mucho prurito en el cuero cabelludo, más detrás de las orejas y en la nuca.

Lycop. tiene crisis violentas de comezón en el cuero cabelludo, particularmente después de haber tenido calor, en seguida de un ejercicio violento.

Mezer. tiene gran comezón en el cuero cabelludo con la siguiente característica : el rascarse hace cambiar de lugar al prurito, y no lo mejora; al contrario, lo agrava.

Oleander tiene prurito en el cuero cabelludo, principalmente en parte posterior de la cabeza y detrás de las orejas, y el rascado calma temporalmente la sensación.

No olvidemos a sulfur entre estos remedios con la característica de que el rascado produce sensación de voluptuosidad y en seguida, una desagradable sensación de ardor.

Cefalalgia como si un clavo estuviese clavado en el lado derecho de la cabeza.

Dolor como si la cabeza estuviese atravesada con agujas de hielo.

Vértigo como el de la embriaguez.

Principalmente de mañana al aire libre; la luz solar produce inmediatamente vértigo que le hace caer.

Ojos

MOVIMIENTO CONSTANTE DE LOS PÁRPADOS.

NYSTAGMUS, peor al leer o mirar fijo (ars. alb., cicuta, puls., sulfur).

Errores de apreciación de figuras y colores (Kent).

Oídos

Prurito en las orejas con enrojecimiento y dolor ardiente como de sabañones.

Cara

RUBOR en las mejillas con comezón y ardor como de sabañones.

Espasmos en músculos faciales.

CÓREA.

NEURALGIA FACIAL con sensación de agujas de hielo pinchando el nervio afectado. (v. aconit.).

Aparato digestivo

TEMBLOR LINGUAL QUE DIFICULTA LA PALABRA; la lengua tiembla, es agitada por contracciones y sacudidas espasmódicas que impiden articular.

Al sacar la lengua, tiembla como en lachesis.

Trastornos gástricos con punzadas dolorosas en la región hepática.

Órganos genitales

Fríos y arrugados.

Gota militar.

Agaric. es útil en la comezón, pinchazos en la uretra. (petrol.).

LA ORINA PARECE FRÍA AL PASAR POR LA URETRA.

AGRAVACIÓN POR EL COITO; malestares después del coito, excitación sexual, excesos, etc.

En el hombre, debilidad, en la mujer desfallecimientos.

SENSACIÓN DE PESADEZ EN EL BAJO VIENTRE, como si el útero fuera a caer (sepia, murex, lilium), en una mujer agitada, nerviosa, delgada y espigada, acompañada de la reptación del remedio y sensación de picazón.

Todos los síntomas generales EMPEORAN DURANTE LAS REGLAS (act. rac.) y mejoran antes o después de ellas; agravación de los síntomas cardíacos y prolapsos uterinos al término de las reglas (Kent).

Leucorrea abundante, ácida, escoriante.

Comezón y ardor en los senos.

Aparato respiratorio

NARIZ :

Coloración rojo azulada de la extremidad nasal como si estuviese congelada, pudiendo haber también sensación de prurito y ardor.

Para los ancianos bebedores cuya nariz presenta estas características, además de agaric. son útiles ledum y lachesis (Kent).

Catarro crónico con sequedad o costras.

LARINGE, TRAQUEA, PULMONES :

Tos seca, frecuente, espasmódica, provocada por cosquilleo en laringe y tráquea por la noche, al quedarse dormido.

Violento ataque de tos que puede ser detenido por fuerza de voluntad.

Expectoración de bolitas mucosas.

TOS QUE TERMINA EN ESTORNUDO.

Senega tiene tos desgarrante con sensibilidad en las paredes pectorales y termina en estornudo.

Squilla marina tiene tos violenta, fatigante, con abundante expectoración salada y viscosa, acompañada de estornudo; además al toser deja escapar, involuntariamente, un poco de orina.

Respiración corta y oprimida.

Aparato circulatorio

Palpitaciones cardíacas dolorosas.

Sensación dolorosa como si el tórax resultase estrecho.

Pulso intermitente e irregular.

Espalda y extremidades

Rigidez DE LA COLUMNA VERTEBRAL, SENSACIÓN DE QUE SE VA A QUEBRAR AL AGACHARSE.

DOLORES DE TODA CLASE A LO LARGO DE ELLA ardientes y punzantes.

Sensibilidad de la espina dorsal al tacto, especialmente en la nuca y entre los hombros (aescul.).

SENSACIÓN DE HIELO O DE AGUA FRÍA CORRIENDO A LO LARGO DE LA COLUMNA VERTEBRAL.

Abies canad. tiene sensación de agua fría entre los hombros con sensación de que la sangre fuese agua helada.

Lil. tig. tiene sensación de agua fría en la espalda con dolores y temblores.

Lycop. tiene sensación de agua fría y tirones entre los hombros.

Puls. tiene sensación de agua fría con dolores latentes en nuca y cuello.

PARESIA MUSCULAR, ESPASMOS, SACUDIDAS MUSCULARES, TEMBLORES, DEBILIDAD GENERAL; INCOORDINACIÓN DE MOVIMIENTOS, MOVIMIENTOS TORPES DE MANOS Y DEDOS : AL TOMAR LOS OBJETOS SE LE CAEN (apis).

Temblores de manos.

Movimientos coreicos en los brazos que pueden estar débiles y entumecidos.

Gran debilidad de miembros inferiores; paresia con tendencia a aumentar y provocar verdadera parálisis.

Dolores en las piernas como de sacudidas eléctricas.

ENROJECIMIENTO EN LOS DEDOS CON COMEZÓN Y ARDOR COMO DE SABAÑONES.

Piel

PRURITO INTENSO EN TODO EL CUERPO, PRINCIPALMENTE OREJAS, CARA, NARIZ, DEDOS DEL PIE, CON ENROJECIMIENTO, PRURITO Y SENSACIÓN DE ARDOR, como si estuviese congelada.

Agaric. es indicado para los sabañones, con ars. alb., que tiene sabañones conhinchazón, comezón y ardor, peor por el frío, mejor por el calor.

Nitr. ac., tiene sabañones ulcerados extremadamente sensibles sobre todo por lanoche, y que sangran fácilmente.

Petrol. tiene sabañones con prurito y ardor como fuego, y extremidades digitales agrietadas todos los inviernos.

Carbo. an., tiene sabañones que empeoran a la noche, en el lecho y por el frío.

Apis es el remedio de los sabañones empeorados por el calor y mejorados por el frío.

Sulfur es indicado para los sabañones que empeoran por el calor de la cama.

Relaciones

Antídotos

Absinthium, camphora, coffea, rhus tox.

AGNUS CASTUS

Agnus castus, o agnocasto, o sauzgatillo común, es un arbusto de la familia de las Verbáceas, cultivado en muchos jardines por la vistosidad de sus hojas, pero que se encuentra en estado salvaje en toda la región mediterránea, Provenza, Grecia, donde crece en terrenos arenosos y al pie de las rocas.

En la antigüedad, los griegos consideraban a esta planta como al símbolo de la castidad, y las mujeres en ausencia de sus esposos cubrían el lecho con hojas de este arbusto; así le dieron el nombre de "agnos" que significa casto, al cual le fue más tarde adicionado el término latino "castus", que significa lo mismo.

La tintura madre se prepara con las hojas y bayas frescas.

Acción general del medicamento

El punto de acción del remedio son los ÓRGANOS GENITALES; disminuye la vitalidad sexual a la vez que causa una gran depresión mental y marcada pérdida de la vitalidad nerviosa.

El remedio actúa en ambos sexos indistintamente, si bien parece desarrollar mejor su acción en la mujer, y los excesos genitales, la masturbación, etc., *rean* un campo favorable a la acción de esta droga.

SUJETOS DE CONSTITUCIÓN LINFÁTICA, PREMATURAMENTE ENVEJECIDOS, GASTADOS POR EXCESOS SEXUALES O HÁBITOS SOLITARIOS, CON GRAN DEBILIDAD SEXUAL, ÓRGANOS GENITALES FLÁCIDOS E INERTES; SUJETOS TRISTES, DESANIMADOS, APÁTICOS, QUE SE LAMENTAN DE SU VIDA DESPERDICIADA.

En estos sujetos no tardan en desarrollarse síntomas angustiosos : pierden la memoria, están ansiosos, desesperados, con ideas de suicidio, a veces temen infundadamente una muerte próxima.

Dolores de cabeza, cara y dientes; hormigueo de piel; síntomas nerviosos muy numerosos; ftofobia, dolores desgarrantes de cabeza; el menor alimento les causa trastornos gástricos, náuseas.

Los músculos están blandos; vísceras abdominales caídas; gran debilidad en colon y recto, y el resultante escaso poder de expulsión causa CONSTIPACIÓN.

La deposición sale a medias, vuelve a entrar, como en silicea, sanicula y thuya es gruesa y dura; flatulencia perpetua con gases ruidosos y malolientes; prurito, excoriaciones y ardor en el ano.

Tos cortante, sudores nocturnos, músculos cansados y extremidades frías.

"El ejercicio y el frío aumentan los malestares, quieren estar tranquilos y quietos.

A menudo se vuelven neurasténicos.

En fin, necesitan el remedio.

"El hombre joven que ha abusado sexualmente, principalmente abusos solitarios, que ha tenido blenorragia, que sufre de frigidez sexual y emisiones seminales durante las deposiciones; de recién casados ya son impotentes, su joven esposa no les causa ninguna erección aún cuando haga poco tiempo que haya tenido algún éxito clandestino; todo se reduce a algunas erecciones matinales; está extremadamente deprimido, desolado, su corazón desgarrado, y se lamenta de su vida pasada; agnus castus arreglará todo esto.

"La mujer joven que haya practicado onanismo, no encuentra goce alguno con su esposo a pesar de amarlo.

A veces no tiene reglas, o presenta algunas hemorragias uterinas; vaginarelajada, prolapso uterino frecuente con leucorrea parecida a clara de huevo.

También esto se arregla con agnus castus.

"En este tipo de mujeres la leche no aparece después del alumbramiento o se hace escasa y se retira al poco tiempo.

Este remedio le devolverá una leche abundante" (Kent).

Para concluir, falta enunciar un síntoma particular que menciona Allen : la paciente siente permanentemente olor a arenque o almizcle, lo cual es imaginario.

Estos fenómenos de parosmia relacionan al remedio con : anacard., que tiene pervisión imaginaria del olfato y percibe olores como a madera quemada o estiércol de paloma; bell., kali bichr., merc., phosph., puls., etc.

Relaciones

Calad., y selen., ACTÚAN BIEN DESPUÉS DE agn. cast. en el tratamiento de la debilidad de los órganos genitales e impotencia (Allen).

ALLIUM CEPA

Allium cepa, o cepa vulgaris, o cebolla, es una hortaliza de la familia de las Liliáceas, lo suficientemente conocida por lo que no se necesita mejor descripción.

Se preparan las diferentes dinamizaciones homeopáticas partiendo de latintura madre obtenida con el bulbo fresco macerado en alcohol.

Acción general y características

Considerada en conjunto, allium cepa provoca CATARRO AGUDO DE LAS MUCOSAS DE LOS OJOS, NARIZ, LARINGE Y HASTA DE UNA PORCIÓN DEL TUBO DIGESTIVO, CON SECRECIONES EXAGERADAS Y DOLORS NEURÁLGICOS.

Modalidades

Lateralidad

IZQUIERDA.

Agravación

Al atardecer y a la noche, a la hora de acostarse tiene este remedio la mayor agravación.

EN HABITACIÓN CALIENTE : todos los malestares se agravan por el calor, empeoran en habitación caliente, con excepción de la picazón de garganta que a veces es excitada por el aire frío; pero el paciente está mejor al aire frío y es sensible al calor.

Mejoría

EN HABITACIÓN FRÍA, AL AIRE LIBRE.

Cabeza

Dolor de cabeza catarral, principalmente en la frente, que empeora en habitación caliente y a la noche, acompañado de sensación de confusión, de plenitud, de pesadez.

Ojos

Ojos enrojecidos, hinchados, arden con PROFUSO LAGRIMEO pero SIN IRRITACIÓN, MIENTRAS QUE LA SECRECIÓN NASAL ES BASTANTE IRRITANTE (euphrasia es lo contrario); GRAN FOTOFobia.

Oídos

Dolor de oídos con punzadas en la trompa de Eustaquio, coriza; dolores profundos en la garganta que se extienden a los oídos, y la inflamación del resfrío de cabeza tiende a llegar a garganta, laringe y oídos.

Dolor de oídos que pueden llegar a secreción purulenta; el coriza produce ruidos y tintineos en los oídos.

Dolores picantes en los oídos con coqueluche, laringitis y coriza.

Puls. tiene una afinidad tan grande para el oído que cura el dolor de oídos encasi todos los niños que gritan lastimeramente; pero los gruñones, que nunca se contentan, que rechazan todo lo pedido, que golpean a su niñera o enfermero, requieren chamom.; la mayoría de los dolores de oído en los niños puede curarse con puls., chamom., y all. cepa (Kent).

Aparato digestivo

La cebolla es un medicamento extremadamente FLATULENTO.

Cólicos gaseosos; dolores cortantes, picantes, desgarrantes, que el niño siente en el bajo vientre, que lo hacen tiritar y lo obligan a doblarse en dos.

Cólicos que nacen en la región hepática y se extienden a todo el vientre, peores alrededor del ombligo y sentados (Kent).

Ano sensible, sangra a veces.

Aparato respiratorio

NARIZ :

All. cepa es empleado principalmente en los resfríos que comienzan por coriza, luego se inflama la garganta, la laringe y finalmente los grandes bronquios.

Este tipo de resfrío, llamado a veces gripe o influenza es provocado por vientos fríos húmedos y penetrantes; a veces hay dolor de cabeza congestivo.

Sensación de aspereza en la nariz, lagrimeo abundante pero suave, mientras por las fosas nasales corre un líquido acuoso sumamente irritante, con muchos estornudos.

Esta sensación de aspereza gana rápidamente la garganta, la laringe, el pecho y al cabo de 24 hs se presenta una tos desgarrante excitada por una sensación de picazón en la laringe, principalmente cuando el paciente está acostado por la noche en una habitación caliente.

Es asombroso lo rápido que all. cepa destruirá este catarro (Kent).

Coriza con secreción que comienza con muchos ESTORNUDOS; luego aparece secreción acuosa constante, goteando de la nariz, ardiente como fuego, excoriando el labio superior y los bordes nasales, mientras el lagrimeo ocular es suave (euphrasia es lo contrario); al mismo tiempo la congestión de la mucosa nasal es tal que el paciente experimenta sensación de latidos y ardor; siente además dolores en los maxilares, toda la cara y hasta la cabeza; los ojos no pueden tolerar la luz.

En fin, la coriza comienza en la fosa nasal izquierda para en seguida pasar a la derecha y el enfermo se siente afebrado, ardiente, sediento.

Catarro con fiebre de heno; en la época propicia el coriza comienza con estornudos matinales violentos y GRAN SENSIBILIDAD AL OLOR DE LAS FLORES.

All. cepa podrá no curar radicalmente la enfermedad, hará desaparecer en cambio los síntomas desagradables de la misma.

La crisis primaveral anual debe considerarse como la eclosión de una enfermedad crónica.

En este caso, el tratamiento del mal crónico deberá comenzar una vez desaparecida la fiebre de heno y el catarro.

En este período puede atacarse con éxito y constitucionalmente la enfermedad, en cuyo transcurso se notarán crisis y síntomas bien diferentes a los del estado agudo (Kent).

LARINGE Y BRONQUIOS :

Laringitis aguda con ronquera, sensación de aspereza y desgarramiento en cada acceso de tos.

Excitación por cosquilleo de laringe provocado por inhalaciones o aspiraciones de aire frío y en habitación caliente estando acostado.

Tos espasmódica.

Tos ronca, resonante, espasmódica, excitada por picazón laríngea.

La tos produce dolores laríngeos tan agudos que el paciente hace esfuerzos por contenerla.

Sensación de que la tos le desgarró la garganta.

Coqueluche con sensibilidad dolorosa de laringe; el niño se agita y temetose por los dolores que le causa.

A veces esta coqueluche viene acompañada de trastornos gástricos : vómitos, flatulencia; el niño emite gases ofensivos y se dobla en dos por el cólico (Kent).

Así como el aire frío aumenta la tos y la dificultad para respirar, el calor aumenta la picazón y el dolor y provoca también tos.

En consecuencia : si la picazón laríngea, la tos proveniente de inspirar aire frío, la agravación en habitación caliente, agravación nocturna con tos que desgarró la laringe, están reunidos en un paciente, all. cepa es el remedio.

Expectoración mucosa blanca, espumosa, sobre todo de noche sensación de obstrucción de la respiración en medio de la parte superior pectoral.

Espalda y extremidades

Neuritis traumática del tipo encontrado en un muñón después de una amputación : dolores insoportables que agotan las fuerzas del paciente (Kent).

Relaciones

Antídotos

Arnica, chamom, verat. alb., nux vom., thuya.

Complementarios

Phosph., puls., thuya, sarsap.

Comparables

Acon., euphr., gels., ipeca, cali hydr.

Remedios que siguen bien

Calc., silicea.

Remedios con los que no se aviene

All. sativa, aloe, scilla.

ALOES SOCOTRINA

Aloes o aloe socotrina, planta Liliácea, florece en verano en países meridionales.

Las diferentes dinamizaciones homeopáticas se obtienen partiendo de la tintura madre preparada con el jugo espeso de la planta.

Acción general del medicamento

Actúa sobre el SISTEMA VENOSO y los órganos donde dicho sistema predomina, HÍGADO y BAZO.

Pero sus efectos se sienten principalmente en el sistema de la vena porta; por la PLÉTORA que causa provoca en ambos sexos IRRITACIÓN DE TODOS LOS ÓRGANOS DEL BAJO VIENTRE con marcada predilección por el APARATO GENITAL FEMENINO.

Dice Kent : "aloe" se parece mucho a aesculus en que provoca un infarto, una plétora venosa que produce una sensación de plenitud en todo el organismo, localizándose más en las venas del sistema portal con gran sensación de congestión hepática, abdominal, intestinal y rectal".

Dice Manquat en su Tratado de Terapéutica: "aloe congestiona el recto por intermedio de las venas hemorroidales, y en particular los órganos genito-urarios juntamente con todos los del bajo vientre; puede resultar una sensación de pesadez renal y en las caderas, hemorroides en los predispuestos a ellas, deseos frecuentes de orinar y hasta aborto.

Gubler atribuye la congestión rectal, acción biliar sobre la misma región, y efecto de la estasis venosa del hígado sobre las venas mesentéricas".

En resumen, aloe causa efectos fisiológicos de superactividad, depleción venosa tal, que por la intensidad de su irritación probablemente corresponda mejor al período agudo de los cuadros en los que es indicado, debidos a congestión y plétora venosas.

Características

CONSTITUCIÓN Y TIPO : "Es indicado para los grandes comilones, pletóricos, sedentarios, intoxicados por las sales de uratos y oxalato de cal; para los diabéticos, cuya orina reduce el licor de FEHLING, algunas dosis de aloe y de oxalic acid. bastan para descongestionar el hígado, ese gran amo del metabolismo alimenticio, y el bulbo, particularmente en la base del 40. ventrículo, con lo que los pseudo-diabéticos se sienten mejor y su orina se normaliza. (Dr. Amieux en "La Revue Française d'Homéopathie" - Abril 1924).

Restablece el equilibrio fisiológico cuando el paciente ha ingerido demasiadas drogas, especialmente cuando a raíz de ello no se distinguen los síntomas patológicos de los drógaes.

"ES UN CLARIFICADOR DE SINTAMOS" como sulfur y a veces nux vom. (Dr. Amieux, loc. cit.).

LAS DEPOSICIONES Y LOS SINTAMOS INTESTINALES son tan importantes que aveces ellos solos determinan la indicación del remedio : SENSACIÓN DE PLENITUD EN HÍGADO, ABDOMEN E INTESTINOS, LO MISMO QUE EN EL RECTO.

A esto se unen las HEMORROIDES.

Siente DOLORS ABDOMINALES QUE LE OBLIGAN A EVACUAR, como nux vom.; dolores que circundan el ombligo y se irradian al recto.

Trastornos disentéricos o diarreicos; en la diarrea, LAS HECES SON EXPULSADAS EN UN CHORRO ACUOSO AMARILLO, OFENSIVO, EXCORIANTE, ARDIENTES COMO FUEGO Y DEJAN EL ANO DOLORIDO, o bien la materia expulsada es como gelatina.

DIFÍCIL RETENCIÓN DE LAS HECES, pues la materia escapa espontáneamente.

No puede dar salida al gas sin que al mismo tiempo salgan heces.

Con esta diarrea de aloe, LOS GASES DISTIENDEN CONSIDERABLEMENTE EL ABDOMEN produciendo sensación de hinchazón y plenitud por lo que el paciente debe ir con frecuencia al baño.

Esta PERDIDA DEL TONO ESFINTERIANO ANAL ha permitido resultados brillantes en pequeños que al comenzar a caminar dejan escapar involuntariamente heces bajo la forma de pequeñas masas mucosas y sustancias *amarillas*.

Esta pérdida de tono del esfínter se presenta no sólo en las formas diarreicas, sino bajo la forma de fragmentos duros y redondos, sin que el paciente se de cuenta de ello.

En resumen, TODA INGESTIÓN OBLIGA AL PACIENTE A EVACUAR CON PRISA Y PRECIPITACIÓN.

Esta diarrea puede ser ocasionada también por comer OSTRAS FUERA DE ÉPOCA, durante grandes calores o en la época de su reproducción.

BEBER AGUA da igual resultado.

El efecto de comer ostras puede ser alejado o atemperado con lycop., pero si da lugar a algún tipo benigno de cólera, el remedio es aloe.

Modalidades

Agravación

DESPUÉS DE HABER COMIDO O BEBIDO : ello provoca cólicos, diarrea, aunque a veces los cólicos pueden ser seguidos de CONSTIPACIÓN.

POR LA CERVEZA; el remedio es útil para los malestares causados por la cerveza aún en viejos bebedores (kali bichr).

POR LAS OSTRAS (lycop).

A LA MAÑANA TEMPRANO.

POR LA VIDA SEDENTARIA y el CALOR (igual que todos los remedios venosos).

Mejoría

POR UN VIENTO O POR UNA DEPOSICIÓN.

POR EL TIEMPO FRÍO Y EL AGUA FRÍA, que excitan la circulación.

Síntomas mentales

Sumamente excitable durante el sufrimiento, localizado en el vientre; fácilmente enervado e irritable por las crisis de cólicos; descontento y enojado consigo mismo; irritado por sus males, la vida es para ellos una carga; aversión por el movimiento, odia a la gente.

Estos síntomas son propios de los viejos bebedores cansados, flemosos, hipocondríacos.

Cabeza

Congestión manifiesta simultáneamente con congestión y plétora intestinal, consecuencia de éstasis venosa unida a la del sistema portal; dolor de cabeza frontal, pesadez sobre los ojos y náuseas, todo agravado a cada paso que da (bell., bryon.), y por el calor, en cambio mejora por el frío y aplicaciones frías.

Puede alternar con lumbago, que puede venir luego de una deposición insuficiente.

Cuando hay plétora y retención oxalúrica, el paciente tiene cefalea o lumbago, o ambas cosas, y si la eliminación de oxalatos y uratos se hace bien, se produce la descongestión y liberación de la cabeza, aunque persista el malestar intestinal y uterino.

Cara

La cara de aloe puede ser pálida o turgesciente, signos de congestión venosa o de subictericia de origen hepático.

Los labios pueden estar enrojecidos, como en sulfur, hinchados, agrietados o resquebrajados.

Los ojos son brillantes, a veces rojos y saltones; mirada vacilante que expresa ansiedad; a veces siente necesidad de cerrar los párpados como si la visión de objetos le fatigase.

La punta de la nariz puede estar roja, no así el resto de la cara.

Aparato digestivo

ESTOMAGO:

La necesidad de desintoxicarse continuamente le hace desear cosas jugosas; por lo mismo, la saturación por plétora le hace rechazar alimentos, particularmente la carne.

La congestión gástrica es causa de náuseas y dolor de cabeza.

Igualmente, por la plétora, después de comer tiene flatulencia con latidos en el recto e irritación sexual.

Cuando da un traspie o pisa mal, dolor fuerte en la boca del estómago. (Dr. Amieux).

ABDOMEN :

Aloe es eminentemente UN REMEDIO HEPÁTICO.

Es el congestionante del sistema portal, según se le suministre en dosis ponderables u homeopáticas. (Dr. Amieux).

SENSACIÓN DE DISTENSIÓN, PLENITUD, CON FLATULENCIA Y BORBORIGMOS.

Sensación de que el vientre va a estallar, y los fuertes borborismos pueden ser percibidos por una persona que se halle cerca.

GRAN DISTENSIÓN DEL COLON QUE METEORIZA EL ABDOMEN.

La distensión continúa aún después de la expulsión de gas en cantidad.

CÓLICOS EN EL PLANO SUPERIOR ABDOMINAL que obligan a estar sentado y doblado endos, lo cual calma (coloc.).

Los dolores pueden llegar a los costados del abdomen, no encontrando el paciente ninguna posición que le calme.

SENSACIÓN DE DEBILIDAD EN EL VIENTRE COMO DE DIARREA. (Podoph.).

Como en sulfur, puede existir gran deseo de evacuar, que lo despierta temprano.

RECTO Y DEPOSICIONES :

Necesidad urgente de evacuar, para sólo dar paso a un gas caliente que procura calma por poco tiempo, pues el deseo reaparece pronto (natr. sulf.) (Kent).

Gases ofensivos, ardientes, copiosos; gases abundantes y heces pequeñas (agar); al expulsar gas, sensación de que la materia saliese con él (oleand., mur. ac., natr. mur). (Allen).

Diarrea con sustancia amarilla en forma de gelatina transparente o sanguinolenta; a veces esa sustancia sale sin que el sujeto se aperciba de ello.

LA DEPOSICIÓN SALE INVOLUNTARIAMENTE según el Dr. Amieux; ello se debe al edema de mucosa ano-rectal que encontramos a menudo.

Antes de la deposición, abundante gas y borborismos; puede haber también dolores y cólicos sobre todo a la derecha del abdomen.

Durante la deposición, abundante gas y tenesmo; si hubo cólicos antes, después de la deposición sudores y sensación de debilidad; caída posible del recto, calmada con agua fría (muriat. ac. tiene igual síntoma pero calmado con agua caliente).

Hemorroides color azulado con mucho prurito que calma por el agua fría.

(Las hemorroides de muriat. ac. calman con agua caliente).

Aparato urinario

Sensación de pesadez y agrandamiento de la próstata.

No hay que olvidar que aloe es un oxalúrico y un urémico.

Órganos genitales

MASCULINOS :

La congestión venosa del bajo vientre ocasiona gran irritación sexual.

FEMENINOS :

Reglas muy frecuentes y abundantes, con sensación de adormecimiento en el recto, sobre todo estando de pie.

El útero le pesa, y por eso no puede caminar. (sepia, etc.).

Dolores como de parto, principalmente en los riñones, que se extienden a las piernas.

Espalda y extremidades

Dolores en la parte baja de la espalda, aumentados por el movimiento.

Puntadas a través del sacro.

LUMBAGO ALTERNANDO CON DOLOR DE CABEZA Y HEMORROIDES.

Sensación de malestar en los miembros.

Dolores de arrancamiento en las articulaciones.

Planta del pie dolorosa al caminar.

Relaciones

En los estados venosos, aloe tiene relaciones muy íntimas con sulfur, y estudiando los remedios cuidadosamente veremos que también con kali bichr., sulf., aesc., y aloe existe gran relación en las partes estomacal e intestinal.

Aloe NO ES, SIN EMBARGO, un remedio constitucional de acción tan profunda y larga como sulf., pero tampoco es de tan corta duración como acon. o bell.

Los malestares de aloe aparecen con rapidez moderada.

Se parece a bryon. al no actuar sobre la fuerza vital tan profundamente como sulf. (Kent).

Complementarios

Sulfur.

Remedios que le siguen bien

Kali bichr., sepia, sulf., sulf. ac.

Remedio al cual no se aviene

All. sativa.

Antídotos

Camphora, lycop., nux vom., sulfur.

ALUMINA

Es un óxido de aluminio que durante mucho tiempo fue confundido con la cal o la sílice, y su identificación se debe a Guyton de Morveau que fue el primero en aislarlo del alumbre.

En la naturaleza está presente en muchas formas; casi puro en el corindón, el zafiro, el rubí, y combinado en los feldespatos, las micas, las arcillas y en numerosos otros compuestos naturales.

La alúmina pura se obtiene en estado de hidrato gelatinoso precipitando una solución de sal soluble de aluminio por el carbonato de amonio.

La alúmina anhidra se precipita calcinando el hidrato de alúmina o también el alumbre amoniacal.

Se presenta bajo la forma de un polvo blanco muy fino, suave al tacto, sin color ni sabor, que se adhiere a la lengua.

Es insoluble en el agua.

Las tres primeras dinamizaciones se preparan por trituración, y las más altas, por dilución hahnemanniana.

Acción general del medicamento

SOBRE EL SIMPÁTICO Y NERVIOS QUE PARTEN DE LA MEDULA.

LOS MÚSCULOS inervados por ellos CARECEN DE ENERGÍA; GRAN DEBILIDAD EN TODA

LA ECONOMÍA; dificultad en la deglución, estado de parálisis esofágica, dificultad en levantar y mover los brazos, parálisis de un costado del cuerpo o paraplegia, parálisis vesical o rectal.

Al principio es una inactividad general durante un tiempo más bien largo, y termina en estado de completa parálisis.

TODO ES MÁS LENTO EN EL PACIENTE DE ALUMINA; conductibilidad nerviosa disminuida; un pinchazo en las extremidades es sentido un instante después.

Los demás sentidos están igualmente debilitados, conduciendo a un adormecimiento general de la conciencia, estupefacción de la inteligencia a neta pereza mental; todo lo que impresiona llega al espíritu con marcada lentitud (Kent).

MUCOSAS SECAS, no obstante, puede haber por un tiempo MUCOSIDAD ESPESA, AMARILLA, DIFÍCIL DE ARRANCAR.

Características

CONSTITUCIÓN Y TIPO : El remedio actúa sobre los individuos secos, DELGADOS, POSTRADOS.

De aspecto ARRUGADO Y DESECADO; que dan la impresión de VIEJOS PREMATUROS; o REALMENTE VIEJOS.

Niñas cloróticas en el momento de la pubertad, chicos delicados, alimentados artificialmente.

GRAN CONSTIPACIÓN, A CAUSA DE INACTIVIDAD RECTAL; HASTA LAS DEPOSICIONES BLANDAS REQUIEREN GRANDES ESFUERZOS PARA SU EXPULSIÓN.

Como bryon., mucosas muy secas y no siente necesidad de evacuar; ambos actúan en sujetos delgados y "secos".

Ambos se complementan, y se prescriben principalmente en la CONSTIPACIÓN infantil, juntamente con anacard., sepia, silic., veratr., para esta pérdida de poder expulsivo rectal (Nash).

Modalidades

Lateralidad

Izquierda superior, derecha inferior.

Agravación

POR LA MAÑANA AL LEVANTARSE : hora de agravación de la sintomatología; la orina es expulsada con lentitud, miembros incapacitados, paciente dolorido, atontado, confusión mental, duda de su propia identidad. EN UNA HABITACIÓN CALIENTE.

DESPUÉS DE HABER COMIDO PAPAS.

Periódicamente, en particular en tiempo frío y seco, y sobre todo el cambio a tiempo seco; a veces lo mejora la humedad (Dr. O. Luser).

Mejoría

AL AIRE LIBRE; no obstante, la falta de calor vital le hace buscar el calor y ropas abrigadas.

POR LAS ABLUCIONES FRÍAS.

Síntomas mentales

CONFUSIÓN MENTAL, EL PACIENTE ES INCAPAZ DE TOMAR DECISIÓN.

Y la acción sobre el sistema nervioso cerebro-espinal se resume así : perturbaciones de la coordinación; la personalidad psíquica, sobre todo la intelectual, esfera de la representación y del juicio, perturbada en su proceso de asociación e interrumpida.

Estas interrupciones están en relación con los otros reflejos de la médula (Dr. O. Luser).

JUICIO TRASTORNADO; incapacidad de entender; lo que sabe o sabía, no le parecía cierto.

No sabe distinguir la verdad del error; ideas confusas, sus pensamientos no son claros.

SE EQUIVOCA AL HABLAR Y AL ESCRIBIR.

PERTURBACIÓN DE LA CONCIENCIA DE SU PROPIA PERSONALIDAD; inseguro de su propia identidad.

Cuando habla o mira, cree que es otra persona la que habla o mira.

Vive bajo un estado de prisa.

Nada marcha o se hace a su gusto; EL TIEMPO PASA LENTAMENTE.

Una hora le parece medio día.

Arg. nitr. tiene un síntoma semejante, siempre apurado, no termina nada.

A cann. ind. un segundo de tiempo le parece una eternidad, junto a gran excitación y locuacidad.

Medorr. también tiene sensación de que el tiempo pasa lentamente; es un antiguo gonorreico que mejora a la orilla del mar.

Nux vom. considera que el tiempo no pasa bastante rápido.

ES IMPULSIVO; temor al ver sangre o instrumentos en punta.

Cualquier instrumento que pueda servir para un homicidio, le provoca ideas suicidas. (Kent).

ESTA TRISTE, SE LAMENTA SIN CESAR; SE ATAREA SIN DARSE TREGUA; esto se acompaña siempre de un estado de precipitación; cambia frecuentemente de lugar, quiere irse, se va, vuelve, a veces no recuerda ni su nombre, y teme enloquecer; a veces ya se cree loco.

Esto lo vemos también en act. rac., calc., ostr., acon., arg. nitr., lil. tig., mancin., medorr. etc.

A veces el estado mental mejora un poco y el mal humor se transforma en un estado de TRANQUILIDAD,

CALMA, para dar nuevamente paso inmediato al estado anterior.

La mayoría de los síntomas mentales aparecen al despertar, los niños despiertan ASUSTADOS, como en aesc., lycop., y lach.

Cabeza

DOLOR DE CABEZA CON NAUSEAS Y VÓMITOS, mejoran comiendo (anac.).

VÉRTIGOS, propios de gente agotada por la fatiga, o de viejos gastados.

Al cerrar los ojos, VÉRTIGO semejante al de las afecciones medulares cuando hay esclerosis de cordones posteriores.

Síntomas semejantes *a* los de la ATAXIA LOCOMOTRIZ; al comienzo de la ataxia al. detendrá el proceso mórbido.

Cara

Cara pálida con LLAMARADAS DE CALOR DESPUÉS DE COMER; o alternancias rápidas de palidez y enrojecimiento.

Erupción con pequeños puntos pruriginosos, con sensación de telaraña sobre la piel (bar. carb., bromium, borax, graph.), o sensación de tensión como de una fina capa de albúmina seca (phosph. etc.).

Los labios secos, hendidos, agrietados.

Aparato digestivo

BOCA :

Seca, especialmente de mañana al despertar.

Puede haber acumulación de saliva amarga, o dulzona, o ácida.

GARGANTA Y ESÓFAGO :

Garganta seca y dolorida; mucosa seca, como barnizada; alimentos deglutidos con dificultad; sensación COMO SI TUVIESE UNA ASTILLA O ESPINA DE PESCADO; (hep. sulf., calc., nitr. ac., arg. nitr., natr. mur., dolich.).

ANGINA CRÓNICA DE LOS ORADORES.

La angina de alum. se desarrolla en individuos flacos con ronquera, sensación de carne viva en la garganta, deseos de escupir frecuentemente, especialmente después de esforzarse por expectorar esputos mucosos, espesos y viscosos; este estado se calma temporalmente con alimentos y bebidas calientes.

Arg. nitr. se le parece mucho, y presenta granulaciones en la garganta.

SENSACIÓN DE OPRESIÓN LARÍNGEA Y ESOFÁGICA, con dificultad para tragar.

ESTÓMAGO:

AVERSIÓN A LA CARNE (graph., puls. y arnica).

TAMPOCO LE AGRADAN LAS PAPAS, que agravan su tos, y le causan diarrea y flatulencia.

Coloc. también se agrava con papas y farináceos (Kent).

LA SAL, EL VINO, VINAGRE, PIMIENTA Y LICORES también lo agravan ni bien terminados ingerirlos.

Otros remedios espinales como zinc. tienen la misma agravación por los licores, que prácticamente los envenena y agrava todos sus males.

En cambio desea LEGUMBRES, FRUTAS Y ALIMENTOS SEMILIQUIDOS.

GENERALMENTE SEDIENTO, con deseos de cosas no comestibles, como cal. carbon, lo mismo que calc. carb., cic. vir., nux vom. Y nitr. ac.

En realidad, NO SIENTE DESEOS DE COMER; come muy poco a la vez.

Puede decirse que EN ESTE REMEDIO NO EXISTE LA DIGESTIÓN.

Tendencia catarral y ulcerativa de la mucosa gástrica, y a indigestarse a la menor ingestión.

Eructos frecuentes, amargos o ácidos; vómitos alimenticios biliosos o mucosos; todo esto puede acompañarse de náuseas, vértigos, pirósis y flatulencia (Kent).

ABDOMEN Y DEPOSICIONES :

Ambos hipocondrios afectados, principalmente el derecho, pues en alum. el HÍGADO es sede de muchos síntomas.

CONSTIPACIÓN POR INACTIVIDAD RECTAL POR PERDIDA DE SU PODER EXPULSIVO (Anac., sepia, silic., natr. mur.).

HASTA UNA DEPOSICIÓN BLANDA CUESTA MUCHO EXPULSAR.

El deseo de mover el vientre se presenta mucho tiempo antes con dolores, y exige grandes esfuerzos.

Pero puede haber también ausencia absoluta de deseo (opium, bryon., collins., sanic.).

Fiebre tifoidea con hemorragias intestinales en coágulos consistentes parecidos a pedazos de hígado (Nash).

Fisuras anales (nitr. ac., caust., graph.).

Aparato urinario

Orina pálida, turbia, abundante, con sedimento blancuzco como tiza.

Orina ardiente como corrosiva.

Necesidad frecuente con tenesmo.

Orina expulsada durante los esfuerzos para defecar, o solamente puede orinar con gran esfuerzo.

Sensación de debilidad vesical; para lograr orinar debe multiplicar sus esfuerzos.

Órganos genitales

MASCULINOS :

Debilidad, impotencia y emisiones nocturnas.

Órganos gastados por abusos funcionales.

SENSACIÓN DE PLENITUD Y AUMENTO DE VOLUMEN DE LA PRÓSTATA, con sensación de pesadez perineal.

Sensación desagradable en la región prostática después del coito; malestares continuos antes, durante y después del coito.

DESEO SEXUAL PERDIDO O DISMINUIDO.

Secreción prostática durante las deposiciones difíciles.

Erecciones nocturnas dolorosas.

FEMENINOS :

Reglas demasiado precoces, cortas, pobres, pálidas, seguidas de gran agotamiento (carb. an., coccul.).

Antes y durante las mismas, cólicos, dolores de cabeza y otros (Jahr.) Leucorrea tan profusa que a veces chorrea por las piernas (luesinum); aumenta de intensidad al aproximarse las reglas.

Espalda y extremidades

EXCESIVAMENTE DÉBIL Y FÁCILMENTE AGOTADO; le cuesta estar de pie y siente necesidad constante de sentarse.

Dolores de espalda como si un hierro candente le atravesara las vértebras.

Dolores lancinantes del sacro a la nuca.

Pesadez en los brazos, parecen paralizados.

Puntadas rápidas y repetidas en el antebrazo.

Comezón bajo las uñas que se rompen.

Pesadez y debilidad en las piernas; apenas puede arrastrarse; cuando camina tambalea y debe sentarse.

Calambres en las pantorrillas.

Entumecimiento en los talones al andar, y en los pies si cruza las piernas al sentarse.

Dolores en el dedo gordo del pie.

Piel

SECA, ARRUGADA, AGRIETADA.

Erupciones de todo tipo.

Se marchita y hay tendencia a ulceraciones, fisuras e induraciones.

Erupciones que pican por el calor de la cama (sulfur).

El paciente se rasca hasta sangrar, a continuación de lo cual le aparecerán costras o erupciones.

Ars., dolich., alum., y mezer. tienen mucho prurito y sienten alivio rascándose hasta sangrar.

Relaciones

Complementarios

Bryonia, del cual alum. es el crónico; ferr.

Antídotos

Ipeca, chamom., camphora.

AMBRA GRÍSEA

Ambra grísea o ámbar gris es una concreción intestinal de los cachalotes, que no debe confundirse con el ámbar amarillo que es una resina fósil.

Se lo encuentra en pequeñas masas que flotan en el mar o son arrojadas a las costas de la India, África y Francia; el más estimado es el procedente de Sumatra y Madagascar.

Parece cera algo endurecida, su color es intenso y agradable, y su sabor recuerda el de la grasa vieja.

Las tres primeras dinamizaciones se obtienen por trituración hahnemanniana; las más elevadas a partir de la tercera, por diluciones hahnemannianas sucesivas.

Acción general del medicamento

No llega a afectar la vía vegetativa como para producir lesiones orgánicas y se localiza casi únicamente SOBRE EL SISTEMA NERVIOSO, determinando un ESTADO NEUROPÁTICO DE TIPO DEPRESIVO, astenia general con calambres, tirones, ESPASMOS MUSCULARES a veces intensos.

Dice Farrington que donde no haya síntomas nerviosos, no debe darse este medicamento.

Características

CONSTITUCIÓN Y TIPO : Afecciones en niños excitables, nerviosos y débiles, individuos delgados y flacos, de temperamento muy nervioso y cuyo nerviosismo exagerado parece determinar su desnutrición; viejos nerviosos que pierden la memoria (Farrington).

"Individuos PREMATURAMENTE VIEJOS.

Gente de 50 años con síntomas propios de los 80; vejez prematura.

Temblor y debilidad característicos de la senilidad.

Temblor, tambaleo, estado mental con pérdida de memoria propia de una vida en plena declinación.

Habla de una cosa, sin esperar respuesta pasa a otra, saltando de una a otra idea.

Estado de espíritu soñador, de senilidad.

El remedio es útil para la gente joven cuya inteligencia no ha caído aún en la locura, pero está muy debilitada (Kent).

ENTUMECIMIENTO : Muchas molestias del remedio tienen esta característica propia de los ancianos; sensibilidad disminuida y circulación débil (Kent).

HEMORRAGIAS, SANGRÍAS FÁCILES : Abundan en este remedio; por nariz, útero, vejiga, indicando circulación perezosa en que la sangre filtra a través de las mucosas atónicas (Kent).

El remedio es útil en las ENFERMEDADES NERVIOSAS en que hay FALTA DE REACCIÓN como

consecuencia de debilidad nerviosa, en cambio psorinum se usa cuando la falta de reacción se debe puramente a un vicio constitucional.

Modalidades

Monolateralidad

Transpiración de un solo lado, o del lado afectado solamente.

Al costado derecho de la cabeza hay un punto en que al tocar los cabellos se sufre como si allí hubiese una llaga; hipersensibilidad de un solo lado del cuerpo (Kent).

Agravación

a) POR PRESENCIA DE OTRAS PERSONAS, IGUAL QUE POR LA CONVERSACIÓN; por ej. : Una mujer cuidada por una enfermera, es incapaz de mover el vientre en su presencia.

Natr. mur. no puede orinar si no está solo.

Confusión espiritual frente a otras personas.

Tan pronto como el sujeto se encuentra entre gente siente las mejillas cálidas, tiembla, sus nervios se excitan y sus ideas se desvanecen (Kent).

b) POR LA MAÑANA.

c) DESPUÉS DE HABER COMIDO.
d) Por bebidas CALIENTES y en habitación CALIENTE.
e) ESTANDO ACOSTADO.
f) POR LA MÚSICA, que no tolera porque lo agrava mentalmente y le produce dolores de espalda.
La música parece una sustancia que lo aprisiona (Kent).
Acon., graph., natr. carb., sabina, sepia, thuya).

Mejoría
POR EL AIRE FRESCO, alimentos y bebidas frías, y levantándose del lecho.

Síntomas mentales
Curiosidad momentánea, cambiante, que SALTA DE UN TEMA AL OTRO.
Pacientes que pasan de una pregunta a otra sin esperar las respuestas.
Frecuentemente se encuentra este cuadro entre las damas elegantes de la sociedad moderna.
CONFUSIÓN CON RÁPIDA EVASIÓN DE IDEAS.
Esfuerzos tremendos para poder reflexionar.
Si consigue hacerlo, se sienta para enumerar con pesadez lo más desagradable de su espíritu, de lo que no puede librarse.
Natr. mur. siente alivio al comunicar sus infortunios, pero ambr. gris. no logra.

ALTERNANCIA DE DEPRESIÓN MENTAL CON VEHEMENCIA DE CARÁCTER.
Frente a tal estado el paciente piensa que pierde la inteligencia, y por último decae para aquietarse en un rincón
MELANCÓLICO, TRISTE, DESESPERADO, no desea continuar viviendo.
Esto suele durarle días, CON LLANTO (puls).
A menudo este estado anímico es el resultado de ACUMULACIÓN DE MALESTARES MENTALES, DESGRACIAS, MALOS NEGOCIOS O DESORDENES DOMÉSTICOS.
Al contrario de un tísico, no tiene caquexia pero sí gran postración nerviosa y mental.
Nada le consuela, se considera perdido para siempre, es incapaz de razonar y ver su situación con filosofía; ya no le interesan sus negocios, ni sus amigos, se pregunta si la vida merece ser vivida. (Kent).

Sueño
Insomnio después de inquietud o preocupación por los negocios; debe levantarse.
Podrá ir a acostarse muy cansado, pero tan pronto su cabeza toma contacto con la almohada, comienza a estar preocupado y el sueño se le va (Farrington).
Durante el sueño el cuerpo está frío, tiene temblores y sacudidas en las piernas.

Cabeza
Por la mañana, cuero cabelludo dolorido, seguido de sensación de entumecimiento (Kent).
Sobre el costado derecho hay un punto dolorido como si fuese una llaga (Kent).
Cefalea compresiva que comienza en ambas sienes.
Puntadas y dolores desgarrantes, todo agravado por el ejercicio, mejorando por el reposo y acostado.
Dolor de cabeza al sonarse la nariz.
Dolor en eminencia frontal y ojo izquierdo (Kent).
VÉRTIGO SIMPLE, INDEFINIBLE, DE LOS VIEJOS.

Ojos
Picazón en los párpados como si se formara un orzuelo.
Dificultad para ver, como si las cosas estuviesen cubiertas por niebla.
Visión disminuida causada por una especie de parálisis senil o debilita mientonervioso de la vista (Kent).
Sensación de quemadura en el ojo derecho y en los párpados.
Dolores desgarrantes con punzadas cortas, en y sobre el ojo derecho; presión sobre la ceja izquierda, punzadas agravadas después de haber comido, y lagrimeo.

Oídos
Agudeza del oído disminuida; sordera sin afección orgánica.
Facultades auditivas tan alteradas que la música AGRAVA LOS SÍNTOMAS, debido a perturbación de los nervios auditivos.
Oír música congestiona la cabeza y agrava la tos.
Calc. ostr. tiene tal sensibilidad, que el solo tocar un piano produce dolores en diversas partes del cuerpo, principalmente en la laringe (Kent).

Aparato digestivo
BOCA Y FARINGE :
Sequedad bucal con sed.
Dolores laríngeos al tragar.
Sensación de crudeza en la garganta.
Agravados por la mañana.
A la sequedad se une acumulación mucosa que el paciente trata de expulsar, con provocación de tos.

Náuseas y a veces vómitos (Kent).

ESTOMAGO :

Agravación después de haber comido y de bebidas calientes, especialmente leche.

Después de haber comido, tos y bostezos.

Vómitos a cada acceso de tos.

Después de evacuar, sensación de debilidad y angustia estomacal (Kent).

Eructos con tos violenta y convulsiva.

Eructos ácidos y o agrios; distensión estomacal después de medianoche. (Boericke).

ABDOMEN Y EVACUACIONES :

Distensión de vientre con gran flatulencia, especialmente después de las comidas.

A veces esto despierta al paciente durante la noche, con borborignos y dolores punzantes intestinales; vientre frío, o sensación de que la pared abdominal interna está fría (Kent).

Sensación de presión hepática profunda; agravación por la mañana, después de haber comido y de cada deposición.

CONSTIPACIÓN INVETERADA en personas de edad, principalmente CUANDO LESES IMPOSIBLE

AGUANTAR A ALGUIEN CERCA EN EL MOMENTO DE EVACUAR.

Deseos frecuentes e ineficaces de evacuar, lo que lo vuelve ansioso y no le permite soportar a nadie cerca.

Después de evacuar, el paciente experimenta sensación de presión, o debilidad y vacío en el vientre, que se calma mediante un escape de gas o un eructo (Kent).

Aparato urinario

Al ser emitida la orina parece turbia, amarillo-marrón, y al enfriarse deja sedimento oscuro; puede ser abundante, de olor ácido, orina sanguinolenta que deja sedimento rojizo.

Durante la micción, sensación de ardor, escozor, comezón y titilación en uretra y vulva.

Órganos genitales

Comezón voluptuosa en el escroto.

Erecciones matinales violentas sin deseos, con entumecimiento de la región genital.

REGLAS DEMASIADO ABUNDANTES Y FRECUENTES, CON PICAZÓN DE LA REGIÓN GENITAL;

dolores y picazón con hinchazón de labios; aumento de las várices de las piernas, si las hubiere.

FLUJO SANGUÍNEO ABUNDANTE ENTRE PERIODOS MENSTRUALES.

Secreción sanguínea entre reglas, POR EL MENOR INCIDENTE, después de una marcha prolongada o ejercicio violento.

ESTAR ACOSTADA LE AGRAVA ESTOS SÍNTOMAS.

Aparato respiratorio

NARIZ :

Hemorragia nasal por la mañana temprano.

Sensación de sequedad nasal durante largo rato, con frecuente irritación como después de un estornudo.

BRONQUIOS Y PULMONES :

Sensación de comezón, con carraspera y de dolor en laringe y tráquea.

Sensación de comezón que comienza en la garganta.

Tos espasmódica VIOLENTA, CON ERUCTOS Y ENRONQUECIMIENTO.

Esta tos es de origen principalmente nervioso, y se acompaña de síntomas tales como temblor, nerviosidad y excitación, que podrían hacer creer en perturbaciones cerebro-espinales.

Tos por irritación por constricción de laringe, paroxística, semejante al coqueluche; con mucosidad blanca.

Disnea asmática, causada por la música, malas ideas, ansiedad, agravadas cuando un extraño se le acerca o entra en la habitación, al excitar su sistema nervioso.

Tos reflejo de influencias mentales, seguida de eructos o vómitos (Farrington).

Asma y disnea con síntomas cardíacos al menor ejercicio, o tentativa de coito (Kent).

Este medicamento es útil en el asma acompañada de trastornos cardíacos como sensación de opresión en el costado izquierdo del pecho, no como cactus, que tiene sensación de que le oprimen el corazón (Farrington).

Dolor opresivo profundo y desgarrante en el costado izquierdo del pecho (Kent).

Sensación de comezón y de crudeza en el pecho, que se desplaza si el paciente toca y rasca en el lugar (Kent).

Aparato circulatorio

Palpitaciones cardíacas y temblores al menor ejercicio, a la menor excitación, escuchando música y al menor esfuerzo mental.

Percibe el palpar hasta en las extremidades; pulsaciones y latidos en las extremidades.

Las palpitaciones conducen a disnea (Kent).

Piel

Comezón y doloración particularmente en la región genital; en los pequeños orificios : ojos, ano, etc.

Adormecimiento de la piel.

Espalda y extremidades

Miembros que se entumecen fácilmente a la menor compresión.

Las piernas al cruzarlas, los brazos al dormir sobre ellos.
Dolor de carne viva entre muslos y en hueso poplíteo.
Pesadez de miembros inferiores, debilidad paralítica; el sujeto envejece, llega a la senilidad.
Tendencia a dormirse, entumecimiento y circulación perezosa con pérdida de fuerza muscular (Kent).
Entumecimiento de miembros, piernas inseguras, tambaleo (Farrington).
Relaciones
Hay muchas semejanzas con *actea rac.*, *asa foet.*, *cocea*, *ignat.*, *phosph.*, *valer.*, y *mosch.*
Este último le sigue muy bien.

AMMONIUM CARBONICUM

Ammonium carbonicum, o carbonato de amoníaco, llamado también álcali volátil o sal volátil de Inglaterra, es un sesquicarbonato de amoníaco.

Tiene olor fuertemente amoniacal y sabor alcalino.

Las tres primeras dinamizaciones se obtienen por trituración, las más elevadas por diluciones hahnemannianas sucesivas.

Acción general del medicamento

Es un medicamento constitucional de acción profunda.

Actúa en forma marcada SOBRE LAS MUCOSAS produciendo inflamación violenta que va desde simple irritación, con sensación de escozor, de quemadura, hasta ulceración; bajo su acción las secreciones mucosas son acres, ácidas; la saliva quema los labios que se agrietan en las comisuras, se ponen en carne viva, secos, resquebrajados.

Lo mismo los párpados bajo la influencia de las lágrimas excoriantes; los órganos genitales se ulceran porque la secreción ataca las partes externas y ESTE CARÁCTER EXCORIANTE ES PROPIO DE TODAS LAS SECRECIONES DE ESTE REMEDIO.

Actúa además sobre la sangre; si se toma amm. carb. durante cierto tiempo, producirá síntomas semejantes al escorbuto, con hemorragias de sangre negra a menudo líquida, que no se coagula, por la nariz, útero, vejiga, intestinos, boca, etc.

La piel toma un aspecto marmóreo y la paciente se demacia rápidamente.

Aplicado directamente sobre la piel, produce eritema local simple seguido de dermatitis e hinchazón; pronto aparece una erupción semejante a un rash escarlatíniforme o puramente miliar.

Características

CONSTITUCIÓN Y TIPO : Amm. carb. desarrolla su acción sobre todo en individuos flácidos y adiposos, de vida sedentaria, indolentes.

Personas que tienen apariencia gruesa y robusta, pero son delicadas y débiles, de extrema friolerosidad, poco impresionables, de vida más material que intelectual, linfáticos, tristes, distraídos, que contraen afecciones catarrales fácilmente.

Indicado en MUJERES DE CONSTITUCIÓN DELICADA QUE SE DESVANECEN FÁCILMENTE, y que desean tener siempre a su alcance alguna sal aromática reconfortante.

Linfáticas sin reacción y que necesitan estimulantes (sales, alcanfor, almizcle, etc.).

GRAN DEBILIDAD GENERAL : Postración profunda, debilidad general.

Histeria en mujeres nerviosas que llevan consigo un estimulante para el caso de sentirse desfallecer al entrar en lugares cerrados.

Esto, por sí solo no es un estado histérico, pero si adquiere proporciones exageradas sería señal de terreno histérico, y amm. carb. producirá la calma necesaria al activar la acción cardíaca.

Modalidades

Lateralidad

DERECHA.

Agravación

Nocturna; de 3 a 4 hs. de la MADRUGADA; POR EL FRÍO; POR APLICACIONES HÚMEDAS; cataplasmas húmedas; al lavarse; durante las reglas (act. rac.).

Mejoría

POR EL TIEMPO SECO; acostándose boca abajo (acet. ac.) o sobre el lado dolorido.

Síntomas mentales

DEPRESIÓN MENTAL.

Si es mujer, LLORA MUCHO; CRISIS DE DESFALLECIMIENTO sin cesar, ansiedad, malestares,

HIPERSENSIBILIDAD a todo lo que oye.

TRISTEZA, ANGUSTIA, que se disipan por la noche; MAL HUMOR DE MAÑANA Y CONTIEMPO TORMENTOSO Y HÚMEDO.

Puede haber también DEBILITACIÓN DE LAS FACULTADES INTELECTUALES.

Disminución de la memoria, se hace olvidadizo, distraído, se equivoca al hablar y al escribir.

Cabeza

Cefalea con sensación de latidos y plenitud, como si la cabeza fuera a estallar y el cerebro a salir por la frente y los ojos.

La cefalea es peor de mañana, agravada por tiempo húmedo, cambio de tiempo, o caminando, especialmente durante las reglas.

Pulsaciones frontales dolorosas, calmadas por la presión y en habitación caliente.

Vértigo con sensación de remolino por la noche, obligando a levantarse.

Ojos

Ojos cansados (natr. mur.).

Ardor con fotofobia.

Chispas delante de los ojos, con cefalea.

Diplopia, aversión por la luz.

Puntos negros flotando delante de los ojos después de trabajos de costura, etc.

Aglutinación nocturna de párpados.

Oídos

Este medicamento perturba las funciones del oído causando además de sordera, secreción agria.

Cara

Generalmente pálida, hinchada, con pecas; también suele presentar puntos atípicos muy pruriginosos.

Labios secos, agrietados o sangrantes, pero lo más común es que estén agrietados en sus comisuras (arum trif., condur., graph., hep. sulf. calc; natr. mur., nitri ac.).

Aparato digestivo

Sintomatología principal en boca y faringe.

Boca seca, gran sensibilidad dentaria, sobre todo al cerrarlos sensación que son muy largos, lo cual provoca conmoción dolorosa en cabeza, ojos y oídos.

LOS DIENTES DUELEN A CADA CAMBIO DE TIEMPO O DE TEMPERATURA INTRA-BUCAL.

Los maxilares y las raíces dentarias hacen igual sensación.

Encías inflamadas e hinchadas; síntomas escorbúticos, las encías se separan de los dientes, se contraen y la mucosa sangra.

Tendencia a ULCERACIONES GANGRENOSAS DE LAS AMÍGDALAS; hipertrofia de amígdalas y ganglios de cuello, todo acompañado de gran debilidad general.

Esto se encuentra en escarlatinas malignas, difterias graves u otros estados infecciosos agudos.

SED CONSTANTE, pero con AVERSIÓN AL AGUA FRÍA.

Gran apetito, que se satisface pronto (lycop., gels., china).

En estómago e intestinos, no hay nada más de importancia ni característico.

Aparato urinario

Orina abundante, sobre todo por la noche.

Orina blanca, arenosa, fétida, turbia, a veces sanguinolenta.

Tenesmo vesical, y a veces incontinencia nocturna.

Órganos genitales

MASCULINOS :

Prurito de escroto con dolores que incluyen el cordón espermático.

Erecciones sin deseos.

Frecuentes pérdidas seminales.

FEMENINOS :

Irritación del clitoris; hinchazón de las partes genitales con sensación de ardor y prurito.

Aversión al coito.

Sensación dolorosa en todas las vísceras pelvianas, ardor como en carne viva; esta sensación está profusamente instalada y se percibe más durante las reglas.

Reglas tempranas, abundantes, sangre negruzca a menudo con coágulos, o acompañadas con cólicos, pujos, dolores renales, dentarios, sensibilidad dolorosa en muslos, CONSTIPACIÓN : tristeza, bostezos y escalofríos con diarrea coleriforme el primer día.

Vómitos, frío, cianosis, disnea y desfallecimiento, como en ver. alb.

Leucorrea ácida, opresiva, ardiente como ars. alb., hydrast., iodum, kreos., nitri ac.

Aparato respiratorio

NARIZ :

Coriza agudo o crónico con OBSTRUCCIÓN NASAL, SOBRE TODO DE NOCHE EN QUE DEBE RESPIRAR CON LA BOCA ABIERTA. (Sambuc., lycop., nux vom., sticta pulm.).

Estado catarral escorbútico de la mucosa nasal, EPISTAXIS AL LAVARSE LA CARA (kali carb., arnica, magn. carb.), o DESPUÉS DE HABER COMIDO.

LARINGE :

Tos seca por cosquilleo de garganta como si tuviera tierra, peor entre 3 y 4 de la madrugada (hyosc., kali carb., opium, rumex cris., zingiber).

BRONQUIOS Y PULMONES :

Síntomas CATARRALES CON TOS Y MUCOSIDAD ABUNDANTE, MUCHA DISNEA.

Es el remedio de la CONGESTIÓN HIPOSTÁTICA DE PULMÓN; el pecho rebosa de mucosidad difícil de expulsar, estertores ruidosos y gran debilidad.

En la última fase agotadora de la enfermedad, amm. carb. es sólo paliativo.

Indicado también cuando existe GRAN SENSACIÓN DE FRÍO, POSTRACIÓN Y SENSACIÓN DE DEBILIDAD PECTORAL, como stann.; apenas puede toser, y NO PUEDE EXPECTORAR EL MUCUS que le obstruye la respiración (ant. tart.).

Tos asmática breve, peor de madrugada; CATARRO PECTORAL EN LOS VIEJOS, peor a igual hora, en que despierta con palpitaciones, disnea, gran postración y transpiración fría.

Aparato circulatorio

Palpitaciones CARDIACAS CON DISNEA, DEBILIDAD CARDIACA Y GRAN POSTRACIÓN.

Las palpitaciones pueden oírse; angustia, sudor frío, lagrimeo, imposibilidad de hablar, respiración ruidosa, temblor de manos.

Agravación por el movimiento.

A veces puede haber sólo síntomas de simple debilidad y de simple asteniocardíaca.

Las palpitaciones y la disnea obligan al paciente a acostarse, lo cual le alivia.

Espalda y extremidades

Gran debilidad de miembros; desfallece, necesita estimulantes.

Dolores de luxación en articulaciones, mejoran por la presión, el calor y el tiempo seco.

Rigidez de nuca con tirones.

Dolores tractivos y tensivos en la espalda, que se disipan con la marcha.

Sensación de parálisis principalmente en brazo derecho con entumecimiento y espasmos.

Manos frías y azuladas, con venas distendidas.

Dolores tractivos de piernas, pies hinchados que transpiran fácilmente.

Dedo gordo hinchado y dolorido de noche.

Piel

PRURITO Y HORMIGUEO.

RASH ESCARLATINIFORME EN ROSTRO Y VIENTRE.

Amm. carb. es buen remedio para la escarlatina si el rash es muy coloreado, aún azulado, y el principal punto afectado es la garganta.

Erupción incompleta, parece querer desaparecer por carecer de fuerza eruptiva para instalar el exantema.

(Zinc. produce convulsiones en este caso).

Erisipela en viejos y debilitados, con iguales caracteres.

En ambos casos trastornos cerebrales que parecen debilidad del ebrio.

Todo el organismo parece agotado por el efecto tóxico de la infección.

Relaciones

Antídotos

Arnica, hep. sulf., calc., camph.

Incompatibles

Lach. : En los tratados de Materia Médica se lee : "es enemigo de lach".

Ello significa que habiendo dado lach. en potencia alta y habiendo dado medicamento realizado una acción curativa.

Amm. carb., no actuará después de una manera eficaz, pudiendo perturbar el caso provocando confusión o desorden en los síntomas.

Pero si lach. ha sido dado en baja potencia o cuando el sujeto ha resultado envenenado por la sustancia misma, amm. carb., en razón de la similitud de su acción, y dado en potencia alta, se convierte en antídoto, triunfando sobre gran número de síntomas tóxicos hallados en tal caso.

Si examinamos a la gente mordida por serpiente y la comparamos con la patogenesis de amm. carb. encontraremos entre ambas cosas gran similitud (Kent).

Remedios que siguen bien

Bell., bryon., lycop., puls., phosph., rhus tox., sepia, sulfur, verat.

AMMONIUM MURIATICUM

Ammonium muriaticum, o salmuriático, o clorhidrato de amoníaco, se presenta bajo la forma de cristales cúbicos u octaédricos, incoloros e inodoros, y de sabor picante, agrio, salado.

Las tres primeras dinamizaciones se preparan por trituración y las más elevadas se obtienen por diluciones hahnemannianas sucesivas.

Acción general

Actúa violentamente sobre LAS MUCOSAS, LAS QUE IRRITA Y AUMENTA SU SECRECIÓN, esto acompañado de friolidad, laxitud, postración.

Provoca SÍNTOMAS PARTICULARES EN EL TEJIDO PERIARTICULAR.

Igual que amm. carb., actúa sobre la sangre disminuyendo su coagulabilidad.

No escapa a su acción el SISTEMA NERVIOSO, especialmente la médula, a la que irrita.

Tiene cierta PERIODICIDAD; provoca una fiebre intermitente que reaparece cada siete días.

Características

CONSTITUCIÓN Y TIPO : Como amm. carb., actúa sobre los adiposos, indolentes, de temperamento linfático, muy sensibles a las impresiones exteriores.

Modalidades

Agravación

a) POR EL FRÍO; muy sensible al frío, y muchos malestares se agravan al aire libre.

b) Diferentes períodos de agravación según las zonas afectadas; síntomas de cabeza y pecho agravados por la mañana; los del abdomen a la tarde; los de miembros y piel, por la noche.

Cabeza y cara

Sensación de plenitud en la cabeza, que empeora por la mañana; muchos síntomas se acompañan de palidez facial.

Neuralgia facial inflamatoria; sensación muy dolorosa de desgarramiento en los huesos de la cara.

Aparato digestivo

Todos los cloruros alcalinos aumentan la secreción de las mucosas del tracto digestivo; pueden provocar un verdadero "CATARRO" de estas mucosas.

Tal lo que ocurre con amm. mur., frecuentemente empleado contra el CATARRO INTESTINAL (Hughes).

Acumulación de una espesa capa de tejido adiposo alrededor de la pared abdominal.

Por lo general el tipo de este remedio tiene MUCHO VIENTRE, PESADO Y RELAJADO, Y EXTREMIDADES INFERIORES DELGADAS.

ABDOMEN FLATULENTO Y DISTENDIDO por mucho gas; puede haber dolores picantes, ardientes, desgarrantes, punzadas y un dolor particular en las INGLES.

CONGESTIÓN HEPÁTICA, con posibilidad de punzadas.

EXCORIACIONES con sensación de QUEMAZÓN EN ANO Y RECTO, durante y largo rato después de evacuar.

Puede haber HEMORROIDES MUY DOLOROSAS.

Pero el síntoma más marcado del tubo digestivo es CONSTIPACIÓN PERTINAZ con DEPOSICIONES DURAS, SECAS, que SE DESMENUZAN y son difíciles de expulsar.

A veces pueden aparecer cubiertas de mucosidad, como caust., que tienen deposiciones parecidas y brillantes, como grasientas, alum., graph., cascara, collins., hydrast., nux vom., sepia, etc., todas ellas duras y cubiertas de mucosidad.

Evacuaciones duras, terrosas al salir del ano.

Según Dewey, todas las sales alcalinas tienen esta característica.

Órganos genitales femeninos

Reglas con pérdidas sobre todo marcadas de noche. (magn. carb., bovista, zinc., coca).

Generalmente adelantadas, sangre oscura, a menudo acompañadas de diarrea y vómitos.

Aparato respiratorio

NARIZ :

Muchos estornudos, secreción acuosa ardiente, nariz tapada.

Coriza con sensación de quemadura en la laringe.

LARINGE Y BRONQUIOS :

Ronquera y dolor ardiente en la laringe.

Catarro que se extiende de la laringe a los bronquios con picazón, desgarramiento, ardor; necesidad de toser sin cesar, o mejor dicho de carraspear a causa de abundante moco blanco.

Tos seca a causa de un continuo picar de garganta.

PULMONES :

Tos seca, entrecortada, que raspa, peor al acostarse, sobre el costado derecho o de espaldas.

Tos pringosa por la tarde, profusa expectoración y grumos mucosos.

Repentinos dolores agudos en el pecho; dolores ardientes en pequeñas zonas del pecho.

Disnea.

Espalda y extremidades

Sensación de frío entre los hombros (abies can., caps., lachnantes, sepia); este síntoma aparece generalmente en las afecciones pectorales, lo que determina la elección de este remedio y es síntoma tan esencial como lo es la sensación de quemadura en el mismo lugar, de lycop. o phosph.

DOLORES EN LOS MIEMBROS CON SENSACIÓN DE QUE MÚSCULOS Y TENDONES ESTUVIESEN RETRAÍDOS Y FUESEN MUY CORTOS (caust., cimex, natr. mur.); CIÁTICA con sensación de contractura en músculos y tendones; se siente mal estando sentado, mejora por la marcha, y se calma del todo estando acostado.

Dolores EN LOS TALONES COMO SI ESTUVIESEN DESOLLADOS (cycl., ledum., phytol., manganum, valeriana.).

Relaciones

Antídotos

Coffea, nux vom.

Complementarios

Lo sigue bien ant. crud., phosph., sanicula.

ANACARDIUM ORIENTALE

Anacardium oriental o anacardium de oriente, árbol de la familia de las Terebintáceas, crece en los bosques de la India.

Es preciso distinguirlo del anacardium occidental que crece en América y da un fruto llamado nuez de acayoiba, de anacardo o de caoba.

El fruto del anacardium oriental tiene forma de corazón y se llama "Haba de Malaca".

La tintura madre, de la cual se preparan todas las dinamizaciones homeopáticas del remedio, se hace con esta haba de Malaca triturada y macerada en alcohol.

Las tres primeras dinamizaciones se pueden obtener también partiendo de una trituración del haba de Malaca previamente pulverizada.

Acción general del medicamento

Es un DEPRESOR DEL SISTEMA NERVIOSO, en el que produce síntomas de gran debilidad y postración general muy marcada, con obnubilación de la voluntad y pérdida de memoria.

El tubo DIGESTIVO, particularmente EL ESTÓMAGO, es otro punto elegido por la actuación del remedio; el lugar que ocupa este medicamento en la Materia Médica está avalado por los síntomas nerviosos y estomacales.

Por último actúa SOBRE LA PIEL produciendo erupción eritematosa, luego papulosa, vesiculosa, y finalmente pustulosa; es una verdadera dermatosis con sensación de quemadura, prurito, enrojecimiento o hinchazón; después de varias horas las pústulas se transforman en ampollas que finalmente revientan dejando salir un líquido purulento, quedando la piel en carne viva, ulcerada, y durando la supuración largo tiempo; no obstante, protegiendo cuidadosamente la ulceración, puede cicatrizar al cabo de diez días.

Características

CONSTITUCIÓN Y TIPO : Individuos nerviosos, muy deprimidos, muy irritables, débiles de memoria, melancólicos, ansiosos, con manías contradictorias y perturbaciones gástricas e intestinales características.

GRAN DEPRESIÓN NERVIOSA CON OBNUBILACIÓN DE LA VOLUNTAD, PERDIDA DE MEMORIA, VERDADERO ESTADO NEUROPÁTICO.

Sensaciones particulares

Sensación, en cualquier parte del cuerpo, DE TENER UN CLAVO, UNA ASTILLA O UN CUERPO EXTRAÑO (nitri. ac.).

Sensación como si ALGUNAS PARTES DEL CUERPO ESTUVIESEN APRETADAS POR UN CÍRCULO (cactus).

Sensación general de tener un clavo, o una opresión, o un cuerpo extraño en el interior de los ojos, o del estómago, recto, vejiga, columna vertebral; las sensaciones de un círculo que oprime, su pesadez y constricción periférica mejoran comiendo, durante la comida.

Modalidades

Lateralidad

Izquierda superior, derecha inferior.

Mejoría

a) POR EL REPOSO b) A LA NOCHE c) COMIENDO : modalidad característica del remedio el momento bueno del día es durante la comida, cualesquiera sean los síntomas : físicos, sensoriales, mentales, funcionales, desaparecen cuando come.

Agravación

POR EL EJERCICIO FÍSICO, sobre todo por EL TRABAJO MENTAL.

POR LA MAÑANA.

POR LAS APLICACIONES CALIENTES.

Síntomas mentales

DEBILIDAD DE ESPÍRITU DESPUÉS DE SURMENAGE NERVIOSO.

TRABAJO INTELECTUAL DIFÍCIL POR DEPRESIÓN CEREBRAL.

El menor esfuerzo mental causa TORMENTO CEREBRAL.

Vive en una especie de SUEÑO PERMANENTE DE COMPRENSIÓN MUY LENTA, por haber perdido la memoria a veces bruscamente.

SIENTE QUE EL ESPÍRITU SE LE VA; se vuelve triste, HIPOCONDRIACO, INDIFERENTE, IRRITABLE, CONTRADICTORIO, RENCOROSO, DESCONFIADO, (hyosc.); PIERDE LA CONFIANZA EN EL Y TODOS,

es irresoluto, SE SIENTE CONTINUAMENTE EMPUJADO POR DOS CORRIENTES OPUESTAS, tiene IMPULSOS CONTRADICTORIOS, VE LAS COSAS DE FORMA EXTRAÑA, su olfato se pervierte, SIENTE OLOR A MADERA QUEMADA o a ESTIÉRCOL DE AVE; OYE VOCES QUE LE DICTAN IDEAS CONTRADICTORIAS, SE VUELVE ANSIOSO y hasta cree TENER DOBLE PERSONALIDAD (baptisia se cree a pedazos); can. ind., petrol, no sólo se cree doble sino que le parece que alguien está en el lecho a su lado; stram. cree que es doble, confunde su persona y su identidad, y cree que le falta una parte de si mismo. DESEO IRRESISTIBLE DE JURAR Y BLASFEMAR, EMPLEA LENGUAJE GROSERO, VIOLENTO. (Nash hace notar que stram. también desea jurar continuamente).

Toda la sintomatología descripta desaparecerá o al menos se calmará desde el instante que empieza a comer; en la mesa no estará jamás desequilibrado, por lo que a las horas de comer jamás sufrirá ningún impulso brusco que le perturbe.

Cabeza

Síntomas de congestión ce fálica, vértigos, cefalea generalizada como producida por una astilla.

Se agrava por el movimiento mejora acostado y mientras come.

La cefalea se acompaña generalmente de SENSACIÓN COMO DE TAPÓN SOBRE EL BORDE ORBITARIO DERECHO.

Oídos

AUDICIÓN disminuida, el paciente parece tener algo que lo tapa o apoya sobre el tímpano.

Dolor interno como de astilla empeorado al apretar los dientes y al tragar.

Cara

Frecuentemente pálida, enfermiza, con los ojos circundados por ojeras, hundidos y brillantes.

Aparato digestivo

BOCA :

ALIENTO FÉTIDO; a lo que come le siente MAL GUSTO.

Por otra parte, la lengua está blanda.

ESTOMAGO :

DOLORES VIOLENTOS; la gastralgia MEJORA COMIENDO; ingiere líquidos y sólidos de prisa : (psor., phosph., iodium).

SENSACIÓN DE ESTOMAGO VACÍO, QUE DESAPARECE COMIENDO (chelid., sulfur).

NAUSEAS Y VÓMITOS CUANDO EL ESTOMAGO ESTA VACÍO; esto, lo mismo que los dolores calambroides, con irradiación a la columna vertebral, desaparecen comiendo.

En lugar de dolores puede haber SENSACIÓN DE PLENITUD CON DISTENSIÓN GÁSTRICA Y ERUCTOS QUE NO CALMAN, TODO ELLO MEJORA COMIENDO.

ABDOMEN Y DEPOSICIONES :

Sensación de astilla en el intestino; sensación de un peso muerto que oprimiera al intestino con IMPRESIÓN DE CONSTRICCIÓN ALREDEDOR DEL ABDOMEN.

Cólicos flatulentos con grandes deseos de evacuar.

Dolores en la región hepática.

CONSTIPACIÓN CON DESEOS URGENTES pero ineficaces (nux vom.); mientras en este último es resultado del peristaltismo intestinal invertido, en anac. or. se debe a insuficiencia funcional, verdadera astenia rectal, que da la SENSACIÓN DE UNA ASTILLA EN EL ANO QUE QUISIERA SALIR Y NO PUEDE (Kent).

Evacuación difícil aún de materias blandas, como si el intestino estuviese paralizado. (agn. cast., alum., platina).

Órganos genitales

Secreción de líquido prostático al evacuar (agn. cast., alum., phosph., sabal., selen.).

Emisión de líquido seminal al soñar.

Deseos aumentados.

Prurito voluptuoso de escroto.

LEUCORREA con sensibilidad y comezón.

Espalda y extremidades

DEBILIDAD PARALÍTICA DE MIEMBROS Y ESPALDA; a veces total, o localizada en un grupo de músculos.

A VECES SENSACIÓN DE PESO en determinada región : espalda, columna, antebrazo, como si una astilla estuviese fuertemente encajada.

Esta sensación es casi siempre INTERMITENTE, pocas veces pulsátil.

A veces le parecerá que sus miembros están vendados, apretados por ligaduras.

CONSTRICCIÓN alrededor de las rodillas.

Calambres neurálgicos en las pequeñas articulaciones digitales, calambres rítmicos latentes, sincronizados con el latir del pulso.

CALAMBRES en PANTORILLAS, TALONES, DEDOS DEL PIE.

Todo esto también mejora comiendo.

Piel

VESICO-PUSTULAS CON INTENSO PRURITO; Boericke cita a este respecto la siguiente observación : "Una joven institutriz después de un esfuerzo cerebral considerable vio cubrir su piel de erupción roja, ardiente, extremadamente pruriginosa, principalmente en espalda, abdomen y piernas.

La medicación alopática no dio resultado.

Consultó al Dr. Dewey, quién la curó con anac. después de un examen completo.

Dijo dicho facultativo que las tres características para la elección del remedio fueron la erupción, las perturbaciones gástricas y el estado mental. (De "Medical Century" - Enero 1912).

La erupción de "lichen-plan" cuando va acompañada de los demás síntomas característicos, también responde a la acción de anac.

Relaciones

Antídotos

Coffea, camphora, juglans cinerea.

Complementarios

Actúa bien antes o después de platina.

Sigue bien a lycop. y puls.

ANTIMONIUM CRUDUM

Antimonio crudo o sulfuro negro de antimonio es un Protosulfuro de antimonio cuya fórmula es : Sb₂ S₃.

Se encuentra en los terrenos mezclado a menudo con sulfuros de plomo, hierro y arsénico.

Se presenta bajo la forma de prismas ortorrómbicos color azul oscuro, menos brillantes y menos densos que el antimonio metálico.

Sin olor ni sabor, es insoluble en agua y en alcohol.

Se trata del producto antiguamente empleado en medicina con el nombre de antimonio.

Las tres primeras dinamizaciones se preparan por trituración hahnemanniana, y a partir de éstos obtenemos las dinamizaciones más elevadas.

Acción general del medicamento

Sobre el neumogástrico, por medio del cual manifiesta sus potentes propiedades hemáticas.

Actúa sobre los órganos dependientes de este neumogástrico : DIRECTAMENTE sobre meninges, faringe, laringe, esófago, tráquea, pulmones, pleura, corazón, estómago, intestino delgado : INDIRECTAMENTE (Visceras abdominales) por intermedio de sus anastomosis con el simpático (Plexo solar).

Su acción es hipoasténizante.

También actúa sobre las mucosas del tracto digestivo aumentando sus secreciones.

Marcada influencia sobre PIEL y FANERAS.

La función nutritiva sufre afectaciones de la vía vegetativa.

Dice Boericke : "Son los síntomas mentales y los de la esfera gástrica los que determinan la elección del remedio" y

Kent agrega : "Es sorprendente ver, estudiando este remedio, que todos los síntomas tienen por centro el estómago".

Poco importa la clase de malestares, el estómago lleva la parte principal.

Los dolores gástricos producen náuseas; cefalea que causa mareos; todo acompañado de gran malestar estomacal.

Características

CONSTITUCIÓN Y TIPO : Actúa en ambos extremos de la vida : los niños y los jóvenes, por un lado, y los viejos por otro.

Dice Espanet : "LAS constituciones más favorables a la acción de este remedio son aquellas en que se desarrollan grandes vísceras con o sin tejido adiposo.

Los grandes calores, los climas cálidos, exigen una alimentación más excitante que abundante.

Entonces a la menor sobrecarga de alimentos o desarreglo en el régimen, ocasionan digestiones laboriosas que desgastan la actividad simpática, sobre todo la del neumogástrico".

Estado mental

Lo importante para la elección del remedio puede resumirse así : a) ASPEREZA DE CARÁCTER, TRISTE, IRASCIBLE Y GRUÑÓN; si es un niño, no tolera que se le toque, que se le examine, no quiere ser paseado (chamom.) : un adulto, es malhumorado y triste.

b) ABORRECIMIENTO A LA VIDA : NO TIENE DESEOS DE VIVIR, LA VIDA ES PARA EL UNACARGA. Lengua BLANCA, MUY BLANCA, CUBIERTA DE UNA CAPA BLANCA MUY ESPESA; otros medicamentos acusan este signo (hydrast., kali carb., puls., sepia) aunque ninguno tan marcado como ant. crud.

Modalidades

Lateralidad

Derecha superior, izquierda inferior.

Mejoría

Por el reposo, estando acostado, tranquilo, por aplicaciones calientes, baños calientes y al aire libre.

Agravación

a) POR EXCESO DE CALOR, PARTICULARMENTE DEL SOL. (bryon., glonoin, gels., natr. carb., lach.).

El remedio desarrolla su acción particularmente en CLIMAS CÁLIDOS O EN VERANO.

El calor agota y empeora los síntomas gástricos.

La tos se agrava al pasar del aire frío al calor (bryon., natr. carb.).

Todos los síntomas se agravan por el calor, tanto del sol, como de una estufa.

El niño con coqueluche se agrava al aproximarse al fuego. (Kent).

b) Por los baños fríos (rhus tox., sulfur); el niño llora al ser lavado o bañado en agua fría.

c) DESPUÉS DE HABER BEBIDO VINO, VINAGRE U OTRA BEBIDA ÁCIDA. (zinc.).

d) Después de haber comido abundantemente cerdo, pan o pasteles.

e) De noche; al claro de la luna (humor sentimental al claro de luna).

Síntomas mentales

Individuos huraños; descontentos de todo lo que los rodea; amantes de contradecir; malhumorados, sin deseos de hablar; se ofenden por lo más mínimo.

Niños gordos, insaciables, denotan mal humor cuando se los mira; no quieren ser tocados, mirados, y los más insignificante los encoleriza.

Esta irritabilidad nos recuerda a bryon., chamom., nux vom., china, sepia.

Disgusto por la vida que es una carga para ellos.

Acompañado de depresión y agotamiento nerviosos.

Mujer triste, melancólica, sentimental, sin deseo alguno.

Este síntoma, muy propio de la pubertad, también se encuentra en un enfermo con fiebre continua, como fiebre tifoidea, de la que ant. crud. tiene toda la postración, como ars. alb. además tiene temor a la muerte; por otra parte ars. alb. está siempre agitado y ant. crud. no; ars. alb. es sediento y ant. crud. nunca tiene sed (Kent).

Todo esto se agrega un síntoma que a veces aparece sólo por instantes : las jóvenes mujeres sentimentales, histéricas, fácilmente irritables, se conmueven ante una luz suave como la que puede filtrarse a través de un vidrio de color; este síntoma quiere decir HUMOR SENTIMENTAL A LA LUZ DE LA LUNA.

Es un desbordamiento desordenado de los afectos que sólo puede encontrarse en desequilibrados.

Sueño

Somnolencia, SOPOR CONTINUO DURANTE EL DÍA.

De noche, sueños agitados y ansiosos.

Cabeza

CEFALEA PRINCIPALMENTE INSTALADA EN EL VÉRTICE, después de un baño o relacionada con trastornos gástricos, o después de haber bebido vino amargo, ácido, o de haber comido dulces.

Vértigos, náuseas y epistaxis.

SENSACIÓN DE PESADEZ EN EL VÉRTICE.

Agravada por el movimiento, subiendo escaleras o en habitación caliente, sobre todo si el paciente está cerca de una estufa.

Mejora por el reposo al aire libre; MEJORÍA INMEDIATA SI APARECEN VÓMITOS.

MEJORÍA POR UNA ELIMINACIÓN, es la característica de ant. crud. : coriza, diarrea, vómito, mientras que la supresión de una secreción causa EMPEORAMIENTO O PROVOCA LA CEFALEA O MIGRAÑA; LOS TRASTORNOS GÁSTRICOS Y LAS MIGRAÑAS ESTÁN LIGADOS ÍNTIMAMENTE AL FUNCIONAMIENTO ORGÁNICO Y SIGUEN EL RITMO DE LAS SECRECIONES.

Ojos

Inflamados, rojos, los párpados presentan una ligera supuración mucosa superficial; se abren con dificultad;

COMISURAS PALPEBRALES FISURADAS, EN CARNE VIVA.

Blefaritis crónica y fotofobia, especialmente por la luz del sol y la del fuego brillante. (merc.).

Cara

Erupciones supurantes, granos, pústulas, forúnculos; COSTRAS AMARILLENTAS EN MENTÓN Y MEJILLAS.

Fosas nasales HENDIDAS, FISURADAS, CUBIERTAS DE COSTRAS CON ECZEMA.

LABIOS SECOS Y COMISURAS HENDIDAS; ECZEMA PERIBUCAL Y HENDIDURAS DOLOROSAS EN LAS COMISURAS (arum., condur., graph., hep. sulf. calc., nitri ac.).

Aparato digestivo

Este capítulo, juntamente con el de los síntomas mentales es la parte más importante de la patogenesia de ant. crud.

BOCA :

Salivación abundante, salada; gusto amargo en la boca con SED ARDIENTE, SOBRE TODO A LA NOCHE.

Encías sangrantes; odontalgia peor de noche, en dientes cariados.

El principal signo bucal, netamente característico, es : LENGUA CUBIERTA POR UNA CAMADA BLANCA, ESPESA, LENGUA BLANCA COMO LA LECHE; SE DIRÍA QUE LA LENGUA SE HA CUBIERTO DE UNA CAPA DE BLANQUEO ESPESA.

Otros medicamentos tienen lengua blanca : hydrast., kali carb., puls., sepia, ant. tart., más bien amarillenta oscura, pero ninguno de una blancura tan neta y uniforme como ant. crud.

ESTOMAGO :
SIN APETITO.

El solo PENSAR EN ALIMENTOS, o su OLOR, basta para provocar NAUSEAS O VÓMITOS (colch., ars., sepia). Gran deseo de alimentos ácidos (ant. tart., magn. carb., myrica, sepia).

Náuseas constantes.

Sensación de pesadez como si el estómago estuviese sobrecargado, como si hubiese comido demasiado, aún con el estómago vacío; sensación de estómago distendido, aún cuando el epigastrio esté plano.

Esfuerzos continuos para vomitar, náuseas y la sensación de pesadez aumentan progresivamente, sin que los vómitos calmen (Kent).

Trastornos digestivos provenientes de sobrecarga estomacal ant. crud. es útil para las molestias que siguen a un banquete o cena demasiado abundante, por ej. la de Navidad; lengua muy blanca, sensación de plenitud, distensión estomacal y abdominal, eructos desagradables, con el gusto de la comida ingerida, tardan en aparecer las náuseas y por último los vómitos con restos alimentarios (Dewey).

Ant. crud. es el remedio de los desarreglos estomacales recientes, digestión difícil con eructos, náuseas, vómitos por sobrecarga estomacal, sobre todo de cosas indigestas y bebidas ácidas (vino, vinagre, etc., que a pesar de hacerle mal, desea).

Ipeca tiene alguna analogía, aunque predominan las náuseas, no los vómitos y la lengua está limpia.

Puls. es también útil en trastornos digestivos por abuso de alimentos, demasiados, grasos, pesados, helados y además diarrea, pero carece de los vómitos característicos de ant. crud. bryon. es útil en catarro gástrico por abuso en comidas, lengua blanca, boca seca, pero es mucho más irritado que ant. crud., la lengua es blanca sólo en el medio, los bordes son rosados, hay generalmente CONSTIPACIÓN, deposiciones duras, oscuras y secas; no obstante si hay diarrea, es acuosa, fétida, con olor a queso viejo. (Farrington).

METÁSTASIS GOTOSA EN ESTOMAGO O INTESTINOS :

La naturaleza gotosa del caso parece cambiar de golpe, aparecen los vómitos de repente, duran días y semanas, hasta que los síntomas gotosos reaparecen en las extremidades.

Es notable la rapidez y brusquedad de este cambio de localización sintomática; de golpe la gota cesa en las extremidades y reaparecen los síntomas gástricos; puede llamársele, si se desea, "gota del estómago" (Kent).

ABDOMEN :

Violentos dolores abdominales, CÓLICOS con dolores ardientes y gran hinchazón; plenitud y distensión después de comer (lycop.) con eructos y gases intestinales.

Esta sensación suele aumentar gradualmente, ejerciendo presión y aumentando la tensión.

Este timpanismo puede presentarse en la fiebre tifoidea, diarreas estivales o en simple caso de flatulencia; puede asociarse a la lengua blanca y a los trastornos gástricos, si se trata de un gotoso, en que los tofos son muy sensibles, y el estómago e intestinos están distendidos y dolorosos.

Puede haber INFLAMACIÓN Y CONGESTIÓN HEPÁTICA.

Hígado grande y duro, con dolor en regiones hepática y vesicular.

Dolores desgarrantes.

A veces se asocia a estos síntomas, la ictericia (Kent).

ANO Y DEPOSICIONES :

HEMORROIDES CON SECRECIÓN CONTINUA QUE MANCHA LA ROPA; MUY DESAGRADABLE PARA EL ENFERMO.

Estas hemorroides son muy violentas en estados gotosos crónicos si se toma un baño frío, si el tiempo es húmedo, y si hace frío.

Se agravan por el vino, alimentos y bebidas ácidas.

Estómago, intestinos, recto y hemorroides se agravan por los desarreglos estomacales, con bebidas ácidas o alimentos indigestos, por baño frío o tiempo húmedo (Kent).

ALTERNANCIAS DE CONSTIPACIÓN Y DIARREA, SOBRE TODO EN LOS VIEJOS; LA DIARREA ES ACUOSA CON PEQUEÑAS MASAS FECALES Y LA CONSTIPACIÓN ES SECA Y DURA. (chelid., estos síntomas acompañan a los trastornos hepáticos propios del remedio; collins., particularmente en las mujeres; nux vom., en que aparecen como consecuencia del abuso de purgantes, principalmente drásticos; podoph., donde la diarrea aparece temprano a la mañana y con frecuente prolapso rectal).

La característica de la diarrea de ant. crud. es que está formada por partes acuosas y partes sólidas (ant. tart. es totalmente líquida).

La diarrea de ant. crud. parece requerir mucho tiempo para vaciar el intestino; primero se expulsa un poco, al cabo de un instante otro poco, hasta que una vez vaciado el intestino, sobreviene un tenesmo muy pronunciado.

Esta diarrea termina en disentería, con gran inflamación de colon y recto, muy dolorosa, mucho tenesmo, prolongados esfuerzos y gran agotamiento. (Kent).

Órganos genitales

Los trastornos genitales, principalmente en la mujer, están íntimamente ligados al estado mental.

Los estados melancólicos, exaltación, tristeza, depresión, tienen relación con PTOSIS DE ÓRGANOS ABDOMINALES. (L. Vannier).

VÍSCERAS PELVIANAS RELAJADAS, SENSACIÓN DE TIRÓN DE ARRIBA HACIA ABAJO EN EL VIENTRE.

PROLAPSO UTERINO con secreción semejante a leucorrea.

Diversos trastornos menstruales.

Ovarios irritables y dolorosos, tal como ocurre en las jóvenes histéricas, soñadoras y presentan el cuadro mental ya descrito. (Kent).

LAS REGLAS PUEDEN SER PRECOCES Y MUY ABUNDANTES o bien SUPRIMIDAS, por un baño frío, con sensación de ptosis, de presión pelviana hacia abajo y marcada sensibilidad en la región ovárica.

Antes de las reglas, la paciente se queja a menudo de odontalgia.

Leucorrea acuosa, o bien ácida, espesa, irritante.

Prurito vulvar con excitación genital.

Aparato respiratorio

NARIZ :

CATARRO DESPUÉS DE HABER TOMADO FRÍO; SENSACIÓN DE HINCHAZÓN AL ENTRAR EN UNA HABITACIÓN CALIENTE.

CORIZA con tendencia a hacerse crónico, por la constitución pobre del paciente.

Cuando ya es crónico está relacionado con dolores de cabeza y empeora de noche.

A medida que el catarro disminuye y se vuelve más seco aumenta el dolor de cabeza.

Neuralgias cefálicas y al mismo tiempo malestar estomacal, náuseas y vómitos.

Podrá esto confundirse con angina gástrica, pero basta recordar que todo apareció después de haber tomado frío, que la secreción nasal disminuyó al aparecer la sensación de sequedad de la mucosa nasal, y que el aire inhalado al pasar por ella daba una sensación de escozor.

A veces el dolor de cabeza persiste a pesar de los vómitos o sólo desaparece después de vómitos prolongados.

Hay otros remedios que mejoran el dolor de cabeza por los vómitos, pero enant. crud. éstos son violentos, interminables y extremadamente agotadores.

El dolor de cabeza agrava por el movimiento, por la noche, en habitación cálida, por exceso de calor, o por el calor irradiado por una estufa, por el fuego o por una luz, mientras que mejora acostado, estando quieto o al aire libre (Kent).

Esta descripción del coriza de ant. crud. demuestra que en este remedio catarral nasal, cefalea y síntomas gástricos pueden constituir el cuadro completo.

LARINGE :

PERDIDA DE LA VOZ DESPUÉS DE UN ACALORAMIENTO : voz chillona que a veces se quiebra.

El paciente toma un baño frío al acostarse, y a la mañana siguiente al despertar está AFÓNICO; afonía indolora, de la que se da cuenta al querer hablar; puede haber a la vez espasmos laríngeos, y estrechez dolorosa de garganta (Kent).

Además el catarro puede ir bajando hasta provocar bronquitis y hasta bronconeumonía.

PULMONES :

TOS ESPASMÓDICA, SECA, EN PAROXISMOS DECRECIENTES.

Comienza muy violentamente y va perdiendo violencia.

Tos seca, con sensación de comezón en laringe o tráquea.

(EMPEORA entrando en habitación caliente, como bryon., natr. carb).

Catarro sofocante en viejos, adultos y niños, expectoración difícil con esfuerzos denodados, de esputos viscosos, pegajosos, espesos, que se adhieren a los bronquios.

Espalda y extremidades

Sacudidas musculares sacudidas en los brazos.

Dolores artríticos en los dedos; nudosidades gotosas en muchas articulaciones; tofos.

UÑAS QUE CRECEN MAL, QUEBRADIZAS.

Si por casualidad se doblan y se quiebran, crecen mal y no alcanzan el largo de las demás.

Silic. uñas de manos y pies deformadas; graph. uñas gruesas y deformadas.

Thuya, tiene uñas deformadas y quebradizas.

Igualmente puede haber EXCRECENCIAS CORNEAS DOLOROSAS BAJO LAS UÑAS, a diferencia de caust. que tiene VERRUGAS BAJO LAS uñas, VERRUGAS CORNEAS EN MANOS Y PLANTAS DE PIES.

Callos inflamados.

Pies débiles con grandes superficies callosas en la planta que se vuelven sensibles impidiendo el apoyo perfecto.

Esta sensibilidad ha servido como síntoma para prescribir este remedio en algunos casos de reumatismo crónico.

Otros medicamentos tienen la planta del pie muy sensible; bar. carb., led. pal., lycop., y medorr.

La más ligera presión producirá una callosidad EN LA PLANTA DE LOS PIES, o al menos un punto doloroso.

En algunas personas hay tendencia al espesamiento de la piel de la planta de los pies, que les produce extrema sensibilidad que provoca dolor al caminar.

Piel

En la piel tiene art. crud. gran actuación.

Erupciones vesiculosas rojas y dolorosas. (ant. tart. en menor grado).

Gran tendencia característica a INDURACIÓN CORNEA, ESPESAMIENTO.

En la planta de los pies, se forman capas que renacen si son cortadas.

COMEZÓN, ERITEMAS, erupciones semejantes a picazón de ortiga acompañando frecuentemente a los síntomas gástricos.

Erupciones con costras duras, espesas, como miel; la piel se resquebraja fácilmente, y ello es muy marcado en fosas nasales y comisuras de labios y párpados lo que nos recuerda a graph.

Transpiración abundante, sobre todo nocturna, agotadora, tal como la que podemos hallar en una enfermedad lenta.

Sudores por el menor ejercicio; si el paciente está expuesto a un pequeño exceso de calor, se pone a transpirar abundantemente y luego toma frío con facilidad.

Relaciones

Complementarios

Squilla.

Antídotos

Hep. sulf. calc.

ANTIMONIUM TARTARICUM

Antimonium tartaricum o tartarus emeticus, es un tartrato doble de Antimonio y de Potasio.

Su fórmula química es : $C_4 H_4 O_7 Sb$ sal en forma de cristales octaédricos incoloros y transparentes, que al aire se cubren lentamente de un polvo blanco.

Inodoro, de sabor ácido desagradable y soluble en alcohol.

Las tres primeras dinamizaciones se obtienen por trituración, y las siguientes por diluciones sucesivas.

Acción general

Actúa principalmente sobre el sistema nervioso ganglionar y va aniquilando la vitalidad sobre la que ejerce acción debilitante con el consiguiente agotamiento del influjo nervioso en tejidos y órganos de la vida vegetativa en general, y en particular en pulmones y vísceras abdominales (Espanet).

Es un DEPRESOR DEL SISTEMA NERVIOSO por medio del cual produce parálisis motrices y sensoriales con pérdida de reflejos.

Es un gran DEPRESOR CARDIACO, que actúa profundamente sobre la circulación.

También es importante su acción SOBRE LAS MUCOSAS, provocando CATARRO INTENSO con SECRECIÓN MUY ABUNDANTE sosa y dulce antes que ácida.

Sobre la piel produce ERUPCIÓN PUSTULOSA que recuerda la de la viruela.

Características

CONSTITUCIÓN Y TIPO : Estado que se agrava rápidamente, intoxicación profunda manifiesta por estado de asfixia si ataca los pulmones o por síntomas coleriformes si ataca el tubo digestivo.

En ambos casos hay cianosis evidente, cara consumida y ojos hundidos con ojeras; fosas nasales dilatadas y con movimientos rápidos, labios lívidos, a veces azulados, cara fría, terrosa, con sudores fríos, en fin, signos de afectación orgánica general y profunda, con asfixia progresiva de todos los tejidos.

Este medicamento conviene particularmente en las EDADES EXTREMAS, siendo aplicado tanto en viejos debilitados en los que una simple bronquitis puede provocar un desenlace fatal, como en niños miedosos y enclenques cuyo desarrollo está perturbado por trastornos intestinales.

GRAN SOMNOLENCIA Y SOPOR QUE PUEDEN LLEGAR AL COMA; valor primordial de este síntoma según KENT, para su prescripción; postración y debilidad marcadas.

Nux mosch. y opium tienen también sopor muy pronunciado.

En menor grado, arnica Y baptisia.

GRAN ACUMULACIÓN MUCOSA EN EL CANAL RESPIRATORIO, con grandes grumos mucosos difíciles de expulsar.

Bronquitis llenos de mucus muy abundante, que no puede expulsar.

NAUSEAS TAN INTENSAS COMO LAS DE IPECA, aunque tan persistentes, ya aliviadas por los vómitos.

Modalidades

Agravación

a) Por la tarde y LA NOCHE; ACOSTADO.

b) POR EL CALOR.

c) Por el tiempo frío y húmedo.

d) Por cambios de tiempo; en primavera.

e) POR LA LECHE Y LOS ÁCIDOS, que no obstante desea.

Mejoría

- a) Por el frío intenso.
- b) Estando sentado o parado.
- c) Por los eructos y la expectoración.

Síntomas mentales

En esta esfera no hay síntomas tan característicos como en ant. crud.

Paciente abatido, con miedo de estar solo.

Estupor, musita, delira.

Niños que no quieren ser tocados, lloriquean; disposición a la acritud y aspereza, que puede ser menor que en ant. crud.

Cabeza

Dolor como si estuviese apretada por una ligadura (nitr. ac., carbol. ac.).

Estos dolores son tan frecuentes como en ant. crud., sin mayor diferencia entre ellos.

Vértigo alternante con sopor.

Vértigo con embrutecimiento y confusión y postración alternadas.

Aparato digestivo

BOCA :

Lengua cargada, como en ant. crud.; pero la capa que la cubre en ant. tart. es amarilla, tonalidad oscura y sucia.

A menudo gusto amargo, poco acentuado, metálico, dulzón.

ESTOMAGO :

Deseo de frutas ácidas, especialmente manzanas ácidas; bebidas ácidas, cosas agrias, aunque todo esto agrava al enfermo y trae vómitos y diarrea.

Aversión por la leche, que también agrava en igual forma (aethusa, calc. ostr., magn. mur., y sulfur).

Sed con deseos de agua helada, frecuentes, pero en pequeños sorbos.

Aunque este síntoma no está presente en muchos casos más bien irrita si se le ofrece de beber, por temor a descomponerse.

El niño gruñe si se le ofrece beber.

A veces deseo de tener algo frío en el estómago (Kent).

Ingiere líquidos con dificultad, pero vomita en cualquier posición, salvo acostado sobre el lado derecho.

Náuseas, esfuerzos para vomitar y vómitos, principalmente después de comer, con postración y desfallecimiento, como si fuera a morir.

NAUSEAS angustiosas con sensación de presión precordial, seguidas de dolor de cabeza con bostezos, lagrimeo y vómitos.

Incapacidad de digerir alimentos, por los que experimenta gran repugnancia; vomita todo cuanto le llega al estómago hasta una cucharadita de agua.

Los síntomas estomacales e intestinales se acompañan de náuseas continuas y aversión "mortal" por todo alimento; tiene la sensación de que todo lo que llega al estómago producirá la muerte.

Los vómitos son violentos, dolorosos, espasmódicos, bostezos con náuseas y todo lo ingerido es vomitado juntamente con una mucosidad blanca, viscosa y espesa a veces con sangre, otras con bilis.

A veces la cantidad de mucus que segrega la mucosa estomacal es tan abundante, que al ser vomitado llena el esófago, la boca, la nariz, y sofoca al paciente (Kent).

Los vómitos con sangre son causa de la ulceración de la mucosa gástrica.

Flatulencia estomacal y abdominal.

ABDOMEN Y DEPOSICIONES :

Puede haber congestión hepática con vómitos biliares (Kent).

Cólicos espasmódicos con mucha flatulencia.

Sensación de presión abdominal al doblarse hacia adelante.

Los malestares abdominales (plenitud) hacen que el paciente desee estar estirado sin inclinarse ni sentarse.

Diarrea a continuación de los vómitos, acuosa con restos alimentarios, luego mucus, luego bilis regurgitada en el duodeno por los esfuerzos para vomitar.

Puede haber diarrea acuosa amarilla o verdosa, o pulposa, o como agua de arroz, con deseos repetidos y gran sensación de calor en el recto.

Aparato respiratorio

Inflamación catarral en toda la mucosa respiratoria; secreción en aumento tendiendo a hacerse viscosa; inflamación más intensa en las partes terminales del árbol respiratorio; (bronquios, bronquiolos, alvéolos pulmonares (Dr. T. G. Stongam en "The British Homeopathic Journal" abril 1912).

NARIZ :

Irritación menos marcada que en ant. crud.

Fosas nasales dilatadas por LATIDOS RÁPIDOS SINCRONIZADOS AL RITMO RESPIRATORIO (chelid., lycop., phosph., pyrog.).

BRONQUIOS Y PULMONES :

Hay en estas zonas GRAN ACUMULACIÓN MUCOSA que hace difícil y ardiente la respiración; la tos parece arrancar algo, pero LA RESPIRACIÓN SE HACE DIFÍCIL Y LA EXPECTORACIÓN IMPOSIBLE.

Este es el primer medicamento en que hay que pensar en todos los casos de gran acumulación mucosa en las vías respiratorias.

Disnea CON FOSAS NASALES DILATADAS; latidos en alas nasales con movimientos sincronizados a la respiración, que es sumamente difícil, ruidosa, cara cianótica, amenaza de asfixia.

Estos síntomas pectorales que pueden llegar a parálisis pulmonar, juntamente con gran sopor, indican a este remedio en la pleuroneumonía y en la ortopnea de los viejos.

Aquí baryta carb. es el complemento, principalmente cuando ant. tart. no ha curado sino parcial e imperfectamente (Farrington).

Ant. tart. es también uno de los mejores remedios contra la HEPATIZACIÓN PULMONAR PERSISTENTE posterior a neumonía (Dr. T. G. Stonham, "The British Homeopathic Recorder", abril 1912).

A la percusión, los pulmones se sienten macizos, disminuye y hasta desaparece el murmullo vesicular; hay disnea, el paciente está pálido, debilitado, sumido en sopor.

Si en un caso tal sulf. no resuelve dicho estado, ant. tart. lo hará (Nash).

Si bien opium tiene un sopor muy parecido a ant. tart. no puede haber confusión pues en opium la cara es roja o púrpura, no pálida, puede haber estertores (Nash).

EL COMER PROVOCA TOS acompañada de dolor pectoral y laríngeo; en suparoxismo, la tos provoca vómito de mucus y alimento.

Si bien ipeca tiene mucosidad abundante, tiene a la vez gran poder de expulsión expectorante, lo que no hay en ant. tart.

A diferencia de bryon., bell., acon. o ipeca, que abaten en forma violenta, ant. tart. es de acción opuesta, con poca fiebre, sudor frío, enfriamiento general, facies hipocrática, gran abatimiento al final.

Cuando nos encontramos frente a niños rozagantes con cuadro pectoral similar pero sin abatimiento ni sopor pese a tener gran catarro, entonces será kali sulf. el remedio, debiendo recordar que es la debilidad la que reclama ant. tart. Además, cuando la mucosidad en viejos deprimidos acatarrados es amarilla y purulenta, el medicamento es amoniacum (Kent).

Espalda y extremidades

VIOLENTO DOLOR EN LA REGIÓN SACRO-LUMBAR, acompañado de sensación de pesadez en el coxis, como si fuese tironeado hacia abajo.

Piel

Tart. emet. es un poderoso irritante de la piel en la que determina erupción de pústulas dolorosas como la viruela y también deja marcas rojo azuladas.

Esta erupción es más marcada en la cara y en la región génito-anal.

Relaciones

Antídotos

Puls., sepia.

Complementarios

Baryta carb.

APIS MELLIFICA

Este medicamento se designa de dos maneras distintas según sea su forma de preparación : apis vivus, que es el nombre del medicamento preparado con el veneno de la abeja solamente, y apis mellifica que representa al remedio obtenido de la trituración del insecto entero.

Acción general del medicamento

El primer síntoma producido por una abeja que pica una parte cualquiera del cuerpo, es un DOLOR AGUDO, ARDIENTE, LANCINANTE, CON ESCASA LATENCIA Y SENSACIÓN DE PINCHAZOS.

En esa región se produce un EDEMA más o menos abundante con SENSACIÓN DE MAGULLADURA.

Hinchazón primero ROSADA, intensificándose hasta tener ASPECTO ERISIPELATOSO AL FINAL.

Luego, después del aumento del calor y dolores, los síntomas disminuyen, se absorbe el edema y sobreviene la curación.

A veces la herida puede volverse GANGRENOSA; la inflamación no tiene el carácter esténico de la curación de la herida de arsenicum, es decir, repentina hinchazón terminada en una resolución brusca; tampoco es como en bell., con hinchazón roja y dolores latentes, pulsátiles, que termina por resolución o por supuración; es una INFLAMACIÓN GANGRENOSA QUE TIENDE A LA DESTRUCCIÓN DE LOS TEJIDOS.

Los síntomas de intoxicación sobrevienen con una rapidez acorde con la sensibilidad del individuo.

"Pueden invadir rápida y violentamente al organismo hasta provocar una netainconsciencia.

El sujeto muy sensible a las picaduras de abeja sufre de náuseas acompañadas de sensación de ansiedad, angustia, muy penosa, haciéndole pensar que va a morir; en 10 minutos lo cubre una urticaria extremadamente ardiente, mortificante; pide a gritos un baño frío temiendo morir en seguida si no se calman sus atroces sufrimientos; se retuerce, se enrosca, como si quisiera despedazarse.

El antídoto de este estado es carb. ac. (Kent).

En los efectos de esta picadura percibimos todos los síntomas de apis.

Generalmente puede afirmarse que apis actúa sobre todo el organismo, localizándose en forma de HINCHAZÓN RÁPIDA CON RUBOR PÁLIDO, PICAZÓN ARDIENTE, AGUDA, SENSACIÓN DE MAGULLADURA, y una INFILTRACIÓN EDEMA TOSA MUY CARACTERÍSTICA.

Puede decirse que apis actúa especialmente sobre LA PIEL, MUCOSAS, SEROSAS, y GLÁNDULAS GENITALES, preferentemente LOS OVARIOS, particularmente el derecho.

"Sobre la piel de todo el cuerpo hay una ERUPCIÓN ESPESA, ROSADA, RUGOSA; esto último se percibe al tacto.

Al comienzo, gran angustia por el calor y piel sumamente sensible con o sin erupción.

Luego aparece un estado inflamatorio erisipeloso, con frecuencia en la cara acompañado de dolores quemantes, ardientes y edema.

Sobre la piel el edema es hidrópico; erupción rojo pálido, urticaria, estado erisipeloso, todo lo cual puede alcanzar las mucosas. (Kent).

A. Claude y P. Jousset dicen : "Bajo la piel, más a menudo en la cara, apis produce hinchazón edema tosa con rasgos erisipelosos; en la zona de la lesión, donde hay gran sensibilidad y afectación dolorosa, hay fornicaciones, puntadas, ardor y sensación de tensión como si los vasos estuviesen infartados".

Continúan diciendo : "El tejido celular se infiltra y las mucosas se inflaman; estas últimas se inflaman violentamente y se vuelven turgescientes; a veces secas, otras cubiertas de una secreción viscosa o de una capa pultácea, a veces con vesículas y excoiaciones; hay allí comezón, puntadas, escozor y quemadura y sensación característica de plenitud.

La inflamación puede alcanzar a ciertos conductos, la tráquea por ej.; fenómenos de obstrucción que pueden interferir toda acción mecánica; espasmos en la laringe, a veces tan violentos que obligan al paciente a desprenderse la corbata, la camisa, etc., todo lo que parece obstruir su respiración.

Abre puertas y ventanas; no soporta el calor de su habitación".

El veneno de abeja inflama también las serosas produciendo derrames de proceso más o menos, agudo, lo cual sucede generalmente en derrames de origen infeccioso o a frigore.

También inflama testículos y ovarios.

Esto último es más frecuente que lo primero.

A veces son puntadas que van de uno a otro ovario y terminan en fuertes sufrimientos.

Esta acción femenina es muy marcada, habiendo sido el remedio usado con éxito, principalmente en las "viudas" (Jahr), en malestares relacionados con funciones sexuales o afecciones ováricas.

Características

DOLORES AGUDOS, ARDIENTES COMO PICADURA DE ABEJA, CALMADOS POR APLICACIONES FRÍAS.

Dolores como producidos por agujas al rojo vivo que van de un lado a otro, DE DERECHA A IZQUIERDA, calmados por aplicaciones frías y agravados por el calor.

Dice Hering : "Enrojecimiento e hinchazón con dolores agudos, ardientes, sensación de pinchazos en ojos, orejas, cara, lengua, garganta, ano, testículos y ovarios".

Y agrega Nash : "Deben agregarse los panadizos, afecciones de la piel, etc." La asociación : "pinchazos y quemadura" solamente en apis.

EDEMA.

INFILTRACIÓN, HIDROPESÍA DE LOS TEJIDOS; TENDENCIA GENERAL A EDEMA PÁLIDO, CEROSO, TRANSPARENTE, MUY SENSIBLE AL MENOR CONTACTO (Dahlke).

El tinte pálido seroso de la región edema tosa es característica del remedio.

ORINA ESCASA Y CASI SIEMPRE AUSENCIA DE SED.

Este último síntoma permite distinguir a apis de los demás remedios de la Hidropesía; acet. ac., apocyn., ars. alb., cactus, que tienen sed, particularmente los 3 primeros.

Apis es el remedio de los edemas que rápidamente llegan a la hidropesía crónica.

También hay que diferenciarlo de phosph., que tiene edema de toda la cara; especialmente el párpado inferior, mientras que kali carb. lo tiene en el párpado superior.

En la hinchazón edema tosa de garganta en las difterias violentas y rápidas, en la erisipela cuya piel tiene hinchazón de aspecto edema toso, en la infiltración serosa inflamatoria de las meninges cuando sobreviene el "grito encefálico", y cuando durante el sueño hay gritos agudos que hacen presagiar una irritación de pinchazos característicos, apis es el remedio.

DOLORACIÓN Y SENSIBILIDAD AL TACTO; ESTA COMO MAGULLADO.

Esta sensibilidad general al tacto y a la presión es característica y a veces acompaña al edema.

Es un signo más marcado en las zonas uterino y abdomino-ovárica, sin que signifique una localización exclusiva. Puede haber sensibilidad al tacto en TODA LA SUPERFICIE DEL CUERPO, y hasta los cabellos parecen doler (china); esto se encuentra generalmente en la meningitis cerebro-espinal y constituye una gran indicación de apís. Esta sensibilidad se observa también en la erisipela de hep. sulf. calc. (Nash).

PIEL ALTERNATIVAMENTE SECA Y CALIENTE AL TRANSPIRAR; Ningún remedio tiene esta alternativa tan marcada como apís; a él debe recurrirse cuando se la encuentra netamente marcada en una enfermedad inflamatoria o en una fiebre intermitente.

Modalidades

Lateralidad

Derecha.

Los síntomas van DE DERECHA A IZQUIERDA Y DE ARRIBA HACIA ABAJO; en rhus tox, van de izquierda a derecha; en agar., alternados (brazo derecho y pierna izquierda, etc.).

En ledum suben de las extremidades a la cabeza; en kalmia, a la inversa.

Agravación

a) POR EL CALOR, que no puede soportar; el calor agrava los síntomas de la piel, igual que los cardíacos, laringeos, etc.

A veces la agravación la produce el agua caliente, habitación caliente, el fuego o la ropa abrigada.

TODO LO QUE ES CALIENTE MOLESTA AL PACIENTE DE APÍS.

b) POR LA TARDE, de 16 a 18 hs.

c) Después del sueño (lach., cocc., spong., opium, etc.).

d) Por el tacto y la presión.

Mejoría

Al aire libre, descubriéndose, por los baños fríos; los dolores son calmados POR APLICACIONES FRÍAS.

Síntomas mentales

Son muy marcados en apís, y lo más notable del estado mental es su AGRAVACIÓN POR EL CALOR (Kent).

Triste, a menudo llora sin cesar y sin motivo, llora día y noche y no duerme a causa de sus pensamientos torturantes que lo obsesionan; todo lo atormenta.

Depresión espiritual con llanto constante.

Tristeza y melancolía; irritabilidad extrema; sospechoso y celoso; sin alegría, es indiferente a todo cuanto podría hacerle feliz.

No se adapta a lo que podría alegrarle, y piensa que las alegrías no son para él, sino para los demás.

Indiferente, apático celoso (lach., hyosc.) también inconsciente, por lo que no puede pensar claramente.

Actitud atontada, embotada, infantil, (parturienta o mujer en edad avanzada que charla estúpidamente).

Sensación de que va a morir, presiente la muerte, la teme, temor a la apoplejía; por esta angustia de la muerte apís se relaciona con acon., ars. alb., agn. cast., y phosph.

Estupor que alterna con manía o estupor acompañado de grito encefálico.

Dificultad en coordinar los movimientos; torpeza, deja caer los objetos de la mano (natr. mur., lach., bovista, aethusa, ignat., nux vomo., helleb., y tarent., tienen también esta torpeza, principalmente el primero de esta serie).

Perturbaciones después de susto, cólera, vejación, ataque de celos o al recibir malas noticias; luego de shock mental, parálisis grave de todo el lado derecho. (Kent).

"En apís, lo mismo que en bell. y helleb. vemos girar la cabeza, rechinar los dientes, ojos brillantes, amenaza de convulsiones, lleva su mano a la cabeza, acompañado todo esto de un estado de semi-inconsciencia apenas perturbada por un grito agudo, el grito encefálico, que denota inflamación y congestión cerebrales.

El niño lanza gritos agudos durante el sueño al comienzo de un caso de apís". (Kent).

Sueño

Muy agitado; grita y se estremece durante el sueño.

Sueños inquietos por preocupaciones de trabajo.

Estupor profundo quebrado solamente por gritos agudos, penetrantes.

Cabeza

Sensación de FATIGA CEREBRAL TOTAL.

SENSACIÓN DE CALOR, de dolor pulsátil, latente; LA CABEZA PARECE ESTAR DISTENDIDA; esto se agrava por el movimiento y mejora por la presión. (arg. nitr.).

Dolores súbitos y penetrantes; sensación de pesadez en el occipucio como después de un golpe, acompañada de excitación sexual y mejoría por la presión.

Hunde la cabeza en la almohada y lanza gritos agudos, penetrantes.

Vértigo que empeora al acostarse y cerrando los ojos.

Apís tiene importancia como agente curativo en la MENINGITIS y en la IRRITACIÓN MENÍNGEA.

Es el remedio cuando durante el sueño hay gritos agudos, penetrantes, que hacen suponer irritación cerebral acompañada de dolores agudos, pinchazos, y los casos similares que comienzan con agitación nerviosa semejante a la que produce el veneno de la abeja (Farrington).

Ya hemos visto la relación que tiene apis con bell. y helleb.; bryon.

tiene algunas semejanzas, como las "efusiones" o derrames cerebrales que siguen a la supresión de un exantema, pero aquí el sensorio está entumecido, la boca presenta un movimiento de masticación perpetuo, la cara es roja oscura, los labios están como cocidos, hay sed y bebe con avidez, impaciencia, y en cantidad, si se lo mueve, profiere un grito de dolor (agravación por el movimiento).

A este estado sigue bien helleb. cuando el paciente queda sumido en un estado de sopor; si por el contrario, grita de dolor, sigue bien apis. (Farrington).

También cupr. es indicado para la irritación meníngea siguiente a supresión de exantema; el paciente además de gritar, acusa violentas convulsiones; los pulgares están plegados hacia las palmas de las manos; cara pálida, labios azulados; gira los ojos constantemente.

Las convulsiones de apis no son tan violentas como de cupr., sino más bien son movimientos convulsivos, estremecimientos, espasmos musculares de una mitad del cuerpo.

Sulfur es indicado para la meningitis proveniente de la supresión de una erupción.

Actúa bien antes o después de apis.

Glonoïn. tiene grito encefálico como apis, y vómitos espasmódicos de origen cerebral, muy marcados, junto con intensa congestión de cabeza con latidos que domina todo el cuadro.

En la irritación cerebral de zincum, el niño se despierta con sobresalto y sensación de miedo; durante el sueño, sus pies se mueven continuamente, grita y se estremece.

Rhus tox. tiene síntomas cefálicos muy similares a apis, y ars. alb. es indicado en la hidrocefalia por el calor de la piel; cara pálida y caliente; el niño está sumido en un estupor, a veces con espasmos de cuerpo y boca; otras veces está como muerto, los ojos semicerrados, sin reflejos oculares.

Ojos

Muy sensibles a la luz; conjuntiva roja, inflamada, o hinchada con quemosis; párpados hinchados, rojos, edematizados, inflamados, con quemosis.

Sensación de quemadura y escozor; lagrimeo caliente.

Orzuelos con dolores ardientes y pinchazos, como producidos por un dardo; hinchazón del párpado. (Clarke).

Hinchazón edema tosa del párpado inferior que cuelga como una bolsa (kali carb. tiene igual síntoma pero en el superior); apis se ha mostrado útil en el edema de ambos párpados, siempre que las características predominantes indiquen el remedio; kali carb., ars. alb., kali ars., y phosph.

Queratitis con inflamación de conjuntivas; Estafiloma de córnea subsecuente a inflamación supurada.

Orzuelos : apis evita su repetición (Boericke).

Oídos

Inflamación del oído medio en combinación con escarlatina (Kent).

Oído externo rojo, inflamado, doloroso, dolores ardientes (Boericke).

A esto puede agregarse prurito, y apis ha dado resultados en sabañones en las orejas.

Ruidos y zumbidos de oídos.

Cara

CONGESTIONADA, roja, hinchada, dolorosa; toda la cara está inflamada; (oídos, ojos, labios, principalmente el superior, piel tensa).

Aspecto de hinchazón roja general. (L. Vannier).

O bien pálida, cerosa; piel flácida y blanda, y el edema será más perceptible alrededor de los ojos, particularmente el párpado inferior, que cuelga como una bolsa llena de agua.

Aparato digestivo

BOCA :

Mucosa bucal y laríngea brillante, como barnizada; roja y edematizada como en la erisipela.

Encías hinchadas igual que los labios, más el superior.

Lengua dolorosa, hinchada, con vesículas; caliente y temblorosa.

La boca, lengua y garganta tienen la sensación de estar en carne viva como si hubiesen sido quemadas con agua hirviendo.

Apis se asemeja a : iris vers. que tiene este síntoma juntamente con sensación dolorosa de quemadura en epigastrio y abdomen.

Bell. tiene hinchazón inflamatoria bucal con enrojecimiento y sequedad, como si hubiese sido quemada; magn. mur., tiene sensación de quemadura en boca y lengua, con sequedad, sin sed.

Merc. corr. tiene la boca inflamada, seca, ardiente, con aliento fétido y lengua característica.

FARINGE :

Dolores ardientes, pinchazos, amígdalas y garganta rojo brillante, hinchadas; ulceraciones en las amígdalas; la mucosa parece cuero plisado o una tajada de carne vacuna cruda; la campanilla cuelga como una bolsa llena de agua (kali bichr., rhus tox).

Sensación de espina de pescado clavada en la garganta (hep. sulf. calc.).

Agravación por bebidas calientes y tragar sólidos.

En los casos de difteria violenta y rápida, en la que toda la garganta se llena de una hinchazón edematosa; la campanilla cuelga como una bolsita transparente llena de agua, y el enfermo está amenazado de muerte por sofocación causada por oclusión de laringe, ningún remedio sobrepasa a apis.

En este caso, a veces no hay dolor.

Bapt. tiene hinchazón de garganta sin dolor, pero el proceso carece de gravedad y del desarrollo rápido del caso de apis (Nash).

ESTOMAGO :

AUSENCIA DE SED (puls.), característica : no obstante hay deseo de leche fría (ars. alb., chelid. maj., phosph. ac., y rhus tox).

Sensación estomacal dolorosa y sensibilidad exagerada, que agrava por la más leve presión, relacionando a apis con lach., nux vom., bell., y merc.

Náuseas, vómitos, ansiedad.

Vómitos de bilis, alimentarios y de líquido amargo y ácido.

ABDOMEN :

DOLOR CARACTERÍSTICO con SENSACIÓN DE CONSTRICCIÓN.

Abdomen distendido por gas meteorizado; la piel parece la de un tambor.

No se atreve a toser y evita estornudar, por temor a que su vientre explote.

Sensación que algo se desgarran en su vientre cada vez que va a mover el vientre.

DOLOR Y SENSACIÓN COMO SI LOS INTESTINOS ESTUVIESEN MAGULLADOS.

Edema de la pared abdominal; ascitis; hidropesía; anasarca, hipersensibilidad hepática; inflamación de hígado y bazo.

ANO Y DEPOSICIONES :

DEPOSICIONES A CADA MOMENTO, INVOLUNTARIAS; SENSACIÓN COMO SI EL ANO ESTUVIESE ABIERTO; deposición sanguinolenta pero indolora.

Phosph. tiene deposiciones involuntarias, pero son más frecuentes y agotadoras; luego el paciente tiene sed de agua fría, que devuelve a poco de haberla bebido; el paciente está aplastado y su color es a menudo amarillo; rhus tox.

tiene también deposiciones involuntarias, pero solamente nocturnas; dolorosas, sed inextinguible; lengua seca, color marrón, y con el triángulo característico en la punta (L. Vannier).

Aloe tiene evacuaciones involuntarias con sensación de inseguridad del recto; a veces la evacuación sale sin que el paciente se dé cuenta.

Arnica tiene deposiciones involuntarias de noche, durante el sueño.

Gels. las tiene a raíz de una emoción.

EL PACIENTE DE APIS NO PUEDE ORINAR SIN EVACUAR A LA VEZ.

DIARREA ACUOSA AMARILLENTA.

Apis actúa bien en la diarrea de los niños que contiene mucus, restos alimentarios y sangre, con aspecto de salsa de tomate (Kent).

Otras veces el paciente está constipado, pues no puede hacer esfuerzos por tener la sensación de que algo se rompe en su vientre.

EN LA CONSTIPACIÓN APIS TIENE RELACIÓN COMÚNMENTE CON LOS TRASTORNOS CEREBRALES.

Los intestinos parecen paralizados, con congestión cerebral al mismo tiempo (Kent).

El ano arde como en carne viva.

Después del parto, dolores hemorroidarios ardientes.

Aparato urinario

Hay muchos trastornos urinarios en apis.

ORINA ESCASA QUE VIENE SOLO GOTA A GOTA; hace muchos esfuerzos al comenzar la micción, y sólo orina algunas gotas de orina caliente, ardiente, sanguinolenta.

No bien hay algo de orina en la vejiga siente deseo imperioso, pero sin efectos.

Luego la orina casi siempre se suprime.

Los bebés están largo tiempo sin orinar lanzando gritos penetrantes, se llevan las manos a la cabeza, gimen durante el sueño y se destapan con los pies.

Una dosis de apis será útil (Kent).

TRASTORNOS URINARIOS CON HINCHAZÓN EDEMA TOSA DE ÓRGANOS GENITO-URINARIOS.

Dolores inflamatorios de riñones, uréteres, vejiga y uretra.

Todo el tracto urinario inflamado como en cantharis; estos dos remedios son antídotos.

El frenesí violento de cantharis será curado por apis.

El malestar causado por uno de estos remedios puede ser superado empleando el otro.

Irritación mórbida de órganos urinarios, estranguria, dolor angustioso al orinar.

Retención de orina en lactantes (Kent).

ORINA ESCASA Y FÉTIDA, QUE CONTIENE ALBÚMINA Y GLÓBULOS SANGUÍNEOS, ESPECIALMENTE EN LA ALBUMINURIA AGUDA.

INFLAMACIÓN AGUDA DE RIÑÓN CON ALBUMINURIA, que puede presentarse en la escarlatina, fiebre tifoidea, o cualquier otra enfermedad infecciosa aguda. (Kent).

Órganos genitales

Apis actúa en los órganos genitales de ambos sexos.

Determina hinchazón y estado edematoso característicos.

Pero es en la mujer donde mejor actúa.

EDEMA DE LABIOS CON DOLOR AGUDO, ARDIENTE, MEJORADO POR EL AGUAFRÍA.

REGLAS SUPRIMIDAS CON SINTOMAS DEL COSTADO DE LA CABEZA, especialmente en las jóvenes.

DISMENORREA CON FUERTES DOLOR DE OVARIOS, MAS EL DERECHO.

METRRORRAGIA profusa con dolor abdominal, desfallecimiento y dolores ardientes.

METRITIS CON DOLOR ARDIENTE; OVARITIS; TUMORES OVÁRICOS; apis AFECTA AL OVARIO DERECHO DEL MISMO MODO QUE LA IZQUIERDA.

Apis es indicado en la ovaritis con dolores extremos, localizados a la derecha; por tacto se descubre que el ovario derecho está TUMEFACTO, ya sea por palpación abdominal, o combinado con tacto vaginal.

En QUISTES DE OVARIO apis hace retroceder la enfermedad.

El signo es una hinchazón ovárica que se extiende al muslo y sensación de opresión al pecho con tos causada por reflujo uterino. (Farrington).

(Para el estudio comparativo de apis con los demás remedios ováricos, ver la.).

Aparato respiratorio

LARINGE :

Apis puede provocar aquí irritación de la mucosa similar a la producida en las demás mucosas por este medicamento.

Es útil en los síntomas laríngeos - edema de glotis o de laringe - catarrlos laríngeos, etc.

Bell. suele confundirse con apis en catarrlos laríngeos; recordemos que apis tiene mayor hinchazón edematosa con disnea, mientras Bell. tiene más constricción espasmódica. (Farrington).

BRONQUIOS Y PULMONES :

DISNEA, RESPIRACIÓN DIFÍCIL.

La dificultad para respirar es síntoma particular; EL ENFERMO TIENE LA SENSACIÓN DE QUE NO PODRÁ SEGUIR RESPIRANDO; apis da resultados en hidrotórax, edema pulmonar y asma.

Tos seca, corta, supra-esternal, causada por cosquilleo de garganta o en la tráquea, peor después de medianoche; sacude todo el cuerpo, repercute en la cabeza y no deja dormir; si hay descarga de mucosidad la tos calma entonces. (Charge).

La tos de apis se asemeja más o menos a la de la., carbo veg., rumex, bell., chamom., crotal., nux vom., bryon., ignat., ars. hyosc. (Farrington).

Aparato circulatorio

Los dolores lancinantes como con pinchazos; palpitaciones, la ortopnea, han demostrado la utilidad de apis en las inflamaciones de pericardio, endocardio, hidropesías de origen cardíaco, etc., los síntomas esenciales parecen ser : edema, hinchazón repentina de piel y mucosas; disnea, dolores agudos, punzantes, agitación y ansiedad (Farrington).

Ars. SE ASEMEJA TANTO A apis en cuanto a la agitación y la disnea que a menudo los confunde.

La mejor distinción es la agitación intranquila de apis, frente a la pasiva de ars.

También hay que distinguirlos en la falta de sed que les es común, y en el edema, que en ars. es blanco generalmente y en apis es más común el rojo, con estados edematoso y erisipeloso, y pruriginoso de la piel.

Apoc., aspar., y digit. se asemejan en algunos puntos a apis.

Espalda y extremidades

SENSACIÓN DE ESTAR CANSADO, DESHECHO.

EDEMAS : PIES HINCHADOS Y RÍGIDOS; acet. ac. tiene edema de extremidades inferiores y abdomen con gran sed, trastornos gástricos y enflaquecimiento.

Apoc. tiene edema principalmente del lado que se acuesta; gran disminución de orina, sed intensa y opresión.

Ars. alb. tiene edema de extremidades inferiores, anasarca, orina escasa ardiente, albuminosa; piel pálida y fría en todo el cuerpo; gran debilidad y agitación pasiva.

Cactus tiene edema de extremidades superiores y manos, en especial la izquierda; piel brillante, todo relacionado con angustia precordial.

RODILLAS HINCHADAS, SENSIBLES, BRILLOSAS, DOLOROSAS, DOLOR

PUNZANTES, ARDIENTES, ESCOZOR.

DOLOR REUMÁTICO en miembros y espalda.

Puede haber DEBILIDAD PARALÍTICA en las extremidades.

Este síntoma es comúnmente resultado de venenos de origen animal.

En las parálisis que sobrevienen después de una fiebre debilitante - difteria, fiebre tifoidea - apis ha resultado útil.

En casos semejantes la preexistencia de un exantema o su supresión confirma la indicación de apis; la reaparición de los síntomas cutáneos indica que debe interrumpirse la prescripción hasta tanto desaparezcan dichos síntomas; en estos casos, sulfur es un gran coadyuvante (Farrington).

DIFICULTAD PARA COORDINAR MOVIMIENTOS.

Torpe, se le caen los objetos de las manos. (bovista, aeth., ignat., natr. mur., lach., nux vom., helleb., tarent. hisp. Véase también natr. mur.).

Piel

En todo el cuerpo, ERUPCIÓN RUGOSA, ESPESA, A VECES ROSADA la rugosidad es palpable al tacto. (Véase el rubro Acción GEN.).

ERISPELA con hinchazón y sensibilidad dolorosa color rosado; URTICARIA FORÚNCULOS; con dolores punzantes, ardientes, escozor. (ars., antrac.).

Hinchazón edema tosa repentina en todo el cuerpo.

ESCARLATINA CON ANGINA Y ERUPCIÓN RUGOSA. (Ver ACCIÓN GENERAL).

Fiebre

ESCALOFRÍOS POR LA TARDE CON SED; puede afirmarse que durante el estado febril, el paciente sólo siente sed con los primeros escalofríos.

Detesta el movimiento y el calor, desea puertas y ventanas abiertas, y a mayor calor mayor agitación.

Calor externo con sensación de sofocación.

Ligeros sudores con deseos de dormir; la transpiración seca y vuelve a aparecer.

El paciente que está CALIENTE Y SECO, y de repente TRANSPIRA, hace pensar en apis, único remedio que tiene esta alternancia tan marcada.

Duerme una vez pasado el paroxismo febril (Boericke).

Relaciones

Antídotos

Plantaris Y lach.; led. pal. ha sido propuesto por Teste como antídoto.* (Según experiencias de Mme. Physalix, los venenos de la abeja y de la avispa son antídotos recíprocos.)

Complementario

De natr. mur.

Es ANTAGONISTA de rhus tox.

APOCYNUM CANNABIMUM

Apocynum cannabinum o cáñamo indio es una planta de la familia de las Apocíneas, propia de la América Septentrional.

No debe confundirse con cannabis indica o cáñamo de la India, de donde se extrae el "haschis".

La tintura madre se obtiene de la raíz fresca.

Acción general y características

Actúa violentamente sobre el organismo deprimiendo las fuerzas vitales, causando pérdida de fuerza muscular, relajamiento de esfínteres, etc. y dicha pérdida de fuerzas es importante, pues califica los síntomas cardíacos, renales e intestinales (Farrington).

Bajo su influencia DISMINUYEN LAS SECRECIONES; "Orina escasa, piel seca, falta de transpiración sea cual fuere la enfermedad; el paciente siente que si pudiese transpirar mejoraría; bebe mucho, pero todo lo absorben sus tejidos, no elimina nada; orina poco, casi nada; piel seca, tosca, no compensa por transpiración la merma de orina; por eso el tejido celular se infiltra y sobreviene la hidropesía" (Kent).

HIDROPEŚIA EN LOS SACOS SEROSOS, CON GRAN SED, gran síntoma del remedio.

Derrame hidrópico en meninges, pericardio, pleura, peritoneo, con gransufrimiento y prolongado malestar; derrame hidrópico en sacos serosos articulares; esto recuerda mucho a apis, pero en este remedio no hay sed y el paciente está caliente, mientras que en apoc. cann. el enfermo tiene sed, y quiere estar abrigado pues tiene frío.

"Apocyn. tiene importancia en algunas enfermedades infecciosas como escarlatina y tifoidea, especialmente cuando tienden a la cronicidad.

El enfermo cae en gran postración, friolento, asténico, sediento, la orina escasea, piel seca y la convalecencia no se hace bien; pierde fuerzas, sobreviene el estado hidrópico.

Supongamos que una grave tifoidea ha tenido al paciente 4 ó 5 semanas en cama; el paciente está demacrado, postrado, no recobra sus fuerzas, no engorda, no tiene apetito, y sólo siente deseos de beber agua.

Apocyn. será el remedio aún cuando el caso recuerde mucho a apis; bastará recordar para distinguirlos que apis es caluroso y quiere estar siempre descubierto y pide cosas frías, lo cual no ocurre en apocyn" (Kent).

"Hay en apocyn. estados alternantes : HIDROPEŚIA Y SECRECIÓN ABUNDANTE.

La hidropesía puede calmar mediante copiosas evacuaciones intestinales, o por una actividad espasmódica renal tal que la orina se hace profusa.

Luego todo cesa de golpe, la orina escasea, los tejidos se infiltran de nuevo, y reaparece la hidropesía" (Kent).

Modalidades

Agravación

POR EL FRÍO; paciente friolento, muy sensible al aire, las bebidas frías le hacen mal al estómago, y le causan vómitos, las bebidas frías le hacen sentir malestares en todo el cuerpo; todo síntoma es agravado destapándose y por aplicaciones frías.

ESTANDO ACOSTADO; debe estar sentado, incorporado.

Síntomas mentales

Puede haber algo de extravío espiritual; estupor, postración, tristeza y abatimiento.

Cara

Expresión de angustia; cara hinchada, hinchazón sobre los ojos; deja la marca donde se apoya el dedo (Kent).

Aparato digestivo

Boca y lengua secas, SED EXTREMA; SED ARDIENTE aunque EL AGUA LE CAE MAL.

El agua fría le produce dolor estomacal y vómitos antes de que pueda haberse calentado en el estómago; el agua puede dar lugar a distensión, a un cierto malestar brusco que termina por hacerle temer al agua fría, en cuyo caso bebidas calientes le reconfortarán, le producirán calor, en fin le harán bien" (Kent).

Los pacientes de apocyn. al llegar al estado de anasarca parecen tener todos sus tejidos infiltrados de agua, y que todo el líquido ingerido se incrusta en sus células, las cuales, sobre saturadas, no necesitan suero sanguíneo.

Los vasos sanguíneos están rebosantes de sangre acuosa, los tejidos en general saturados, el estómago distendido, dilatado, rechazando todo lo que recibe.

Vomita cuanto bebe; hay sensación de presión epigástrica, pectoral; aún cuando siente hambre, el menor bocado le suscita una penosa impresión de distensión capaz de entorpecer la respiración misma.

El estómago, repleto de agua, vomita agua, bilis y cualquier alimento que haya recibido; finalmente el estómago se vuelve irritable, los intestinos se paralizan, los riñones se cierran.

El vientre está notablemente distendido.

"Apocyn. se ha revelado como excelente remedio en estados diarreicos alternantes con hidropesía; diarrea abundante, acuosa, amarilla, involuntaria y a menudo su aparición hace calmar los otros síntomas". (Kent).

Aparato urinario

Orina POCO; pese a tener la vejiga llena, el paciente no puede expeler la orina; retención con continua necesidad urgente de orinar; micción dolorosa.

A veces la hidropesía mejora con secreciones abundantes de orina la que luego se vuelve escasa y reaparece la hidropesía.

Orina turbia, caliente, con espeso sedimento mucoso, ardor en la uretra después de orinar.

Apocyn. ha dado resultados excelentes en el mal de Bright en que la orina es escasa, hay hidropesía, náuseas, vómitos, sopor y respiración difícil.

Órganos genitales

Ovarios y útero parecen no poder cumplir sus funciones y sobreviene amenorrea acompañando al estado hidrópico.

A veces los trastornos parecen comenzar con un debilitamiento de dichos órganos que parecen no poder realizar sus funciones; la mujer se vuelve débil y muy nerviosa, no tiene reglas, el vientre está dolorido; luego se distiende el vientre y hay edema de miembros (Kent).

Otras veces hay gran tendencia hemorrágica, flujo menstrual muy abundante, de larga duración y se renueva a menudo.

Apocyn. es un buen remedio para la hidropesía que sigue a una hemorragia uterina grave.

Aparato respiratorio

Gran opresión, respiración jadeante, difícil, sensación de plenitud y distensión en el tórax.

Aparato circulatorio

Insuficiencia tricúspida o mitral con arritmia.

Latidos cardíacos rápidos, débiles, tensión arterial muy baja, pulsaciones en las yugulares, cianosis e hidropesía generalizada.

Palpitaciones dolorosas, pulso irregular, pequeño, incontable.

Relaciones

Apocyn. está muy cerca de apis, pero éste no es sediento y se calma por el frío, lo contrario de apocyn.

Ars. alb. es otro medicamento muy cercano a los anteriores, especialmente a apocyn. por su sed y por calmarse por el calor; pero tiene una postración y una ansiedad "mortal" que no tienen apis ni apocyn.

Tiene además un olor cadavérico que se percibe al entrar en su habitación, síntoma que no existe en los otros remedios.

ARGENTUM NITRICUM

El nitrato de plata no existe en estado natural; se obtiene por disolución de la plata en ácido azótico.

Sal soluble cuya fórmula química es $\text{AzO}_3 \text{Ag}$ y se presenta en estado puro en hojas transparentes, incoloras, anhidras, perfectamente neutras, de sabor típico y metálico, desagradable.

Muy cáustico, se disuelve en cantidad igual de agua fría; se descompone con facilidad al aire libre y a la luz del sol. Fundido y colado en lingotes constituye la piedra infernal empleada como cáustico.

El azúcar de leche ejerce acción reductora sobre el nitrato de plata no debiéndose hacer nunca por trituración las dinamizaciones de este medicamento.

Por otra parte a la acción del alcohol en exceso se produce el fulminato de plata, materia blanca y cristalina que deflagra al menor choque.

Por ello es necesario proceder a las preparaciones del modo siguiente : la primera dinamización se hace totalmente en agua destilada; la segunda en mitad agua y mitad alcohol, y la tercera y subsiguientes, en alcohol.

Acción general del medicamento

Acción profunda especial sobre el SISTEMA NERVIOSO CEREBRO ESPINAL que bajo su influencia, produce una serie de síntomas que van de la simple debilidad a la parálisis.

Causa también SENSACIONES ANORMALES particulares y por otra parte, un ESTADO DEFECTUOSO EN LA COORDINACIÓN MUSCULAR que otorga al medicamento lugar preponderante en el tratamiento de la ataxia.

Según Chanut y Ball, la acción de los preparados argénticos puede asemejarse a la de la estricnina.

Touget admite que el veneno argéntico paraliza los centros del movimiento y de la respiración.

Para Rabuteau, las sales de plata son venenos musculares (ver Manquat - Tratado de Terapéutica. Tomo II. Pág. 15).

Tiene una acción no menos marcada sobre las mucosas, en las que produce "atonía e inflamación destructiva" (Espanet).

Características

CONSTITUCIÓN Y TEMPERAMENTO : Al igual que arg. metal., arg. nitr. hace bien a las personas delgadas, irritables, de temperamento nervioso. (Dr. G. H. Martin).

Dice Guernesey : "Pienso en arg. nitr. toda vez que encuentro un individuo consumido y seco, agotado por la enfermedad.

Esto lo vemos en niños que parecen viejos arrugados". (fluor. acid., jóvenes con aspecto de viejos).

En una palabra, dice Chiron : "Se puede esquematizar el tipo de arg. nitr. como persona delgada, abatida, fatigada, de aspecto envejecido y ajado; los niños mismos parecen viejos; cara consumida, color blanco sucio, ojos legañosos y labios azulados y secos; tales individuos están agitados y deprimidos espiritualmente".

Síntomas mentales

La plata, como el oro, afecta la moral, y en arg. nitr. predominan las características intelectuales en forma muy marcada, igual que en arg. metal.

Los síntomas predominantes afectan LA MEMORIA Y LA RAZÓN.

EL INDIVIDUO SE HACE CADA VEZ MAS IRRAZONABLE EN SUS ACTOS Y EN SUS MANIFESTACIONES, comete actos raros, llega a conclusiones extrañas.

Está proclive a toda clase de ILUSIONES, IMAGINACIONES Y ALUCINACIONES; está atormentado por PENSAMIENTOS DE TODA INDOLE QUE AFLUYEN A SU MENTE, PRINCIPALMENTE DE NOCHE, en que lo llevan a la ansiedad; esto lo lleva a un estado de prisa y precipitación; va, viene, vuelve a ir, luego piensa que debe hacerlo nuevamente, y así hasta fatigarse.

Ideas y temores le invaden.

Sustenta la creencia que tiene tal o cual enfermedad; ideas raras lo acosan; piensa que si pasa por determinado lugar de la calle se va a caer y tendrá convulsiones, y para evitarlo, antes que pasar por allí prefiere dar un enorme rodeo.

Es tan DÉBIL DE ESPÍRITU que no puede librarse de toda clase de IMPULSOS, afluencia de pensamientos extraños; al pasar por un sitio elevado se le ocurre que podría caerse y matarse, y a veces le viene la idea de saltar un parapeto o lanzarse al vacío.

Si mira a través de una ventana piensa qué ocurriría si se lanzase por ella ya veces llega a concretar tales ideas.

TEME LA MUERTE Y CAE EN ESTADO DE GRAN ANSIEDAD.

Como acon., cree poder predecir la hora de su muerte al punto que mira pasar las horas con angustia.

Si ha prometido hacer algo, está ansioso hasta poder cumplirlo.

Si tiene el propósito de viajar su angustia le durará hasta que, una vez embarcado o en el vagón, el vehículo arranca.

Al llegar a una esquina, teme encontrarse con algo o alguien.

Su ansiedad perpetua le produce irritabilidad y se encoleriza fácilmente, volviéndose vehemente, tiene dolor de cabeza, tos, dolor en el pecho, debilidad.

Cuando tiene que ir al teatro, a una boda u otro compromiso, su ansiedad y su nerviosidad llegan a causarle diarrea.

"Las patologías acusan que el individuo da razones extrañas para justificar su conducta, buscando esconder su locura, de la que llega a darse perfecta cuenta.

Es TRISTE, MELANCOLICO, tiene CONFUSIÓN ESPIRITUAL Y MEMORIA INSUFICIENTE" (Kent).

Sensación de expansión

Esta sensación extraña y característica puede sentirla en su cuerpo total o parcialmente.

Algunos pacientes la definen como sensación de plenitud. (Aesc. hip.).

Es más marcada en la cabeza donde la sensación es dolorosa, pareciéndole que su cabeza está considerablemente agrandada, y lo mismo que en apís y puls., se calma por la presión fuerte.

Ulceraciones

"Ulceración particularmente de mucosas; garganta, párpados, córnea, vejiga, útero, vagina y labios.

Estas ulceraciones parecen extrañas, ya que la escuela oficial lo emplea para curar y cicatrizar, nosotros los homeópatas sabemos bien que es por ello que las cura" (Kent).

Modalidades

Lateralidad

Más bien izquierda.

Mejoría

a) POR EL FRÍO, POR EL AIRE FRÍO; es característico, como en puls. y otros remedios, el hecho que desea aire frío, bebidas y comidas frías, cosas heladas; quiere tener su cabeza al aire libre, se sofoca en habitación caliente, con ropas abrigadas.

No puede estar en un lugar cerrado, donde haya muchas personas, por lo cual no va a la iglesia ni al teatro (Kent).

b) Por la presión.

c) Por los eructos.

Agravación

a) POR EL CALOR, CUALQUIERA SEA SU FORMA.

b) Por la noche.

c) POR LOS DULCES.

d) DURANTE LAS REGLAS : "Los malestares de arg. nitr. tienden a agravarse o a aparecer, en las mujeres, durante el período menstrual.

Hay dismenorrea violenta, excitación nerviosa, manifestaciones histéricas y flujo considerablemente abundante.

Pasadas las reglas, desaparecen todos los males". (Kent).

Modalidad semejante tiene cimicif., bell., graph., kali carb., nux vom., puls., sepia, viburn. op.

e) Después de haber comido.

f) ACOSTÁNDOSE SOBRE EL COSTADO DERECHO; esta posición le causa palpitaciones (alum., badiaga, kalmia, kali n., lil. tigr., platina, spongia).

"En arg. nitr. esto es tan característico que puede considerarse síntoma general.

Por esta razón busca cambiar de posición: se levanta, debe caminar, pues acostado del lado derecho siente palpitaciones DE PIES A CABEZA; siente, al decir del paciente, sensación de pulsaciones generales". (Kent).

g) Los dolores aumentan y disminuyen progresivamente, lo cual se ve en stan., platina, stront. carb., syphil.

Esta modalidad que Boericke puntualiza para arg. nitr., no la mencionan Allen, Chargé, Clarke, Hunt Borge, Kent ni Shetty.

Síntomas mentales

Desequilibrio mental característico.

Debilidad para los esfuerzos físicos, trabajos intelectuales.

La FATIGA MENTAL se manifiesta en PERDIDA DE MEMORIA, o DISMINUCIÓN.

Teme que su cerebro falle funcionalmente.

Su fatiga y nerviosidad excesivas lo tornan irritable, colérico, fácilmente exasperado.

FATIGADO, ABATIDO, ENVEJECIDO PREMATURAMENTE.

Tiene alternativamente tristeza y melancolía, pues tiene vaga consciencia de su desequilibrio mental.

Teme padecer una enfermedad incurable o enloquecer. (alum., cimicif., calc. ostr., acon., lil. tigr., mancini., medorr.).

Perpetuamente AGITADO, APURADO, ATAREADO; camina ligero y cuanto más inquieto es su aspecto, más siente necesidad de apurarse, hasta fatigarse; IMPULSO IRRESISTIBLE DE CAMINAR APURADO; tiene necesidad de HACER ALGO LIGERO pues SIENTE QUE EL TIEMPO PASA LIGERO, QUE NO LE PERMITIRÁ TERMINAR LO EMPEZADO. (cann. ind.).

La particularidad de hacer las cosas rápido latienen : aur. met. (impaciencia, deseo de hacer varias cosas a la vez); lil. tigr. (además de prisa para hacer todo, necesidad de estar ocupado constantemente; sobre todo en la mujer angustiada por su salvación, ganas de llorar y perturbaciones uterinas características); medorr. (siempre atareado; siente que el tiempo pasa lentamente; temor de enloquecer); natr. mur. y nux vom. (siempre impaciente, apurado, pero con otras características fundamentales que evitan su confusión) sulf. ac. (hace todo apresurada y precipitadamente; impaciente, malhumorado y débil). alum., merc. etc.

Este apresuramiento perpetuo se complica con APRENSIÓN CONSTANTE.

Teme no tener tiempo suficiente de cumplir con su obligación.

APRENSIÓN POR CONCURRIR A UN LUGAR PÚBLICO, A LA IGLESIA, AL TEATRO, que le provoca diarrea. (Gels).

Fobias o temores impulsivos.

Miedo a la multitud; FOBIA DE CRUZAR UNA ESQUINA, o llegar al final de una cuadra, pues teme que el ángulo de una casa se le venga encima; VÉRTIGO POR MIRAR EDIFICIOS ALTOS; le parece que los edificios de ambas aceras se van a volcar sobre él aplastándolo; siente apuro y corre para huir del eventual peligro. MIRANDO A TRAVÉS DE UNA VENTANA ELEVADA SIENTE DESEOS DE ARROJARSE POR ELLA; cruzando un puente siente deseos de arrojarlo al agua.

Más que una manía suicida, es un deseo irresistible.

Sueño

Pesadillas agotadoras, sueños extraños y viciosos con serpientes, que se va a enojar con amigos; despierta sobresaltado, y se agita enseguida, atormentado por preocupaciones que persiguen su cerebro; de noche apenas duerme a causa de su excesiva nerviosidad; por la mañana tiene las piernas molidas, está cansado, tiene dolores en el pecho, etc. (Kent).

Cabeza

DOLOR CONGESTIVO CON SENSACIÓN DE AUMENTO DE VOLUMEN.

Mejora AL AIRE FRÍO Y PRESIONANDO LA CABEZA CON UNA VENDA AJUSTADA.

En bapt. la cabeza parece muy grande y pesada.

Bovista tiene la misma sensación de aumento de volumen de la cabeza, y el cerebro parece aplastado.

Berb., con igual sensación, y además la cabeza parece apretada por un sombrero muy estrecho.

En nux mosch., la cabeza parece muy grande y pesada y pareciera que el cerebro estuviese aplastado (Chiron).

Cefalea con sensación de frío y temblores.

Le parece que los huesos del cráneo fueran a separarse, sobre todo después de un trabajo intelectual prolongado.

Hemicránea con dolor desgarrante principalmente en la jiba frontal, que mejora por la presión fuerte; como dato contradictorio a las modalidades del remedio, empeora al aire libre.

Es más frecuente del lado derecho, se extiende al ojo derecho, y como síntoma distintivo, se acompaña de lasitud y temblor en todo el cuerpo por la violencia de los dolores y termina en vómitos biliosos.

VÉRTIGOS acompañados de zumbidos de oídos, temblores y debilidad general; VÉRTIGO AL MIRAR

EDIFICIOS ALTOS Y CAMINANDO CON LOS OJOS CERRADOS.

Por sus vértigos y la debilidad, este medicamento y gels. se parecen, al punto que ambos se emplean con éxito en la ataxia locomotriz.

"Siendo los síntomas restantes iguales - dice Nash - yo daría gels. en casos agudos y arg. nitr. en crónicos".

Alum. también tiene vértigos al cerrar los ojos.

Ojos

Síntomas muy numerosos, que encontramos en los estados catarrales del remedio; ulceraciones y mejoría por el frío (Kent).

OFTALMÍA CON SECRECIÓN PURULENTO PROFUSA, HINCHAZÓN DE PÁRPADOS Y EDEMA (apis y rhus tox.).

Oftalmía de los recién nacidos.

Conjuntivitis con ABUNDANTE MUCOSIDAD PURULENTO, AMARILLENTO.

BLEFARITIS. (graph., staph., borax).

Conjuntivitis granulosa aguda, siendo característica la ABUNDANCIA de secreción muco-purulenta.

FOTOFOBIA INTENSA; no tolera la luz, principalmente en habitación caliente, no puede leer, escribir, coser, ni otro trabajo.

Corúncula lagrimal, roja, masas de vasos rojos que se extienden a la córnea, al leer manuscritos de caracteres pequeños; después de un trabajo minucioso de costura.

Se acompaña este malestar con perturbaciones en la acomodación.

Puede haber dificultades en la visión; fósforos; ACOMODACIÓN DEFECTUOSA; al leer o escribir ve bailar o borrarse las letras.

Cara

Tinte blanco sucio, cobrizo, labios secos y azulados, aspecto de PREMATURAMENTE ENVEJECIDOS.

La multiplicidad de sus arrugas responde de sus aprensiones que diariamente aumentan sus torturas.

También lycop. tiene aspecto envejecido, pero en este medicamento vemos además una coloración amarillo terroso, ojos vivos e inteligentes como también vientre grueso y detalles que denotan más que un estado pendiente de preocupaciones, una disfunción hepática.

Aparato digestivo

BOCA :

BOCA SECA (si bien no tiene sed); PAPILAS PREEMINENTES Y PUNTA DE LA LENGUA ROJA Y

DOLOROSA; (no confundir con el triángulo rojo de la punta de la lengua de rhus tox.).

Encías sensibles, sangran fácilmente. (phosph).

Puede haber dolor en dientes sanos, (caust).

A menudo la boca tiene olor fétido y mucha saliva, viscosa.

FARINGE :

La mucosa tiene una COLORACIÓN ROJO OSCURO, más acentuado en campanilla y pilas.
 Hay principalmente de mañana acumulación de mucosidad espesa y tenaz que obliga a arrancar y escupir como en nitr. ac.
 Sensación de tener una astilla clavada en la faringe.
 Faringitis común con hep. sulf., nitr. ac., dolich. y sílicea.
 Quiere estar en ambiente frío, al aire frío, bebidas frías.
 Hep. sulf. calc., con modalidades opuestas, quiere habitación caliente y bebidas calientes.
 Nitr. ac. por el aspecto particular de su garganta y el olor de las fosas nasales, no puede confundirse.
 Dolich. tiene localización en ángulo derecho del maxilar inferior, y la sensación es solamente perceptible en la deglución.
 El prurito interno peor de noche, el estado hepático, lo distinguen muy bien.
 El diagnóstico de sílice es más difícil; tiene sensación de pinche como de un alfiler, acompañada de induración ganglionar, y generalmente es el resultado de amigdalitis supurada periódica.
 Alum. y natr. mur. tienen catarro crónico seco de garganta, igual sensación dolorosa como de aguja clavada en la garganta; pero si se trata de garganta roja con tumefacción y dolor, estos dos remedios no calman, son más eficaces arg. nitr. y hep. sulf. calc. (Kent).

ESTOMAGO :
DESEOS IRRESISTIBLES DE AZÚCAR Y DULCES.
 Desea y come estos alimentos en gran cantidad, aunque le hacen mal.
 "La agravación por el azúcar es tan marcada, que en lactantes cuya madre come azúcar, aparece diarrea" (Kent).
 Calc. ostr. tiene deseos de dulces y huevos y sal lo mismo que de cosas indigestas como cal, tiza, carbón; cina, con perturbaciones reflejas de parásitos intestinales agrega deseo de azúcar.
 Kali carb. además de desear azúcar, tiene aversión a los alimentos y sensación de estómago lleno de agua.
 Lycop., deseos de azúcar, aversión al pan, y apetito prontamente saciado.
 Medorr. que al deseo de azúcar agrega el de licores, sal y bebidas calientes.
 Sabadilla, excelente para casos de parásitos intestinales, desea mucho el azúcar y dulces.
 Sulfur con deseo de dulces pero que tolera mal la leche, los alimentos le parecen muy salados, bebe mucho y come poco.

DOLOR COMO DE ULCERACIÓN EN EL HUECO EPIGÁSTRICO.
 Empeora al menor tacto; igual dolor en las costillas falsas izquierdas.

DISNEA, GASTRALGIA, y ÚLCERAS GÁSTRICAS con dolores irradiantes. (ver kalibichr.).
 Úlcera y gastritis de los viejos bebedores.

MUCHOS DOLORS DE ESTOMAGO, son acompañados de ERUCTOS, DESPUÉS DE CADA COMIDA : SU ESTOMAGO PARECE QUE VA A ESTALLAR; ERUCTOS DIFÍCILES, en que el aire escapa violenta y ruidosamente.
 Es cosa sabida que arg. nitr. se prescribe muy comúnmente después de haberse recetado erróneamente carbo. veg., china o lycop. (Nash).

Arg. nitr. figura entre LOS REMEDIOS MAS FLATULENTOS, en que el paciente está distendido a punto de creer estallar, y sólo obtiene alguna calma expulsando viento y eructos (Kent).
 La flatulencia puede llegar a causar disnea por compresión, los esfuerzos por eructar se ven impedidos por un espasmo de esófago.
 Vómitos de flema que calman; "vómitos ALIMENTARIOS INCESANTES; vómitos de grandes bocanadas de alimento no digerido, como en ferrum o phosph" (Kent).
 Bismutum tiene vómitos nerviosos por la más mínima cantidad de alimento ingerido; ars. alb., vómitos de sangre.

ABDOMEN Y DEPOSICIONES :
 "Abdomen distendido por flatulencia tremenda" (Kent).

EXTREMA DISTENSIÓN ABDOMINAL FLATULENTE CON CÓLICOS.
 Diarrea de formas variadas; DE MUCUS VERDE, SEMEJANTE A ESPINACAS PICADAS; DIARREAS EXPULSADAS CON GRAN ESTALLIDO; DEPOSICIONES CONTENIENDO RESTOS ROJOS, MUCO-PURULENTAS o RESTOS EPITELIALES MUCOSOS; DURANTE LA DEPOSICIÓN RUIDOSA EMISIÓN DE GAS.
 Calc. phosph. tiene este tipo de diarrea ruidosa pero no tan marcada como en arg. nitr.
 Otros medicamentos con diarrea verde son : acon., elater., ipeca, magn. carb., secale, chamom.
 Diarrea con deposición inmediatamente después de haber comido o bebido, principalmente esto último. (ars. alb., crot. tigl., podoph., staphis.).

Aparato urinario
 Incontinencia día y noche; orina muy abundante que corre casi sin interrupción; orina inconsciente e ininterrumpidamente (Kent).
 Uretra inflamada con dolor ardiente y sensación de algo clavado en la mucosa.

ORINA ESCASA Y OSCURA, A VECES SANGUINOLENTA; EMISIÓN DE ALGUNAS GOTAS DESPUÉS DE HABER TERMINADO DE ORINAR.

Cann. ind. tiene este síntoma con micciones frecuentes, pero muy poco abundantes; conium, micciones involuntarias, y pierde algunas gotas después de haber terminado de orinar; kali carb. tiene deseos imperiosos de orinar, pero el chorro tarda un instante en aparecer; la micción es lenta y después de terminar pierde también gotas.

Selen. además de perder gotas, tiene sensación de que le quedó en el meato una gota irritante.

Bromium tiene un síntoma semejante.

GONORREA con secreción amarilla espesa y purulenta; dolores violentos en la uretra, erecciones que atormentan y a veces secreciones sanguinolentas. (ver cann. sat.).

Órganos genitales

MASCULINOS :

Impotencia; erecciones imposibles o que cesan al intentar el coito.

Indiferencia durante el coito, pero sueños sensuales con pérdidas seminales.

Ausencia de deseo.

Órganos encogidos.

Dolores como de agujas en testículos y escroto.

Orquitis por supresión intempestiva de una secreción.

FEMENINOS :

Vagina hipersensible y partes blandas exteriores infladas; al orinar dolor vaginal.

Ovaritis : inflamación de órganos pelvianos.

Grandes dolores en el pubis.

Ulceración de cuello uterino.

Dolores como pinchazos en la matriz, especialmente en zona ulcerada.

Prolapso uterino.

Reglas irregulares, prematuras o atrasadas; escasas o abundantes; pero la sangre es siempre negra y en coágulos.

Metrorragia; hemorragia uterina dos semanas después de la menstruación.

Hemorragias de corta duración y dolores lancinantes en vientre y abdomen.

Leucorrea profusa amarilla sanguinolenta.

Por la hipersensibilidad vaginal, el coito se hace imposible.

Orgasmos nocturnos.

Eretismo nervioso durante las reglas.

Aparato respiratorio

LARINGE :

Los signos laríngeos son los más importantes en esta esfera.

Catarro con pérdida de la voz.

Tumefacción de la mucosa y paresia de cuerdas vocales; ulceraciones, condilomas en las cuerdas vocales (Kent).

Las notas altas producen tos, laringitis crónica de los cantantes.

Tos sofocante como producida por un cabello en la garganta.

PULMONES :

Disnea con angustia; sensación de pecho oprimido por una cuerda.

Puntos dolorosos en el pecho.

Hemoptisis.

Aparato circulatorio

TENDENCIA HEMORRÁGICA; úlceras que sangran fácilmente, igual que nariz y pecho; orina sanguinolenta; metrorragias, vómitos de sangre, SANGRÍA DE MUCOSAS EN GENERAL (Kent).

Palpitaciones, pulso irregular intermitente; las palpitaciones se agravan acostado del lado derecho. (Alum).

Ansiedad con palpitaciones y sensación de latidos en todo el cuerpo.

Palpitaciones violentas al menor ejercicio muscular improvisado o a la menor emoción; el paciente se siente movido a llevarse las manos sobre el corazón para calmarse (Kent).

Sensación de una barra a través del pecho y dolores violentos que le impiden respirar.

Angina de pecho.

La presencia de muchas personas en su cuarto le parece que le roban parte del aire que necesita para respirar.

Espalda y extremidades

Arg. nitr. es un remedio nervioso rico en síntomas dorsales, dolores desgarrantes, lacerantes, fulgurantes, sobre todo en extremidades inferiores, como los que vemos en la ataxia locomotriz (Kent).

DOLORES DE PROLAPSO RENAL, CALMADOS DE PIE O AL CAMINAR, PERO FUERTES al levantarse de la silla (sulf., caust.).

Si además encontramos GRAN LASSITUD (kali carb.) FATIGA SOBRE TODO EN ANTEBRAZO Y PIERNAS, VÉRTIGO Y TEMBLOR DE EXTREMIDADES, arg. nitr. es el remedio más indicado. (Nash).

El dolor en la región lumbar se produce estando sentado pero mejor al pararse y caminando.

Dolor dorsal por gran flatulencia.
Dolor agudo en columna vertebral.
Dolor de espaldas a la noche.
Gran sensación de peso en la región lumbar (Kent).
DEBILIDAD CON TEMBLOR que manifiesta la inestabilidad nerviosa de arg. nitr., en que la estática no es jamás fija.
Gels. presenta el mismo síntoma, tal vez los temblores más marcados, pero el paciente está amodorrado con apatía mental y física.
El paciente de arg. nitr., NO SE MANTIENE BIEN EN PIE, Y SU MARCHA ES VACILANTE.
En un grado más elevado, la irritabilidad nerviosa se manifiesta por convulsiones y PARÁLISIS.
DURANTE UN TIEMPO CORTO, LAS CONVULSIONES SON PRECEDIDAS DE GRAN AGITACIÓN.
Cuprum presenta igual agitación, pero entre las crisis.
Durante los días que preceden al ataque el paciente tiene DILATACIÓN PUPILAR, y arg. nitr. conviene en casos de epilepsia cuando aparece con estos síntomas después de un susto, por la noche, o durante las reglas.
GRAN DEBILIDAD DE MIEMBROS INFERIORES; adormecimiento y sensación como si las piernas fueran a fallarle.
POR LA MAÑANA AL DESPERTAR, SENSACIÓN DE TENER LOS HUESOS ROTOS; IMPOSIBILIDAD DE CAMINAR CON LOS OJOS CERRADOS; gran lassitud.
Debilidad de miembros inferiores con enflaquecimiento de masas musculares (Amiotrofia).
Los temblores, cuando se localizan en ciertos grupos musculares tienen el aspecto de movimientos coreiformes.
Piel
Erupciones pustulosas con prurito, particularmente de noche, por el calor del lecho.
Rash púrpura tal como aparece en las formas muy graves de la fiebre tifoidea y enfermedades zimóticas.
Llagas erisipelosas en las partes que apoyan sobre el lecho en decúbito dorsal.
Relaciones
Antídotos
Natr. mur. es el mejor antídoto de las consecuencias del abuso de la aplicación de Nitrato de Plata en las mucosas.
ars. alb.
Incompatible
Coffea.
Sigue bien a veratr; en la disnea flatulente le sigue bien lycop.
También es útil en las enfermedades de los niños que han fumado. (ars. veratr.) (Allen).

ARNICA MONTANA

Familia : Compuestas, vulgarmente llamada Tabaco de los VOSGOS o Betonia de las montañas por la propiedad estornudante de sus flores.
Rizoma pardo oscuro que crece principalmente en terrenos húmedos.
En el momento de la floración se recoge la planta para preparar el medicamento.
Debido a que la "musca arnica" deposita sus huevos en las flores de esta planta es capaz de alterar sus propiedades, algunas farmacopeas homeopáticas recomiendan utilizar solamente las raíces frescas; otras, por el contrario, aconsejan limpiar cuidadosamente las flores y utilizar la planta entera.
Acción general del medicamento
SOBRE LOS MÚSCULOS Y TEJIDO CELULAR.
Su influencia especial sobre la fibra muscular determina trastornos circulatorios en arterias y capilares, lo que explica su acción sobre vísceras, en particular cerebro y bulbo.
Su acción sobre los vasos sanguíneos, sobre todo los capilares, posibilita la **EXTRAVASACIÓN SANGUÍNEA**.
Produce estados semejantes a **CONTUSIÓN O TRAUMATISMO** siendo útil para los casos en que un traumatismo, aún curado, parezca ser el motivo de un mal presente.
Es indicado para casos de contusión o surmenage de un órgano, esfuerzos musculares; el cuerpo y todos los miembros duelen como si hubiesen sido golpeados; la cama parece dura.
Su acción es rápida y no determina estados discrásicos, es decir, estados patológicos crónicos.
Su rapidez no permite esperar cambios durables en la esfera vegetativa.
Su indicación es acertada si la afección alcanza a capilares y últimas fibras nerviosas, ya sea por causa mórbida, conmoción mecánica o violencia exterior.
Bajo su acción los órganos en general presentan durante un período abatimiento, luego exaltación de la vitalidad, lo cual sucede a una impresión venida de la periferia (Espanet).
Características
Individuos plétóricos, de cara roja, ojos inyectados, labios secos, hinchados y agrietados hipersensibles y que temen ser golpeados.
ES EL PRINCIPAL REMEDIO PARA LAS CONTUSIONES Y SUS CONSECUENCIAS.

Produce efectos semejantes a los resultantes de golpes, contusiones, caídas, y conviene acordarse de él en afecciones agudas o crónicas debidas a traumatismo.

Produce bajo la piel equimosis como las de una contusión; favorece la absorción de sangre extravasada, evitando la supuración.

Es útil para cualquier dolencia causada por traumatismos lejanos.

Si no hay contraindicación, arnica deberá emplearse para el surmenaje muscular, esguinces, torceduras, contusiones. Pero para la debilidad de tendones que puede seguir a cualquiera de los estados anteriores, no es suficiente, debiéndose recurrir a rhus tox, su complemento natural.

Si la debilidad y sensibilidad dolorosa persisten en las articulaciones, a rhus deberá seguir calcárea, cuidando de no suministrar todos estos remedios el mismo día, sino después de esperar la acción que cada uno de ellos debe ejercer. Puede ocurrir que tengamos que recurrir también a caust., staph., etc., los cuales están más o menos relacionados con arnica, rhus calcárea.

Arnica SANGRA FÁCILMENTE : La tonicidad de sus vasos sanguíneos parece relajada y facilita la extravasación. Se forman manchas equimóticas en la piel; las mucosas y regiones inflamadas sangran fácilmente.

Proclive a estados catarrales, y si se resfría sangra.

Sus expectoraciones son estriadas de filamentos sanguíneos o manchadas con pequeños coágulos de sangre del tamaño de la cabeza de un alfiler.

Orina conteniendo sangre y sangra por todos los orificios corporales.

Las fibras musculares le los vasos han perdido el tono y la sangre se filtra a través de sus paredes.

DEBILIDAD, LASSITUD, SENSACIÓN COMO SI ESTUVIESE MAGULLADO; DOLORS COMO SI HUBIESE SIDO GOLPEADO.

El lecho le parece demasiado duro, por lo que se agita sin cesar.

Al examinar al paciente de arnica se lo ve moverse continuamente en el lecho, revolviéndose.

Cuál es la razón de esta agitación? El paciente de arnica se mueve por causas muy distintas a la ansiedad de acon., o la de ars., o a mejoría por el movimiento propio de rhus tox; se mueve porque está dolorido, por ello la cama le parece dura, y mejora moviéndose.

La sensación de "rotura" general, de magulladura, que hace que el paciente encuentre el lecho muy duro, la encontramos también en bapt., china, pyrog., phytol., ruta grav., staph., y rhus tox.

Modalidades

Lateralidad

Izquierda superior, derecha inferior.

Agravación

a) POR EL MAS LIGERO TACTO; TEME SER TOCADO; antim. crud., chamom., bell., zincum met.

b) POR EL FRÍO HÚMEDO; (aranae, rhus tox, nux vom., calc. carb.).

c) POR EL REPOSO.

d) POR EL VINO (alum., antim. crud., ars. alb., carb. veg., conium, fluor. ac., lycop., nux vom., silic., zinc.).

Mejoría

a) POR EL MOVIMIENTO.

b) Acostado, con la cabeza baja.

Síntomas mentales

EXTREMA DEBILIDAD QUE LLEGA A LA POSTRACIÓN; abatido física y moralmente, y experimenta la sensación característica, como si TODO SU CUERPO ESTUVIESE ROTO, MAGULLADO.

TRISTE, DESEA POR SOBRE TODAS LAS COSAS ESTAR TRANQUILO, EN PAZ; QUE NO LE HABLEN NI SE LE ARRIMEN; TOTAL INDIFERENCIA.

(No por misantropía sino por fatiga).

ANSIOSO HIPOCONDRIACO, en los momentos de mayor aprensión se espanta o se desespera imaginando toda clase de cosas angustiantes, especialmente si sufre del corazón o tiene alguna perturbación orgánica profunda (Kent). Mientras responde a una pregunta, cae en profundo estupor y antes de determinar, cae en somnolencia.

Si el médico lo toca o lo sacude para despertarlo, responde a una primera pregunta, pero en seguida cae en estupor y le dice al médico : "Yo no le he llamado, no lo necesito".

Luego volverá a dormirse, encogido, gruñendo cada vez que se le hable; tal estado reclama arnica.

Estupor con pérdida involuntaria de orina o materia fecal, en enfermedades infecciosas de formas graves : tifoidea con delirio, delirium tremens (Kent).

Sueño

Somnolencia durante el día, y por la noche espera descansar de su gran fatiga y de la magulladura que siente.

Pero su sueño es agitado, lleno de pesadillas, sueños penosos; se despierta brusca y frecuentemente, llevando sus manos al pecho, oprimiendo la región cardíaca, parece aterrorizado.

A menudo le despierta el temor a la muerte; está lleno de una angustia terrible, pero finalmente se calma, vuelve a dormirse, pero su sueño sigue siendo angustiado, vuelve a despertar y pide que le llamen en seguida un médico.

Esto sucede noche a noche, en sujetos que de día están bien o simplemente aparentan estar algo nerviosos.

Esto ocurre en los cardíacos o entre quienes están bajo la amenaza de cualquierafección orgánica grave.
En personas traumatizadas, que han sufrido un accidente; despiertan de repente de noche con miedo angustioso a la muerte repentina, reviviendo las angustias de su accidente.
En esto hay diferencia con opium, en que el temor persiste de día, no así enarnica (Kent).

Cabeza

CABEZA CALIENTE, RESTO DEL CUERPO FRÍO; sólo la cabeza o la cara están calientes.

Es una característica de los ataques congestivos repentinos, y a veces es elcomienzo de una crisis seria.

En los niños con cabeza caliente y extremidades frías puede pensarse en bell.,pero hay que tener cuidado en la diferenciación, pues si los pacientes no quieren que se les toque, si gritan si uno se acerca a ellos, si estudiamos bien el caso constataremos que se debe a la sensación de magulladura y al dolor que padecen; por último desvistiendo al enfermo, encontraremos las manchas equimóticas que reforzarán la indicación de arnica (Kent).

CEFALEA, generalmente frontal, con sensación de tegumentos contraídos;a veces SUPRAORBITARIA, generalmente a la derecha, con irradiación a los temporales, agravada al agacharse, pudiendo también haber confusión mental.

Sensación de tener un clavo clavado en el cráneo, o como si aplicaranalgo frío sobre la cabeza.

VÉRTIGO, principalmente al enderezarse, al mover la cabeza y al caminar.

APOPLEJÍA, con pulso pleno y fuerte, respiración estertorosa paralizada.

Por la rigidez tetánica del cuerpo y la fàcies violàcea, puede inducir a pensaren opium.

Aparato digestivo

BOCA :

ALIENTO FÉTIDO Y OLOR BUCAL PÚTRIDO.

ERUCTOS OFENSIVOS CON OLOR A HUEVO PODRIDO (Nash).

El olor repugnante es un indicio de arnica.

Las deposiciones tienen un olor extremadamente repugnante. (Kent).

BOCA SECA CON SED; lengua seca, cubierta de una capa blanca.

ESTOMAGO :

NO TIENE APETITO; a veces AVERSIÓN A LOS ALIMENTOS.

Principalmente carne y leche.

Alum. que además, no tolera la papa y en cambio desea cosas anormales (carbón,etc.); calc. ostr., aversión a carne, grasa, y no tolera la leche ni huevos; carbo. veg., aversión a carnes y cosas dulces; puls., aversión a carne y grasas, alimentos calientes, en cambio desea helados y frutas frías; sepia no tolera carne ni leche, pero quiere vinagre y ácidos en general.

También arnica tiene DESEOS DE VINAGRE.

Sufre del estómago mientras come; luego de haber comido, sensación de plenitud,de asco, de peso en el estómago, como si tuviese una piedra.

COMO SI EL ESTOMAGO estuviese oprimido contra la columna vertebral.

Eruetos frecuentes de mañana.

INTESTINOS Y DEPOSICIONES :

Vientre inflado, calmado por emisión de gas con olor a huevo podrido.

DEPOSICIONES OFENSIVAS, color marrón, sanguinolentas, irritantes, INVOLUNTARIAS.

A veces con tenesmo.

Deposiciones involuntarias de noche durante el sueño.

(Aloe, tiene inseguridad en el recto con deposiciones involuntarias al orinar oemistir gas; apis deposiciones involuntarias en algunos movimientos, quedándole sensación como si el ano estuviese abierto; gels. lo mismo, por emoción, susto, mala noticia; phosph. deposiciones involuntarias con sensación de que el ano queda siempre abierto; deposiciones y gases muy fétidos; lo mismo ocurre en phosph. ac., sécale, ver. alb., hyosc., bapt., carbo veg., etc.

Aparato urinario

No consigue orinar después de esfuerzo violento.

Retención espasmódica con presión vesical.

Tenesmo.

Orina roja oscura con sedimento color ladrillo.

Órganos genitales

Síntomas marcados, especialmente en la mujer.

Sensación de MAGULLADURA EN REGIÓN UTERINA QUE IMPIDE CAMINAR DERECHA.

Sensibilidad dolorosa abdominal, principalmente pelviana.

En la mujer embarazada, LOS MOVIMIENTOS DEL FETO SON DOLOROSOS, despertándola denoche.

Esta sensación de magulladura y gran sensibilidad, se extienden a recto ylabios, que están hinchados y dolorosos.

Várices EN VULVA y VAGINA, con sensación de magulladura.

La enferma de arnica tiene el vientre permanentemente dolorido;(helonias, el dolor pasa si se distrae; bellis peren., con paredes abdominales y útero doloridos).

REGLAS GENERALMENTE ADELANTADAS, de sangre roja brillante con coágulos.

Entre reglas, puede haber pérdidas de sangre con sensación demagulladura en la región pelviana.

Dolores en las vías genitales después del parto; dando arnica en tales circunstancias previene hemorragias y complicaciones puerperales; también es conveniente para hemorragias uterinas de origen traumático.

Aparato respiratorio

LARINGE :

AFONÍA DESPUÉS DE HABLAR MUCHO; sensación dolorosa como si la mucosa laríngea estuviese en carne viva por la mañana.

TOS PRODUCIDA POR EXCESO DE GRITOS Y LLANTOS.

Tos seca por cosquilleo en la tráquea.

Buen remedio para la COQUELUCHE; en que la tos es espasmódica y se acompaña de expectoración sanguínea o mucosa estriada de sangre, o mucus con pequeñísimos coágulos de sangre como cabezas de alfiler.

Vómitos alimenticios acompañan la expectoración de mucus oscuro.

El estado mental del pequeño enfermo es : huraño, irritable, el llanto acompañado de agitación y cólera provoca tos, paroxismos nocturnos de tos; llora antes del acceso como si tuviese miedo al dolor que le sobrevendrá (Kent).

BRONQUIOS Y PULMONES :

Tos paroxística nocturna, en relación con lesión cardíaca.

Pleurodinia (ranunc., cimicif.)HEMOPTISIS DESPUÉS de traumatismo o esfuerzos violentos respiratorios o circulatorios.

Aparato circulatorio

El paciente de arnica sufre del corazón; puede sentir puntos dolorosos en región precordial o sensación de magulladura acompañada de fatiga intensa y gran debilidad.

Sensación como si el corazón estuviese oprimido por un hilo o por un manojo. (cactus).

Hipertrofia pasajera del corazón después de esfuerzos violentos. (cactus).

Arnica sangra mucho.

Puede indicarse en hemorragias acompañadas de dolor en todo el cuerpo que está frío mientras la cara está roja y caliente.

Espalda y extremidades

Dolores musculares en la espalda como si hubiese sido golpeado.

(EN acon., y berb. el dolor se relaciona con litiasis renal; rhus tox; ruta).

Rigidez en todos los miembros, con sensación de magulladura como si los hubiesen golpeado.

Dolor que puede sobrevenir por esfuerzo prolongado o por exceso de ejercicio físico.

Es interesante señalar la localización dolorosa en el dedo gordo del pie, acompañada de tumefacción brillante roja y caliente, hipersensible al menor contacto; el dolor es intolerable como en un acceso de gota (Kent).

Piel

GRANITOS FORUNCULOSOS en serie disseminados por el cuerpo y muy dolorosos.

ACNÉ doloroso con característica DISTRIBUCIÓN SIMÉTRICA.

ERUPCIÓN DE PEQUEÑAS vesículas sobre base eritematosa, con calor y prurito.

TENDENCIA A EQUIMOSIS AL MENOR CONTACTO.

En lach. y sulf. ac. también hay equimosis pero aparecen en forma espontánea, mientras que en arnica son provocadas por el menor traumatismo.

Fiebre

Arnica es útil en la fiebre cuando la cabeza está roja y caliente y el resto del cuerpo frío, particularmente al atardecer y por la noche.

El solo hecho de despertar un poco al enfermo le causa escalofríos.

Por la noche hay mucha transpiración agria, ácida.

Puede presentarse la sensación como si el cuerpo fuese regado con agua fría.

Relaciones

Antídotos

Camphora, ignatia.

Complementarios

Acon., ipeca, veratr.

ARSENICUM ALBUM

Arsenicum album, anhídrido arsenioso, ácido arsénico o arsénico blanco, vulgarmente llamado arsenicum, cuya fórmula es : As_2O_3 , es el más importante de los compuestos del arsénico.

Raramente se encuentra en estado natural y por lo general se lo obtiene por combustión del Arseniosulfuro de Hierro, o de otros minerales arseníferos de cobalto o níquel.

Se nos presenta como un polvo blanco cristalizado, bastante parecido al azúcar en polvo; inodoro, de sabor ligeramente ácido, pero su acritud se desarrolla con el tiempo; espolvoreándolo sobre el fuego, se descompone y produce un olor alíaceo característico.

Es solamente soluble en 82 partes de agua fría, 140 partes de alcohol a 95° y 5 partes de glicerina.

Las 3 primeras dinamizaciones se obtienen generalmente por trituración, y las restantes, mediante diluciones.

Acción general del medicamento

Argente terapéutico de gran potencia y difusión.

Su esfera de acción inmensa.

"Abarca todo el organismo, y dada su localización electiva sobre el sistema simpático, al que afecta principalmente, puede decirse que irradia a todos los sistemas orgánicos" (Espanet).

Esquematizando su acción a través de la experimentación Hahnemanniana, vemos que actúa de manera general sobre

: 1) Las fuerzas vitales, a las que paraliza progresivamente, de ahí gran debilidad y postración; acompaña a este síntoma una gran irritabilidad del sensorio que se traduce por gran ansiedad y profunda agitación física y moral.

2) El sistema nervioso; por su acción sobre la médula se comprueba gran excitabilidad seguida de parálisis de la sustancia gris; si se prolonga su acción, los nervios periféricos son afectados y se nota una curiosa mezcla de irritación y depresión.

La parálisis se acompaña de calambres y la anestesia, de neuralgias (Hughes).

3) La circulación y la sangre; sobre la propia constitución sanguínea, disminuyendo el poder de los glóbulos rojos para fijar el oxígeno en el filtro pulmonar; en la intoxicación por arsénico, la sangre se vuelve negra, incoagulable, y sobrevienen derrames patéticos.

Disminuyen también los glóbulos rojos, produciendo anemia.

Perturba la acción cardíaca por su acción sobre el neuro-gastro, y sobre el miocardio.

Su acción sobre el simpático, ya señalada, perturba la circulación periférica.

4) La nutrición en general; repetidas dosis pequeñas de arsénico disminuyen los cambios tisulares, y los compuestos carbónicos que no se queman por falta de oxigenación, son depositados en forma de grasa, (obesidad, etc.).

En el envenenamiento crónico, la falta de combustión y la lentitud progresiva de la nutrición, dan lugar a caquexias.

5) Las mucosas, en que actúa profundamente.

Bajo su acción se irritan sobremanera, se inflaman, rojas y secas, sólo dejan segregarse un exudado poco abundante pero extremadamente irritante y ardiente; de esta acción dependen los dolores ardientes tan comunes en la patogenesia de este medicamento. (Dr. Wuwb).

6) Las serosas : aquí su acción es tan potente como en las mucosas; provoca inflamación subaguda con derrame seroso rápido y abundante.

7) El tejido muscular, sobre el que actúa no sólo por medio de los nervios motores sino también por la fibra muscular, sobre la que ejerce influencia miotónica que la contrae.

Según Hughes, esta acción miotónica explicaría los calambres y contracciones fibrilares propias del envenenamiento con arsénico.

En una palabra, la acción de este POLICRESTO SIN PAR, es indefinida desde los estados benignos (irritación débil) hasta la extrema caquexia. (Acción completa, crónica).

Agreguemos que, según Teste, es útil en afecciones endémicas que padecen los habitantes de países pantanosos, y según Jahr, en las modestas consecuencias de enfriamientos producidos por agua.

Es por excelencia, el medicamento de los estados caquéticos siguientes a afecciones agudas, cuya convalecencia se prolonga más de lo conveniente.

Muchas de sus manifestaciones las vemos en los viejos sífilíticos.

Características

CONSTITUCIÓN Y TEMPERAMENTO : Sujetos debilitados con resistencia vital casi nula; sujetos cuyo sistema gástrico ha perdido actividad por excesos; temperamentos venenosos, que aunque de aspecto exterior exuberante, han perdido su vitalidad y una pequeñez es capaz de destruir su armonía funcional : en todos ellos el menor malestar produce agotamiento, desfallecimiento.

Los ancianos son los que generalmente se sienten mejor por el arsénico, pues es en la vejez que domina el sistema venoso; la mayoría de los problemas causados por "usura" orgánica o superabundancia de sustancias en descomposición.

Moléculas gastadas o demasiado "animalizadas", que de todas partes son arrojadas a la sangre venosa para su eliminación, pues a esta edad el movimiento de descomposición sobrepasa al de plasticidad que prevalece en la infancia, sin embargo, en muchas circunstancias ARSÉNICO está llamado a actuar frente a la acumulación peligrosa sobre el sistema nervioso ganglionar, sobre las vísceras abdominales, y los sistemas linfático o quilífero (Espanet).

Alternancia entre excitación y depresión, a menudo periódica. ej. : una noche está calmo, la siguiente sumamente excitado; un día tiene proyectos grandes, actividad sobresaliente, agitación, nerviosismo, fogosidad, y al día siguiente está agotado, se considera incurable y se desespera por ello, diciendo que "todo tratamiento será en vano"; la muerte lo acecha, pero su gran debilidad no le permite exteriorizar un gran temor por ello.

La debilidad puede llegar al extremo que pide incesantemente, que se le cambie posición en el lecho por ser incapaz de moverse por sí solo; tiene alucinaciones, ve animales, fantasmas, y si es alcohólico, tiene erotismo; sobreviene la locura, se muerde los dedos, quiere mutilarse y por último siente impulsos irresistibles a suicidio. (Dr. Mouezy-Eon).

El tipo de ars. alb. : "cara alargada, enflaquecida, pálida, palidez verdosa cadavérica; rasgos marcados, aperturados, caídos; nariz afilada, piel fría, seca, arrugada, escamosa, revestida de pequeñas escamitas furfuráceas; o cubierta de sudor frío y viscoso.

Cara caquética, hipócrática.

Sobre este adelgazamiento, lívido, seco y frío, se destaca el rojo congestivo de los ojos y la hinchazón o edema palpebral, con predominancia en párpados inferiores.

Labios secos, aperturados, resquebrajados, lívidos, azulados.

En los labios inferiores, partiendo de las comisuras, hay una zona cubierta de pequeñas costras finas y blancuzcas, que el paciente humedece frecuentemente con su lengua porque se reproducen enseguida.

Eczema alrededor de las orejas.

Ojos y cabellos oscuros; cabellos duros".

(Descripción del paciente de arsénico, por el Dr. M. L. Brissaud, publicada en Le propagateur de l'Homeopathie, Marzo-Abril 1930; en el texto del Maestro Lathoud, tomo I, pág. 164, hay una figura que representa la cara del paciente de arsénico, dibujada por Phillippe Thual).

AGITACIÓN Y ANSIEDAD :Arsénico forma con acon. y rhus tox, lo que Nash llama "Trío de la Agitación".

Pero mientras la agitación de acon. sobreviene en el período precoz de la enfermedad con violencia y actividad, la de ars. sobreviene en el período final, cuando el paciente está disminuido en su vigor.

Entonces su gran debilidad impide agitarse, si bien su angustia le lleva a ello, quiere moverse y cambiar sin cesar de posición en el lecho, pero necesita ayuda, es incapaz de hacerlo solo.

LA AGITACIÓN MENTAL ES TAN GRANDE COMO LA FÍSICA.

Inquietud moral, ansiedad indefinida.

Su temor a la muerte no es tan neto y determinado como en acon.

Es más bien una ansiedad vaga, indefinida, una sensación de que morirá por no tener remedio para evitarlo.

Mientras ars. pide ser cambiado de postura, de lugar, incluso de lecho, magn. carb. abandona el lecho y se pasea por la habitación buscando calmarse.

Rhus tox está inquieto, activo, pues su dolor se calma por el movimiento.

"La agitación es una gran característica de ars.; por la tarde, el estupor de ars. se interrumpe por accesos de agitación acompañada de quejas y gemidos; el paciente está ansioso con temor a morir.

Su agitación le obliga a cambiar de lugar sin cesar (Clarke).

DEBILIDAD Y POSTRACIÓN :No hay otro remedio que tenga un cuadro de tanta debilidad y postración como en la fiebre tifoidea, ni otro remedio que le cure mejor.

Después del menor esfuerzo debe acostarse pues sobreviene gran debilidad, postración y agotamiento.

Escalando una montaña, o haciendo otros ejercicios musculares, hay falta de respiración, postración, insomnio y otros malestares (Nash).

Estando en cama el enfermo no tiene conciencia de su verdadero estado; pero tan pronto se mueve o se levanta se sorprende de sentirse tan debilitado y deprimido.

Carb. veg. y mur. ac., tienen gran postración, pero carecen de la agitación de ars.

Además, la lassitud de ars. alb. es general y no local como en phosph. ac., stann., sulfur, ignat., hydrast., sepia, que se localiza en el pecho.

Tampoco es como la debilidad de china, que sobreviene después de pérdidas líquidas orgánicas.

Conium tiene en común con ars. gran debilidad general, y gran deseo de estar acostado.

SENSACIÓN DE QUEMADURA :En todo el cuerpo los dolores de ars. son ardientes.

COMO SI BRASAS FUEREN APLICADAS A LAS REGIONES AFECTADAS.

Una sensación tal en el cerebro, insta al paciente a querer lavarse la cabeza con agua fría; pero cuando un dolor neurálgico afecta al cuero cabelludo y los nervios extra craneos con el ardor característico de ars., hay mejoría por el calor.

En consecuencia tenemos un síntoma muy importante : **MEJORÍA DE TODOS LOS SÍNTOMAS POR ENVOLTURAS CALIENTES Y CALOR EN GENERAL; ALIVIO DE AFECCIONES CEFÁLICAS POR EL FRÍO, EXCEPTO LOS MALESTARES EXTERNOS DE LA CABEZA QUE MEJORAN, COMO LOS RESTANTES SÍNTOMAS DE ARS. POR EL CALOR.**

Los síntomas con sensación de calor ardiente se sienten en vejiga, estómago, pulmones, garganta, vagina, etc.

Es una sensación mucho más fuerte que las de los demás remedios con igual síntoma.

SECRECIONES MUCOSAS AGRIAS, EXCORIANTES, Y DE OLOR PÚTRIDO :Las secreciones mucosas de ars. son AGRIAS Y EXCORIANTES; irritan extremadamente las partes de la piel que tocan, causando gran escozor INTENSO Y CARACTERÍSTICO.

"La secreción nasal u ocular provoca enrojecimiento alrededor de los respectivos emunctorios; lo mismo ocurre con todos los líquidos provenientes de los demás orificios del cuerpo; las ulceraciones son ardientes y su líquido claro, sanguinolento, excoria las partes vecinas (Kent).

El olor de las secreciones, dice Kent, es el de la carne gangrenada.

Deposiciones, orina, leucorrea, flujo menstrual, expectoración, toda secreción orgánica es fétida.

Las ulceraciones huelen tan mal, que se diría que los tejidos se descomponen" (Kent).

PERIODICIDAD DE LOS SÍNTOMAS :Esta particularidad pertenece a todo el remedio; dolores, alternancias, malestares periódicos, etc.

Cuanto más crónico es el mal más largo es el período, y en esto ars. se parece china.

Modalidades

Agravación

a) **POR LA NOCHE, PRINCIPALMENTE DESPUÉS DE MEDIANOCHE, DE 1 A 3 DE LA MAÑANA.**

Esta característica, común a los tres remedios de la agitación es más notable en ars.

b) **POR EL FRÍO**; nótese que aunque busca el aire libre, quiere puertas y ventanas abiertas para respirar, se procura calor al cuerpo, se arropa, quiere fuego en la habitación, y no obstante una cierta forma de cefalalgia congestiva que le ataca, se calma temporalmente por el agua fría.

Kent afirma haber tenido un paciente que, sumamente arropado para tener su cuerpo caliente se sentaba en la habitación con puertas y ventanas abiertas para aliviar su congestión cefálica.

c) **ACOSTADO DEL LADO DERECHO** (cabeza, pulmón, abdomen).

d) Acostado del lado afectado y con la cabeza baja.

Mejoría

a) Teniendo la cabeza en alto.

b) **POR EL CALOR, BEBIDAS CALIENTES**, etc.

De una manera general, y exceptuando la cefalalgia descrita en "AGRAVAC." Ars. quiere estar envuelto en todo lo que le procure calor, cerca del fuego; desea el calor como nux vom., psorin., hep. sulf., silic. y magn. mur.; huye del frío y de la humedad, lo que lo diferencia de sulfur, ant. crud., iodium, apis y puls. (Clarke).

Síntomas mentales

La moral de ars. refleja exactamente las modificaciones fisiológicas que padece el organismo, desde la hiperimpresionabilidad sensorial hasta la apatía melancólica; desde sus temores incesantes hasta su desgano por la vida; desde la más viva ansiedad hasta el más completo desaliento.

Todos los síntomas morales parecen emanar de la profundidad de sus órganos sufrientes, actúan sobre las facultades instintivas y afectivas y no sobre la inteligencia y la voluntad.

El cerebro es sólo afectado muy secundariamente; su delirio es pasivo, como provocado por un mal estado de los líquidos y sólidos del organismo". (Espanet).

El paciente de ars. es a la vez **ANSIOSO Y AGITADO, DESESPERADO Y AGOTADO.**

Está demasiado débil para deshacerse de los pensamientos que le asaltan día y noche, en su lecho, sentado en cualquier parte; cuando le atormentan los pensamientos terribles está ansioso. (Kent).

Su mentalidad se encuentra dominada por **AGITACIÓN, ANSIEDAD y POSTRACIÓN.**

Melancolía, tristeza, y miedo a fantasmas, a la soledad, a la oscuridad, a la muerte.

Piensa en la muerte y en lo incurable de sus males.

Piensa que a causa de ello, es inútil que tome medicamentos.

GRANDES TEMORES CON SUDORES FRÍOS, DELIRIO VIOLENTO, más violento que cualquier otro ácido excepto nitr. ac.

PEOR DE NOCHE, en que **VE FANTASMAS, ALUCINACIONES**, etc., con **TEMBLOR EN TODO EL CUERPO.**

En el delirium tremens y en la potomanía ars. es sumamente útil.

"En los viejos bebedores que hacen abusos del alcohol y que por diversas razones no pueden sustraerse a dicho hábito ars. es muy útil". (Farrington).

INDIFERENCIA, DISMINUCIÓN DE MEMORIA E INTELIGENCIA.

"El paciente de ars. es avaro, malo, egoísta, falta de valor y rehuyelas amistades, pues imagina haberlas ofendido anteriormente" (Kent).

Hipersensibilidad general (hep. sulf.).

Al tacto, al olfato, particularmente.

Un rasgo característico es la hipersensibilidad al arreglo de su habitación y objetos que le rodean.

Hering le llama "**ENFERMO DE BASTÓN CON EMPUÑADURA DE ORO**"; si está en cama, sufre si los cuadros de su habitación no están correctamente colgados y tienen alguna inclinación (Kent).

Sueño

Somnolencia de día, entrecortada por agitación o deseo de moverse.

Deseo de dormir con frecuentes bostezos.

Despierta bruscamente de 1 a 3 de la mañana después de un sueño agitado y le asalta el temor de morir, lo que lo hace salir de la cama en busca de mejor lugar y mejor sensación.
Sueño agitado, acompañado de delirio, pesadillas; rechina los dientes movimientos convulsivos de manos y dedos; gime, tiembla, despertar con posibilidad de volverse a dormir.
Sofocación durante el sueño, por lo que debe dormir con la cabeza alta.

Cabeza

Comezón intolerable del cuero cabelludo, seborrea seca, caída de cabello, más en la parte delantera de la cabeza.
Ardor y prurito nocturno.
Erupciones costrosas, pústulas y úlceras de cuero cabelludo al menor contacto.
A veces el cuero cabelludo es tan sensible que ni puede peinarse (Kent).
Dolores de cabeza congestivos con latidos, sensación de quemadura, agitación, ansiedad.
Cabeza pesada, cefalalgia frontal, migraña calmada por el frío.
Dolores que aturden, o lancinantes, o ardientes.
Por los dolores de cabeza hay vecindad con graph., naja, prun., spin., puls., sele., bell., bryon., coffea, ignat., onosmod., sang., sepia, silic., en china y natr. mur.
Los dolores de cabeza alternan con malestares físicos, ya sea reumatismo, dolores articulares, etc.
Por la alternancia de los dolores de cabeza con otros signos, ars. recuerda aalum., podoph., y arnica. (Kent).
Durante los malestares cefálicos, la piel aparece arrugada con aspecto de vejez prematura.

Ojos

Ardor con LAGRIMEO ÁCIDO, ARDIENTE, EXCORIANTE.
Dolores agravados por la luz y el movimiento del globo ocular.
Párpados ROJOS, ULCERADOS, cubiertos de costras, escamas, granulaciones.
Enrojecimiento de conjuntiva o esclerótica.
Venas inyectadas.
Hinchazón inflamatoria de párpados.
Sequedad de párpados, principalmente en bordes ciliares.
Oclusión espasmódica y aglutinación de párpados.
Edema ALREDEDOR DE LOS PÁRPADOS, especialmente del inferior, que cuelga como una bolsita llena de líquido como en apis, phosph., kali ars., kali carb. tiene el edema localizado en ángulo interno de párpado superior.
CONJUNTIVITIS, ULCERACIONES DE CORNEA, FOTOFobia INTERNA.
Retinitis albuminúrica.

Cataratas.

Miosis.

Atrofia óptica por abuso de tabaco.

Neuralgia ciliar.

Oídos

Edema alrededor de las orejas.

Otorrea poco abundante.

Ofensiva, excoriente, con dolores agudos, ardientes y zumbido de oídos durante el paroxismo de los dolores.

Zumbidos y silbidos que acompañan las cefaleas congestivas que mejoran al aire libre y empeoran al entrar en habitación caliente.

Sensación de oídos tapados y sordera, sobre todo por la palabra humana.

Cara

Abotagada, pálida, amarilla caquética, con rasgos marcados, hundidos; fría, a veces húmeda, (acet. ac.); puede tener expresión agónica.

Labios secos, resquebrajados, que el paciente lame con frecuencia para humedecerlos.

Ojos hundidos.

Puede haber oscurecimiento de la vista, temblor palpebral y contracción pupilar.

Al dormirse, los labios tienen un temblor convulsivo y están azulados, manchados o bordeados de violeta-negro agrietados.

Maxilar inferior caído.

Aparato digestivo

BOCA :

Aftas, ulceraciones, salivación que puede ser sanguinolenta, pero siempre pútrida; dolores ardientes que calman por bebidas calientes.

Encías tumefactas y sangran fácilmente.

Dientes doloridos, dolores neurálgicos.

ALIENTO MAS QUE FÉTIDO, PÚTRIDO.

GRAN SEQUEDAD DE LABIOS, MUCOSAS, CON SED.

Lengua a veces seca y rosada, con papilas, con la marca de los dientes; a veces marrón y seca o casi negra, como en la fiebre tifoidea; pero siempre seca como apergaminada.

Puede haber dolores ardientes.

FARINGE :

SECA igual que la boca; GARGANTA SECA, ARDIENTE, edematizada, contraída; disfagia por bebidas frías, mejoría por ingestiones calientes.

Inflamación con profundo enrojecimiento; en algunos casos pueden aparecer falsas membranas grisáceas, EXCESIVAMENTE ARRUGADAS, a veces gangrenosas, con olor pútrido.

Edema de glotis.

ESTOMAGO :

SED INTENSA, PUDIENDO INGERIR SOLO PEQUEÑAS CANTIDADES A LA VEZ; SED INEXTINGUIBLE.

Pese a que el frío empeora su garganta, la sed que tiene es de agua fría.

A veces el agua fría que ingiere le cae como un peso en el estómago y le devuelve en seguida. (phosph.).

Otros remedios de la sed : bryon., acet. ac., aconit., ant. crud., ant. tart., bell.

Gran deseo de agua fría, y aversión al agua, síntomas aparentemente contradictorios; canthar., capsic. eupat. perf., merc., natr. mur., phosph., y rhus tox. verat. alb., sediento de agua fría pero la vomita en seguida.

DESEO DE AGUA FRÍA, ÁCIDOS, CAFÉ, AGUARDIENTE, LECHE; otros remedios que desean leche : apis, chelid., phosph. ac..

Por los deseos generales del remedio, se relaciona con ant. crud., ant. tart., magn. carb., myrica, sepia, cinch., hep. sulf., verat. alb., puls., etc.

Por los deseos de alcohol, asarum eur., coca, caesic., carbol. ac., syphilin, etc.

LA SED intensa suele estar acompañada de falta de apetito.

Rechaza la carne como arnica, alum., bryon., cinch., calc. carb., puls., sepia; rechaza la manteca como puls., carb. veg., natr. mur..

A veces rechaza todos los alimentos NO SOPORTANDO SU VISTA NI OLOR como colch., coccul, sepia, stann..

A veces tiene hambre, pero se sacia en seguida.

Después de las comidas, dolores, vómitos, náuseas, cólicos.

Después de beber : escalofríos, horripilación, vómitos, diarrea y cólicos.

El estómago de ars. es tan IRRITABLE, que la menor ingestión sólida o líquida causa vómito, deposición, dolor, o todo a la vez.

Sensación de tener el estómago en carne viva (arg. nitr.).

Los vómitos son de todo tipo : acuosos, mucosos, mezclados con bilis y sangre.

Esta intolerancia gástrica hace pensar en ant. crud., nux vom., phosph., puls. e ipeca; este último, además de otros signos distintivos, tiene más náuseas que ars.

La sensación de plenitud, de hinchazón causada por el alimento, aún en cantidades normales, hace pensar en lycop.

La sensación estomacal de ars. es de tener "brasas" o un hierro caliente.

A veces este dolor estomacal se acompaña de diarrea.

Sensación de aniquilamiento, debilidad, que se calma comiendo, pero tan pronto comienza a comer, deseos urgentes de evacuar con diarrea. (cinch., ferrum).

Las causas desencadenantes de este grupo sintomático pueden ser : EL FRÍO, en todas sus formas; LAS BEBIDAS ALCOHÓLICAS en exceso; los venenos tomanícos; las carnes descompuestas; malos efectos de régimen vegetariano; melones, frutas acuosas. (cinch., puls.).

ABDOMEN :

Hinchado, dolorido, obligando al paciente a retorcerse en todas formas; calmado por el calor.

Dolores ardientes calmados por aplicaciones y bebidas calientes, con angustia y ansiedad.

Abdomen distendido, timpanizado; no puede soportar el menor contacto está agitado, cambia de lugar a cada instante, y sólo se detiene cuando está agotado.

Ascitis, anasarca, hipertrofia hepática y del bazo.

ANO :

HEMORROIDES QUE QUEMAN COMO FUEGO, CALMADAS POR EL CALOR; los dolores no se producen al ir al baño, sino al caminar o sentarse.

Alrededor del ano la piel está desollada y hay dolores ardientes; tenesmo y prolapso espasmódico con dolores ardientes, que se calman por el calor.

El paciente sufre constantemente una sensación de presión y de quemadura en recto y ano.

DEPOSICIONES :

Particularmente OFENSIVAS, IRRITANTES, que causan excoriaciones de la piel alrededor del ano; las excoriaciones pueden acompañarse de eczema con prurito y ardores que calman aplicando agua bien caliente.

Sus deposiciones pueden tener carácter disintérico o coleriforme.

Diarrea de todo tipo, desde la simple, mucosa, hasta la de color negro y sanguinolenta.

Deposiciones pequeñas, escasas, de olor cadavérico, de difícil expulsión y acompañadas de gran postración. Otras deposiciones de ars. son disentericas con dolores ardientes y enfriamiento de extremidades, vómitos y postración.

EMPEORAN DE NOCHE Y POR EL FRÍO EN TODAS SUS FORMAS; (acon., bryon., puls., etc.).

Después de haber comido o bebido : arg. nitr., crot. tigl., podoph., staph.

Las características de la diarrea de ars. son : PEQUEÑA CANTIDAD, COLOR OSCURO, OLORES EXTREMADAMENTE OFENSIVOS, y la GRAN POSTRACIÓN QUE LES SIGUE.

Cólera infantil con agitación extrema, ansiedad, postración, sed ardiente y piel fría. (veratr. alb.).

La constipación es un signo secundario de ars., y se acompaña de sensación de parálisis rectal.

En cada uno de los malestares digestivos descriptos, encontramos : quemazón característica, mejoría por el calor y agravación por el frío, y agravación a medianoche.

Aparato urinario

Ars. inflama e irrita profundamente la mucosa renal.

La intoxicación por ars. determina el aumento de volumen de estos órganos, cuyo epitelio sufre finalmente la degeneración grasosa, (Manquet).

En el envenenamiento agudo por ars., la orina disminuye y casi queda suprimida; la poca que se produce, es albuminosa.

Las observaciones del Dr. Mitchell comprueban la aparición repetida de anasarca con o sin albuminuria causada por altas dosis de ars.

Las investigaciones del Dr. Quaglio, han aportado nuevos conocimientos a este respecto : envenenando lentamente 7 gatos con Arseniato de soda en periodos de 1 a 10 meses, en todos ellos se produce el mal de Bright en distinto grado, pero neto. (Dr. Hughes).

ALBUMINURIA CON EDEMAS LOCALIZADOS O ANASARCA; CILINDROS EPITELIALES; células epiteliales; cilindros de pus y sangre; MAL DE BRIGHT y diabetes con sed característica, postración.

Para Jousset ars. alb. es el medicamento indicado para la diabetes complicada con forúnculos, antrax, gangrena o albuminuria; en la forma común, dicho autor encuentra mejor uranum nitr.

ORINA POCO ABUNDANTE, QUEMANTE E INVOLUNTARIA; quemazón al orinar, micciones involuntarias.

La vejiga está como paralizada y después de haber orinado, el paciente experimenta sensación de debilidad abdominal.

Incontinencia de orina.

Órganos genitales

MASCULINOS :

Predominan las ulceraciones mucosas y cutáneas, herpes, eczemas, todo ello muy sensible al menor tacto y con sensación de quemadura viva, calmada por el calor.

Edema de bolsa y pene.

FEMENINOS :

Sensación de quemadura, DOLORS ARDIENTES EN ZONA OVARICA, peor a la derecha.

Tirones hasta los muslos que parecen entumecidos.

Reglas muy abundantes y precoces, de sangre negra, y hemorrágicas o insignificantes, con sangre pálida; la secreción es excoriantes y acompañada de pruritos y ardores en la vulva; durante las reglas, puntadas y picazón en recto, periné y vulva.

Dolores tensivos y ardientes en región uterina y ovarios.

LEUCORREA ÁCIDA, QUEMANTE, OFENSIVA, CORROSIVA, sobre todo si la paciente está parada; LA SECRECIÓN ES POCO ABUNDANTE pero TIENE MAL OLOR; puede acompañarse de gas por la vagina (ammon. carb., hydrast., iodum, merc., kreos., nitri ac. tienen leucorrea ácida corrosiva, quemante igual que sepia, sulfur, graph., borax, etc.

Entre los remedios con leucorrea fétida, además de ars. alb. podemos citar akreos., hep. sulf., carbo an., helon., merc., psor., sécale, sepia, etc.

Puede haber en la vulva; inflamación, irritación, hinchazón dolorosa y ardor; dolores como producidos por un hierro candente, agravados por el menor movimiento y calmados en habitación cálida o con aplicaciones calientes; comezón, ulceraciones con sensación de escozor y quemadura.

Aparato respiratorio

NARIZ :

Coriza con secreción poco abundante, acuosa y excoriantes, ardiente, que irrita el labio superior; nariz tapada y los estornudos no calman.

La coriza puede presentarse periódicamente en primavera y otoño, con todas las incomodidades ya citadas, que sólo se calman por calor, bebidas y aplicaciones calientes.

Merc. tiene secreción excoriantes muy corrosiva, acuosa y ardiente pero mejora al aire libre; euphr. tiene catarro nasal suave pero con lagrimeo ácido, excoriantes, peor a la derecha.

Fiebre, y fiebre de heno peor al aire libre, mejor por el calor de la casa o de una habitación.

Dolores ardientes y hemorragia nasal.

Acné y lupus.

PULMONES :

Ars. es útil en casos pulmonares con respiración dificultosa, sibilante, tos y expectoración espumosa.

No puede estar acostado ni extendido, debiendo al menos sentarse para poder respirar : tampoco puede moverse por falta de aliento.

Las vías respiratorias parecen oprimidas, contraídas.

Es útil cuando todos los síntomas se relacionan con la supresión de una erupción cutánea. (Nash).

Gran disnea con agitación y agotamiento.

Catarro y dolores y ardor en el pecho.

Tos seca, fatigante, sibilante, con sensación como si respirase vapores de azufre.

Tos que empeora acostado, agravada después de medianoche (sulfur tiene tos pero peor antes de medianoche.).

Sensación de constricción de vías respiratorias, sofoca miento catarral.

Asma, cuyos accesos empeoran a medianoche.

Otro gran remedio del asma es ipeca; tanto en el asma catarral como en el nervioso, ars. le sigue bien.

SENSACIÓN DE FRÍO EN EL PECHO Y DOLOR FIJO, AGUDO PUNZANTE, A VECES CON ARDOR EN EL PRIMER TERCIO SUPERIOR DEL PULMÓN DERECHO.

Hemoptisis con dolor entre ambos hombros.

Edema de pulmón.

PLEURAS :

Chargé dice que las inflamaciones serosas son una de las principales características de ars.

Aunque todos comparten este criterio, es muy característico que más de una vez se ha constatado inflamación en la pleura y derrame seroso en casos de envenenamiento por ars.

PLEURESÍA, DERRAME ABUNDANTE Y DISNEA VIOLENTA AL MENOR ESFUERZO.

Derrame pleural con complicaciones cardíacas; violentas, sobre todo acostado.

Aparato circulatorio

CORAZÓN Y CIRCULACIÓN :

Ars. actúa mucho sobre el músculo cardíaco, por intermedio del neumogástrico cuya acción debilitan las pequeñas dosis, provocando aceleración en los latidos; las grandes dosis por el contrario, disminuyen los latidos cardíacos al actuar por medio de los ganglios cardíacos.

Puede resumirse así la SINTOMATOLOGÍA CARDÍACA DE ars. ; corazón irritable, latidos fuertes visibles para los que rodean al paciente y oídos por el paciente mismo (spig); puede haber grandes palpitaciones con funcionamiento cardíaco irregular; éstas palpitaciones pueden sobrevenir por la noche, o después de una deposición, provocando debilidad y temblores que obligan a acostarse.

SENSACIÓN DE CONSTRICCIÓN PRECORDIAL. (cactus), y opresión, al andar.

Síntomas de angina pectoris (spig.) y degeneración grasosa.

Una característica del remedio es que el PULSO RÁPIDO DÉBIL E IRREGULAR, es más rápido de mañana.

Várices que queman como fuego, calmadas por aplicaciones calientes.

SANGRE :

Ars. es muy hemorrágico; hemorragias fáciles de sangre negra, de mal olor con ardor y excoriación en la parte que sangra, además agitación, ansiedad y postración.

Hematurias, hemoptisis, hematemesis, melena, menorragias, metrorragias, epistaxis, secreción sanguínea en toda inflamación mucosa y petequias.

ANEMIA :

Ars. no disminuye el plasma sanguíneo ni destruye los glóbulos rojos, como cinch., pero sí causa cambios patológicos en glóbulos rojos y blancos.

Defectos en la hemogénesis y marcada hemólisis.

En el envenenamiento por ars. la sangre llega a contener unos 2.000.000 de glóbulos por mm³.

Hemoglobina normal o algo aumentada.

Lo mismo ocurre en la Anemia perniciosa progresiva y explica por qué ars. actúa bien en algunos casos de este terrible mal.

Ars. pertenece a las enfermedades sanguíneas graves y a los casos de anemia relacionados con enfermedades orgánicas en que da resultados felices e inesperados.

Espalda y extremidades

Debilidad de columna vertebral, que impulsa a acostarse, pero sin alivio, con angustia y agitación.

Dolor y sensación de debilidad sacral.

Dolores con ardor de espalda (oxal. ac.); sensación de quemadura entre hombros (lycop).

Dolores tractivos en la espalda.

En las crisis de angina pectoral, dolor de nuca.

SENSACIÓN DE PESO Y DEBILIDAD EN MIEMBROS, CON DIFICULTAD PARA MOVERLOS.

PARÁLISIS Y CONTRACCIÓN DE MIEMBROS.

La parálisis de ars. afecta principalmente los miembros inferiores, y es precedida de temblores, dolores, contracturas y convulsiones.

Otros medicamentos que tienen parálisis : stram., bismut., antimon., plum., merc. (Espanet).

En un enjundioso trabajo, el Prof. Dr. IMBERT-GOURBEYRE resume así las características de la parálisis de ars. : "Se manifiesta preferentemente sobre las extremidades de los miembros deteniéndose apenas en los dedos de manos y pies; ataca con más frecuencia, pies y manos, remontándose a piernas y brazos sin pasar de rodillas y codos.

Elige preferentemente las extremidades inferiores, siendo quiropodial, principalmente podal.

Antes del ataque, las partes a afectarse experimentan conmociones, calambres, cosquilleos, hormigueos, dolores, hinchazón; puede complicarse con hiperestesia cutánea.

Descamación, prurito cutáneo.

Estas parálisis entran en el grupo denominado actualmente parálisis tóxicas y tienen relación con lesiones en nervios periféricos (Baars).

De cada 72 casos, 69 comienzan por los pies, y siguen una vía centripeta (Abrouard).

En el 50% de los casos los miembros superiores son atacados varios días después.

Los trastornos paralíticos son casi siempre simétricos, con estepaje y abolición de reflejos tendinosos, los extensores son atacados y la atrofia es a veces precoz, siendo por consiguiente una parálisis sensitivo-motriz" (Dr. Pierre Schmidt, "Estudio de la acción general de ars. sobre el organismo" en Le Propagateur de l'Homéopathie, mayo 1930).

(Hay grabados ilustrativos del dibujante Lexin).

Temblores, espasmos de un grupo muscular, contracciones, movimientos coreiformes; corea obstinada y crónica, con sensación característica de inquietud en las piernas que obliga a moverlas o a caminar en busca de calma.

Por la corea, ars. alb. se asemeja a agaric., cimicif., crocus, cupr., ignat., mygal., stram., tarent., verat. vir., zincum, zizia.

Calambres en pantorrillas al marchar, o en el lecho por la noche. (Sulf. cupr.).

Dolores óseos desgarrantes, tractivos, ardientes, de noche, mejorados siempre por el calor.

Dolores ardientes a lo largo de un tracto nervioso, neuritis periférica; ciática con intensos dolores ardientes, con agitación y angustia.

Son intermitentes, con tendencia a repetición periódica.

Empeoran por el reposo, mejoran por el movimiento (rhus. tox.).

Por todas estas características, *el* medicamento tiene relación con ammon. mur., gels., lycop., rhus. tox y visc. alb. Hinchazón.

Edema de maleolos y pies.

Piel

INDURACIÓN Y ENDURECIMIENTO DE LA PIEL. (Farrington).

Tendencia a arrugarse con aspecto de vejez prematura (Kent).

Este estado de la piel puede acompañar un verdadero estado de CAQUEXIA.

Piel seca como pergamino, rugosa, escamosa, con comezón pápulas, dolores ardientes, pústulas, edemas, erupciones diversas, etc.

Agravado por el frío y rascándose, mejorado por el calor.

El paciente se rasca hasta arrancarse la piel.

Ars. es el remedio indicado en la PSORIASIS y muy útil en las eczemas con erupciones vesiculosas cuando se calman por el calor.

URTICARIA, ANTRAX, ULCERACIONES, PSORIASIS, PÚSTULAS, GANGRENA, LUPUS.

ZONA con erupción vesiculosa confluyente y violentos dolores ardientes agravados de noche y mejorados por el calor; (rhus. tox, ranunc. bulb., dolich., graph., mezer., crot. tigl.).

EDEMA, ANASARCA, HINCHAZÓN EDEMA TOSA CON DERRAME EN LAS SEROSAS (Kent).

Fiebre

Por su periodicidad sintomática, ars. es el remedio indicado en las FIEBRES INTERMITENTES.

Los accesos de ars. son incompletos e indefinidos; los escalofríos son irregulares y por el contrario, EL CALOR ES INTENSO, CON GRAN SED PERO DE BEBIDAS CALIENTES, pues las bebidas frías producen escalofríos; además esta sed no se encuentra durante los escalofríos existiendo solamente durante el estado de calor y ardor; este último estado puede aparecer tardíamente pero no siempre calma.

Pulso pequeño, débil y frecuente.

Además, el paciente es atormentado por NEURALGIAS TÍPICAS; en las formas crónicas y graves de paludismo, puede haber ANASARCA más o menos generalizado con HIPERTROFIA DE HÍGADO Y BAZO.

A menudo ars. sigue bien a china en el tratamiento del paludismo; también es indicado después del fracaso de la quinina o por abuso de este medicamento.

En las reacciones agudas de ars., en las fiebres TIFOIDEAS, SÉPTICAS, la fiebre es muy alta.

Entonces se impone ars. por sus características : agitación, debilidad, agravación de medianoche etc.

Relaciones

Complementarios

Carb. veg., phosph., thuya, all. sativa.

Antídotos

Opium, carb. veg., china, hep. sulf., nux vom.

ARSENICUM IODATUM

Arsenicum iodatum o ioduro de arsénico, ASI₃, se presenta como un polvo cristalizado color rojo anaranjado con olor y sabor a lodo.

Está compuesto de 16,5% de arsénico y de 83,5% de lodo.

Es un compuesto poco estable que debe ser mantenido al abrigo del aire, de luz y del calor, a cuyo contacto se descompone rápidamente por evaporación del lodo.

Es soluble en exceso de agua.

Podemos preparar las diversas dinamizaciones por diluciones sucesivas siguiendo el método hahnemanniano clásico, si bien se puede emplear el método de trituraciones sucesivas para las primeras dinamizaciones.

Acción general

Contrariamente a lo que la composición del remedio pudiera sugerir, lo que predomina en la acción fármaco-dinámica de ars. iod. es el arsénico.

COMO ars. alb., ars. iod. actúa sobre el metabolismo alimenticio determinando enflaquecimiento y disminuyendo la vitalidad general.

También ejerce acción marcada sobre las mucosas provocando inflamación crónica de pulmones y bronquios con abundante expectoración purulenta amarillo-verdosa e inflamación del tracto gastrointestinal.

Por su acción glandular tiene alguna semejanza con iodium, aunque en pocos aspectos.

Características

CONSTITUCIÓN Y TIPO : Particularmente indicado en las constituciones psoro-sifilíticas, escrofulosas o tuberculosas.

Individuos delgados, caquécticos, agotados, postrados, desconformes, taciturnos, generalmente con gran ansiedad física y moral.

CARÁCTER IRRITANTE, AGRIO, EXCORIANTE, CORROSIVO, ARDIENTE DE TODAS

LAS SECRECIONES MUCOSAS (ars. alb., kreos., merc. corr., nitr. ac., tell., sulfur) : En general las secreciones son ACUOSAS, LÍMPIDAS en las afecciones agudas y espesas (hydrast.) en las afecciones crónicas.

Pueden ser fétidas o ácidas.

Entre otros Kent insiste en que la elección del remedio en este aspecto debe basarse en que la secreción líquida o purulenta, debe ser agria e irritante, como carácter individualizador.

Sensaciones

QUEMADURA, como ars. alb., condición derivada de la característica señalada anteriormente; DE TENER LOS MIEMBROS ATADOS como por una venda (cactus); CONSTRICCIÓN INTERNA Y EXTERNA en los orificios (KENT); PULSACIÓN, LATIDOS, como en iodium.

Modalidades

Agravación

a) POR EL MOVIMIENTO; el ejercicio físico; no obstante, tiene deseos de moverse.

POR LAS TEMPERATURAS EXTREMAS; (ars. alb. se agrava por el frío; iodium por el calor).

b) POR EL FRÍO, tiempo y viento frío.

c) POR EL VIENTE FUERTE Y CÁLIDO del trópico. (ipeca).

d) ACOSTADO O DESCANSANDO SOBRE EL COSTADO DOLORIDO.

e) DURANTE LAS REGLAS.

f) AGRAVADO CUANDO TIENE HAMBRE.

Mejoría

MEJORADO CUANDO HA COMIDO (iodum).

Síntomas mentales

En esta esfera encontramos la influencia de ars. alb., con su AGITACIÓN y ANSIEDAD, pero en grado menos marcado.

SUJETO ansioso, triste, descontento, taciturno, también postrado, e IRRITABLE, incapacitado para trabajar.

Si padece alguna otra enfermedad, está irritable y colérico; prisa, IMPACIENCIA, incapaces de decidir entre dos opiniones.

Confusión espiritual mañana y tarde.

AVERSIÓN al trabajo; marcada debilidad mental, agravada por cualquier ejerciemento.

Cabeza

Cefalea frontal con sensación dolorosa de peso durante toda la mañana; sensación de magulladura y de rigidez en el costado izquierdo del cuello, que se agravan al mover la cabeza, Cefalea temporal derecha.

Sensación de pesadez cerebral como si el entendimiento no fuese totalmente claro; dolor malar y ligera cefalalgia frontal matutina.

Dolor de cabeza como ocasionado por un gran resfrío.

Los dolores mejoran al aire libre y se agravan en lugares calientes; mejoran después de haber comido y se agravan cuando tiene hambre.

Agravación por el movimiento, el ruido, la marcha.

El trabajo mental provoca cefaleas.

Sensación de que la cabeza se ha agrandado.

Erupción costrosa, eczema tosa, con descamación de harina, en el cuerpo cabelludo.

Ojos

Inflamación de conjuntivas con sensación de escozor y secreción, a veces muy abundante.

Lagrimo fácil peor por el aire frío; con dolores punzantes.

Dolor ocular al leer.

Oídos

Secreción de pus fétido y excoriante, otitis supurada con secreción de pus verdoso y excoriante (sulf. ac.); catarro de trompa y de oído medio; dolores torturantes, lancinantes.

Cara

Facies demacrada, con rasgos marcados, expresión enfermiza.

Tez pálida o lívida, casi cianótica; o palidez facial con pómulos enrojecidos.

Erupciones en el rostro y alrededor de la nariz; acné, eczema, granos.

Aparato digestivo

BOCA :

Aftas, encías inflamadas que sangran fácilmente.

Lengua agrietada.

Lengua y boca secas mientras duerme, y por la noche.

Lengua cubierta de un manto marrón o blanco.

Sensación de ensanchamiento de la lengua.

Mucosidad bucal abundante de mañana.

Sialorrea; encías escorbúticas, lengua dolorosa, ardiente.

Olor bucal ofensivo, pútrido.

Mal gusto, amargo o pútrido, salado, dulzón o ácido.

Odontalgia después de haber comido; dolores desgarrantes en los dientes.

HIPERTROFIA DE LAS GLÁNDULAS SUBMAXILARES.

GARGANTA :

Inflamación e hipertrofia de amígdalas.

Sequedad.

Membranas sobre las amígdalas con sensación dolorosa, ardor, deglución difícil, ulceraciones de la mucosa laríngea.

ESTOMAGO :

Apetito aumentado, hambre voraz; luego gradualmente inapetencia con aversión a los alimentos.

GRAN SED DE AGUA FRÍA, VOMITADA ENSEGUIDA DE SER BEBIDA (phosph).

Dolor estomacal con eructos, con gusto de grasa, como de haber comido cerdo.

Gastralgia, pirosis.

Dolores estomacales calambroides, cortantes, opresivos, ardientes, punzantes.

Acritud violenta.

Vómitos y náuseas dolorosos; vómitos continuos, con diarrea, dolor y náuseas, después de haber comido.

ABDOMEN Y DEPOSICIONES :

DISTENSIÓN, FLATULENCIA; abdomen hinchado, duro, tenso, por gases evacuados continuamente.

Cólicos, dolores iguales a los estomacales, después de haber comido, durante las reglas, durante la evacuación;

DOLORES COMO SI LE PARTIERAN EN DOS que lo obligan a doblarse hacia adelante, a doblarse en dos (colocynt); LA EVACUACIÓN DE GAS CALMA.

Hipertrofia de bazo (Esplenomegalia).

Hipertrofia de hígado, dolores en zona de ambos órganos.

Dolor como si se preparase una evacuación, pero con salida sólo de gas.

Cólicos que mejoran evacuando gas y materia fecal.

Evacuaciones por la noche, casi negras, mal formadas.

De mañana al levantarse urgentes deseos con resultados casi nulos.

Diarrea que aparece recién al moverse para levantarse, como en bryon.

Dolor de esfínter como de incapacidad de contraerlo, como en la disentería.

Alternativas de diarrea con constipación.

Aparato urinario

Profunda acción sobre vejiga y riñones.

Orina albuminosa, turbia, color marrón o rojizo; abundante o escasa, de olor ofensivo.

Deseos de orinar con frecuencia, principalmente de noche.

Micción involuntaria, gota a gota.

Se ha observado retención de orina.

Órganos genitales

MASCULINOS :

Erecciones matutinas, violentas, luego incompletas o ausentes.

Comezón en pene y glande; pérdidas seminales, hinchazón de testículos.

FEMENINOS :

Deseos aumentados; toda clase de perturbaciones menstruales; reglas abundantes o suprimidas; copiosas,;

frecuentes, atrasadas, cortas, insuficientes, dolorosas; hemorragia uterina; LEUCORREA ÁCIDA,

SANGUINOLENTA, ABUNDANTE, QUEMANTE, espesa o clara, amarillenta, después de las reglas.

Dolores ováricos, en especial a la derecha.

Sensación dolorosa de magulladura en ovarios y órganos genitales.

Durante las reglas, dolores sacrales y coxales.

SENOS HINCHADOS Y DOLOROSOS.

Nódulos en los senos con retracción de pezón; útil a menudo después de comium.

Aparato circulatorio

Pulso irregular; debilidad cardíaca.

Dolores cardíacos con o sin afecciones valvulares, particularmente cuando estose acompaña de lesiones pulmonares.

Degeneración grasosa, aortitis, corazón senil, miocarditis.

Sensación de angustia cardíaca.

Palpitaciones ruidosas, provocadas por el movimiento y el ejercicio.

"Utilizado en hipertrofia cardíaca con dilatación, y en la ARTERIOSCLEROSIS.

Si la afección alcanza a la irrigación craneana, hay un estado de depresión psíquica acompañada de astenia muscular,

temblor de manos; reflejos tendinosos al comienzo exagerados, luego van desapareciendo; agregando los trastornos

digestivos citados más arriba, llegaremos al CUADRO NEURASTÉNICO DE HIPOCONDRIACO al cual

corresponde el remedio". (Dr. Pierre Schmidt : "Vistazo histórico y síntomas característicos de ars. iodatum", en Le

Propagateur de l'Homéopathie , febrero 1931).

Aparato respiratorio

NARIZ :

Gran sequedad de mucosa nasal.

Dolores en la raíz de la nariz.

Estornudos frecuentes.

Sensación de obstrucción.

Coriza violento con irritación picante de mucosa nasal y ojos con IRRITANTE SECRECIÓN ACUOSA QUE INFLAMA EL LABIO SUPERIOR.

Tendencia catarral, fiebre de heno, catarro crónico nasal; secreción espesa, amarillenta, sanguinolenta, excoriante, como miel.

LARINGE Y GARGANTA :

Inflamación de laringe y tráquea.

Estado crupal.

Sensación de sequedad de las vías respiratorias.

Ulceración laríngea, el medicamento ha mostrado ser útil en tuberculosis de garganta.

Por la mañana el paciente expulsa del fondo de la garganta una cierta cantidad de mucosidad espesa y sanguinolenta, como si viniese de la nariz que le calma los dolores.

BRONQUIOS Y PULMONES :

Pequeña tos seca sensación de sequedad de vías respiratorias y obstrucción nasal.

Tos frecuente con expectoración muco-purulenta, excepcionalmente hebrosa, agravada por el ejercicio y durante la noche.

Tos violenta con imposibilidad de expectorar pese a los esfuerzos que hace.

Expectoración hemoptoica, hemoptisis.

Cosquilleo en laringe y tráquea.

Tos espasmódica, sofocante, agravada por el movimiento y la marcha.

Respiración difícil; sensación de dificultad como en el asma debiendo sentarse para poder respirar.

Asma entre 23 y 2 hs.

La respiración dificultada se acompaña de palpitaciones.

Catarro de heno con asma (gels).

Asma con enfisemas, consunción y tuberculosis.

Constricción y calor en el pecho, puntadas al costado al toser.

Los médicos experimentados y la experiencia demuestran que este medicamento es el indicado en la tisis pulmonar, particularmente después de sulfú.

Dice Boericke que ars. iod. es útil en los primeros períodos de la tuberculosis, cuando hay ligera elevación de temperatura, postración profunda, irritación, pulso rápido, transpiración, demacración y tendencia a diarrea.

Es útil también en la diarrea de los tuberculosos avanzados, y en el agotamiento con gran apetito (natr. mur., iodum).

Por último, en la amenorrea con palpitaciones anémicas y disnea, cuando SESOSPECHA LA TUBERCULOSIS DETRÁS DE TODO ESTO.

Neumonía crónica; neumonía que no cura.

Espalda y extremidades

Dolores de magulladura en la espalda, sobre todo en la nuca, como si hubiese sido golpeado.

Dolor ardiente en la región lumbar como si allí la ropa tuviese fuego.

Pesadez de miembros y lasitud de todo el cuerpo.

Dolor en tercio superior del húmero.

Sensación de estremecimiento en cara posterior de muslo izquierdo seguida de hormigueo y pesadez en el pie izquierdo, extendiéndose al derecho.

Calma parcialmente caminando y mejora por aplicaciones calientes.

Miembros inferiores fríos.

Dolores de magulladura en pantorrilla izquierda.

Sensación de fatiga y agotamiento en ambas pantorrillas al arrodillarse.

Dolor fuerte como paralizante en pantorrilla izquierda, desaparece caminando y reaparece en el reposo.

Pesadez de piernas y parálisis.

Piel

PIEL FRÍA Y CALOR INTERNO.

Persistentes comezones sobre todo en espalda.

Afecciones cutáneas crónicas; psoriasis dejando la superficie rezumada.

Exfoliación marcada en grandes escamas.

Ictiosis.

Fiebre

Liviana.

Ligera transpiración nocturna.

Fiebre hética con transpiración.

Pulso rápido, débil, irregular.

Escalofríos alternando con la fiebre, o llamaradas de calor.

Relaciones

Antídoto

Bryonia.

Complementarios

Kali iod., phosph.

ARUM TRIPHYLLUM

Arum triphyllum o "jaro de 3 hojas", planta vivaz natural de Virginia, de la familia de las Aroideas.

Cultivada en invernáculo por sus hojas ornamentales formadas por una espata de hermoso color blanco, rodeando un espádice amarillo brillante.

Es preciso distinguirla del arum maculatum, conocido también como jarocomún o pezuña de vaca, planta silvestre que crece en muchos lugares húmedos a la sombra de los bosques.

En realidad ambos han demostrado, en experimentaciones patogenéticas, poseer idénticas propiedades.

La tintura madre se prepara con la raíz fresca.

Acción general del medicamento

Irrita violentamente las MUCOSAS provocando SECRECIÓN EXCESIVAMENTE ACRE, MUY IRRITANTE, CON DESEOS INCESANTES DE RASCARSE HASTA SANGRAR LABIOS Y NARIZ.

"Los niños que juegan en lugares donde crece esta planta y comen un trozo de este llamado "nabo salvaje" sienten sobre los labios hormigueo, picazón; idéntica sensación en la lengua, y parte de las mucosas de vías respiratorias.

Esta sensación es muy desagradable y se extiende hasta el fondo de la garganta.

Inmediatamente sienten un deseo irrefrenable de frotarse, rascarse a pesar del escozor y la aparición de sangre.

Luego se frotan labios, nariz, etc., y semejante deseo se encuentra en enfermedades agudas con las características del remedio.

NARIZ Y LABIOS PICAN TANTO QUE NO DEJA DE FROTARLOS A PESAR DE SANGRAR" (Kent).

Los dolores aumentan al rascarse, pero nada hace detener dicho manipuleo(hell. nig.).
"Estas superficies están al rojo vivo y parecen una tajada de carne cruda". (Hering).
Las secreciones pueden ser sanguíneas, provocadas por el rascado, como también otras ácidas muy corrosivas.
Estos síntomas de su acción general son la guía más inequívoca para suprescripción; el paciente puede presentar un estado tifoideo avanzado con fiebre, delirio y fenómenos adinámicos.

Profunda postración y gran irritabilidad.

Puede existir incluso extrema agitación física y mental.

Hunde a cada instante la cabeza en la almohada.

Además de rascarse, rasca también la ropa que lo cubre.

El cosquilleo, picazón, etc., son tan incesantes, que sus manos están en un manipuleo continuo.

Esta carfología tan peculiar distingue al medicamento de otros estados dehyosc., bell., stram., etc.

Modalidades

Agravación

POR EL CALOR.

Lateralidad

IZQUIERDA :

Secreciones e irritaciones son más activas y marcadas de este lado.

Cabeza y cara

Dolor de cabeza más o menos crónico, agravado en habitación caliente abrigándose, después de haber entrado en calor, por bebidas calientes especialmente café, y mejorado generalmente después del desayuno o la comida.

Esta sensación dolorosa suele localizarse en los temporales.

Cara hinchada y abotagada; no soporta la luz; párpado superior tembloroso y lagrimal inflamado, más el izquierdo.

Aparato digestivo

BOCA :

Mucosa de boca y faringe muy IRRITADA como en carne viva; labios, boca y paladar doloridos, QUEMANTES, con hormigueo y picazón.

Abundante SALIVACIÓN FÉTIDA, ACRE, CORROSIVA, ULCERANTE, que agrieta las comisuras de los labios.

Dolores y ardor en la lengua, cuyas papilas le dan el aspecto de lengua como una superficie de una lima (arg. nit., bell., crocus, tereb., etc.).

A menudo la mucosa bucal puede estar recubierta de falsas membranas que, quitadas, dejan la mucosa en carne viva y sangrante.

Olor bucal fétido.

La boca "QUEMA" y duele tanto que el paciente rehusa beber y comer.

FARINGE Y ESTOMAGO :

Mucosa muy inflamada, al rojo vivo, dolorosa, a menudo cubierta de falsas membranas pútridas; DEGLUCIÓN MUY DIFÍCIL, no sólo por el dolor, sino que los músculos subyacentes a la mucosa están "paresiados".

PICAZÓN DOLOROSA.

Hipertrofia de ganglios submaxilares, que se vuelven sensibles y dolorosos; a veces, también de las parótidas.

Ausencia de apetito y de sed; bebe poco, y raramente.

ABDOMEN Y DEPOSICIONES :

Abdomen a veces distendido; DOLOR INTENSO ENTRE OMBLIGO Y CADERA, más del lado izquierdo, agravado estando parado, o respirando profundamente, o a la menor presión.

Diarrea ÁCIDA, OFENSIVA, EXCORIANTE, evacuaciones a veces amarillentas como harina de maíz, otras veces oscuras y acuosas, de aspecto tífico, con tenesmo; son muy irritantes.

La mucosa anal, excoriada y en carne viva, duele como si quemara; EXCORIACIONES y ENROJECIMIENTO EN EL PLIEGUE INTERGLUTEO, HACIA EL COXIS, CON SECRECIÓN HÚMEDA IRRITANTE Y CONSTANTE; SENSACIÓN DE QUEMADURA EN EL ANO.

Aparato respiratorio

Mucosa nasal EXCORIADA Y EN CARNE VIVA; el paciente SE RASCA HASTA SANGRAR.

A no ser por la totalidad sintomática restante tan distinta, la manía de rascarse sin cesar la nariz podría inducir a pensar en china, NARIZ AGRIETADA, como después de un paseo al aire muy frío, más del lado izquierdo.

CORIZA CON ESCURRIMIENTO ABUNDANTE, más abundante por la tarde, con cara y cabeza calientes; más de la fosa nasal izquierda; secreción ACRE QUE QUEMA FOSAS NASALES Y LABIO SUPERIOR;

SENSACIÓN DE OBSTRUCCIÓN NASAL, MAS DEL LADO IZQUIERDO; el paciente respira por la boca.

En la laringe notamos RONQUERA, con voz muy cambiante; ronca, incomprensible, grave, clara y fina, etc.

Hablando o cantando en un tono la voz no varía, pero al cambiar de tono varía también de timbre e intensidad.

RONQUERA DEL CANTANTE U ORADOR, después de un desgaste o uso intensivo de la voz.

(Rhus tox, que al cantar o hablar ejercita y mejora la voz, mientras que arum. triph. más canta o habla, más enronquece).

Cantar o hablar causan dolores considerables.

Afonía por exposición a una corriente de aire o viento frío (acon., hep. sulf.), o después de haber cantado mucho (arg. nit., caust., phosph., selen).

Ronquera brusca del orador a quien sorprende una corriente fría.

BRONQUIOS Y PULMONES :

Sensación de quemadura en tráquea al toser.

Estado catarral con sensación de quemadura en tráquea y grandes bronquios, prolongándose a los pulmones, que se vuelven muy sensibles a la presión; más marcado al costado izquierdo.

Aparato urinario

Orina escasa, a veces suprimida.

Un buen síntoma de su acción feliz hacia el alivio es el retorno de un copioso volumen de orina (Kent).

Piel

Petequias tíficas; ERUPCIÓN ROJA VIOLENTA DEL CUADRO DE ESCARLATINA; remedio excelente para esta enfermedad.

Escarlatina grave de forma tífica, con adinamia, orina escasa o suprimida, y amenaza de uremia. (amm. carb., ailanth. gland.).

Relaciones

Sigue bien a hep. sulf., y nitr. ac. en la tos crupal, seca, ronca; a caust. y hep. sulf. en ronquera y sordera matinal, y en la escarlatina. (Allen).

Arum triph. no debe ser dado en diluciones demasiado bajas ni repetido muy amenudo, por la agravación que suele producir. (Allen).

ASA FOETIDA

Goma resinosa extraída por simple incisión de la raíz del SCRULA ASA FOETIDA, planta Umbelífera del Asia Menor e India.

La tintura madre se obtiene por maceración en alcohol de la gomaresinosa mencionada; y las diferentes dinamizaciones por diluciones sucesivas, siguiendo el procedimiento HAHNEMANNIANO.

Acción general del medicamento

Excita los nervios espinales, cardíacos y particularmente los gástricos; su uso prolongado debilita y desorganiza estos sistemas y órganos atacando la nutrición en general, provocando infarto en el sistema linfático, traba la plasticidad y culmina en caquexia caracterizada por espasmos histeriformes, temblor asténico, sensación de plenitud, congestiones pasivas, lesiones atónicas en los tejidos, particularmente periostio y tejido óseo; altera las secreciones mucosas y crea un "medio" intestinal favorable a la vida y desarrollo de la flora parasitaria. (Espanet).

Características

CONSTITUCIÓN Y TIPO : Actúa en general en individuos gordos, DE MÚSCULOS FLÁCIDOS, de CONSTITUCIÓN VENOSA; SANGUÍNEOS, fácilmente cianóticos, jamás tienen aspecto de enfermos; expuestos al frío se vuelven color violeta enseguida.

Altamente nerviosos, a veces con signos verdaderamente histéricos.

Sufren dolores osteocópicos con puntadas que van del interior a la periferia; induración ganglionar.

Esta inflamación de periostio y zonas ganglionares puede también encontrarse en viejos sífilíticos con aspecto exterior de constitución venosa (Kent).

EXTREMA FLATULENCIA Y CONTRACCIONES ESPASMÓDICAS DE ESÓFAGO Y ESTÓMAGO EN EL SENTIDO DE UN PERISTALTISMO INVERTIDO.

Flatulencia plena acompañada de eructos, pues el gas tiene tendencia a ser expulsado hacia arriba, nunca hacia abajo. Sensación de que va a estallar de abajo hacia arriba, nunca en sentido opuesto, por efectos del peristaltismo invertido. (Nash).

SECRECIONES ABUNDANTES, ICOROSAS, EXTREMADAMENTE FÉTIDAS Y MAL OLIENTES.

ULCERACIONES PROFUNDAS DE BORDES AZULADOS, MANANDO UN LIQUIDO ICOROSO MUY FÉTIDO, EXTREMADAMENTE SENSIBLES AL TACTO O AL MENOR CONTACTO DE ROPAS (hep. sulf. calc.); DUELEN MUCHO DE NOCHE.

INFLAMACIÓN DEL PERIOSTIO, CARIES ÓSEAS, CON IGUAL HIPERSENSIBILIDAD Y DOLORES NOCTURNOS : DIATESIS SIFILÍTICA Y CONSTITUCIÓN VENOSA.

No deben confundirse estas ulceraciones con las de ars. alb. (más superficiales y calmadas por el calor); carb. veg., especialmente varicosas; hep. sulf. calc., que sangran fácilmente y en el borde tienen vesículas rojas; lach., que son indolentes aunque muy sensibles; merc. sol., ulceraciones de borde irregular.

SENSACIÓN DE ADORMECIMIENTO : Le encontramos en el cráneo, ya sea en piel o más profundamente; adormecimiento asociado al dolor; sensación de adormecimiento, insensibilidad, después del dolor, o después del sueño (Kent).

Modalidades

Agravación

POR EL REPOSO, en que aparece la mayoría de los síntomas.

De noche; por aplicaciones calientes; del costado derecho.

Mejoría

Por el movimiento moderado.

Al aire libre.

Cabeza

Dolores desgarrantes, punzantes, localizados en lóbulos frontales o en temporales, como si en esos lugares le clavasen un clavo; dolores con sensación de perforación de adentro hacia afuera, del hueso a la superficie cutánea. Estos dolores se encuentran principalmente en sífilíticos, histéricos o escrofulosos. (Kent).

Ojos

Inflamación ocular; párpados que dan sensación de quemadura y sequedad; ulceraciones de córnea, con sensación de adormecimiento en los ojos, y dolores que mejoran al aire libre.

Iritis, particularmente de origen sífilítico con dolores punzantes, ardientes, y sensibilidad de huesos que circundan los ojos.

Oídos

Inflamación de periostio, caries óseas, dolores de adentro hacia afuera; secreción de pus icoroso, fétido.

Cara

HINCHADA, VIOLÁCEA, SENSACIÓN DE PLÉTORA; recuerda la cara de carb. an., carb. veg., puls., aur. met. (Kent).

Aparato digestivo

BOCA :

Rechinar de dientes nocturno; movimiento de masticación perpetua con sialorrea.

Labios hinchados, particularmente el inferior, con puntadas ardientes.

Sensación de sequedad bucal, aunque está húmeda.

FARINGE Y ESÓFAGO :

BOLA HISTÉRICA; sensación de bola de abajo hacia arriba en la garganta.

Sensación de movimientos peristálticos por el esófago, del estómago a la faringe.

Dolor quemante al deglutir.

ESTÓMAGO :

EXTREMA FLATULENCIA; AEROFAGIA; meteorismo epigástrico.

Repeticiones como después de haber comido ajo; dejan gusto acre, rancio, fétido.

Gases que escapan hacia arriba, jamás hacia abajo.

PRESIÓN ESTOMACAL CON MARCADA TENSIÓN; SENSACIÓN DE ALGO QUE SUBE POR EL ESÓFAGO.

CONTRACCIONES COREICAS DEL DIAFRAGMA.

Dolores calambroides, de rotura, sensación de plenitud; sensación quemante en estómago y diafragma.

Pulsaciones sensibles y visibles en el epigastrio.

Desarreglos estomacales causados por alimentos grasos.

ABDOMEN Y DEPOSICIONES :

Dolores punzantes, cólicos en general, muchos dolores de vientre.

Dolores punzantes en hipocondrios, al respirar.

Dolores con gran malestar en hipogastrio e inquietud ansiosa.

Sensación de presión con puntadas en costados del vientre.

Cólicos ventosos con sensación de pellizco.

La menor indigestión o desarreglo, produce diarrea.

Diarreas líquidas que pueden ser amarillentas u oscuras, pero en todo caso, EXTREMADAMENTE FÉTIDAS; se calman después de deposición o emisión abundante de gas.

Órganos genitales

Dolores testiculares, particularmente viajando en coche; sensación de que los órganos son tirados hacia abajo; sensación de presión uterina.

Hinchazón de senos y secreción lechosa durante el embarazo.

Aparato respiratorio

NARIZ :

Catarro antiguo, o caries óseas, con secreción extremadamente pútrida y ofensiva.

BRONQUIOS Y PULMONES :

Asma nerviosa; asma espasmódica con sensación como si los pulmones no se pudiesen dilatar.

Sensación de presión torácica; asma después de comida abundante, esfuerzo físico, del coito (ambra).

Tos pertinaz con cosquilleo laríngeo, peor de noche.

Puntadas en el pecho con sensación de que van de adentro hacia afuera.

Opresión, principalmente acostado y luego de comer, con respiración acelerada y pulso pequeño.

Aparato circulatorio

Pulsaciones y latidos en el pecho.

Palpitaciones cardíacas.

Piel

Ulceraciones azuladas, de bordes duros, hipersensibles al menor contacto, hasta el de una gasa; manan un líquido icoroso extremadamente fétido.

Las viejas cicatrices se vuelven violáceas, como llenas de sangre venosa, muy dolorosas y con amenaza de supuración (Kent).

Espalda y extremidades

Síntomas de reuma gotoso en nerviosos; latidos muy sensibles en el dedo gordo del pie.

Estremecimiento de grupos musculares en los miembros, principalmente piernas y pies.

Hinchazón y dolores perforantes en huesos largos; a menudo la piel de estas partes es violácea y está ulcerada.

Caries óseas con dolores punzantes del interior a la periferia, fistulas que abren en una ulceración de piel, dejando salir pus icoroso extremadamente fétido.

Relaciones

Comparación

Merc., aur. met., china, mosch., castor, valer., ambra.

Antídotos

China, merc.

AURUM METALLICUM

Aurum metallicum u oro metálico, el "Rex Metallorum" de los alquimistas, metal bien conocido, se encuentra en muchas partes del globo.

Puede hallársele en estado nativo solo, o aleado con cobre, plata, en pepitas, en lentejuelas mezcladas con arena a la vera de algunos ríos, etc.

Del punto de vista terapéutico, fue muy apreciado por los árabes quienes lo empleaban contra melancolía, palpitaciones y disnea.

Cayó súbitamente en descrédito y tras algunas objeciones teóricas fue abandonado aduciendo como causa su insolubilidad, y consecuentemente, su inasimilación.

A comienzos del siglo XIX ganó nuevamente reputación.

Los médicos Chrestien y Mil de Montpellier, demostraron que reducido a polvo muy fino tenía acción sobre las mucosas.

Más adelante, su empleo bajo la forma coloidal se hizo clásico.

Pero todo su poder y valor terapéuticos fueron puestos al descubierto gracias a las experimentaciones hahnemannianas.

Para uso homeopático, se usa el oro obtenido precipitando una solución de cloruro de oro por exceso de solución de sulfato ferroso; el precipitado de oro es lavado por decantación con agua ligeramente acidulada por H. C. L., y después con agua pura.

Las tres primeras dinamizaciones se preparan por trituración Hahnemanniana; las más elevadas, por diluciones sucesivas.

Acción general del medicamento

PRODUCE SOBRE EL ESPÍRITU UN ESTADO DE DEPRESIÓN MARCADA QUE PUEDE LLEGAR AL DESGANO POR LA VIDA Y AL SUICIDIO.

Los efectos del oro, al igual que todos los metales preciosos, (plata, platino, paladio), son muy marcados en la esfera psíquica.

Para explicarnos esto, debemos considerar que el cuerpo humano, verdadero microcosmos químico, contiene en su composición la mayoría de los cuerpos simples de la naturaleza (calcio, sodio, potasio), diseminados en los tejidos además de carbono, hidrógeno, oxígeno, que se encuentran en toda nuestra composición.

Cuando un cuerpo mineral es introducido en el organismo, tiene tendencia a ser llevado a los órganos donde normalmente existe en mayor abundancia: el hierro va hacia el hígado, el azufre hacia mucosas y piel, el sodio hacia los humores internos, etc.

De tal forma, los metales preciosos, aparentemente no son retenidos por los tejidos u órganos más superficiales, y así sería como llevan su acción a planos más profundos.

Hace más de 100 años Legrand produjo un estudio sobre los efectos primarios del oro.

Trousseau y Pidoux, en su Tratado de Terapéutica, 1851, dicen: "Algunos preparados áuricos exaltan las funciones intelectuales recordando lo que nos ocurre cuando nos agita una pasión excéntrica o estamos bajo los efectos del vino".

Comparan dicho estado al "estado nervioso" de las mujeres histéricas.

Destacan también la exaltación del apetito venéreo, casi exclusivamente en el hombre.

En la Materia Médica Experimental de P. Jousset encontramos una descripción de este estado nervioso para el cual el oro es el medicamento indicado : "estado histérico, impresionabilidad excesiva; dolores experimentados muy rápidamente, o cuando se piense en ellos; risas y llantos; temblores nerviosos; agravación de este estado por la noche".

Comparando diversos autores, podemos determinar "síntomas primarios de excitación" y "síntomas secundarios de depresión".

La alegría del paciente de aur. es comparable a la producida bebiendo, y puede virar rápidamente hacia la cólera. Recuerda la ebriedad o el estado hipo maniaco.

Necesidad de cambiar de lugar, de idea, constantemente.

Necesita gran actividad física y mental, pero no puede hacer nada concreto ni completo.

Pregunta sin esperar respuestas, empieza algo sin terminarlo, no puede concentrarse espiritualmente, no puede ejecutar un trabajo intelectual seguido y activo.

Su conducta acusa algún apresuramiento o inquietud.

Jahr menciona una especie de exaltación religiosa.

La inquietud produce irritabilidad; el paciente de aur. es peleador; la menor contradicción u obstáculo le hace montar en cólera.

Su agitación le impide dormir y no siente fatiga.

Este estado deriva progresivamente hacia una depresión típicamente melancólica.

"La inquietud se torna en angustia acompañada de una especie de contracción espasmódica del abdomen, o la región cardíaca, o temblores.

La memoria, facultades intelectuales, etc., bajan al punto de hacerlo huir de toda obligación mental.

Vacilante, escrupuloso; se siente inferior, culpable, incapaz de hacer algo bueno o bien, y en todo cree haber procedido mal.

Sufre de nostalgia pensando haber perdido la estimación de sus amistades; puede proyectar sobre otros sus ideas melancólicas, cree que lo acusan, que le obstaculizan, en fin, llega a delirio paranoico.

Se vuelve pesimista, ve dificultades por doquier, siente tristeza con ganas de llorar.

La agresividad del período primario se vuelve contra sí mismo y se torna deseosa de suicidarse.

Después de haber sentido temor por la muerte, termina por considerarla como su única solución.

La idea más común de suicidio es arrojar desde una altura, y mientras no lo hace, lo sueña constantemente.

Insomnio, depresión y terrores nocturnos.

Tales son las dos características de síntomas psíquicos de aur.; pueden alternar como aparecer mezclados, provocando estados de inestabilidad en pacientes histéricos después de emociones o en alcohólicos; estados alternantes llamados "ciclotímicos" que terminan en psicosis maniaca depresiva.

Es el remedio típico de la melancolía. (Dr. Allendy - "Los síntomas psíquicos de aurum", en Le Propagateur de l'Homéopathie", diciembre 1931).

Aur. afecta la circulación : PRODUCE "HIPEREMIA", esta acción por una parte sobre el simpático, y por otra sobre las fibras musculares de las tunicas de los vasos.

Ataca el tejido óseo, principalmente en nariz, paladar y región mastoidea, provocando caries y exóstosis.

Otros medicamentos que tienen acción similar pero en distintas partes del cuerpo : angust., asa foet., fluor. ac., calc. ostr., calc. phosph., etc.

Influencia marcada en tejido glandular y glándulas mismas, en particular linfáticos y testiculares.

Produce estados parecidos a los de merc. EN LA SÍFILIS; el uso de aur.

como antivenéreo y antiescrofuloso es muy antiguo. (Espanet).

Características

CONSTITUCIÓN Y TIPO : CONSTITUCIÓN LINFÁTICO - SANGUÍNEA CON MEJILLAS ROJAS, CABELLOS Y OJOS NEGROS, SUJETO VIVO Y MUSCULOSO. (Dr. G. H. Martin).

De apariencia sanguínea, sufre de congestiones que hipertrofian e induran sus órganos, todo lo cual es causa de un negro pesimismo que lo fuerza a pensar en suicidio.

Síntomas mentales

TRISTEZA Y DESESPERACIÓN : Tan profundamente marcados que constituyen una indicación característica del remedio.

Sujeto activo, movedizo, animado, agitado, autoritario, habla fuerte, quiere ser escuchado, escucharse e imponer sus directivas; si no se le atiende, o si se le contradice, estalla en cólera.

Es un gran sensitivo ávido de acción y que duda de sí mismo.

Teme el porvenir aún en medio de la mayor prosperidad; piensa a menudo en la muerte y si su sistema nervioso se debilita la obsesión lo lleva al suicidio.

TRISTE, VE TODO SOMBRÍO; LLORA, SE LAMENTA, Y PIENSA QUE NO ESTÁ HECHO COMO TODO EL MUNDO, NI PARA ESTE MUNDO.

IRRESISTIBLE INCLINACIÓN AL SUICIDIO, CONSTANTEMENTE, POR SERLE LA VIDA UNA CARGA MUY PESADA. (Nash).

Modalidades

Agravación

POR LA NOCHE; estando acostado, estando quieto.

Por el ejercicio mental, Desde que el sol se pone hasta que sale nuevamente.

AL AIRE FRÍO; EN INVIERNO.

Muchos síntomas aparecen sólo en invierno; sin embargo, PIDE ESTAR AL AIRELIBRE, lo cual lo mejora; pero como LE FALTA CALOR VITAL, EL FRÍO EN CUALQUIERA DE SUS FORMAS AUMENTA SUS MALES.

La excitación mental causa náuseas y cefaleas; las emociones le causan temblores. (Dr. Del Mas).

Mejoría

Al aire libre (puls.).

Cuando hace calor; en verano.

La música lo apacigua, le aclara el alma siempre llena de sombras, y atempera su cólera. (Dr. Del Mas).

Lateralidad

Derecha.

Síntomas mentales

Sintetizando, ya que la mayoría de los síntomas ha sido mencionada, podemos decir : PERSONAS LANGUIDECIENTES, DEPRIMIDAS, SIN IMPULSO, DE MEMORIA DÉBIL, GRAN DESEO DE ACTIVIDAD FÍSICA Y MENTAL AUNQUE NADA DE ESO PUEDEN HACER CON FACILIDAD Y RAPIDEZ; SENTIMIENTO DE INDIGNACIÓN, DE DESESPERACIÓN, DESESPERACIÓN EN EL DOMINIO PSÍQUICO Y RELIGIOSO; HIPERSENSIBLES, las menores injurias le despiertan un rencor indeclinable (staphys); CÓLERAS VIOLENTAS, de las que enseguida se arrepiente y se lamenta; PROFUNDA TRISTEZA, GRAN DESALIENTO, DISGUSTO POR VIVIR Y CONSTANTEMENTE PIENSAN EN SUICIDARSE.

Otros medicamentos con deseo de suicidio : alum., arg. nitr., capsic.) grannostalgia moral con tendencia suicida; naja, natr. sulf., nux vom., pero en aur., el sujeto cambia inmediatamente si algún trabajo le interesa, lo absorbe o simplemente le entretiene, causándole algún placer, p. ej. una alegría que lo conmueve, una música de su predilección, etc.

Cabeza

Aur. SE VUELVE CALVO MUY TEMPRANO.

Caída de cabellos principalmente en sifilíticos y mercurializados.

Exóstosis craneanas.

EXOSTOSIS Y PERIOSTITIS EN ANTIGUOS SIFILÍTICOS o que han abusado de merc.

Dolores óseos agravados al acostarse y durante la noche.

Dolores osteocócicos craneanos.

Violentos dolores frontales, como de perforación, peor de noche, sensación de presión de adentro hacia afuera.

CONGESTIÓN DE CABEZA, que está caliente, rostro enrojecido y llamaradas de calor; sin embargo experimenta mejoría envolviéndose la cabeza con algo abrigado.

Dolores violentos peores de noche, con sensación de corriente de aire que le pasa sobre la cabeza, a tal punto, que mira por doquier tratando de ver de dónde proviene dicha corriente (Kent).

Ojos

Sensibilidad al tacto, dolores como de picaduras en ojos y órbitas.

Ojos escrofulosos que toman frío fácilmente. (Dr. Del Mas).

Conjuntivitis.

Sensación de arenilla en los ojos.

Párpados aglutinados por la mañana.

Quemadura, punzadas y prurito en párpados y ángulo interno del ojo.

HIPEREMIA.

(El Dr. Rouy publicó en La Propagateur de l'Homeopathie de diciembre 1931, un hermoso artículo intitulado "EL OJO DE aurum", en el que puntualiza que en el cuadro de este medicamento, es el ojo donde mejor se patentiza la hiperemia desde el punto de vista de su estructura vascular.

Dice entre otras cosas : "El campo terapéutico de aur. es muy rico en lo que concierne al ojo : estado congestivo de párpados, esclerótica; lagrimeo, conjuntivitis, blefaritis, tracoma, chalación, queratitis, iritis, glaucoma, algunas parálisis de músculos oculares, se benefician con aur." Ojos prominentes.

Exoftalmia.

Protrusión de globo ocular.

Coroiditis.

Iritis con intensos dolores orbitarios y en los huesos de la órbita, muy sensibles a la presión.

Queratitis.

Extrema fotofobia.

"La luz lunar mejora los síntomas oculares" (Kent).

Debilidad visual con sensación como si tuviese puntos brillantes o cuerpos extraños flotando ante los ojos.

Desigualdad pupilar.

Diplopia (gels., cyclam.).

HEMIOPIA; sensación de velo cubriendo la parte superior del campo visual, por lo tanto sólo puede ver las partes inferiores de las cosas.

Digit. tiene hemiopia con sensación de que los objetos son verdes o amarillos; lycop., y lith. carb. tienen también hemiopia, pero ven sólo la mitad vertical de los objetos, siendo la de aur., horizontal.

Oídos

Hipersensibilidad a los ruidos, mejorada por la música.

Silbidos, zumbidos, crujidos en los oídos.

Caries de huesecillos y de mastoides, con supuración crónica.

Otorrea con secreción fétida y rebelde después de escarlatina.

Cara

CARA ROJA, HINCHADA, BRILLANTE COMO SUDOROSA.

Labios ROJOS, no rojo escarlata como en sulf. sino tirando a marrón.

Erupción rojiza en frente y nariz, que tiende a extenderse y espesarse (Lach) con RED VASCULAR

SUBCUTÁNEA MUY MARCADA (carb. veg.) y sequedad interior de las ulceraciones.

La punta de la nariz es bulbosa, roja, tomando el aspecto que se llama nariz "de frutilla"; puede haber también pequeñas várices, lo que es frecuente en cardíacos que padecen trastornos del lado izquierdo del corazón y en viejos bebedores" (Kent).

OSTEÍTIS frontal, nasal, en CIGOMAS y maxilar superior con dolores desgarrantes peores de noche, con gran sensibilidad de las regiones afectadas DOLORES DESGARRANTES EN LA ARCADE CIGOMÁTICA, SOBRE TODO LADO DERECHO.

Aparato digestivo

BOCA :

Olor fétido, pútrido, como de "queso viejo".

Gusto idéntico; aliento fétido en joven citas en la pubertad.

Odontalgia, caries con dolores provocados por el menor frío que penetra en la boca.

Necrosis del hueso de la bóveda palatina con ulceración azulada sobre el velo palatino, donde hay dolores perforantes.

Ulceración de encías, sialorrea.

Hinchazón de amígdalas con ulceraciones, y dolores picantes al tragar.

Adenopatía submaxilar dolorosa.

ESTOMAGO :

SED Y APETITO AUMENTADOS; come golosamente, principalmente al comienzo de cada comida.

En la mesa, ni mira la carne; prefiere los alimentos más delicados; leche, pan, y bebidas alcohólicas.

GRAN DESEO DE BEBIDAS FRÍAS (ars., acon., ant. tart., bryon., cupr., merc., ver. alb.); DE CAFÉ (angost., ars., conium, mosch., etc.), DE LICORES Y ALCOHOLES (ars., asarum, capsic., carb. ac., kali bichr., lach., merc., nux vom., sulf., etc.).

Estómago dolorido; sensación de quemadura con eructos y regurgitaciones.

Sensación de hinchazón epigástrica.

Deseos de dormir después de las comidas. (Agaric., calc. ostr., kali carb., nux vom., etc.).

ABDOMEN :

ACCIÓN PRINCIPALMENTE HEPÁTICA.

Gran parte de los signos digestivos tienen relación con el mal funcionamiento de estos órganos.

Hígado hipertrofiado y duro, principalmente en cardíacos, con trastornos de circulación portal, y por ende, de toda la circulación venosa abdominal.

Ptois hepática, acompañada de gran tendencia a ideas suicidas, tristeza y desesperación, que vemos en hepáticos y cardíacos.

Esto no ocurre con tuberculosos, que esperan sanar aún teniendo el tejido pulmonar destruido.

El cardíaco carece de la voluntad de luchar por su curación, y se desespera al menor signo cardíaco.

Abdomen tenso sobre todo lado derecho.

Ascitis con induración hepática.

Borborismos y timpanismo; flatulencia, cólicos ventosos, más de noche, con gas fétido, puede acompañarse todo esto de constipación y diarrea; en ambos casos las evacuaciones son blancuzcas, amarillentas pero descoloridas siempre.

Sensación de presión en pared abdominal como si quisiera salirle una hernia, peor al sentarse, mejor parándose.

ANO Y DEPOSICIONES :

Hemorroides externas, con secreción de sangre durante las evacuaciones.

Diarreas nocturnas con sensación de quemadura rectal.

Constipación con deposiciones duras y en pequeños trocitos.

Evacuaciones amarillentas o blancuzcas, descoloridas.

Aparato urinario

Poliuria; constante deseo de orinar.

Poliuria en hipertensos.

Orina turbia con depósito de sedimento espeso y abundante; tiene violento olor amoniacal y se descompone rápidamente.

Retención dolorosa, con deseo pertinaz, acompañado de sensación de presión vesical.

En los sífilíticos, orina albuminosa acompañando los trastornos cardíacos; la cantidad orinada es mayor que el líquido ingerido; orina turbia, lechosa.

Nefritis relacionada con trastornos cardíacos o hepáticos.

Órganos genitales

MASCULINOS :

VOLUTUOSIDAD; poluciones nocturnas que debilitan; deseos aumentados, a veces sin erección.

Otras veces hay el síntoma opuesto, es decir, erecciones violentas acompañando al apetito venéreo.

HINCHAZÓN DOLOROSA TESTICULAR, con endurecimiento, sobre todo el derecho; induración testicular, dolores tensivos como de rotura, hidrocele, más particularmente en los sífilíticos.

ATROFIA TESTICULAR EN NIÑOS; PUBERTAD TARDÍA O AUSENTE.

Los varones que padecen este trastorno parecen adormecidos, poco inteligentes, son llorones, miedosos, y por el menor temor o cólera tiemblan (Kent).

FEMENINOS :

Gran sensibilidad vaginal, con sensación de quemadura y picazón; vaginismo.

ÚTERO HIPERTROFIADO Y PROLAPSADO.

CONGESTIÓN UTERINA, INDURACIÓN; sitio muy doloroso cuando la paciente hace algún esfuerzo con sus brazos.

REGLAS TARDÍAS, POCO ABUNDANTES, seguidas de flujo espeso, agrio.

Cada época de reglas se agravan los síntomas mentales; melancolía.

ESTERILIDAD.

Útero doloroso.

Pólipos uterinos, leucorrea transparente agravada por la marcha.

Predisposición a metritis, y a "cirrosis uterina".

Deseos sexuales acrecentados; granos en partes genitales durante las reglas, sualegría alterna a veces con cólera violenta. (ignat., capsic).

No soporta la menor ofensa. (Dr. Del Mas).

Respiración

NARIZ :

CATARRO Y OLEA.

FOSAS nasales ulceradas, nariz obstruida llena de costras; o puede haber secreción extremadamente fétida.

Dolores perforantes en huesos de la nariz, sobre todo nocturnos.

Boca y nariz tienen olor horrible.

La mayoría de los pacientes que acusan estos síntomas son sífilíticos, y juntamente con aur., pueden andar bien con merc. y hep. sulf. calc.

HIPERSENSIBILIDAD DEL OLFATO, EXCEPTO EN OLEA, EN QUE EL OLFATO SE PIERDE.

PECHO :

Disnea nocturna; crisis asmáticas peor por aire caliente y tiempo húmedo.

Dolor como si le entrara una astilla en el costado.

Sensación de presión dolorosa en costado izquierdo.

La mayoría de los trastornos respiratorios son secundarios y dependen de una lesión cardíaca primitiva; asma cardíaca, enfisema con irregularidad de latidos y congestiones.

La opresión se acompaña de agitación, ansiedad, deseos de suicidio.

Circulación

Aur. ES UN SANGUÍNEO EN ESTADO CONSTANTE DE CONGESTIÓN, DE PLÉTORA SANGUÍNEA.

La congestión, que puede ser total se mejora por aire frío, baños, y estando descubierto o destapado.

TENSIÓN ARTERIAL AUMENTADA; calor con palpitaciones violentas y visibles, y ansiedad después de la más leve excitación.

Las palpitaciones mejoran al aire libre.

El corazón aumenta de tamaño y está tembloroso.

Hay sensación de constricción pectoral, y dolores cardíacos agravados estando estirado. (spongia).

SENSACIÓN COMO SI EL CORAZÓN SE DETUVIERA UN INSTANTE.

SEGUIDA DE SALTO DEL ÓRGANO Y PALPITACIONES VIOLENTAS, CON SENSACIÓN DE DEFALLECIMIENTO EN EL EPIGASTRIO.

Corazón grande en plétóricos, reumáticos, viejos, sanguíneos, corpulentos, hipertensos.

PULSO RÁPIDO, DÉBIL E IRREGULAR, ERETISMO VASCULAR.

LATIDOS VISIBLES EN CAROTIDAS Y TEMPORALES.

El flujo circulatorio puede ser intenso pero de poca duración, y puede hacer pensar en angina de pecho.

Si es constante, el paciente está extremadamente oprimido al menor esfuerzo y hay edema maleolar.

No puede estar tendido ni acostado; debe estar sentado, y con el pecho hacia adelante.

Disnea durante el dolor cardíaco, o después de haber comido, en cuyo caso mejora por los eructos; mientras ríe, o sube una escalera; durante las palpitaciones y por marcha rápida.

Espalda y extremidades

Aur. es indicado en afecciones óseas de origen sífilítico; máxime si el paciente ha sido sometido previamente a tratamiento mercurial intensivo.

Osteítis y periosteítis.

Dolores osteocópicos y óseos desgarrantes, cortantes, perforantes, como decuchillada, peor de noche y estando acostado, principalmente localizados en huesos cortos. (angostura, fluor ac.).

Dolores paralíticos desgarrantes en articulaciones.

Debilidad de miembros.

Reuma que salta de una articulación a otra para fijarse por último en el corazón.

Orgasmo como si la sangre hirviese en las venas de los miembros, dilatadas, con paredes espesas como tumefactas.

Sensación como si la sangre fluyera desde la cabeza a los miembros inferiores.

Pies pesados e hinchados.

Edema de pies y miembros inferiores.

Relaciones

Remedios que le siguen bien

Acon., bell., calc., china, lycop., merc., nitr. ac., puls., rhus tox., sepia, sulf., syphil.

Además sigue bien y es seguido por LUESIN.

Antídotos

Bell., china., coccul., coffea, cupr., merc., puls., spig.

BAPTISIA TINCTORIA

Baptisia tinctoria o índigo salvaje, planta de la familia de las Leguminosas, con cuya raíz fresca se prepara para uso homeopático una Tintura Madre para lo cual se emplea el procedimiento habitual.

Acción general del medicamento

Los síntomas de baptisia son del TIPO ASTENICO, como ser fiebres infecciosas graves, estados sépticos de la sangre, envenenamientos maláricos; POSTRACIÓN EXTREMA (Espanet).

En una palabra, la influencia primordial de bapt. sobre el organismo se manifiesta por su acción SOBRE LOS HUMORES, en los que produce una desorganización semejante a la provocada por fiebres tifoideas y fiebres infecciosas graves. (Espanet).

También actúa sobre las mucosas pudiendo provocar en ellas verdaderas ULCERACIONES.

Características

CONSTITUCIÓN Y TIPO : Se adapta sobre todo a temperamentos linfáticos. (Allen).

GRAN POSTRACIÓN, AVERSIÓN POR EL EJERCICIO MENTAL, que lo fatiga; pérdida del poder de pensar; TOTAL INDIFERENCIA, que no le permite concentrarse en nada; ESTUPOR; estado de somnolencia al hablarle o entiendo lo que se habla y no puede contestar (o si se le habla, responde correctamente e inmediatamente cae en estado de delirio). (arnica). (Allen).

GRAN SENSACIÓN DE DOLOR, DE FATIGA, MUSCULAR.

SEA CUAL FUERE LA POSICIÓN SOBRE LA QUE DESCANSA, LA PARTE DEL CUERPO

APOYADA SOBRE EL LECHO ESTA DOLORIDA. (pyrog., arnica, ruta).

TODAS LAS SECRECIONES ESPECIALMENTE DURANTE FIEBRE TIFOIDEA Y ENFERMEDADES AGUDAS SON FÉTIDAS; transpiración, aliento, evacuaciones, orina, respiración, emanaciones ulcerosas, etc. (ars., pyrog., psor., etc.). (Allen).

Síntomas mentales

INCAPACIDAD DE PENSAR, considerable depresión nerviosa; facultades intelectuales perturbadas desde el comienzo; AVERSIÓN POR TODO ESFUERZO MENTAL; incapacidad de reunir ideas y todo termina por serle INDIFERENTE.

GRAN POSTRACIÓN, ESTUPOR PROFUNDO; EN MEDIO DE UNA RESPUESTA QUE NO ALCANZA A COMPLETAR, CAE EN PROFUNDO ESTUPOR Y SOMNOLENCIA. (arnica).

IDEAS CONFUSAS, DIVAGACIONES, DELIRIO; piensa que es el doble o el triple de grande, que la ropa de cama no alcanzará a cubrirlo; que está seccionado, que las partes del cuerpo están separadas, y se mueve en el lecho

para tratar de reunir sus partes que cree dispersas. (anacard.) con verdadera disociación de personalidad. (can. ind., petrol., stram.).

A pesar de la sensación dolorosa y de magulladura por la que desearía descansar, **ESTA EN PERPETUO MOVIMIENTO, MUY AGITADO.**

Sueño

Constante somnolencia, estupor; queda dormido en mitad de una respuesta.

Pesadillas y sueños horribles; insomnio y agitación.

Teme dormirse para no soñar pesadillas o por temor a sofocación.

Además, durante el sueño no descansa bien, por lo que las partes del cuerpo sobre las que descansa están doloridas. (Boericke).

Cabeza

Confusión; la cabeza le gira.

Vértigo con sensación de debilidad generalizada, sobre todo, miembros inferiores, particularmente rodillas.

Cefalea, sobre todo occipital, con entumecimiento y sensación de plenitud, presión, en la base de la nariz.

Sensación de dolor cerebral, y dolor frontal como si la piel estuviese estirada, apretada, retraída.

Ojos

Congestionados, rojos, sensibles, y duelen al menor movimiento del globo ocular.

Cara

Congestionada, rojo oscura, con expresión de estupidez semejante a la de un borracho. (gels.).

Aparato digestivo

Esta región es el centro de la acción de bapt.

BOCA Y FARINGE :

Gusto amargo, olor repugnante, pútrido, insoportable, **ALIENTO FÉTIDO**, encías hinchadas, tumefactas, dolorosas y ulceradas.

Dientes cubiertos de fuliginosidades.

El paciente saca difícilmente la lengua, que está temblorosa, hinchada, dolorosa, blanca con papilas rojas, que no tarda en volverse seca, con la superficie resquebrajada y dolorida, con raya al medio rojo marrón, **SIN** el triángulo rojo en la punta, distintivo de rhus tox.

MUCOSA LINGUAL, BUCAL Y FARÍNGEA CUBIERTA DE PEQUEÑAS ULCERACIONES ROJO OSCURO MUY DOLOROSAS que se extienden rápidamente y tienen un olor particular **PÚTRIDO, GANGRENOSO.**

Además en faringe, amígdalas, velo de paladar, la mucosa está hinchada y rojo opaco jamás brillante como bell.; a menudo cubierta de una exudación pútrida pero indolora; **ANGINA ROJO OPACO, INDOLORA.**

PUEDE TRAGAR SOLAMENTE LÍQUIDOS; EL MENOR ALIMENTO SÓLIDO LO AHOGA(bar. carb., silic., éste último con aversión al agua); deseo constante de agua fría.

EN bapt. la deglución está casi paralizada; a la constricción faríngea se agrega **CONSTRICCIÓN ESOFÁGICA** (cajaputum) y una especie de **ESPASMO CARDÍACO** que produce calambres que dificultan la alimentación. (verat. vir.).

ESTÓMAGO :

DESEO CONSTANTE DE AGUA; falta de apetito, agravación por la cerveza (kali bichr).

Dilatación de estómago.

Sensación de vacío, de cuerpo duro. (abies nigra).

ABDOMEN Y EVACUACIONES :

Dilatación y distensión abdominal; **TIMPANISMO, BORBORIGMOS, SENSIBILIDAD DOLOROSA Y COSQUILLOS EN FOSA ILÍACA DERECHA; GORGOTEOS.**

Toda la mitad derecha del abdomen es muy sensible al tacto; región cecal, apendicular, hígado y región biliar doloridas y sensibles.

Diarrea **SOBRE TODO MATINAL**, evacuaciones frecuentes pequeñas, color oscuro, irritantes, muy fétidas, pútridas, (ars., carb. veg., psor., podoph.) a veces negruzcas y sanguinolentas, a veces involuntarias, acompañadas, de irritación perianal, pudiendo producir en esta región pequeñas ulceraciones.

Órganos genitales

Reglas prematuras, muy abundantes.

Flujo acre, fétido.

Aparato respiratorio

Respiración dificultosa, los pulmones parecen comprimidos, se mantiene sentado en el lecho y teme dormirse pues despierta con pesadillas y sofocación.

Espalda y extremidades

Músculos de nuca, espalda y miembros sensibles, rígidos y dolorosos; en el sacro se localiza una intolerable sensación de rotura que impide dormir.

Tirones dolorosos en brazos y piernas.

Piel

Sensación de quemadura y calor. (ars).

Manchas lívidas en todo el cuerpo.

Fiebre

El acceso aparece generalmente a las 11 y dura todo el día, acompañado a la sensación de "rotura" característica.

La temperatura sube con rapidez y las llamaradas de calor llegan al máximo a las 3 de la tarde; transpiración poco abundante pero muy fétida.

La temperatura se mantiene generalmente elevada, con pulso rápido e intermitente.

Bapt. corresponde a las fiebres infecciosas graves.

(Pyrog. tiene en común con bapt. postración, agitación, confusión mental.

Alucinaciones, sensación de "rotura" que impide el descanso, y secreciones pútridas.

Pero sobre todo padece de dolores vivos en los huesos como eupat.; siente a su corazón, como si estuviese en agua fría; pero lo distintivo en este último medicamento es la discrepancia entre la temperatura, poco elevada, y el pulso muy rápido).

Bapt. es sobre todo el remedio de la FIEBRE TIFOIDEA; ha aquí el cuadro sintomático que indica, según su patogenesia : al comienzo, gran nerviosidad con escalofríos, doloración, quebrantamiento muscular generalizado, pero localizado generalmente en cabeza, espalda y extremidades.

Luego cae en una postración cada vez mayor, abatimiento e indiferencia; confusión de ideas, ojos inyectados, cara congestionada y un embotamiento que al hacerle una pregunta se duerme en mitad de la respuesta.

Tiene además en medio de la lengua, una raya bien marcada primero blanca y luego marrón.

A medida que la enfermedad progresa, sólo musita cosas sueltas, y si ensaya hablar algo es para decir que se encuentra despedazado en su lecho y que trata de reunir sus pedazos.

Gorgoteos en fosa ilíaca derecha, y esta región es muy sensible al tacto.

Diarrea característica, a la vez que orina, sudores, aliento, son extremadamente fétidos.

Otros medicamentos comparables a bapt. y que se emplean en algunos aspectos de la fiebre tifoidea : gels., que se caracteriza por actuar más suavemente que bapt.; rhus tox, que tiene evacuaciones menos fétidas, la agitación obedece más a algia reumatoidea que a dolores musculares; además en el delirio de rhus tox no hay los errores de apreciación de la personalidad propios de bapt.

Arnica, es más indicado cuando hay tendencia apoplética, cuando evacuaciones y orina pasan involuntariamente, la respiración es violenta y ronca y hay verdaderas pequeñas equimosis en el cuerpo.

Lach. tiene mucho en común con bapt.; mur. ac., en que la debilidad es tan grande, que el paciente no tiene la fuerza necesaria para tener su cabeza erguida, y se desliza HUNDIDO propiamente en su lecho.

Relaciones

Bapt. es indicado cuando ars. ha sido prescripto demasiado pronto o a dosis muy repetidas, en la fiebre tifoidea (Allen).

A bapt. siguen bien : croton, hamam., nitr. ac., tereb., actúa bien en la hemorragia de la fiebre tifoidea (Allen).

BARYTA CARBONICA

Baryta carbónica, o carbonato de bario, CO₃Ba, se encuentra en estado natural en masas fibro-compactas blanco-amarillentas o en cristales incoloros.

Es la Witherita de los mineralogistas cuyas más hermosas muestras provienen de Alston-Moor.

Para obtenerlo puro se prepara por descomposición doble, precipitando el nitrato o el cloruro de bario en una solución de carbonato alcalino.

De la sal así obtenida hacemos por trituración las tres primeras dinamizaciones, luego de las cuales obtenemos las más elevadas partiendo de la tercera disuelta en alcohol.

Acción general del medicamento

Bar. carb. influye en el DESARROLLO GENERAL DEL INDIVIDUO.

La palabra "pequeño" generalmente relacionada con este medicamento, no se refiere solamente a la estatura, sino al cuerpo y espíritu en general.

Cuando analizamos el término "precocidad" que significa brillantez, inteligencia avanzada con respecto a los otros individuos de igual edad y bien dotados en general, tendremos en bar. carb. exactamente lo contrario determinado por la palabra "pequeñez" (Kent).

La influencia del remedio la encontramos en todas las edades : en niños tardíos en desarrollar su actividad intelectual, jóvenes de hasta 25 años, que continúan comportándose como niños, expresándose como tales, sintiendo y sintiéndose tales; la joven que no tiene conciencia de su edad, continúa jugando con muñecas, dice necedades, carece de todo lo propio de una joven de su edad.

Esa es la manifestación de "pequeñez" del remedio (Kent).

En una palabra bar. carb.

PARECE SUSPENDER LA MARCHA DEL DESARROLLO ARMONIOSO QUE DE TODA CRIATURA HACE UN HOMBRE O UNA MUJER.

Más que de pequeñez física general, se trata de pequeñez espiritual de uno desus órganos, que puede atrasarse en su desarrollo y hasta atrofiarse; lo mismo puede ocurrir con un lado del cuerpo con respecto al otro; es LA ANOMALÍA EN EL DESARROLLO lo que nos hace pensar en bar. carb.

Produce además CAMBIOS DE GENERATIVOS EN LOS TEJIDOS, ESPECIALMENTE ARTERIALES; de ahí aneurismas o rotura de paredes arteriales, y apoplejía. (Boericke).

También ha curado tumores grasosos, tumores enquistados, lupus, excrecencias externas de naturaleza tuberculosa, sarcomas : ha disminuido los dolores y prolongado la vida en algunas afecciones cancerosas (Kent).

Es sobre todo EL TEJIDO GLANDULAR que interesa profundamente, en especial el SISTEMA LINFÁTICO Y LAS AMÍGDALAS; gran síntoma de bar. carb. es el ATROFIAMIENTO E INDURACIÓN DE GANGLIOS; las cadenas ganglionares se forman en axilas, ingles, cuello, abdomen.

Además de atrofia e induración de ganglios la inflamación con infiltración es signo típico de baryta (Kent).

Produce, por último, ESTADO CATARRAL EN LAS MUCOSAS, particularmente EN EL ÁRBOL RESPIRATORIO.

Características

CONSTITUCIÓN Y TIPO : Niños escrofulosos con retardo físico e intelectual; de escasa talla, no han desarrollado normalmente en forma armoniosa; oftalmía escrofulosa, vientre grande (sulf.); toman frío fácilmente y tienen hipertrofia de amígdalas. (Boericke).

Bar. tiene en común con otros medicamentos : calc. ostr., tarda encaminar por "no poder", mientras bar. lo hace "por no aprender" (Kent).

Silic., como bar. tiene sudor ofensivo de pies, agravación por tiempo húmedo, cabeza grande sobre un cuerpo débil, pero bar. no tiene los sudores profusos de silic., y éste no tiene la "pequeñez" espiritual de bar., siendo más bien chico voluntarioso y caprichoso. (Nash).

En posterior instancia, la gran característica de bar. es SU RETRASO EN EL DESARROLLO PSÍQUICO. En este aspecto rivaliza con borax Y natr. mur., formando un trío de medicamentos que ofrecen un RETARDO PARTICULAR EN EL DESARROLLO CEREBRAL, O POR LO MENOS DE LA ACTIVIDAD DE ESTE ÓRGANO, de ahí la tardanza en desarrollar, en aprender.

Dice Kent, que los niños de bar. que van al consultorio, se tapan la cara por temor al médico, o le miran a través de sus dedos entreabiertos.

Niños vergonzosos, tímidos, asustadizos, enfermizos, huyen de los extraños, y buscan esconderse o huir.

Antes que jugar con sus compañeros o amigos, prefieren sentarse en un rincón; no demuestran deseos de jugar, ni solos.

Crecen, pero sus facultades no se desarrollan proporcionalmente a la edad. (Kent).

Sujetos difícilmente impresionables, impasibles, faltos de reacción.

Mujeres cuya faz estúpida dice bien claro de su falta de juicio o sensibilidad.

Estas características se prolongan a edades avanzadas; hay aún en la vejez, un estado permanentemente de puerilidad.

Como consecuencia de tal estado, vemos senilidad precoz, vejez prematura, viejos jóvenes o viceversa, pero que actúan y piensan como niños.

Todo ello debe hacernos pensar en bar. carb. (Kent).

Modalidades

Lateralidad

Derecha superior, izquierda inferior.

Mejoría

a) Estando solo.

b) Paseándose al aire libre (los dolores de cabeza solamente).

Agravación

a) POR EL AIRE FRÍO; el paciente de bar. es friolento, está siempre HELADO, es muy SENSIBLE AL FRÍO; necesita arroparse mucho; cuando el paciente toma frío se agravan sus ganglios hipertrofiados; hay una excepción : LOS DOLORES DE CABEZA mejoran por el frío y empeoran por el calor.

SENSIBILIDAD A AMBOS EXTREMOS DE TEMPERATURA.

El exceso de calor hace fluir la sangre a su cabeza y favorece los estados apopléticos (Kent).

b) POR TODOS LOS CAMBIOS DE TIEMPO.

c) POR LA HUMEDAD, POR MOJARSE, POR EL BAÑO FRÍO.

d) PENSANDO EN SU ENFERMEDAD, EN SUS CONTRARIIDADES, EN SUS ENFRIAMIENTOS (gels., helon., oxal. ac., calc. phosph.).

e) Acostándose sobre el costado afectado (Hep. sulf., iodum, kali car., nux mosch., phosph.).

Síntomas mentales

Espíritu infantil, timidez, aversión a la gente desconocida, escondiéndose cuando alguien entra en su habitación.

No acusan progresos en la escuela; no sacan provecho de lo que leen, estudian les enseñan.

Debilidad mental, falta de resolución, no tiene fe en sí mismo; se entristece por cosas sin importancia; confusión espiritual, escrupulosidad exagerada, memoria infiel (carece de memoria); sulf. tiene debilidad de memoria para los

nombres propios y los últimos sucesos, recordando en cambio los anteriores; lycop. hace muchos lapsus al escribir y olvida los significados de muchas palabras; nux mosch. con gran debilidad de memoria y pereza espiritual; anac. olvida hasta lo que va a decir por escrito o hablando.

Constantemente preocupado, cree que por pura desgracia no puede obtenerlo que desea, y en su imaginación piensa en infinidad de males que podrían ocurrirle (ars. alb.) (Kent).

FALTA DE CLARIDAD DE CONCIENCIA; CARECE DE INTELIGENCIA LUCIDA.

Debilidad intelectual que marcha progresivamente hacia la imbecilidad, pasando por todos los grados que median entre ambos extremos (Kent).

Sueño

Si presenta somnolencia diurna, con frecuentes bostezos, en cambio durante la noche tiene insomnio; frecuentes despertares con calor general y sensación persistente de gran fatiga; sueños aterradores y pesadillas.

Cabeza

Cabeza pesada, obnubilada, con somnolencia; el cerebro parece vacío.

Dolores de cabeza agravados por los extremos de temperatura.

Puede decirse que generalmente los dolores de cabeza calman por el frío.

Sensación como si el cerebro estuviese "separado" en la cabeza; como si semoviera a cada movimiento de cabeza.

Sensación de sobresalto en cabeza y cerebro.

Hay muchos dolores de cabeza semejantes a los relacionados con el estuporapoplético (Kent).

Gran sensibilidad de cuero cabelludo.

Erupciones húmedas o secas en la cabeza.

Cara

Roja, congestionada; labios secos y resquebrajados, con hinchazón de labio superior. (apis., bell., calc. ostr., hep. sulf. calc.).

Ojos

Aquí hay pocos síntomas característicos.

Dilatación pupilar que alterna con contracción.

Visión como si tuviese un velo de gasa ante los ojos; a veces ha sido empleado con éxito en la catarata.

Sensación de peso en los párpados superiores; sensación como si la frente ejerciese peso sobre los ojos. (carb. veg., carb. an., natr. mur).

El paciente se toma la frente diciendo que la siente apoyada dolorosamente sobre los ojos. (Kent).

Oídos

Sordera; ruidos, crujidos, zumbidos, principalmente cuando se suena la nariz.

Aparato digestivo

BOCA Y GLÁNDULAS SALIVALES :

Boca seca de mañana al despertar.

Aftas; encías sangrientas.

Odontalgias durante las reglas.

Parálisis o debilidad lingual en personas de edad.

DIFICULTAD DE PALABRA POR DEBILIDAD PARETICA LINGUAL, COMO EN LOS VIEJOS.

HIPERTROFIA DE PAROTIDA Y GLÁNDULAS SUB-MAXILARES, INFLAMACIÓN CON INDURACIÓN E INFILTRACIÓN, muy dolorosas, después de tomar frío o de un cambio brusco de tiempo; **ESTA INFLAMACIÓN TIENDE A INDURACIÓN, PERO NO A SUPURACIÓN**; puede encontrarse también este tipo de hipertrofia después de escarlatina (Kent).

FARINGE :

Estado catarral general; inflamación de tejidos celulares y amígdalas.

Mucosa de aspecto brillante y con granulaciones rugosas.

Las amígdalas que se inflaman al menor golpe de aire, en los niños se vuelven muy aumentadas de tamaño.

NIÑOS DE AMÍGDALAS GRANDES CON HIPERTROFIA DE GANGLIOS Y UN POCO DE RETARDO INTELLECTUAL (Kent).

Con todo, la inflamación de amígdalas no es tan violenta como en bell. ni llega tan pronto a supuración; viene lentamente, y lenta y gradual es su evolución progresiva.

Tampoco es violenta como en hep. sulf. calc.

Hay otro medicamento que debemos tener presente cuando además de inflamación de amígdalas hay afectación del oído : cham. (Kent).

AL TRAGAR, SENSACIÓN DE CUERPO EXTRAÑO VOLUMINOSO EN LA GARGANTA; la gran hipertrofia de amígdalas puede incluso llegar a **IMPEDIR LA DEGLUCIÓN, CAMBIAR EL TIMBRE DE VOZ**, todo ello muy dolorosamente.

SENSACIÓN DE QUEMADURA, INCAPACIDAD DE TRAGAR MAS QUE LÍQUIDOS.

Irritación que provoca **ESTRANGULA MIENTO CONSTANTE, CONSTRICCIÓN ESPASMÓDICA DEGARGANTA**; contracción, constricción y espasmo.

En las afecciones de amígdalas, hay que diferenciar a bar. carb., de Calc. phosph., en casos crónicos que responden a la constitución de este remedio.

Calc. iod., que se asemeja a bar. en algunos casos de amígdalas grandes llenas de pequeñas criptas.

Conium, amígdalas grandes SIN tendencia supurativa.

Hep. sulf. calc., amígdalas grandes con sordera y sensación de espina en la garganta.

Lycop., amígdalas grandes con pequeñas ulceraciones induradas.

ESÓFAGO :

ESPASMOS AL TRAGAR, sobre todo en viejos nerviosos o envejecidos prematuramente.

El bolo alimenticio provoca espasmos cuya tos hace escupir el bocado antes de tragarlo. (graph., merc. corr.). (Kent).

ESTOMAGO :

No hay síntomas característicos; digestión débil y toda clase de desórdenes y sensaciones desagradables después de haber comido (Kent).

Agravación después de haber comido cosas calientes (Boericke).

Falta de apetito; rápida saciedad.

Sensación de escozor o quemadura en epigastrio, o sensación de peso después de haber comido, y calma de este último síntoma por los eructos.

ABDOMEN Y DEPOSICIONES :

Abdomen duro y distendido, músculos abdominales sensibles al tacto.

Cólicos, con retracción umbilical calmados por aplicaciones calientes oplegándose en dos.

Hipertrofia e induración de ganglios mesentéricos con gran vientre.

Constipación inveterada.

DEPOSICIONES DIFÍCILES, NUDOSAS; duras, insuficientes.

Falta de acción rectal (alum., graph., mag. mur., plum.).

Hemorroides salientes.

CADA VEZ QUE ORINA, las hemorroides salen del ano.

Lo mismo al evacuar.

Aparato urinario

No hay síntomas característicos.

Orina turbia, amarillenta, a veces quema al orinar y deseos urgentes relacionados con hipertrofia de próstata.

Como sabal serr., es un excelente remedio en micciones nocturnas frecuentes, sobre todo cuando la tensión arterial es elevada, lo cual no existe en sabal serr.

Órganos genitales

MASCULINOS :

Deseos disminuidos; impotencia prematura.

Pene colgante, hipertrofia de testículos, entumecimiento de órganos genitales.

Hipertrofia de próstata con deseos frecuentes e imperiosos de orinar.

Bar. cura las viejas secreciones blancuzcas, incoloras, sin inflamación.

FEMENINOS :

Esterilidad; atrofia ovárica (contrariamente a las otras glándulas) y disminución de deseos sexuales.

Reglas insuficientes; poco abundantes o de poca duración.

Leucorrea pasiva, blancuzca, espesa, persistente, a menudo copiosa, peor una semana antes de las reglas.

DISMINUCIÓN ATROFICA DE GLÁNDULAS MAMARIAS (Kent).

Respiración

ESTADO CATARRAL MARCADO; ACUMULACIÓN ABUNDANTE DE MUCUS; EN GARGANTA,

NARIZ, LARINGE, TRAQUEA, BRONQUIOS (Kent).

(Recordar que es muy sensible al frío).

En nariz, gran sensibilidad olfatoria; a veces, perversión olfatoria, consensación de oler humo de madera de pino.

Coriza con secreción espesa, amarillenta, e hinchazón de labio superior.

Estornudos sucesivos, peores de noche, causando vértigo.

En la laringe, sensibilidad con sensación penosa de haber tragado humo, o vapores de azufre, o polvo.

DEBILIDAD PARALÍTICA LARÍNGEA, RONQUERA, O PERDIDA DE VOZ, AFONÍA, TOS

SECA, SOFOCANTE, especialmente en los viejos (senega).

BRONQUIOS Y PULMONES LLENOS DE MUCOSIDAD PERO QUE NO PUEDE EXPECTORAR.

Ancianos que presentan mucosidad pectoral espesa; A CADA CAMBIO DE TEMPERATURA O DESPUÉS DE EXPOSICIÓN AL FRÍO, LA MUCOSIDAD AUMENTA.

Hay otros medicamentos con esta característica, que comparte también bar. mur.

Pero cuando se trata no de un envejecido prematuramente sino de un verdadero anciano, septuagenario u octogenario que está bien en verano pero en invierno se agrava y aumenta su catarro, habrá que recurrir a ammoniac. (Kent).

Circulación

SENSACIONES CARDIACAS DOLOROSAS, HIPERTENSIÓN, PALPITACIONES FRECUENTES (en jóvenes cloróticas y ancianos).

Las palpitaciones empeoran acostándose sobre el lado izquierdo, pensando en ellas, lo que produce ansiedad e inquietud.

También empeoran al menor ejercicio, que fatiga y produce deseos de dormir.

Palpitaciones que se acompañan de aceleración de pulso y sensaciones dolorosas retro-esternales.

HIPERTENSIÓN; contracción de arteriolas.

Bar. es un buen remedio para hipertensión simple y aneurisma de aorta.

Cuando la hipertensión se acompaña de debilidad cardíaca y arritmia, conviene recurrir a bar. mur.

Ambos son recomendados para combatir la tendencia apoplética de los ancianos, o las secuelas de un ictus.

Espalda y extremidades

Hipertrofia de ganglios cervicales.

HIPERTROFIA GANGLIONAR GENERAL, sobre todo en cuello y nuca.

Pueden afectarse los ganglios de las regiones retro-auricular y sub-maxilar parótica.

Tumores grasos en la nuca.

Debilidad en columna vertebral; dolores en sacro, entre hombros, en ganglios axilares que están hipertrofiados.

Dolores gotosos y reumáticos en articulaciones.

DEBILIDAD PARALÍTICA Y TEMBLOR CON ENTUMECIMIENTO DE PIES.

ESTADOS PARALÍTICOS SEMEJANTES A LOS QUE SOBREVIENTEN EN VIEJOS APOPLÉTICOS; Actúa paralelamente a phosph. y es excelente en viejos estados paralíticos originados por antigua hemorragia cerebral.

SUDOR FÉTIDO DE PIES; HUMEDAD FRÍA DE PIES.

Calc. ostr., silic., thuya, nitr. ac., kali carb., graph., carbo veg., lueticac. este último tiene sudor profuso de pies pero no fétido.

Dedos gordos y plantas del pie sensibles.

Piel

Erupciones en la cabeza de niños enclenques tipo bar.; eczema de cabeza con costras rezumantes.

Eczema en oídos y escroto.

También hay erupción seca de cuero cabelludo; caída de cabellos; calvicie.

PIEL MALSANA; heridas y llagas de difícil cicatrización.

Relaciones

Complementarios

Dulc., silic., psorin.

Incompatibles

Calc. carb.

En las enfermedades de los viejos en particular, tiene como complementario a antim. tart.

BELLADONNA

Atropa belladonna, o belladonna, o mora furiosa, o mora marina, es una planta herbácea de la familia de las Solanáceas (género Atropa), muy común en diversas partes del globo, especialmente en Europa.

Del punto de vista tóxico, es uno de los mayores peligros de los caminos, bosques, paseos, etc., donde crece; el mayor número de víctimas lo hace entre los niños, que fascinados por sus llamativos frutos, los ingieren y mueren envenenados.

Entre los diferentes alcaloides que encierra la planta, el principal es la atropina.

La Tintura Madre, de la que se obtienen todas las dinamizaciones, se obtiene con la planta fresca entera recogida en pleno verano, durante su floración.

Belladonna, juntamente con hyosc. y stram., forman lo que Nash llamó el TRIÓ DEL DELIRIO (o TRIÓ DE REMEDIOS DEL DELIRIO).

Acción general del medicamento

Sobre el SISTEMA NERVIOSO donde causa CONGESTIÓN ACTIVA, excitación furiosa, especial perversión de la sensibilidad, espasmos, convulsiones y dolores.

Las dosis sub-tóxicas, y con más razón, las dosis tóxicas, ejercen sobre los centros NERVIOSOS una manifiesta ACCIÓN EXCITANTE en forma de vértigos, ALUCINACIONES Y DELIRIO VIOLENTO, que puede llegar a verdaderos ACCESOS DE FUROR.

Este conjunto de síntomas se conoce bajo el nombre de "DELIRIO ATROPINICO"; no se presenta siempre con la misma modalidad sino de acuerdo a mentalidad, hábitos y profesión del individuo.

Si la dosis es mortal, al delirio suceden fenómenos paralíticos y el paciente muere estando en coma.

Bajo su influencia toda la masa encefálica parece irritada, y cada uno de sus centros nerviosos acusa esa irritación de la forma que le es propia; los efectos cerebrales más inmediatos son INSOMNIO, DELIRIO Y MANÍA FURIOSA, con gran afluencia sanguínea en esta región manifiesta por enrojecimiento facial, congestión, intolerancia por la luz,

el ruido; si la influencia tóxica es prolongada e intensa este período de excitación es generalmente seguido de un ABATIMIENTO Y COLAPSO semejantes a la consecuencia de la inflamación idiopática del cerebro.

El cuadro puede completarse con síntomas semejantes en CENTRO MOTORES, CUERPOSESTRIADOS, CEREBELO, trastornos para mantenerse de pie y para la marcha.

Se pueden constatar también otras pruebas de excitación congestiva de esos centros en la perversión de la acción muscular y que se traducen en JACTACION DE MIEMBROS Y MOVIMIENTOS COREIFORMES.

El envenenamiento de los centros sensitivos provoca congestión visual y auditiva; zumbidos de oído, ilusiones auditivas, ilusiones visuales; apariciones visibles, aterradoras, fantasmas, gigantes.

La perversión medular la veremos observando los centros a los cuales se dirigen los NEUMOGASTRICOS, el HIPOGLOSO, tales como espasmos de laringe, articulación y deglución difícil, tos espasmódica, respiración estridulosa.

La autopsia revela casi invariablemente CONSIDERABLE CONGESTIÓN CEREBRAL, que interesa por igual al CEREBELO, BULBO y MEDULA. (Dr. Hughes, en Tratado de Farmacodinamia).

Como consecuencia de su influencia sobre el sistema nervioso, actúa marcadamente sobre la circulación; "La atropina actúa sobre el corazón, como una aceleración cardíaca, paralizante de la acción moderatriz de las fibras del neumogástrico, como si éste hubiese sido seccionado". (Manquet - Tratado de Terapéutica).

ELEVACIÓN DE LA PRESIÓN SANGUÍNEA por irritación de los centros vaso-motores.

La acción de la atropina sobre los vasos provoca estrechamiento de las arteriolas; éstasis sanguíneo que comienza por los capilares, sigue por las venas y se manifiesta secundariamente en las arteriolas, de modo que todos los vasos de poco calibre están hiperemizados.

A estos fenómenos se debe el ERITEMA DE bell. y el ENROJECIMIENTO ESCARLATINIFORME causados por dosis altas de bell. (Manquet - Tratado de Terapéutica).

SOBRE LAS GLÁNDULAS Y LAS MUCOSAS la acción de bell. consiste en paralización de las secreciones (bryon).

Supresión de la secreción salival, sequedad y enrojecimiento de boca y faringe; sequedad de mucosa faríngea y laríngea, secreción urinaria disminuida, secreción láctea, pancreática y biliar.

SOBRE LA PIEL, bell. determina un ERITEMA CARACTERÍSTICO y enrojecimiento escarlatíniforme, que hace de esta droga uno de los remedios más eficaces en el tratamiento y profilaxis de la fiebre escarlatina.

Características

CONSTITUCIÓN Y TEMPERAMENTO : Actúa sobre el organismo con gran violencia; es un medicamento adecuado a PLETÓRICOS E INTELECTUALES. (Kent).

Individuos pletóricos, gordos, flemáticos, proclives a congestiones, principalmente de cabeza, como en calc. ostr., sin la palidez de este medicamento.

Gente generalmente de buen humor, pero estando enfermos se vuelven irritables y muy desagradables.

CONGESTIÓN DE CABEZA Y DELIRIO; en este aspecto bell. puede ser denominado un MEDICAMENTO PARA LA CABEZA; en la mayoría de los casos en que es indicado, predominan los síntomas de la cabeza.

LA SANGRE FLUYE A LA CABEZA, QUE ESTA CALIENTE, MIENTRAS LOS MIEMBROS ESTÁN FRÍOS; LOS OJOS SE ENROJECEN, INYECTADOS DE SANGRE; CARA TAMBIÉN ROJA CASI PÚRPURA; LAS CAROTIDAS LATEN FUERTEMENTE; EN LA CABEZA HAY UNA SENSACIÓN DOLOROSA DE PLENITUD, DE CONGESTIÓN PLETÓRICA; puede todo esto estar acompañado de MARCADO ESTUPOR. (acon., ferr. met., glonoin., sanguin., ferr. phosph.).

Hay además, MARCADO DELIRIO, que puede llegar a ser muy VIOLENTO, SALVAJE, TERRIBLE.

Imagina ver fantasmas, caras horribles y quiere huirles; rechina los dientes queriendo morder a quienes se le aproximan, tan pronto ríe como grita.

Le acosa todo tipo de violencias muy difíciles de reprimir.

Este delirio guarda proporción con la congestión cerebral, de modo que tan pronto ésta se calma lo propio sucede con el delirio.

En este aspecto bell. corre pareja con hyosc.

La diferencia consiste en que en bell.

PREDOMINA LA VIOLENCIA SOBRE EL ESTUPOR, y en hyosc. es a la inversa.

Stram. que como dijimos, forma según Nash, el trío de los medicamentos del delirio con los anteriores, tiene la particularidad de ser EXTREMADAMENTE LOCUAZ.

Puede decirse de los tres, que hyosc. es el más estúpido.

Stram. el más locuaz, y bell. un término medio entre ambos.

INFLAMACIÓN CONGESTIVA DE TODOS LOS ÓRGANOS DE UN SECTOR ORGÁNICO : En estados inflamatorios localizados, bell. es el medicamento indicado PARA EL PRIMER PERÍODO.

Sea cual fuere la región atacada, cabeza, garganta, pecho, piel, etc., si EL ATAQUE ES SÚBITO, DE EVOLUCIÓN RÁPIDA, Y LA REGIÓN ATACADA ESTA ENROJECIDA, DOLOROSA, LATENTE, es en bell. en el primer remedio que hay que pensar.

Estas inflamaciones se acompañan de : CALOR VIOLENTO, INTENSO; GRAN ENROJECIMIENTO, que aumenta al rojo oscuro a medida que la inflamación progresa; la característica de bell. es el enrojecimiento

BRILLANTE de las partes afectadas; GRAN SENSACIÓN DE QUEMADURA, TANTO OBJETIVA COMO SUBJETIVA; (acon., phosph., sulfur, apis, agaric., canthar., capsic., caustic., carbol. ac., anthrac., y tarent.). Hay también GRAN HINCHAZÓN, con extrema sensibilidad al tacto, punzadas, latidos, y dolor espontáneo como si fueran a estallar.

MUCHOS LATIDOS; en el caso que requiere bell., la parte afectada late considerablemente (Kent).

LOS SÍNTOMAS APARECEN Y DESAPARECEN BRUSCAMENTE : Todos los síntomas de bell. son súbitos, rápidos, violentos, agudos.

Los cuadros de bell. son de eclosión aguda, repentina, siguen un curso violento y ceden también súbitamente (Kent).

HIPERESTESIA : HIPERSENSIBILIDAD EXTREMA; SENSIBILIDAD LLEVADA AL MÁXIMO;

REACCIÓN VITAL AUMENTADA; IRRITABILIDAD EXTREMA DE TODA LA ECONOMÍA Y SOBRE TODO DE LOS CENTROS NERVIOSOS.

Sistema sensorial violentamente excitado.

La irritabilidad nerviosa se destaca como uno de los rasgos más importantes de bell. todo lo contrario de opium, que priva al sujeto de toda sensibilidad.

Mayor es la congestión en bell., mayor es la excitabilidad, y en opium al revés.

INTENSA EXCITABILIDAD REACTIVA; reacción muy rápida y violenta a los medicamentos (nux vom., zincum, cuprum) (Kent).

LOS DOLORES DE bell. SOBREVIENTEN BRUSCAMENTE Y DESAPARECEN EN FORMA IGUALMENTE RÁPIDA : Son dolores punzantes, ardientes, presivos, cambiantes; se agravan por la luz, y el ruido, por la más leve sacudida, por el contacto estando acostado, mientras que en la posición sentado y en reposo se calma.

Esta brusquedad en la aparición y desaparición de los dolores, nos recuerda a carbol. ac., kali bichr., magn. phosph., strychn., etc.

En cambio, en platina, stann., chamom., lycop., pallad., verat. alb., los dolores aparecen y desaparecen en forma progresiva, paulatina.

Espasmos

Una particularidad de bell. es el poder de excitar la contracción de las fibras circulares de vasos sanguíneos, esfínteres, etc.

Contracción de garganta al ingerir líquidos, constricción de esfínter anal, lo que juntamente con el tenesmo y sensación de presión en el recto, sugiere la indicación de bell. en algunos casos de disentería; constricción espasmódica de cuello uterino que retarda el parto; deseos ineficaces y frecuentes de orinar (Farrington).

Espasmos generales y locales; espasmos de colédoco y cístico reteniendo un cálculo; en algunos casos de cólico hepático, aún cuando bell. quien mejor actúa, igualmente en un cólico nefrítico.

Espasmos constrictivos, en cualquier parte del cuerpo, semejantes a constricción producida con los dedos, en matriz, hígado, garganta, cerebro; sacudidas y contracciones musculares, son grandes rasgos de bell.

Modalidades

Lateralidad

Derecha.

Agravación

a) Por el tacto, al menor contacto, el ruido, sacudidas, corrientes del aire, la luz brillante, acostado horizontalmente; la sensación de frío aparente después de haberse hecho cortar el cabello.

b) Por las bebidas.

c) A la tarde.

d) El movimiento y el ruido; "He visto mujeres con inflamación uterina, ovárica, o intestinal, abstenerse de hablar pues su voz producía un eco doloroso en la región afectada" (Kent).

Mejoría

a) Por el reposo.

b) De pie o sentado, derecho.

c) Por aplicaciones frías.

d) En habitación caliente.

Síntomas mentales

Son los propios de fiebres intensas, manía, delirio; EXCITACIÓN, VIOLENCIA; son síntomas activos, jamás PASIVOS.

El paciente se vuelve SALVAJE, PEGA, MUERDE, DESGARRA LO QUE LLEGA A SUS MANOS, hace cosas extrañas, inauditas, está en estado de gran excitación.

A veces estos síntomas mentales que sobrevienen durante la fiebre, suelen calmarse comiendo un alimento liviano (Kent).

DELIRIO DESORDENADO, FURIOSO, INSENSATO; con visiones, alucinaciones, gritos agudos, deseos de huir, de escapar.

Ve FANTASMAS, COSAS IMAGINARIAS, HORRIBLES.

TIENE PESADILLAS Y SUEÑOS ANGUSTIOSOS.

ANSIEDAD.

MIEDO.

Delirio agudo maniaco.

El paciente muerde la cuchara, ladra como un perro, tiene aversión a la luz, a los ruidos, a veces estos ataques son entrecortados por períodos de calma.

Aunque el paciente esté menos violento, sentado en su cama o acostado, igualmente desgarrar todo cuanto alcanza. En niños se nota ESTUPOR, resultante de congestión cerebral; pupilas dilatadas, cara roja, piel seca y caliente, las carótidas laten violentamente, finalmente palidece, cabeza hacia atrás por contracción de los músculos del cuello; cabeza que gira a ambos lados sobre la almohada, mirada fija, pupilas dilatadas, todo esto relacionado con MENINGITIS, CONGESTIÓN MENÍNGEA O CEREBRAL, FIEBRE ESCARLATINA, etc. (Farrington).

(Ver apís, "OTROS REMEDIOS DE LA MENINGITIS").

Sueño

SUEÑO CONGESTIVO, estado de estupor lleno de sueños agitados.

Conmociones y sobresaltos al cerrar los ojos y dormirse.

Sueños de miedo, de terror, fantásticos, hablando en voz alta y ligero, oquejándose, cantando o lanzando verdaderos gritos.

El latir de sus arterias le mantiene despierto.

Duerme con las manos bajo la cabeza. (ars., platina). (Boericke).

Cabeza

HIPERSENSIBILIDAD DE CUERO CABELLUDO, especialmente en mujeres que no pueden tolerar que les alisen los cabellos, se lo peinen o corten.

Sensación de que los cabellos están tirantes.

Dolor de cabeza o resfrío después de haberse hecho cortar los cabellos (Kent).

LOS DOLORS DE CABEZA VAN DE ARRIBA HACIA ABAJO.

El tener la cabeza al frío, descubierta o el habérsela mojado, produce dolores reumáticos en las articulaciones, particularmente en extremidades inferiores.

Por el contrario acon. o puls siente dolores después de mojarse los pies, o haberlos expuesto al frío.

Rhus tox siente dolores por haberse mojado, pero el mal se localiza en la parte mojada (Kent).

DOLORS DE CABEZA CONGESTIVOS; DOLORS LATENTES Y CALOR; sensación de plenitud, principalmente en la frente, occipital y temporales.

Dolores punzantes, en relación con congestión cerebral.

A cada latido, parece que adentro del cráneo golpearan con un martillo; sólo el reposo calma este martilleo.

SENSACIÓN DOLOROSA EXPANSIVA, COMO SI LA CABEZA SE AGRANDASE; PRESIÓN DOLOROSA DE ADENTRO HACIA AFUERA.

VÉRTIGO; cae hacia atrás y a la izquierda.

Cualquier movimiento en el lecho, girar los ojos, etc., le produce vértigo; los objetos parecen girar.

Vértigo CON LATIDOS; hunde la cabeza en la almohada y la da vuelta a uno y otro lado.

Cara

CARA ROJA, CALIENTE, HINCHADA, BRILLANTE; por el contrario A VECES PUEDE ESTAR PÁLIDA Y FRÍA.

La FISONOMÍA, con los párpados bien abiertos, ojos huraños, mirada fija, expresan, ANSIEDAD, embrutecimiento, TEMOR; frente arrugada, exoftalmía, mirada audaz y brillante; en su semblante está dibujada la amenaza, el FUROR.

Los rasgos pueden cambiar y expresar a veces ALEGRÍA (Kent).

MOVIMIENTOS CONVULSIVOS DE MÚSCULOS FACIALES, dolores violentos peores del lado derecho;

ESTADOS PARALÍTICOS A FRIGORE, aunque el remedio más indicado en tal caso es caust.

Inflamación e hinchazón de parótidas.

ERISPELA FACIAL. (lach., apis, rhus tox, euphorb.).

Ojos

CONGESTIÓN INTENSA; ESTADO INFLAMATORIO.

Afecciones oculares, neuralgias alrededor del ojo.

Inflamación de párpados y de todas las partes del globo ocular con enrojecimiento, calor, quemazón, latidos, tumefacción, lagrimeo, dolores violentos, etc., todo lo cual empeora por los ruidos y la luz.

Fotofobia intensa (Kent).

Los ojos dan al enfermo la sensación de estar hinchados y desorbitados. (Boericke).

Durante la congestión cerebral, puede sobrevenir ESTRABISMO VIOLENTO, BRUSCO.

DILATACIÓN PUPILAR; mirada fija brillante.

Dilatación palpebral. (gels).

En cambio physost. contrae la pupila.

ILUSIONES ÓPTICAS y toda clase de desórdenes en el campo visual, y descriptas bajo "Síntomas Mentales".

Los objetos le parecen doblados o invertidos, y cuando lee, los renglones le parecen cabalgar.

Oídos

Puede haber dolor, hipersensibilidad, enrojecimiento, hinchazón y todos los demás estados congestivos de bell. pero muy raramente llegan a supuración.

Aparato digestivo

BOCA :

MUCOSA MUY SECA, ROJA, BOCA SECA, CON SED INTENSA por cantidades de agua que pueden variar; a veces sólo desea humedecer su boca sin cesar.

Este síntoma es común a bell. y ars. alb.

LENGUA ROJA con papilas que le dan el aspecto de una frutilla lo cual es característico de bell.

Las papilas pueden hacer pensar en arg. nit., tereb. y ptelea.

Puede haber una RAYA ROJA EN EL MEDIO, mas ancha hacia la punta, o bien languablanca con bordes rojos, forrada de una capa blanca lechosa espesa, en enfermos cerebrales.

DEBILIDAD PARALÍTICA LINGUAL; TEMBLOR al sacarla.

Lengua hinchada, dolorosa, con TARTAMUDEO. (stram).

Odontalgias por accesos de tarde y de noche, o después de las comidas.

El contacto y el aire libre agravan estos dolores.

Abscesos en las encías.

FARINGE Y ESÓFAGO :

Garganta seca, inflamada, de un rojo brillante u oscuro, peor lado derecho.

AMÍGDALAS HINCHADAS, DEGLUCIÓN DIFÍCIL, principalmente para líquidos.

Al tragar, gran dolor en amígdalas y zonas circundantes.

Sensación de GRAN BOLA en la garganta, por tumefacción de amígdalas.

DESEOS CONSTANTES DE TRAGAR, músculos de deglución muy sensibles.

De aquí que bell. figure a la cabeza de los remedios de la AMIGDALITIS; sobrepasa a apis en valor terapéutico en este caso, ya que la inflamación de apis es superficial, y la de bell. ataca al parénquima orgánico. (Farrington).

Espasmos DE LARINGE; ESPASMOS Y SENSACIÓN DE SEQUEDAD DE LA MUCOSA DEL ESÓFAGO, que da sensación de estar contraída.

Laringe y faringe en estado espasmódico, por sequedad de mucosas y extrema sensibilidad de los nervios de la región.

La constricción espasmódica de bell. no tiene nada común con gels. ylach. (estado paralítico post-diftérico) ni con alumina (espasmo esofágico que sobreviene lenta, gradualmente, no bruscamente como en bell.) (Kent).

ESTOMAGO :

AUSENCIA DE DESEOS DE COMER; rechaza principalmente carne y leche, café y a veces ácidos, aunque desea limón, el que por otra parte, le conviene (Kent).

GRAN SED, CON VIOLENTO DESEO DE AGUA FRÍA; desea beber lo que notoleraría estando sano.

Hipo, náuseas, dolores calambroides en epigastrio después de las comidas; dolores espasmódicos, constricciones, esfuerzos para vomitar con el estómago vacío.

Dolor estomacal extendido a la espina dorsal. (Kent).

Dolores y estados inflamatorios en estómago e intestinos, ardor, distensión, sensibilidad al menor ruido, movimiento y presión (Kent).

INTESTINOS, ABDOMEN Y DEPOSICIONES :

TENSIÓN, DISTENSIÓN, e HINCHAZÓN, principalmente de COLON TRANSVERSO, que sobresale en relieve; calor, dolores violentos espasmódicos, como si el intestino estuviese oprimido por una mano; agravación por presión, tacto o contacto.

DOLORES PUNZANTES, PICANTES, ATROCES, como si la masa intestinal fuese rasguñada POR UÑAS.

PUNTOS DOLOROSOS EN ABDOMEN, COSTADO IZQUIERDO, al toser, estornudar o a la palpación.

EXTREMA SENSIBILIDAD hasta por el roce de las ropas (lach).

Dolor en región ILEO-CECAL, no pudiendo soportar presión ni tacto; en algunos casos bell. demostró ser eficaz en la APENDICITIS.

En niños CÓLICOS VIOLENTOS; DOLORES INTENSOS SOLAMENTE CALMADOS DOBLÁNDOSE

HACIA ADELANTE (colocynth).

CARA ROJA, CALIENTE.

Con la diferencia que colocynth. no tiene la fiebre de bell.

A veces el cólico de bell. SE CALMA TIRÁNDOSE HACIA ATRÁS (DROSER) (Kent).

Hemorroides muy rojas, muy inflamadas y dolorosas, no pueden ser tocadas; tan sensibles, que el paciente debe mantener las piernas separadas.

Prolapso anal. ignatia, podophyl.

Evacuaciones acuosas, líquidas, cara roja, caliente, ardiente y extremidades frías.

Muchos esfuerzos, pero la evacuación es poco importante.

Diarrea verdosa, disintérica, con tenesmo.

Aparato urinario

IRRITACIÓN DE VEJIGA Y URETRA; DESEOS URGENTES DE ORINAR, PERO LA ORINA SALE A GOTAS, QUEMANDO LA URETRA IRRITADA; esta irritación se acompaña de gran hipersensibilidad. TENESMO VESICAL DESPUÉS DE LA MICCIÓN; constricción dolorosa en cuello de vejiga.

El deseo de orinar es imperioso, violento, y aparece rápidamente.

Espasmo de cuello de vejiga por tomar frío, ansiedad o desarreglo mental (Kent).

INCONTINENCIA; orina mientras duerme, mientras tiene pesadillas osobresaltos.

LA ORINA ESCAPA GOTA A GOTA CONTINUAMENTE; emisiones involuntarias estando de pie o caminando, o simplemente al moverse.

En las mujeres, tomando frío, o estando expuestas al frío o durante un escalofrío, pérdida de orina como en dulce o caústico.

Micciones frecuentes y abundantes, y sensación como si un gusano se moviese en la vejiga.

Órganos genitales

MASCULINOS :

Según Kent, nada hay de característico en este aspecto, fuera de ausencia completa de deseo sexual y a veces secreción de líquido prostático.

Inflamación y punzadas en bolsas y testículos.

Sudores nocturnos en el escroto.

FEMENINOS :

Útero y ovarios congestionados, sensibles y dolorosos al tacto y al menor movimiento (Kent).

Después de cada regla el útero es más grande de lo normal, y la paciente sigue sintiendo la misma sensación como si continuase teniendo las reglas.

Flujo menstrual COPIOSO, ABUNDANTE, GENERALMENTE ADELANTADO.

Puede haber coágulos en la sangre, que es rojo vivo.

Pero el signo más importante es la HEMORRAGIA UTERINA; hemorragia por congestión, con espasmos y gran sensibilidad uterinos.

EL ÚTERO SE CONTRAE CON VIOLENCIA DE UNA MANERA ESPASMÓDICA (sabina).

La hemorragia se acompaña de gran fatiga y puede sobrevenir a raíz de aborto, o bien sin causa alguna.

En este trance hay gran hipersensibilidad moral y física; al tacto, a los ruidos, a la propia voz, gran excitación y extremo nerviosismo, todo ello a menudo acompañado de fiebre.

A veces la hemorragia calma la fiebre.

Bell. es útil también en la hemorragia post-parto; hemorragia con contracción del útero que adopta la forma de un reloj de arena (contraído en el medio).

En todos los estados hemorrágicos, espasmódicos, de irritación y de hipersensibilidad uterina; hipertrofia, en que el útero da la impresión de querer salir de la vulva. (sepia, lil. tig., mosch., murex).

En la falta de dilatación en parturientas casadas tarde, por espasmos del músculo uterino (Kent).

INFLAMACIÓN DE SENOS; coloración roja, rastros rojos de linfangitis irradiando del pezón, calor, dolores latentes, punzantes, hipersensibilidad; FIEBRE LÁCTEA. (bryon., apis, phellandr.).

Respiración

NARIZ :

SEQUEDAD DE LA MUCOSA, que está roja e inflamada.

Coriza con mucosidad mezclada con sangre.

Epistaxis con enrojecimiento congestivo de la cara.

LARINGE, BRONQUIOS, PULMONES :

SEQUEDAD DE LARINGE Y TRAQUEA.

Gran sensación de sequedad e inflamación; RONQUERA; afonía; INFLAMACIÓN LARÍNGEA CON ESTRECHEZ ESPASMÓDICA Y AHOGOS.

Laringe muy dolorosa con sensación de cuerpo extraño que provoca tos.

TOS LARÍNGEA, SECA, BREVE, COSQUILLANTE, peor de noche.

Tos coqueluchoide con dolores de estómago y expectoración sanguínea.

PUNTOS DOLOROSOS EN EL PECHO AL TOSER. (bryon., phosph., hep. sulf. calc.).

RESPIRACIÓN DIFÍCIL (oprimida), rápida, desigual.

Expiración entrecortada, ardiente y prolongada.

Circulación

Palpitaciones violentas que repercuten hasta la cabeza.

LATIDO DE LAS ARTERIAS DE TODO EL ORGANISMO, PARTICULARMENTE LAS CAROTIDAS.

Pulso duro, lleno, acelerado.

Venas muy dilatadas, pletóricas de sangre.

Flebitis inflamatoria. (apis, ars., hamam., lach., puls.).

Dorso y extremidades

Dolor en la nuca como si fuera a romperse.

Rigidez de nuca.

Presión dolorosa en la región dorsal.

Dolor y rigidez muscular en la espalda, agravados estando sentado o acostado, mejorados caminando lentamente.

Lumbago con dolores en caderas y muslos.

Dolores a lo largo de los miembros; marcha tambaleante, sacudidas, espasmos, convulsiones.

Dolores reumáticos cambiantes.

Articulaciones rojas, hinchadas, con irradiaciones rojas.

Dolores desgarrantes de ciática, agudos en crisis violentas, bruscas, delatardecer hasta medianoche.

Excesiva hipersensibilidad al frío, aún a la corriente producida por simple movimiento, hasta el de las ropas.

Piel

ABSCEOS Y FORÚNCULOS; enrojecimiento, doloración, sensibilidad y evolución supurativa. Hep. sulf. calc., merc., sílicea.

Eritema ESCARLATA ROJO VIVO, CON PIEL LISA, que recuerda el RASH ESCARLATINIFORME; diferencia con apís en que la congestión de este último es rugosa.

ESTADO ERISPELOSO DE LA PIEL, brillante, con hinchazón rápida, infiltración del tejido celular subyacente, tendencia marcada a supuración, con la irritación característica del medicamento, que no debe, por otra parte, confundirse con la metástasis cerebral posible de la enfermedad (Farrington).

Fiebre

Escalofrío inicial con frío general en el organismo y palidez facial, seguido de calor intenso, ardiente, con cara roja, vultuosa, latidos temporales, carótidas, pulso frecuente, duro, transpiración caliente, general, pero más marcada en la cara.

Fiebre sin sed.

Relaciones

Complementarios

Calc. ostr., que es también el crónico de bell.

Incompatible

Acet. ac.

Antídotos

Camph., coffea, opium, acon.

BENZOIC ACIDUM

Benzoic acidum o ácido benzoico, existe naturalmente en la mirra, en el Bálsamo del Perú, en muchos vegetales (clavo de olor, vainilla, canela, anís verde, anís estrellado, etc.).

Existen tres variedades : una, ácida, extraída por sublimación : el benjuí; contiene glaiacol, pirocatequina, aldehído benzoico - ácido extraído de la orina de los herbívoros desdoblando el ácido hipúrico que contiene - un ácido obtenido oxidando el tolueno clorado.

Las tres primeras dinamizaciones del remedio homeopático se preparan por trituración hahnemanniana; las más elevadas, por diluciones hahnemannianas sucesivas.

Acción general del medicamento

Benz. ac. no ha sido experimentado lo suficiente como para conocerle en todos sus detalles; sin embargo, lo que de él conocemos, permite decir que los síntomas más notables producidos por dosis bajas son gran irritabilidad de la vejiga, dolores reumáticos fugaces en las articulaciones y finalmente, accesos periódicos de palpitaciones cardíacas y pulsaciones en las arterias temporales que impiden el sueño, hacia las 2 de la mañana.

Administrado en dosis más altas, provoca emisión de ORINA MUY COLOREADA Y CONOLOR FUERTE que parece depender de la presencia de cierta cantidad de ÁCIDO HIPURICO.

Los dolores y este olor tienen gran importancia y constituyen síntomas-llave para la acción del remedio.

Características

CONSTITUCIÓN Y TEMPERAMENTO : "Benz. ac. responde particularmente a constituciones gotosas, a diatesis urémica, a constitución litiasica.

Tales sujetos tienen funciones renales irregulares, pues su orina es, a veces, poco abundante; están sujetos a ataques de reumatismo poco frecuentes y benignos que desaparecen en cuanto orinan abundantemente con descarga de depósitos uráticos y recomienzan ni bien la orina escasea y tiene un peso específico menos elevado.

La orina tiene a veces un olor tan fuerte a ácido hipúrico que se dice que tiene el violento olor amoniacal propio de la orina de caballo.

Los malestares de benz. ac. son variables : cuando la orina es abundante y deja abundante depósito de uratos en el recipiente, el individuo se siente bien : pero si la cantidad disminuye y el peso específico es inferior al normal, padece de los riñones o en las articulaciones; sus dolores no son influenciados por el cambio de tiempo; es sensible

al aire, a corrientes de aire, pero en cuanto vuelve a orinar abundantemente, eliminando mucho ácido úrico, volverá a sentirse bien" (Kent).

ORINA POCO ABUNDANTE, DE COLOR MARRÓN OSCURO, PERO, SOBRE TODO, CONFUERTE OLOR AMONIAL QUE PERSISTE DESPUÉS DE LA MICCIÓN Y APESTA la habitación.

Se puede encontrar este olor característico en la orina en reumatismo, angina, diarrea, hidropesía, jaqueca etc.; su presencia indica benz. ac., (nitri. ac.).

Modalidades

Agravación

Al aire libre, al desvestirse.

Síntomas mentales

Tendencia a pensar en cosas desagradables; si ha visto a alguien que padece alguna deformidad, piensa con frecuencia en ello y esto le produce escalofríos.

Sueño

Sueño profundo, alternando con períodos de insomnio prolongados.

Durante el período de insomnio, piensa durante la noche en todas las cosas desagradables que puede encontrar.

Este estado puede alternar con noches de sueño pesado, embrutecedor, y estovaría según la eliminación de orina.

Cabeza

Transpiración fría en la cabeza, sobre todo en la frente.

Latidos violentos en la zona de las arterias temporales.

Muchos dolores de cabeza de naturaleza urémica y muy variables en cuanto a zona y forma.

Dolores terribles en occipucio y cerebro.

Dolores reumáticos en la cabeza; dolores sordos en el occipucio, a la noche después de cambio de tiempo; dolores en la base del cerebro, después de dolores articulares, al mismo tiempo que la cantidad de orina disminuye.

Cada vez que toma un poco de frío la cantidad de orina disminuye y tiene dolores de cabeza sordos, sobre todo en la zona del occipucio (Kent).

Dolor de cabeza después de haber estado expuesto a una corriente de aire, después de haberse descubierto la cabeza; por la mañana, al despertar; agravado por el descanso; en crisis periódicas y acompañado de dolores de estómago, náuseas y sensación de frío en las manos.

Vértigo principalmente a la tarde, como si fuera a caerse de costado.

Sensación de plenitud en el vértex que desciende a lo largo de la columna vertebral, sin dolor, pero acompañada de ansiedad.

Aparato digestivo

BOCA :

Ulceraciones en la lengua con superficies profundamente agrietadas o fungosas, metástasis característica : "Los dolores reumáticos articulares cesan súbitamente después de haber tomado frío, o por el mal tiempo, y sobreviene hinchazón de la lengua que se inflama" (Kent).

Este estado se encuentra también en merc. (Kent).

FARINGE :

Aquí, el estado parecido al de la boca : "Un gotoso en el que súbitamente disminuye mucho la cantidad de orina que sube de color y toma un olor violento, comparable al de la orina de caballo (nitri. ac.) verá aparecer una inflamación aguda con hinchazón de amígdalas y faringe" (Kent).

ESTOMAGO :

Transpira al comer.

Sensación de presión en el estómago y eructos; sensación de peso en el hueco del estómago.

Náuseas; náuseas con esfuerzos para escupir.

Vómitos de materia salada, agria.

He aquí un ejemplo de la metástasis frecuente en el remedio : Un individuo va y viene con más o menos dolores reumáticos en las articulaciones; de repente toma frío y sus dolores desaparecen, pero al día siguiente aparece una violenta inflamación, no en la lengua o en faringe, sino de estómago; vomita todo lo que come; se dice que "La gota se trasladó al estómago".

Entonces, habrá que pensar en benz. ac., en ant. crud., o en sang.

ABDOMEN Y DEPOSICIONES :

Hay muchos trastornos en la zona hepática; dolores constantes, agudos, violentos, en la región del hígado; obstrucción hepática.

Punzadas, cólicos en la región umbilical, aliviados al defecar.

Dolores y sensación de constricción en el recto.

Prurito anal; pequeños bultos varicosos en el ano.

Deposiciones espumosas, líquidas, muy fétidas, claras, COMO AGUA JABONOSA.

La deposición blanca como agua jabonosa es un síntoma tan característico que será curado por el remedio aunque está ausente la constitución gotosa.

Aparato urinario

Catarró vesical como consecuencia de gonorrea mal curada.

ORINA POCO ABUNDANTE, DE COLOR MARRÓN OSCURO, PERO SOBRE TODO CON **"OLOR AMONIAL" EXCESIVAMENTE MARCADO, QUE PERSISTE DESPUÉS DE LA MICCIÓN Y APESTA AL ENFERMO Y A SU HABITACIÓN (nitr. ac., berb. vulg., sepia, calc. ostr.).**

"Benz. ac. y berb. v. son dos grandes remedios de los trastornos artríticos con síntomas urinarios; lycop. y lithium pueden también ser útiles en estos casos.

Benz. ac. ha aliviado en casos de cólicos nefríticos en que la orina tenía el olor característico del remedio.

Ha sido también eficaz para casos de secreción de orina gota a gota en viejos con próstata agrandada.

En estos casos el olor de la orina que impregna las ropas apesta todo el cuarto.

También alivia las reglas difíciles y el prolapso uterino cuando existen los síntomas urinarios característicos del remedio.

También alivia trastornos cardíacos de origen reumático, siempre que exista el olor característico en la orina.

Tenemos una larga lista de síntomas y afecciones diversas que indican a benz. ac., siempre que estén unidos a un solo síntoma característico : EL OLORE FUERTEMENTE MARCADO DE LA ORINA". (Nash).

Órganos genitales

Prolapso uterino con orina con fuerte olor amoniacal.

Reglas demasiado precoces o atrasadas.

Amenorrea.

Aparato respiratorio

NARIZ :

Perversión del olfato.

Olfato muy disminuido.

Dolores en los huesos de la nariz.

Comezón en la zona del septum.

BRONQUIOS Y PULMONES :

Asma con síntomas reumáticos inflamatorios.

Pecho dolorido.

Tos asmática, peor de noche o al acostarse sobre el lado derecho, seguida de expectoración de moco verdoso.

Aparato circulatorio

Dolores en la región cardíaca.

PALPITACIONES CARDÍACAS NOCTURNAS : despierta todas las mañanas, hacia las 2, presa de gran calor interno y violentas palpitaciones que lo obligan a acostarse de espaldas y con latidos en la zona de las arterias temporales que le provocan zumbidos de oídos que le impiden volverse a dormir.

Cuando los dolores reumáticos articulares reaparecen, el corazón se alivia.

Espalda y extremidades

Sensación de presión en la columna vertebral.

Sensación dolorosa después de haber tomado frío, en la zona del sacro.

Sensación dolorosa de plenitud en la zona renal, agravada por beber vino.

Crujidos en las articulaciones al moverse.

Reumatismo gotoso.

Concreciones gotosas, tofos; "juanetes" y dolores agudos en el dedo grande del pie.

Dolor en el tendón de Aquiles (act. rac., muriat. ac., ruta).

Piel

Sudor abundante pero sin alivio.

Debilidad extrema; sudor y estado comatoso.

Sudor abundante, agotador, y sueño profundo, pero sin alivio posible (Kent).

Relaciones

Benz. ac. es útil en la gota, después de colch. cuando éste no actúa ya; lo mismo en la gonorrea, después de copaiva.

Es incompatible con el vino.

BERBERIS VULGARIS

Berberis vulgaris, o espinillo, o espinillo, pertenece a la familia de las Berberidáceas; crece en toda Europa, partes de Asia y de América del Norte.

Es una zarza frondosa y espinosa.

Florece en verano con hermosas flores amarillas perfumadas, dispuestas en racimos colgantes; sus bayas maduras hacia fin del verano, son óvalo-oblongas y de un hermoso color rojo.

La tintura madre se prepara por maceración en alcohol de las raíces de mediano grosor y la corteza de las raíces mayores.

Acción general

Principalmente sobre RIÑONES Y VEJIGA; algo menos sobre EL HÍGADO, y menos aún sobre LAS MUCOSAS. También alcanza las fuerzas vitales, como se ve por la consunción facial y la excesiva postración que causa. (Farrington).

Características

CONSTITUCIÓN Y TEMPERAMENTO : Actúa en individuos "entrados en carnes", de buena salud aparente, pero poco resistentes.

Seres con estados reumáticos o gotosos crónicos acompañados de trastornos hepáticos o renales más o menos acentuados, determinando frecuentes crisis de dolores picantes y erráticos característicos.

DOLORES PICANTES, ARDIENTES, DESGARRANTES, PUNZANTES; Los dolores de berberis tienen dos características esenciales : ERRÁTICOS, ocupan una zona limitada pero no son fijos, cambian de lugar;

IRRADIANTES, de la zona donde está el dolor localizado parten irradiaciones dolorosas hasta lugares a veces alejados, también cambiantes.

Estos dolores se agravan por el movimiento, la marcha y las sacudidas aunque el paciente no puede estar quieto debiendo cambiar sin cesar de posición.

DOLOR DE MAGULLADURA CON RIGIDEZ E IMPOTENCIA POR RIÑONES CAÍDOS, SELEVANTA DEL LUGAR DONDE ESTÁ SENTADO, CON DIFICULTAD, SENSACIÓN DE ENTUMECIMIENTO, RIGIDEZ Y DOLORES A LA PALPACIÓN EN REGIONES LUMBAR Y RENAL.

DOLOR EN LOS RIÑONES ESTANDO ACOSTADO, POR LA MAÑANA.

Todo esto está relacionado con trastornos reno-urinarios o bajo dependencia.

(Rhus tox; síntomas semejantes pero puramente reumáticos).

Dolores irradiados a lo largo de los uréteres, a la vejiga; la orina contiene sedimento coposo o arenoso, o aún hematurico.

Toda vez que las afecciones reumáticas *y o* artríticas tienen relación con trastornos urinarios, hay que pensar en berb.

Juntamente con éstos dolores lumbares hay sensación de debilidad dorsal; cara pálida, terrosa, pómulos y ojos hundidos con grandes ojeras azules.

Poco importa el nombre de la enfermedad; si el paciente tiene este cuadro hay que pensar en berb. (Nash).

Modalidades

Agravación

Por el movimiento, la marcha, yendo en vehículo, movimiento o sacudón bruscos, o por dar un paso en falso.

Síntomas mentales

Siendo poco marcados, tienen poca importancia.

Indiferencia, apatía, abatimiento, postración; debilidad mental más o menos acentuada; debilidad de memoria, y dificultad para ordenar sus recuerdos.

Alucinaciones particulares : a la hora del crepúsculo; los objetos le parecen más grandes; el paciente se inquieta, sobre todo el niño; ansiedad crepuscular con visión terrífica de animales y monstruos.

Cabeza

Se lleva la mano a la cabeza; le parece tener un casco o sombrero ajustado en el cráneo.

Dolores desgarrantes en frente, temporales, cabeza u otra parte del cuerpo.

Sensación como si la cabeza fuese más grande. (act. rac., bovista).

Ojos

Generalmente hay ojeras; ojos inflamados; dolores ardientes con sensación de sequedad y como si tuviese arena en los párpados.

Oídos

Puede haber dolores picantes y desgarrantes, irradiados en todas direcciones, y debidos en la mayoría de los casos a pequeñas concreciones gotosas.

Cara

Tipo anémico, fatigado; el individuo de berb. parece desgastado prematuramente; expresión enfermiza, envejecida y arrugada; color terroso, rasgos marcados, ojos con grandes ojeras oscuras, y la fisonomía demuestra una depresión generalmente profunda.

Aparato digestivo

BOCA :

ENROJECIMIENTO LÍVIDO DEL LABIO SUPERIOR, CARA INTERNA CON MANCHAS ROJAS O AZULADAS CERCA DE LAS COMISURAS.

Boca seca, saliva muy disminuida, espesa, espumosa, aspecto de algodón. (nux mosch.).

ESTÓMAGO :

Puede haber buen apetito, o falta de él, alternativamente; mala digestión, eructos y vómitos agrios; los trastornos digestivos que se observan son generalmente debidos a mal funcionamiento hepático.

ABDOMEN :

Dolores punzantes bajo las costillas falsas, a la derecha en región vesicular, o en lóbulo hepático izquierdo, bajo las costillas falsas izquierdas; estos dolores son agudos, penetrantes, vienen bruscamente y se intensifican inmediatamente; irradian hacia el estómago, abdomen, y obligan al paciente a plegarse en dos; se agravan por la presión y el movimiento, acompañados de subictericia o ictericia, con constipación más o menos marcada; hay deseos frecuentes con deposiciones descoloridas.

ANO Y DEPOSICIONES :

LAS EVACUACIONES SE ACOMPAÑAN de violenta quemadura en el ano y dolores en zonas circundantes; deseos frecuentes o constantes de evacuar; diarrea indolora, amarillenta, el paciente sufre del hígado que es sensible a la presión.

Dolores picantes y ardientes en el ano antes, durante y luego de la evacuación.

Hemorroides con sensación de quemadura principalmente después de la evacuación. (sulfur).

Dolores como si hubiese una llaga, un peso doloroso; esta sensación ha sugerido el empleo de berb. en la fístula anal.

Aparato urinario

La acción de berb. es en esta región sumamente importante.

DOLORES PICANTES, TIRANTES, TORTURANTES, PEORES POR LA PRESIÓN PROFUNDA.

Localizados en los propios riñones, irradian a lo largo de espalda y región lumbar, siguiendo la trayectoria de los uréteres.

Hay también DOLOR PRESIVO, TENSIVO, en la región dorsal inferior, que parecerá rígida y entumecida.

Otro síntoma particular es una sensación de goteo, de chorreo, en la región renal como si brotara agua a través de la piel.

CÓLICOS NEFRÍTICOS, dolores agudos, picantes, cortantes, irradiados del riñón a la vejiga, principalmente lado izquierdo; el CÓLICO RENAL IZQUIERDO es característico de berb., así como el derecho lo es de lycop.

En la vejiga, dolores también cortantes, picantes con violento deseo de orinar; estos dolores irradian hacia espalda, caderas y muslos.

Puede haber dolores uretrales aún después de haber orinado; si predomina el TENESMO DOLOROSO, es un síntoma de canth.

ORINA VARIABLE; puede aumentar o disminuir; micciones abundantes y frecuentes, como pequeñas y escasas; puede ser turbia, con mucosidad espesa y abundante sedimento color ladrillo; la orina puede ser también pálida o amarillenta, con depósito gelatinoso transparente; a veces deja depositar mucus espeso mezclado con sedimento blancuzco semejante a tiza o creta.

Por último, la orina puede ser de color rojo ladrillo.

Órganos genitales

MASCULINOS :

DOLORES PROVOCADOS por fenómenos urinarios.

Dolores ardientes a lo largo de la uretra durante la micción; irradiación dolorosa a lo largo de cordón espermático y testículos. (puls., clem. er.); dolores ardientes, picantes, agudos en testículos, ya a la derecha, ya a la izquierda, con punzadas a veces localizadas en epidídimo. (senecio).

FEMENINOS :

Reglas dolorosas acompañadas de dolores picantes y ardientes en región anal, provocados por trastornos urinarios propios del remedio.

Dolores que se extienden a las partes externas, vulva, labios, irradiados a los riñones o a lo largo de los muslos.

Leucorrea con dolores vaginales y vaginismo.

Espalda y extremidades

ENTUMECIMIENTO, FATIGA, RIGIDEZ Y DEBILIDAD CON SENSACIÓN DE PRESIÓN DOLOROSA EN REGIÓN RENAL Y LUMBAR.

Dolores con sensación de magulladura en parte baja dorsal y región renal que es muy sensible al tacto.

Hay dolor al sentarse, acostarse e inclusive al levantarse; se agravan por la fatiga y por el simple movimiento, tales como una sacudida, un paso en falso y hasta una respiración profunda.

Estos dolores irradian a vientre y vejiga, ingles, caderas, nalgas, muslos, con sensación de rigidez, entumecimiento, "rotura".

LUMBAGO CON IRRADIACIONES DOLOROSAS EN MIEMBROS INFERIORES.

Este lumbago se acompaña de trastornos urinarios que no encontramos ni en rhus tox ni en los demás medicamentos del lumbago reumatoideo ordinario.

Dolores erráticos en extremidades, que se desplazan rápidamente de uno a otro punto con irradiaciones muy distantes.

Las articulaciones pueden haber aumentado de volumen y estar muy sensibles.

Los dolores articulares son más intensos en la zona de inserción muscular que en la zona articular propiamente dicha.

Neuralgias dolorosas bajo las uñas.

Dolores en talón como si estuviese ulcerado.

Sensación de frío en cara externa de muslo.

Piel

COMEZONES sin modificación del tegumento.

ECZEMA con prurito ardiente, agravado rascándose y calmado por aplicaciones frías se localiza particularmente en cara dorsal de las manos o en el periné; una vez curado, persiste durante algún tiempo una zona roja circular, mientras que el centro aparece color natural (en sepiá hay un herpes con esta característica, durante toda la evolución de la enfermedad, mientras que la de berb. aparece al final.).

Relaciones

Antídotos

Bell., camphora.

BORAX

Borax, o bi-borato de sosa, es una sal alcalina que se presenta bajo la forma de grandes cristales, prismáticos romboidales, oblicuos, ligeramente opacos, que se disipan al aire, son solubles en agua y glicerina, pero insolubles en alcohol.

En estado natural se lo encuentra en Persia, y en el TÍBET de donde se lo hacía venir antiguamente bajo el nombre de Tinkal.

Se lo puede preparar artificialmente haciendo actuar sobre ácido bórico, carbonato de sosa, obteniéndose así el bi-borato de sosa por saturación.

Acción general del medicamento

SOBRE LAS MUCOSAS, A LAS QUE IRRITA Y ULCERA, principalmente la MUCOSA BUCAL en la que produce AFTAS CARACTERÍSTICAS.

Según Nash, el cuadro de borax es el siguiente; "Las pestañas se aglutinan y sepegan para luego volverse hacia adentro; los oídos supuran, se forman costras secas en la nariz que si se sacan vuelven a formarse; hay tos, con expectoración ofensiva de gusto herbáceo; diarrea continua día y noche, verdosa, y en la boca las AFTAS CARACTERÍSTICAS.

El niño grita antes y durante la micción, pudiendo haber arenilla roja en la orina, como en lycop. o sarsap.; leucorrea blanca albuminosa que endurece la ropa, muy profusa, que da la sensación de que chorrea agua caliente por los muslos.

Borax también actúa sobre la piel, que supura por la menor causa, pudiendo haber erupciones eczematosas.

En el CUADRO MENTAL, los síntomas son también de un valor extraordinario para la elección del remedio.

Características

CONSTITUCIÓN Y TEMPERAMENTO : Individuos de cabellos rubios, músculos flojos, piel flácida y arrugada. Parecen ansiosos, deprimidos : cara pálida y terrosa, ojos inflamados con quemosis y triquiasis; nariz roja y brillante en su extremo; fosas nasales ulceradas y labios hinchados.

TEMOR DE INCLINARSE HACIA ADELANTE, Y DE CAER AL BAJAR UNA ESCALERA, (gels. y sanicula).

El niño grita y se aferra a la nodriza cuando ésta trata de acostarlo, cuando baja una escalera con él en brazos.

El adulto no puede balancearse en una "rocking-chair", bajar una escalera o ir al mar, pues teme los movimientos en descenso.

DOLORES PICANTES, AGUDOS, PUNZANTES, y también quemantes.

AGRAVADOS POR EL TIEMPO HÚMEDO Y FRÍO Y CALMADOS POR LA PRESIÓN FUERTE, como en bryon., con los que también tiene en común la AGRAVACIÓN POR EL MOVIMIENTO.

Modalidades

Agravación

POR EL MOVIMIENTO DE INCLINACIÓN HACIA ADELANTE, por el ruido, el tiempo húmedo y frío, el tiempo muy caluroso; el movimiento.

Mejoría

Por la presión fuerte, al atardecer, y por el tiempo seco y fresco.

Síntomas mentales

EXCESIVAMENTE NERVIOSO, AGITADO; no puede concentrarse, sobre todo por la tarde; cambia de que hacer a cada instante; va de una habitación a otra, su humor cambiante se traduce en alternativas de llanto y risa (puls); esta INESTABILIDAD está caracterizada por gran IRRITABILIDAD.

Es extremadamente sensible al ruido, sobre todo al RUIDO QUE APARECE BRUSCAMENTE DE MANERA AGUDA; un grito, estornudo, el ruido de las hojas de diario, una detonación lejana, asustan al paciente de borax, lo sobresaltan, le producen palpitaciones, y un malestar que persiste largo tiempo.

Suele darse en estos casos bell. u otros remedios, si bien el mejor indicado es borax.

(Hipersensibilidad que se manifiesta también en asarum, natr. mur. y nux vom.).

El rasguño de madera, tela o papel le causa estremecimientos. (therid., zinc. met.).

ANSIEDAD que llega al máximo a las 23, momento en que comienza bruscamente a calmarse.

A esta hora generalmente hay gritos, sopor, vértigos, temores de alguna enfermedad contagiosa.

Ya mencionamos el TEMOR A INCLINARSE HACIA ADELANTE, como signoparticular de borax, por temor de caer.

Además de los síntomas ya apuntados, el adulto no puede ir a caballo ni embarco.

Ya dijimos también que este síntoma sólo lo tienen además de borax, sanic. ygels., si bien en estos tiene importancia secundaria.

Sueño

Por la noche, deseos de dormirse mucho antes de la hora habitual, y por la mañana el sueño es muy prolongado.

EL NIÑO DUERME TRANQUILO, PERO DESPIERTA DE REPENTE GRITANDO Y ASIÉNDOSEAL BORDE DE LA CUNA, EN SEÑAL DE TEMOR.

Podrá pensarse en apis, bell., china o stram. pero si en la boca hay aftas, nocabe duda que hay que recurrir a borax. (Nash).

Cabeza

Los cabellos se vuelven sucios y enredados.

Cefalea aguda, sobre todo frontal.

Más marcada a las 10 de la mañana con náuseas y temblores en todo el cuerpo.

Punzadas, sobre todo encima de los ojos y en los temporales.

Vértigos con sensación de plenitud, pesadez y ansiedad especialmente aldescender por una escalera, mejoría caminando al aire libre.

Ojos

Inflamados, sobre todo en ángulos de los párpados que tienen excoriaciones en los bordes y aparecen aglutinados por la mañana; triquiasis, entropión.

Oídos

Puntadas, secreción purulenta con dolores punzantes; otitis crónica.

Dolores agudos y punzantes en oído izquierdo al despertar por la mañana o allavarse con agua fría.

Obstrucción de trompas de Eustaquio y sordera.

Cara

Pálida, terrosa, principalmente en el niño; expresión ansiosa, de temor.

Mejillas hinchadas cubiertas de granos, sobre todo alrededor de nariz y labios.

Estos presentan movimientos (fibrilaciones) más acentuadas en los extremos de laboca.

Por último, se ha notado SENSACIÓN DE TENER UNA TELARAÑA SOBRE LA CARA,COSTADO DERECHO SOLAMENTE (bar., carb., alum., bromium, y graph.).

Aparato digestivo

BOCA :

Labios hinchados, particularmente el inferior.

BOCA SECA, CALIENTE, sed.

GUSTO AMARGO o a moho.

Lengua resquebrajada y sangrante.

Encías hinchadas que sangran fácilmente.

Salivación abundante, sobre todo en la dentición.

AFTAS EN LA BOCA, SOBRE LA LENGUA Y CARAS INTERNAS DE LAS MEJILLAS;vesículas rojas, como si la mucosa estuviese quemada; mucho dolor al menor contacto de la lengua o alimentos, máxime si es ácido o salado.

En el lactante, mucosa del paladar arrugada, con pequeñas erosiones, caliente,seca y sangra fácilmente; TAN PRONTO INTENTA MAMAR GRITA DE DOLOR, Y RECHAZA EL PECHO.

En el adulto, las aftas tienen idénticas características y además el gusto esamargo.

(Merc., tiene ulceraciones planas con salivación excesiva, viscosa, hilosa;nitr. ac., signos iguales pero más marcados : los dolores son agudos como provocados por un objeto que pincha; las ulceraciones son profundas, de bordes irregulares y sangran fácilmente, lo mismo las encías; saliva ácida, aliento fétido, comisuras bucales excoriadas; sulf. ac., las aftas tienen exudación sanguinolenta, icorosa y fétida; constituyen sólo un signo accesorio pues el estado general es grave, depresión profunda, temblores, púrpura hemorrágica y tendencia gangrenosa. Bapt. aftas con la putridez característica del remedio; boca, lengua y faringerojo oscuro y las ulceraciones que invaden toda la mucosa impiden la deglución; a menudo, estas manifestaciones bucales se acompañan de un estado tifoideo con diarrea y postración.

La tendencia gangrenosa de las aftas se afirma con ars. alb., cuyas ulceracionesaftosas toman un tinte azulado, lívido, sangran muy fácilmente y tienen dolores ardientes con sed intensa.

Las aftas que son secundarias, sobrevienen durante el curso de enfermedadesagudas o crónicas de evolución maligna.

Kali chlor., con aftas y toda la mucosa roja, abundante secreción se salivaácida y lengua hinchada.

En el estómago hay pocos trastornos.

Deseos de bebidas ácidas y apetito disminuido.

Después de comer, hinchazón epigástrica con sensación de presión.

Puede haber náuseas con vómitos de mucosidades ácidas.

Esto puede sobrevenir después de un trabajo mental, de oír un ruido repentino, o de un balanceo, lo que relaciona a borax con cocculus para curar el mareo de mar.

Hinchazón abdominal con cólicos y borborismos.

Diarrea frecuente, blanda, amarillo clara, espumosa, con disuria y rápido adelgazamiento.

Aparato urinario

Escozor en la uretra durante y después de orinar, y al toser, fuera del momento de la micción.

El niño grita antes de la micción pues ya sabe que será dolorosa, grita mientras orina; el paso de la orina produce escozor doloroso en la uretra, después de orinar, el meato urinario queda doloroso y sensible.

Órganos genitales

En el hombre, ausencia de deseo sexual.

De mañana al despertar, erecciones con sensación de tensión dolorosa del pene.

En la mujer, sensación de hinchazón del clitoris con dolores picantes.

REGLAS ADELANTADAS, ABUNDANTES Y DOLOROSAS.

Dolores picantes calambroides antes y sobre todo durante la secreción, extendidos a estómago y sacro, acompañados de NAUSEAS.

Juntamente con ars. alb., bromium, magn. phosph., sulphur, y viburnum, borax es un gran remedio de la DISMENORREA MEMBRANOSA.

Leucorrea espesa, como almidón, abundante, caliente, muy ácida, que da sensación de que chorrea agua caliente entre las piernas, que impide la fecundación.

Borax es útil en algunos casos de esterilidad.

La leche es muy espesa, de mal gusto y mal olor, por lo que el lactante quiere tomar el pecho.

Borax mejora estos síntomas, sobre todo si la paciente presenta los signos mentales del remedio : excesiva nerviosidad, susto por el menor ruido, vértigo y malestares al bajar por una escalera o al inclinarse hacia adelante.

Dolores en el seno opuesto al que es chupado, durante el amamantamiento.

Respiración

Nariz roja y brillante, particularmente en su extremidad (canth., merc., oxal. ac., phosph., etc.).

Abundante rinorrea blancuzca o amarillo-verdosa.

Obstrucción de fosa nasal derecha primero, luego izquierda, con constante necesidad de sonarse.

Costras secas en la nariz que obligan al niño a rascarse; en arum triph. se acompañan de secreción sanguínea, y en cina, de prurito anal y helmintiasis.

BRONQUIOS Y PULMONES : Tos seca causada por cosquilleo de garganta; tos violenta, desgarrante, con expectoración mucosa de olor y gusto a moho; acompañado de dolor agudo en el pecho, principalmente del lado derecho en el pecho, principalmente del lado derecho.

PUNZADAS Y DOLORES PICANTES EN EL PECHO, SOBRE TODO LADO DERECHO, AL RESPIRAR HONDO Y AL TOSER.

PUNZADAS Y TIRONES EN MÚSCULOS INTESTINALES LADO DERECHO, AGRAVADOS POR EL MENOR MOVIMIENTO PECTORAL O DE BRAZOS, CON IMPOSIBILIDAD DE YACER ACOSTADO DEL LADO AFECTADO.

Mejoran por aplicaciones frías o presión fuerte como en bryon.

Esta sintomatología nos recuerda a ars. alb., calc. ostr. carduus, chelid. maj., elaps., illicum, kali carb., merc., phelland, etc., y sólo el estudio del conjunto de síntomas nos permitirá elegir entre ellos.

Piel

Piel malsana; LA MENOR LLAGA TIENDE A SUPURAR; (graph., hep. sulf. calc., merc., petrol).

Erupciones herpéticas o erisipelatosas, granos blancuzcos con aureola roja.

Inflamación similar a la causada por un sabañón, que mejora al aire libre.

Relaciones

Incompatibles

Ácido acético, VINAGRE y VINO.

Antídotos

Chamom., coffea.

BROMIUM

El bromo, descubierto por el químico Balard en 1826 en las aguas pantanosas de las Salinas, es un metaloide que tiene aspecto de líquido rojo-marrón, muy volátil, de olor desagradable y penetrante y sabor repugnante.

Se disuelve difícilmente en agua; es muy soluble en alcohol.

Se lo encuentra bajo la forma de bromuros metálicos en el agua del mar y en vertientes saladas.

Todas las dinamizaciones se obtienen por diluciones hahnemannianas sucesivas, partiendo del metaloide disuelto en alcohol.

Acción general del medicamento

Bromium actúa grandemente sobre las MUCOSAS, a las que irrita produciendo violenta inflamación, "crudeza", excoriaciones, pero sobre todo pseudo-membranas; especialmente mucosas del árbol respiratorio, y, en primera línea en laringe y tráquea.

Responde especialmente a INFLAMACIONES AGUDAS Y BRUTALES DE VÍAS RESPIRATORIAS SUPERIORES.

Como todos los halógenos, tiene acción marcada sobre el SISTEMA GLANDULAR al que hipertrofia e indura : HINCHAZÓN, CON INDURACIÓN, DE TODAS LAS GLÁNDULAS PARTICULARMENTE DEL LADO IZQUIERDO.

Bromium parece ejercer un poder especial sobre la fuerza VITAL : todos los síntomas que presenta tienen un sello DE ASTENIA PRONUNCIADA : sensación de fatiga, de debilidad tales, que persisten después de haber cesado los otros síntomas; la debilidad es tan pronunciada, que el menor movimiento provoca transpiración.

Características

1) CONSTITUCIÓN Y TIPO : Bromium actúa particularmente bien en SUJETOS RUBIOS, DE OJOS CLAROS, CORPULENCIA MEDIANA, PIEL BONITA Y FINA, TEZ ROSADA, caso opuesto en iodium que corresponde más bien a morochos, flacos, de piel morena y tostada.

2) HINCHAZÓN CON INDURACIÓN DE TODAS LAS GLÁNDULAS DEL CUERPO PARTICULARMENTE DEL LADO IZQUIERDO : Pueden estar afectadas todas las glándulas : salivales, tiroidea, mamarias, ováricas, testiculares, y los ganglios linfáticos; en este caso se encontrarán siempre los síntomas característicos : AUMENTO DE VOLUMEN, INDURACIÓN E INDOLENCIA.

Algunos remedios determinan esta hipertrofia con induración de glándulas : conium, carb. an., lap. alb., iodium, calc. ostr. graph., silic., etc., pero las características que les son propias permiten distinguirlos fácilmente.

3) DOLORES SORDOS, PROFUNDOS, CONTINUOS RARA VEZ AGUDOS aunque a veces picantes y punzantes; generalmente DEL LADO IZQUIERDO (lach. y naja); sobrevienen particularmente SI EL ENFERMO TOMA FRÍO CUANDO EL TIEMPO ES CALUROSO Y HÚMEDO y aparecen frecuentemente durante las noches frescas de primavera o verano lluvioso; se agravan de noche, hasta media noche y sobre todo cada vez que el individuo, estando acalorado, se expone al frío y a la humedad.

Modalidades

Mejoría

Por el movimiento y el ejercicio; andando a caballo o en coche; a la orilla del mar; viajando por mar.

Agravación

Después de haber tomado frío en días calurosos; por humedad fría; a la noche, antes de media noche; al entrar en un cuarto caliente (la tos, como bryon); después de beber leche (cefalea).

Síntomas mentales

Generalmente todos los estados agudos, así como los crónicos, del remedio, son acompañados de DEBILIDAD Y POSTRACIÓN FÍSICA Y MENTAL : cualquiera sea el nombre de la enfermedad, habrá ABATIMIENTO, POSTRACIÓN, ANSIEDAD, HUMOR TRISTE Y TACITURNO; puede haber gran actividad cerebral y necesidad de trabajo intelectual.

Más a menudo tiene DEBILIDAD MENTAL, MEMORIA MUY DISMINUIDA, que lo entristece, lo desanima, lo vuelve melancólico y le produce un pronunciado disgusto por el trabajo; le CUESTA FIJAR SU ATENCIÓN y su indiferencia es profunda.

ANSIEDAD, acompañada de palpitaciones y cefalea, PEOR AL ATARDECER Y ALA NOCHE, ALUCINACIONES, particularmente en la oscuridad : cree tener detrás suyo personas extrañas; le parece que toda clase de cosas bailan en el suelo delante suyo; tiene miedo a los espíritus (acon., carb. veg., phosph., puls.).

Sueño

Si de día se pone a leer o escribir, le dan grandes deseos de dormir.

De noche, su sueño es agitado, no es reparador, turbado por pesadillas sueña con muertos, asesinatos, peleas, viajes.

Cabeza

Jaquecas, particularmente del lado izquierdo de la cabeza, que sobrevienen hacia las 15 o 16 hs, acompañadas de zumbidos de oídos y latidos en las sienes.

Jaqueca peor del lado izquierdo, después de beber leche, mejora acostándose del lado derecho con los brazos sobre la cabeza.

Dolor en la parte de arriba de la cabeza al calor del sol, que se disipa a la sombra.

El dolor de cabeza se agrava con cualquier movimiento, especialmente alagacharse, y a menudo acompañado de vértigos.

Vértigos acompañados de epistaxis, con tendencia a caer hacia atrás; PROVOCADOS AGRABADOS POR LA VISTA DE AGUA QUE CORRE, razón por la cual el sujeto no puede atravesar un puente, como angost., arg. met., que tiene vértigos como si estuviera intoxicado, cuando atraviesa un puente; ferr. met. tiene vértigos con tendencia a caer hacia adelante, al mirar correr el agua; sulfur tiene vértigos y sensación como si estuviera paralizado, yendo por un río.

Cara

Pálida, labios rojos, hinchados, ardientes.

Sensación de cosquilleo y hormigueo en las mejillas; sensación como si tuviera UNA TELA DE ARAÑA EN LA CARA, que se manifiesta sobre todo MOVIENDO LAS ALAS DE LA NARIZ, como en bar. carb., en que se sitúa a la derecha; y graph. que la siente sobre todo en la frente.

Aparato digestivo

BOCA :

Sensación de quemadura en la boca.

Lengua seca y ardiente, con pequeños granitos particularmente numerosos en la cara posterior y a la derecha; en la punta, dolores ardientes y picantes.

Gusto desagradable; el agua tiene gusto a salado.

HINCHAZÓN E INDURACIÓN DE GLÁNDULAS SUB-MAXILARES Y PAROTIDAS, indolora, deconsistencia pedregosa, particularmente del lado izquierdo; a veces se han notado dolores en la mandíbula, también del lado izquierdo.

FARINGE :

Sensación de quemadura CON DOLOR DE EXCORIACIÓN que se extiende a lo largo del esófago, hasta el estómago.

Estado inflamatorio de la faringe, dificultad para tragar, operación muy dolorosa sobre todo al tragar líquidos.

Hinchazón rojo-rosada de las amígdalas.

ESTÓMAGO :

Disminución de apetito y sed.

Apetencia de ácidos (ant. crud., ant. tart., magn. carb., myrica, sepia) que dandiarrea.

No puede soportar los alimentos, ni las bebidas calientes (bryon., graph., phosph., puls., pyrog.).

Tampoco puede soportar el humo de tabaco, como ignat., pero que, al contrariode bromium, no puede beber cosas frías y mejora con bebidas calientes.

Dolores gástricos profundos, presivos, que sobrevienen de 8 a 11 de la mañana, generalmente calmados al comer (anacard.), pero que reaparecen inmediatamente después; agravados por la presión profunda.

Sensación de calor, de quemadura, en el estómago.

Sensación de presión en el estómago, como producida por una piedra (bryon.).

Sensación de vacío en el estómago, mejorada al comer.

Eructos, náuseas; náuseas sobre todo a la noche; vómitos de mucus sanguinolento, vómitos alimenticios, sanguinolentos y negros como borra de café.

ABDOMEN Y DEPOSICIONES :

Meteorismo, distensión timpánica de abdomen, con muchos gases y emisión de vientos.

Cólicos mejorados por presión externa y al inclinarse hacia adelante (coloc).

Hemorroides procidentes, muy dolorosas, que sangran fácilmente, agravadas por aplicaciones de agua caliente o fría.

Diarrea con meteorismo abdominal y abundante emisión de gases, agravada o provocada por todo lo que es ácido, aunque el enfermo tenga marcada preferencia por alimentos y bebidas ácidos.

Diarrea después de haber comido ostras (lycop).

La diarrea sobreviene sobre todo después de la comida; tiene a la mañana una deposición normal, y bruscamente a las 14, siente necesidad urgente de evacuar con tenesmo y emisión de muchos gases.

Aparato urinario

La secreción puede disminuir y la orina se hace oscura y turbia.

Después de la micción, puede haber sensación de quemadura en la uretra; también en este momento, emisión de algunas gotas de orina (arg. nit., can. ind., conium, kali carb., selen.).

Órganos genitales

MASCULINOS :

Hipertrofia e induración del testículo que toma la consistencia de una piedra, especialmente el izquierdo; no hay dolor.

Solamente en ciertos casos hay dolores punzantes a lo largo del cordón espermático.

FEMENINOS :

Reglas demasiado precoces, demasiado abundantes de sangre rojo vivo, mezclada a veces con jirones de mucosa.

Dolores violentos, espasmódicos, en el vientre, antes o durante las reglas, aliviados al doblarse en dos.

Este estado de dismenorrea es, a menudo, acompañado por cefalea izquierdacaracterística y dolor profundo en la zona ovárica, especialmente el ovario izquierdo.

DISMENORREA MEMBRANOSA (ars. alb., borax, magn. ph., sulphur, viburn., etc.).

EMISIÓN FRECUENTE DE GAS POR AL VAGINA (lycop., phosph. ac., sanguin.).

Ovario, particularmente el izquierdo, hipertrofiado, de consistencia pedregosa, con dolores sordos.

Hipertrofia e induración de glándula mamaria, particularmente del lado izquierdo, con dolores agudos, tirones, como si tuviera un hilo que le tirara hacia la axila del mismo lado; los dolores punzantes empeoran a la noche.

Aparato respiratorio

NARIZ :

Coriza agudo, violento, con sensación de frío en la nariz durante la inspiración; nariz muy dolorida, con obstrucción, primero a la derecha, después a la izquierda; secreción de líquido que produce excoriación en fosas y aletas nasales cuyo interior se llena de costras.

El coriza sobreviene los días calurosos de verano, cuando estando muy acalorado, el individuo se expone al fresco humeo; el coriza de acon. es provocado por exposición al frío seco, en invierno y el de bromium, al frío húmedo, en verano.

Movimientos de fuelle, de abanico, en las alas de la nariz. (lycop., ant. tart.).

LARINGE :

Inflamación de laringe, ronquera y afonía, acompañadas de cosquilleo y sensación de desolladura que parece provocada por tos seca.

Ronquera brusca que aparece a la noche en sujetos que, estando acalorados, han estado expuestos a frío húmedo.

Sensación como si la mucosa estuviera en carne viva, obligando al enfermo a arrastrar o toser.

Sensación de frío en la laringe, al aspirar.

Espasmo de glotis; constricción a la garganta que impide no solamente tragar, sino también respirar; apenas puede hablar y se sofoca.

Sofocación constante con crisis paroxísticas, sobre todo al tragar.

Sensación como si la tráquea estuviera llena de humo o vapores de azufre, que provoca intensa sofocación y tos irritante extremadamente fatigante.

DIFTERIA LARÍNGEA, LA FALSA MEMBRANA COMIENZA EN LA LARINGE Y GANA ENSEGUIDA LA PARTE SUPERIOR, (lycop.) : lo contrario : la falsa membrana se forma primitivamente en la nariz y desciende enseguida a la laringe.

Crup membranoso con grandes rales en la laringe a cada movimiento respiratorio, producido por una masa mucosa que parece ahogar al enfermo; ant. tart. tiene también masa mucosa que provoca el mismo ruido de rales respiratorios, pero en bronquios y no en laringe.

Bromium ha curado el crup en casos en que iodium, phosph., hep. sulf. calc., spong. fueron ineficaces, principalmente en casos de recaída, después de iodium.

Tos seca, espasmódica, crupal, que aparece como en ipeca, pero sin expectoración, aunque acompañada de ruido de mucosidades en laringe y parte superior de la tráquea; cada inspiración la provoca, y el enfermo no puede respirar profundamente sin toser y sofocarse inmediatamente.

Acon. presenta la misma tos seca, crupal con ronquera, que sobreviene en el primer sueño y lo despierta bruscamente : se sofoca, está angustiado, tiene miedo de morir; esto sucede sobre todo después de exponerse al frío seco.

Hep. sulf. calc. tiene tos gruesa, crupal, con respiración ruidosa y muchas mucosidades traqueales; peor después de medianoche, más marcada a la mañana y provocada por la menor aspiración de aire frío, o la menor exposición al frío.

Spong. presenta tos seca, ronca, comparable al ruido del serrucho, acompañada de sensación de tapón en la laringe, detrás de las amígdalas, con ronquera y ardor en la laringe; aparece antes de medianoche, acompañada de embarazo respiratorio, particularmente por la aspiración y el enfermo tiene entonces una sensación como si respirara a través de una esponja; mejora con bebidas calientes que, al contrario agravan a bromium; la disnea empeora estando acostado y mejora inclinándose hacia adelante; en términos generales spong. se agrava con el viento seco y frío y actúa bien después de acon.; lo sigue bien bromium, iodium, al contrario actúa bien después de hep. sulf. calc.; su tos es parecida a la de bromium, pero con modalidades inversas; la tos no es seca, sino dura, ruidosa, metálica, acompañada de expectoración escasa; la ronquera es peor a la mañana; en fin, la tos es peor al calor y sobre todo muy dolorosa; a cada acceso, el enfermo se aprieta la garganta a causa del dolor laríngeo.

BRONQUIOS Y PULMONES :

La tos va acompañada de ardor violento detrás del esternón.

Violenta sensación de apretón y dolores punzantes en el pecho, principalmente a la derecha.

DISNEA; NO PUEDE RESPIRAR BASTANTE PROFUNDAMENTE, o tiene una SENSACIÓN COMO SI RESPIRARA A TRAVÉS DE UNA ESPONJA O COMO SI LOS BRONQUIOS ESTUVIERAN LLENOS DE VAPORES DE AZUFRE (ant. tart., ars. alb., chel. maj., ipeca, lycop., phosph.) ASMA MEJORADA AL BORDE DEL MAR.

Inflamación de pulmón que puede llegar a hepatización.

Aparato circulatorio

Dolores cardíacos, que irradian hacia la axila.

HIPERTROFIA DEL CORAZÓN después de abusos de gimnasia en jóvenes que están creciendo y cuyo tipo físico es el de bromium (en jóvenes, son las indicaciones de caust. las que se encuentran preferentemente) (Allen).

Palpitaciones frecuentes peor acostándose del lado izquierdo; por lo que no puede permanecer en esta posición; agravadas también al caminar, haciendo un ejercicio violento; mejoradas por una inspiración profunda.

Opresión frecuente, peor al caminar con tendencia a bostezar constantemente.

Piel

Amarillenta, terrosa en partes, presenta acné y forúnculos, particularmente en cara y brazos.

También puede haber ulceraciones cuyos bordes sobresalientes limitan un fondo decoloración verdosa que emite mal olor.

Relaciones

Antídotos

Amm. carb., camph., magn. carb., opium.

Mientras se toma bromium, no se debe tomar leche.

BRYONIA ALBA

Bryonia alba o bryonia blanca, vulgarmente llamada Culebra, Anhorca, Nuez Blanca o Tuca, Nabo del Diablo o Viña Blanca, es una planta herbácea, trepadora, de las Cucurbitáceas.

Abunda en Francia y Alemania, creciendo en bosques y praderas.

Con la raíz, cuyo sabor es agrio y su olor repugnante, desenterrada un poco antes de florecer la planta (pleno verano), se prepara la tintura madre, punto de partida de todas las dinamizaciones.

Acción general del medicamento

Según Kent, bryonia es un medicamento "muy perseverante" y CUYAS AFECCIONES SE DESARROLLAN LENTAMENTE, ES DECIR LENTAMENTE PARA LOS ESTADOS AGUDOS.

Durante la evolución, que lleva algunos días, el paciente se siente indispuerto, abatido no quiere hablar ni que se hable, no se mueve, y todo esto aumenta gradualmente.

Si se trata de una crisis reumática, los dolores comienzan a aparecer en diversas partes, cambian de lugar, y no son muy acentuados, salvo que el paciente se mueva, lo cual los agrava notablemente.

Por fin los dolores se vuelven más intensos, se hacen permanentes y fijos.

Las regiones afectadas se vuelven rojas o hinchadas progresivamente, y por último aparece nítido el cuadro clínico de una verdadera crisis reumática.

Las afecciones de bryon. son continuas y FIJAS, y sólo muy rara vez INTERMITENTES.

Pueden adquirir un estado de VIOLENCIA, pero que nunca llegará a ser la violencia de acon. o de bell. bryon. se conforma a un tipo de enfermedad con fiebre continua, o a un tipo de reuma manifestado con severidad gradualmente creciente, invadiendo articulaciones una después de otra, hasta que el tejido fibroso periarticular esté en un estado de dolor e inflamación característicos.

Actúa electivamente sobre el TEJIDO FIBROSO.

Afecta las MEMBRANAS SEROSAS más que ningún otro remedio; actúa con preferencias sobre las SINOVIALES, LIGAMENTOS FIBROSOS PERIARTICULARES, las APONEUROSIS, y en no menor grado sobre PLEURAS, MENINGES, PERICARDIO, PERITONEO; y como característica, afecta con su acción no sólo las bolsas serosas SINO LOS PARENQUIMAS CERRADOS POR ELLAS; sobre pulmón y pleura, sobre cerebro y meninges, sobre hígado y peritoneo su acción se caracteriza por un derrame, de ahí que su indicación comienza EN SEGUNDA INSTANCIA, AL APARECER LA EXUDACIÓN.

Dice Espanet, que bryon. conviene "en estado de las flegmasias", cuando la afección es completa, el estado febril ya se ha producido, y la congestión ya existe en su plenitud.

Actúa también sobre las MUCOSAS, pero a la inversa de puls.

AGOTA LAS SECRECIONES Y LAS SECA, de ahí la sed intensa, constipación, tos seca, orina poco abundante; inflamación que se traduce por excesiva sequedad en mucosas y dolores agudos que mejoran por reposo y presión, pero se agravan con el movimiento.

Características

CONSTITUCIÓN Y TIPO : INDIVIDUOS MORENOS, ASPECTO BILIOSO, IRRITABLES, ROBUSTOS PERO DELGADOS.

En ellos el tejido muscular predomina y casi anula al adiposo; su musculatura es firme y su sangre fogosa; les gusta y están acostumbrados a la buena alimentación.

La constitución de bryon. nos recuerda la de nux vom., pero con diatesis reumática, bien marcada.

Dice Espanet "bryonia se adapta a los mismos individuos que nux vom., con menor electividad en los sistemas gástrico y raquídeo, pero mayor sobre los órganos respiratorios y el tejido fibroso.

IRASCIBILIDAD, CÓLERA : La mentalidad de este tipo se caracteriza por la excesiva irritabilidad; es

IRASCIBLE, VEHEMENTE, MONTA EN CÓLERA POR INSIGNIFICANCIAS; CUALQUIER

CIRCUNSTANCIA INSIGNIFICANTE les hace PERDER SU SANGRE FRÍA, la irritabilidad de bryon. nos

recuerda a nux vom., si bien ya vimos que nux vom. no tiene diatesis reumática tan marcada como bryon.; y además, si ambos se calman por el reposo, en bryon. esto es algo ABSOLUTO a la vez que a veces, el movimiento mejora a nux vom. como sucede en rhus tox. (Nash).

La cólera de bryon. es importante no sólo por ser un signo del remedio, sino por la INFLUENCIA ETIOLOGICA que ejerce.

NO SOLO AGRAVA LOS SÍNTOMAS, SINO QUE PUEDE PROVOCAR OTROS NUEVOS : porej. dolores de cabeza.

Por los efectos que le ocasiona la cólera, bryon. puede compararse a chamom, colocynt, gels, nux vom y staphys.

DOLORES PUNZANTES :El carácter de los dolores constituye un síntoma clave del remedio.

DOLORES AGUDOS, PICANTES, desgarrantes rápidos, y a menudo intermitentes.

Afectan sobre todo EL COSTADO DERECHO y SE AGRAVAN AL MENOR MOVIMIENTO : lamarcha, el ejercicio, el acto de lavarse, o simplemente la respiración.

El menor movimiento AGRAVA O PROVOCA dolores; de este modo el desplazamiento de los globos oculares aumenta la cefalea de bryon.

La agravación tiene lugar a las 3 de la mañana, y el dolor aumenta por el calor, en todas sus formas, aplicaciones y alimentos calientes, frotación, etc.

MEJORAN SIEMPRE POR EL REPOSO, PRESIÓN FUERTE, APLICACIONES Y BEBIDAS FRÍAS.

Un solo remedio iguala a bryon. en los dolores punzantes : kali carb., y en ellos dolores se sienten igualmente aunque el paciente no se mueva.

Los dolores de apís son más picantes que punzantes, como la picadura de abeja.

Si consideramos que los dolores característicos de las inflamaciones serosas son punzantes, tendremos que bryon es el remedio ideal en los casos de pleuresía, meningitis, peritonitis y pericarditis.

Modalidades

Lateralidad

DERECHA.

Agravación

Por el movimiento (CUANTO MAS SE MUEVE MAS SUFRE) el paciente de bryon desea imperiosamente el REPOSO FÍSICO Y MORAL.

Sea cual fuere la parte orgánica afectada o el "nombre" de la enfermedad, esta característica tiene un valor de primer orden, toda agitación exterior lo agrava y se halla mejor en habitación oscura y silenciosa.

POR EL CALOR EN TODAS SUS FORMAS : a veces puede suceder que las envolturas calientes calmen sus dolores reumáticos, pero la totalidad restante de sus dolores reclamará el frío.

El calor, habitación caliente, el exceso de ropas lo agravan y le hacen desear aire fresco, ventilación, ventanas abiertas; la permanencia en un teatro, iglesia, etc. donde falte aire fresco, lo agravan.

Debe notarse como una excepción de esta modalidad general, que los síntomas estomacales o intestinales mejoran con bebidas o aplicaciones calientes, pero eso sí, el paciente quiere estar acostado en una habitación fresca (Kent).

DEL COSTADO DERECHO; bryon. es útil cuando los dolores comienzan, o presentan su máxima exteriorización de este lado.

DESPUÉS DE HABER COMIDO; cualquiera sea el mal del que sufre, empeora después de haber comido, siendo éste un síntoma general (Kent).

DE NOCHE; comienza a las 21 hs.

Mejoría

POR EL REPOSO, que calma, así como el menor movimiento empeora.

POR LA PRESIÓN FUERTE, ESTANDO ACOSTADO SOBRE EL COSTADO DOLORIDO.

POR EL FRÍO EN TODAS SUS FORMAS; hay sin embargo algunos dolores de cabeza que mejoran por aplicaciones calientes; los dolores que mejoran con aplicaciones frías son los del tipo congestivo, no así los primeros (Kent).

Digamos que el estado mental de bryon. mejora con el frío; delirio, sensación de plenitud de la cabeza, empeoran en habitación caliente.

Los niños de bryon, si abrimos las ventanas de su habitación para ventilarla, se dormirán tranquilamente (Kent).

Síntomas mentales

Ya vimos EXTREMA IRRITABILIDAD, con deseos de llorar y humor triste, melancólico.

SE ENCOLERIZA FÁCILMENTE, y en seguida tiene un escalofrío, la cara roja y la cabeza caliente (staphys.) (Dr. P. White, MAL EFECTO DE LA CÓLERA).

Desea algo SIN SABER QUE : he aquí un signo que individualiza a bryon : desea algo imposible, y cuando lo consigue o se le ofrece, ya no lo desea (chamom, cina, dulcam., kreosot., rheum, staph., etc.).

TRISTEZA, ABATIMIENTO, DESEO DE LLORAR, DESESPERACIÓN; el paciente está TACITURNO, DE CARÁCTER ÁSPERO, LLORA CON FACILIDAD; está AGITADO, ANGUSTIADO, TIENE SENSACIÓN DE INSEGURIDAD; TEME NO SANARSE Y POR EL PORVENIR (anacard., calc. ostr., graph., phosph., etc.).

A veces su estado de angustia es extraordinario y le invade totalmente, obligándole a MOVERSE DE UN LUGAR A OTRO; su inquietud suele ser como la de ars. alb., y si bien al comienzo de ese estado comprende que el reposo lo mejora, llega un instante en que la angustia y los dolores son tales que no puede ya permanecer en reposo (Kent).

Está lleno de temores, de inquietud, de desasosiego, desalentado por la marcha de su mal y por el temor a la muerte (Kent).

Estado de CONFUSIÓN MENTAL, DE APATÍA, DE ESTUPEFACCIÓN, debilidad de memoria, AGOTAMIENTO MENTAL, AVERSIÓN A LA COMPAÑÍA Y DESEOS DE SOLEDAD, DE TRANQUILIDAD, DE REPOSO MENTAL Y FÍSICO.

La simple excitación mental lo agrava, lo cual puede llegar a verdadero DELIRIO.

EMPEORA CERRANDO LOS OJOS, en que tiene visiones como en bell., arg. nit., calc., china, ignat., puls., sulfur, etc.

Hacia las 3 de la mañana, hora de máxima agravación, cree estar fuera de su casa y pide que la lleven a ella.

El delirio de bryon. es un delirio tranquilo, en que permanece acostado; no presenta la brusquedad de bell. o stramonium.

Sueño

Está sumido en un sopor; al dormirse tiene estremecimientos; antes de medianoche insomnio con agitación.

Pesadillas.

Sueña sobre lo que ha leído o sobre problemas de su profesión o trabajo.

Cabeza

Cuero cabelludo frecuentemente cubierto de caspa; además extremadamente sensible.

El más leve tacto causa sensación de que le tiran de los cabellos; las mujeres se dejan los cabellos sueltos.

Con cada afección aguda de bryon hay CEFALEA, asociada a manifestaciones inflamatorias y congestivas; Estas cefaleas son generalmente EL PRELUDIO DE OTRAS AFECCIONES; bronquitis, congestión pulmonar, etc.

Despierta por la mañana con dolor de cabeza congestivo sobre los ojos, o detrás del cráneo, o en ambos lugares a la vez; le parece que la cabeza va a estallar y sólo mejora por la presión mientras que el calor o el menor movimiento, aún del globo ocular, producen agravación.

CEFALEAS congestivas con sensación de plenitud, de que la cabeza VA A ESTALLAR Y SU CONTENIDO A SALIR POR LA FRENTE.

La cabeza parece estar tan llena que hay necesidad de presionarla entre las manos o atarla con un trapo apretado.

El dolor de cabeza puede a veces sentirse sobre los ojos con sensación de cuchillada.

La sensación de cefalea frontal y de que la cabeza va a estallar puede extenderse al occipital y descender por cuello y espalda.

Cualquier movimiento agrava; la tos, la luz en los ojos.

También el calor agrava los males de bryon.

Esto viene acompañado de pereza ESPIRITUAL con la fisonomía de aspecto ATONTADO; CARA MARMÓREA Y PÚRPURA, ojos enrojecidos y congestionados.

INDIFERENCIA; no quiere moverse, ni hablar pues todo ello lo agrava.

Bell. tiene también esta cefalea congestiva, pero es sumamente activa, frente a la pereza, lentitud y pasividad de bryon.

VÉRTIGOS Y NAUSEAS al moverse, y al sentarse en el lecho.

DERRAMES MENINGEOS, que indican la utilidad de bryon. en la meningitis simple, después de producido el exudado seroso.

En esto, salvo en ciertos casos, bryon. sigue bien a bell. mejor que acon. bell.

deja de ser útil tan pronto aparece el derrame, para dar lugar, según el caso, a sulf., apis o bryon.

Este último es indicado sobre todo si la meningitis aparece después de supresión eruptiva, como rubéola o escarlatina.

La cara del niño es pálida, o presenta alternancias de enrojecimiento y palidez; lengua blanca; grita como si tuviese dolores agudos, lo cual está relacionado con el menor movimiento.

Puede haber estrabismo de uno o ambos ojos.

Constipación y distensión abdominal; en fin, hay una depresión sensorial vecina al estupor, del que sale bebiendo ávidamente y con impaciencia.

Cuando sobreviene el entumecimiento soporífero helleb. sigue bien a bryon., mientras que si sobrevienen crisis agudas marcadas, apis será mejor.

Dice Spanet que "después de bell., bryon es útil en la meningitis para conjurar el derrame y la exudación serosa.

Puede alternarse con merc. o con bromium; juega un rol importante junto a digit., arnica, helleb., sulf., en la irritación sub-aguda de meninges después de fiebres graves.

Es importante en las enfermedades del encéfalo y más aún en afecciones cerebrales de desarrollo lento cuando existe obnubilación, marcha incierta, humor variable, frecuentes cambios de color en la cara y dolores de miembros : cuando la transudación serosa es inminente.

En todos estos casos, bryon. es útil antes y después de zincum, y también después de indigo".

Ojos

Enrojecimiento, inflamación congestiva, calor, ardor, escozor, relaciones a dolores de cabeza, coriza, perturbaciones catarrales de las vías respiratorias.

Los ojos duelen al menor tacto y sin tocarlos; dolor tipo contusión, magulladura todo agravado por la menor presión, movimiento y tos.

Metástasis gotosa en los ojos, inflamación congestiva y dolorosa en los ojos de los gotosos; iritis reumática provocada por el frío.

Cara

Pálida, AMARILLENTA, TERROSA.

También puede ser ROJO OSCURO, PÚRPURA, ABOTAGADA, por la éstasis vascular producida por el remedio, con ESTUPIDEZ ESPIRITUAL como si estuviese ebrio.

Ojos carentes de expresión de inteligencia, y ante la presencia de cualquiera le pregunta qué hace, qué ha dicho.

Cuando un individuo está por padecer el cuadro de bryon. se notará al despertarse facies atontada, gran dificultad y esfuerzo para pensar o hacer cualquier cosa, tendrá fuerte dolor de cabeza y se agravará por cualquier movimiento; o bien la cara estará roja, caliente, abotagada; habrá placas rojas en cara y cuello (Kent).

Aparato digestivo

BOCA :

GRAN SEQUEDAD DE BOCA, LENGUA, FARINGE Y LABIOS, que están como chamuscados, con escamitas que los niños se arrancan sin cesar.

Labios sangrantes como en los estados tifoideos.

Mucosa bucal y lengua color marrón, mucha mucosidad en los dientes.

(En arum. triph. el niño se arranca sin cesar la piel de sus labios y costras de su nariz) (Kent).

Medicamentos que tienen también gran sequedad bucal : alum. (sobre todo al despertar, de mañana); ars. alb., (con sed intensa, pero sólo acepta pequeñas cantidades de agua fría a intervalos cortos); bell. (también la garganta está seca; gran sed, puede ser de grandes como pequeñas cantidades de agua, pero a menudo, como ars. alb.); borax (boca y garganta muy secas, deseo de ácidos); kali bichr., (sequedad bucal y faríngea que le hacen tragar saliva continuamente, sed inextinguible); rhus tox, sepia (solamente a veces tiene la boca y garganta secas - Jahr); sangui. (de mañana al despertar tiene la boca con sensación de excoriación y sequedad como si hubiese comido cosas agrias - Jahr); tereb. (lengua seca, roja y dolorosa - Boericke); apis (gran sequedad en boca, lengua y garganta, pero sin sed - esto es característico); lach. (puede haber mucosidad tenaz en la boca, o sequedad sin sed); lycop. (sequedad con o sin sed); nux mosch. (la sequedad es tal que la lengua se pega al paladar, pero no hay sed); puls. (lengua seca pero sin sed).

Sensación de tener los dientes demasiado largos; ODONTALGIAS AL COMER, agravación por el calor; MEJORA CON ALIMENTOS FRÍOS SE AGRAVA AL FUMAR, y mejora acostándose sobre el lado dolorido con una presión fuerte sobre el diente dolorido.

Odontalgia de origen reumático; a menudo dolor dentario sin caries.

Lengua cubierta de espesa capa blancuzca (antim. crud.); puede ser también amarillento el color de la capa que cubre la lengua o marrón oscuro, sobre todo en medio de la lengua.

LENGUA SECA COMO ASADA, FISURADA, SANGRANTE; (estados tifoideos del remedio); esto puede ocasionarle pérdida del gusto y por ello ni pide agua (nux mosch).

Retraso sensorial - pérdida de gusto o alteración; lo dulce parece amargo, etc.

AFTAS, mal aliento bucal.

Movimiento lateral del maxilar inferior, principalmente en estados febriles y meníngeos.

FARINGE :

GRAN SEQUEDAD, constricción y picazón al tragar.

Faringitis con dolores agudos, sequedad y deseo de grandes cantidades de agua fría a intervalos largos (Kent).

APETITO Y SED :

SED INTENSA DE GRANDES CANTIDADES DE AGUA FRÍA PERO A INTERVALOS LARGOS.

Sin embargo, notar que los dolores estomacales de bryon.

MEJORAN CON BEBIDAS CALIENTES (Kent).

AVERSIÓN A LOS ALIMENTOS con pérdida estomacal de las aptitudes digestivas normales.

Su temperamento cambiante le hace pedir a veces lo que su estómago rechaza.

Bulimia aún sin gusto por los alimentos.

Pide algo de comer y cuando lo consigue ya no lo desea.

Pide cosas imposibles (Kent).

DESEO DE BEBIDAS ÁCIDAS Y FRÍAS. (KENT).

Desea café y vino.

AVERSIÓN por todo lo grasoso, aceitoso, succulento (Kent).

El paciente que está bajo la influencia del medicamento constitucional debe evitar ciertas comidas; el de bryon., chucrut, ensaladas crudas y carne; el de puls., alimentos demasiado grasos; el de lycop., ostras; el de thuya, cebollas y ajos, etc.

Estos remedios constitucionales tienen la propiedad de producir manifestaciones hostiles a ciertos alimentos, en cuyo caso el remedio deja de actuar (Kent).

ESTOMAGO :

Bryon., juntamente con nux vom. y puls., se caracteriza por marcados desórdenes estomacales.

Los alimentos caen mal al paciente en cuanto los ingiere; sensación de que le quedan en el estómago; vómitos acuosos y biliosos en seguida de haber comido; pirosis.

Sensibilidad del hueco epigástrico al tacto.

Sensación de piedra en el estómago, que se calma eructando (kali bichr., lycop., nux vom., puls.).

Trastornos dispépticos durante los calores del verano.

Hipo, náuseas, vómitos; si está acostado tranquilamente, estos síntomas pueden no causarle mucha molestia, pero el solo hecho de levantar un poco la cabeza de la almohada, los intensifica enormemente.

Muchos de estos síntomas se parecen a nux vom y puls., aunque si tenemos cuenta sus características no los confundiremos.

Basta recordar que los trastornos de nux vom se deben generalmente a abusos alimentarios, vida sedentaria, etc.

Los de puls., a alimentación demasiada rica, demasiado grasosa, y los de bryon.

a desviación del régimen principalmente cuando a esto se agrega un cambio de tiempo.

Los tres tienen mal gusto en la boca, sensación de peso estomacal (aunque más marcado en bryon.), y mientras bryon. tiene sed intensa, los dos anteriores tienen nada o escasa sed. (Nash).

ABDOMEN :

GRAN SENSIBILIDAD EN TODA LA PARED ABDOMINAL, que si bien calma por aplicaciones locales calientes, el paciente desea estar en habitación fresca.

Agravación al menor movimiento.

PERITONITIS INFLAMATORIA SIMPLE UNA VEZ PRODUCIDO EL DERRAME, dolores punzantes, repentinos, y dolores ardientes, agravado al menor movimiento.

CÓLICOS CON TIMPANISMO, BORBORIGMOS, GORGOTEOS, QUE PRECEDEN VARIAS HORAS A LA DIARREA.

REGIÓN HEPÁTICA DOLORIDA Y TENSA.

Dolores agudos, punzantes al hígado, calmando acostándose sobre el lado dolorido, o por el reposo.

Dolores agravados por la tos.

El hígado, principalmente el lóbulo derecho, está resentido como si estuviese endurecido como piedra, pesado, con dolor y sensibilidad a la presión.

Esto suele estar acompañado de trastornos gástricos, vómitos de bilis, náuseas.

Chelid. maj. tiene síntomas parecidos, pero los dolores son menos marcados.

Berb. irradia sus dolores a la 10a. costilla hacia el ombligo.

Yucca fil. es también indicado para estados biliosos con dolores al hígado, de su parte superior hacia la espalda; mal gusto, diarreas, con contenido bilioso, y mucho gas en el recto.

Lycop., nux vom., aur. met., ceanothus, china, chamom., podophyl., kali carb., sepia, phosph., sulf., etc., tienen síntomas parecidos.

Dice Espanet que bryon. se ajusta bien en la hepatitis donde hay ictericia, constipación, perturbaciones asmáticas, fiebre alta y agravación nocturna, principalmente en afecciones localizadas en la cara peritoneal del hígado mientras que puls. se comporta mejor en la hepatitis profunda, en su porción vascular, con angustias, deseos de dormir, salivación abundante, deposiciones copiosas, etc.

Bell. se ajusta más a la flogosis parenquimatosa del hígado con gran sensibilidad, fiebre y delirio.

Merc. resulta a menudo auxiliar de estos tres remedios.

Bryon es poco útil en la hepatitis crónica a menos que haya crisis agudas, o que su empleo esté asociado a la acción de sulf. o merc.

ICTERICIA CON CATARRO DUODENAL, O DESPUÉS DE UN ACCESO DE CÓLERA; también chamom. es indicado en estados biliosos que sobrevienen por una cólera; la diferencia consiste en que en chamom. el paciente tiene calor y transpira mientras que en bryon. tiene escalofríos.

ANO Y DEPOSICIONES :

CONSTIPACIÓN PASIVA SIN DESEOS, PROVOCADA POR EXTREMA SEQUEDAD DE LA MUCOSA INTestinal; MATERIAS DURAS, SECAS, COMO CALCINADAS; salen después de grandes esfuerzos, sin que haya deseos presivos.

No hay mucus, o si lo hay es expulsado separadamente. (Kent).

Esta constipación difiere de la de nux vom, en que se debe a mala acción peristáltica intestinal.

La constipación de bryon. es más marcada que en puls.

DIARREA COLOR OSCURO ABUNDANTE, COMO AGUA SUCIA, ácida, con sensibilidad dolorosa anal, y sobreviene principalmente durante épocas calurosas.

Diarrea con restos de alimentos sin digerir, por beber agua fría estando acalorado.

Diarrea semejante a polenta con flemas y a veces sangre, como encontramos a menudo en la fiebre tifoidea.

DIARREA PEOR POR LA MAÑANA DESPUÉS QUE EL PACIENTE SE HA MOVIDO UN POCO PUDIENDO SER CONSECUENCIA DE LOS CALORES DEL VERANO.

No debe confundirse esta DIARREA MATINAL con la de sulf. que aparece con deseos imperiosos ANTES DE LEVANTARSE.

Tienen el mismo síntoma matinal : natr. sul., phosph., podoph., aloe y rumex.

Se prescribirá petrol. en diarreas diurnas y agravadas o provocadas por el movimiento, mientras que de noche, mientras el paciente descansa, no aparecen (Kent).

La diarrea es casi excepcional en bryon. tomando más bien la forma disintérica; es más frecuente que la de puls., en que aparece generalmente de noche y con muchos borborismos.

Aparato urinario

Según Kent, "este remedio tiene una cantidad importante de síntomas urinarios" : manifestaciones renales inflamatorias, ORINA ROJA COLOR OSCURO COMO CERVEZA, ARDIENTE, y caliente; DEPÓSITOS DE URATOS ROSADOS, ácido úrico en la orina (Kent).

Cada vez que se hace un esfuerzo para levantar algo o algún movimiento que requiere mucha fuerza, reaparece en la región renal un dolor que puede durar algún tiempo (Kent).

También por padecer mucho calor puede aparecer este dolor.

Después de efectuar movimientos, emisión involuntaria de orina.

Ardor uretral mientras no orina, calmados por la micción (Kent).

Órganos genitales

MASCULINOS :

Punzadas en los testículos.

FEMENINOS :

GRAN SENSIBILIDAD EN ÚTERO Y OVARIOS, agravados por el movimiento y la menor presión.

Calambres uterinos.

Inflamación del útero con dolores ardientes.

OVARITIS; dolores ováricos picantes al respirar profundamente y DOLOR VIOLENTO EN EL OVARIO DERECHO, COMO SI SE DESGARRARA, AGRAVADO POR LA PRESIÓN Y EXTENDIÉNDOSE AL MUSLO.

Ello nos hace pensar comparativamente en apis, crocus, iodum, lilium, lycop., phytol.

Frecuentes hemorragias nasales al aparecer las reglas.

REGLAS MUY PRECOCES Y ABUNDANTES QUE EMPEORAN por el MOVIMIENTO, acompañadas de dolores desgarrantes y punzantes en las piernas.

DISMENORREA, reglas con dolores ováricos; cada período menstrual se acompaña de marcada congestión ovárica y gran sensibilidad al contacto.

Sensibilidad en ambas ingles que aumenta a medida que se aproximan las reglas, extendiéndose en forma de dolor a todo el vientre y durando hasta que desaparezca la menstruación (Kent).

La paciente de bryon. es pasible de AMENORREA, o bien las reglas se SUPRIMEN A LA MÁS LIGERA PROVOCACIÓN; si se acalora después de un ejercicio violento, operación de limpieza, etc., días antes del período, este no aparecerá y a la vez siguiente será sumamente doloroso; lo mismo puede encontrarse en jóvenes plétoricas en que después de un ejercicio violento nota orina escasa, doloración abdominal y el flujo no aparece o se atrasa algunos días (Kent).

REGLAS SUPRIMIDAS CON SECRECIONES VICARIANTES y dolor de cabeza; si la supresión de las reglas trae hemoptisis o hematemesis, puede pensarse en puls. y en phosph. además de bryon; si hay tos con expectoración sanguinolenta, senecio, hamam., ustil., millef., etc. (Farrington).

Irregularidades menstruales con síntomas gástricos; dolores intermenstruales con gran sensibilidad abdominal y pelviana. (Boericke).

En los intervalos entre reglas, secreción de sangre rojo oscuro con dolores renales y de cabeza; este síntoma, acompañado de náuseas, lo tienen también arnica, bell., bovis., ambra, calc. c., hamam., ipeca, phosph., sabina.

DOLORES EN LOS SENOS DURANTE LAS REGLAS (calc. ostr., senos calientes y doloridos; conium senos grandes, duros y doloridos; helon. y lac. can., senos hinchados y doloridos, lo cual desaparece al aparecer el período; murex, dolores en los senos y "bearing down" durante las reglas; que son irregulares, abundantes, frecuentes; phytol., dolores antes y después de las reglas; graph., puls., y sanguin., tienen también estos síntomas).

Al comienzo de abscesos de seno, cuando hay dolor, hinchazón, pesadez y dureza, bryon. es el remedio indicado; si el seno tiene tendencia a supurar, adopta la forma de una torta ("gateau").

Phytol; si hay dolores en los canales galactóferos entre una y otra mamada, Phell. acuat.

Si hay dolor que irradia del pezón a la espalda, al tomar el lactante, crot. tigl.

Amenaza de aborto después de ejercicio exagerado y por haber tomado calor (Kent).

Aparato respiratorio

NARIZ :

CATARRO NASAL, con GRAN SEQUEDAD DE MUCOSA, o más frecuentemente, con secreción amarilla, poco espesa.

CORIZA SECA CON DOLORES TIRANTES EN LA FRENTE.

Hinchazón en la punta de la nariz, con sensación de ulceración al tocarla.

Bryon. es indicado cuando hay SUPRESIÓN BRUSCA DE SECRECIÓN, si ha sido causada un dolor fuerte de cabeza localizado sobre el sinus frontal.

Lach. puede confundirse en tal caso si no se tienen en cuenta las características de cada uno (Farrington).

Frecuentes epistaxis matinales durmiendo, o por reglas suprimidas.

LARINGE :

Sequedad de laringe y tráquea.

Ronquera, peor al aire libre.

TOS SECA, BRUSCA, provocada por cosquilleo en laringe y parte superior de la tráquea.

BRONQUIOS Y PULMONES :

Deseos frecuentes de hacer inspiraciones profundas (cactus, ignat., natr. sulf.).

DOLORES AGUDOS, PUNZANTES, PICANTES EN EL PECHO, AGRAVADOS POR EL MENOR MOVIMIENTO.

RESPIRACIÓN IMPEDIDA POR PUNTADAS EN EL PECHO.

RESPIRACIÓN RÁPIDA, DIFÍCIL, PEOR CON CADA MOVIMIENTO, POR PUNTOS DOLOROSOS EN EL PECHO.

Estos dolores agudos de pecho los tienen : ranunc. bulb. el verdadero remedio de la neuralgia intercostal; gault., remedio de la pleurodinia con dolores de mediastino anterior; arnica, si predomina el dolor con sensación de magulladura, de rotura; rhus. rad., cuando en la pleurodinia hay dolores latentes en la espalda; senega, en personas gruesas de músculos flácidos, cuando en caso de resfrío hay dolores en el pecho y paredes torácicas; mucha mucosidad y ronquera; la sequedad de garganta impide al paciente hablar.

Rum. crisp., dolores picantes como de agujas en pulmón izquierdo; trif. prat., crisis de tos y sofocación de noche al toser; act. rac., con pleurodinia peor del costado derecho principalmente en personas nerviosas; kali carb., dolores picantes, punzantes en el pecho, sobre todo a la derecha (Farrington).

TOS SECA, AGRAVADA POR EL MOVIMIENTO, AL PASAR DEL AIRE LIBRE A UNA HABITACIÓN CALIENTE (natr. carb.) o DESPUÉS DE HABER COMIDO.

A veces se acompaña de vómitos.

Provoca dolores de cabeza y pecho, que debe oprimir con sus manos al toser. (eupat., natr. sulf.) tos con sensación como si el pecho fuera a estallar en pedazos.

MUCOSIDAD TRAQUEAL TENAZ, que cuesta mucho desprender.

BRONQUITIS AGUDA, con dolores detrás del esternón y disnea.

Bryon ES ÚTIL EN LA NEUMONÍA, sobre todo si hay localización derecha y dolores agudos, punzantes, tos seca, expectoración poco abundante, fibrosa, color herrumbre, signos físicos de hepatización notables a la auscultación.

Calma acostado sobre el lado enfermo, mientras que phosph. sobre el lado izquierdo.

En tal caso bryon. sigue a acon. cuando la piel está menos caliente, la facies menor roja, el paciente menos agitado, la tos es menos seca, menos irritante y menos atormentante; no hay ya síntomas de miedo y angustia propios de acon. y en este caso puede pensarse también en ant. tart., sangu., chelid.

Bryon es útil en la pleuresía, cuando hay puntadas en el costado agravadas por el movimiento.

La primera curación franca de pleuresía con bryon. de que se tiene cuenta, fue en 1822, por el Dr. Gross.

Después se fueron observando otros medicamentos útiles y hasta indispensables a veces tales como acon., arnica, merc., digit., y sulf., phosph., ipeca, chamom., bell. (Dr. Espanet).

Aparato circulatorio

Corazón nervioso e irritable con estados agudos tales como endocarditis o pericarditis.

"Los fenómenos agudos cardíacos de bryon., corresponden a la pericarditis.

Los movimientos del corazón son más acordes y menos tumultuosos que los de acon. y bell.; no se encuentra el orgasmo sanguíneo de este último pero hay dolores muy vivos, sensación de tensión precordial, síncope inminente y generalmente un estado artrítico". (Espanet).

Dorso y extremidades

Rigidez dolorosa de nuca; rigidez y dolores en región renal.

Dolores punzantes y picantes o desgarrantes, o entumecimiento doloroso - toda naturaleza reumática - o en región renal; mejoría general por el reposo y agravación por el movimiento.

En la mielitis aguda bryon. actúa sobre la inflamación de las serosas que envuelven la médula (Espanet).

Dolores y rigidez en los músculos.

Articulaciones rojas, hinchadas, calientes, con dolores punzantes agravados por el movimiento y el menor tacto.

Reumatismo articular agudo con hinchazón de articulaciones que son muy sensibles al tacto siendo imposible el menor movimiento.

La piel que cubre la articulación hinchada está roja, brillante, tensa y caliente.

El calor local y el reposo calman este reuma que no tiene tendencia a cambiar de lugar, ocurriendo lo contrario con puls., colchic., cauloph., y benz. ac.; apis y sulf. pueden completar la acción de bryon.

Dolores tractivos en todo el brazo, hombro y antebrazo hasta los extremos de los dedos; dolor de luxación en muñecas al moverlas.

Manos hinchadas.

Punzadas en el muslo con dolores insoportables al tacto y movimiento.

Dolores tirantes, punzantes, desgarrantes, de CIÁTICA; o dolor como de ulceración subcutánea localizado particularmente en la región lumbar y que se extiende al muslo.

Calma acostado sobre el lado dolorido.

Rodillas rígidas y dolorosas.

Puntadas tensivas y tractivas en pantorrillas hasta los tobillos.

Hinchazón de piernas y pies.

MOVIMIENTO CONSTANTE DE BRAZO Y PIERNA IZQUIERDOS; que recuerda el desplazamiento unilateral automático de helleb.

Piel

Seborrea grasosa.

Transpiración oleosa de cuero cabelludo, de olor agrio.

Erupciones flictenoides con comezón y ardor.

Bryon es útil en la rubéola cuando el rash aparece tardíamente y muestra una evolución lenta; igualmente cuando viene acompañada de inflamaciones respiratorias con tos seca y dolorosa.

Fiebre

Sensación de frío y escalofríos con fatiga muscular, calor en la cara y sed.

Calor seco interno y externo con grandes deseos de bebidas frías.

Sudores abundantes, fáciles, calientes, de olor agrio, por la noche y por la mañana que producen alivio.

Pulso frecuente, duro, tenso, como el de acon., influenciado por todo movimiento corporal.

En la fiebre TIFOIDEA, bryon. es indicado por la sintomatología siguiente : sensibilidad en todo el cuerpo con sensación de fatiga; todo esfuerzo le cansa : dolor de cabeza frontal, angustiante, con sensación de que su cabeza va a estallar y agravado por el menor movimiento; hasta por el simple movimiento ocular; hacia la noche la cara puede estar muy roja; por la mañana hemorragia nasal precedida de sensación de congestión, de plenitud de cabeza; fiebre elevada y sueño agitado; sueña con sus ocupaciones, delira, cree estar fuera de su casa y pide que le lleven a ella; hay gran sed y bebe, a intervalos largos, grandes cantidades de agua fría a la vez; otras veces puede faltar esta sed; cuando conviene bryon hay constipación; si el individuo evacua, la deposición es muy dura, seca, color marrón o negro, y con dificultad a causa de la atonía rectal.

Relaciones

Antídotos

Acon., chamom., nux vom.

Complementarios

Alum., rhus tox y bryon se siguen bien el uno al otro, pero dados juntos se antidotan.

BUFO RANA

Con este nombre se designa al medicamento preparado con el líquido contenido en las glándulas situadas en el lomo del sapo.

Pese a su aspecto horroroso y a su fama de segregar veneno, conocida desde la época de Hipócrates, esto que fue causa de que la repugnancia de pensar en un remedio preparado con semejante animal lo sumiera en el olvido por siglos, cambió de aspecto cuando la experimentación hahnemanniana nos dio un remedio más, bien útil por cierto en muchos casos.

Las tres primeras dinamizaciones se obtienen por trituración hahnemanniana del veneno en azúcar de leche; las más altas por diluciones hahnemannianas sucesivas.

Acción general del medicamento

Todos los autores reconocen que el sapo posee una función venenosa por secreción de dos categorías de glándulas cutáneas, por la sangre y las glándulas genitales.

Las glándulas cutáneas segregan un líquido mucoso que permite al animal resbalar entre las manos de quienes pretenden asirlo; esta sustancia parece ser apenas tóxica.

En cambio, el producto lechoso de las otras glándulas, llamadas granulosas, es venenoso.

Están agrupadas principalmente a los costados del cuerpo, algo atrás de la cabeza.

La secreción de estas glándulas posee dos principios activos : la bufotalina y la bufotenina.

La acción fisiológica de estos productos se asemeja a la de la digitalina.

Recordemos el hecho señalado por los viejos autores, que el polvo obtenido de productos extraídos del sapo excita la secreción urinaria y dan buenos resultados en la hidropesía.

De acuerdo con los resultados de la patogenesia, notamos que el bufo rana actúa sobre el organismo de la siguiente manera : AFECTA PROFUNDAMENTE EL ESPÍRITU Y LAS FACULTADES INTELECTUALES, produciendo confusión, pérdida de memoria que va en aumento hasta llegar a verdadera imbecilidad.

Produce olvido completo de todo lo retenido, excita la masturbación a continuación de lo cual pueden sobrevenir verdaderas crisis epiléptiformes.

Estos síntomas son generalmente precedidos de particular excitabilidad durante la cual el paciente pronuncia palabras incoherentes y se vuelve susceptible, porque no le entienden lo que dice.

A las convulsiones sucede sueño profundo. (Farrington).

Puede actuar también sobre MUCOSAS Y PIEL, produciendo ulceraciones, lesiones, todo esto en individuos proclives a imbecilidad, confusión o debilidad de espíritu.

Modalidades

Agravación

En habitación caliente.

Al despertar.

Mejoría

Por el aire frío o baños fríos.

Poniendo los pies en agua caliente.

Síntomas mentales

DESEO DE ESTAR SOLO PARA MASTURBARSE; falta de dominio, ausencia de control sobre sus deseos sexuales, bajeza de espíritu, abandono al vicio y las prácticas más sucias (Kent).

LLORIQUEA hasta llegar a una especie de estado comatoso; esto se manifiesta principalmente en adultos que se comportan como niños; aspecto de simpleza infantil; parecen retornar a un estado de inocencia infantil.

El adulto adopta actitudes propias de la infancia, en un estado de imbecilidad.

Estado mental sin desarrollo; mientras que el cuerpo ha crecido la inteligencia parece seguir siendo la de un niño llorón y gritón.

(Bar. carb.); ambos convienen a individuos que entran en la senilidad antes de contar la edad propia.

Sujetos de 50 años que se conducen como si tuviesen 80 o más, presentando un estado espiritual de inocencia infantil cercano a la imbecilidad.

ESPÍRITU DÉBIL, SIMPLE, INFANTIL, DEBILIDAD DE MEMORIA, IMBECILIDAD, RÍE Y LLORA FÁCILMENTE.

Dice estupideces, ríe de lo que no es risible.

También se afecta fácilmente; nervioso, sensible.

A veces una gran angustia lo obsesiona noche y día.

Camina a lo largo y a lo ancho, retorciéndose las manos, diciendo que algo terrible y espantoso va a ocurrir, aún cuando no tenga motivos para inquietarse; todo ello es producido por la masturbación. (Kent).

Desea la soledad y sin embargo teme estar solo.

A veces monta en cólera, mordiendo cuanto le rodea.

Luego de una fase de apatía, salta del lecho para correr como un loco por la casa (Kent).

Aquí se aparta momentáneamente de su imbecilidad para entrar en una excitación espiritual a veces violenta.

Si no es comprendido se enoja, pudiendo aproximarse al estado de locura.

Cabeza

Dolores congestivos.

Sensación como si un vapor caliente le subiera al tope de la cabeza.

Cara cubierta de sudor.

Ojos

No puede tener ante su vista objetos brillantes.

Vista muy aguda, pupilas muy dilatadas, y antes de una crisis epiléptica no reaccionan a la luz (Kent).

Estado paralítico de los músculos del ojo y párpados.

Pequeñas ampollas se forman sobre el ojo; ulceraciones de córnea.

Oídos

La música le es intolerable (ambra); le provoca cierto estado de inquietud.

El oído está tan exagerado, que el menor ruido le resulta molesto.

Aparato digestivo

Tartamudea y se enoja cuando no le entienden (Kent).

Se muerde la lengua durante las crisis epiléptiformes.

La lengua está agrietada, y su color es azul-negruzco (Kent).

Antes de la crisis, la boca está muy abierta, lo cual indica la proximidad del espasmo; este estado aumenta a tal punto, que cuando no hace crisis el maxilar inferior cae, dándole un aspecto de idiotez (Kent).

Vómitos después de haber bebido, vomitado líquido amarillo.

Vómitos de bilis o de sangre.

Las crisis terminan en movimientos convulsivos del abdomen, donde se inician también dichas crisis, es decir, antes de las crisis hay sensación abdominal de angustia, de inquietud.

Órganos genitales

MASCULINOS :

Algunas mujeres indígenas, cuando están cansadas de la asiduidad de sus maridos, les dan a beber mezclado en las bebidas, secreciones oleosas de glándulas dorsales de lomo de sapo, con el fin de producirles estado de impotencia. (Farrington).

"Durante las experimentaciones los órganos genitales están a veces en estado de excitación, otras de impotencia, pero en ambos casos el paciente acusa un estado espiritual tal que tiene sus manos continuamente sobre sus órganos genitales" (Kent).

El esperma es vertido demasiado rápido, en un coito demasiado breve, sinsensación de placer.

Inflamación de ganglios inguinales como bubones.

FEMENINOS :

El rasgo más frecuente es la sensación de quemadura en ovarios y útero.

Es una de las peores sensaciones cuando en un caso de dismenorrea aparece esta sensación, en ovarios y pelvis, al comienzo o durante las reglas.

A la sensación de quemadura en ovarios y órganos genitales se agrega una doloración desgarrante con tirones a lo largo de los muslos.

Esto configura un tipo de dismenorrea muy molesto, máxime cuando al mismo tiempo hay quistes ováricos.

Calor ardiente y puntadas en los ovarios.

En útero dolores ardientes, sensación de hinchazón o calambres.

Gran calmante de los dolores del carcinoma uterino, irradiados a muslos, piernas, con leucorrea sanguinolenta y mal oliente (Kent).

Menstruación suprimida, reglas muy precoces con dolores de cabeza.

Espasmos epileptiformes antes de las reglas.

Las niñas epilépticas acusan un aumento de sus espasmos en el momento de las reglas (Kent).

Dolores contractivos en el hígado durante las reglas (Kent).

"Bufo ha sido un gran calmante útil en el cáncer de mama, cuando hay dolores ardientes, y en la zona de tumor aparecen ampollas subcutáneas llenas de serosidad amarilla" (Kent).

Circulación

Palpitaciones.

El corazón parece demasiado grande.

Sensación de constricción en torno al corazón.

Flebitis.

Las venas dan la sensación de ser como tirillas de látigo sobre el muslo (Kent).

Respiración

Sensación de quemadura, excoriación, en la laringe.

Tos violenta con vómitos, o con esfuerzos para vomitar.

Sensación de frío en los pulmones, o de quemadura, como si hubiese fuego en los pulmones.

Expectoración sanguinolenta, o bien totalmente sanguínea.

Dorso y extremidades

Crisis de epilepsia asociadas a excitaciones sexuales o a masturbación; el aura parece partir del plexo solar u órganos genitales.

La crisis puede también ir precedida de estado de irritabilidad espiritual durante el cual el paciente habla incoherentemente y se siente ofendido al ver que su lenguaje no es comprendido.

A la crisis generalmente sigue profundo sueño. (Farrington).

Las crisis comienzan con una sacudida en la nuca (Kent).

Piel

Ampollas, burbujas que revientan y dejan carne viva, dejando correr un líquido icoroso.

Ampollas en palma de manos y planta de pies.

Sensación de quemaduras y comezón.

Algunos sitios de la piel son insensibles, en otros la sensibilidad aumenta. (Kent).

Relaciones

Antídotos

Lach., senega.

Complementario

Salamandra.

CACTUS GLANDIFLORUS

Planta de la familia de las Cactáceas, originaria de Jamaica y México; crece en las costas del Mediterráneo y se la cultiva en invernáculos; planta ornamental.

La tintura se obtiene de las ramas frescas y tiernas, y también de las flores; a partir de esta tintura, las diferentes dinamizaciones se obtienen por diluciones hahnemannianas.

Acción medicamentosa

Sobre las fibras musculares, principalmente corazón y arterias.

Determina sensación de CONSTRICCIÓN COMO POR UN ANILLO DE HIERRO.

Acción sobre el corazón y vasos que determinan SENSACIÓN DE CONSTRICCIÓN COMO POR UN TORNIQUETE, gran característica del remedio.

Características

SENSACIÓN DE CONSTRICCIÓN COMO POR UNA BANDA, UN ANILLO DE HIERRO QUE COMPRIME EL ÓRGANO DONDE DICHA SENSACIÓN SE SIENTE : corazón, pecho - mediastino - pudiendo sentirse también en vejiga, vagina, esófago, útero, recto, en fin, dicha sensación es tan característica de cactus como la sensación de plenitud lo es de aesc. (Nash).

CONGESTIONES SANGUÍNEAS EN PERSONAS PLETÓRICAS, determinando a menudo HEMORRAGIAS; apoplejía sanguínea. (Allen).

Modalidades

Agravación

Acostándose sobre el lado izquierdo, caminando, subiendo escaleras, y entre 11 a.m. y 11 p.m.

Mejoría

Al aire libre.

Síntomas mentales

Síntomas propios de cardíacos; MELANCOLÍA, TACITURNOS, TRISTEZA, MALHUMOR.

Detesta hablar y ama la soledad; ansiedad más marcada a la noche.

TEMOR A LA MUERTE.

La constricción intermitente repetida aumenta la MELANCOLÍA ANSIOSA; piensa que su enfermedad es incurable. (ars. alb., acon.).

Sueño

Duerme mal; sueño perturbado por pulsaciones que experimenta tanto en el hueco epigástrico, oreja derecha, a lo que acompaña a menudo sensación de constricción precordial, que lo despierta.

Cabeza

Dolor de cabeza si deja pasar la hora de comer (ars. alb., lach., lycop.); sensación de peso sobre el vértex mejorada pasajera por presión fuerte (menyant).

Este dolor presivo de cactus se observa sobre todo en la menopausia y se acompaña de impresiones constrictivas de cuello, pecho y abdomen (lach).

Dolor de cabeza con amenaza de apoplejía; hemicrania derecha; dolor constrictivo que se repite a la misma hora del día (cedron, spig., bell., glonoin.).

Simultáneamente con los dolores de cabeza, perturbaciones visuales : CREE VER CÍRCULOS DE LUZ ROJA.

Vértigos relacionados con el estado cardíaco provocados o agravados por esfuerzo físico, al darse vuelta en el lecho, sentarse, levantarse, agacharse, caminar, respirar profundamente.

Digestión

BOCA :

Sequedad de lengua, que está como asada; necesidad de tragar mucho líquido para que bajen los alimentos.

FARINGE : CONSTRICCIÓN SOFOCANTE EN LA GARGANTA, CON SENSACIÓN DE PLÉTORA; LATIDOS EN LAS CAROTIDAS EN LA ANGINA DE PECHO; se queja de tener la garganta constreñida como por una mano de hierro.

ESTOMAGO :

Constricción, acompañada de peso, y pulsaciones violentas en hueco epigástrico.

Náuseas con VÓMITOS SANGUÍNEOS.

ABDOMEN Y DEPOSICIONES :

Sensación COMO SI EL ABDOMEN estuviese RODEADO POR UN CÍRCULO DE HIERRO :

CONSTRICCIÓN RECTAL; PESADEZ ANAL CON CONSTRICCIÓN; deseos urgentes sin resultado; hemorroides hinchadas, dolorosas, HEMORRAGIAS INTESTINALES.

Aparato urinario

CONSTRICCIÓN DE CUELLO VESICAL causando retención urinaria, HEMORRAGIA VESICAL con coágulos que obstaculizan la uretra y al causar retención, éste se acompaña de espasmos vesicales; a menudo resultado de hemorragias congestivas vesicales que sobrevienen durante ciertas afecciones cardíacas.

Órganos genitales

Sensación de CONSTRICCIÓN UTERINA Y OVARICA con dolores pulsátiles que se extienden a los muslos.

Reglas precoces de SANGRE NEGRA COMO ALQUITRÁN (cocc., magn. carb) que se detienen cuando la enferma se acuesta (bov., caust.), acompañadas con síntomas cardíacos y precedidas de violentas palpitaciones.

Otros medicamentos que detienen las reglas si la paciente se acuesta : cyclam., hamam., y puls.

Respiración

NARIZ; PECHO y PULMONES :

NARIZ.

EPISTAXIS con cara pálida.

OPRESIÓN CON SENSACIÓN DE CONSTRUCCIÓN QUE DIFICULTA LA RESPIRACIÓN al no poder dilatar el pecho.

Irritación diafragmática con gran dificultad para respirar.

Sensación dolorosa COMO SI HUBIESE UN PESO ENORME SOBRE EL PECHO, con disnea, que impide al paciente acostarse.

La disnea puede ser continua, acentuándose al menor esfuerzo, o sobreviene por accesos acompañados de desfallecimiento cardíaco y sudor frío.

Generalmente estos síntomas pulmonares son el resultado de congestión pasiva relacionada con una cardiopatía.

Sensación de constricción, en medio del esternón, análoga a la que encontramos en bovista; éste último presenta a su vez como característica, SENSACIÓN COMO SI LA CABEZA ESTUVIESE AGRANDADA.

ESPUTOS SANGUINOLENTOS O VERDADERA HEMOPTISIS acompañados de palpitations violentas que imposibilitan acostarse sobre el costado izquierdo, con hipertrofia cardíaca con latidos irregulares.

Circulación

SENSACIÓN DE CONSTRUCCIÓN CARDIACA OBSTACULIZANTE DEL MOVIMIENTO NORMAL DEL CORAZÓN (ars. alb., iodum, lil. tig., lach., nux mosch.).

SENSACIÓN DE PESO EN REGIÓN PRECORDIAL CON DOLORS AGUDOS Y PICANTES en la punta del corazón, e irradiaciones DOLOROSAS EN EL BRAZO IZQUIERDO.

PALPITACIONES CONTINUAS, VIOLENTAS, AGRAVADAS AL ACOSTARSE SOBRE EL COSTADO IZQUIERDO, O DURANTE LA MARCHA, O AL APROXIMARSE LAS REGLAS.

Se acompañan de DIFICULTAD EN LA RESPIRACIÓN, Y SE CALMAN RESPIRANDO AIRE FRÍO; estas palpitations pueden repercutir en todo el cuerpo.

GRAN IRREGULARIDAD DEL TRABAJO CARDIACO; PULSO INTERMITENTE, SOPLOS VASCULARES.

HEMORRAGIAS por congestiones, consecuencia de trastornos cardíacos, que se localizan en cualquier órgano.

En la ANGINA DE PECHO, cactus es indicado por su característica : CONSTRUCCIÓN PECTORAL, COMO SI FUESE UNA MANO DE HIERRO CON ADORMECIMIENTO DEL BRAZO IZQUIERDO Y DOLOR DEL DEDO MEÑIQUE.

Sobre todo cuando la crisis es precedida de trastornos intestinales, pesadez anal y deseos urgentes de evacuar sin resultado (acon., amyl. nitr., glonoin., lach., lil. tigr.).

HIPERTROFIA CARDIACA en jóvenes que practican deportes abusivamente y sin entrenamiento progresivo (arnica, rhus tox).

ENDOCARDITIS con respiración dificultosa, coloración facial azulada, igual en las extremidades, dolores cardíacos picantes, tos seca, imposibilidad de acostarse sobre la izquierda, pulso rápido, duro, tenso y saltón.

En el CORAZÓN TABAQUICO : cactus es el remedio por excelencia para la ANGINA DE PECHO DE ORIGEN TABAQUICO (tabac., nux vom. y calad. pueden ayudar, pues ayudan al paciente abandonar la costumbre de fumar).

En cardiopatías crónicas cactus es indicado cuando la cara está cianótica y edematizada, respiración sofocante, etc.

Dorso y extremidades

Dolores reumáticos desgarrantes y tirones en las articulaciones, reumatismo que comienza por las extremidades superiores, como en kalmia, y contrario a ledum, que comienza por las inferiores.

Edemas de pies, piernas y manos, particularmente LA IZQUIERDA.

ADORMECIMIENTO DEL BRAZO IZQUIERDO con dolor picante en el MEÑIQUE, sobre todo de noche.

Puede sobrevenir aisladamente, pero a menudo está relacionado con el dolor constrictivo de angor pectoris; esto recuerda a acon.; también puede ser doloroso como el adormecimiento de rhus tox aunque no mejora con el movimiento como este último.

Fiebre

Accesos periódicos que vienen a las 11 a.m. y a las 11 p.m. en los cuales predomina el frío con escalofríos en espalda y manos heladas, juntamente con los signos cardíacos característicos del remedio.

Accesos palúdicos en los que predomina el estado cardíaco característico.

Relaciones

Antídotos

Acon., camph., china.

Remedios que siguen bien

Digit., eupat., lach., nux vom. y sulf.

CALCÁREA CARBONICA U OSTREARUM

Carbonato de calcio es uno de los cuerpos comunes en la naturaleza.

Se lo encuentra bajo las formas más variadas, tanto en el reino mineral, como en el vegetal o en el animal.

Más o menos puro, constituye mármoles, tiza, etc.; forma la caparazón de moluscos y crustáceos y el esqueleto de los animales.

Insoluble en agua pura y en alcohol, se disuelve en aguas cargadas de ácido carbónico.

Nuestro medicamento se prepara triturando la capa media de la concha de la ostra donde Hahnemann pensaba encontrar carbonato de cal perfectamente puro.

En realidad, no es así y el remedio así obtenido encierra gran cantidad de carbonato de cal, pero mezclado con vestigios de fosfato de cal y substancias orgánicas.

Por eso Hering propuso cambiarle el nombre de calc. carb. por el de calcárea ostrearum.

Es uno de nuestros grandes policrestos que puede ser indicado en gran número de enfermedades, pudiendo compararse su importancia, solamente a la de sulfur.

Acción general del medicamento

Posee acción profunda sobre los cambios intersticiales de los tejidos, la esfera de la vida vegetativa, la nutrición íntima de los leucocitos, el desarrollo de los huesos y la médula, el aumento de líquido en el organismo (Dr.

Mouzezy-Eon, Les doctrines de l'Homeopathie , p. 239).

Como sus compuestos : calc. phosph. y calc. fluor., y todas las sales de cal engeneral, calc. ostr. afecta muy profundamente LA NUTRICIÓN GENERAL, por eso se mostrará, sobre todo, activo en todos los períodos y circunstancias de la vida EN QUE EL ORGANISMO SUFRA UNA EVOLUCIÓN MAS ACTIVA; en la infancia, durante el crecimiento, juventud, pubertad, momentos de desarrollo intenso; edad madura, especialmente en la mujer, en el momento de retroceso de las funciones sexuales, la vejez, en fin, es uno de nuestros principales modificadores terapéuticos para todas las edades, pero es un medicamento indispensable en la infancia. (Espanet).

Actúa en forma muy marcada sobre el TEJIDO ÓSEO, cuyo desarrollo preside con calc. phosph. y calc. fluor.

Una de sus particularidades es la de producir EXOSTOSIS; esto proviene de la irregularidad en la distribución de la cal; puede acumularse en un lugar y estar casi ausente en otro; un hueso podrá estar cartilaginoso hasta el punto de deformarse a causa de la ausencia de calc. ostr. o al contrario, tener en otro lugar grandes formaciones óseas sólidas a causa de la acumulación de calc. ostr. (Kent).

También actúa grandemente sobre EL TEJIDO LINFOIDEO; experimentalmente, bajo su influencia, los ganglios se hipertrofian, se inflaman y supuran, especialmente cervicales y mesentéricos.

Kent escribe : "Una característica de este remedio es su tendencia a atacarlos ganglios del cuello y de todo el cuerpo; los del abdomen se induran y se inflaman; están dolorosos y dan la impresión de tubérculos, en degeneraciones ganglionares, induración de ganglios, ganglios calcificados".

Su acción sobre la CIRCULACIÓN es notable.

"Cuando se introducen en el organismo sales de cal solubles, muestran una acción casi específica sobre el músculo cardíaco cuya contracción es aumentada de vigor y se prolonga, mientras que su dilatación es retardada; los vasos están igualmente contraídos y la presión sanguínea se eleva.

Al mismo tiempo, la coagulación de la sangre aumenta.

Fuertes dosis inyectadas en la circulación producen una depresión profunda del sistema nervioso central, y las fuertes dosis empleadas en el caso de ciertas neurosis espasmódicas, agravan en lugar de producir un efecto sedante.

No se conocen detalles con respecto a la acción que ejerce sobre la sangre, excepto la de la coagulabilidad.

Es útil en ciertas anemias secundarias y he visto producirse una agravación pronunciada de la anemia secundaria, administrándolo en dosis de 30 gr. por día o más". (Dr. E. A. Neably.).

Cualquiera sea la explicación de su acción sobre la sangre el remedio responde en alto grado a TEMPERAMENTOS CLOROTICOS con tez pálida, color de cera, y un poco gordos.

Provoca una anemia extremadamente perniciosa, con gran relajamiento de tejidos en todo el organismo, particularmente músculos y paredes de los vasos sanguíneos y especialmente venas, ya sea hemorroidales o de los miembros inferiores; están dilatadas, várices con sensación de ardor y escozor; pueden estos enfermos ser entrados en carnes, característica de la cal; gordos, fofos, pálidos; pero hay casos en que son delgados, con musculatura atrofiada, todo el cuerpo flaco, desde el cuello hasta los pies; en ambos casos, su piel es pálida, color de cera y su color enfermizo; sus labios, orejas, mejillas, dedos son pálidos o amarillentos, vacíos de sangre; especialmente en los jóvenes. (Kent).

Puede haber mucha irregularidad circulatoria que se traduce en TODA CLASE DE CONGESTIONES; la sangre tiende a subir a la cabeza; pies fríos y cabeza caliente; sensación de congestión pectoral (Kent).

Si bien no ataca primitivamente el tejido nervioso, si se prolonga o se profundiza su acción se constatan en esta esfera trastornos muy marcados, como excitación, espasmos, etc.

Otra particularidad es la de determinar un ESTADO DE PIOEMIA : abscesos en los músculos profundos, en las partes musculares profundas del cuello, muslos, abdomen.

Se verá con sorpresa que calc. ostr. actúa sobre tales supuraciones cuando los síntomas concuerdan, haciendo reabsorber el pus, sin que el absceso reviente (Kent).

Otro rasgo interesante es su aptitud para excitar la producción de PÓLIPOS.

Los enfermos que necesitan calc. ostr. producen pólipos en nariz, orejas, vagina, vejiga, etc. (Kent).

De todo esto se deduce que si puede clasificarse entre los grandes policrestos, su influencia principal se concentra sobre la esfera vegetativa - siendo el sistema llave de su acción una nutrición imperfecta - y los ganglios linfáticos así como todo el sistema linfoideo, los huesos, la circulación y la piel su principal campo de acción.

Características

CONSTITUCIÓN Y TEMPERAMENTO : "El calcium, gracias a su afinidad con el sistema linfático, preside la función de anabolismo y forma constituciones de esqueleto ancho y talla mediana; engendra fácilmente el temperamento linfático y sus consecuencias : taras.

Cuando se encierra en los límites de su equilibrio, no llega a la torpeza funcional, a los trastornos de la nutrición que corresponden a su decadencia, realiza uno de los tipos de mentalidad más bellos; poderosa asimilación de todas las ideas que el mundo le sugiere; poder de organización lógica, de generalización vasta, de juicio equilibrado que hacen las grandes inteligencias" (Dr. Mouezy-Eon).

Pero si este equilibrio se rompe, nos encontramos frente a un sujetocaracterístico constituido por el desequilibrio intra-orgánico de calc. ostr. al que Nash designa con tanto acierto con estas dos palabras : "LEUCOPHLEGOMATIC TEMPERAMENT"; para definirlo mejor, agrega : "EL TIPO DEL REMEDIO TIENE UNA CONSTITUCIÓN GORDA, MUY GORDA, TENDIENTE A LA OBESIDAD; SU PIEL ES BLANCA, COLOR TIZA, CON MARCADA DISPOSICIÓN A LA APATÍA, ESPECIALMENTE ACENTUADA EN LOS NIÑOS; SUS MOVIMIENTOS SON LENTOS, PEREZOSOS, Y ESTE ESTADO DE APATÍA DEPENDE DE UNA DEBILIDAD, FALTA DE RESISTENCIA, DE UNA FATIGA DESPUÉS DE TODA CLASE DE ESFUERZO Y QUE ES CARACTERÍSTICA DEL REMEDIO".

TIPO DE TALLA PEQUEÑA, CABELLO RUBIO, A VECES MOROCHO, OJOS AZULES, PIELCOLOR DE TIZA, GANGLIOS DUROS E HIPERTROFIADOS, ABDOMEN VOLUMINOSO, especialmente en la niñez. TEJIDOS HINCHADOS Y BLANDOS, PIEL FRESCA Y HÚMEDA, SOBRE TODO EN LASEXTREMIDADES; pies y cabeza; el esqueleto, de difícil formación SE DESARROLLA A LO ANCHO, no a lo alto, ni en profundidad : FRENTE ANCHA; DIENTES ANCHOS, MUY BLANCOS; PUNTAS DE LOS DEDOS CUADRADAS; HUESOS FUERTES Y CORTOS.

El cerebro está en relación inmediata con los sistemas sensoriales; la asimilación y el trabajo intelectual son fáciles; gran posibilidad de ideas generales; gran sentido de asociación lógica y matemática; voluntad previsorá fría, potente, tenaz : es un realizador; pero no sabe ejecutar; si las circunstancias no se le presentan, y su cerebro no puede expresarse en la realidad, muestra fácilmente neurastenia cerebral; tiene ideas obsesivas, teme volverse loco; tiene alucinaciones sobre todo durante el crepúsculo. (Dr. Mouzy-Eon).

En lo que concierne particularmente al niño, hemos dicho quecalc. ostr. afecta profundamente la nutrición del organismo, sobre todo durante el crecimiento en que preside el desarrollo de los huesos y de los otros tejidos.

Ciertos sujetos jóvenes tienen una incapacidad especial para asimilar la calalimentaria necesaria para el desarrollo armonioso y la buena nutrición de su organismo y especialmente de su tejido óseo; entonces tenemos síntomas de RAQUITISMO; los huesos se desarrollan tardíamente y mal, mientras hay un estado de linfatismo marcado que se manifiesta en adenopatías múltiples.

Mientras el sistema óseo se desarrolla irregularmente y tarde, las partesblandas exageran su crecimiento, origen del síntoma : TENDENCIA A OBESIDAD EN NIÑOS Y JÓVENES.

(En la pág. 320 del 1er tomo, hay un grabado que muestra el rostro DEL NIÑO DE calcárea carbonica). (Dibujo de P. Théral).

PELO RUBIO, LARGO Y LACIOCARA PÁLIDA, COLOR DE TIZA, MOFLETUDA CARNES BLANDAS PIEL FINA Y DELICADA QUE DEJA VER LAS VENAS POR TRANSPARENCIA RASGOS MUY MARCADOS OJOS AZULES, DILATACIÓN CRÓNICA DE PUPILAS : CEJAS LARGAS Y SEDOSAS LABIO SUPERIOR HINCHADO DIENTES ACANALADOS (Dr. Brissaud).

TRANSPIRACIONES PARCIALES :Calc. ostr.

Transpira fácilmente, pero SOLO SON TRANSPIRACIONES PARCIALES : SUDORES PROFUSOSEN LA CABEZA; en niños cabeza grande y mollera abierta hasta más tarde de lo normal, PERO LOCALIZADOS EN EL CUERO CABELLUDO (bheum., chamom., sanic., silic).

Sudores parciales en la nuca, pecho, axilas, manos, órganos genitales masculinos, rodillas, pies.

Sudores nocturnos en debilitados o tuberculosos (acet. ac., hep. sulf., calc.,silic., stan., etc.).

En todos los sudores de calc. ostr.

LA SUPERFICIE DEL CUERPO Y LAS EXTREMIDADES TIENEN, AL MISMO TIEMPO, UN FRÍO CARACTERÍSTICO.

SENSACIÓN DE FRÍO :Al contrario de sulf., en que hay sensación de quemadura en toda patogenesia, en calc. ostr. hay sensación exactamente opuesta : de frío; PIES FRÍOS Y HÚMEDOS; SENSACIÓN COMO SI TUVIERA PUESTAS MEDIAS FRÍAS, MOJADAS; FRÍO EN LAS PIERNAS, SOBRE TODO DE NOCHE; SENSACIÓN DE FRÍO INTERNO Y EXTERNO EN DIFERENTES PARTES DE LA CABEZA, COMO SI TUVIERA UN TROZO DE HIELO APLICADO CONTRA ELLA, CON CARA PÁLIDA E INFLADA; SENSACIÓN DE FRÍO INTERIOR, AVERSIÓN AL AIRE LIBRE; EL MENOR AIRE FRÍO LE PENETRA.

Modalidades

Lateralidad

Derecha

Agravación

a) POR EL FRÍO : ES FRIOLENTO; TIENE SIEMPRE FRÍO Y EL FRÍO EN TODAS SUS FORMAS LO AGRAVA.

MUY SENSIBLE AL FRÍO CUANDO EL TIEMPO CAMBIA DE CALOR A FRÍO, DIFÍCILMENTE CONSIGUE CALENTARSE.

CUERPO CASI SIEMPRE FRÍO AL TACTO y necesita abrigarse mucho.

b) POR EL TRABAJO INTELECTUAL Y FÍSICO; es un APÁTICO FALTO DE RESISTENCIA que se cansa enseguida.

Mejoría

POR EL TIEMPO SECO; CUANDO ESTA CONSTIPADO.

Acostándose sobre el lado dolorido.

Síntomas mentales

GRAN DEBILIDAD, VERDADERA INCAPACIDAD PARA SOSTENER UN ESFUERZO INTELECTUAL.

Parece desprovisto de toda actividad posible : lento de movimientos, a causa de la DEBILIDAD CUYOS MALOS EFECTOS EXPERIMENTA EN TODO MOMENTO.

El trabajo intelectual le es penoso; aprende, comprende y realiza lentamente, por dos razones : DIFICULTAD PARA FIJAR SU ATENCIÓN Y FATIGA RÁPIDAMENTE PRODUCIDA POR TODO EJERCICIO MENTAL.

Imposibilidad de pensar con atención después de una contrariedad o emoción; EL TRABAJO INTELECTUAL LE TRAE TANTA LASITUD FÍSICA COMO MORAL; EL MENOR ESFUERZO MENTAL LE HACE SUBIR LA SANGRE A LA CABEZA.

Calc. ostr. es muy útil en trastornos provenientes de preocupaciones continuas o de prolongada aplicación a los negocios o "de una existencia demasiado excitante (Kent).

SIN CARÁCTER, DÉBIL, FLOJO, SIN ENERGÍA, MELANCÓLICO, TRISTE, DEPRIMIDO, CON IRRESISTIBLE TENDENCIA A LLORAR, TEMEROSO, ANSIOSO, ASQUEADO DE LA VIDA, ve todo negro, al mismo tiempo puede estar IRRITABLE, IMPACIENTE, CON ACCESOS DE CÓLERA IMPULSIVA; "NIÑOS irritables y tristes, que se asustan fácilmente; miedo al porvenir, no le gusta estar solo.

Esta melancolía, esta ansiedad, esta debilidad intelectual del remedio, va acompañada de PALPITACIONES Y VÉRTIGOS" (Kent).

El enfermo constata por sí mismo su agotamiento cerebral y le parece que esta debilidad, esta incapacidad para obrar y pensar con coherencia lo conducirá a la locura; incuba este pensamiento que aumenta su preocupación y finalmente ancla en su cerebro; TIENE MIEDO A LA LOCURA; ESTA PERSUADIDO DE QUE VA A ENLOQUECER.

El estado mental puede complicarse con una sucesión de aberraciones mentales, como impulsos de correr repentinamente, de subir y bajar rápidamente una escalera, de saltar por la ventana.

Tendencia a hacer cosas raras, a divertirse durante horas con un juguete ridículo, a repetir el mismo movimiento durante días enteros.

Ideas infantiles : PREOCUPACIÓN POR DETALLES, POR COSAS SIN IMPORTANCIA.

Lo que a todo el mundo le parece insignificante, es para él una enormidad y estos pensamientos lo obsesionan hasta el punto de creer que va a volverse loco.

Obsesión espiritual continua, ya sea por el pensamiento de que va a volverse loco, o por la preocupación ridículamente exagerada de cosas sin importancia.

Visiones.

Al cerrar los ojos, ve visiones; IMAGINA QUE ALGUIEN CAMINA DETRÁS SUYO (silic., petrol.).

Aberración mental con visiones horribles.

Sueño

Mucha somnolencia con bostezos durante el día, sobre todo después de cenar; DESEA DORMIRSE TEMPRANO.

Pero de noche más tarde tiene INSOMNIO, o DESPIERTA CON FRECUENCIA, con sobresaltos, gritos; se estremece a cada ruido.

Las ideas se amontonan en su espíritu, impidiéndole dormir o bien, una idea fija lo tiene despierto, en cuanto SE ADORMECE LO ASALTAN IDEAS DESAGRADABLES.

Terrores nocturnos, sueños horribles de enfermedades, de muertos; visiones aterradoras al cerrar los ojos.

Duerme con las manos detrás de la cabeza (puls., y ars. alb., manos sobre la cabeza).

A la mañana despierta agotado.

Cabeza

ERUPCIONES SECAS O HÚMEDAS, MUY PRURIGINOSAS, de cuero cabelludo.

TRANSPIRACIÓN MUY ABUNDANTE EN LA CABEZA, DE NOCHE, DURANTE EL SUEÑO, HASTA EL PUNTO DE MOJAR LA ALMOHADA.

La transpiración se LOCALIZA SOBRE TODO EN FRENTE Y OCCIPUCIO, MIENTRAS QUE EN silic., que también transpira mucho la cabeza, se localiza no solamente en el cuero cabelludo, como en calc. ostr., sino también en cara y cuello.

Rheum tiene abundante y constante transpiración de cuero cabelludo con olor ácido en todo el cuerpo; pero también sudor frío en la cara, especialmente marcado alrededor de la boca y en la nariz que no tiene calc. ostr. - sanic. tiene sudores abundantes en occipucio y cuello durante el sueño pero sin las características que indican calc. ostr. - chamom. tiene transpiración caliente, pegajosa, en frente y cuero cabelludo con síntomas mentales que impiden confundirlo con ningún otro.

Cefalea con dolores tensivos y presivos, con martilleo en la cabeza, y zumbidos en los oídos.

Cefalalgia crónica, peor a la mañana y por el trabajo intelectual.

La jaqueca de calc. ostr.

ENTUMECE AL ENFERMO; LE PROVOCA ESTUPOR, tiene confusión de espíritu.

Jaquecas intensas cuyo dolor se prolonga a lo largo de la nariz, aliviadas por compresas calientes y en la oscuridad.

Jaquecas congestivas con dolores latentes y náuseas; una característica es que EN LA ZONA DONDE LA CONGESTIÓN ES MÁS INTENSA LA CABEZA ESTÁ FRÍA EN EL EXTERIOR.

DOLOR DE CABEZA CON MANOS Y PIES FRÍOS; SENSACIÓN DE FRÍO INTENSO Y EXTERNO, INDIFFERENTES PARTES DE LA CABEZA.

PERO ESPECIALMENTE A LA DERECHA, COMO SI TUVIERA UN PEDAZO DE HIELO

APLICADOS SOBRE LA CABEZA.

VÉRTIGO GIRATORIO con pérdida de equilibrio y tendencia a caer hacia atrás, peor a la mañana y al agacharse, o girar la cabeza.

Vértigo al subir a lugares elevados.

MIEDO AL VACÍO.

EPILEPSIA.

El remedio es útil en ciertas formas de epilepsia precedida de un AURA ESPECIAL : COMIENZA EN EL PLEXO SOLAR Y DE ALLÍ, SUBE O AL CONTRARIO DESCENDE DEL EPIGASTRIO HACIA EL ÚTERO Y MIEMBROS INFERIORES; en otros casos, siente, durante el aura, COMO SI UN RATÓN LE CORRIERA SOBRE EL BRAZO.

Las causas de la epilepsia de calc. ostr. son el miedo, la supresión brusca de una erupción crónica o los excesos venéreos; el remedio actúa bien después de sulf.

Para el Dr. Bantl, es muy útil en casos en que la constitución del enfermo responde a la que es su característica; pero sin embargo, parece haber actuado de manera igualmente útil, hasta cuando los síntomas constitucionales eran poco marcados, para reforzar y hacer duradera la acción de bell.

Cara

Pálida, amarilla, terrosa, enfermiza.

A veces roja y ardiente con hinchazón de un solo lado.

A veces puede haber erupciones pruriginosas en la cara.

Labios secos, hinchados o aperturados, resquebrajados, agrietados, que sangran fácilmente.

Ojos

En un sujeto que ofrece las características constitucionales del remedio se pueden encontrar influencias y trastornos diversos.

Sensación de frío en los ojos.

Conjuntivas rojas, congestionadas.

Párpados rojos, hinchados, con costras y comezón.

Dilatación crónica de pupilas.

Si esta dilatación se observa durante un estado agudo, indica bell.; pero cuando existe de manera constante indica calc. ostr.

Oídos

Inflamación escrofulosa con otorrea muco-purulenta y congestión ganglionar.

Pólipos que sangran fácilmente.

En los oídos como en los ojos, no hay síntomas muy característicos ni especiales.

Hay que tener en cuenta sobre todo la constitución y las características generales.

Aparato digestivo

BOCA :

Gusto ácido y persistente en la boca; la boca se llena de líquido ácido; sensación de quemadura en la boca, peor al masticar.

Mucosa roja, uniformemente o en placas, encías hinchadas y sangrantes.

Lengua roja y lisa.

Dientes anchos, blancos, implantados, casi cuadrados.

Dolores en los dientes al beber agua fría.

En los niños, dentición atrasada.

FARINGE :

Amígdalas hipertrofiadas; sensación de constricción en la garganta, al tragar.

FARINGITIS CON SENSACIÓN DE SEQUEDAD Y DE CONTRICIÓN QUE NO PUEDE LLEGAR ACURARSE.

Calc. ostr. es un excelente remedio para los dolores de garganta crónicos, ensujetos que toman frío tan fácilmente que antes de que cure un dolor de garganta, vuelven a padecer uno nuevo; aquí hay que tener en cuenta esta facilidad del remedio para tomar frío por una nada, a la menor corriente de aire, a la menor humedad.

APETITO :

Hay VIVOS DESEOS DE HUEVOS, SOBRE TODO EN LOS NIÑOS; también le gusta el pan, pero detesta la carne (alum., am., carb. veg., puls., sepia), así como la leche a la que no tolera (aeth. magn. carb., magn. mur., sulf.). También puede tener, a veces, deseo de cosas indigestas : yeso, papel, etc. (alum., cic. vir., nux vom., nitr. ac.). Puede tener a veces escaso apetito, otras verdadera bulimia.

A veces, muy sediento y quiere agua fría (acon., ars. alb., bryon., china, nat. mur.).

ESTOMAGO :

Estómago PEREZOSO Y LENTO; DIGIERE MAL EL ALIMENTO ABSORBIDO QUE PERMANECE EN EL ESTOMAGO DONDE SE PONE AGRIO.

SENSACIÓN DE HINCHAZÓN, DE PLENITUD, en el estómago.

ESTOMAGO HINCHADO, DISTENDIDO, SENSIBLE; y la hinchazón se siente no sólo subjetivamente, sino que es visible en el examen; el epigastrio es prominente como si un plato hondo bajo la piel lo hinchara.

Vómitos AGRIOS, ERUCTOS AGRIOS; TODO PARECE VOLVERSE ÁCIDO, A TODO LO LARGO DEL TUBO DIGESTIVO : eructos agrios, vómitos agrios de leche cuajada en niños de pecho o biberón; diarrea agria; olor agrio en todo el cuerpo (magn. carb., sulf. ac., rheum, iris vers., robinia, etc.).

ABDOMEN Y DEPOSICIONES :

Sensible al tacto.

Flatulento con muchos borborismos.

SENSACIÓN DE FRÍO EN TODO EL VIENTRE, que está distendido y duro.

AUMENTO DE VOLUMEN DE GANGLIOS INGUINALES Y MESENTERICOS que están doloridos.

AUMENTO DE GRASA EN LA PARED ABDOMINAL.

Hernia umbilical, HÍGADO SENSIBLE, CON DOLORS PUNZANTES : DOLORS EN LA REGIÓN hepática al doblarse en dos, al agacharse.

CÓLICOS HEPÁTICOS CON DOLORS DE DERECHA A IZQUIERDA, mejorados al caminar.

Diarrea de color y consistencia variados, pero PEOR A LA TARDE en lugar de ser peor a la mañana como en sulf.

DIARREA CON DEPOSICIONES ÁCIDAS, CON RESTOS ALIMENTICIOS SIN Digerir, con olor muy ofensivo, agravado por la leche, que se produce especialmente en niños del tipo calc. ostr.

DIARREA A LA MENOR EXPOSICIÓN AL FRÍO; al menor resfrío, la menor exposición al frío, provoca diarrea; diarrea que no puede detenerse porque el menor frío, la menor humedad la renueva.

CONSTIPACIÓN, deposiciones duras, grisáceas, adherentes, que no pueden ser expulsadas.

GENERALMENTE SE SIENTE MEJOR CUANDO ESTA CONSTIPADO.

Deposiciones primero duras, después pastosas, finalmente líquidas.

Constipación alternada con diarrea. (ant. crud., chelid. maj., collins., nuxvom., podophyl.).

Órganos genitales

MASCULINOS :

Exaltación del apetito venéreo; deseos sexuales excesivos, pero físicos; erecciones disminuidas o imperfectas.

Durante el coito, eyaculación prematura.

Seguida de vértigo, de dolor de cabeza, debilidad en las rodillas.

Debilidad después del coito.

Calc. ostr. forma con sulf. y nux vom. un pequeño grupo de medicamentos sugeridos por JAHR para la debilidad sexual después de exceso de coito o masturbación. (Farrington).

FEMENINOS :

Sudor abundante en la zona de las partes genitales externas; ardor y comezón en la vulva antes y después de las reglas.

Comezón y ardor en la vulva en las niñas, REGLAS QUE HACEN ESPERAR que DEMORAN EN LLEGAR, EN EL MOMENTO DE LA PUBERTAD, en jóvenes de apariencia plétórica pero que tengan hiperleucocitosis, y se quejan de congestión de cabeza y pecho, de disnea, palpitaciones, dolores de cabeza, etc. (fer. met., graph., kali carb., nat. mur., puls.) (Kent).

MENSTRUACIÓN DEMASIADO TEMPRANA, demasiado profusa, demasiado larga, y demasiado abundante, con amenorrea consecutiva, REGLAS ADELANTADAS Y ABUNDANTES CON PIES FRÍOS, COMO SI TUVIERA PUESTAS MEDIAS MOJADAS : reaparecen a la menor agitación.

LIGERO CORRIMIENTO DE SANGRE POR LA VAGINA FUERA DE LA ÉPOCA DE LAS REGLAS, lo que recuerda a ambr. gris., bovista, hamam., phosph., sabina, silic, etc. de los cuales hay que diferenciarlo.

La menor agitación mental hace reaparecer las reglas; una contradicción, emoción, un altercado poco serio bastan para ocasionar reaparición de reglas.

Leucorrea lechosa, mucosa, bastante profusa, sin acritud.

Leucorrea antes de la pubertad en las niñas.

Pólipos uterinos (bell., phosph., teucr., thuya).

SENOS CALIENTES Y DOLORIDOS ANTES DE LAS REGLAS (conium, etc.).

Nódulos en los senos.

Aparato respiratorio

NARIZ :

Coriza : SIENTE FRÍO EN CADA CAMBIO DE TIEMPO, A LA MENOR CORRIENTE DE AIRE.

"Calc. ostr. es útil de manera general y preponderante en niños escrofulosos propensos a resfriarse fácilmente" (Charge).

Catarro crónico con grandes costras en las fosas nasales y corrimiento amarillo, espeso.

Pólipos en la nariz.

Epistaxis.

LARINGE :

Ronquera crónica en individuos escrofulosos, del tipo de calc. ostr.

RONQUERA SIN DOLOR, PEOR A LA MAÑANA (aur. triph., caust., hep. sulf., nuxvom.).

BRONQUIOS Y PULMONES :

A continuación, en grandes trazos los síntomas pulmonares de calc. ostr. : dolor DEL LADO DERECHO del pecho; rales mucosos más abundantes a la derecha; expectoración purulenta con gran demacración y sudores.

Respiración corta, especialmente al subir escaleras.

Tos seca, de noche, violenta, espasmódica, que puede desaparecer durante el día.

Tos sobre todo a la mañana, con expectoración.

Todo esto recuerda el cuadro de la tuberculosis pulmonar; a este respecto Nash ha escrito lo siguiente : "calc. ostr. tiene la mayor importancia en el tratamiento de la tisis pulmonar, y es uno de nuestros más eficaces agentes, si se emplea juiciosamente, en una época de la enfermedad en que la curación sea aún posible.

Sus indicaciones son : temperamento leucoflegmático; lesión localizada en la parte superior o en la parte media del pulmón derecho (sulf. : en la parte superior del pulmón izquierdo), pecho doloroso al tacto o al inspirar; respiración corta al caminar, pero sobre todo al subir; ronquera indolora agravada a la mañana; es especialmente indicado en mujeres que tienen reglas adelantadas, demasiado profusas, con marcada sensación de frío en pies y rodillas; tendencia a relajamiento de los intestinos, marcada agravación a la tarde; acentuada falta de apetito y demacración progresiva.

Aparato circulatorio

Palpitaciones después del menor ejercicio.

Palpitaciones en la cama con vértigo y sensación de desfallecimiento.

Pulso acelerado y débil.

Espalda y extremidades

Ganglios cervicales, escasos, al contrario, como sarta de perlas, en niños gordos, y que pueden subir hasta debajo del cuero cabelludo. (bar. carb.) Tortícolis; la cabeza tiende a inclinarse hacia el lado derecho.

Dolores en los hombros y entre los hombros, que impiden la respiración, y contribuyen a impedir al enfermo caminar o subir una escalera.

Tirones en la región lumbar y de arriba hacia abajo.

Dolor en la región lumbar, que impide al enfermo levantarse de su asiento, agravado por el reposo, mejorado por el calor.

Encorvamiento de espalda; DESVIACIÓN DE COLUMNA VERTEBRAL.

Entumecimiento general

Al levantarse, al abandonar la silla, etc.

"Se producen TODAS LAS CONDICIONES REUMÁTICAS DE LAS EXTREMIDADES.

Afecciones gotosas de las articulaciones; articulaciones hinchadas, estado gotoso de las pequeñas articulaciones de los dedos y dedos grandes de los pies.

Dolores reumáticos después de exposición a la humedad o de haberse mojado.

El cambio de tiempo y sobre todo el tiempo lluvioso provoca siempre manifestaciones dolorosas en el enfermo de calc. ostr." (Kent).

Violentos dolores, como si la parte enferma fuera arrancada o triturada.

GRAN SENSIBILIDAD DE PIERNAS Y MUSLOS, ya sea después del coito (acompañada entonces de temblor y puede durar varios días), o después de ejercicio físico; aparece rápidamente; músculos anteriores de los muslos sin fuerza, como después de una larga carrera, la debilidad es más acentuada a la mañana; va acompañada de entumecimiento.

PIES FRÍOS Y HÚMEDOS, COMO SI TUVIERA PUESTAS MEDIAS HÚMEDAS.

Pies fríos, helados, de noche; cuando se calientan, se vuelven ardientes, pero no hay que confundir este ardor con el de sulf.

Planta de los pies desollada, en carne viva.

MARCHA TARDÍA EN LOS NIÑOS (caust). (Boericke).

Niños que aprenden a caminar tardíamente porque sus piernas son demasiado débiles, los huesos de sus extremidades inferiores no pueden soportar el peso de su cuerpo.

En natr. mur. el caso es diferente : el atraso con que el niño ejecuta ciertos actos : caminar, etc. se debe a trastornos mentales (Kent) : también se debe comparar con bar. carb.

Piel

Calc. ostr. no tiene sobre la piel una acción tan marcada como sulf.

Sin embargo, es indispensable en afecciones cutáneas que parecen depender de alguna discrasia constitucional a la que cubre de una manera general : por ej. en el ECZEMA HÚMEDO DE LA CABEZA, O COSTRA DE LECHE, que sobreviene en niños del tipo calc. ostr. éstos están particularmente sujetos a un eczema característico que aparece sobre el cuero cabelludo, con tendencia a descender y cubrir la cara, formando en ella, como en el cuero cabelludo, espesas costras que se parecen a espesos depósitos de cal.

El niño se rasguña la cabeza al rascarse violentamente cuando despierta, el paso del sueño al despertar parece producir, o por lo menos concordar con una viva comezón en la zona de la erupción.

Se puede decir que la piel del tipo calc. ostr. es FRÍA, SUAVE, FLOJA; FÁCILMENTE MALSANA, en el sentido de que las heridas más insignificantes supuran fácilmente, pero no en el mismo grado que en silic. o hep. sulf. carb.; el enfermo se defiende mal y su vitalidad disminuida se traduce tanto por su debilidad física y mental como por su desmineralización.

Fiebre

Escalofríos con sensación de frío, sobre todo de noche, y empezando en cara y espalda.

Calor con tufaradas en la cara y sed.

SUDORES PARCIALES en cabeza, pecho, manos, pies.

Transpiración nocturna.

Relaciones

Complementarios

Bell., cuyo crónico es; rhus tox.

Antídotos

Camph., bryon, china, ipec., nit. ac., nux vom., sepia, sulf.

Incompatibles

Calc. carb y sulf. no actúan bien después de kali carb., y nit. ac.

REMEDIOS QUE ACTÚAN BIEN : arau., agar., bell., borax, bismuth., dulc., graph., ipeca, kali carb., lycop., nat. carb., nit. ac., nux vom., phosph., puls., platina, podoph., rhus tox., silic., sepia, sarsap., therid., tubercul.

CALCÁREA FLUORICA

Calcárea fluorica o fluoruro de calcio es una sal que se encuentra en estado natural bajo la forma de cristales ya sea cúbicos, octaédricos, incoloros o teñidos de colores variados, llamados también spath fluor o fluorina.

También se encuentra en nuestros tejidos, principalmente en los huesos, en los dientes o en el tejido fibroso.

Nuestro medicamento se prepara por trituración de cristales de SPATHfluor, por lo menos para las tres primeras dinamizaciones.

Acción general del medicamento

Boericke y Dewey resumen así en la obra : "Los doce remedios de los tejidos, de Schüssler" la acción general :

"calc. fluor. se encuentra en el esmalte de los dientes y en las porciones superficiales de los huesos; es también un elemento constitutivo importante de la epidermis y fibras elásticas del tejido conjuntivo y de las paredes vasculares. Una perturbación en el equilibrio intra-orgánico de las moléculas de calc. fluor. Produce un estado de dilatación constante, de relajamiento crónico de las fibras citadas.

Si son las fibras elásticas de los linfáticos las que llegan a ese estado de relajamiento, en el nivel donde se encuentran se produce una exudación que, al no poder reabsorberse, determina finalmente induración; cuando esto sucede a nivel de los vasos sanguíneos, se tienen hemorroides, várices, tumores vasculares".

"Una falta de calc. fluor. en el organismo parece acarrear exudación seguida de **induración en la superficie de los huesos** a cuyo nivel se hace sentir más esta falta; resultado : **relajamiento de las fibras elásticas, dilatación de vasos e igualmente ptosis viscerales : útero-ptosis, gastroptosis, etc.; exudación de KERATINA en la zona de las células epidérmicas (la Keratina se encuentra en epidermis, uñas, cabello); esta exudación seca fácilmente, produciendo entonces costras adherentes, lo que se observa a menudo en las palmas de las manos** donde, a continuación de un trabajo manual penoso, se pueden encontrar callosidades que allí se han formado por ese medio".

"Cómo reabsorber, bajo la influencia de calc. fluor. dinamizada, en el organismo así perturbado, estas induraciones?

De dos maneras : las fibras elásticas del tejido conjuntivo en el cual el exudado se ha producido han perdido la tonicidad necesaria para mantener en los vasos linfáticos este infiltrado, y recuperan esa tonicidad bajo la influencia del remedio, lo que les permite, al comprimirlo, hacerlo entrar en la vía linfática, o bien, como consecuencia de la

presión del ácido carbónico contenido en la sangre una parte de fluor del fluoruro de calcium se combina con el hidrógeno que nace para formar ácido hidro fluorídrico que disuelve gradualmente las moléculas de esta producción mórbida cuyo residuo es llevado a los vasos linfáticos; lo que no ha sido así descompuesto por el ácido carbónico es disuelto por SO₄ H₂ que se forma durante la oxidación de los albuminoides y es llevado de la misma manera".

"Según estos datos fisiológico-químicos, continúan estos autores, se comprende que las afecciones localizadas en la zona de la substancia que constituye la región superficial de huesos, dientes, y fibras elásticas están bajo la dependencia de ese remedio".

"Por eso es útil EN TODOS LOS TRASTORNOS QUE SON CONSECUENCIA DEL RELAJAMIENTO DE CIERTAS FIBRAS ELÁSTICAS, COMPRENDIDA LA DILATACIÓN DE VASOS SANGUÍNEOS, TUMORES VASCULARES, HEMORROIDES, VARICES; PTOSIS DE ÓRGANOS ABDOMINALES, DESPLAZAMIENTOS UTERINOS, PTOSIS RENALES, etc.; LA MALA NUTRICIÓN DE LOS HUESOS Y PARTICULARMENTE DE LOS DIENTES, CIERTAS EXOSTOSIS DESPUÉS DE UN TRAUMATISMO; LOS GANGLIOS INDURADOS Y MUY DUROS, DE UNA DUREZA DE PIEDRA, etc.".

"En una palabra, dice Mouezy-Eon, el fluoruro de calcium parece ser ELELEMENTO QUE PRESIDE LA DUREZA DE LOS HUESOS; LA RESISTENCIA DE LA FIBRA ELÁSTICA, conviene, en consecuencia, a la malnutrición de los vasos, a sus várices y deformaciones; a los tumores óseos; a los ganglios demasiado duros, al desarrollo irregular de los huesos, a los relajamientos ligamentosos". (Publ. en "LES DOCTRINES DE L'HOMÉOPATHIE").

Características

CONSTITUCIÓN Y TIPO : "Calc. fluor. conviene particularmente a INDIVIDUOS MEDIANOS O PEQUEÑOS, DE TEJIDOS GENERALMENTE FIRMES Y TEZ MORENA.

Su esqueleto es desarrollado en el sentido antero-posterior; hay dolicocefalia habitual y prognatismo frecuente en una o ambas mandíbulas.

Dientes pequeños, manchados, implantados irregularmente; los huesos, rugosos, deformados, son gráciles; los dedos delgados.

Gran laxitud y agilidad articular, al mismo tiempo que gran laxitud ligamentosa en general : tales sujetos tienen fácilmente várices y ptosis viscerales marcadas.

"Si el tipo de calc. fluor. permanece en un período de equilibrio, su mentalidad es la de un realizador; no es brillante, ni potente, pero agota metódicamente todos los datos de un problema, en un negocio aprovecha todas sus faces.

El centro de actividad cerebral tiende a ser llevado hacia atrás, lejos de los sentidos de información anteriores.

La memoria bien desarrollada y provista, es, sin embargo, perezosa; hay unacomprensión menos viva que en calc. ostr., pero es compensada con gran fijeza y tenacidad mentales.

Pues, si bien la frente es huidiza y los centros cerebrales están un pocoborrosos, los centros supra oculares de observación están bien desarrollados, registran, retienen, comparan.

Aunque le faltan amplitud, profundidad de concepción o de vista, es un buenejecutor, un espíritu práctico, un hombre de negocios y de relación". (Mouezy-Eon).

Sus posibilidades patológicas se orientan más bien en el sentido de las ENFERMEDADES DE LOS VASOS O DE LA NUTRICIÓN.

Modalidades

Agravación

Por el reposo, las corrientes de aire, el frío; por el cambio de tiempo, por el tiempo húmedo.

Mejoría

Después de moverse un poco, por el movimiento, por el calor, por las aplicaciones calientes.

Síntomas mentales

Extremadamente DEPRIMIDO, el enfermo de calc. fluor. es indeciso, vacilante.

Al mismo tiempo, ANSIOSO, DESALENTADO; tiene miedo sin razón, especialmente temor de ruina financiera sin motivo, tendencia a dar al dinero más valor del que realmente tiene.

Sueño

Esa sensación de angustia, de temor, se encuentra en su sueño que es agitado, no reparador, y durante el cual tiene, en sus sueños, una sensación penosa de peligro inminente.

Cabeza

Exostosis de los huesos del cráneo.

Jiba sero-sanguínea, en el recién nacido, en la zona de los parietales, quereposa sobre una base rugosa y muy difícil de reabsorber.

Ruidos como crujidos en la cabeza.

Cara

ASIMETRÍA FACIAL.

Hinchazón e induración de maxilares.

Ulceraciones herpéticas en los labios, consecuencia de haber tomado frío, perono difusas, como las de nat. mur.

Ojos

Dolores en los glóbulos oculares, mejorados al cerrar los ojos y apretarlos fuertemente.

Sensación como de llama vacilante o de puntos negros delante de los ojos.

Disminución de visión después de haber abusado de sus ojos.

Manchas en la córnea.

Queratitis flictenular.

Conjuntivitis.

Quiste subcutáneo de párpados.

Chalasi6n (puls., rhodod., staphys., thuya).

Oídos

Dep6sitos calc6reos en el tímpano; esclerosis de los huesillos del oído con sordera y zumbidos.

Supuraci6n cr6nica del oído medio.

Aparato digestivo

BOCA :

DIENTES IRREGULARES, MAL IMPLANTADOS; RAREFACCI6N DEL ESMALTE DENTAL; el esmalte del diente est6 rugoso y es deficiente; falta de solidez anormal de la implantaci6n de los dientes con o sin dolores; comienzan a moverse en sus alvéolos.

Odontalgia con los dientes que se mueven; dolor cada vez que un alimento toca el diente.

Apariencia resquebrajada de la lengua.

Induraci6n de la lengua, despu6s de una inflamaci6n.

Abscesos en las encías con hinchaz6n dura del maxilar.

GRAN SEQUEDAD DE LA BOCA.

FARINGE :

GRAN SEQUEDAD DE LA GARGANTA.

Ardor mejorado por bebidas calientes; agravado de noche y por bebidas frías.

ESTOMAGO :

P6rdida del apetito con náuseas y v6mitos despu6s de la comida.

V6mitos de alimentos no digeridos.

Hipo.

Flatulencia.

ABDOMEN Y DEPOSICIONES :

Flatulencia con sensaci6n de frío peor en el hipocondrio derecho.

Dolores punzantes en la regi6n hepática, peor cuando est6 sentado, mejorados despu6s de acostarse a la noche.

Agravados estando acostado sobre el lado dolorido (al contrario de calc. ostr.).

Constipaci6n con sensaci6n de plenitud en la cabeza.

Los intestinos est6n "apretados", incapacitados para expulsar la deposici6n.

Fisura anal : grietas extremadamente dolorosas en la extremidad inferior del intestino.

Prurito anal, hemorroides con p6rdida de sangre; hemorroides internas, generalmente con dolores en los riñones, generalmente en la parte inferior del sacro, y constipaci6n.

Aparato urinario

Orina abundante.

Necesidad frecuente de orinar.

O al contrario, orina escasa, de color subido, olor agrio en la emisi6n, eirritante.

6rganos genitales

MASCULINOS :

Pequeña secreci6n constante de líquido seminal y prostático con disminuci6n de testículos.

INDURACI6N DE TESTÍCULOS E HIDROCELE.

Es de mucha utilidad para hacer desaparecer la induraci6n del chancro Hunteriano.

FEMENINOS :

PROLAPSO UTERINO CON SENSACI6N DE PESO, DE PESADEZ; sensaci6n como si el útero fuera a salir por la vulva.

Prolapso uterino con dolores y tirones en los muslos.

Reglas abundantes.

El remedio tonifica el poder contráctil del útero en caso de p6rdidas.

P6rdidas catameniales excesivas con dolor de ptosis.

Administrado durante el embarazo, favorece el parto.

INDURACIONES EN LOS SENOS O EN EL ÚTERO O EN LAS ZONAS ANEXAS.

Aparato respiratorio

Dilataci6n, hipertrofia del coraz6n.

DILATACIONES ARTERIALES Y VENOSAS.

Por el rol que representa en las fibras contráctiles de las paredes vasculares calc. fluor. es un gran remedio para las DILATACIONES VENOSAS Y VARICES.

En una fase precoz, el ANEURISMA será reducido o detenido en su evolución por la acción de este remedio y ferr. ph. con tal de que antes no se haya tomado ioduro de potasio.

TUMORES VASCULARES con dilatación de vasos sanguíneos.

ES EL REMEDIO POR EXCELENCIA PARA RESTAURAR LA CONTRACTILIDAD DE LAS FIBRAS ELÁSTICAS DE LOS VASOS.

Con respecto a su rol en el tratamiento de las várices, se lo puede comparar a fluor. ac., que es útil para tratar las várices existentes de larga data, particularmente en las piernas; tienden a ulcerarse, tienen dolores ardientes y sensación de rotura, de laxitud.

Hamam. que tiene várices duras, con nudosidades; son hinchadas y dolorosas.

Puls., que tiene muchos trastornos de la circulación venosa, es útil en el tratamiento de las várices de las piernas con sensibilidad y dolor picante.

Lycop. está indicado en casos de várices de los miembros inferiores localizadas particularmente a la derecha, que parecen gruesas y son duras a la presión.

Vipera es el remedio de las várices muy hinchadas, sensibles, con amenaza de flebitis.

Zincum que tiene gruesas venas varicosas en las piernas.

Tejidos

Hemos visto que calc. fluor. es rico en INFILTRACIONES SOLIDIFICADAS; por ej., en GANGLIOS INDURADOS, QUE SON DE UNA DUREZA DE PIEDRA.

Ganglios cervicales indurados, DUROS COMO PIEDRA.

Esta acción de calc. fluor. sobre el tejido glandular es importante; las induraciones glandulares, LOS TUMORES DUROS COMO PIEDRA, LOS NUDOS INDURADOS SON CARACTERÍSTICOS DEL REMEDIO.

Los principales remedios que pueden compararse con respecto a esta hipertrofia de las glándulas, son : calc. ostr., graph., iodium, que presenta hinchazones, masas induradas en las fascias y los ligamentos capsulares de las articulaciones o de los tendones, y también hipertrofias a la vez ganglionares y glandulares, sobre todo a nivel del cuerpo tifoideo; silic., hekla lava, lapis, albus.

Tumor quístico consecuencia de un esfuerzo exagerado de las fibras elásticas de la región.

EXUDACIÓN EN LA SUPERFICIE DE UN HUESO, QUE SE ENDURECE RÁPIDAMENTE Y TOMA EN ESE LUGAR FORMA NODULAR O PUNTIAGUDA, EXOSTOSIS en las articulaciones del torso y del CARPO; exostosis en los huesos del cráneo.

Para esta producción de exostosis se puede comparar el remedio a angostura que es particularmente útil en las exostosis del maxilar inferior y de la tibia; dulcam., en las de los huesos de antebrazo y tibia; hekla lava, particularmente en las de los huesos del cráneo, maxilares y tibia; phosph., en las de los huesos del cráneo, que tienen dolores con tirones, peores de noche y por el menor tacto, etc.

Nudos duros, glándulas duras, tumores duros en los senos.

Espalda y extremidades

Sensación de tirón y dolor en la parte inferior de la espalda (sacro) con sensación de quemadura, plenitud, y constricción intestinal.

Dolor de espalda que simula una irritación espinal con debilidad.

Lumbago peor al empezar a moverse, pero mejorado continuando el movimiento.

Lumbago crónico que se repite al menor esfuerzo; dolor peor después del descanso, mejorado por el movimiento continuo y por el calor, muy parecido al de rhus tox.

Crujidos en las articulaciones.

SINOVITIS CRÓNICA.

Hinchazón de la articulación del hombro con crepitación que indica falta de líquido sinovial.

LAXITUD ARTICULAR, LUXACIONES FÁCILES : las falanges se dislocan fácilmente; estas cosas se comprenden fácilmente, al recordar cuán falta de solidez es en calc. fluor. la fibra elástica del tejido fibroso.

Tumores quísticos en el dorso de la muñeca.

Exostosis de los dedos.

Piel

Grietas de la piel.

Fisuras, grietas, o durezas en la palma de las manos.

Eczemas debido a una hiperemia venosa, agravado por tiempo húmedo, mejorado a la noche.

Eczema escamoso con espesamiento y grietas en la piel.

Eczema anal, consecuencia de hemorroides.

Úlceras fistulosas, indolentes, que segregan pus amarillo, espeso; úlceras debordadas callosas y duros.

Relaciones

Actúa bien después de calc. ph. y silic. en las supuraciones óseas; nat. mur., en los enfriamientos; rhus tox, en el lumbago; bryon. y calc. ostr., en la artritis; sticta y ferrum en la sinovitis.

En la induración, hay que estudiarlo al lado de : bar. iod.; calc. iod.; hek. lava, asterias, conium, phytol.; carb. an.; merc. protoid.; silicea.

CALCÁREA PHOSPHORICA

Calcárea phosphorica, o fosfato de cal, tiene muchos síntomas comunes con calcárea ostreatum, pero tiene también muchos otros particulares, que le dan una fisonomía bien determinada y característica.

Es una sal que abunda en la naturaleza; se la encuentra en yacimientos, a veces considerables y bajo diversas formas, en muchos lugares; es parte integrante de todos nuestros tejidos (con excepción de los elásticos) y está presente en todos los líquidos de la economía.

El ácido fosfórico que es tribásico, forma con la cal tres sales : el fosfato monocalcico o fosfato ácido; el fosfato bicalcico o neutro; el fosfato tricalcico que es el más importante : se presenta bajo el aspecto de polvo blanco, amorfo, liviano, insoluble en el agua, pero soluble en los ácidos, aún en los débiles.

Con este polvo preparamos nuestras tres primeras dinamizaciones por trituración.

Acción general del medicamento

Absolutamente esencial para el crecimiento y la nutrición del organismo, el fosfato entra en la composición de todos los tejidos orgánicos, excepto el elástico y todos los humores; en todos excepto en el tejido óseo, estaría en combinación orgánica con un albuminoide.

Se encuentra en los glóbulos y el plasma sanguíneo, en la saliva y el jugogástrico, en los huesos, los dientes, la leche, etc.; da su solidez a los huesos.

Tiene una afinidad química especial con la albúmina que le sirve de base orgánica en el tejido celular y es útil en todas aquellas partes en que se lo encuentra en las secreciones de la albúmina o de las sustancias albuminosas.

También alimenta los glóbulos recién formados en la sangre, convirtiéndose en un remedio de primera en la anemia y la clorosis.

Es de grandísima utilidad para los tejidos débiles o en crecimiento, excitando el desarrollo celular, constituyendo la base primordial de los tejidos nuevos; de ahí su empleo indispensable en el comienzo del crecimiento.

"Calc. phosph. se dirige a las enfermedades que dependen de un desequilibrio de sus moléculas en una región del cuerpo, como sucede en la formación demasiado tardía del callo en una fractura; en el desarrollo anormal de la nutrición defectuosa de un hueso u otro tejido, como pasa en el raquitismo o toda otra enfermedad similar.

Por eso su esfera de acción comprende todas las enfermedades óseas, todas las que dependen de una defectuosa calidad de la sangre, debida a infección discrásica que interese tejidos óseos y dermoide.

Cuando, por cualquier razón, una cantidad insuficiente de fosfato de cal es asimilada por el organismo, el sistema vegetativo sufre, determinando nutrición defectuosa, crecimiento celular imperfecto, debilitamiento consecutivo y destrucción si el cuadro llega al extremo, especialmente de tejidos óseos y glandulares.

"Durante el período de crecimiento, el remedio, es a menudo útil en los niños; si los huesos de la cabeza sueldan lentamente, o si el desarrollo es defectuoso, es útil.

Cuando se está frente a un niño que adelgaza, que tarda en caminar, cuyas piernas carecen de la fuerza necesaria para soportar el peso del cuerpo, cuyo desarrollo mental es atrasado y por lo tanto aprenden tarde, se debe, pensar en calc. phosph. como en bar. carb., borax, phosph. ac., natr. mur. o calc. ostr.

Niños débiles, flacos, de piel arrugada.

"También es útil durante la dentición, en casos de convulsiones y espasmos en niños débiles, escrofulosos, para estimular su nutrición.

Otra propiedad importante es su PODER DE RESTAURACIÓN DESPUÉS DE ENFERMEDAD AGUDA, ya sea actuando directamente, o preparando el camino a los otros remedios, al sensibilizar el organismo a su acción; constituye, pues, un importante remedio intercurrente.

En muchos casos se muestra como un verdadero tónico : en enfermedades crónicas debilitantes, cuando en la orina hay exceso de fosfatos.

En la anemia de los jóvenes que han crecido demasiado rápido; en mujeres jóvenes debilitadas por embarazos repetidos, por lactancias demasiado abundantes; en enfermedades con pérdida de líquidos humorales abundantes y agotadores, como diarrea tuberculosa, bronquitis crónica con expectoración agotadora, sudores nocturnos profusos, abscesos, heridas o llagas escrofulosas con gran supuración, pérdidas sobre las cuales, entre paréntesis, calc. ph. tiene gran acción curativa, en todos estos casos, es un remedio por excelencia.

"Calc. ph. actúa bien en personas de edad en quienes el poder regenerador del sistema nervioso disminuye, la convalecencia de una enfermedad grave.

En la tuberculosis pulmonar con demacración, sudores nocturnos, hemoptisis, y otros síntomas físicos marcados, calc. ph. administrado en baja potencia, llega a menudo a mejorar la violencia del caso.

"También es útil en jóvenes que tienen poluciones nocturnas agotadoras, en onanistas y en mujeres con excitación sexual exagerada.

"Hay una perturbación en el equilibrio molecular del fosfato de cal en la zona de las células epiteliales de las serosas, que tiene como consecuencia una exudación sero-albuminosa en el interior de sus cavidades.

Es así como se desarrollan derrames de rodilla, higromas de rótula, etc.; algunas dosis de calc. ph. harán reabsorber estos derrames.

Si las células epiteliales epidérmicas tienen pérdida molecular de fosfato de calcio, hay aflujo de albúmina en la superficie de la piel donde forma costras o una descamación pelicular que sólo se dominará administrando calc. ph. Si las células epiteliales de la zona de las mucosas sufren de falta de calc. ph., se podrá encontrar secreción albuminosa superficial similar". (Los doce remedios de los tejidos de Schüssler , por Boericke y Dewey).

Características

1) CONSTITUCIÓN Y TIPO : El radical Fósforo, que encontramos aquí asociado a la cal, aporta grandes cambios al tipo calc. ostr., que la constitución de calc. ph. parece exactamente lo contrario de la de calc. ostr.

En efecto, el elemento Fósforo tiende a sobreactivar la función de oxidación, obrando a la vez sobre el glóbulo rojo y la célula nerviosa.

En la primera alternativa, se manifestará por el temperamento sanguíneo, con su vivacidad, inestabilidad, la bella vitalidad de la cual hemos hablado.

Si, al contrario, recae más sobre la célula nerviosa, la mentalidad que se formará la del imaginativo, del entusiasta, del espíritu que recibe las influencias más sutiles y las irradia enseguida, del cerebro predispuesto a las artes, a la intuición. (Las doctrinas de la Homeopatía , por el Dr. Mouezy-Eon).

Este elemento Fósforo comunica, pues, la sobre actividad que le es propia al tipo calc. fundamental y apoya sobre sus puntos de elección; los huesos, el elemento linfático; de ahí su empleo en el crecimiento, sobre todo prematuro o rápido, en fracturas, afecciones agudas de los huesos, anemias que acompañan o siguen a pirexias, enfermedades crónicas graves.

En términos generales, se puede decir que calc. ph. actúa mejor en sujetos flacos que en gordos.

TIPO GRANDE, DELGADO, ESPIGADO, DE TEZ, OJOS Y CABELLO MORENO O MAS BIEN RUBIOS, VIVOS EN SUS MOVIMIENTOS, DE PIEL DELICADA, TEZ ROSADA, CABELLOS FLAXIBLES Y SEDOSOS, PESTAÑAS LARGAS.

El esqueleto se desarrolla en altura; el arco de las mandíbulas es bastante arqueado; los dientes, altos, angostos, un poco amarillos; los huesos, alargados, los dedos en forma de huso.

El centro de la actividad intelectual tiende a ser llevado hacia arriba, lejos del control de los sentidos de observación anteriores y posteriores de la memoria.

Inteligencia viva, movida por la intuición, el entusiasmo, y que se pone con más agrado al servicio de la imaginación que de la experiencia o de la lógica; se inclina más a inventar que a conocer, por eso, gracias a este minimum de apoyo en la realidad es eminentemente inestable y, a pesar del impulso de su voluntad y su irradiación, su falta de tenacidad rara vez hace de él un realizador.

Está predispuesto a enfermedades agudas, a menudo a tuberculosis. (Mouezy-Eon, "Les doctrines de l'Homéopathie").

El niño de calc. ph. es un PEQUEÑO SER FLACO, DE ABDOMEN HUNDIDO, ÁGIL, PREDISPUERTO A AFECCIONES ÓSEAS Y GLANDULARES, TARDA EN APRENDER A CAMINAR.

Mientras es amamantado, VOMITA LA LECHE QUE MAMA DE MANERA PERSISTENTE y padece cólicos después de haber comido.

SUS DEPOSICIONES SON VERDES Y ACOMPAÑADAS DE MUCHOS GASES FÉTIDOS.

Cuando es más grande, tiene MARCADO DESEO DE TOCINO Y JAMÓN.

Moralmente, LA TORPEZA Y EL ABANDONO DE LA INTELIGENCIA SON CARACTERÍSTICOS; es de comprensión lenta; el uso prolongado e intempestivo de calc. ph. puede llegar hasta a desarrollar el cretinismo.

Cuando avanza en edad, todas LAS EXPOSICIONES A LA HUMEDAD CAUSAN SENSACIÓN DE DOLORACIÓN Y TAMBIÉN DOLOR VERDADEROS que serán despertados o aumentados si se mueve al pequeño enfermo; sin embargo, no nos dejemos engañar por este síntoma y no demos bryon.; todo esto está bajo la dependencia de un principio de raquitismo que prevendrá felizmente calc. ph.; si éste fracasa, habrá que recurrir a silic.

Si queremos comparar calc. ph. a calc. ostr., por lo menos en constituciones infantiles, veamos un cuadro comparativo de sus características en pág. 209.

Modalidades

Lateralidad

Izquierda.

CUADRO COMPARATIVO DE LAS CARACTERÍSTICAS DE calc. ph. Y calc. ostr.

Calcárea phosphorica

Calcárea ostrorum a) sujetos delgados y espigados

a) niño gordo e hinchado b) tez y ojos oscuros; morochos

b) piel floja, de una blancura de tiza, tez clara, cabello rubio, ojos azules c) vientre hundido, blando

c) vientre grande, extendido d) deseo de tocino

d) deseo de huevos e) deposiciones verdes, viscosas,

e) deposiciones acuosas, que que salpican, acompañadas de contienen residuos muchos gases fétidos. alimenticios sin digerir f) niños vivos, huraños, de mal

f) niños apáticos y flojos humor

Agravación

POR LA HUMEDAD : calc. ph. es un excelente remedio en trastornos reumáticos que aumentan en primavera y otoño, principalmente cuando el aire es frío y húmedo o por la nieve derretida.

CUANDO EL ENFERMO PIENSA EN SUS DOLORES; los dolores se agravan al pensar en ellos (bar. carb., helon., gels., oxal. acid.).

Mejoría

a) EN VERANO, POR EL CALOR, POR TIEMPO SECO, en atmósfera caliente y seca.

b) Cuando se acuesta.

Síntomas mentales

Hay gran DEPRESIÓN DEL ESPÍRITU, MANIFESTACIÓN DE LA DEBILIDAD nerviosa del sujeto, al mismo tiempo que una especie de ANSIEDAD MENTAL acompaña todos los síntomas del remedio; se puede comparar a helon. por la depresión mental, debilidad y fosfaturia.

La memoria está muy debilitada y la comprensión es lenta.

Es irritable, pronto a montar en cólera.

Los niños también son HURAÑOS, DE MAL HUMOR, ESTÚPIDOS, COMPRENDEN MAL.

A menudo es indicado después de una contrariedad, un disgusto, una desilusión (ignat., phosph. ac.).

Sueño

Sopor, especialmente en las personas de edad, asociado a ideas tristes, a angustia.

Se estira y bostezo sin cesar.

Niños que gritan de noche, despiertan difícilmente a la mañana.

Cabeza

Sensación dolorosa de plenitud en la cabeza, como si el cerebro estuviese apretado contra los huesos del cráneo.

DOLOR DE CABEZA EN SUJETOS JÓVENES NO MUY SANOS, QUE SE DESARROLLAN MAL, ALLEGAR A LA PUBERTAD, Y QUE SON NERVIOSOS Y AGITADOS; cuando están adentro quisieran salir, y cuando están afuera, quisieran entrar; esta cefalea DESPIERTA O ES AGRAVADA POR EL ESTUDIO, CUANDO ESTÁN EN CLASE.

En los dolores de cabeza de los jóvenes escolares, el remedio es seguido por magn. ph.; por otra parte, hay que compararlo a nat. mur.

Dolor de cabeza antes o durante la segunda dentición, PEOR EN LA ZONA DE LA REGIÓN DE LAS SUTURAS; agravado por el ejercicio mental, por la humedad, por el cambio de tiempo.

Dolor de cabeza en la zona de las suturas; EL REMEDIO TIENE UNA AFINIDAD ESPECIAL PARA EL TEJIDO ÓSEO EN LA ZONA DE LAS SUTURAS Y DE LOS SINFISES; dolor de cabeza reumático, desgarrante, en los huesos del cráneo.

Sensación como si tuviera agua fría sobre la cabeza, sobre el occipucio.

Sensación como si tuviera hielo aplicado sobre la parte superior de región occipital; el resto de la cabeza está caliente con sensación de picaduras de abeja en la raíz de los cabellos.

Dolor de cabeza en jóvenes escolares demasiado fatigados, con diarrea provocada por absorción de mermelada ácida o cosas ácidas.

VÉRTIGO EN PERSONAS DE EDAD : dolor de cabeza, sensación de frío en la cabeza; la cabeza parece fría al tacto.

LAS FOSAS NASALES PERMANECEN ABIERTAS LARGO TIEMPO; LOS HUESOS DEL CRÁNEO SON blandos y finos.

Hidrocefalia crónica; la cabeza es demasiado grande y los huesos no están suturados; estados hidrocefálicos agudos y crónicos (zincum es complementario en la hidrocefalia).

Cuero cabelludo doloroso y tirante; entumecimiento y comezón al atardecer.

Ulceraciones escrofulosas en la cabeza.

Placas de calvicie.

Ojos

Afecciones espasmódicas de los párpados, si magn. ph. no es eficaz.

Inflamación y sequedad excesiva de conjuntivas durante la dentición, con prurito y sensación como si hubiera arena; fotofobia.

Oftalmía en escrofulosos; Queratitis escrofulosa; opacidades difusas en la córnea después de absceso; ulceraciones de córnea (radix, rhus tox; silic., sulf.).

Oídos

El oído externo parece frío.

Todos los huesos alrededor de la oreja están doloridos, duelen.

Dolores de oído con dolores reumáticos asociados a hipertrofia glandular, en niños escrofulosos.

Catarro crónico de oído en niños que de vez en cuando tienen dolor de garganta.

Aparato digestivo

BOCA :

Lengua hinchada, arrugada.

Acumulación de saliva ácida.

TRASTORNOS DE LA DENTICIÓN; LOS DIENTES CRECEN LENTAMENTE, Y SE CARIAN RÁPIDAMENTE.

Dolor de dientes desgarrante, perforante, peor de noche (en caries dentarias, el remedio es muy parecido a fluor ac, magn. ph., y silic.).

Dientes sensibles a la presión.

Convulsiones durante la dentición (después de magn. ph.).

Encías dolorosas, inflamadas o pálidas.

FARINGE :

GANGLIOS SUPERFICIALES DOLOROSOS.

RONQUERA NOCHE Y DÍA.

Sensación de ardor en parte posterior de lengua y laringe.

DOLORES DE GARGANTA, CON MUCHOS DOLORES QUE IRRADIAN EN TODAS DIRECCIONES, ALTRAGAR.

Constante carraspera al hablar.

HIPERTROFIA CRÓNICA DE AMÍGDALAS; Amígdalas grandes y dolorosas; adenoides.

Garganta dolorosa "de los clérigos"; GARGANTA DOLOROSA Y FATIGADA.

ESTÓMAGO :

DESEO DE TOCINO, JAMÓN, ALIMENTOS SALADOS Y AHUMADOS.

(Calc. ostr. desea huevos y los niños escrofulosos de magn. ph. carne) EL NIÑO PIDE SIN CESAR DE COMER, Y VOMITA FÁCILMENTE LO QUE HA TOMADO.

Vómitos fáciles en los niños; el niño tiene siempre necesidad de mamar y sin embargo vomita a menudo y fácilmente.

Mucha FLATULENCIA; mucho hambre con sed, la flatulencia se alivia un instante por eructos ácidos.

Acidez y flatulencia.

Sensación de opresión en el epigastrio.

Dolor después de haber comido con sensibilidad a la presión; los dolores de estómago se agravan también tomando una pequeña cantidad de alimento (ars. alb.); también tiene el síntoma contrario : dispepsia mejorada momentáneamente comiendo.

(Anacardium.), o por eructos; en ayunas, tiene dolores que irradian hacia la espalda, hasta la columna vertebral.

Dolores de estómago con debilidad.

Vómitos después de haber bebido agua fría o comido crema helada.

Dolor de cabeza y diarrea, después de haber comido.

ABDOMEN Y DEPOSICIONES :

HIPERTROFIA DE GANGLIOS MESENTERICOS.

DIARREA; DEPOSICIONES VERDES, ACUOSAS, QUE SALPICAN, es decir, EVACUADAS VIOLENTAMENTE Y CON GASES FÉTIDOS.

Diarrea agravada por fruta, ácidos, sidra.

Diarrea durante la dentición.

CADA VEZ QUE COME, TIENE CÓLICOS; cólicos, dolores ardientes alrededor del ombligo.

FÍSTULA ANAL QUE ALTERNA CON SÍNTOMAS PULMONARES, O EN PERSONAS QUE TIENEN DOLORES ARTICULARES a cada CAMBIO DE TIEMPO.

(Calc. ph. y berber. han sido útiles en la fístula anal; ambos tienen gran similitud en los síntomas del pecho, especialmente cuando sobrevienen después de intervención quirúrgica de la fístula).

Cura la tendencia a tener lombrices en niños con la constitución del remedio.

Aparato urinario

INCONTINENCIA NOCTURNA DE ORINA Y DEBILIDAD GENERAL (ver sepia).

NECESIDAD FRECUENTE DE ORINAR.

Dolores ardientes en uretra y cuello de vejiga.

ABUNDANTES DEPÓSITOS DE FOSFATOS en la orina.

AUMENTO DE CANTIDAD DE ORINA con depósito como en copos.

Arenillas, cálculos.

ORINA EXTREMADAMENTE COPIOSA CON GRAN LAXITUD; puede ser útil en diabetes, cuando los pulmones están afectados; (aquí se puede comparar a kali ph. y nat. ph.).

Órganos genitales

MASCULINOS :

Gonorrrea crónica en sujetos del tipo del remedio, con comezón y doloración.

Hinchazón de testículos y escroto.

Comezón en el escroto.

AUMENTO DE DESEO SEXUAL A LA MAÑANA.

FEMENINOS :

Debilidad y dolores en la región uterina.

Desplazamientos uterinos con dolores reumatoides.

Prolapso uterino con debilidad, sensación de ptosis peor después de la defecación.

Latidos en las partes genitales con SENSACIONES VOLUPTUOSAS; el remedio está indicado contra la TENDENCIA A MASTURBACIÓN en niñas escrofulosas.

NINFOMANÍA PEOR ANTES DE LAS REGLAS, acompañada de los signos de debilidad nerviosa del remedio y dolores de cabeza (kali ph., platina, murex, canthar., origanum).

VIOLENTA EXCITACIÓN SEXUAL DURANTE LA LACTANCIA.

Ninfomanía con doloración, sensación de presión y debilidad, en la región uterina. (platina).

DOLORACIÓN EN LA ZONA DE LOS SINFISES SACRO-ILIACOS Y PUBIS.

REGLAS DEMASIADO PRECOCES, EXCESIVAMENTE CLARAS, en niñas del tipo de calc. ph.; si son TARDÍAS.

LA SANGRE ES NEGRA.

A veces, SON PRIMERO CLARAS, BRILLANTES, DESPUÉS OSCURAS, Y VAN ACOMPAÑADAS DE VIOLENTO DOLOR DE ESPALDA, SECRECIÓN DE SANGRE ROJO BRILLANTE CADA DOS SEMANAS, menos dolorosa que mensualmente.

Reglas demasiado tardías, de sangre oscura, en una adulta, especialmente una reumática, precedidas de excitación sexual, acompañadas o seguidas de gran debilidad, angustia y dolores reumáticos.

Dolores como los del trabajo, antes y durante las reglas; a veces después de la deposición o micción; después por el cambio de tiempo.

Leucorrea COMO CLARA DE HUEVO (alum., amoniac., mutiat., borax, mezer.).

Después de una lactancia prolongada con voz débil, tos, debilidad y dolores entre los hombros, el niño rechaza el pecho, la leche tiene gusto salado : en tales casos, calc. ph. es muy útil.

Aparato respiratorio

NARIZ :

Punta de la nariz fría como hielo; las sensaciones de enfriamientos localizados son, como los dolores "de pinchazo", característicos de calc. ph.

Nariz hinchada, ulcerada, en niños escrofulosos.

Sensación de frío en la cabeza con corrimiento de líquido albuminoso por la nariz.

Coriza abundante, violento con excoriación de fosas nasales.

Coriza con corrimiento en cuarto frío, seco, al aire caliente y afuera.

Resfríos crónicos en escrofulosos.

Estornudos y dolor en fosas nasales.

En la ozena, puede ser muy útil acompañado de calc. fluor. (Boericke y Dewey).

LARINGE :

Ronquera, laringe fatigada; frecuentes carraspeos para aclarar la voz.

BRONQUIOS Y PULMONES :

Sensibilidad dolorosa detrás del esternón y clavículas con contracción del pecho y respiración difícil.

Pecho doloroso.

DOLOR EN LA BASE DEL PULMÓN IZQUIERDO (asclep. tub; lob; cer; nat. sulf.; ox. ac.).

TOS SOFOCANTE MEJORADA AL ACOSTARSE.

Tos crónica con extremidades frías TOS PERRUNA, COQUELUCHOIDE, en casos rebeldes, o en niños de constitución débil; en EL MOMENTO DE LA DENTICIÓN.

Tos sofocante, mejorada al acostarse, en los niños.

Catarro en constituciones escrofulosas o gotosas.

SÍNTOMAS PULMONARES ASOCIADOS A FÍSTULA ANAL.

Principio de tuberculosis en sujetos con la constitución de calc. ph., debilitados, con TRANSPIRACIÓN PROFUSA EN CABEZA Y CUELLO.

Tuberculosis al principio en individuos que, además de los síntomas característicos, tienen abundantes sudores nocturnos, especialmente en cabeza y cuello, al mismo tiempo que una fístula anal; tos crónica en tísicos que tienen las extremidades frías.

Aparato circulatorio

Palpitaciones con ansiedad, seguidas de debilidad y temblores.

Puntadas dolorosas en la zona cardíaca durante la inspiración.

Circulación imperfecta.

El remedio ha sido a veces de utilidad en casos de enfermedad azul.
(Falta de obturación del agujero de Botal).
Espalda y extremidades
Cuello delgado en los niños (nat. mur.).
Dolores reumatoides y rigidez de cuello a la manor corriente de aire.
Dolor en la región de la columna lumbar; a la mañana, al despertar; dolores y calambres en cuello, región de los omóplatos y renal, al levantarse y al caminar.
DOLORACIÓN EN LA ZONA DE LA SINFISIS SACRO-ILIACA.
ESPINA DORSAL HUNDIDA, especialmente en niñas, en el momento de la pubertad.
MAL DE POTT.
Calc. ph. TIENE ACCIÓN ELECTIVA EN TODA SUTURA O SINFISIS.
Dolores en la región de las suturas craneanas y en huesos iliacos.
DOLORES ÓSEOS Y EN LAS ARTICULACIONES, PEOR EN CADA CAMBIO DE TIEMPO.
ENTUMECIMIENTO Y DOLORES CON SENSACIÓN DE FRÍO Y RIGIDEZ PEOR A CADA CAMBIO DE TIEMPO.
Dolores en hombros, brazos, omóplatos; no puede levantar los brazos.
Puntadas a través de los codos.
Dolores y calambres en antebrazos, muñecas, dedos, especialmente los pulgares.
Dolores ulcerantes en la raíz de las uñas.
Reumatismo articular agudo, a menudo es útil después de kali ph. y nat. mur, si quedan secuelas de la afección.
Reumatismos pero con los cambios de tiempo, mejorados en primavera o en otoño.
ENTUMECIMIENTO DE EXTREMIDADES CON SENSACIÓN COMO SI LA PARTE ENFERMA FUERARECORRIDA POR HORMIGAS.
REUMATISMO GOTOSO, PEOR DE NOCHE O POR MAL TIEMPO.
Dolores reumáticos presivos y con tirones, después de exposición a una corriente de aire, con rigidez de cuello y sensación de pesadez en la cabeza.
SENSIBILIDAD DOLOROSA EN LA SINFISIS SACRO-ILIACA COMO SI ESTUVIERA ROTA. (aesc. hip.).
Dolor en las extremidades con gran debilidad.
Las articulaciones de los tobillos parecen dislocadas (Boericke y Dewey).
COXALGIA en el tercer período.
Sinovitis crónica.
HINCHAZÓN DE EPIFISIS, RAQUITISMO; piernas arqueadas en niños que caminan tarde.
Fístulas en pies y tobillos (Boericke y Dewey).
HUESOS FALTOS DE DENSIDAD, TRANSPARENTES Y FRÁGILES; FALTA DE CONSOLIDACIÓN DE LOS FRAGMENTOS ÓSEOS DE UNA FRACTURA; facilita la formación del callo, ayudando así la consolidación de las fracturas. (symphitum).
Neuralgias que comienzan a la noche y vuelven periódicamente, profundamente, situadas, el enfermo tiene la impresión de que sufre en la región de los huesos del miembro dolorido; dolores perforantes, al menor cambio de tiempo, con sensación de hormigueo entumecimiento, y frío o como sacudidas eléctricas.
DOLORES EN UN PUNTO MUY PEQUEÑO, MUY LOCALIZADOS.
Dolor como producido por ulceración en las ranuras de las uñas, más marcada en dedo medio.
El trabajo lo fatiga; LANGUIDEZ, LAXITUD, FATIGA PARTICULARMENTE ASCENDENTE;
ALEJAMIENTO POR EL ESFUERZO; temblor de extremidades; GRAN DEBILIDAD DESPUÉS DE ENFERMEDAD AGUDA, DEBILITANTE.
Espasmos de toda clase, después que magn. ph. ha agotado su acción.
Convulsiones de la dentición.
Epilepsia. (ferr. ph., kali mur, kali ph., silic.).
Piel
PIEL SECA, FRÍA Y ARRUGADA.
Piel irritada, excoriada.
Eczema con costras amarillentas o blancuzcas o vesiculoso, en cloróticos, gotosos, o escrofulosos.
Herpes agudo o crónico con prurito.
PRURITO SENIL, prurito vaginal en mujeres viejas.
Disminuye las pecas.
ACNÉ (calc. picr. conviene más a menudo en los jóvenes y calc. ph. en las niñas).
Lupus (kali mur.).
Piel pálida y color de cera en cloróticos (comparar nat. mur. especialmente cuando hay constipación, palpitations al acostarse, color terroso; comparar también en la anemia de los niños, silic., cuando son delgados, enclenques, con tendencia a raquitismo, y cuando hay transpiración aceitosa abundante en la cabeza; comparar también ferrum, cuprum, ars., etc.).

Comparte con calc. carb. la tendencia a TRANSPIRACIÓN SOBRE TODO LOCALIZADA PARCIALMENTE, y también su tendencia a OBSTRUCCIONES GANGLIONARES.

En los sudores profusos después de enfermedades agudas, agotadoras, hay que compararlo a psorin.

Fiebre

Escalofríos; ABUNDANTES SUDORES NOCTURNOS EN LA TISIS; SUDOR FRÍO EN LA CARA Y FRÍO EN EL RESTO DEL CUERPO.

Para los sudores NOCTURNOS, se puede comparar el remedio con acet. ac, agaric., ars. iod., calc. ostr. cinch., conium, hep. sulf., silic., taraxac., thuya.).

Fiebre crónica en los niños escrofulosos.

Relaciones

Complementarios

Ruta, carbo an., hep. sulf., calc.

Completa a menudo con ventaja a phosph.

Remedios que los siguen bien

Rhus tox, sulph., iod., psorin., sanic.

CAMPHORA

El alcanfor es un aceite volátil concreto, blanco, translúcido, de aspecto cristalino, brillante, que se obtiene del laurus camphora, árbol del Japón, de la familia de los Laureles, y que se parece bastante al tilo.

De olor vivo y penetrante, es muy soluble en alcohol a 90º con el cual hacemos una solución de alcanfor al 1/20 que nos sirve de tintura madre; de ella extraemos nuestras diferentes dinamizaciones por diluciones hahnemannianas sucesivas.

Acción general del medicamento

Camphora actúa primitiva y electivamente sobre el SISTEMA NERVIOSO CEREBRO-ESPINAL, produciendo finalmente, después de una corta fase de excitación intermediaria, astenia general, VERDADERO ESTADO DE COLAPSO, caracterizado por relajamiento de la fibra muscular, debilitamiento intelectual invencible, postración total con enfriamiento progresivo, disminución progresiva de la circulación con debilitamiento progresivo del pulso, embotamiento de los sentidos y finalmente coma verdadero.

ENFRIAMIENTO COMPLETO DEL CUERPO CON POSTRACIÓN PROFUNDA, ESTADO DE COLAPSO Y TRASTORNOS NERVIOSOS ESPASMÓDICOS.

Camphora paraliza también los GLÓBULOS BLANCOS, trabando así la diapedesis y la fagocitosis.

Características

Frío INTENSO EN TODA LA SUPERFICIE EXTERNA DEL CUERPO CON REPENTINA Y COMPLETA POSTRACIÓN DE LAS FUERZAS VITALES DE TODO EL ORGANISMO; VERDADERO COLAPSO.

Además, el frío de camph. tiene como característica que EL ENFERMO NO QUIERE APESAR SUYO, ESTAR TAPADO.

Todo esto define bien la gran característica alrededor de lo cual gravita toda su acción patogenética; este enfriamiento intenso de toda superficie externa del cuerpo con gran postración, verdadero estado de colapso, están siempre asociados en los estados mórbidos de camph., cualquiera sea su causa.

Siempre el enfermo experimenta sensación de frío, y se puede constatar este enfriamiento tocando su cuerpo que es tan frío como un trozo de hielo.

A pesar de esto, no puede soportar estar tapado y tira sus cobijas.

Modalidades

Agravación

POR EL FRÍO : el enfermo es muy sensible al frío y al aire frío que aumenta sus sensaciones dolorosas, sin embargo, no soporta estar tapado.

Mejoría

Por el calor; bebiendo agua fría; pensando en sus sufrimientos.

Síntomas mentales

La postración es profunda, la debilidad del sujeto es extrema, su estado puede ofrecer todos los signos del coma o estado semi-inconsciente en el cual, responde apenas a las preguntas que le hacen, manifestando indiferencia absoluta por todo lo que lo rodea.

Postrado, no sale de su estado comatoso sino para presentar signos característicos de agitación : miedo, angustia, estado de ansiedad indefinible, a veces, con alucinaciones; sacudidas nerviosas, pequeños movimientos espasmódicos, consecuencia de contracciones crónicas, repetidas de los tendones; además, la superficie externa del cuerpo está siempre fría como hielo, el pulso es pequeño y débil, el colapso inminente o completamente realizado.

Cabeza

Dolor vivo como si el cerebro estuviese comprimido, particularmente en la región occipital; sensación de pesadez; sensación de latidos como de pequeños golpes de martillo, peor al inclinar la cabeza hacia adelante.

Dolor de cabeza con síntomas catarrales, estornudos, etc.; camph. tomado en este momento, puede cortar el resfrío.

Cara

Cara pálida, livida, fría, con expresión de gran ansiedad; mirada fija y huraña, ojos hundidos y ojerosos; las pupilas, primero contraídas, se vuelven rápidamente dilatadas e inmóviles; la visión se nubla, los objetos parecen rodeados por una nube.

Aparato digestivo

BOCA :

Labios violáceos; boca contraída espasmódicamente; lengua gruesa, cubierta de mucus espeso, pero sobre todo fría; labios fríos, aliento frío; hay en la boca, una sensación de frío, como después de haber bebido menta.

ESTOMAGO :

Tiene sed intensa de agua fría, que toma en pequeña cantidades por vez y devuelve casi enseguida de haberlas absorbido; náuseas después de beber.

Dolores desgarrantes y ardientes en el hueco epigástrico, acompañados por sensación de angustia mortal, con eructos, náuseas y vómitos.

ABDOMEN Y DEPOSICIONES :

Abdomen doloroso.

Hay, a veces, sensación de calor y ardor, como en ars. alb.; a veces, de frío de hielo como en sec. corn.

Dolor constrictivo en la región de las costillas falsas, que se extiende a las vértebras lumbares.

Cólicos con deposiciones diarreicas marrones o también negras, como borra decafé, pero poco frecuentes y a veces involuntarias.

En el tratamiento del cólera, camph. va a la par de verat. alb, lo más marcado es el colapso.

Aparato urinario

Orina escasa, roja, a veces con sangre y que sale gota a gota (canthar.) al principio, micciones frecuentes, después se hacen difíciles y dolorosas; finalmente retención de orina; la vejiga está llena, pero no se vacía (opium).

Órganos genitales

ERETISMO SEXUAL INTENSO con priapismo doloroso, aumento del deseo, y emisiones frecuentes de noche.

En la mujer, supresión de reglas con excitación considerable y sequedad de vagina.

Aparato respiratorio

NARIZ :

Corizas que sobrevienen bruscamente y van acompañadas de sensación de frío general; nariz tapada y cabeza dolorosa, particularmente en la región de los sinus frontales.

BRONQUIOS Y PULMONES :

Disnea con accesos de sofocación como por una presión en el hueco epigástrico.

Crisis de sofocamiento con tos seca y corta, sobre todo a la tarde y a menudo durante la rubéola, cuando los pulmones se congestionan después de la supresión brusca de la erupción.

Aparato circulatorio

Angustia cardíaca, sensación de angustia precordial; palpitaciones; pulso pequeño, débil, irregular.

Espalda y extremidades

Debilidad de las extremidades, entumecimiento con sensación de frío intenso.

Las piernas están débiles, y el enfermo no puede caminar, vacila como si estuviera ebrio.

Dolores desgarrantes en los músculos de las extremidades inferiores; calambres en las pantorrillas.

Relaciones

Complementario

Cantharis.

Incompatible

Kali nit.

Antídotos

Opium, nitri ac., dulc., phosph.

Camph. antidota o modifica la acción de casi todos los medicamentos vegetales, de los provenientes de venenos de serpientes, del tabaco, etc.

CANNABIS INDICA

Cannabis indica, o cáñamo de la India, es una planta de la familia de las cannabináceas.

Es una simple variedad del cáñamo europeo, cannabis sativa, con algunas características morfológicas particulares; tallo más duro, corteza más delgada y menos susceptible de ser hilada, frutos más pequeños, olor más nauseabundo y propiedades virosas más fuertemente pronunciadas.

Contiene un aceite esencial, y una resina; además, entra en la composición del hashich, preparación conocida en todo el ORIENTE desde los tiempos más remotos por la ebriedad que provoca.

No se lo debe confundir con apocynum cannabinum o cáñamo indio, planta vivaz de la familia de las apocíneas, de América Septentrional.

El medicamento homeopático se prepara por diluciones Hahnemannianas sucesivas, partiendo de la tintura madre obtenida por maceración de las puntas de las ramas florecidas y secas, en alcohol a 90°.

Acción general del medicamento

El olor nauseoso que exhalan los campos de cáñamo de la India en plena floración determina una especie de ebriedad con vértigo.

El tomar una dosis moderada de una decocción de hojas produce náuseas, vómitos, cefalalgia, diuresis y sudor fétido. En dosis más fuerte, produce gran excitación y alucinaciones voluptuosas seguidas de sueño, a veces muy profundo; en otros sujetos, provoca furor e impulsos homicidas; en otros, verdadera catalepsia.

Profundizando su estudio se puede decir que su acción en el organismo se divide en tres partes, no porque produzca efectos contradictorios, sino que desarrolla en cada sistema, efectos que, a la vez que permanecen esencialmente nerviosos, revisten un sello si no semejante, por lo menos diferente.

Ya se lo considere actuando sobre la vida psíquica, de relación, o vegetativa, su carácter es el mismo : procede siempre de la exaltación al embotamiento de las distintas funciones psíquicas, de relación o vegetativas, pero la clasificación de sus efectos en tres clases distintas, se presta mejor a su descripción.

a) Su acción sobre los CENTROS PSÍQUICOS es muy característica : produce primero gran excitación que se caracteriza por EXALTACIÓN DE LA TENDENCIA A LAS IDEAS FAVORITAS DE CADA UNO; después HILARIDAD : ríe de sí mismo; de todo, hasta de las cosas menos risibles, hasta sin motivo ninguno (Teste); finalmente, una especie de EBRIEDAD SONAMBULICA así descrita por Teste : una suave languidez se apodera de uno, la notilidad se entumece, las rodillas flaquean bajo el peso del cuerpo, uno no puede y, sobre todo, no quiere moverse, uno se siente, por decirlo así, separado de su cuerpo, mientras todo embellece alrededor; una luz brillante inunda sin deslumbrar; los rostros más vulgares parecen seráficos; las ideas afluyen y abundan con rapidez tan prodigiosa que ya no subsiste ninguna noción de duración y parece vivir un siglo en un minuto.

En este estado, los individuos están plenamente satisfechos de sí mismos; todo lo que huelen, oyen, ven, dicen, en su mayor parte insignificante y absurdo, les parece nuevo, inaudito, prodigioso, sublime o de lo más cómico.

En una palabra, son tan felices como se puede llegar a serlo.

Al cabo de algunas horas, esta exaltación delirante se apacigua poco a poco; entonces es reemplazada por SUEÑO PROFUNDO (este es el caso más habitual); o por una CRISIS DE DELIRIO FURIOSO CON IMPULSOS HOMICIDAS o por UN VERDADERO ATAQUE DE CATALEPSIA (particularmente si la dosis fue demasiado fuerte).

La característica de los trastornos psíquicos desarrollados por este veneno consiste en que EL ENFERMO CONSERVA, AL VOLVER A SU ESTADO NORMAL, EL RECUERDO DE SUS ILUSIONES Y ALUCINACIONES.

b) Su acción sobre el SISTEMA NERVIOSO DE RELACIÓN es especialmente ASTENICA, pero este poder es MAS MARCADO EN LAS ZONAS SENSITIVAS QUE EN LAS MOTRICES.

En efecto, si bien disminuye la sensibilidad lo suficiente como para que, bajo su imperio, toda sensación verdaderamente dolorosa sea excluida, no llega a provocar fenómenos paralíticos : dejando de lado la catalepsia, que no es sino un efecto supra-tóxico, el debilitamiento de la motilidad que provoca, es más parecido a fatiga muscular que a paresia; por esta razón en las posadas persas se recurre frecuentemente a él para calmar la fatiga del caminante.

c) SOBRE EL SISTEMA SIMPÁTICO, su carácter asténico se reconoce en las hipersecreciones mucosas que se producen en la región del estómago (mucus gástrico), del intestino (diarrea), de los pulmones (expectoración mucosa espesa y viscosa) y sobre todo de la uretra (corrimiento muco-purulento), pero siempre mezclado con espasmos y dolores que, en realidad, sólo son reflejos consecutivos a irritación de mucosas, más bien que a fenómenos verdaderamente asténicos.

Modalidades

Agravación

A la mañana; por el café, licores, tabaco; acostándose del lado derecho.

Mejoría

Al aire fresco, por agua fría; por el reposo.

Síntomas mentales

ESPÍRITU VIVAZ CON GRAN LOCUCIDAD.

EXCITACIÓN CON RISA INMODERADA.

CIMIFUGA habla constantemente, pasando rápidamente de un tema a otro; no puede fijar su atención en nada, es muy irritable.

Hyosc., muy locuaz; habla con precipitación y gran animación; alternativas de risa, llanto y cólera.

Lach. tiene locuacidad extrema; pasa continuamente de un tema a otro; elige cuidadosamente sus palabras; hiperexcitabilidad y tendencia a asustarse.

Stramon. es locuaz en alto grado; busca la sociedad y la luz, pues la soledad y la oscuridad agravan sus síntomas mentales.

LE ES IMPOSIBLE CONCENTRAR SUS PENSAMIENTOS A CAUSA DE LA MULTITUD DE IDEAS QUE SE PRESENTAN EN SU ESPÍRITU.

Depresión ansiosa; miedo de volverse loco; excitación emotiva; rápido cambio de humor; ES MUY OLVIDADIZO, NO PUEDE TERMINAR SUS FRASES; temor a la oscuridad; gran aprensión de una muerte próxima.

Hipersensibilidad al ruido.

TRASTORNOS DE LA NOCIÓN DE ESPACIO Y TIEMPO; algunos segundos le parecen siglos; algunos pasos, una distancia inmensa.

EL TIEMPO, DEMASIADO LARGO, justamente porque no puede ya apreciar su verdadera duración y porque algunos minutos le parecen horas (alum., arg. nit., medorrh., nux vom.).

Alucinaciones; DESDOBLAMIENTO DE PERSONALIDAD (anacard., baptis., petrol., stram.).

Sueño

SE CAE DE SUEÑO Y SIN EMBARGO NO PUEDE DORMIR.

Formas obstinadas e incurables de insomnio.

HABLA Y HACE CRUIR LOS DIENTES DURANTE EL SUEÑO, como ars. alb., bell., cina, kali brom.

Sueña con cadáveres y muertes. anacard., etc.

Cabeza

Cefalea con SENSACIÓN COMO SI LA PARTE SUPERIOR DE LA CABEZA SE ABRIERA Y CERRARA Y COMO SI EL CUERO CABELLUDO SE LEVANTARA.

Ataques de jaqueca precedidos de una excitación inusitada y excesiva conlocuacidad.

Dolor de cabeza urémico.

Sensación de sacudidas a través del cerebro (aloe, cocea).

Sacudidas involuntarias de la cabeza.

Cara

FACIES CON EXPRESIÓN ESTÚPIDA, SOÑOLIENTA, ADORMECIDA.

MIRADA FIJA y ojos congestionados.

Labios pegados y SECOS, LO MISMO QUE LA BOCA; SALIVA ESPESA, ESPUMOSA, PEGAJOSA.

Aparato urinario

Sensación de ardor en la uretra antes, durante y después de la micción.

DEBE HACER UN ESFUERZO PARA ORINAR Y ESPERAR ALGÚN TIEMPO ANTES QUE LA ORINALLEGUE A CORRER.

DESPUÉS DE LA MICCIÓN, CUANDO HA TERMINADO, AL CABO DE UN INSTANTE, CORREN ALGUNAS GOTAS DE ORINA.

Sensación de hinchazón en el perineo, hacia el ano, como si allí tuviera una bola grande.

Órganos genitales

DESEOS SEXUALES MUY AUMENTADOS.

Priapismo; satiriasis, violentas erecciones dolorosas.

Cólicos uterinos espasmódicos con gran agitación e insomnio.

Menstruación muy abundante, dolorosa, de sangre negra pero sin coágulos.

Aparato circulatorio

Palpitaciones que lo despiertan del sueño.

Dolor punzante en el corazón acompañado de gran opresión.

Pulso muy lento.

Espalda y extremidades

Parálisis de extremidades inferiores; rigidez en las rodillas; gran fatiga después de una corta caminata.

Piel

Exaltación y perversión de la sensibilidad.

CANNABIS SATIVA

Cannabis sativa o cáñamo, planta de la familia de las cannabináceas, originaria del Asia central, que ahora se cultiva en todos los países.

Se prepara la tintura madre, de la que se obtienen las diferentes dinamizaciones por diluciones hahnemannianas sucesivas, haciendo macerar las puntas de las ramas florecidas en alcohol de 90°.

Acción general del medicamento

Su acción general se parece bastante a la de cann. ind.; sin embargo, tiene algunas características especiales que permiten distinguir su empleo.

Produce FENÓMENOS NERVIOSOS INFINITAMENTE MENOS ACENTUADOS que cann. ind.

Su acción sobre las VÍAS RESPIRATORIAS, es más marcada : determina en ellas una inflamación más o menos pasajera y acusada.

Pero su acción más profunda, y que pone al remedio en primer plano en ciertas afecciones de esta región, se realiza en la zona de la PORCIÓN TERMINAL DE LAS VÍAS URINARIAS : produce IRRITACIÓN EXCESIVA DE LA MUCOSA de la vejiga, de la uretra y también del prepucio que se pone rojo oscuro, caliente e inflamado; hay

mucho ARDOR EN LA URETRA, SECRECIÓN MUCOSA abundante : micción dolorosa y difícil; además, PRIAPISMO molesto y doloroso.

Síntomas mentales

INTELIGENCIA DÉBIL; el cerebro da la impresión de estar fatigado como después de un gran surmenage; las ideas se pierden, las palabras faltan; hablar precipitado, incoherente (bar. carb., nat. mur.); tartamudeo.

Triste e indiferente, con tendencia a asustarse fácilmente.

La menor contradicción le parece una ofensa y se encoleriza por bagatelas.

Sueño

DURANTE EL DÍA, SOMNOLENCIA INVENCIBLE, sobre todo, DESPUÉS DE LAS COMIDAS (ant. tart., agar., amm. carb., bapt., calc. ostr., china, kali carb., lycop., nux vom., nat. carb., phosph., zinc. met).

Pero de noche no tiene ganas de dormir, y a la mañana, al despertar le parece no haber descansado bien, se siente laxo, fatigado.

Cabeza

Aquí encontramos un síntoma particular y muy característico : SENSACIÓN COMO SI SOBRE EL CRÁNEO LE CAYERAN GOTAS DE AGUA.

Cefalea con sensación como de peso en la parte superior de la cabeza.

Vértigo como si estuviera intoxicado.

Ojos

Sensación de presión en los párpados con dificultad para levantarlos.

Sensación de presión dolorosa en el globo ocular de adelante hacia atrás.

Manchas, caspa en la córnea (Hahnemann).

El remedio puede, pues, curar las manchas consecutivas a oftalmía escrofulosa.

Opacidad de córnea.

Catarata después de trastornos nerviosos; antecedentes alcohólicos o nicotínicos (magn. carb., nat. mur., phosph., sécale.).

Aparato digestivo

Sequedad de la boca con saliva viscosa y ausencia de sed.

Constipación obstinada, que causa retención de orina, constricción del ano.

Sensación como de rezumadura de agua fría, gota a gota, por el ano.

Órganos genitales

DOLORES ARDIENTES EN URETRA Y VEJIGA antes y durante la emisión de orina.

DESEOS FRECUENTES DE ORINAR.

EMISIÓN GOTA A GOTA DE ORINA ESCASA Y SANGUINOLENTA, o CORRIMIENTO

INTERMITENTE DE ORINA (clem., gels., hep. sulf., calc., sabal.).

Cuando orina, el chorro es bífico.

PUNTADAS DOLOROSAS EN LA URETRA QUE ESTA INFLAMADA Y MUY SENSIBLE AL TACTO Y A LA PRESIÓN EXTERIOR : URETRA TAN SENSIBLE Y DOLORIDA QUE ESTO LO OBLIGA A CAMINAR CON LAS PIERNAS SEPARADAS; mucosa uretral muy sensible interiormente; CUANDO ORINA, ARDOR INTENSO que irradia hacia la vejiga.

SECRECIÓN COMO DE PUS, AMARILLA, ESPESA, por la uretra.

Finalmente, fuerte excitación del apetito venéreo con ERUCTOS MUY DOLOROSOS.

He aquí la descripción clínica de la blenorragia.

Cann. sat. es el MEDICAMENTO POR EXCELENCIA DEL PRINCIPIO DE LA GONORREA, puesto que el síntoma más característico de la indicación del remedio es la gran sensibilidad de la uretra al tacto y a la presión exterior.

Si la infección ha invadido todo el canal, hasta la vejiga, puede haber serios dolores en la espalda, repetidos sin cesar, y la orina puede ser sanguinolenta.

Después de cann. sat. viene merc. sol. si la secreción se hace más espesa y suave; sulfur, contra la gota militar (Nash).

También puede compararse a canthar. que tiene más tenesmo, mientras que cann. sat. tiene más ardor y dolores con escozor; capsic., que tiene ardor como si tuviera pimienta en la uretra; copaiva, es indicado en la uretritis, por los siguientes síntomas : ardor en uretra y región del cuello vesical, catarro vesical con disuria marcada, hinchazón del meato y deseo constante de orinar : orina con olor balsámico; secreción purulenta, corrosiva, hematuria; cubeba, tiene dolores picantes y sensación de constricción después de la micción; orina cada cinco minutos, tiene tenesmo con escozor y por la uretra segrega mucus viscoso; es muy útil en la inflamación de próstata.

Aparato respiratorio

Se ahoga al tragar; los alimentos toman un mal camino. (Allen).

Tos violenta con expectoración abundante y viscosa.

Respiración dificultosa con opresión.

Respiración difícil, que sólo es posible estando de pie.

Inflamación de los pulmones.

Aparato circulatorio

Molestia dolorosa en el corazón con palpitaciones y ansiedad.

SENSACIÓN COMO SI SOBRE EL CORAZÓN CAYERA AGUA, GOTA A GOTA.

Espalda y extremidades

Gran fatiga como después de ejercicio violento; debilidad parálitica de las extremidades; sensación de entumecimiento.

Calambres.

Contracción de dedos después de esguince. (Allen).

Dislocamiento de rótula al subir una escalera. (Allen).

Piel

SENSACIÓN COMO DE GOTAS DE AGUA CAYENDO SOBRE DIVERSAS PARTES DEL CUERPO.

Relaciones

Antídotos

Camphora, merc.

Remedios que lo siguen bien

Bell., hyosc., lycop., nux., opium, puls., rhus tox., verat.

CANTHARIS VESICATORIA

Cantharis vesicatoria o mosca española, es un insecto coleóptero, largo de 12 a 16 mm que vive principalmente en los países del mediodía de Europa.

Se encuentran hacia el fin de primavera, sobre las plantas.

Contiene un alcaloide, cantaridina, de acción semejante a la cantárida.

La mejor preparación para uso homeopático se hace pulverizando las grandescantáridas hembras; se obtienen así, las tres primeras dinamizaciones, por trituraciones hahnemannianas sucesivas en azúcar de leche; se puede también partir de una tintura madre preparada dejando macerar en alcohol esas grandes cantáridas hembras, secas y pulverizadas en la proporción de una parte de cantárida y tres de alcohol.

Acción general del medicamento

Aplicada sobre la piel, la cantárida produce una violenta inflamación que comienza por eritema, que va rápidamente a la vesiculación formada por grandes ampollas, llenas de serosidad blanco amarillenta, que puede tomar carácter purulento si la aplicación continúa una vez aparecido el síntoma.

Esta propiedad irritante es la piedra fundamental de toda la experimentación del remedio; va acompañada por dolores ardientes muy vivos, que son igualmente una de sus grandes características.

"Su característica más importante es la inflamación ardiente que determina y la particularidad de esta inflamación, es la rapidez con que se hace gangrenosa (Kent).

Absorbida al interior, la cantárida produce, a veces, bruscamente, sensación de quemadura en boca y garganta, y otras veces al cabo de algunas horas, dolor epigástrico violento.

Sobrevienen vómitos de materias flemosas o sanguinolentas, salivación muy abundante; la cara está roja; los ojos saltones y brillantes; la cabeza dolorida.

Los órganos genitales urinarios presentan siempre un alto grado de alteración; esta acción del remedio en esta esfera, produce inflamación muy violenta y característica en sus síntomas.

Estos son tan importantes que siempre están presentes cuando el remedio está indicado; los síntomas urinarios, son una indicación indispensable para su elección.

Riñones agrandados y doloridos, congestionados; presentan el aspecto microscópico propio de los riñones atacados de nefritis parenquimatosa y el examen microscópico confirma esta observación. Micción frecuente, dolorosa, ardiente; orina escasa, sanguinolenta; contiene mucus y albúmina; puede ser reemplazada por sangre casi pura.

Pelvis, vejiga y uretra tienen una mucosa inflamada y roja; se encuentran equimosis en la vejiga.

Los envenenados presentan priapismo; a menudo este síntoma va acompañado de furor erótico, movimientos obscenos y gritos de venado.

En el recto, tenesmo, dolores ardientes y deposiciones disentericas.

Cuando la dosis ha sido muy fuerte se pueden observar ataques convulsivos tetánicos, delirio, hidrofobia.

Si la muerte debe ser la consecuencia del envenenamiento, el enfermo cae en un debilitamiento considerable, las partes genitales se gangrenan y muere.

Si debe curar todos estos síntomas mejoran, pero generalmente la dispepsia y la nefritis crónica persisten.

Diremos, para terminar, que ciertos síntomas que evolucionan, sea en el curso de una intoxicación accidental del remedio, sea durante el estudio patogenético nos muestran su acción incontestable sobre las serosas.

Los vesicatorios aplicados sobre tórax y abdomen de perros y conejos producen enrojecimiento e inflamación de pleura y peritoneo, visibles por manchas en las superficies cutáneas, sometidas a la vesicación. (Hughes).

En autopsias de individuos muertos de envenenamiento cantaridiano, se han encontrado en el peritoneo rastros netos de inflamación.

Además la aracnoides, la piamadre, estaban igualmente muy inflamadas, y contenían, lo mismo que los ventrículos laterales, gran cantidad de suero sanguinolento.

Conviene agregar, que en la zona de inflamación de las mucosas, antes de las fases de gangrena, sus secreciones aumentan, produciendo mucus espeso, adherente, tenaz.

Características

1) SÍNTOMAS URINARIOS : Los síntomas urinarios son muy característicos y acompañan de manera fiel la acción del remedio.

MICCIÓNES FRECUENTES, ACOMPAÑADAS DE DOLORS ARDIENTES, QUE SE TRADUCEN EN LENGUAJE FAMILIAR POR : "ORINA HOJAS DE AFEITAR"; O TAMBIÉN SIN MICCIÓNES FRECUENTES DE ENCUENTRAN DOLORS ARDIENTES, CORTANTES, QUE ESCUECEN, ACOMPAÑADOS DE ESCURRIMIENTO NORMAL DE ORINA, canthar. es casi siempre el remedio cualesquiera sean los otros síntomas concomitantes o la región enferma : uretra, cerebro, pulmón, garganta, piel, tubo digestivo, etc.

2) SENSACIÓN DE ARDOR : Esta sensación de ardor, de escozor ardiente, es tal que en ella canthar. ocupa un lugar al lado de ars. alb.

Canthar., es el remedio de las quemaduras de piel.

Dolores ardientes en boca, garganta, estómago; inflamación con dolores ardientes de los ojos, principalmente cuando es causada por quemadura.

Violento dolor ardiente a través de todo el conducto intestinal.

Gran dolor ardiente en la región ovárica.

Peritonitis con dolores ardientes y abdomen sensible.

Ardor doloroso y pinchazos en la laringe, sobre todo al ensayar expulsar el mucus viscoso característico.

Dolores ardientes en el pecho.

ARDOR CARACTERÍSTICO A TODO LO LARGO DEL TRACTO URINARIO Y SOBRE TODO DE LA URETRA.

Dolores ardientes, de excoiación, con escozor, se encuentran en el remedio exterior e interiormente.

Modalidades

Lateralidad

Derecha.

Agravación

Por el tacto.

POR EL AGUA, cuya vista aumenta el delirio furioso del remedio; la constricción de laringe y garganta va hasta la sofocación al tratar de tragar agua; parece que su sola vista provoca contracción de esfínteres.

ORINANDO.

Mejoría

Por fricciones.

Acostado : los dolores de canthar. calman a veces un poco estando acostado.

Síntomas mentales

Los síntomas mentales son notables : IRASCIBILIDAD, MALDAD, IMPRESIONABILIDAD, TRISTEZA, TEMOR, INQUIETUD CON GEMIDOS, como en la hipocondría; ANSIEDAD CON GRAN AGITACIÓN QUE NO LE PERMITE QUEDAR EN EL MISMO LUGAR.

PERDIDA SÚBITA DE CONCIENCIA CON CARA ROJA; cae súbitamente en estupor, confusión de espíritu; está lleno de ideas extrañas; sus pensamientos vagan yendo como quieren y no como él quiere; como si estuvieran dirigidos por una influencia exterior (Kent).

Delirio agudo, furioso, parecido a la rabia, con cabeza caliente; delirio con gran excitación y rabia, cuyos paroxismos se despiertan a la vista de un objeto brillante, si se le toca la laringe o si trata de beber agua o simplemente al ver el agua.

Agitación ansiosa, que termina en crisis de furor, gritos, lamentos.

MANÍA AGUDA, GENERALMENTE DE TIPO SEXUAL; FRENESÍ AMOROSO : IMPETUOSOS DESEOS SEXUALES.

"El espíritu se vuelve hacia temas sugeridos por las funciones de las partes inflamadas : vejiga y órganos genitales inflamados y la excitación producida por la congestión inflamatoria de estos órganos, provoca exaltación de los pensamientos sexuales, pudiendo llegar hasta frenesí genital; instinto sexual completamente enloquecido, desorbitado; en el hombre, erecciones tan violentas como dolorosas, pene inflamado y dolorido al punto de ser imposibles las relaciones y sin embargo hay frenesí sexual extremo; rabia, agitación, delirio sexual desenfrenado; igual al que se encuentra en hyosc., phosph., y sécale, que tienen también estado de delirio; canta canciones obscenas, charla sin razón de sus órganos genitales, su orina, sus deposiciones (conversaciones sucias, depravadas) (Kent).

Sensación ardiente, dolores ardientes en el cerebro.

Sensación como de agua hirviendo en su cerebro.

Vértigo, peor al aire libre.

Estos síntomas mentales indicadores de inflamación cerebral, encuentran la concordancia más próxima en bell., que tiene muchos de los síntomas mencionados; intolerancia por el agua, también la tiene bell.; la diferencia más neta entre estos dos remedios, se encuentra en la cara.

La de bell., roja, brillante, vultuosa, carótidas latentes; canthar. muestra generalmente - aunque no siempre - cara pálida, expresión de extremo sufrimiento; disuria marcada que no se encuentra en bell.; camph. y ars. alb., son parecidos a canthar.; en estos tres medicamentos, ansiedad, agitación y expresión de sufrimiento de la cara indican la gravedad de la enfermedad, así como gran disminución de sus fuerzas vitales.

Ars. alb., no presenta, sin embargo, el erectismo sexual de canthar., su delirio es más bien acompañado por tendencia a automutilación o al suicidio; el enfermo muestra temor a la muerte, y agitación que alterna a menudo con estupor; en fin, no tiene los trastornos urinarios marcados de canthar.; camph., provoca como canthar., delirio, convulsiones, manía sexual, priapismo, estranguria, sensación de ardor intensa, con gran enfriamiento exterior, inflamación de cerebro, mucosa gástrica, vejiga, etc.; el enfriamiento exterior y el debilitamiento de las fuerzas vitales, se consideran los efectos más característicos de camph., los síntomas de excitación no son más que síntomas de reacción.

Con canth., al contrario, los principales efectos son de excitación, el posible enfriamiento, sólo es el resultado de su acción prolongada, continua; prácticamente se puede decidir por camph., cuando hay delirio, manía o convulsiones, con gran enfriamiento exterior y gran postración, si viene a continuación de erupción suprimida a destiempo. (Farrington).

Sueño

En las patogenias se observa somnolencia e insomnio, sin poderse saber qué dosis producen estos efectos opuestos; pero he aquí los más característicos : sueño agitado; risas lascivas; alucinaciones.

Oye caminar suavemente en su cuarto; se siente elevado de su lecho, o bien agarrado del cuello por manos heladas. (Jousset).

Cabeza

Cefalalgia acompañada de aflujo de sangre a la cabeza y estupidez, o de sensación como si el cerebro deseara salir por la frente; dolores de cabeza punzantes, como si fuese a estallar, como pinchazos de cortaplumas.

Tirones dolorosos en un costado de la cabeza o del occipucio, o en el vértex.

Dolores ardientes en la cabeza, o en un costado de la cabeza.

Ojos

Dolores ardientes, con escozor, en los ojos.

Los objetos le parecen coloreados de amarillo.

Cara

Como muchos medicamentos, canth., presenta en la cara, efectos opuestos debidos a la alternancia de las acciones y a las diversas dosis del medicamento.

Cara roja y ardiente.

CARA PÁLIDA, LASTIMOSA, DE ASPECTO CADAVERÍCO; FACIES PÁLIDA, FRÍA, ADELGAZADA, HIPOCRÁTICA; este último estado, pertenece al período del estado de envenenamiento.

Canth., produce además, dolores, tirones espasmódicos, en el trayecto del trigémino (neuralgia facial).

Vesículas pruriginosas, ardientes, con fuerte comezón cuando se lastoca, en la piel de la cara; erisipela de la cara, con dolores ardientes y síntomas urinarios característicos.

"Erisipela de la cara, hacia la nariz, en el lomo de la nariz afectando los párpados; se emplea más frecuentemente rhus tox, en estos casos, pero cuando la erisipela es muy violenta, canth. será a menudo indicado y preferido a rhus tox; éste tiene igualmente, ampollas flictenoides con dolores ardientes, pero en canth., la erisipela se hace muy rápidamente negruzca DE ASPECTO GANGRENOSO, tiene gran ardor en la superficie erisipelatosa y en la piel que la rodea, ardor al tacto; las pequeñas ampollas queman como fuego al tocarlas, es un rasgo saliente de este remedio que las erupciones que produce, arden como fuego cuando se las toca, aún ligeramente (Kent).

Aparato digestivo

Canthar. produce gran inflamación de la mucosa del tubo digestivo en todo su trayecto, pero sobre todo a nivel del intestino.

BOCA :

Lengua muy cargada, con bordes rojos : cubierta de vesículas.

Sensación de sequedad y ardor por dosis débiles; por dosis fuertes, formación de vesículas en la mucosa bucal, desolladura del epitelio y formación de falsas membranas.

Sequedad e hinchazón de labios, con sensación de ardor.

Vesículas y desolladura de labios por dosis fuertes.

Ulceraciones aftosas (muriat. ac., nit. ac.) en labios, encías, mucosa bucal.

FARINGE :

Encontramos los mismos síntomas de inflamación ardiente, que en la boca.

Inflamación de la faringe que le da la sensación de ser fuego.

Además la CANTARIDA, como las solanáceas virosas, provoca DISFAGIA MUY pronunciada que va hasta hidrofobia con convulsiones, ladridos, con expectoración continua.

Violentos espasmos se producen cuando se toca exteriormente la laringe o garganta.

Canth. está indicado en afecciones de garganta cuando, además de todos los síntomas inflamatorios, se encuentra gran constricción que progresa hasta la sofocación de la región laringeo faríngea, a cada ensayo de tragar agua, cuya vista basta a veces para provocar una constricción de esfínteres.

A esto se agregan dolores ardientes, característicos de canthar., lo que lo distingue de bell., que presenta también intensa inflamación de garganta, y espasmos de esta región, peor al tragar líquidos, síntomas que pueden al principio inducir a error para la elección del remedio.

Hay que citar aquí, como cerca de canthar : merc. corr., ars., aur. triph. y capsic.

ESTOMAGO :

Canthar. produce inflamación de la mucosa del estómago con los grandes síntomas del remedio : dolores ardientes, con escozor, sed intensa, inextinguible, sin embargo los líquidos lo agravan, e imposibilidad de tragar; vómitos.

ABDOMEN Y DEPOSICIONES :

Abdomen hinchado, timpanizado.

Dolores cortantes, punzantes, pero sobre todo ardientes en el intestino; son atroces, terribles; se exasperan por la presión y a veces por la aplicación de una esponja o género embebidos en agua caliente, hasta la convulsión y el furor; se acompañan de borborismo.

El primer efecto de la Cantárida en pequeñas dosis es producir constipación; más tarde sobrevienen deposiciones pequeñas, dolorosas, con cólicos, tenesmo, ardor en el ano; compuestas de mucus verdoso, sanguinolento y aún de sangre.

Diarreas con deposiciones mucosas, en las cuales se encuentran restos de membranas, que no son mucosa intestinal, sino formaciones fibrinosas que resultan de la inflamación violenta de esta mucosa.

EL TENESMO MARCADO QUE ACOMPAÑA ESTAS DEPOSICIONES, ESTA CASI SIEMPRE ASOCIADO A DISURIA; además se encuentra a menudo una especie de escalofrío que agita al enfermo, después de la deposición; en fin, los cólicos obligan a doblarse en dos, lo que alivia un poco.

Coloc., tiene también cólicos que hacen doblar al enfermo en dos, lo que lo mejora; deposiciones pegajosas, sanguinolentas, agravadas después de cada tentativa de beber o comer; contienen restos mucosos; pero los cólicos son aliviados después de la deposición; son netamente aliviados cuando se dobla en dos, o presionando fuertemente sobre el intestino; en fin, se puede decir que tiene más síntomas nerviosos, en tanto que canthar. tiene más síntomas inflamatorios.

Otro remedio a diferenciar aquí, es colchic., en el cual se encuentran desechos blancuzcos entre las materias evacuadas; cada deposición es seguida de violento tenesmo y hay constricción anal que atormenta durante la deposición, más que la necesidad; pero no tiene la disuria de canthar.

Hay que pensar también en zinc. met., capsic., sulphur, bien aplicado a los casos crónicos, persistentes con tenesmo que continúa de una evacuación a otra.

En fin, kali bich., sigue a canthar., cuando las deposiciones se hacen más pegajosas, más gelatinosas, aunque la presencia de falsas membranas persiste. (Farrington).

Aparato urinario

DOLORES QUE HACEN GRITAR, EN LA REGIÓN RENAL, QUE PUEDEN IRRADIAR A LO LARGO DEL URÉTER, HASTA LA VEJIGA, VIOLENTOS DOLORES EN LA REGIÓN RENAL CON NECESIDAD DOLOROSA DE ORINAR.

ORINA SANGRANTE QUE CAE GOTA A GOTA.

ESTRANGURIA.

VIOLENTOS DOLORES EN LA VEJIGA CON NECESIDAD URGENTE y frecuente de orinar y tenesmo intolerable.

DOLORES VIOLENTOS, ARDIENTES, CORTANTES EN EL CUELLO DE LA VEJIGA.

ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE LA MICCIÓN, DOLORES CORTANTES, TERRIBLES EN LA URETRA. CONSTANTES Y URGENTES DESEOS DE ORINAR; LA ORINA PASA GOTA A GOTA CON DOLOR EXTREMO, QUE QUEMA DE MANERA ATROZ.

Estos síntomas caracterizan a canthar. y cualquiera sea el nombre de la enfermedad, hay que dar el remedio cuando se los encuentra.

"Deseos de evacuar durante la micción; el enfermo quedará largamente en el baño para tratar de emitir materias y orina, a pesar de un tenesmo violento; le parece que si pudiera solamente emitir algunas gotas de orina o un poco de materia se aliviaría; pero este alivio no llega.

Todas estas partes ano y vías urinarias terminales están inflamados, ardientes.

Tenesmo y esfuerzos, no solamente cuando la vejiga está vacía sino cuando está llena; sólo emite algunas gotas de orina difícil, o nada; retención de orina.

Es presa de inquietud, frenesí, dolores ardientes con necesidad de evacuar y orinar, todo acompañado de eretismo sexual extremadamente atormentador" (Kent).

Orina ardiente que contiene a veces albúmina y sangre.

Hematurias ardientes con escozor.

Canthar. es un remedio de valor en CÓLICOS NEFRÍTICOS, especialmente cuando los dolores son muy violentos y van acompañados de las características del remedio.

A menudo se encuentra indicado en las arenillas de los niños cuando tienen esa irritación que desciende hacia el pene y con constante tocamiento de este órgano.

Es igualmente útil EN LA NEFRITIS que presenta los síntomas de inflamación especial del remedio.

Es también indicado en la CISTITIS AGUDA más frecuentemente que cualquier otro remedio, así como en la HEMATURIA de origen inflamatorio.

Tiene también acción secundaria sobre RETENCIÓN DE ORINA, efecto debido a la gravedad de los síntomas inflamatorios preexistentes.

Órganos genitales

MASCULINOS :

Canthar.

Inflama el apetito sexual, produciendo violento deseo de coito, casi insaciable con erecciones tan violentas y persistentes que terminan en verdadero priapismo; no cesan ni con el coito.

Estos síntomas indican el remedio en la corditis, en el curso de una blenorragia y también en la pasión irresistible, sea o no resultado de trastorno mental.

El priapismo de canthar. no debe ser confundido con el de picric. ac., en que está asociado a una afección de la médula; las erecciones son tan violentas que el pene está distendido como si fuese a estallar.

Canthar. produce síntomas de URETRITIS AGUDA, con hinchazón de la mucosa, prurito, ardores y excoriación, tenesmo y ardor al orinar, como producidos por un hierro al rojo o una hoja de afeitar, escurrimiento de líquido amarillento, a veces sanguinolento, excoriación en el glande, supuración entre prepucio y glande; a veces se encuentra además una hinchazón dolorosa del testículo derecho, con dolores en los cordones espermáticos, (orquitis).

Es indicado en la gonorrea, cuando hay la irritación descrita intensa, por los síntomas arriba citados y acompañada de corditis y excitación sexual intensa; es igualmente muy útil cuando la inflamación mucosa ha ganado el cuello de la vejiga, sobre todo por lavajes mal hechos.

FEMENINOS :

Canthar. produce aquí síntomas de inflamación semejantes a los que acabamos de describir en el hombre.

Se encuentra UN DESEO SEXUAL EXASPERADO, OBSESIONANTE, NINFOMANÍA. (platina, hyosc., stramon., lach.).

Reglas muy precoces, abundantes; hinchazón de vulva con irritación.

Constante escurrimiento uterino, agravado al dar un paso en falso, por las sacudidas.

Metritis puerperal con inflamación de vejiga.

Dolores ardientes en los ovarios.

Podemos también emplearlo en el momento del trabajo de parto cuando hay los síntomas característicos del remedio.

Ayuda también a la expulsión de la mola, así como de la placenta en casos de retención en el momento de un aborto o parto a término.

Aparato respiratorio

Enrojecimiento con debilidad de la voz y dolores ardientes, intensos en la laringe.

Intensa disnea, tos seca, frecuente; puntos dolorosos en el pecho (bryon., kali carb., squilla).

INFLAMACIÓN DE PLEURA.

PLEURESÍA.

Canthar. es un gran remedio de la pleuresía.

La escuela alopatíca, lo emplea bajo forma de vesicatorios en aplicaciones sobre la piel del tórax, en la región de los derrames; estos vesicatorios son tópicos completos de un emplastro extendido sobre una tela, emplastro sobre el cual se extiende o incorpora el polvo cantaridiano.

Se conocen numerosas discusiones a que su uso ha dado lugar; extremadamente empleado en otros tiempos y con éxitos que justifican su boga, fue abandonado después, a causa de las complicaciones renales que provocaba en ciertos enfermos.

Desde hace algún tiempo, ciertos terapeutas consideran a la vesicación cantaridiana como indicación indispensable en el tratamiento de la pleuresía.

Es incontestable que la feliz influencia que puede tener sobre su evolución determinada por la absorción al nivel de la piel del sujeto, de canthar.; en cuanto a las complicaciones notadas a continuación de su empleo, son la consecuencia de dosis demasiado fuertes para la sensibilidad más o menos grande del sujeto, a quien las dosis homeopáticas hubiesen evitado estas molestias.

He aquí lo que nos dice Chargé a propósito de canthar. en la pleuresía : "el momento más favorable para su empleo es cuando la fiebre decrece, el dolor de costado desaparece o disminuye y el derrame persiste o aumenta.

Sus contraindicaciones formales son : pulso duro, fuerte y cerca de 100 y agudeza del dolor del costado.

La fiebre de canthar. se manifiesta sobre todo por sensación de frío y escalofríos.

Pulso pequeño, concentrado, duro, bastante frecuente, sin calor en la piel; palidez alrededor de nariz y boca; ojos con ojeras, sordera completa; ausencia de ruido vesicular; soplo tubario más fuerte en la espiración que en la inspiración, en el vértice del pulmón, atrás y adelante.

Disnea intensa; palpitaciones, piel húmeda o sudor profuso.

Noches muy agitadas.

Tos breve, seca, frecuente.

Tirones dolorosos que cortan la respiración lo más a menudo en las regiones costales, derecha e izquierda, acompañando una disnea más o menos intensa. "Si con todos estos signos de un derrame que por sí mismo es capaz de determinar la elección de canthar., el enfermo presentara como síntoma concomitante una de las manifestaciones mórbidas siguientes : lengua desollada, excesivamente dolorosa y cubierta de pequeñas úlceras planas; bajo vientre un poco sensible, en profundidad al tacto; orina poco abundante, con emisión dolorosa y frecuente; gran debilidad, tendencia a síncope; se tendrá el complemento absoluto de la indicación perfecta de canthar., que, en este caso, será el medicamento soberano por excelencia; pero por más reales que sean los beneficios de este agente más recientemente introducido en la materia médica homeopática, no hay que exaltarlos en detrimento de sulph., que no debe ser olvidado en los derrames pleuríticos.

Desde hace largo tiempo, la experiencia ha hablado en su favor".

"Salta a la vista de todo el mundo, que los éxitos del vesicatorio de la antigua escuela en el tratamiento de las pleuresías se explican naturalmente por la acción dinámica de canthar sobre el cual me he extendido y al que volveré a tocar : solamente haré esta salvedad, que no podrá ser discutida, ni por los prácticos de la vieja escuela; los vesicatorios jamás actúan mejor que en las condiciones señaladas para la justa indicación de canthar., es decir en el momento en que la fiebre decrece, el dolor ha desaparecido o al menos disminuido notablemente y el derrame persiste con amenaza de agravarse".

Los otros medicamentos a comparar con canthar. en el tratamiento de la pleuresía son : acon., apis., bryon. etc.

Sus características particulares permitirán la elección.

Aparato circulatorio

Palpitaciones, pulso débil, irregular, tendencia a síncope.

Pericarditis con derrame sero fibrinoso.

Espalda y extremidades

Dolores en los riñones con deseo constante de orinar.

Dolores desgarrantes en tronco y extremidades.

Parecen tener acción especial sobre las rodillas donde determinan dolores que hacen gritar, agravados al menor contacto y acompañadas de sensación de hinchazón.

Dolores, ulceraciones en la planta de los pies, que impiden dar un paso.

Las convulsiones constituyen un síntoma habitual de los dolores típicos de canthar. : se acompañan a menudo de delirio, furor, los cabellos se erizan y los ojos están horriblemente convulsionados.

Las convulsiones tónicas dominan, trismus, rechinar de dientes, salivación, hidrofobia.

La paraplejía ha sido observada en algunos casos.

Piel

INFLAMACIÓN DE PIEL CON FORMACIÓN DE AMPOLLAS.

ERUPCIÓN VESICULOSA CON PRURITO Y ARDOR.

Dolores que escuecen, ardientes, con sensación como si la piel estuviera encarnada viva, aliviados por aplicaciones frías y seguidos de inflamación excesiva y tendencia a gangrena.

Erupción con descamación escamosa como harina.

Relaciones

Complementario

Camphora.

Antídotos

Acon., puls., también en ciertos casos camphora, apis, rheum.

Remedios que siguen bien

Bell., kali iod., merc., phosph., sepia, sulphur.

CAPSICUM

Capsicum o pimienta, es una planta anual de la familia de las solanáceas, originaria de las Indias orientales que también se encuentra en América del Sud, en el interior del África y en las islas del Pacífico.

Su fruto es una baya alargada, roja o amarilla, en otoño, época en que toma sabor a pimienta, acre, caliente.

Excita el apetito y es muy empleado como condimento, sobre todo en Inglaterra, América y ciertos países orientales.

"La mayoría de las substancias empleadas bajo la forma de condimentos, desazonamiento, de excitantes, como pimienta, té, café, serán dentro de algunas generaciones, escribe Kent, remedios muy útiles porque la gente se

intoxica con ellas lentamente y los efectos de esta intoxicación crónica en los padres provocarán en sus hijos una predisposición a los síntomas similares a los provocados por esas substancias".

Preparamos las diferentes dinamizaciones sea partiendo de una tinturamadre hecha con los frutos secos de capsicum, sea haciendo tres primeras trituraciones hahnemannianas sucesivas de este mismo fruto seco, lo que nos da las tres primeras dinamizaciones a partir de las cuales se obtienen las más elevadas por diluciones hahnemannianas sucesivas.

Acción general del medicamento

Aunque pertenece a la familia de las solanáceas capsic. posee pocas de las propiedades narcóticas de las plantas de esta familia.

Por el contrario, en altas dosis, tiene PROPIEDADES IRRITANTES que interesan especialmente las MUCOSAS y especialmente las del canal alimenticio.

Características

CONSTITUCIÓN Y TEMPERAMENTO : Capsic. desarrolla particularmente bien su acción en personas CON FIBRAS FLOJAS, MAS BIEN GORDAS, CON MÚSCULOS BLANDOS, QUE REACCIONAN MAL, TIENEN DIGESTIONES DIFÍCILES, SON IRRITABLES, Y SE ENOJAN SIN CESAR.

"Encontramos a menudo la indicación de capsic. en niños gordos, con músculos blandos, cuyos padres son grandes comilones de pimienta u otros condimentos estimulantes; en bebedores de cerveza; que tienen reacciones débiles, tejidos blandos, flojos, relajados, cara coloreada y tendencia marcada a las várices.

Sujetos gordos, redondos, que tienen una falsa plétora, como calc. ostr; la punta de la nariz y las mejillas están rojas, pero se abaten pronto; reaccionan mal cuando están enfermos, no reaccionan a los remedios, tienen una constitución perezosa, fatigada, sin elasticidad.

Escolar que no puede trabajar, estudia con dificultad, languidece y si está en pensión, extraña, desea volver a su casa. Gotosos, con tofos y crujidos articulares, articulaciones rígidas, torpes, débiles, incapaces de hacer un esfuerzo, perezosos como su naturaleza entera que no reacciona; friolento, sensible al aire, quiere estar en una pieza caliente, aún en tiempo normal; el aire libre lo pone friolento; son sensibles al frío y a los baños (Kent).

Capsic., es un medicamento en que se debe pensar en todas las afecciones que van acompañadas de SENSACIÓN DE GRAN ARDOR EN LAS MUCOSAS, cualesquiera sean.

Es un buen remedio en la disentería, en el dolor de garganta o en la última etapa de la gonorrea, cuando existe gran sensación de ardor, al nivel de la mucosa enferma.

Esta sensación de ardor, no es semejante a la de ars. o canthar; se parece A LA QUE PRODUCIRÍA LA PIMIENTA ROJA, APLICADA SOBRE UNA MUCOSA Y NO ES ALIVIADA POR APLICACIONES CALIENTES LOCALES.

Modalidades

Mejoría

POR EL CALOR EN GENERAL.

Comiendo.

Agravación

POR EL FRÍO, AL AIRE LIBRE, DESCUBRIÉNDOSE, POR LOS BAÑOS.

Están peor a la menor corriente de aire, aunque el aire no sea frío.

Síntomas mentales

Tiene HUMOR TRISTE; muy marcado; desea que se lo deje tranquilo; fácilmente violento, impulsivo; marcada disposición A LA TESTADUREZ, a tomar todo a mal, a montar en cólera, aún por bromas y a hacer reproches.

HUMOR CAPRICHOSSO Y EXCESIVAMENTE CAMBIANTE.

Tiene fácilmente NOSTALGIA.

Esta es la manifestación más saliente en el estado mental.

EXTRAÑA EL LUGAR; esta nostalgia va acompañada de rubor en las mejillas, insomnio, miedo etc. (carb. an., ignat., merc., phosph. ac., aur. met.).

Por otra parte capsic. está abrumado por PENSAMIENTOS PERSISTENTES DESUICIDIO, no quiere matarse, resiste a esta idea que lo envuelve, lo atormenta.

Es una idea de suicidio que no debe confundirse con el impulso al suicidio que se encuentra en otros remedios.

Cabeza

DOLORES DE CABEZA MUY VIOLENTOS, COMO SI FUERA A ESTALLAR, AL MOVER la cabeza, caminar, toser.

(Bryon., nat. mur., squilla, sulphur); sensación como si la cabeza fuese asaltada en pedazos, la sostiene en las manos; sensación dolorosa como si la cabeza fuese muy grande, agravada al caminar, toser, mejorada acostándose con la cabeza alta.

Dolor de cabeza pulsátil, con dolores latentes en frente y sienes; como si el cerebro fuera empujado con fuerza en la frente como si fuera a saltar.

Ojos

Inflamación en los ojos, con enrojecimiento, dolor ardiente y lagrimeo.

Ojos prominentes.

Trastornos de la vista, sobre todo a la mañana, como si tuviera algo en la córnea, mejorados por algunos instantes por la frotación.

Oídos

Dolor de oídos; dolores tractivos, agudos; dolores con comezón; dolores sordos en los oídos agravados por la tos, como si un absceso fuese a estallar.

Capsic. tiene acción especial sobre los huesos del oído y el mastoideo; frecuentemente es indicado en la mastoiditis.

Puede tener hipersensibilidad a los ruidos : "Los sentidos están muy agudizados en capsic; hipersensibilidad a ruidos, a olores; gusto, tacto" (Kent).

Cara

Mejillas rojas y calientes, y esto puede alternar con palidez.

La piel de las mejillas roja ardiente, con congestión capilar subcutánea.

Cara colorada y fría.

Dolores en los huesos de la cara, agravados por el tacto.

Aparato digestivo

BOCA :

Mal gusto en la boca.

Al toser, el aire que proviene de los pulmones provoca un gusto acre, maloliente, desagradable (Kent).

Grietas en los labios.

En lengua y labios ulceraciones sensibles, que se ensanchan.

Vesículas ardientes en labios, boca y lengua.

FARINGE :

Dolor de garganta con deglución dolorosa y tirones en la faringe; la mucosa parece querer sangrar, por lo roja que está.

Garganta dolorosa largo tiempo después de angina o resfrío.

Dolores ardientes en la garganta, cuya mucosa está roja oscura.

Irritación de garganta en bebedores, fumadores; está dolorosa, ardiente, contraída aún cuando no traguen.

ESTOMAGO :

En cuanto toma frío, comienza a tener sed; sed después de cada deposición disenterica, deseo súbito de agua helada que provoca escalofríos.

Deseo de agua antes de los escalofríos y una vez bebida aumenta los escalofríos y se acompaña de sensación de frío en el estómago.

Desea algo caliente, estimulantes, cosas picantes; se ve esto en alcoholistas, bebedores de whisky.

Tienen deseos de pimienta, de la que comen mucho, lo picante les aumenta el deseo de alcohol; es un círculo vicioso.

DIPSOMANIA; dipsómanos que han llegado a un estado tal que están obligados a levantarse de noche para beber un vaso de alcohol; sin el cual no podrían levantarse a la mañana; a la mañana, los tres o cuatro primeros vasos de alcohol que toman son vomitados y toman hasta que pueden retener uno; por eso se levantan de noche, para beber una dosis de alcohol que entonces será retenida; si no lo hacen los primeros vasos serán vomitados y estarán obligados a beber hasta poder retener uno.

Nux vom., ars., y capsic., serán útiles en tales casos.

Deseo de café, con deseo de vomitar después de haberlo tomado (Jahr).

Pirosis, dolores de estómago y epigastrio ardientes, inmediatamente después de haber comido.

Deseos de vomitar.

ABDOMEN Y DEPOSICIONES :

Ventre hinchado hasta estallar con tensión presiva y respiración dificultosa.

Cólicos ventosos.

Hemorroides dolorosa; arden y sangran como si se les hubiera puesto pimienta.

Deposiciones diarreicas, poco abundantes, con violenta sensación de ardor y tenesmo.

Después de la deposición debilidad con sed, pero el beber causa escalofríos.

Aparato urinario

Tenesmo vesical; dolores ardientes al orinar; estranguria.

Dolores mordientes, ardientes, después de la micción.

Orina mezclada con sangre.

Órganos genitales

Impotencia y partes genitales frías.

Blenorragia; el remedio es útil en este caso, en casos antiguos, cuando el enfermo no presenta ninguna reacción de defensa; la secreción es cremosa, la cara de tales sujetos, tiene una falsa apariencia de plétora, es roja; gordos, blandos, sensibles al frío, al que no reaccionan; micción dolorosa, ardiente, prepucio hinchado, doloroso.

Dolores en la próstata después de gonorrea.

Aparato respiratorio

NARIZ :

Catarros antiguos; un resfrío de cabeza provoca catarro naso-faríngeo, del que no se puede desembarazar "MUY a menudo, en enfermos poco inteligentes o poco observadores, es difícil obtener un cuadro sintomático útil, entonces, uno está obligado a guiarse por lo que se llama, el aspecto exterior del remedio; por eso en tales casos de catarro antiguo, si se tienen pocos síntomas; o si los remedios juiciosamente elegidos no despiertan las reacciones curativas del enfermo y se observa que tiene una cara roja, pero fría, punta de la nariz roja y fría, que es gordo de tejidos blandos sin resistencia, que tiene dificultad para aprender en clase, que el menor esfuerzo lo hace transpirar mucho, que se hiela al aire libre, esto nos da una clave para la elección del remedio que, dado a tal enfermo, despertará sus reacciones, tal vez no lo curará pero permitirá a silic., kali bich., u otro remedio dado sin éxito antes, actuar útilmente enseguida y curar" (Kent).

LARINGE BRONQUIOS Y PULMONES :

Ronquera crónica, molesta y fastidiosa.

"Vd. se encuentra frente a un resfrío al que se ha dado por ej., en sufaz aguda : acon., bryon., hep. o phosph., pero la molesta ronquera persiste.

Se ve entonces que se está frente a un enfermo gordo, friolento, con cara roja; su ronquera desaparece con capsic" (Kent).

Súbitos ataques de tos que convulsionan todo el cuerpo; sensación como si la cabeza o el pecho fuesen a estallar en pedazos cuando tose; al toser dolor en diferentes partes del cuerpo.

Vejiga, rodillas, piernas, etc.

Dificultad para respirar, disnea, necesidad de respirar profundamente.

Puntadas en el pecho al respirar.

Espalda y extremidades

Escalofríos que irradian de entre los hombros.

(Presión entre los hombros cada vez que bebe). (Abies can., ammon. mur., lachesis, sepi).

Dolores con tirones agudos en la espalda.

Rigidez de brazos y piernas, con hormigueos.

Piel

Piel húmeda y fría, marmórea a veces, o roja y fría; si se la pellizca, se arruga en pliegues que persisten después (Kent).

Fiebre

Capsic. da lugar a síntomas febriles que recuerdan bastante exactamente síntomas de la fiebre intermitente.

Fiebre con predominancia de frío con sed, luego calor ardiente; escalofrío con mucha sed, luego calor con sed y sudor.

Calambres en el cuerpo, con rigidez en brazos y piernas, acompañados de hormigueos y sensación de entumecimiento.

Repugnancia por el movimiento.

Estos síntomas se manifiestan principalmente a la tarde y de noche, se agravan al aire libre, por el frío, el movimiento, después de haber comido o bebido.

Relaciones

Antídotos

Cina, camph., china, calad., sulph. ac.

Remedios que siguen bien

Bell., cina, lycop., puls., silic.

CARBO ANIMALIS

Carbo animalis, carbón animal, o negro animal, es un medicamento introducido en la Materia Médica por Hahnemann, quien lo preparaba poniendo sobre carbones encendidos un trozo grueso de cuero de buey, fresco y sin curtir; lo dejaba arder hasta que dejara completamente de hacer llama; entonces lo sacaba de encima de los carbones ardientes y lo colocaba rápidamente en una prensa para extenderlo al abrigo del aire.

Una vez completamente frío, lo pulverizaba y con ese polvo preparaba las tres primeras dinamizaciones por trituraciones sucesivas, en azúcar de leche; a partir de la tercera trituración, obtenía las más elevadas por diluciones sucesivas.

Esta es todavía la mejor manera de preparar el remedio.

Acción general del medicamento

Carbo animalis PRESENTA COMO BASE de su acción general un estado de astenia orgánica, de depresión vital, de adinamia que recae principalmente en mucosas, tejido ganglionar y linfático y sistema venoso que está congestionado, lento.

A veces se asemeja bastante a carbo veg. y hay que tener mucho cuidado para diferenciarlos.

La acción de carb. anim. recae especialmente sobre los tejidos glandulares principalmente, ganglios de axilas, ingle, senos, testículos, glándulas parótidas, etc.

Características

CONSTITUCIÓN Y TIPO : Carb. an. parece especialmente apropiado a constituciones escrofulosas o venosas, o después de una enfermedad debilitante con circulación débil y lenta, y vitalidad disminuida, o en personas de edad (Boericke).

Ancianos o personas muy debilitadas por enfermedad larga y grave, y en los que hay marcada tendencia a plétora venosa.

Su piel tiene tendencia a ponerse azulada, manos y pies se ponen fácilmente violáceos, con las venas superficiales distendidas y netamente dibujadas de azul a través de la piel, mejillas a menudo azuladas, así como los labios.

Tales individuos se enferman por causas insignificantes; su circulación es lenta y su vitalidad está disminuida.

GRAN DEBILIDAD; FALTA DE ENERGÍA; POSTRACIÓN : Esta es una característica general del remedio, ligada, por lo demás, a la decadencia de las fuerzas vitales de la constitución de carb. an. que acabamos de describir. Sin embargo, cuando tal estado se encuentra en la última etapa de una enfermedad aguda desesperada, como fiebre tifoidea, neumonía, fiebre escarlatina, al final de una afección que parece tener que terminar en muerte, carb. veg. parece preferible.

El único caso en que carb. an. lo sobrepasa, es cuando esta gran debilidad se encuentra en una nodriza o cuando es consecuencia del agotamiento del amamantamiento : éste la ha debilitado a tal punto que hasta tiene dificultad para hablar. (Nash).

HIPERTROFIA GLANDULAR; LOS GANGLIOS Y LAS GLÁNDULAS SE HIPERTROFIAN Y SE

INDURAN : Esta hipertrofia glandular parece sobre todo marcada en la región de los ganglios de axila, ingle, seno, testículos, glándulas salivales; éstas tienen entonces gran tendencia a tomar una dureza cirrosa, al mismo tiempo que se transforman en sede de dolores punzantes, picantes, ardientes (conium, merc., iodo, flav.).

Glándulas que se hipertrofian, se endurecen al mismo tiempo que el tejido que las rodea se infiltra y la piel torna un tinte violáceo que indica obstrucción de la circulación venosa capilar; por otra parte estas glándulas hipertrofiadas y duras como piedra no tienen ninguna tendencia a ablandarse y supurar como en hep. sulf. calc., merc., o sulf.

Todo en la constitución de carb. an. está en gran estado de pereza, todo va más lento, la inflamación es rápida, pasiva; puede sobrevenir una inflamación casi de forma erisipelatosa, aquí la piel se vuelve azulada violeta, hay edema que conserva la marca del dedo, pero todo esto evoluciona lentamente, sin gran tendencia a curar.

Es todo el opuesto de bell; con este remedio se podrá encontrar inflamación glandular, pero con gran estrépito, rápida; piel roja, violeta también, pero caliente y tan sensible que apenas se puede tocar, con tendencia a reabsorción si se la deja tranquila.

La inflamación de carb. an., al contrario, sobreviene lentamente, tiene evolución lenta, y no hay ninguna tendencia a la curación.

Además, hay dolores ardientes intensos en la parte inflamada que está dura y color violáceo; ganglios cervicales infiltrados, duros, y que tienen dolores ardientes; bubones en ancianos o sujetos debilitados, con dolores ardientes en tejidos infiltrados, duros y violetas; pequeño tumor duro, en el seno, cubierto de piel violeta que está rojo-violeta y en el que hay dolores ardientes como carbones encendidos.

A la larga, sin embargo, carb. an. determina ulceración de tejidos glandulares, se forman, entonces, ulceraciones tórpidas, inertes : un bubón, un ganglio infiltrado se abre y supura, pero la secreción normal de pus cesa para ser reemplazada por un líquido icoroso, sanguinolento, al mismo tiempo que alrededor los tejidos se ponen duros, violetas y se instalan vivos dolores ardientes.

Carb. an. es a menudo el remedio en úlceras y fistulas cuyo contorno se vuelve duro, violeta, que experimenta vivos dolores ardientes y que dejan segregar un líquido irritante y malsano.

Por eso carb. an. es indicado en casos de ulceraciones cancerosas que arden, están rodeadas de tejidos infiltrados, duros, de color oscuro azulado, y dejan segregar un líquido icoroso e irritante, ardiente (Kent).

Modalidades

Lateralidad

Izquierda superior, derecha inferior.

Agravación

Al aire frío.

Mejoría

En la habitación caliente.

Síntomas mentales

Sonador y triste, desea estar solo, evita las conversaciones; se desanima fácilmente, se desespera; se asusta fácilmente, tiene miedo en la oscuridad.

Ansiedad nocturna con tufaradas congestivas.

Alternativas de alegría y tristeza, de irascibilidad o mal humor, taciturno.

Nostalgia con sentimiento triste de abandono, con lágrimas; en esto se puede comparar a capsic. en que la nostalgia se acompaña de excesiva tristeza, insomnio, pensamientos de suicidio; ignat. en que la nostalgia va acompañada de violento deseo de volver a ver sus amigos; está melancólico, triste, poco comunicativo; merc., cuya nostalgia va acompañada de gran ansiedad con temblor y agitación, sobre todo durante la noche en que tiene mucho insomnio, es

peleador, se queja de todo el mundo, tiene deseos de huir; phosph. ac. cuya nostalgia va acompañada de pérdida de apetito, adelgazamiento, somnolencia; es de humor taciturno, espíritu obtuso, trastornos de la memoria; aur. met., tiene gran deseo de volver a ver a los suyos, como una especie de nostalgia.

Sueño

Insomnio causado por inquietud, angustia, una especie de temor, de miedo de ahogarse; ansiedad nocturna con tufaradas congestivas.

Cara

Coloración azulada de las mejillas que pueden presentar manchas rojo-cobrizo.

"Puede haber una mancha amarillo-marrón, en la nariz, parecida a la mancha amarilla-marmórea que se encuentra en sepia". (Kent).

Aparato digestivo

BOCA :

Labios agrietados, hinchados, sangrantes.

Vesículas brillantes en boca y lengua.

Aliento fétido; sequedad de boca y lengua.

ESTOMAGO :

Asco por alimentos gordos (calc. carb., carb. veg., hep. sulf., calc., petrol.).

Pirosis.

Dolores crampoides y tractivos en el estómago.

Sensación dolorosa de opresión en el hueco del estómago.

Sensación de vacío, de desfallecimiento, en el hueco del estómago, que se alivia comiendo (carb. veg.).

"Cada vez que da de mamar a su hijo, tiene sensación de vacío, desfallecimiento, debilidad, en el hueco del estómago, y se ve obligada a retirar el niño" (Kent).

ABDOMEN Y DEPOSICIONES :

Sensación de frío en el vientre.

Hinchazón y borborigmos.

Constipación con deseos ineficaces; cuando trata de evacuar solo pasan gases.

Hemorroides a veces picantes y ardientes, con gran debilidad de la digestión y corrimiento de líquido claro, inodoro. (Farrington).

Órganos genitales

Reglas demasiado tempranas, abundantes, que duran demasiado, y SEGUIDAS POR GRAN POSTRACIÓN; la mujer está tan débil que tiene dificultad para hablar; SECRECIÓN ÚNICAMENTE A LA MAÑANA (borax, sepia).

Leucorrea ardiente y que escuece, y mancha la ropa de amarillo.

Leucorrea fétida e irritante (kreos., rhus tox., sepia).

Amenorragia con induración crónica de útero.

INDURACIÓN CRÓNICA DE ÚTERO QUE AUMENTA CADA AÑO (aur. mur., natrum. mur.).

Secreción mal oliente por el útero.

Reglas negras y fétidas.

Ulceración de útero con evolución progresiva hacia la malignidad.

Finalmente, esta pobre mujer, debilitada, que se ha arrastrado durante años en este estado, presenta una ulceración cancerosa del cuello que arde, sangra, deja segregar constantemente un líquido acuoso, fétido.

Los dolores ardientes del útero irradian hacia los muslos.

Ardor en vagina y vulva.

NUDOSIDADES dolorosas en los senos, particularmente a la derecha, DUROS, compuntadas, pinchazos, ardores; allí la piel está violeta (calc. fluor., conium, hydrast., etc.).

Aparato respiratorio

Aquí encontramos el mismo parecido entre carb. an. y carb. veg. que en los síntomas digestivos.

Ambos están indicados en la etapa tardía de la neumonía, bronquitis o tisis pulmonar cuando hay destrucción del parénquima pulmonar y esputos fétidos.

Carb. an. tiene, sin embargo, el siguiente síntoma para distinguirlo : tos ronca, sofocante, con sacudidas de la cabeza como si el cerebro se sacudiera en la caja craneana; sensación de frío en el pecho (bromium); expectoración verde, purulenta, y horriblemente fétida, proveniente especialmente del pulmón derecho en el que se encontrará, al auscultar, una caverna; sensación de sofocamiento en cuanto cierra los ojos. (Farrington).

Persiste un dolor punzante en el pecho, después de la cura de un apoplejía. (ran. bulb.). (Allen).

Espalda y extremidades

Debilidad muscular y articular.

Tobillos débiles en los niños (nat. carb.); esguinces fáciles (calc. ostr.).

Piel

Manchas cobrizas en la piel.

Carbo. an. es más útil que carbo. veg. en la sífilis constitucional, porque, siambos pueden estar indicados en este caso, después de abusos de mercurio, particularmente cuando hay induraciones ganglionares, carb. an. es el remedio especialmente indicado a causa de este síntoma : manchas cobrizas en la piel, más marcadas en la cara. A este respecto, se parece a merc. biod., nit. ac., petrol., y badiaga, más quea carb. veg. (Farrington).

Acné rosáceo.

Prurito generalizado.

Sabañones con tinte azulado de la piel (agar., ars. alb., nit. ac., petrol.,sulfur).

Verrugas en manos y cara con piel azulada.

Relaciones

Complementarios

Calc. ph. especialmente en afecciones ganglionares.

Antídotos

Nux vom., ars. alb., camphora.

Carb. an. y carb. veg. no se siguen bien uno al otro; no pueden ser dados con beneficio sucesivamente.

Carb. an. es a menudo indicado para combatir los síntomas que sobrevienen después de haber comido pescados o vegetales en mal estado (carbo. veg., cepa). (Allen).

CARBO VEGETABILIS

Carbo vegetabilis, carbón vegetal, o carbón de la leña se obtiene dejando calcinar madera en recipiente cerrado hasta que ya no despidan humo.

Para la producción en cantidad, los carboneros reemplazan el recipiente cerrado por una espesa capa de tierra cubierta de pasto.

Para el uso medicinal, se utilizan carbones provenientes de maderas blancas : sauce, abedul, álamo, y especialmente, haya; las tres primeras dinamizaciones se preparan por trituración.

Igual que carb. an. y graph., carb. veg. no es un carbón puro, pues contiene un poco de carbonato de potasio.

Acción general del medicamento

LA DESCOMPOSICIÓN Y UNA OXIDACIÓN IMPERFECTA son la base de la acción de carb. veg.

La sangre parece estancarse en los capilares, causando CIANOSIS, EQUIMOSIS Y ENFRIAMIENTO; bajo su influencia el cuerpo se vuelve cianótico y frío como hielo.

Determina GRAN DEBILIDAD, como si la fuerza vital ya no tuviera bastante energía para permitir al organismo seguir viviendo.

Produce ATONÍA DE MUCOSAS cuyas SECRECIONES AUMENTA Y VUELVE ÁCIDAS, PÚTRIDAS, OFENSIVAS.

Además, trae HEMORRAGIAS en toda mucosa.

Bajo su influencia, LA COMPOSICIÓN DE LA SANGRE SE ALTERA PROFUNDAMENTE.

Espanet escribe sobre la acción del carbón estas líneas : "Los efectos del carbón representan un estado de astenia por el cual la inervación cerebro espinal y los nervios trisplancoicos son atacados por la inercia; el movimiento nutritivo, la plasticidad, las funciones del aparato circulatorio y de los órganos secretores se hacen más lentas, se entorpecen; hay entorpecimiento general, adinamia, estancamiento de sangre en los capilares, congestión pasiva del sistema venoso y sobre todo, parálisis.

Este estado grave es precedido por ansiedad, timidez, indecisión, horror al trabajo, desesperanza, deseo de muerte y, a veces, irascibilidad; vértigo; estupidez; se constatan dolores tensivos, congestivos, ardientes, en la cabeza y en todo el cuerpo, con agravación de noche, al atardecer; al aire libre, y por el frío.

El sueño no es reparador y los fenómenos que dependen de la calorificación y la motilidad, se agravan a la mañana.

Los síntomas de irritación tienen carácter erético y congestivo poco consistente; recuerda la acción de ars. por la sensación de ardor que acompaña las congestiones y los dolores, por la ansiedad, caída rápida de las fuerzas, prurito en la piel, e irritación de las mucosas de los sentidos, por ciertas erupciones petequiales, por agotamiento de las fuerzas musculares, finalmente, por la facilidad para enfriarse, mientras la inflamación parece dominar.

La debilidad paralítica, insensibilidad, convulsiones, aliento frío, rápido enfraquecimiento de la cara, ojos hundidos en sus órbitas, tinte negrozco de la piel, ausencia de pulso, facies hipocrática, hemorragias pasivas, flujos involuntarios, son el último grado de la acción del carbón.

Lo físico y lo moral caen por igual en el entorpecimiento.

Pocos medicamentos son tan eminentes en el último período de las enfermedades, cuando va acompañado de estancamiento de sangre en los capilares".

"El carbón comprende todos los sistemas orgánicos en su esfera de acción, a causa de su influencia sobre los nervios ganglionares (es decir, el simpático) y sobre el sistema capilar venoso, pues está especialmente en relación con los nervios de la vida orgánica, las extremidades de los vasos sanguíneos y la misma sangre; su acción sobre los otros es una consecuencia de estas relaciones y del entorpecimiento general, así como del estancamiento que de ahí resulta.

Su acción sobre el sistema capilar venoso puede compararse a la de merc. sobre el linfático y sus capilares, o a la de phosph. sobre los arteriales.

Como la de ars. alb. su acción se caracteriza por la ataxia y una violenta obstrucción sanguínea que en el primero termina en gangrena y en el carbón, en asfixia.

El tumulto de la reacción existe aún en la putrefacción, efecto del arsénico : el entorpecimiento de la circulación y la inercia nerviosa diferencian entonces la acción del carbón; su pulso es pequeño y más bien escaso que frecuente.

En su acción sobre los capilares de las extremidades, carb. veg. hace la incompetencia al ESPOLÓN DE CENTENO para la hinchazón lívida de los dedos grandes del pie, y los estasis asténicos de la sangre; y a caust. cuyo estancamiento tiene un carácter seroso, mientras que las de carb. son venosas.

Por ello, su acción electiva sobre la sangre es mucho más especial, ya actúa directamente sobre este líquido modificando su vitalidad en un sentido opuesto a la acción descomponente de caust., o modificando la hematosi por la asfixia lenta determinada.

Carb. es eminentemente ASTENICO; es el opuesto de acon. en su acción sobre el sistema sanguíneo y de nux vom. sobre el nervioso.

Características

1) CONSTITUCIÓN Y TEMPERAMENTO : Es especialmente útil en enfermos avanzados en la vida y en debilitados.

Se adapta particularmente a personas débiles, delicadas, de cierta edad, dispépticas, sobre todo después de surmenage de los órganos digestivos por excesos.

Conviene a todos los estados de debilidad profunda; en personas de edad con congestión venosa; en caquexias; en la agonía, cuando la cabeza está aún caliente mientras el resto del cuerpo está frío : la piel, la transpiración, etc., el pulso es rápido, imperceptible, la opresión y la falta de aire son tales que el enfermo pide sin cesar que lo abaniquen. (Dr. Mouezy-Eon).

2) LENTITUD, PEREZA, TURGENCIA : Estas son las expresiones que, al estudiar el remedio, se presentarán sin cesar, puesto que tales estados se producen sin cesar a lo largo de su patogenesia.

En la economía de carb. veg. todo es lento, turgente, distendido, hinchado : manos hinchadas, venas hinchadas; el cuerpo parece turgente, hinchado por superabundancia de humor en los conductos que lo encierran naturalmente o en los intersticios de los elementos anatómicos, después de salir de los vasos e infiltración; la cabeza como llena de sangre; las extremidades parecen pesadas, a tal punto que el individuo necesita tener las piernas y los pies levantados para permitir circular a la sangre; venas dilatadas, varicosas sus paredes parecen blandas, relajadas, paralizadas; parálisis vaso-motriz; extremidades torpes, parecen hinchadas.

Todo el estado mental, como el físico, es lento; operaciones mentales lentas; lentitud para pensar, perezoso, indolente; no puede entrar rápidamente en actividad o despertar en si-mismo el deseo de hacer algo; quiere permanecer acostado y dormir.

Coloración de la piel oscura; circulación capilar obstruida; rostro purpúreo, la menor bebida estimulante, el menor alimento excitante traen a este rostro sombrío, vivo rubor.

Al ver reunidos, alrededor de una mesa servida de vinos, se puede diagnosticar entre ellos a los sujetos de carb. veg. al ver su rostro empurpurarse de repente; este rubor desaparece rápido, pero reaparecerá pronto.

Coloración oscura, casi sucia de la piel que está blanda.

3) DEBILIDAD INQUIETANTE; DEBILIDAD EXTREMA; COLAPSO : Debilidad tan extrema como característica.

Esta debilidad lo coloca al lado de china y ningún otro remedio la sobrepasa.

Carb. veg. forma con ars. alb. y mur. ac. un trío de primera magnitud en caso de debilidad extrema.

En casos en relación con ENFERMEDAD AGUDA, tenemos el siguiente cuadro clínico : fuerzas vitales casi agotadas; superficie del cuerpo fría, sobre todo, piernas, rodillas, pies; el enfermo está inerte, sin movimientos, como moribundo; aliento frío, pulso pequeño, fugaz, intermitente; piel cubierta de sudor frío, sobre todo en las extremidades; la sangre se detiene en los capilares causando cianosis, equimosis y sensación de frío en la piel, ya descripta.

No puede respirar si no se lo abanica, cosa que pide sin cesar.

En pocas palabras, es la descripción de un estado desesperado como el del final de la evolución de una enfermedad aguda muy grave, por ej. fiebre tifoidea. (Nash).

En casos relacionados con ENFERMEDAD CRÓNICA está indicado en CAQUECTICOS CUYA POTENCIA VITAL ESTA DEBILITADA Y ESPECIALMENTE CUANDO LA ENFERMEDAD PARECE

CONSECUENCIA DE UNA ENFERMEDAD ANTERIOR CUYA INFLUENCIA DEPRESIVA HA

PREPARADO EL TERRENO PARA LA AFECCIÓN ACTUAL : por ej., en el asma que sobreviene después de coqueluche; jamás se sintió bien después de la época en que realizó un esfuerzo agotador; sus sufrimientos actuales se remontan a una herida anterior, a viejo traumatismo, etc. (Nash).

Esto es lo que quiere decir Boericke, cuando escribe : "PERSONAS QUE NO SE DESEMBAZAN NUNCA DE LOS MALOS EFECTOS DE UNA ENFERMEDAD ANTERIOR".

4) SECRECIONES OFENSIVAS, PÚTRIDAS, ACRES, ICOROSAS; ULCERACIONES; GANGRENA :Produce atonía de mucosas, cuyas secreciones que son acres, ofensivas, aumenta.

Tejidos débiles; una vez lesionados, no hay tendencia a la reparación; y si se forma ulceración, mucosa o de otra índole, no curará.

Como consecuencia de mala circulación, de su estasis capilar, hay gran tendencia a gangrena.

La menor inflamación pronto se pone negra y se escara fácilmente.

5) TENDENCIA A HEMORRAGIAS :Ningún remedio puede reemplazarlo en estados profundamente quebrantados, debilitados, y en que las superficies mucosas sangran fácilmente, pareciendo demasiado esponjosas para retener la sangre que las recorre.

Hemorragias de sangre oscura, descompuesta, no coagulable por profundo estado de destrucción globular.

Supuración de sangre en las superficies inflamadas; supuración de sangrenegruzca en ulceraciones; flujo de sangre por pulmones, útero, vejiga; hematemesis.

Es UNA HEMORRAGIA PASIVA : de la circulación debilitada nacerá y continuará una supuración capilar.

El remedio no presenta casi nunca lo que podría llamarse flujo activo, surgente, como el de bell., ipeca, acon., sécale y otros remedios en que la hemorragia es violenta : en él se trata de SUPURACIÓN CAPILAR PASIVA.

Esto se ve en mujeres que tienen por la vulva secreción de sangre casi continuay tal que el período menstrual parece eternamente prolongado; secreción interminable de sangre después del parto y cuando las contracciones uterinas hubieran podido detener toda pérdida.

Después de una herida en la piel, de una intervención quirúrgica, no hayninguna tendencia a la retracción; las arterias han sido perfectamente ligadas, pero las paredes de venas y capilares no se contraen y la sangre continúa fluyendo (Kent).

Sensaciones

DE ARDOR :

Mucho ardor en venas, en capilares; en la cabeza; comezón y ardor en la cabeza.

Sensación de ardor en las partes inflamadas.

Ardor interno y frío externo.

DE FRÍO :

Sensación de frío con corazón y circulación débiles.

Frío de hielo.

Manos y pies fríos y secos o fríos y húmedos.

Rodillas frías, nariz, orejas y lengua frías.

Sensación de frío en el estómago, con ardor.

Está cubierto de sudor frío, como en el colapso.

Colapso con aliento frío, lengua y rostro fríos; se parece a un cadáver(ant. tart., ars. alb., camphora, tabac., ver. alb.).

En todos estos estados de frío, el enfermo pide que se lo abanique.

FLATULENCIA : GRAN FLATULENCIA; GRAN ACUMULACIÓN DE GAS EN EL ESTOMAGO;profunda molestia estomacal relacionada con flatulencia, peor estando acostado.

Esto puede presentarse en diferentes afecciones de este órgano, desde simpledispepsia, hasta cáncer.

ESTA FLATULENCIA PUEDE TAMBIÉN PRESENTARSE EN EL ABDOMEN, PERO ENTONCES SE SITÚA ESPECIALMENTE EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTA ZONA, aunque puede extenderse lo suficiente para causar meteorismo.

Modalidades

Agravación

Al atardecer; por el tiempo húmedo o caliente; después de haber comido alimentos grasos; después de haber bebido vino.

Mejoría

Al abanicario; por los eructos.

Síntomas mentales

Un síntoma notable de carb. veg. es la INDIFERENCIA MENTAL.

ES INCAPAZ DE PERCIBIR O EXPERIMENTAR LAS IMPRESIONES QUE LAS CIRCUNSTANCIAS DEBERÍAN HACER NACER EN EL.

Sus afectos están borrados de tal manera que nada de lo que dice parece exitarlo o turbarlo; oye las cosas sin experimentar gusto o disgusto y sin que su pensamiento se fije en nada; tampoco parecen afectarlo cosas horribles, ni alegrarlo cosas alegres; no sabe si ama o no a su mujer y a sus hijos.

Todo esto es consecuencia de su pereza espiritual, de su incapacidad para reflexionar; su espíritu está confuso y no puede pensar; todas estas cosas están ligadas a la urgencia del remedio (Kent).

Gran estado de ansiedad; está angustiado, ansioso "como un poseso"; ansiedad al cerrar los ojos, al acostarse a la noche, al despertar.

Se asusta fácilmente; tiene miedo a aparecidos, fantasmas; aversión a la oscuridad.

Sueño

Sueño tardío con insomnio y agitación.

Su sueño está tan lleno de ansiedad que se puede decir que es terrible.

Al dormirse tiene ansiedad, sobresaltos, sacudidas, sufre.

Tiene un singular sueño apático igual al de la muerte, con visiones; visiones horribles, ve fantasmas.

Despierta en la ansiedad y cubierto de sudor frío; está agotado, el sueño no lo descansa; al contrario, su sueño lo sumerge en postración.

Está tan ansioso que no quiere dejarse vencer por el sueño.

Cabeza

Dolores de cabeza, generalmente OCCIPITALES; sensación de plenitud, turgencia, distensión, en la cabeza; su cuero cabelludo le parece demasiado estrecho.

Dolor de cabeza sordo en el occipucio o, al contrario, violento dolor occipital con imposibilidad de moverse porque le parece que su cabeza va a estallar, que algo le tritura el occipucio.

Cuando el dolor se sitúa en el occipucio, la cabeza parece tirada para atrás sobre la almohada, parece no poder levantar la cabeza de la almohada (opium); latidos dolorosos en la cabeza durante la inspiración, inspiraciones suaves y cortas; permanece lo más tranquilo posible hasta que finalmente se ve obligado a tomar una inspiración profunda, lo que hace lanzando un grito penetrante (Kent).

Congestión de cabeza con constricción espasmódica, náuseas y sensación de presión sobre los ojos.

Impresión como de principio de coriza después de haber permanecido en un departamento demasiado caliente (Kent).

Varios de estos dolores de cabeza sobrevienen después de haber tomado frío, como consecuencia del tiempo frío y húmedo, por haber penetrado en un lugar frío y húmedo, o bien como consecuencia de haber suprimido un viejo catarro; en efecto, a menudo el sujeto de carb. veg., sufre de un antiguo catarro y sólo se siente bien cuando la secreción nasal corre libremente; pero si toma frío y la secreción cesa, sobreviene congestión de cabeza; no puede soportar la supresión de las secreciones.

Todo esto recuerda a kali bich., kali iod., sepia (Kent).

Cabeza sensible al frío; si se acalora y su cabeza transpira, y después una corriente de aire llega a esta cabeza transpirada, su catarro se detendrá inmediatamente y sobrevendrán dolores de cabeza.

Transpiración, sudor frío, particularmente en cabeza y frente; el paciente de carb. veg. tiene fácilmente sudor frío abundante que comienza en la frente, que está fría, que parece fría al tocarla y a la que el menor soplo de aire que la roce provocará dolor; quiere estar completamente cubierto (Kent).

Dolores de cabeza agravados por la presión del sombrero; el sombrero más liviano le parece demasiado pesado.

Erupciones en el cuero cabelludo; caída de cabello que pierde a puñados.

Ojos

Dolores ardientes en los ojos, comezón, presión.

Los ojos pierden el brillo; están hundidos y las pupilas no reaccionan a la luz.

Oídos

Secreción de líquido fétido, icoroso, excoriante; especialmente cuando las secreciones son viejas, y han sobrevenido después de escarlatina, rubéola, de un ataque de malaria, etc.; se debe pensar en este remedio cuando los síntomas son confusos y cuando el enfermo ha sido tan drogado que el caso está absolutamente embrollado; provoca una reacción, establece una mejor circulación, y cura particularmente el caso, después de lo cual y una vez aparecidos los síntomas con más claridad, se puede elegir definitivamente un remedio mejor.

Cara

Rostro pálido con TUFARADAS DE CALOR, SÚBITO ENROJECIMIENTO VIOLENTO EN CUANTO BEBE LA MENOR CANTIDAD DE VINO U OTRA BEBIDA O ALIMENTO EXCITANTE, FACIES HIPOCRÁTICA gris amarillo con ENFRIAMIENTO de cabeza, sudores, fríos, etc.

BOCA :

Encías retraídas, esponjosas, que sangran fácilmente al tocarlas o por simple succión; muy sensibles y aún dolorosas durante la masticación o simplemente al apretarlas con fuerza una contra otra.

Corrimiento de sangre en las encías al cepillarse los dientes (phosph).

Lengua fría, blanca o amarillo-marrón.

Boca seca; ulceraciones en la mucosa bucal con gangrena fácil.

GUSTO A SALADO EN LA BOCA; todos los alimentos le parecen demasiado salados (cyclam., merc., puls., sepia, etc.).

ESTOMAGO :

Gran deseo de café, ácidos, cosas saladas o azucaradas (Kent).

Aversión por leche, carne y LAS COSAS GRASAS (puls.).

Estómago muy débil; la acidez y la pirosis son frecuentes; el alimento más simple le cae mal, pero sobre todo todos los alimentos grasos; en esto, carb. veg. tiene éxito cuando puls. fracasa (Nash).

Pero su acción más notable y preciosa es su poder de causar y curar LOS DOLORS DEBIDOS A EXCESIVA FLATULENCIA ESTOMACAL.

En efecto, carb. veg.

LLENA EL ESTOMAGO DE GAS.

ERUCTOS, pesadez, sensación de plenitud y de somnolencia; DISTENSIÓN POR FLATULENCIA, CON DOLORS, PEOR ESTANDO ACOSTADO; eructos después de haber comido o bebido; UN ERUCTO LO MEJORA TEMPORALMENTE, eructos rancios, ácidos, pútridos; disnea por flatulencia; digestión lenta; los alimentos fermentan antes de ser digeridos; sensación de plenitud después de algunos bocados de alimento. (Para la flatulencia, compararlo con china, lycop., etc.).

Sensación de vacío, desfallecimiento, en el estómago : el comer no le produce ningún alivio.

Náuseas a la mañana, ardores de estómago, que se extienden a la espalda, a lo largo de la columna dolores crampoides que obligan al enfermo a doblarse en dos.

Región epigástrica dolorosa.

Gastralgia de las amas de leche con extrema flatulencia y eructos ácidos.

Dispepsia proveniente de excesos de alimentación o después de una juerga; trastornos estomacales por abusos de alcohol (nux vom.).

Kent escribe : "Si quisiera fabricar un sujeto de la constitución de carb. veg., comenzaría por atiborrarlo de alimentos grasos, ricos, de salsas, budín, dulces, todo en enorme cantidad, y también le daría vino en gran abundancia, pronto vería dibujarse la patogenesia del remedio".

ABDOMEN :

EXTREMA DISTENSIÓN FLATULENTE, SOBRE TODO EN SU PARTE SUPERIOR Y MEJORADA MOMENTÁNEAMENTE ELIMINANDO GASES.

Esta mejoría momentánea es lo contrario de lo que se ve en lycop. y china, a los que la eliminación, no sólo no alivia, sino que, a veces, los agrava, les parece estar más molestos.

Cólicos flatulentos.

Numerosos y abundantes gases fétidos.

No puede soportar ropas ajustadas alrededor de la cintura y abdomen.

EL HÍGADO, así como los otros órganos, está en un gran estado de entorpecimiento y pereza.

Puede estar HIPERTROFIADO Y DOLOROSO, espontáneamente o a la palpación.

Circulación porta perezosa, obstruida; hay más o menos ESTASIS PORTAL, de donde la formación de várices, hemorroides, etc.; le gusta sentarse con las piernas sobre la mesa, porque esto facilita la circulación.

RECTO Y DEPOSICIONES :

Ardor anal; hemorroides ardientes.

Constipación con hemorroides que empeoran cada vez que siente secreción analfúmeda; perineo doloroso, comezones; a veces, las hemorroides salen y están azuladas, violetas, de tan repletas de sangre (Farrington).

Especialmente DIARREA con deposiciones principalmente acuosas, matinales, acompañadas de cólicos, seguidas de ardor, y EXTREMADAMENTE FÉTIDAS, OFENSIVAS, con muy mal olor, olor cadavérico (ars. alb., kali ph., lach., ptélea, etc.).

Aparato urinario

Viejos estados de catarro vesical, cuando la orina contiene abundante depósito mucoso, especialmente en ancianos, con rostro frío, extremidades frías (Kent).

Disminución de secreción urinaria.

Hematuria.

Órganos genitales

MASCULINOS :

Debilidad y relajamiento de los órganos genitales que cuelgan blandos y fríos.

Espermatorrea.

FEMENINOS :

Prurito, ardor, excoりaciones de vulva.

Várices vulvares.

Sensación de pesadez en el útero que da la impresión de que estuviese colgando; sensación como si fuera a escapar (sepia).

Leucorrea antes de las reglas, blanca, como leche, o amarillo-verdosa, espesa, muy corrosiva.

REGLAS DEMASIADO TEMPRANAS Y ABUNDANTES, precedidas de dolores, calambres en el vientre, o demasiado débiles, con sangre pálida.

Antes de las reglas calambres en el vientre y dolores de cabeza, riñones, en el vientre. (Jahr).

Hemorragia lenta o, más exactamente, secreción de sangre en la vulva, casi de un período al otro; consecuencia de atonía del útero, y que es el opuesto de "chorro" hemorrágico de bell., ipeca, sécale, hamam., en que la sangre viene como en chorros seguidos naturalmente de constricción de útero.

Retención placentaria por atonía muscular con secreción de sangre : después de carb. veg. la musculatura se contraerá y expulsará la placenta.

Supresión de la leche; postración o gran debilidad como consecuencia de la mamantamiento. (Kent).

Aparato respiratorio

NARIZ :

Epistaxis diaria con cara pálida.

Epistaxis después de un esfuerzo, con cara pálida.

Venas varicosas en la nariz.

Coriza perpetuo : el menor calor lo hace transpirar abundantemente y el menor frío lo hiela; resfríos de cabeza continuos comienza por secreción nasal acuosa y estornuda noche y día; tal vez tenga epistaxis; después, la irritación llega a la garganta a la que trae dolor y sensación de sequedad; ronquera dolorosa en laringe y garganta, peor al toser al final, este estado se extiende al pecho y la secreción se hace verde-amarillenta, espesa, con mal gusto.

Este coriza va, a menudo, acompañado de trastornos dispépticos, distensión estomacal y abdominal, con eructos, gases.

Además cada vez que su estómago se resiente, puede padecer coriza con ronquera y catarro de pecho (Kent).

LARINGE :

Como hemos visto, carb. veg. causa y cura una fuerte ronquera cuya característica es que empeora al aire húmedo y especialmente marcada a la noche.

También puede agravarse a la mañana, si el aire está húmedo; sin embargo, la ronquera matinal corresponde más a menudo a caust. (Nash).

Es más parecida a la de phosph., que también tiene agravación a la mañana, y por el que a menudo es presidido o seguido.

Carb. veg. es un buen remedio para el PRINCIPIO DE LA COQUELUCHE, cuando el caso es confuso, cuando la tos no es bastante característica como para indicar el remedio, o cuando el caso sólo toma un desarrollo parcial.

En tales casos, una dosis de carb. veg. mejorará y en las formas benignas disipará la coqueluche en pocos días; o si no cura de manera permanente, hará aparecer más claramente los síntomas del remedio que aportará la curación (Kent).

TOS CON ARDOR EN EL PECHO, peor a la noche, al aire libre, después del descanso y de haber hablado.

TOS ESPASMÓDICA con rostro azulado y expectoración fétida.

PECHO :

ARDOR COMO PRODUCIDO POR UN CARBÓN ARDIENTE EN EL PECHO.

SENSACIÓN DE DEBILIDAD; DE FATIGA EN EL PECHO; aquí debemos elegir entre : carb. veg., phosph. ac., sulfúrico y zincum (Nash).

Rales mucosos en el pecho; tos con sensación de ardor en el pecho; tos espasmódica con expectoración fétida; neumonía descuidada.

Hemorragia pulmonar.

Opresión peor de noche con aliento frío y deseo de ser abanicado constantemente.

Carb. veg. ha sido reconocido como muy eficaz en casos desesperados de NEUMONÍA y conviene mucho después del fracaso de tart. emet. para ayudar al enfermo a desembarazar sus pulmones de las grandes cantidades de mucus que los llenan; hay cianosis y la parálisis pulmonar amenaza; los esputos son fétidos, el aliento helado y el enfermo pide sin cesar que lo abaniquen (Nash).

También es útil en el ASMA DE LOS ANCIANOS, en los casos desesperados en que el enfermo parece moribundo. Particularmente en ancianos cuya constitución ha sido profundamente menoscabada, especialmente el sistema venoso. (Nash).

Aparato circulatorio

El corazón parece presa de violentos esfuerzos; se sobreentiende que se trata del corazón derecho, el corazón venoso, especialmente, el que está en aprietos.

Estado de turgencia, de lucha, de relajamiento de todo el sistema venoso.

ACCIÓN TUMULTUOSA DEL CORAZÓN EXPERIMENTADA A TRAVÉS DE TODO EL CUERPO; allatir, el corazón sacude el cuerpo entero.

Tufaradas de calor que van de abajo hacia arriba y terminan en transpiración.

Entorpecimiento completo; amenaza de parálisis del corazón.

Sensación de ardor, dolores ardientes en la región del corazón.

Siente la acción tumultuosa del corazón y el soportarla lo agota.

Sensación de angustia, de ansiedad, en el pecho, en la región del corazón, como si estuviera por morir (Kent).

Debilidad de todo el sistema vascular.

Pulso pequeño, irregular, casi imperceptible, frecuente.

La sangre se estanca en los capilares.

Cianosis de las extremidades.

Venas varicosas, VARICES AZULADAS como repletas de sangre venosa.

Es de inestimable valor en HEMORRAGIAS producidas por profunda alteración de las mucosas.

Ningún remedio puede reemplazarlo en estados profundamente debilitados en que las superficies mucosas dejan filtrar la sangre, pareciendo demasiado esponjosas, demasiado permeables, para poder retenerla; su vitalidad ha

desaparecido con la vitalidad nerviosa del enfermo cuya cara y piel están pálidas, aún antes de que la hemorragia se haya producido; china Y carb. veg. son en estos casos complementarios (Nash).

Carb. veg. marcha, en estos casos, de la mano con china y ars. alb.; este último es útil en hemorragias persistentes, de tipo asténico, bajo la dependencia de la degeneración del órgano afectado.

Carb. veg. y ars. alb. tienen violentos dolores ardientes, pero ars. alb. tienen irritabilidad de tejidos y espíritu, cosa que no sucede en carb. veg. que es un remedio tórpido, perezoso, mientras que ars. alb., tiene irritabilidad, agitación y ansiedad que le son características. (Farrington).

Espalda y extremidades

Rigidez de nuca y músculos del cuello con puntadas en la espalda.

Rodillas y piernas frías.

Cianosis de extremidades.

Várices.

Dolores ardientes en las articulaciones.

Dolores paralíticos en las piernas.

Calambres en piernas y planta de pies.

Gangrena senil que comienza en los dedos grandes de los pies.

Piel

ÚLCERAS INDOLENTES CON DOLORES ARDIENTES Y SECRECIÓN ICOROSA, OFENSIVA; TENDENCIA A GANGRENA DE LOS BORDES DE LA ULCERACIÓN; tales ulceraciones son NETAMENTE DE TIPO ÁTONO, son superficiales y tienen indiscutible tendencia a extenderse en superficie y no en profundidad.

En esto se puede comparar al remedio a ars. alb., hep. sulf. calc., lach., merc. sol.

ÚLCERAS VARICOSAS INDOLENTES, que sangran fácilmente, CON DOLORES ARDIENTES, peor al atardecer, y secreción icorosa, fétida (fluor ac.).

GANGRENA con DOLORES ARDIENTES.

ESCARAS en enfermos que han permanecido largo tiempo en cama.

Forúnculos con tendencia a gangrena.

Ars. alb. se le distingue en este caso por su agitación extrema.

Comezones al atardecer en el calor de la cama (sulfur).

Piel AZUL, CIANOTICA, FRÍA.

SUDORES FRÍOS.

Fiebre

Escalofríos violentos con frío y a PESAR DE ESTE FRÍO.

EL ENFERMO PIDE DE BEBER AGUA FRÍA; ESCALOFRÍOS CON CUERPO FRÍO

OBJETIVAMENTE COMO HIELO.

El escalofrío puede ser unilateral, un lado del cuerpo muy frío y tembloroso y el otro conserva su calor natural.

Acceso de dolor pasajero, sin sed.

Sudores debilitantes, fríos, abundantes.

Relaciones

Antídotos

Es antidotado por ars. alb. y por camph; antagónico de caust.

Complementarios

Kali carb., especialmente en afecciones de la garganta, pulmones y dispepsia; DROSERA, china.

Es complementario de phosph. en afecciones del pecho y sobre todo de garganta, y también de la debilidad excesiva particularmente en amenazas de parálisis de toda la economía, como consecuencia de enfermedad grave.

CAUSTICUM

Causticum, o TINCTURA ACRISIME kali PREPARATUM HAHNEMANNI, o tintura acre sin potasa de Hahnemann, es un medicamento especial de la Homeopatía.

Completamente desconocido hasta Hahnemann.

a éste le corresponde el honor de haberlo introducido en nuestra Materia Médica.

No obstante, su composición química, tan misteriosa, ha hecho que algunos médicos de nuestra época llegasen a poner en duda su acción.

Por eso el Dr. Pierre Schmidt, en un estudio muy completo que hizo de la farmacología del remedio, recuerda que "la acción de causticum es bien evidente, puesto que su experimentación fue hecha con altas diluciones, y que hoy, todavía, todos reconocen y utilizan altas dinamizaciones.

En nuestros días, su reputación está perfectamente establecida y todos los médicos homeópatas conscientes lo utilizan y lo colocan entre los grandes policrestos en las afecciones crónicas".

(Comunicación a la Sociedad Rhodanienne de Homeopatía, en mayo 1928, sobre : "La Pharmacologie de causticum").

Para obtener este pretendido principio de la causticidad de los álcalis, Hahnemann indicó varios procedimientos que, aunque con algunas diferencias de detalles, hacen obtener preparaciones bastante análogas en sus efectos y que sólo se distinguen por su grado de potencia.

La preparación más enérgica, la única que hoy se usa, es la siguiente : se toma, aproximadamente, un kilogramo de cal recién apagada y después de sumergirla un minuto en agua destilada, se la coloca en un recipiente bien seco, donde después de haber desarrollado mucho calor y vapor, pronto se transforma en polvo.

Sesenta gramos de este polvo, mezclados en un mortero de porcelana con igual cantidad de bisulfato de potasa previamente fundido a fuego fuerte, luego enfriados, forman con sesenta gramos de agua hirviendo, una masa espesa que se coloca en un retorta para proceder a su destilación hasta su completo desecamiento.

El producto de esta destilación, de aproximadamente 45 gramos de peso, contiene el causticum en estado de concentración; es un líquido claro como el agua, con el olor de la disolución de la potasa cáustica, que causa una impresión estíptica sobre la lengua y extremo ardor en la garganta, que se congela a un grado de frío un poco más elevado que el necesario para congelar el agua.

Finalmente, el hidrocloreto de barita no revela la presencia de ácido sulfúrico, como el oxalato de amoníaco, el de la cal.

Una gota de este líquido mezclada con 100 gotas de alcohol nos ayuda a preparar por los procedimientos de dinamización, nuestra 1ra. centesimal, de la que obtenemos dinamizaciones más elevadas por los métodos hahnemannianos.

Con respecto a la constitución de este remedio, se han emitido las más diversas hipótesis, pero para encontrar un trabajo satisfactorio debemos llegar a 1926.

Es el Dr. Wagner, de Basilea, quien publicó entonces un trabajo sobre el tema y que es el único estudio que merece actualmente ser aceptado, pues es el primero que da la conclusión de investigaciones efectuadas a la luz de nuestros modernos conocimientos.

Según el Dr. Wagner, esta misteriosa preparación llamada causticum no es otra cosa que UNA DÉBIL SOLUCIÓN DE HIDRATO DE AMONÍACO que contiene un poco de SULFATO DE AMONÍACO, puesto que el origen del amoníaco se encuentra en el proceso de Calcinación de la Cal.

Luego, caust. debe entrar en el grupo "ammonium" y no en el "Potassium".

De cualquier manera, Hahnemann ha dotado a la terapéutica de un potente agente y ha tenido razón suficiente para considerarlo como un medicamento constitucional importante.

Acción general del medicamento

En conjunto, caust. es un MODIFICADOR PROFUNDO DE LA NUTRICIÓN; DEPRIME LOS SISTEMAS NERVIOSOS Y MUSCULARES; INHIBE LAS SECRECIONES; MODIFICA EL TEJIDO FIBROSO.

(Mouézy-Eon).

Antipsórico como sulfur, antiscófico como thuya, actúa profundamente en todos los estados crónicos en que predominan debilidad extrema y estado parético parcial o generalizado : está indicado en todas las edades de la vida; sus características deben ser reconocidas en todo estado mórbido crónico.

Características

CONSTITUCIÓN Y TIPO : Caust. conviene más a personas "DE CABELLO MOROCHO, FIBRA RÍGIDA, PIEL DELICADA Y SENSIBLE, constitución psórica, que padecen de larga data las CONSECUENCIAS DE LA SUPRESIÓN DE UNA ENFERMEDAD DE PIEL O LA DETENCIÓN INTEMPESTIVA DE CUALQUIER ELIMINACIÓN EXTERNA". (Nash).

Responden al tipo hidrogenoideo de Granvogl.

Según Mouézy-Eon, "los sujetos de caust. serán generalmente INDIVIDUOS SECOS, GRANDES, SISTEMA MUSCULAR Y TENDINOSO ALARGADO, SALIENTE, SIN GRASA".

Para el Dr. C. E. Chase el tipo de caust. "parece de COMPLEXIÓN AMARILLA, PÁLIDO, PELO OSCURO; DÉBIL, DEPRIMIDO, PESIMISTA.

Humor melancólico, angustia vaga constante, como si fuera a ocurrirle una desgracia, a él o a su familia; tiene miedo de la muerte, presenta un estado de ansiedad que, de noche, lo mantiene despierto.

TRASTORNOS PATOLÓGICOS, CONSECUENCIA DE PESARES O ANGUSTIA PROLONGADA, FATIGA EXTREMA DESPUÉS DE TRABAJOS PENOSOS".

FINALMENTE, para Farrington son NIÑOS DE ASPECTO ESCROFULOSO en los que aunque su delgadez sea general, es mucho más marcada en las extremidades inferiores; abdomen muy desarrollado; aprenden a caminar muy tarde; con tendencia a inflamación escrofulosa en los ojos; costras en los párpados que, lo mismo que las conjuntivas, se inflaman; sensación como de arena en párpados y globo ocular; a menudo erupción en cuero cabelludo que termina por localizarse detrás de la oreja (graph.) con secreción viscosa, excoriante y poco abundante; también otorrea de carácter purulento.

A veces sucede que un niño como éste quiere caminar y no puede hacerlo como se debe; tropieza a causa de trastornos provocados por alteración del cerebro o de la médula en relación con la nutrición defectuosa del sistema nervioso que consigo trae el remedio.

Los otros medicamentos en que aquí se puede pensar son : primero sulfur ac., después sulfur, finalmente Silicea.

"El tipo de caust. podría hacer pensar en un TIPÓGRAFOSOLTERO : tipógrafo, porque caust. conviene a las consecuencias de envenenamiento por plomo y los tipógrafos llevan a menudo los caracteres a su boca; soltero, porque es un remedio frígido, con carácter sombrío, crítico, poco sociable, por consiguiente, poco inclinado al matrimonio.

También conviene a constituciones psóricas, neurópatas, reumáticas y discráscicas; Stauffer, entre otros, lo considera un remedio de la pre-cancerosis". (Pierre Schmidt).

GRAN SENSIBILIDAD GENERAL CON PARÁLISIS DE TERRITORIOS AISLADOS, PRINCIPALMENTE CARA, LARINGE, ESFÍNTERES : es empleado en estados caracterizados por gran debilidad, depresión y melancolía, como los que sobrevienen después de una gran pena, angustias repetidas o preocupaciones constantes, especialmente cuando hay tendencia paralítica marcada, debilidad como desfallecimiento, abatimiento con gran debilidad. (Dr. C. E. Chase).

DEBILIDAD COMO SI FUERA A DESFALLECER; O PERDIDA DE FUERZA CONTEMBLORES; en esto se parece a gels. con el que tiene en común otro síntoma relacionado con su acción sobre el sistema nervioso : Ptosis de párpado superior; los tres remedios que tienen este síntoma en grado notable son : sepia, caust., y gelsem. (Nash). Esta debilidad puede llegar hasta la PARÁLISIS, PARÁLISIS QUE APARECE GRADUALMENTE y tiene, de preferencia, el aspecto de una hemiplegia derecha.

(Lach. ataca de preferencia el lado izquierdo).

Pero caust. presenta sobre todo PARÁLISIS DE TERRITORIOS NERVIOSOS AISLADOS : "Tiene acción profunda sobre el sistema nervioso con tendencia a estados paralíticos, haciendo venir la parálisis actual de una DISMINUCIÓN GRADUAL Y PROGRESIVA DE LA FUERZA MUSCULAR Y NERVIOSA.

ESTO SE ENCONTRARA EN PARÁLISIS DE ESÓFAGO Y FARINGE POST-DIFTERICAS, para las que el remedio tiene gran valor, al lado de gels., lach., coccul, etc.) También está muy indicado en PARÁLISIS DE UN LADO DE LA CARA, DESPUÉS DE EXPOSICIÓN AL AIRE FRÍO : aquí se parece a acon., después de la fase aguda, cuando el mal tiende a hacerse crónico.

En la PTOSIS PARALÍTICA DE PÁRPADOS, es un gran remedio con sepia, gels., graph., etc.

EN LA PARÁLISIS DE CUERDAS VOCALES, después de surmenage de la voz, de esfuerzolaríngeo demasiado grande, es uno de nuestros grandes medicamentos : tiene además de fuerte ronquera, a menudo con pérdida de voz, sensación de debilidad en la laringe, como si le fuera imposible hablar.

En la DEBILIDAD PARALÍTICA DE VEJIGA, es muy indicado cuando el enfermo pierde orina al toser o estornudar o hacer un esfuerzo; incontinencia en niños, especialmente en tiempo frío y durante el primer sueño, como sepia.

ESTADO PARALÍTICO DE MIEMBROS INFERIORES, gran lasitud general.

CONSTIPACIÓN DE NATURALEZA PARALÍTICA : con muchos esfuerzos y la deposición pasa mejor estando de pie; a veces, el recto parece lleno y la deposición sale sin que se dé cuenta (con aloes, en los niños, salen pequeñas bolitas sin que se den cuenta).

Además de ptosis de párpado, caust. tiene en los ojos DISMINUCIÓN DE VISIÓN con puntos negros que le parecen siempre delante de los ojos, o un velo, o resplandor vacilante; parálisis de nervio óptico.

Sensaciones de causticum

a) SENSACIÓN PARTICULAR DE DESOLLADURA, COMO SI LA MUCOSA ESTUVIERA EN CARNE VIVA, ACOMPAÑADA DE SENSACIÓN DE DOLORACIÓN : Se lo encuentra en todas partes : cuero cabelludo, garganta, laringe, tráquea, pecho, recto, ano, uretra, en la región de las erupciones, etc.; este es uno de los mejores síntomas del medicamento.

Esta sensación de desolladura, a menudo, por no decir siempre, va acompañada de desensación de dolor.

No es una sensación de magulladura como en Arnica, de doloración muscular : tampoco como en Rhus tox., fatiga dolorosa como después de un esfuerzo y que se sitúa en tendones y tejido conjuntivo en general : SE LOCALIZA EN LAS MUCOSAS Y PRODUCE AL MISMO TIEMPO DOLOR ATROZ, COMO SI LA MUCOSA ESTUVIERA EN CARNE VIVA (Nash).

b) SENSACIÓN DE ARDOR : Sensación bastante característica y que relaciona al remedio con ciertos otros : pero, mientras la sensación de ardor de Sulfur va asociada a prurito; la de Apis a pinchazos, a puntadas dolorosas, la de caust. a doloración.

c) DOLORS DESGARRANTES, A MENUDO, PAROXÍSTICOS : "DOLORS DESGARRANTES, TIRANTES EN TEJIDO MUSCULAR Y FIBROSO, CON DEFORMACIONES ARTICULARES" (Dr. C. E. Chase).

Se las observa en la neuralgia facial y son características del medicamento.

Afecciones neurálgicas acompañadas de dolores desgarrantes, como las descriptas, y de carácter rebelde.

Modalidades

Lateralidad

Derecha.

Agravación

DE 3 A 4 DE LA MAÑANA EN TIEMPO CLARO Y BUENO; AL AIRE LIBRE; POR FRÍO, VIENTOS FRÍOS Y SECOS; entrando del aire libre, AL CALOR; por el movimiento del coche.

Mejoría

Por tiempo húmedo y lluvioso; al aire caliente.

Síntomas mentales

Ejerce sobre el espíritu acción deprimente relacionada con su acción general sobre el sistema nervioso.

De ahí, síntomas mentales particulares muy importantes para su elección.

Mouzey-Eon los resume en el siguiente cuadro esquemático : "mentalidad profundamente deprimida; no tiene ya ninguna esperanza, le gusta permanecer tranquilo, sin hablar; pero tiene obsesiones, miedo a la oscuridad, teme que lo asesinen.

Aunque esta melancolía va atravesada por fases de irritabilidad, sus reacciones son muy débiles para llevarlo a la violencia, está ávido de simpatías que lo protejan".

HUMOR MELANCÓLICO Y TRISTE; SE INCLINA A VERLO TODO NEGRO; A LA DESESPERACIÓN.

Esta melancolía, a menudo se relaciona con preocupaciones, tristeza, penas de antigua data y en esto, debemos pensar también en gigant., nat. mur., phosph. ac.

El humor de caust. es, de manera preponderante, lloroso, melancólico; puede alternar con humor ansioso, irritable, de histérico. (Nash).

Individuo TÍMIDO, ANSIOSO, NERVIOSO, LLENO DE IMAGINACIONES

TERRIBLES, PARTICULARMENTE AL ATARDECER; el niño tiene miedo de ir a acostarse en la oscuridad y no quiere quedarse solo; la menor cosa lo hace llorar.

Adulto, tiene APRENSIÓN VAGA, como si algo enojoso fuera a sucederle, o se siente angustiado como si hubiera cometido una falta grave.

Al cerrar los ojos, ve cosas horribles; tendencia a melancolía y lloriquear, especialmente si es una mujer.

La cara refleja exactamente su estado mental; expresa su estado de depresión espiritual y tiende a tener aspecto enfermizo.

Además, A VECES ESTA DISTRAÍDO Y TACITURNO Y A VECES CAE EN ACCESOS DE CÓLERA, VOLVIÉNDOSE PELEADOR, LO QUE SE PARECE A phosph. SU MEMORIA FALLA FÁCILMENTE y, además, TODO ENSAYO DE TRABAJO MENTAL VA SEGUIDO DE UN SÍNTOMA DESAGRADABLE, con puntadas en las sienes al leer o escribir, sensación de tensión en cabeza o cuero cabelludo, particularmente en sienes y frente; peor al atardecer o después del sueño; en esto caust. se parece mucho a phosph. que también tiene esta sensación de tensión. (Farrington).

PENSAR EN LOS MALESTARES LOS AGRAVA, especialmente LAS HEMORROIDES.

Esto nos recuerda a bar. carb. que tiene violentos latidos cardíacos estando acostado sobre el lado izquierdo, agravado al pensar en ellos; a calc. ph. que siente más sus dolores cuando piensa en ellos; a gels. que tiene trastornos provocados por miedo, mala noticia, y que vuelven a manifestarse al pensar en ellos; a helonias que tiene sensación de pesadez, de sensibilidad dolorosa en el útero, agravada al pensar en ella, y mejorada por distracción mental; a oxal. ac. que en las afecciones cardíacas para las que está indicado, ve las palpitaciones y la disnea agravadas al pensar en ellas.

GRAN SIMPATÍA POR LAS DESGRACIAS DE LOS DEMÁS, se lamenta por todas las penas de los demás (lach. pasa su tiempo gimiendo por sí mismo.).

Sueño

Deseos irresistibles de dormir de día con bostezos.

Insomnio nocturno con imposibilidad de encontrar una posición cómoda o permanecer un momento tranquilo; movimientos frecuentes en brazos y piernas durante el sueño; movimientos convulsivos de piernas de noche mientras duerme (agaric., assa foet., ammom. carb., ars. alb., lach., mygale, mephitis, stic. pulm., tarent.).

Insomnio causado por ansiedad, sensación de inquietud, calor seco y otras incomodidades con frecuentes movimientos espasmódicos.

Cabeza

Sensación dolorosa como si tuviera un espacio vacío entre cráneo y cerebro; y esto se alivia por calor.

Punto doloroso en eminencia frontal derecha.

Fuerte dolor de cabeza con estado reumático o gotoso.

Sensación como si le tiraran fuertemente los cabellos.

Dolor de cabeza reumático tan violento que causa náuseas, párpados pesados.

Cefalalgias principalmente estando de pie, con dolores latentes, punzantes, desgarrantes en frente, sienes; agravación al leer, mover la cabeza; mejoría al aire libre.

Vértigo con tendencia a caer hacia adelante o al costado; en éste vértigo hay constante sensación de ansiedad y debilidad de cabeza y vista que oscurece como si mirara a través de la niebla.

A menudo esto va unido a lesión de cerebro o médula como suele encontrarse al principio de los tabes o de la parálisis general. (Farrington).

Cara

"Rostro de óvalo marcado, huesudo, cabello negro y ojos oscuros; en la cara amarillo-pálido, color de cera, donde anchas verrugas rugosas pueden estar diseminadas, sobre todo en nariz y mejillas, se destacan labios blancos, o de un azul violáceo; mirada vaga, o estúpida, párpados caídos que dan a la fisonomía un aspecto muerto". (Dr. Mouezzy-Eon).

PARÁLISIS FACIAL de origen psórico o reumático, pero SOBRE TODO AFRIGORE.

Aconit. responde bien al comienzo de tales casos; después caust. está indicado cuando la parálisis se ha hecho crónica y rehúsa ceder a aconit.

NEURALGIA FACIAL DE IGUAL ORIGEN; A MENUDO SEGUIDA DE PARÁLISIS.

Rigidez de mandíbulas, no puede abrir la boca, lo que parece de naturaleza reumática.

Ojos

Inflamación de párpados; blefaritis ciliar con costras.

Conjuntivitis con sensación de arena en los ojos.

PARÁLISIS CON PTOSIS DE PÁRPADO SUPERIOR.

Aquí hay que compararlo con : alumina que tiene ptosis con ardor y sequedad de ojos; sin lagrimeo; es de acción particularmente neta en ancianos.

Conium, buen remedio para la ptosis.

Gels. de acción tan profunda sobre toda la musculatura del ojo.

Led. pal. remedio de la ptosis en gotosos que presentan frecuentemente equimosis de conjuntiva y párpados; lagrimeo ardiente, episcleritis.

Rhus tox. cura la ptosis después de un trabajo en la humedad, consecuencia de cambio de tiempo; diatesis reumática.

Sepia, indicado en ptosis de párpado superior izquierdo.

VISTA A MENUDO TURBIA; el enfermo tiene la sensación de ver a través de un velo de gasa o niebla o nube.

Esto se ve a menudo en principio de CATARATA y caust. lo mejora con frecuencia.

Catarata con trastornos motores.

Chispas y puntos negros delante de los ojos.

PARÁLISIS DE LOS MÚSCULOS DE LA ÓRBITA DESPUÉS DE EXPOSICIÓN AL FRÍO.

Oídos

TODA CLASE DE RUIDOS en los oídos; gruñidos, tintinear, zumbido.

Es uno de nuestros mejores remedios para la sordera ACOMPAÑADA DE ESTOS RUIDOS (Nash).

LOS SONIDOS Y PARTICULARMENTE LA VOZ DEL ENFERMO RESUEÑAN DESAGRADABLEMENTE EN SUS OÍDOS.

OÍDO EXTERNO ARDIENTE Y MUY ROJO.

Sulfur también tiene este síntoma : esto no debe sorprender, pues sulfur y caust. tienen muchos otros parecidos y se siguen bien en enfermedades crónicas.

Aparato digestivo

BOCA :

Al comer, se muerde fácilmente la cara interna de las mejillas (ignat).

Las encías sangran con facilidad (phosph).

PARÁLISIS DE LENGUA O DIFICULTAD DE PALABRA SIN PARÁLISIS COMPLETA.

PARÁLISIS DE LENGUA CON PALABRA Y DEGLUCIÓN MAS O MENOS DESTRUIDA.

PARÁLISIS DE LABIOS Y LABIO-GLOSO-FARINGEA.

Estas parálisis pueden ser consecuencia de lesión nerviosa profunda, exposición a viento frío, y sobre todo cuando hay bruscos cambios de temperatura : en estos casos, hay que pensar en dulcam. de aplicación en el comienzo pero que ya no está bien indicado cuando se inclinan a cronicidad : entonces hay que elegir entre rhus tox y caust.

(Farrington).

GARGANTA :

Dolores ardientes, pero que no aumentan al tragar; son bilaterales y parecen provenir del pecho, (Nash).

ESTOMAGO :

EL APETITO DESAPARECE A LA VISTA DE LOS ALIMENTOS; TIENE HAMBRE AL SENTARSE A LA MESA.

PERO LA VISTA DEL ALIMENTO LE CORTA EL APETITO.

Esto es común en mujeres embarazadas.

Kali carb. tiene sensación de vacío, aniquilamiento, agotamiento, con aversión por la comida (Dr. C. E. Chase).

DESEO DE BEBIDAS FRÍAS, PERO AVERSIÓN POR EL AGUA.

DESEO DE CERVEZA, COSAS CONDIMENTADAS.

Sed después de comer.

LOS ALIMENTOS FRESCOS AGRAVAN, la carne fresca produce náuseas; LOS PLATOS AHUMADOS, POR EL CONTRARIO.

LE CONVIENEN.

AVERSIÓN POR DULCES, AZÚCAR.

ESTO SE ENCUENTRA EN graph. que tiene asco por los dulces que le producen náuseas; en zinc. met. en sinap. mig.

El pan causa gran impresión de pesadez y de peso en el estómago.

El café parece agravar todos los síntomas estomacales, pero un trago de agua fría los alivia (Kent); UN GRAN NUMERO DE SÍNTOMAS PARECEN MEJORADOS POR LA ABSORCIÓN DE UN TRAGO DE AGUA FRÍA : tos, estado paralítico, etc. (Kent).

Sensación de ardor, calor con escozor, en el estómago con eructos de gas.

Sensación como si tuviera cal viva en el estómago.

Dolores crampoides en el estómago.

Dispepsia ácida.

ABDOMEN Y DEPOSICIONES :

Sensación de presión en la parte superior del abdomen.

Bajo vientre distendido.

Emisión considerable de gases fétidos.

Es uno de nuestros mejores remedios para trastornos de ano y recto, de los que tiene síntomas particulares :

CONSTIPACIÓN CON FRECUENTE PERO INEFICAZ NECESIDAD DE EVACUAR, ACOMPAÑADA DE MUCHO DOLOR, ESFUERZOS Y CARA ROJA (nux vom.).

Deposiciones duras, cubiertas de mucus, de aspecto grasoso, expulsados con muchos esfuerzos (graph.).

En phosph. la deposición es blanda, pequeña, como una pluma de ganso, LAS DEPOSICIONES PASAN MEJOR ESTANDO DE PIE.

HEMORROIDES QUE IMPIDEN EVACUAR; hinchadas, pruriginosas, escuecen, son húmedas, con pinchazos; sensación de ardor en el ano que está en carne viva y doloroso, todo se agrava al caminar, al pensar en ello, elevando la voz, o hablando mucho (Nash).

Muchos remedios pueden considerarse al lado de caust. para las hemorroides : versu enumeración en nux vom.

Aparato urinario

En esta esfera, caust. tiene acción muy marcada.

Lo mismo que para el recto, hay que recordar su acción paralizante sobre territorios nerviosos aislados, si queremos comprender bien los síntomas : CONSTANTE E INEFICAZ DESEO DE ORINAR; EVACUACIONES FRECUENTES DE SOLO ALGUNAS GOTAS DE ORINA, CON ESPASMO EN EL RECTO Y CONSTIPACIÓN (nux vom., cantharis) (Nash).

Retención de orina con necesidad frecuente y urgente; por momentos escapan involuntariamente algunas gotas de orina.

A menudo sólo puede orinar estando de pie, o al evacuar, como sarsap.

EMISIÓN INVOLUNTARIA DE ORINA AL TOSER, ESTORNUDAR, SONARSE LA NARIZ, CAMINAR, DE NOCHE MIENTRAS DUERME (ferr. p., nat. mur., puls., scilla, zinc., etc.).

Para micciones involuntarias, mientras duerme, comparar a caust. : bell., cina, kreos., puls., sepia, sulfur.

ORINA INVOLUNTARIAMENTE DURANTE EL PRIMER SUEÑO (kreos., sepia) y también por lamás pequeña excitación.

Orina con tanta facilidad que no siente correr la orina, que no se da cuenta de que orina, a menos de que se cerciore por el tacto (tabes).

PARÁLISIS VESICAL : el remedio tiene dos maneras de paralizar la vejiga : paralizando los músculos de expulsión y la orina es retenida en la vejiga, o paralizando los esfínteres y la orina es emitida involuntariamente (Kent).

Retención de orina, en mujeres, después del trabajo de parto; operación quirúrgica cuando el tiempo es frío.

Pero caust. no actúa solamente sobre la musculatura vesical, sino también sobre la secreción urinaria misma : LA ORINA ES CARGADA DE ÁCIDO ÚRICO Y URATOS Y DEJA SEDIMENTO ESPESO CUYO COLOR VARIA DEL OSCURO AL CLARO.

Si tenemos un enfermo con excesivo depósito de uratos en la orina, pero sin otro síntoma predominante, caust. nos resolverá el caso.

En esto hay que comparar el remedio con : arnica, bar. mur., benz. ac., berb. vulg., par. brava., sarsap., sepia., thlpsi, colch.

Órganos genitales

REGLAS ATRASADAS (conium, graph., puls.).

QUE SOLO CORREN DURANTE EL DÍA Y CESAN DE NOCHE.

Otros remedios tienen este síntoma : cactus, pero las reglas son adelantadas, de sangre oscura como la pez y con sensación de constricción en región uterina; cyclam. pero con reglas demasiado abundantes, demasiado frecuentes, de sangre oscura, y con dolores como los del trabajo de parto; hamam., cuyas reglas son irregulares, sin dolores; puls., con reglas irregulares, poco abundantes, de sangre oscura, con coágulos.

CÓLICOS MENSTRUALES con dolores de carácter crispante, cortante, y aliviados al doblarse en dos, colocynt. : los cólicos aparecen antes de las reglas y tienen dolores con tirones en espalda y extremidades; de noche, todos los dolores cesan (Farrington).

LEUCORREA SOBRE TODO DE NOCHE, que cesa de día, con gran debilidad(nat. mur); REGLAS QUE CORREN SOLO DURANTE EL DÍA Y REEMPLAZADAS DE NOCHE POR FLUJO, es un buen síntoma de caust.

Inercia uterina durante el trabajo de parto.

Aparato respiratorio

LARINGE :

RONQUERA PEOR A LA MAÑANA CON SENSACIÓN DOLOROSA DE LLAGA EN CARNE VIVA Y PERDIDA SÚBITA DE VOZ.

PARÁLISIS LARÍNGEA.

LOS MÚSCULOS DE LA LARINGE REHUSAN OBRAR; NO PUEDE HABLAR EN VOZ ALTA.

RONQUERA CRÓNICA DESPUÉS DE LARINGITIS AGUDA.

RONQUERA CON VOZ BAJA Y GRAVE (DROSERÁ).

Esta pérdida de voz puede ser consecuencia de verdadera parálisis o continuación de catarro de cuerdas vocales. (Nash).

En esto hay que diferenciar a caust. de phosph.; la afonía de phosph. se agrava generalmente al atardecer, mientras la de caust. a la mañana; en caust. beber un trago de agua fría parece devolver la voz, cosa que no se ve en phosph.

Más se parece a caust., carb. veg., a tal punto, que no se comete una falta muy grave al tomar aquí a uno por otro, ya que de tal manera se suceden bien; y no habrá otro daño que la pérdida de tiempo causada por la elección imperfecta.

Ambos remedios tienen "crudeza" y sensibilidad dolorosa laríngea; ambos tienen ronquera, pero carb. veg. la tiene al atardecer, como phosph.; además, está especialmente indicado después de exposición al aire húmedo al atardecer, mientras caust. lo está particularmente después de exposición a viento frío y seco.

También eupat. perf. tiene aquí grandes puntos de contacto con caust., ambos tienen ronquera especialmente marcada a la mañana; ambos están indicados en influenza con doloración generalizada, pero eupat. tiene más doloración en el pecho que ardor y "crudeza" laríngea.

En la RONQUERA DE LOS CANTORES, U ORADORES, caust. se parece a graph., selen., ar. triph.

En ciertos casos en que caust. fracasa en la ronquera crónica, sobre todo peora la mañana sulfur es a menudo el remedio que cubre todo. (Farrington).

BRONQUIOS Y PULMONES :

Descendiendo por el tracto respiratorio, tenemos SENSACIÓN DE LLAGA EN CARNE VIVA, DE DESOLLADURA E IRRITACIÓN TRAQUEAL, CON TOS SECA, CAVERNOSA, CON DOLORES DE LARINGE A BRONQUIOS.

IRRITACIÓN COMO EN CARNE VIVA, QUE SE PODRÍA CALIFICAR DE LINEAL, A LO LARGO DE LA TRAQUEA.

TOS CON SENSACIÓN COMO SI NO PUDIERA TOSER BASTANTE FUERTE COMO PARA SACAR LOS ESPUTOS QUE QUISIERA EXPECTORAR.

Tos con imposibilidad de expectorar los esputos que termina portragar : como con sepia, dros., kali carb., y arnica, y algunos otros remedios, el enfermo consigue sacar un esputo hasta el momento en que, llevado a la faringe, vuelve a caer en el esófago.

Tos llamada "de cigarrillo", es decir tos al final de la espiración como la de los fumadores que, después de una buena bocanada exhalan el humo y tosen antes de tomar una nueva bocanada (Dr. P. Schmidt).

Tos peor al expectorar (acon.).

TOS MEJORADA AL BEBER AGUA FRÍA.

Los otros principales remedios que tienen este síntoma son : cup. met., opium., tabac.

Dolores intercostales : a veces estos dolores son sordos y compresivos; otras, puntadas vivas en los nervios intercostales; los dolores subesternales son muy pronunciados, aumentan por inspiraciones profunda, y movimiento de los brazos.

Disnea asmática.

Inspiración difícil y con opresión pectoral; otras veces la disnea va acompañada de sensación de estrangulamiento que obliga al enfermo a aflojar su corbata; a veces tiene melancolía y tristeza.

En la influenza, disputa el primer lugar con eupat. y rhus tox.; también hay que pensar en sanguin. y paup. cand.

Los dos primeros tienen especialmente sensación de doloración muscular como con caust. y en los dos últimos de llaga en carne viva detrás del esternón; paup. cand. tiene además doloración catarral.

Aparato circulatorio

Palpitación con pulso irregular, debilidad, disnea y gran ansiedad; durante exceso violento, acceso súbito de palpitaciones violentas con debilidad, ansiedad, sudores profusos, lividez, imposibilidad de permanecer mucho tiempo de pie.

Hinchazón varicosa de venas y hasta trombosis de venas.

Para el Dr. Nebel de Lausanne, caust. sería el "carbo crónico", es decir, que cuando este ha conjurado los síntomas agudos de una cardiopatía, los trastornos crónicos restantes, indicarían las más de las veces caust.

Espalda y extremidades

RIGIDEZ Y DOLOR EN NUCA Y CUELLO; LOS MÚSCULOS PARECEN ANUDADOS, APENAS PUEDE MOVER LA CABEZA.

TORTICOLIS; a veces la cabeza está inclinada hacia el costado por encogimiento, contractura de músculos de la nuca, de este lado : hay que recordar que caust. es el remedio por excelencia para semejantes casos de contractura de tendones y músculos (Kent). (Lachn., calc. ostr., nux vom., rhus tox., etc.).

RIGIDEZ DORSAL Y SACRA DOLOROSA, SOBRE TODO AL LEVANTARSE DEL ASIENTO.

Rhus., tiene también esto, pero con agitación constante, mientras que caust. está tranquilo de noche.

Caust. tiene acción electiva sobre el TEJIDO FIBROSO y particularmente sobre LOS LIGAMENTOS PERIARTICULARES, y especialmente para combatir su excesiva laxitud (subluxaciones fáciles y aún espontáneas).

Dolores de luxación en articulación coxo-femoral con imposibilidad de caminar o permanecer de pie.

PARÁLISIS DE UNO O DOS MIEMBROS, SUPERIORES O INFERIORES.

DOLOR TIRONEANTE SORDO EN MANOS Y PIES; TIRONES Y DOLORS DESGARRANTES

EN MUSCLOS, PIERNAS, RODILLAS, PIES, AGRAVADOS AL AIRE LIBRE Y MEJORADOS EN LA CAMA.

Dolores tironeantes, desgarrantes, en los brazos, de noche.

Entumecimiento.

Contracción tendinal con sensación de encogimiento muscular.

Calambres.

CALAMBRE DE LOS ESCRITORES.

En el calambre de los escritores, la acción de caust. es bien conocida por los médicos homeópatas.

Hay a la vez debilidad de la mano derecha al escribir, y sobre todo convulsión de los dedos.

No basta que haya crispación : para que el remedio actúe, debe manifestarse al mismo tiempo la debilidad característica de caust.

Luego, no solamente toma el enfermo la pluma de manera crampoidea, sino que, por momentos, tiende a soltarla y se le escapa de entre los dedos.

Al mismo tiempo tiembla al escribir, su moral se resiente y se deprime.

Si el enfermo reúne todos estos síntomas, caust. conseguir seguramente su curación.

Notemos, de paso, para este calambre, la lateralidad derecha, característica de caust. (Dr. Ch. Berray).

DEBILIDAD Y TEMBLOR DE EXTREMIDADES.

INQUIETUD NOCTURNA EN LAS PIERNAS (zincum).

INFLAMACIONES REUMÁTICAS ARTICULARES CON CONTRACCIÓN DE FLEXORES Y TENSORES DE LAS ARTICULACIONES.

"La tendencia a reumatismo y artritis reumática es un estado muy marcado de la acción de caust.

Va acompañada de violentos dolores punzantes que dan SENSACIÓN DE RETRACCIÓN, DE CONTRACTURA, TEMPORARIA O PERMANENTE DE DICHOS TENDONES.

A menudo SE LE AGREGA ANQUILOSIS DE ARTICULACIONES ENFERMAS.

Estado reumático con violentos dolores agravados por tiempo seco mientras mejoran por calor; sin embargo si el calor alivia localmente, el sujeto está en un estado particular y tal, que no puede soportar el calor ni el frío.

Articulaciones hinchadas y deformadas; músculos y articulaciones enfermas a la vez; todos los síntomas y la misma afección se agravan por tiempo frío y seco" (Dr. C. E. Chase).

Todo esto y muchos otros síntomas más nos muestran la gran utilidad del remedio en el reumatismo, y si para curar esta afección hubiera que elegir aquí tres medicamentos, con exclusión de todos los demás, éstos serían : caust., rhus tox., y sulfur. (Nash).

Caust. puede ser útil en ENFERMEDADES ESPASMÓDICAS, hasta en CONVULSIONES; en la EPILEPSIA, PARTICULARMENTE en la forma llamada "Pequeña epilepsia".

Al pasar al aire libre, el enfermo cae pero no tarda en reponerse; durante el estado de inconsciencia tiene emisión involuntaria de orina.

Puede ser útil cuando los ataques son de naturaleza convulsiva, especialmente si sobrevienen en luna nueva.

También está indicado en epilepsia relacionada con irregularidades menstruales o que sobrevienen en la pubertad; por estos síntomas, caust. está aquí estrechamente ligado a calc. ostr. (Farrington).

Caust. es uno de nuestros mejores remedios en la COREA : espasmo y sacudidas musculares, calambres musculares, movimientos musculares nocturnos súbitos, en niños nerviosos; corea también nocturna; movimientos convulsivos después de un susto; corea sobre todo marcada a la derecha.

Los principales remedios a colocar aquí al lado de caust. son : agaric., ars. alb., cuprum, tar. his., ver. vir., zinc. met., etc.

Piel

"Piel caliente y con tendencia a la sequedad; blancuzca y sucia.

A menudo llagas y erupciones tórpidas en los pliegues de la piel.

Eczema pruriginoso.

Intertrigo.

Sensibilidad dolorosa en los pliegues de la piel, detrás de las orejas, entre los muslos.

Piel propensa a intertrigo durante la dentición, en los niños.

Verrugas, anchas, desgarradas, que sangran fácilmente, en cara y dedos.

VERRUGAS BAJO LAS UÑAS.

LLAGA QUE DURA MUCHO Y CONSECUTIVA DE ANTIGUA QUEMADURA.

Viejas quemaduras que no pueden curar; malas consecuencias de viejas quemaduras.

Caust. actúa en viejas cicatrices, ya sean de antiguas heridas, operaciones de viejas quemaduras.

Es evidente que, siendo la cicatriz una lesión indeleble, no puede curarla, pero las atenúa, haciéndolas a menudo menos feas, menos diferentes a los tejidos vecinos.

Calma los dolores que pueden provocar sufrimientos contra los que, dada su antigüedad, arnica e hyper. a menudo no surten efecto (graph).

Úlceras que comienzan por ampollas con ardor y prurito.

Relaciones

Caust. no va muy bien con phosph., no deben darse uno después del otro; por lo demás, caust. antidota los estados paralíticos consecutivos al envenenamiento de phosph.

"Hay antagonismos entre phosph. y caust.; estos remedios no actúan bien uno después del otro, a pesar de estar indicados en la misma clase de enfermedades.

Esto debe ser tenido muy en cuenta, especialmente por aquellos que emplean diluciones medias y altas.

El antagonismo entre las dos sustancias homeopáticas es precisamente la marca de la analogía profunda que hay entre sus síntomas, de tal manera, que estos se neutralizan más o menos, unos a otros y se siguen recíprocamente".

(Dr. Mouezy-Eon).

También coffea es incompatible con caust.

Antídotos

Cham., asa foet., dulc., coffea, coloc., nux vom.

Complementario

Carb. veg., petroselinum., coloc.

Remedios que le siguen bien

Ant. tart., aurum, coloc., calc., kali iod., lyc., nux vom., puls., rhus, ruta, sepia, silicea.

Remedios que no le van de acuerdo

Acet. ac., coffea, phosph.

CICUTA VIROSA

Cicuta virosa, cicuta de agua, o perejil de los locos, planta de la familia de las umbelíferas, crece en lugares pantanosos, estanques, principalmente en Alemania y Francia; florece en verano, expande un olor pestífero y también estupefaciente, su jugo es agrio, y su raíz, muy venenosa, de sabor parecido al perejil.

No hay que confundirla con otra cicuta de agua, cicuta maculata, que crece en América y cuyos efectos son un poco distintos.

Preparamos nuestro medicamento partiendo de una tintura madre obtenida por maceración en alcohol a 90º, de la raíz recién juntada, al principio de la floración, y a partir de la que obtenemos, por diluciones hahnemannianas sucesivas, las diversas dinamizaciones.

Acción general del medicamento

Cicuta virosa actúa violentamente sobre el SISTEMA NERVIOSO, congestionando, en dosis ponderables, base del cerebro y bulbo.

Es un veneno convulsivo : poco después de absorberlo, el paciente cae primero en estado de rigidez característica con mirada fija, rostro azulado, violáceo, espuma en la boca; luego aparecen convulsiones epiléptiformes con sacudidas musculares espasmódicas violentas, seguidas por una no menos violenta depresión.

LA PIEL está también en el dominio de acción de cic. vir.

En ella produce erupciones pustulosas con costras amarillentas, color de miel.

Características

1) CONVULSIONES EXTREMADAMENTE VIOLENTAS : Este remedio es interesante a causa de su tendencia convulsiva.

Bajo su acción, el paciente ejecuta toda clase de movimientos extraños y espasmos de violentas convulsiones, siendo la más frecuente el opistótonos.

Se debe pensar en cic. vir. ante toda clase de convulsiones tónicas, clónicas, epiléptiformes, cuando revisten carácter extremadamente violento.

Todos los autores han señalado convulsiones epiléptiformes en el envenenamiento por cic. vir. : caídas más o menos súbitas, convulsiones tónicas y clónicas, asfixia y cara roja, labios azules y a veces, sanguinolentos, orina involuntaria.

Las convulsiones por accesos terminan en profundo sueño; y también en coma y muerte.

A veces revisten la forma del opistótonos; el trismus es frecuente; otras veces son movimientos raros de ojos, cara, extremidades, cabeza, parte superior del cuerpo (gran ataque de histeria).

Las sacudidas producen un movimiento visible en cabeza y extremidades.

En fin, las convulsiones van acompañadas por timpanismo y a veces vómitos de sangre (Dr. Jousset).

Cic. vir. pone el sistema nervioso en tal estado de hiper-irritabilidad QUE UNA SIMPLE PRESIÓN EN CUALQUIER REGIÓN DEL CUERPO PROVOCA CONVULSIONES.

Estas VAN DEL CENTRO A LA PERIFERIA; cabeza, cara y ojos son afectados primero.

UN AURA EN EL ESTOMAGO advierte la inminencia del ataque convulsivo.

En ciertos casos, comienza en el pecho, particularmente en zona cardíaca, donde hay sensación de frío; de allí parte una especie de escalofrío convulsivo que gana enseguida las otras regiones del corazón.

Pero en general las convulsiones parten de cabeza o garganta para extenderse enseguida a extremidades inferiores.

En ciertos casos, todo el cuerpo está en tal estado de tensión nerviosa, que una simple nerviosidad, contrariedad, provoca en todo el organismo sensación de ardor y desencadenan un ataque convulsivo.

Otras veces, la menor irritación en garganta o esófago desencadenará convulsiones violentas en esta región: por ej., si traga una espina de pescado, en lugar de la simple sensación de pinchazo que sentiría un individuo normal, le provoca tal irritación que cae en un ataque convulsivo que de allí se extiende a otras partes del cuerpo.

Las convulsiones van siempre de arriba hacia abajo, contrariamente a lo que pasa en cuprum, cuyas convulsiones van de las extremidades hacia el centro: empieza por sentir pequeños calambres, ligeros movimientos convulsivos, primero en los dedos, después en las manos, enseguida en el pecho, y finalmente, en todo el cuerpo; en Cic. vir., al contrario, hay primero pequeñas convulsiones en cabeza, ojos, garganta, después se extenderán a lo largo de espalda y piernas, donde pueden ser violentas.

Esto recuerda a sécale cuyas convulsiones comienzan a veces en la cara (Kent).

2) LOS ACTOS DEL PACIENTE PUEDEN SER TAN VIOLENTOS COMO SUS CONVULSIONES: Gime, aúlla, gesticula, hace movimientos raros, está extremadamente agitado, etc.

3) PÚSTULAS que se reúnen y forman COSTRAS ESPESAS, AMARILLAS, en cara, cabeza, y otras partes del cuerpo.

Modalidades

Agravación

POR EL TACTO, POR UN SIMPLE CONTACTO; es tan sensible que una simple corriente de aire que le roce la piel puede provocar convulsiones.

POR EL HUMO DEL TABACO (ignatia).

Síntomas mentales

DELIRA, CANTA, BAILA, hace gestos de bufón.

TODO LE PARECE EXTRAÑO Y TERRIBLE.

CONFUNDE EL PRESENTE CON EL PASADO; TIENE LA SENSACIÓN DE SER UN NIÑO.

Todo es confuso, raro; no sabe dónde está; la cara de viejos amigos le parece de extraños, la mira y se pregunta si son personas que ha conocido antes.

Su casa y los lugares que le son familiares le parecen extraños.

Las voces le parecen extrañas.

Vista, oído, olfato, y todos los otros sentidos están perturbados y confusos; también tiene ideas confusas sobre todo lo referente a sí mismo, su edad, estado.

A menudo, una mujer, al final de los ataques de catalepsia, se conduce como un niño.

Cree haberse convertido en un niño y como tal se conduce: ríe tontamente, juega con juguetes y comete mil acciones pueriles.

Canta, grita, baila, le gustan los juguetes, brinca, como un niño.

Tiene la sensación de encontrarse en un lugar desconocido y esto le provoca miedo (Kent).

Esto nos lleva a hablar de otro síntoma mental de Cic. vir.: ESTADO FÁCIL DE MIEDO; al menor ruido, cuando le hablan, aún en voz baja, se sobresalta asustado; piensa en el porvenir con inquietud.

MELANCOLÍA CON INDIFERENCIA; ESTA LLENO DE DESCONFIANZA.

Gran agitación; el niño se aferra al vestido de su niñera o de su madre con gran expresión de miedo.

Esto puede suceder antes del ataque convulsivo; su rostro expresa gran miedo, y sin embargo no tiene ningún recuerdo de temor, de miedo, una vez terminado el ataque.

Este estado de miedo, de angustia, sobreviene después del principio del ataque, aunque las convulsiones no hayan empezado.

Está lleno de miedo; el miedo le provoca convulsiones, como opium, ignat. yacon. (Kent).

SÍNTOMAS DE ÉXTASIS INMÓVIL como en catalepsia.

"No recuerda lo sucedido o lo que puede decir durante cierto período o tiempo.

Fase de ESTUPOR CATALÉPTICO en que no reconoce a nadie, pero durante la que responde correctamente a las preguntas que se le hacen y de las que después no guarda ningún recuerdo.

Entorpecimiento mental, pérdida de continuidad de ideas y sensibilidad durante cierto tiempo; lagunas mentales, con o sin convulsiones, durante horas o días.

Sin embargo, las convulsiones toman generalmente el lugar del estado extático.

Nat. mur. puede tener pérdida de memoria parecida a la que acabamos de describir : circula, va, viene, haciendo las tareas de la casa y sus ocupaciones habituales y al día siguiente, ya no lo recuerda; nux mosch. también tiene completo vacío de memoria, durante el que el paciente ejecuta sus tareas cotidianas, estando su espíritu completamente ausente (Kent).

DESEA ESTAR SOLO; AVERSIÓN POR LA SOCIEDAD; ES SUAVE, FÁCIL, DÓCIL, EN LOS PERIODOS QUE SEPARAN SUS ATAQUES CONVULSIVOS, lo difiere de strichnine y de nux vom. : ESTE PUEDE PRESENTAR ATAQUES CONVULSIVOS GENERALIZADOS, AGRAVADO POR EL TACTO O POR EL SIMPLE ROCE DE UNA CORRIENTE DE AIRE, PERO ENTRE LAS CRISIS CONVULSIVAS está excesivamente irritable y es desagradable.

Una vez pasado el ataque convulsivo, queda lleno de tristeza, inquietud, pesimismo; prevé un porvenir sombrío, infeliz, es pesimista.

Tiene miedo de la sociedad, teme al mundo, desea estar solo; es desconfiado, huye de sus semejantes; a veces llega a despreciarlos y a tener una idea demasiado alta de sí mismo, como platina, pero este es el único parecido que tiene con cic. vir. (Kent).

Cabeza

Cic. vir. es un buen medicamento contra las consecuencias de una contusión de cerebro o médula, después de traumatismo de cabeza o columna vertebral : se ha visto que en contusiones cuya sintomatología recuerda a la de las convulsiones de cic. vir., arnica, dado anteriormente, no ha producido ningún efecto.

Dolor de cabeza, en mitad de la cabeza, que obliga al paciente a permanecer sentado derecho.

Dolor de cabeza, como si el cerebro se bamboleara al caminar.

Al pensar en la naturaleza exacta del dolor, cesa (Kent).

Los síntomas de la cabeza se alivian por emisión de gas. (Boericke).

Contracciones de músculos de cuello y nuca; cabeza inclinada y vuelta a un costado.

Cic. vir. ha curado ciertos casos de meningitis cerebro-espinal, cuando había convulsiones que se agravaban por el menor tacto (Kent).

Vértigo con gastralgia y espasmos musculares (Boericke); los objetos parecen dotados de movimientos, se alejan o aproximan, parecen llevados de derecha a izquierda, o giran en círculo. (Jousset).

Ojos

Movimientos convulsivos de los músculos de alrededor de los ojos.

Pupilas dilatadas e insensibles a la luz y a la acomodación.

El enfermo permanece sin moverse, fija la mirada, ojos vidriosos, globo ocular levantado por espasmo del músculo derecho superior (Kent).

Un síntoma característico de esta región es la fijeza de la mirada (Jousset).

Mirada fija, conocimiento incompleto, responde con dificultad; si con esfuerzo, quiere cambiar el eje de la mirada, *pierde* el conocimiento.

Fijeza de la mirada con pérdida del conocimiento; la cabeza se baja poco a poco, sin que los ojos sigan este movimiento, de manera que la pupila pronto se encuentra detrás del párpado superior; una sacudida súbita la saca de este estado en el que pronto recae, (Homburg, citado por Jousset).

Mirada fija, estado de estupor; pérdida de la palabra; pulso de 50 pulsaciones.

Fijeza de la mirada que produce deseos de dormir. (Hipnotismo) (Jousset).

Estrabismo, que puede ser consecuencia de una única contracción, de un único espasmo muscular presentado por el niño; cada vez que tiene miedo, hay estrabismo; cuando lo toca, cuando tiene frío, después de un golpe de cabeza, o de haber caído sobre ella, o simplemente periódicamente, sin razón, hace estrabismo (Kent).

Aparato digestivo

BOCA, FARINGE, ESÓFAGO :

TRISMO.

Durante la dentición, rechina los dientes o aprieta fuertemente las encías de los dos maxilares, una contra otra, como si tuviera trismo.

Garganta seca y contraída; el espasmo laríngeo es tal que tiene la sensación de que las paredes de este conducto se aproximan una a otra.

Espasmo de esófago; ya no puede tragar.

ESTOMAGO Y ABDOMEN :

DESEO ANORMAL DE TIZA Y COSAS NO COMESTIBLES, como carbón (alum., calc. ostr., nit. ac., nux vom.) : "desea comer cosas raras : carbón y otras cosas, porque es incapaz de distinguir entre lo comestible y lo que no lo es; como carbón, papas crudas, etc." (Kent).

Hipo.

Espasmos.

Sensación de opresión y de angina en región del epigastrio.
 Vómitos, alternados, a veces, con espasmos en el pecho.
 Cólicos con convulsiones, como en los niños que tienen parásitos intestinales.
 Retortijones inmediatamente después de la comida, con deseos de dormir.
 Abdomen distendido y doloroso.
 Deposiciones líquidas y demasiado frecuentes.
 Diarrea matinal con deseo irresistible de orinar. (Boericke).
Aparato urinario
 Necesidad frecuente de orinar.
 Emisión involuntaria de orina, como por parálisis vesical.
Aparato respiratorio
 Espasmos tónicos de los músculos pectorales; el pecho parece oprimido; apenas puede respirar.
 Espasmos tónicos de los músculos pectorales alternando con vómitos.
Aparato circulatorio
 Espasmos en el pecho; le parece que su corazón cesa de latir (Kent).
 Bajo la influencia de cic. vir., el ritmo de los latidos y del pulso es desordenado : hay intermitencias seguidas de varios latidos precipitados; pulso lento; pulso insensible.
 Parece haber un parecido entre la acción de cic. vir. y la de digit., sobre el corazón. (Jousset).
Espalda y extremidades
 Calambres y espasmos tónicos en los músculos de la nuca.
 Flexión espasmódica de la cabeza hacia atrás.
 Transpiración espasmódica de la espalda, a causa de la contractura espasmódica de los músculos de esta región.
 Dolores con tirones en los músculos; dolores continuos, rigidez con crujidos en las articulaciones; estremecimientos musculares, sacudidas musculares, temblores musculares; debilidad, dificultad de movimientos, sensación de frío en las extremidades, son los síntomas producidos por cic. vir. en las extremidades (Jousset).
 Convulsiones espantosas, violentas, con contorsiones espantosas de las extremidades y de todo el cuerpo, con pérdida de conocimiento; a veces revisten la forma del *opistótonos*; el trismo es más frecuente; otras veces, son movimientos raros con los ojos, músculos faciales, extremidades, cabeza y parte posterior del cuerpo; las sacudidas musculares producen un movimiento visible en la cabeza y extremidades. (Jousset).
 Las convulsiones van acompañadas de pérdida de conocimiento, timpanismo y a veces, vómitos de sangre (Jousset); a veces hay hinchazón de la región epigástrica, como causada por un violento espasmo del diafragma.
 El menor contacto, el menor ruido las hace recomenzar.
 Gran debilidad del sistema muscular, especie de inmovilidad, de impotencia para hacer ningún movimiento.
Piel
 Prurito generalizado.
 Erupción de placas rojas y que escuecen, como la urticaria.
 Erupción de pequeñas pústulas que parecen confluentes, formando costras amarillas, particularmente en la cabeza y cara; erupción parecida a la sicosis de mentón; puede ir acompañada de mucho prurito.
 Erupción eczematosa sin prurito : la exudación forma costras duras y amarillas.

CINA

Cina o semen contra - abreviatura de semen contra vermes - o artemisa, es una planta aromática, de la familia de las compuestas que viene de Alepo o del Levante.
 Su principio activo es un alcaloide bien conocido : la santonina.
 Preparamos el medicamento homeopático conocido bajo ese nombre, sea partiendo de una tintura madre obtenida por maceración de la planta en alcohol de 90° sea preparando las tres primeras dinamizaciones, por los procedimientos habituales de trituración de la planta.
Acción general del medicamento
 Se han observado ciertos casos de envenenamiento con santonina, principio activo de cina que ha desarrollado el cuadro clínico siguiente : la acción del veneno tiene por característica accesos de hemí convulsiones, que empiezan por un lado de la cara separados unos de los otros por un estado de salud casi completa : las convulsiones son al principio crónicas, luego se hacen tónicas.
 La pupila está dilatada durante el acceso en el momento en que va a cesar, se achica antes de volver a la dimensión normal.
 La circulación se modifica poco, pero la respiración es muy lenta y amenaza suspenderse, hay mutismo y evacuaciones involuntarias.
 A una dosis más fuerte se observa un coma completo, con estertor, con coloración violeta de la cara, aparición de saliva espumosa, rechinar de dientes, dilatación de pupilas y convulsiones generalizadas.
 La muerte llega por suspensión de la respiración, la dilatación de las pupilas es un síntoma constante de las fuertes dosis.

Por otra parte éstas producen también dos síntomas muy notables : coloración amarilla de la orina, por la presencia en ellas de un producto de oxidación de la santonina conocido por el nombre de XANTHOPSINE, esta coloración amarilla pasa al amarillo púrpura por adición de un álcali - y un estado de DISCROMATOPSIA muy marcado : al principio, el sujeto ve azul; más tarde el azul desaparece y es el amarillo el color dominante; en un mayor grado de envenenamiento el paciente no percibe ningún color : confunde el lila y el verde oscuro, el violeta y el negro; más tarde se producen verdaderas alucinaciones de la vista; el retorno a la salud se anuncia por la percepción dominante del color azul. (Jousset).

Si examinamos el conjunto de acción de cina, sea en sus efectos tóxicos, sea en sus efectos patogenésicos, vemos que su punto central ES EL CONJUNTO DE LOS GANGLIOS SIMPÁTICOS ABDOMINALES, de donde se reflejan las impresiones nerviosas que se manifiestan hacia las otras partes del cuerpo, pero principalmente el cerebro y la médula.

Como resultado de la acción primitiva de cina, tenemos síntomas reflejos : temblores convulsivos, sacudidas musculares en los miembros y violentos espasmos, éstos, generalmente de carácter tónico : hay también estrabismo. Por otra parte, siempre bajo la influencia de esta acción primitiva de cina, tenemos cara pálida, aunque haya fiebre; ojos con grandes ojeras oscuras; pupilas dilatadas; rechinar de dientes durante el sueño que es agitado y entrecortado con gritos; frota sin cesar su nariz. (Farrington).

Cina produce en el organismo sano - si no todos - casi todos los síntomas cuya presencia nos hace suponer la existencia de vermes intestinales.

Características

IRRITABILIDAD NERVIOSA QUE SE TRADUCE POR MOVIMIENTOS ESPASMÓDICOS, ACOMPAÑADA POR TRASTORNOS DIGESTIVOS GENERALMENTE EN RELACIÓN CON LA PRESENCIA DE VERMES : NIÑOS agitados que gritan durante el sueño; niños huraños ARISCOS QUE DESEAN SER LLEVADOS EN BRAZOS A VECES NO SOPORTAN QUE LOS TOQUEN NI QUE LOS MIREN, desean tocar todo, pero rechazan lo que les ofrecen, o bien, gritan si alguien trata de tomarlos o pasearlos. CARA ROJA, CALIENTE, ARDIENTE, CON RUBOR BRILLANTE EN LAS MEJILLAS, ALTERNANDO CON CARA PÁLIDA, DE ASPECTO ENFERMIZO, OJOS CON GRANDES OJERAS AZULADAS; O TAMBIÉN CARA ROJA, SALVO ALREDEDOR DE LA BOCA Y LA NARIZ EN QUE ESTA MUY PÁLIDA.

Cina es muy útil en niños con muchos trastornos ligados a irritación intestinal o determinada por vermes; no siempre es el remedio indicado para los vermes, pero lo es, tal vez, las más de las veces, para los síntomas que causan las lombrices en niños portadores de estos parásitos. (Nash).

Modalidades

Agravación

Por el menor contacto; en verano.

Mejoría

Al agacharse.

Síntomas mentales

El niño de cina es huraño, GRUÑÓN, DESAGRADABLE, insensible a las caricias y toca todo, QUIERE TODO, Y EN CUANTO LE DAN LO QUE PIDE LO TIRA PARA PEDIR OTRA COSA.

Todo esto se parece a los síntomas mentales de chamom. pero mientras el niño de este último no se tranquiliza hasta que lo toman en brazos y lo pasean, EL NIÑO DE cina GRITA EN CUANTO TRATAN DE TOMARLO Y PASEARLO.

TAN SUSCEPTIBLE COMO IRRITABLE, NO SOPORTA QUE se le APROXIMEN O LO MIREN (ant. crud.); no soportan ningún contacto, es imposible tocarlo sin provocar en él, una real sensación dolorosa, y en ciertos casos, desatar verdaderos movimientos espasmódicos; esta hipersensibilidad, a la vez física y mental, hace que el niño no pueda soportar la menor reprimenda, ni ser castigado sin tener inmediatamente convulsiones.

Sueño

Es muy agitado; mientras duerme RECHINA LOS DIENTES, LANZA GRITOS PENETRANTES, TIENE SOBRESALTOS VIOLENTOS : VERDADERAS PESADILLAS QUE LO DESPIERTAN sobresaltado, temblando y llorando; ninguna palabra puede calmar esta agitación ansiosa.

Insomnio nocturno, con agitación, llantos, gritos, calor y angustia. (Jahr).

Cabeza

Dolor de cabeza alternando con dolores en el abdomen.

Cefalea con dolores sordos detrás de la cabeza e hipersensibilidad de los ojos, principalmente a la mañana al despertar.

Cefalea con sensación de presión como por un fardo que le pesara sobre la cabeza, paseando al aire libre; cefalalgia desgarrante, con tirones, agravada por la lectura y la meditación; mejoría al agacharse. (MEZEREUM) moviendo la cabeza de un lado al otro, estando acostado o sentado.

Dolor en la cabeza cuando fija la mirada en alguna parte.

Hipersensibilidad de la cabeza al tacto.

El niño mueve la cabeza de un lado a otro, sobre la almohada.
La cabeza está generalmente caliente, mientras que los pies están fríos.

Ojos

Movimientos convulsivos de músculos ciliares superiores.
Sensación dolorosa de presión en los ojos cuando los fatiga por lectura prolongada.
Visión turbia al leer, que desaparece frotándose los ojos.
Visión débil con fotofobia y escozor en los ojos, como si en ellos se hubiera introducido arena.
Alucinación visual, ve todo amarillo.
Dilatación de pupilas.
Estrabismo.

Cara

La cara puede presentar dos aspectos diferentes que alternan : ALTERNANCIA DE PALIDEZ Y ENROJECIMIENTO DE LA CARA : hemos descrito más en detalle este aspecto de la cara en las características.
Movimientos coreicos de los músculos de la cara.

Aparato digestivo

BOCA Y ESÓFAGO :

Rechina los dientes, particularmente de noche.
Odontalgia provocada por el aire y las bebidas frías.
Sequedad de la boca, y dificultad para tragar; cuando traga, se produce ruido de gorgoteo en el esófago, (ars. alb., cuprum), o bien cuando traga tose, se ahoga como si tuviera algo en la garganta.
Bostezos espasmódicos.

ESTOMAGO :

HAMBRE CONSTANTE E INSACIABLE, TANTO ANTES COMO DESPUÉS DE COMER, DESEOS DE COSAS DULCES (arg. nitr., calc. carb., kali carb., lycop., sulphur).
ALTERNATIVA DE HAMBRE CANINA Y ANOREXIA.

Aumento de sed.

Sufre del estómago antes de las comidas, se calma pasajeramente por la absorción de alimentos, pero queda con hambre.

Vómitos acompañados de diarreas, después de haber bebido.

Vómitos con lengua limpia (ipeca); inmediatamente después de los vómitos tiene nuevos deseos de comer.

ABDOMEN Y DEPOSICIONES :

CÓLICOS CON DOLORES COMO DE PELLIZCOS ATORMENTADORES, SOBRE TODO EN LA ZONA DEL OMBLIGO, QUE PUEDE ESTAR DOLOROSO AL TACTO.

Dolores acompañados de gorgoteo y sensación interna de calor.

El abdomen puede estar distendido y duro.

Constipación acompañada de la presencia de vermes intestinales.

Diarrea abundante de deposiciones a menudo blancuzcas, a veces involuntarias, que contienen a menudo vermes intestinales.

Comezón INTENSA DEL ANO (alumen, chelid., collins., graph., teucrium).

Aparato urinario

Necesidad frecuente de orinar con emisión abundante.

Emisión involuntaria de orina; INCONTINENCIA NOCTURNA DE ORINA.

Orina turbia, que al reposar se hace lechosa y muy consistente.

Órganos genitales

Onanismo en niños que tienen vermes intestinales.

Reglas demasiado frecuentes y abundantes.

Metrorragia.

Aparato respiratorio

NARIZ :

DESEO DE METERSE LOS DEDOS EN LA NARIZ, SE RASCA SIN CESAR LA NARIZ, SE LA FROTA CON PERSISTENCIA, pues siente picazón INTOLERABLE; arum triph. se rasea sin cesar la nariz pero también los labios, tratando de *arran* pequeñas costras o pedacitos de piel hasta hacerse sangrar.

LARINGE, BRONQUIOS, Y PULMONES :

Tos generalmente seca ESPASMÓDICA, DESGARRANTE, continua o paroxística; se AGRAVA DE NOCHE, AL BEBER O CAMINAR AL AIRE LIBRE, por la presión sobre la laringe (rumex), es sofocante, acompañada de ruido de gorgoteo en el esófago, y como se reproduce cuando el niño hace un movimiento, se queda completamente inmóvil, no queriendo hablar, ni moverse, por miedo de que le aparezca un nuevo acceso.

Habitualmente producida por la presencia de vermes intestinales, puede también manifestarse sin influencia parasitaria y aparecer por ej., durante una COQUELUCHE.

Dificultad para respirar, y opresión ansiosa del pecho, como si el esternón oprimiese el pulmón.

Espalda y extremidades

Columna vertebral sensible, no soporta el menor contacto.

Extremidades frías que presentan a menudo MOVIMIENTOS ESPASMÓDICOS.

CONVULSIÓN CON SACUDIDAS ESPASMÓDICAS Y CONTORSIONES DE MIEMBROS.

El cuerpo está en extensión rígida, espasmódicamente contraído.

Manos débiles e incapaces de tomar fuertemente un objeto.

Fiebre

Comienza generalmente a las 13.

Escalofrío sin sed, con cara pálida, fría y manos calientes.

No la mejoran las aplicaciones calientes, contrariamente a ipeca, ACOMPAÑADA DE HAMBRE.

Calor con sed y ansiedad.

Sudor generalmente frío en nariz, frente, cara y manos; vómitos con hambrecanina, que se manifiesta en cuanto aparece el sudor.

Mientras dura la fiebre, la lengua está limpia.

Relaciones

Antídoto

Camphora, capsicum.

CINCHONA OFFICINALIS

Bajo el nombre de cinchona officinalis o china, se designa la quina, corteza de árboles de la familia de las rubiáceas, que crecen en regiones tropicales de América, en las largas cadenas de montañas formadas por la Cordillera de los Andes.

Hace tres siglos, el rey Felipe IV reinaba en España; en 1630, la esposa de un alto y poderoso señor de la lejana colonia española, la condesa de Chinchón, estaba muy enferma, de una de esas fiebres tenaces, muy comunes en esas tierras lejanas.

El corregidor español de Loja, ciudad del Ecuador, Don Juan López Cañizares había oído ponderar por los indios, la corteza de cierto arbusto de la selva que según las indígenas tenía el poder de curar las malas fiebres de esas comarcas salvajes.

El arbusto era llamado, por esa propiedad "PALO DE CALENTURAS".

El corregidor ofreció a la condesa de Chinchón un poco de esta corteza.

La noble dama curó.

Desde entonces la planta fue llamada Chinchona que es hoy el término latino con que los botánicos designan lo que nosotros conocemos por el nombre de quinina.

Sólo se puede lamentar que los botánicos (el culpable fue el gran Linneo) hayan mutilado el nombre de la pobre condesa llamando a la quinina cinchona y no chinchona, que hubiera sido el término correcto, pero la falla es leve.

El marido de la enferma, conde de chinchón, era virrey del Perú, por eso la curación con la corteza misteriosa tuvo gran resonancia.

En verdad, antes que ella, cantidad de indígenas habían recurrido con éxito, a ese remedio que proveía fácilmente la selva virgen.

Pero sólo eran pobres salvajes.

Su curación a nadie interesaba mientras que la de la mujer del poderoso virrey era un acontecimiento.

La condesa de chinchón fue una enferma, agradecida.

Al volver a España, en 1640, llevó una provisión de la preciosa corteza.

Habló de ella en la corte de España y en todas partes.

La publicidad fue buena.

Rápidamente el "Polvo de la condesa" fue muy conocido en Europa.

Pronto la provisión fue insuficiente, fue necesario hacer mandar en cantidad.

Los jesuitas, cuyas misiones cubrían el centro de la América del Sud, habían presentado la importancia comercial de tan excelente remedio.

Los padres de la Compañía de Jesús, saben ver bien, y lejos.

Los neófitos de sus misiones, donde crecía el arbusto, fueron empleados en juntar la corteza, tan solicitada en Europa.

Las misiones de los Jesuitas vendieron la quinina en el mundo entero a buen precio durante medio siglo.

"El polvo de la condesa" se convirtió en "El polvo de los Jesuitas" y de la pobre condesa de Chinchón sólo quedará el recuerdo de los botánicos.

Un siglo después de haber sido puesta en evidencia por los europeos su acción curativa, se empezó a estudiar científicamente la planta y a tratar de aclimatarla en otras partes.

El gran botánico Linneo contribuyó mucho al estudio de la quinina; clasificó numerosas especies que se encontraban en estado natural en las selvas primitivas del PERU y BOLIVIA.

La región de Loja, en Ecuador, tenía especialmente la cinchona officinalis, reconocida tan buena y eficaz que fue reservada para la farmacia del rey de España.

Hasta mediados del siglo XIX, ningún ensayo serio de cultivo fue hecho.

La quinina era recogida en la selva virgen sin método, sacrificando las preciosas plantas para arrancarles brutalmente su corteza.

Pero la demanda de quinina fue tal que hubo que ensayar el cultivo del precioso arbusto.

Los primeros ensayos fueron hechos por un botánico francés, el Dr. Wedell que hizo de 1874 a 1880 varias expediciones a Bolivia y llevó a Europa semillas de quinina CALISAYA.

Fueron cultivadas en pequeña escala en el Jardín de Plantas de París y en el Botanical Garden de Londres.

Pero esto sólo fue una tentativa de laboratorio.

Los ensayos en gran extensión de tipo industrial, fueron obra de los holandeses e ingleses.

Los holandeses habían organizado en su espléndida colonia en Java, en Buitenzorg, un jardín botánico modelo.

La Malasia ofrece clima y suelo propicios para el cultivo de la quinina.

Se comprende que los primeros ensayos de cultivo en grande fueron obra de holandeses.

Los ingleses los siguieron de cerca.

Tenían, en la India, terrenos y climas favorables.

Durante numerosos años expediciones de botánicos se dirigieron al centro de América del Sud, a buscar semillas y plantas de la preciosa planta.

Fueron penosas expediciones.

El arbusto se encontraba en regiones salvajes, casi inhabitadas, y hostiles.

Por otra parte, los habitantes de estas altas regiones pronto se dieron cuenta de que si el cultivo de la quinina se hacía grande, fuera de América, perderían el monopolio.

A menudo las expediciones fueron recibidas a tiros.

Fue necesario emplear toda clase de astucias para enviar a Europa y al Extremo Oriente, las preciosas semillas.

Sobre todo, las de las mejores especies fueron muy defendidas; algunos exploradores fueron asesinados.

Algunos indios, culpables de haber ayudado a recolectar semillas, fueron puestos en prisión y ejecutados.

La más dramática fue la búsqueda de semillas de cinchona ledgeriana.

Las dificultades fueron vencidas.

Hoy, esta especie, que tiene el más alto tenor en quinina se cultiva en gran escala en la India y en Java.

Existen numerosas especies de quinina, muy diferentes en sus efectos.

Para las preparaciones homeopáticas se usa únicamente la Quinina Calisaya, o quinina amarilla real.

La quinina encierra un gran número de alcaloides a los que debe su actividad terapéutica; los principales son : la cinchonona, la cinchonoidina, la quinina, la quinidina, la guinamina, etc.; la quinina es la más conocida.

Independientemente de su gran valor terapéutico este medicamento presenta para nosotros un interés histórico particular : estudiando este remedio Hahnemann tuvo por primera vez la intuición del "similia similibus curantur"; fue el primer medicamento que experimentó el Maestro y de esta experiencia nació la Homeopatía.

Preparamos nuestras dinamizaciones del remedio, partiendo de una tintura madre preparada por maceración en alcohol a 70° : en proporción 1/20 de polvo de quinina, por los procedimientos habituales de trituración hahnemanniana sucesiva de este mismo polvo.

Acción general del medicamento

Los síntomas de intoxicación provocada por uso exagerado de quinina son los siguientes : la primera advertencia es generalmente zumbidos de oídos, acompañado por más o menos sordera.

Enseguida, los trastornos gastro intestinales no tardan en aparecer : náuseas, vómitos y diarrea; el mismo tiempo, el enfermo presenta hipersensibilidad creciente a impresiones exteriores, ruido, luz, etc. que lo irrita; sobreviene también una forma de dolor de cabeza característica, dolor profundo o en otros momentos, dolor latente; pronto se produce vértigo que complica el caso; la acción del corazón se debilita y en casos extremos, esta debilidad puede llegar al colapso y aún a la muerte por parálisis del corazón.

En ciertos casos, la intoxicación cinchonina crónica recuerda la del alcohol : hay delirio violento con dilatación pupilar; luego estupor con respiración estertorosa y finalmente aparecen convulsiones, todos estos trastornos nerviosos son la consecuencia de una anemia de los centros cerebrales y no de su congestión como en bell.

Si agregamos a estos síntomas de intoxicación cinchonina, los que se manifiestan en su experimentación patogenética, vemos que la quinina, uno de los remedios más poderosos de que disponemos, actúa electivamente sobre EL CONJUNTO DEL SISTEMA NERVIOSO por medio del cual produce, primero, SOBRE EL APARATO CIRCULATORIO, después SOBRE EL SISTEMA NUTRITIVO, una serie de síntomas cuyo orden de aparición denota en el desarrollo de su acción, UNA FASE PRIMITIVA, ESTENICA Y UNA SECUNDARIA, ASTENICA, la que caracteriza verdaderamente su genio mórbido.

Si en efecto, los primeros síntomas que desarrolla se traducen en excitación : delirio activo, locuaz, alegre, o ruidoso, muy parecido al alcohólico; aceleración del pulso, elevación de la presión sanguínea, vaso constricción; exaltación de sensibilidad, aceleración de respiración : los que produce enseguida tienen el sello de la astenia : estupor,

postración, lentitud de pulso y respiración, disminución de tensión arterial, vaso dilatación, éstasis venoso, disminución de sensibilidad, debilitamiento de los sentidos.

Estos dos órdenes de síntomas alternantes, constituyen el primer período de intoxicación por quinina, ordinariamente tiene poca duración y es comparable a un estado agudo por oposición al segundo período que consiste EN UN ESTADO CRÓNICO QUE TIENDE A LA DISMINUCIÓN LENTA, PERO PROGRESIVA, DE LA VITALIDAD.

Esta inercia nutritiva, que descubre la disminución de la cantidad de azúcar eliminado por la orina, determina UN ESTADO CAQUÉCTICO bastante parecido a la caquexia palustre o tuberculosa que aunque puede estar mezclada con reacciones eréticas, puede llevar al marasmo y la muerte.

La quinina no se adapta a estados inflamatorios francos, ni a febriles agudos : conviene, al contrario, y sobre todo bajo la forma de sulfato de quinina, a fiebres intermitentes regulares, fiebres palúdicas; además aquellas cuyos accesos son francos y presentan los tres estados clásicos de escalofríos, calor y sudor; por otra parte, a las afecciones, febriles o no, de forma deprimente, acompañados o determinados por pérdida abundante de líquidos humores, así como a todas las que provienen de evacuaciones orgánicas espontáneas o provocadas demasiado abundantes.

Por eso debe ser prescrita contra todos los flujos aún las hemorragias pasivas internas o externas, sobre todo cuando son reincidentes y su exageración engendra un debilitamiento general.

Características

1) CONSTITUCIÓN Y TIPO : No tiene indicaciones netamente determinadas; sin embargo resulta de múltiples observaciones, que la quinina tiene mayor eficacia en las estaciones cálidas o templadas en lugares bajos o pantanosos, en sujetos debilitados por fuertes sudores durante su trabajo o por grandes calores, en los que han sufrido pérdidas de líquidos orgánicos considerables, sea por evacuaciones sanguíneas abundantes, supuración interminable, etc., en los que abusan de bebidas gaseosas cargadas de ácido carbónico, en los temperamentos linfáticos o linfático-sanguíneos; al contrario se encuentran contraindicaciones más frecuentes en individuos nerviosos, en hombres de incesante actividad intelectual y también física. (Espanet).

2) DEBILIDAD, DEPRESIÓN, DEBILIDAD DESPUÉS DE ABUNDANTE PERDIDA DE SANGRE O CUALQUIER OTRO LÍQUIDO ORGÁNICO : Durante mucho tiempo, la quinina fue el tónico dado a ciegos por la escuela oficial en cualquier caso de debilidad, anemia, depresión, etc.

En realidad sólo es útil cuando este estado es consecutivo a pérdida abundante de líquido orgánico, cualquiera sea a continuación de supuración abundante y casi crónica o de pérdidas seminales demasiado frecuentes, o sialorrea abundante o lactancia prolongada, etc.

Si la pérdida fue brusca como en el caso de hemorragia, se ve aparecer en seguida esta extrema debilidad; va acompañada de palidez característica, zumbido de oídos, sensación de niebla delante de los ojos, con visión turbia; etc.

Si la pérdida de líquido orgánico es lenta, el enfermo tomará progresivamente una cara pálida, con ojeras azules alrededor de los ojos; cefalea latente, transpiración fácil al menor esfuerzo, sudores nocturnos.

Todo acompañado de la debilidad característica del remedio que aumentará a medida que la pérdida humoral o sanguínea se prolongue.

El origen particular de esta debilidad de china permitirá distinguirla de la de otros remedios cuya debilidad ocupa también el primer plano : ferr. met., indicado en la anemia pura, con tendencia a plétora congestiva; ars. alb., cuya gran debilidad y postración no tienen la misma etiología que la de china; phosph., cuya debilidad es causada por agotamiento del ritmo nervioso, como la de phosph. ac.; zincum, etc.

3) FLATULENCIA EXTREMA : China es con carb. veg. y lycop., uno de los grandes remedios de la flatulencia. DISTENSIÓN MOLESTA DE ABDOMEN, CON ERUCTOS QUE NO ALIVIAN; PARECE, ATALES ENFERMOS, QUE TODOS LOS ALIMENTOS SE TRANSFORMAN EN GASES, además, mientras con carb. veg. la flatulencia interesa sobre todo la parte inferior, con china LLENA TODO EL ABDOMEN.

Este estado está a menudo asociado a una vitalidad disminuida, consecuencia de la pérdida demasiado abundante de cualquier líquido humoral.

Modalidades

Agravación

PERIÓDICAMENTE : TODAS LAS AFECCIONES PERIÓDICAS, PRINCIPALMENTE, SI ESTÁN PEOR CADA DOS DÍAS, DEBEN HACER PENSAR EN QUININA, SEAN MALARICAS O NO; AGRAVACIÓN CADA DOS DÍAS; POR LAS CORRIENTES DE AIRE; DESPUÉS DE LAS COMIDAS; POR PALPACIÓN SUPERFICIAL, POR EL MENOR CONTACTO; DE NOCHE; DEL LADO IZQUIERDO DE PREFERENCIA.

Mejoría

POR EL CALOR : mientras la generalidad de los síntomas de quinina es mejorada por el calor, en habitación caliente, etc., el remedio es agravado, de manera general, al aire libre, por corrientes de aire; por presión fuerte.

Doblándose en dos.

Síntomas mentales

Es una característica del remedio producir UN ERETISMO DEL SISTEMA NERVIOSO QUE ACOMPAÑA LOS SÍNTOMAS DE DEBILIDAD.

Este hecho aproxima más quinina a ars. que carb. veg.

Es así como SU ESPÍRITU ESTA EXCITADO AUNQUE FALTO DE RESISTENCIA; las ideas se presentan en tropel en su cerebro y le impiden dormir (coffea), al cerrar los ojos, ve seres imaginarios; tiene la IMAGINACIÓN, EL ESPÍRITU LLENO DE PROYECTOS, PLANES, ESPECIALMENTE AL ANOCHECER Y A LA NOCHE.

Este eretismo se traduce no solamente en los síntomas del espíritu sino también POR UNA EXTREMA HIPERSENSIBILIDAD DE LA SUPERFICIE DEL CUERPO que está muy sensible al menor toque; esta sensibilidad es más bien imaginaria que real, porque SI ES MUY SENSIBLE AL TOQUE SUPERFICIAL, UNA PRESIÓN PROFUNDA ALIVIA (Nash).

HIPERSENSIBILIDAD DE TODOS LOS SENTIDOS; INTOLERANCIA AL MENOR RUIDO; HIPERSENSIBILIDAD AL MENOR CONTACTO.

Por otra parte la quinina produce en el hombre sano varios síntomas mentales que se encuentran en los estados enfermizos a los que cura, en particular en la anemia cuyas características concuerdan con las del remedio : APÁTICO, INDIFERENTE TACITURNO DESANIMADO, IRRESOLUTO; tiene aversión por el movimiento e inaptitud para los trabajos del espíritu.

Algunos síntomas se relacionan con un verdadero ESTADO HIPOCONDRIACO : mal humor con lamentos, inquietud con llanto y gemidos.

La quinina produce también verdaderos IMPULSOS DE CÓLERA Y AL HOMICIDIO; impulsos ansiosos al suicidio con gran agitación y sin embargo teme ceder a su impulso.

Sueño

Cinchona produce SOMNOLENCIA MUY MARCADA DURANTE EL DÍA y a la noche, INSOMNIO, SOBRE TODO MARCADO ANTES DE MEDIA NOCHE y causado principalmente POR GRAN AGITACIÓN INTELECTUAL.

EL SUEÑO QUE SOBREVIENE al fin es AGITADO, con despertares frecuentes en sobresalto, y sueños terroríficos aunque confusos, que despiertan a menudo al enfermo y le dejan una impresión de terror, acompañado a veces de gritos, gemidos, de sensación de caída.

Cabeza

La quinina produce tal HIPERESTESIA DEL CUERO CABELLUDO que no se le puede tocar sin provocar gran dolor; cuando se tocan los cabellos, le duele la raíz.

CEFALALGIA con DOLORS SORDOS acompañados de pesadez, calor, AFLUJO DESANGRE, que comienza generalmente a la mañana al despertar : otras veces el dolor es violento, pulsátil, martillante; CEFALALGIA CON VIOLENTOS LATIDOS EN CABEZA Y CAROTIDAS; tiene sensación como si la cabeza fuese a estallar; otras veces hay sensación como si el cerebro golpease en choques sucesivos la bóveda craneana y esto es expresivamente doloroso.

Esta cefalalgia latente debida a anemia del cerebro no debe confundirse con la debida a su hiperemia.

VIOLENTOS LATIDOS EN LA CABEZA DEBIDOS A PERDIDA ABUNDANTE DE SANGRE U OTROLIQUIDO HUMORAL.

A veces el dolor se localiza en la frente, sobre los ojos, comienza a la mañana y aumenta en intensidad y desaparece durante la cena o la noche; a veces se localiza con los mismos caracteres, en parietales u occipucio.

Todas estas cefalalgias aumentan por el movimiento y al caminar; algunas disminuyen por la presión fuerte.

Vértigo por anemia cerebral.

Ojos

Cinchona actúa más sobre la vista que sobre el globo ocular mismo.

Anotemos sin embargo, sequedad, prurito de párpados; por otra parte el movimiento de los ojos es doloroso y difícil como si los globos oculares fueran demasiado grandes.

Sensación de presión en los ojos, como cuando no se ha dormido.

Las pupilas están achicadas o dilatadas e inmóviles; gran disminución de visión; ambliopia progresiva con dilatación e inmovilidad de pupilas; puntos negros delante de los ojos; neblina delante de los ojos; fotofobia.

El sulfato de quinina produce muy rápidamente ceguera por dosis tóxicas; visión de los objetos en amarillo, luego en rosa.

Oídos

Oído externo muy sensible al tacto; hipersensibilidad al ruido.

Zumbido DE OÍDOS CON SENSACIÓN COMO SI LOS SONIDOS FUERAN MUY LEJANOS; SORDERA QUE PUEDE LLEGAR HASTA SORDERA ABSOLUTA.

Cara

La patogenesia de quinina contiene dos efectos opuestos, alternantes : enrojecimiento y palidez de la cara.

ENROJECIMIENTO Y CALOR DE LA CARA, a menudo con hinchazón; enrojecimiento y calor de una mejilla, de la oreja; cara roja después de hemorragia o pérdida abundante de cualquier líquido humoral.

PALIDEZ DE LA CARA con tez amarilla, terrosa y rasgos tirantes, como después de excesos, o ansiedad, cara sin sangre, blanca, o aspecto de hinchazón pálida de la cara, como se encuentra en antiguos palúdicos.

NEURALGIA DE TRIGÉMINO, con dolores punzantes en mejillas, maxilar inferior, región supra orbitaria.

Quinina es un gran remedio neurálgico que responde a la neuralgia de trigémino de cualquier lado de la cara, cuando los síntomas son típicos por la periodicidad y cuando el aire frío o un tocamiento superficial muy ligero, un simple roce, producen agravación.

Es muy indicado si la neuralgia es de origen malárico.

Se puede comparar aquí cedron, que es aplicable a la neuralgia supra orbitaria cuando los ataques se presentan con regularidad de reloj; generalmente hay una historia de paludismo en los antecedentes del caso.

Aparato digestivo

BOCA :

Labios dolorosos, secos, agrietados.

Gusto amargo que se extiende hasta la garganta.

Cavidad bucal extremadamente seca a pesar de un gran aflujo de saliva.

Lengua seca, con escozor, a veces ardor, extremadamente sucia y cargada.

Odontalgia que disminuye al apretar fuertemente los dientes de los dos maxilares, unos contra otros y por el calor.

GARGANTA :

Sensación de sequedad, con dificultad para tragar.

ESTOMAGO :

HAMBRE "SIN APETENCIA", tiene un hambre desmesurado y sin embargo los alimentos son mal digeridos.

Encontramos aquí dos efectos opuestos debidos a la diferencia de dosis y las acciones alternantes del remedio : a dosis débiles, la quinina aumenta primero el apetito; produce hambre violenta, a menudo sin apetito verdadero, a veces acompañado de gusto pastoso, náuseas y deseos de vomitar; por la continuación del medicamento, o por dosis fuertes, pronto sobreviene un apetito caprichoso, luego inapetencia completa por sólidos y líquidos.

LA LECHE NO LE CONVIENE; SE AGRAVA AL COMER FRUTA, el remedio, igualmente es útil para combatir CIERTOS MALOS EFECTOS DEL TE, aumento de agudeza del gusto, relacionado con la hipersensibilidad del remedio; los alimentos parecen amargos o demasiado salados.

Quinina produce MUCHOS GASES EN EL ESTOMAGO, DE AHÍ UNA HINCHAZÓN MUY MARCADA Y BORBORIGMOS EN EL EPIGASTRIO, BOCANADAS Y ERUCTOS ABUNDANTES, A VECES SIN GUSTO, A VECES ÁCIDOS, AMARGOS, PERO NO ALIVIAN LA EXTREMA FLATULENCIA.

Dispepsia, especialmente después de pérdida abundante de cualquier líquido orgánico : estómago débil, tolera difícilmente los alimentos; está extremadamente distendido por el gas y los eructos no alivian esta flatulencia; además el menor alimento aumenta este síntoma de tal suerte que después de haber tomado una pequeña cantidad de alimento, se siente lleno como si hubiera tomado una cantidad exagerada; a veces, esta sensación de plenitud sube hasta la garganta y dificulta la respiración.

A veces también se queja, después de haber comido, de sentir sensación de peso, detrás del esternón, como si los alimentos hubieran quedado ahí; es como la sensación de huevo duro de abies negra, pero situada más arriba.

Puls. tiene también esta sensación.

ABDOMEN :

CÓLICOS VIOLENTOS acompañados de ruidos de líquido, borborigmos y timpanismo, a menudo determinados por la acción de comer o beber; pero el gran síntoma aquí es una EXTREMA ABUNDANCIA DE FLATULENCIA, COMO EN EL ESTOMAGO, TIMPANISMO EXCESIVO ACOMPAÑADO DE BORBORIGMOS Y RETENCIÓN DOLOROSA DE GASES (CÓLICOS VENTOSOS) O AL CONTRARIO, DE ERUCTOS Y EMISIÓN ABUNDANTE DE VIENTOS EXTREMADAMENTE FÉTIDOS; diremos en fin, que los cólicos flatulentos son generalmente aliviados cuando el enfermo se dobla en dos.

Aquí deben compararse algunos medicamentos : carb. veg., es otro gran medicamento de la flatulencia, pero mientras quinina se localiza en todo el abdomen, en carb. veg., se localiza en su parte superior y en el estómago, donde provoca gastralgia más o menos viva; hay acidez, pirosis; remedio del dispeptico, ya que el estómago es a menudo perturbado por cierta cantidad de alimentos y esta flatulencia es su consecuencia.

Medicamento muy apropiado en casos en que todo ello proviene de abuso de alimentación grasa, pastelería, etc., y en los que ha fallado puls., que por lo demás sigue bien a carb. veg. lycop., puede compararse a quinina y a carb. veg., por la importancia de su flatulencia; pero aquí esta ocupa la parte inferior del abdomen determinando presión de arriba a abajo, hacia el recto, mientras en carb. veg., la flatulencia ejerce presión de abajo a arriba, hacia el esófago, y el estómago.

Además la flatulencia de lycop. va generalmente acompañada de constipación y necesidad ineficaz de evacuar como nux vom., pero consecutiva a contracción espasmódica del ano que puede continuar después de la evacuación y ser dolorosa.

Además las complicaciones hepáticas o urinarias son tan frecuentes en lycop., como las del bazo e hígado en quinina. En fin, la agravación a las 16 es característica.

Chamom., es muy útil en casos de flatulencia en niños; cólicos ventosos, abdomen meteorizado, piel tirante como la de un tambor; emisiones de pequeña cantidad de gas que no alivian, solo las aplicaciones calientes mejoran el pequeño enfermo; todo esto se encuentra a menudo en la enterocolitis infantil, con deposiciones verdes, acuosas, corrosivas, parecidas a huevos revueltos, deposiciones calientes con olor a huevo podrido.

El carácter taciturno y desagradable característico del remedio es una poderosa indicación.

Magn. carb. tiene flatulencia parecida a la de chamom. : cólicos ventosos, deposiciones verdes, en niños, pero más bien mucosas, parecidas a la espuma verde que cubre un charco de ranas.

Después de las deposiciones los dolores calman; en fin, las deposiciones, eructos, el niño todo, huelen agrio, como calc. ostr. y rheum, mat. sulph., tiene flatulencia abdominal abundante, acompañada de mucho gorgoteo y de borborismos, pero sobre todo localizada al costado derecho del vientre; el gas se forma y acumula principalmente en esta zona, durante la noche, causando a veces mucho dolor; gorgoteo con cólicos súbitos como después de un purgante.

Por otra parte, la tendencia a diarrea es mucho más fuerte que con cualquier otro remedio de esta serie de los principales flatulentos; además, si tiene diarrea peor a la mañana, no lo obliga a levantarse como sulphur; sólo sobreviene después que se ha movido un poco.

Nux vom., está particularmente indicado en individuos con el característico temperamento de este remedio.

La flatulencia va generalmente asociada a constipación de caracteres igualmente clásicos.

El cólico flatulento se siente como si la vejiga, recto e intestinos sufriesen presión dolorosa.

En fin, las agravaciones sobrevienen después de haber comido o bebido a la mañana.

Sulphur, presenta un grado bastante marcado de flatulencia como para considerarlo excelente remedio en tales casos.

Tiene muchos gases con olor fétido a huevo podrido, sobre todo de noche y al atardecer, y generalmente todo acompañado de diarrea sin olor que sobreviene a la mañana temprano y lo obliga a levantarse de la cama.

Quinina tiene sobre el abdomen y las vísceras contenidas en su cavidad una HIPERTROFIA NETA DEL HÍGADO, que está sensible y doloroso; dolores y puntadas en el hipocondrio derecho, que aumentan a menudo al caminar, al respirar y al menor toque.

Se encuentra el mismo estado en la zona de BAZO, que está igualmente hipertrofiado y doloroso; hay que comparar aquí la acción del remedio a la de ceanothus o grindella robusta.

DEPOSICIONES :

DIARREA INDOLORA, DE OLOR FÉTIDO, CADAVÉRICO, CON DEPOSICIONES PEGAJOSAS, BILIOSAS, NEGRUZCAS, CON RESTOS DE ALIMENTOS SIN DIGERIR; SE AGRAVA DESPUÉS DE LAS COMIDAS, SOBRE TODO DESPUÉS DE HABER COMIDO FRUTAS; acompañada de MUCHA FLATULENCIA y las deposiciones, aunque muy blandas, casi líquidas, son a veces muy difíciles; en fin, esta diarrea, muy debilitante, NO TARDA EN TRAER UNA DEPRESIÓN RÁPIDA CON GRAN DEMACRACIÓN. Como acción secundaria, se ha notado constipación a veces muy difícil de aliviar.

Órganos genitales

MASCULINOS :

Quinina excita el apetito venéreo produciendo erecciones y poluciones nocturnas con ideas, sueños lascivos; poluciones frecuentes seguidas de la debilidad característica del remedio.

Hinchazón dolorosa al tacto, del cordón y del epidímo, y a veces de los testículos.

FEMENINOS :

Apetito venéreo aumentado.

Por otra parte, bajo la influencia del remedio, las reglas son adelantadas y sobre todo muy aumentadas, este aumento puede llegar hasta la metrorragia, con coágulos negros, todo esto puede ir acompañado de la debilidad característica de china.

Aparato respiratorio

NARIZ :

Hipersensibilidad, hiperagudeza del olfato, no puede soportar el menor olor de flores, perfume, tabaco.

El enfermo presenta estornudos violentos y a menudo coriza a la menor corriente de aire.

Síntomas de catarro agudo con secreción acuosa y violentos estornudos; se puede complicar con catarro de vías respiratorias superiores.

Sensación de presión en la raíz de la nariz y escozor en las fosas nasales.

Epistaxis abundantes y frecuentes sobre todo a la mañana al despertar, durante un dolor de cabeza, inmediatamente aliviado por la aparición de sangre.

LARINGE, BRONQUIOS Y PULMONES :

Síntomas de catarro agudo con ronquera, acumulación de mucus en laringe y tráquea.

Tos seca, provocada por un cosquilleo en la tráquea.

Tos sofocante por acumulación de mucosidades en la laringe.

Tos grasa con expectoración de mucus sanguinolento.

Tos excitada al hablar, al reír, como en phosph. y stann.

TOS DESPUÉS DE LA COMIDA.

Tos todas las mañanas.

Disnea.

No puede respirar cuando tiene la cabeza baja.

Dolores en las paredes torácicas o detrás del esternón, punzantes opresivos, que no están en relación con la respiración, disminuidos por una presión profunda.

Aparato circulatorio

Palpitaciones del corazón con ansiedad; palpitaciones con aflujo de sangre a la cabeza y extremidades frías.

Pulso irregular; venas hinchadas.

China actúa sobre la fibra cardíaca a la que debilita, determinando así una disminución de la presión sanguínea.

Por otra parte, destruye el poder ozonizante de la sangre y a esto atribuye la Escuela Oficial su poder de reducir la temperatura en enfermedades febriles.

En fin, tiene efecto destructor sobre los movimientos amiloideos en general, pero en particular sobre los de los glóbulos blancos; por esta razón se le ha empleado en la Escuela Oficial, siempre, para prevenir la inflamación.

Pero es sobre todo en los casos DE HEMORRAGIAS donde tiene un gran lugar; HEMORRAGIAS POR UN ORIFICIO CUALQUIERA DEL CUERPO, DE SANGRE OSCURA, MUY FÁCILMENTE COAGULABLE, EL FLUJO ES PROFUSO, PROVOCA COLAPSOS CON ENFRIAMIENTO DE LA CARA Y DE TODO EL CUERPO; el enfermo tiene zumbidos EN LOS OÍDOS, SU VISTA SE ENTURBIA, RESPIRA DIFÍCILMENTE, pide que lo ABANIQUEN (carb. veg.).

No para ser refrescado sino por la necesidad instintiva de tener un aire más renovado y por lo tanto más oxígeno para respirar.

Dado en tales casos, china levanta al enfermo y ayuda a parar la hemorragia.

Dorso y extremidades

Dolores sordos, tensivos, de contusión, con algunos tirones en nuca y espalda.

Dewey señala que el sulfato de quinina es útil en la irritación espinal, cuando hay gran sensibilidad de la columna vertebral, en la región dorsal; la séptima vértebra cervical y la primera dorsal, son muy sensibles a la presión.

Dolores en miembros y articulaciones como si hubiera sufrido un esguince, agravados por roce superficial, pero mejorados por presión profunda.

Articulaciones hinchadas, muy dolorosas, sensibles a la menor corriente de aire.

Lasitud en las articulaciones, peor a la mañana y cuando se sienta.

Gran debilidad con temblor y sensación de entumecimiento.

Aversión por el ejercicio.

Dolores articulares que pueden ir acompañados de hinchazón y calor, en particular en rodillas y pequeñas articulaciones; pero todos aumentan por el menor toque o por el movimiento.

China puede estar indicado en el reumatismo inflamatorio, no al principio de la enfermedad, sino más tarde, cuando la fiebre ha tomado un carácter intermitente.

Las articulaciones enfermas están hinchadas, y los dolores son entonces punzantes, hacen presión; el enfermo no permite que se le aproximen y grita de dolor si le tocan ligeramente las partes enfermas, ya que la superficie cutánea tiene a ese nivel, una sensibilidad exquisita.

Sensación de frío, de entumecimiento y debilidad en las extremidades; a veces tiene frío en una sola mano o en un solo pie.

Piel

Excesivamente sensible al tacto superficial, de una sensibilidad exquisita, mientras que una presión profunda alivia.

Edema y anasarca.

Por otra parte, se ha reconocido que la quinina puede producir URTICARIA, y erupciones eczematosas y otras erisipelatoides; se localizan con más frecuencia en cara, manos y partes genitales.

Fiebre

La quinina produce fiebre y este hecho ha servido de base para todos los trabajos de Hahnemann.

Esto ha sido negado por nuestros adversarios.

Sin embargo, no se puede negar, entre otros hechos, QUE LOS OBREROS QUE TRABAJAN EN LA PREPARACIÓN DE SULFATO DE QUININA, presentan de vez en cuando ejemplos de fiebre cinchonica.

En fin, las experimentaciones de Hahnemann y sus discípulos han mostrado que la quinina administrada al hombre, produce varios síntomas febriles.

Estos accesos de fiebre están compuestos al principio de una faz de ESCALOFRÍOS, acompañados de temblor y castañeteo de dientes, generalmente sin sed, pero a menudo con náuseas.

Al fin de esta faz de escalofríos, éstos alternan a menudo con el calor que constituirá la faz siguiente : a menudo también, la aparición de sed, así como de hambre anormal, harán prever el fin de la faz de escalofríos y el principio de la faz de calor.

EL CALOR ES INTENSO; se acompaña de enrojecimiento de la cara, hinchazón de las venas y pinchazos en la piel; a veces sudor en la frente; el sudor o la ausencia de sed han sido igualmente notados en las observaciones.

A la faz de ardor, sucede la tercera faz DE SUDOR, comúnmente general y excesivo; acompañado de sed muy marcada y sopor.

Como lo hemos dicho más arriba, tal caso febril no se adapta al elemento inflamatorio franco y no ofrece analogía con el estado agudo febril de una afección inflamatoria o infecciosa cualquiera.

Es, al contrario, la imagen clásica del ACCESO DE FIEBRE INTERMITENTE PALÚDICA para el que cinchona es un gran remedio.

Todos los estados son bien marcados; ANTES DEL ESCALOFRÍO, está agitado, no puede reposar; DURANTE EL ESCALOFRÍO, está helado, castañetea los dientes; pide que lo abriguen bien, permanece cerca del fuego sin que esto lo alivie; la sed puede existir antes y después del escalofrío, pero durante éste no tiene sed; DURANTE EL ESTADO DE CALOR, trata de descubrirse, tiene demasiado calor, pero el descubrirse le produce escalofríos; tiene la cara de un rojo ardiente y a veces delirio; EL ESTADO DE SUDOR que termina el acceso, ofrece transpiración excesivamente abundante, muy debilitante, acompañada de mucha sed.

ENTRE LOS ACCESOS, durante la apirexia, no tiene la impresión de estar enfermo, no está desanimado como ars. alb., sin embargo, presenta síntomas importantes : tiene mala cara; el hígado y el bazo están más o menos atacados y en todo caso hipertrofiados; tiene hambre canina, anormal, o al contrario, ausencia completa de apetito.

Tiene fácilmente edema en los pies, en fin, su sueño se turba : en cuanto cierra los ojos, ve personajes imaginarios que lo espantan, etc.

Gracias a su homeopaticidad con la fiebre palúdica, LA quinina ha tenido brillantes éxitos en la cura de esta enfermedad; sin embargo, tanto ella como sus alcaloides han sido prescritos con tal abuso en su tratamiento que hay que diferenciarla de otros remedios que pueden tener, en ciertos casos, un empleo mejor.

Ars. alb., es un medicamento a veces muy útil en la fiebre palúdica.

Está indicado cuando LOS ACCESOS NO SON COMPLETOS, son mal definidos en sus fases, el estado de escalofrío es irregular; EL CALOR al contrario, ES INTENSO, acompañado de gran sensación de sed, pero con deseo particularmente marcado DE BEBIDAS CALIENTES; LAS BEBIDAS FRÍAS LE PRODUCEN ESCALOFRÍOS; por otra parte, esta sed no aparece jamás durante el estado de calor y sudor.

Este último estado puede aparecer tardíamente y la transpiración no siempre alivia.

Durante todo esto, el pulso es pequeño, débil, frecuente.

Por otro lado el enfermo es a menudo atormentado por neuralgias típicas y en los casos antiguos o muy graves, el anasarca más o menos generalizado se puede mostrar al mismo tiempo que la hipertrofia de hígado y bazo.

En fin, ars. alb., SIGUE A MENUDO BIEN A china en el tratamiento del paludismo; y está a menudo indicado también DESPUÉS DEL FRACASO DE LA quinina O DEL ABUSO DE ESTE REMEDIO.

Aranea diadema se aplica a sujetos que no manifiestan un tipo distinto de fiebre, pero que sufren cada cambio de tiempo, a la humedad o el frío.

Los síntomas están mal definidos : a veces se dicen dispépticos y sufren entonces del estómago, otras, tienen un malestar vago, pero general; pero en todos los casos hay en el fondo un estado constitucional desarrollado por el paludismo.

Capsicum, tiene como característica un escalofrío que comienza en la espalda, con mucha sed, que se alivia cuando se calienta o cuando se le hacen en esa zona aplicaciones calientes.

Carb. veg., es buen remedio en los casos graves, sobre todo después del abuso de quinina; hay mucha sed durante el escalofrío; el cuerpo es de un frío de hielo sobre todo a partir de las rodillas y el enfermo muestra falta absoluta de reacción.

Eupat. perfol., tiene un estado de escalofrío que empieza por lo general a la mañana, después de haber sido precedido de mucha sed y vómitos amargos; sin embargo beber le da escalofríos; como acabamos de decir, este escalofrío sobreviene generalmente a la mañana, hacia las nueve, pero a veces, un día a la mañana y otro a la tarde.

La fiebre termina por ligera transpiración.

En fin, hay sensación de contusión en la espalda y en los músculos de los miembros.

Ferrum, es útil después del abuso de quinina; cuando sobreviene la anemia característica del medicamento; la cara tiene fáciles aflujos de sangre; los grandes vasos están animados por latidos marcados; bazo hipertrofiado y edema en los pies.

Ipeca, es útil CUANDO LOS SÍNTOMAS HAN SIDO CONFUNDIDOS POR LA quinina; no hay un cuadro clínico neto, todo es confuso; ipeca parece tener la propiedad de desarrollar los síntomas primitivos y permitir encontrar así el remedio que cura, pero en ciertos casos puede bastar para curar.

Sus características son una faz de escalofríos muy corta, seguida de un largo acceso de calor, con predominancia de síntomas gástricos, sobre todo náuseas marcadas.

Nat. mur., está especialmente indicado EN LOS CASOS ENMASCARADOS PERO NO CURADOS POR LA quinina; su principal característica es la aparición de un escalofrío entre las 10 y las 11 de la mañana.

Hay también otros remedios útiles en el tratamiento del paludismo, pero éstos son los que se encuentran más frecuentemente indicados en la vecindad inmediata de quinina.

China puede estar igualmente indicada en el tratamiento de la FIEBRE HÉCTICA tal como la que se produce durante una supuración de larga duración; en ese caso las mejillas están muy rojas; el enfermo extremadamente nervioso; muy débil, postrado; la diarrea aumenta su debilidad, así como abundantes sudores nocturnos.

Hay que recordar en estos casos al lado de china a ars. alb. y carb. veg.

Relaciones

Complementarios

Ferrum met., calc. phosph.

Antídotos

Ars. alb., ipeca, carb. veg., lach., puls., ferrum, ver. alb., cinchona y bell. son antagonistas por los síntomas del corazón, la temperatura, etc.

Cinchona Y LA MORFINA son antagonistas por sus síntomas cerebrales.

CLEMATIS ERECTA Error! Marcador no definido.

Clematis erecta es una planta de la familia de las RANUNCULACEAS que crece en terrenos secos, soleados y pedregosos, principalmente de Europa Central, donde florece en junio-julio.

Todas sus partes tienen sabor agrio, cáustico, y olor fuerte y picante.

Preparamos la tintura madre, a partir de la que obtenemos por diluciones hahnemannianas sucesivas las diversas dinamizaciones, con las hojas frescas de la planta, recogidas al principio de la floración.

Acción general y características

Clematis erecta es un medicamento que sólo ha sido experimentado en forma incompleta, y por consiguiente, corresponde a pocos síntomas; sin embargo, éstos son tan importantes, que no se los puede silenciar (Kent).

Su gran esfera de acción parece situarse en la zona de las MUCOSAS, PARTICULARMENTE las del APARATO GENITO-URINARIO.

En la PIEL, provoca lesiones tan marcadas como características.

En fin, bajo su acción, los GANGLIOS LINFÁTICOS, ASÍ COMO CIERTAS GLÁNDULAS se infiltran y se induran.

Constitución y temperamento

Parece convenir particularmente a las constituciones que Hahnemann definió bajo el nombre de constituciones sicóticas, particularmente cuando tales sujetos han tenido recientemente una hemorragia suprimida bruscamente y a destiempo.

Modalidades

Agravación

De noche y por el calor de la cama.

Mejoría

Al aire libre; al lavarse con agua fría.

Síntomas mentales

Tristeza; ansiedad; indiferencia.

"Uno de los estados mentales casi constante es el TEMOR DE ESTAR SOLO Y, SIN EMBARGO, TEME LA SOCIEDAD; teme la necesidad de tener gente a su alrededor, y le parece que la atmósfera está llena de cosas horribles y penosas que lo atormentan.

Esto los deprime" (Kent).

Esto aproxima el remedio a : bismuthum, para quien la soledad es insoportable pero que al contrario de clematis, desea estar en sociedad; kali carb., que teme estar solo porque tiene miedo; lycop., que tiene miedo de la soledad, aunque tenga miedo de aparecer en público; la soledad lo asusta, y sin embargo, tiene miedo de sus semejantes; desea estar solo, pero sentir a alguien en la casa; phosph., que tiene miedo de la muerte cuando está solo; stramon., que no puede soportar la soledad o la oscuridad.

Cabeza

Dolores ardientes y perforantes en la piel del cráneo, a la altura de la frente.

Erupción húmeda, pustulosa dolorosa, pruriginosa, en la frente, al borde del cuero cabelludo.

Cefalea con dolores agudos en las sienes; sensación de confusión, de aturdimiento.

Ojos

El ojo está tan sensible al aire, que no se anima a abrirlo (Jousset).

Sensación de comezón en los ojos, sobre todo al cerrarlos; al abrirlos enseguida, la luz le hace mal (Jousset).

Inflamación de conjuntiva con lagrimeo; dolor ardiente en los párpados, sobretodo en los bordes; inflamación del ángulo interno del ojo; conjuntivitis pustulosa con "tinea capitis".

El remedio se ha mostrado de utilidad en estados inflamatorios de borde de párpados con dolor e hinchazón de glándulas de Meibomius, como se encuentra en jóvenes escrofulosos. (Jousset).

Aparato digestivo

Odontalgia que irradia a toda la cara; dolor con tirones, isócrono con el latir del corazón, acompañado de accesos de opresión dolorosa en el conducto auditivo, y dolor en el ojo al moverlo; "se agrava por el calor de la cama, lo que corresponde a una modalidad general; sobreviene de noche; se agrava conservando en la boca líquidos calientes, mientras se mejora al conservar en la boca agua fría; mejora al aspirar aire frío; odontalgia tolerable durante el día pero cuando se acuesta y toma la posición horizontal, alcanza un grado intolerable" (Kent).

Órganos genitales

Esta es la gran esfera de acción del remedio.

NECESIDAD FRECUENTE DE ORINAR; DURANTE LA MICCIÓN, LA ORINA ES EMITIDA GOTA AGOTA; SENSACIÓN DE ENCOGIMIENTO EN LA URETRA; LA MICCIÓN SE HACE EN VARIAS VECES, INTERRUMPIDA POR DETENCIONES BRUSCAS; INTERRUPCIÓN DEL CHORRO; TIENE LA IMPRESIÓN DE QUE LE ES IMPOSIBLE EMITIR TODA LA ORINA QUE ESTA EN LA VEJIGA; CORRIMIENTO ESPONTANEO DE UN POCO DE ORINA DESPUÉS DE LA MICCIÓN.

"Es natural del remedio provocar inflamación de mucosas, por eso es útil en casos de uretritis blenorragica de lenta evolución y que hayan sido tratadas con lavajes; esta inflamación crónica de mucosa uretral le provocará la infiltración y, a la palpación, el canal uretral dará la sensación de algo duro y cilíndrico como una pequeña cuerda que rueda bajo el dedo, siendo esta presión dolorosa; y esta infiltración progresará hasta determinar un encogimiento.

Si en estos casos, y cuando lo indiquen los síntomas, se da clematis, se verá reaparecer la secreción y poco a poco desaparecerá el encogimiento.

El enfermo no consigue vaciar completamente la vejiga, tiene siempre la sensación de que le queda algo de orina, (Kent).

Sensación DE ARDOR Y PUNTADAS EN LA URETRA ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE LA MICCIÓN.

Micción de orina puriforme.

Dolores tractivos en los testículos o el cordón espermático, hasta las ingles y los muslos.

Neuralgia inguino-escrotal.

Hinchazón de escroto (ars. alb., puls., canthar., ignat., brom., rhus tox.), especialmente su PARTE DERECHA.

Los testículos cuelgan pesadamente o están encogidos, con dolor a lo largo del cordón espermático, peor del lado derecho (aurum, arg. nit., nit. ac.).

INDURACIÓN DE TESTÍCULOS CON SENSACIÓN DE MAGULLADURA.

Inflamación dolorosa e hinchazón de testículos.

Induración de escroto.

"Clem. er. es uno de los medicamentos que más convienen a la inflamación e infiltración testicular; es curioso observar que el lado derecho se ve afectado con más frecuencia que el izquierdo" (Kent).

Violentas erecciones con puntadas en la uretra.

Dolores ardientes en la verga durante la eyaculación, durante el coito.

Infiltración e induración del seno.

Aparato respiratorio

Puntadas en el pecho, que aumentan al inspirar, disminuyen por el reposo absoluto y por una respiración superficial, sin tos.

Dolor presivo y persistente en toda la cavidad torácica, sobre el que la respiración no ejerce ninguna influencia (Jousset).

Aparato circulatorio

Pulsaciones fuertes y apreciables en todo el cuerpo, sobre todo en el corazón (Jousset).

Latidos en las arterias (Jousset).

Espalda y extremidades

Gran debilidad nerviosa y sacudidas musculares (Kent).

Dolores al acostarse, al dormirse (Kent).

Piel

Erupción vesicular.

Erupción de herpes escamosos con secreción de líquido sanioso, amarillento, corrosivo, y acompañada de enrojecimiento, calor e hinchazón de piel.

Herpes tenaces, rojizos y resumantes, con comezón insoportable al calor de la cama.

Los herpes están rojos y húmedos durante el cuarto de luna creciente, peropálidos y secos en el menguante (Jahr).

Erupción con prurito intenso, intolerable, AGRAVADA AL LAVARSE CON AGUA FRÍA, lo mismo que por el calor de la cama; peor en las manos, pies, OCCIPUCIO, ALREDEDOR DEL CUERO CABELLUDO, en el límite de los cabellos.

Relaciones

Antídotos

Bryonia, camphora.

COCCULUS INDICUS

Cocculus indicus, es el fruto del Anamirta cocculus, arbusto de la familia de las menispermáceas, que crece en las Indias Orientales, Egipto, costa del Malabar e Islas de Ceylán, Java y Célebes, en rocas y piedras de la costa del mar.

Nos llega en estado seco, parecido a una baya de laurel negruzca y arrugada; la cubren dos cortezas: la primera, leñosa, oscura, dura; la segunda blanca y más dura todavía, encierra una almendra blanca de sabor agrio, cáustico y amargo, mientras que las cortezas son casi insípidas.

Contiene un alcaloide, la picrotoxina, veneno violento.

Para preparar las tres primeras dinamizaciones la pulverizamos y trituramos el polvo así obtenido; también podemos hacer con ella, una tintura madre, por maceración, al calor suave, de una parte de polvo en veinte partes de alcohol a 90°; de esta tintura madre obtenemos, por diluciones hahnemannianas sucesivas, las diversas dinamizaciones.

Acción general del medicamento

Cocculus indicus actúa sobre el SISTEMA NERVIOSO CEREBRO ESPINAL en el que determina gran debilidad; es especialmente en la MEDULA donde se encuentran las consecuencias de este estado de VERDADERA DEBILIDAD PARALÍTICA, sobre todo en sus FIBRAS MOTRICES; de donde su repercusión en NERVIOS MOTRICES; por eso es frecuentemente empleado con éxito en gran número de casos de parálisis provenientes de afección a la médula lumbar; se produce entonces un estado de debilidad paralítica lumbar, y, al caminar, debilitamiento renal; debilidad de extremidades inferiores, total, que se traduce generalmente en los siguientes síntomas : debilidad en rodillas al caminar, planta de pies como adormecida, sensación de magulladura dolorosa en los músculos de los muslos, como si hubieran sido golpeados.

En otros casos, los siguientes síntomas en las extremidades superiores : primerose entumece una mano, después la otra; a veces, este entumecimiento toma todo el brazo y la mano da la sensación de estar hinchada.

Estos síntomas constituyen el fondo de la sintomatología de todo el medicamento y parecen depender de un estado de parálisis más o menos completa de las fibras motrices del eje cerebro espinal. (Farrington).

Dunham resume así la acción de cocc. ind. : "Su esfera de acción es sobre todo la del sistema de la vida animal; influye primero y especialmente sobre los músculos voluntarios y enseguida sobre el sensorium; determina frecuentemente náuseas que llegan al vómito y van acompañadas de debilidad al mismo tiempo que de sensación de vértigo violento al levantar la cabeza".

Hughes escribe : "Ejerce su influencia sobre todo sobre los nervios motores voluntarios y sus músculos, más que sobre los centros intelectuales".

Características

1) CONSTITUCIÓN Y TIPO : Aún cuando la constitución del *jeto* no parezca tener, en la elección de este remedio, la misma importancia que para la elección de ciertos otros medicamentos, el Dr. Georges H. Martin hace notar lo siguiente : "cocc. ind. parece convenir más a mujeres y niños de temperamento, de cabellos y ojos claros". Boericke, por su parte, escribe : "El remedio muestra una atracción especial por las rubias, sobre todo cuando están embarazadas y tienen muchas náuseas y vómitos, y también por mujeres y niñas jóvenes, sensitivas, románticas".

2) DEBILIDAD EXTREMA, PARALÍTICA, ACOMPAÑADA POR ESTADO NAUSEOSO Y VÉRTIGOS, RELACIONADA CON LESIÓN ORGÁNICA O CONSECUTIVA A SURMENAGE E INSOMNIO : "Cocc. ind. retarda todas las funciones de cuerpo y espíritu, provocando una especie de debilidad paralítica del organismo. Retarda todas las funciones.

Todas las impresiones nerviosas percibidas alcanzan lentamente los centros nerviosos; si se pellizca el pie a tal sujeto, sólo reaccionará al cabo de un instante, en lugar de tener la reacción instantánea del sujeto normal; responde lentamente a las preguntas, pareciendo meditar antes de dar la respuesta, y para él, meditar es un esfuerzo.

Así son todas las manifestaciones nerviosas del remedio : pensamiento, funciones musculares, etc.

No puede soportar ningún esfuerzo muscular porque está débil, fatigado.

Primero sobreviene esta lentitud funcional, después un estado que se aproxima a parálisis, finalmente, verdadera parálisis, local o general" (Kent).

"Postración y agotamiento nervioso acompañan a la mayoría de los síntomas de cocc. ind. (Kent).

3) IRRITABILIDAD EXTREMA DEL SISTEMA NERVIOSO : A pesar de este retardo funcional y psíquico, el sistema nervioso de cocc. ind. es irritable, hipersensible : extremadamente sensible al sufrimiento, al ruido; el menor ruido, la menor sacudida : le son insoportables.

Cocc. ind. es, como bell., agravado por una sacudida : los dos se parecen en los síntomas del sueño, así como por otros generales (Kent).

Hahnemann observa expresamente que cocc. ind. produce HIPERESTESIA GENERAL.

4) SENSACIÓN DE DEBILIDAD, DE VACÍO, EN LA CABEZA Y EN DIFERENTES ÓRGANOS, EN ARMONÍA CON LA DEBILIDAD GENERAL DEL REMEDIO.

Esta sensación de vacío no es otra cosa que la manifestación de la debilidad general del medicamento; se la encuentra en cabeza, estómago, pecho, corazón, etc. : en una palabra en todas las partes interiores del organismo.

Kent observa : "sensación de vértigo, de "mareo", a veces, en todo el cuerpo, una especie de sensación de debilidad, seguida a veces de pérdida de conocimiento o rigidez paralítica de extremidades".

Modalidades

Agravación

POR EL INSOMNIO, POR TRASNOCHAR, POR FALTA DE SUEÑO, POR SURMENAGE, (caust., cuprum, ignat., nit. ac.); "la debilidad de cocc. ind., de origen espinal, tiene particular tendencia a seguir a pérdida de sueño; el sujeto no puede acostarse una o dos horas más tarde que habitualmente sin sentirse languideciente y agotado todo el día siguiente (Farrington).

POR INSOMNIO ACOMPAÑADO DE INQUIETUD, POR EMOCIÓN CONTINUA Y AGOTADORA :

"una mujer que cuida a su marido, una hija que cuida a su padre, se agotan por inquietud, preocupación y falta de

sueño; su agotamiento es tal que no puede ya soportar ningún esfuerzo mental, ni físico; tiene sensación de debilidad en rodillas, espalda, y cuando quiere descansar un poco, no puede dormirse.

El estado así determinado es análogo al que produce cocc. ind. y así, desde Hahnemann, éste ha sido el remedio útil para las que cuidan enfermos, no para las enfermeras profesionales, pues cocc. ind. requiere la complicación de contrariedad, inquietud, y vigias prolongadas, como la de la madre o la hija que cuidan a su hijo o a su padre, en enfermedad grave y larga, o de la enfermera que participa de la inquietud de la familia.

Tal mujer, termina en abatimiento corporal y espiritual, no puede ya dormir, tiene dolores de cabeza congestivos, náuseas, vómitos, vértigos.

He aquí el desarrollo de un caso de cocc. (Kent).

POR EL TREN, EL BARCO, EL COCHE; POR EL MOVIMIENTO : "No puede soportar el movimiento; se agrava al hablar, moverse, por el movimiento de los ojos; necesita tiempo para moverse, pensar, para todo, pues sólo puede hacerlo lentamente, ya que todas sus funciones están retardadas, inactivas.

Se agrava al pasear en coche; si sube a un tren, le sobrevienen dolores de cabeza; al cabo de algunos kilómetros, náuseas, vómitos. (Kent).

Por el aire frío; durante las reglas; al comer o beber; por el café, el humo del tabaco.

Mejoría

Al sentarse.

Síntomas mentales

Su característica es DEBILIDAD IRRITABLE del estado mental.

Triste, taciturno, concentrado en sí mismo, permanece sentado en un rincón, agitando en silencio sus tristes pensamientos; su espíritu está como entumecido, y su debilidad se manifiesta por LENTITUD DE COMPRENSIÓN tal que responde lentamente a las preguntas, y no encuentra la palabra justa, pero sobre todo, no puede recordar, su memoria es débil como en anacard., y además tiene dificultad para expresarse, articular las palabras : disantesis, consecuencia de paresia muscular.

Postrado, concentrado en sí mismo, pues tiene dificultad para mantenerse derecho, tal es su debilidad total : riñones, piernas; responde en voz baja, pues está demasiado fatigado para levantar la voz.

LA IRRITABILIDAD EXTREMA DE SU ESPÍRITU se traduce por el hecho de no poder soportar el menor ruido, la menor contradicción, sacudida, movimiento, que determinan en él tanto accesos de cólera, como trastornos físicos tales como náuseas y vértigos.

Muy susceptible, una pequeñez lo ofende : como en nux. vom. EL TIEMPO PASA DEMASIADO

RÁPIDAMENTE, al contrario de arg. nit. y cann. ind. que tienen inversa característica.

Kent describe así su estado mental : "Uno puede darse fácilmente cuenta de lo que se prepara cuando la actividad mental se retarda a consecuencia de fatiga provocada por inquietudes e insomnio provocados por ejemplo por el cuidado dado sin interrupción a un paciente atacado por enfermedad larga y grave.

El espíritu parece caer en idiotez y al examinar un verdadero caso de cocc. ind., uno se pregunta si no se trata de locura que data de un año o dos, de tan vacía que parece su inteligencia.

Mira en el vacío, responde con dificultad, vuelve lentamente los ojos hacia quien lo interroga.

Esto sucede en la postración nerviosa, en la fiebre tifoidea y entonces se parece tanto a phosph. ac. que hay que tener mucho cuidado para distinguir ambos remedios.

Encuentra que el tiempo pasa demasiado rápido : a la mañana, le cuesta creer que la noche ha terminado ya; al terminar una semana parece que recién empezó, de tan embotado que está.

Tiene gran lentitud de comprensión; no puede encontrar la palabra justa para expresar su pensamiento, a causa de la lentitud con que funciona su espíritu; no puede recordar; no puede soportar el menor ruido, la menor contradicción.

Hay en él confusión espiritual y dificultad de articulación que le impiden responder : la lengua está como paralizada.

Idea que surge en su pensamiento, allí se fija, sin que pueda desalojarla, y si habla, dirá algo que muestre que esa idea lo obsesiona siempre.

Parece estar en verdadero estado de idiotez.

Desorden mental acompañado de vértigos; con casi todos los síntomas mentales hay vértigo.

Permanece acostado, aparentemente sin conocimiento, no obstante, sabe todo lo que pasa a su alrededor; a veces, hasta puede recordar y describir lo que sucedió, pero todo parece dejarlo indiferente; se da cuenta de lo que pasa a su alrededor, pero parece indiferente a todo, parece como en éxtasis sonriente en completo relajamiento muscular, mudo, como sin conocimiento.

Se diría que su espíritu está trastornado en catatonia.

Teme la muerte, tiene aprensión de que algo grave va a suceder.

Todo esto es el resultado de largos pesares, de una inquietud constante, de contrariedades repetidas, de insomnios prolongados" (Kent).

Sueño

Insomnio después de prolongados desvelos para cuidar un enfermo.

Sueño interrumpido por angustia e inquietud horribles.

Durante el sueño, pesadillas, sobresaltos, gritos.

Sueño no reparador con despertares frecuentes.

A la noche, no consigue dormirse.

El menor insomnio lo abate.

Cabeza

Confusión, sensación de "estupefacción" en la cabeza aumentada por el descanso.

Sensación de vacío, de debilidad en la cabeza.

La debilidad es tan grande que no puede mantener la cabeza derecha y la apoya en su mano, ya de un lado, ya del otro.

Dolor de cabeza occipital con tendencia a mantener la boca arriba y sensación dolorosa, como si tuviera la cabeza comprimida o como si una válvula se abriera y se cerrase.

Para el dolor de cabeza occipital, comparar gels., petrol., picr. ac., onosmod., etc.

Jaquecas con náuseas, vómitos, náuseas aumentadas por la vista o hasta por el olor de los alimentos (colchic.) agravadas al andar en coche, en barco, (mareo), en tren, al aire frío (tabac. mejora al aire frío).

Vértigo como si estuviera ebrio; vértigo al levantar la cabeza, lo que lo obliga a permanecer acostado.

Ojos

Dolores vivos en los ojos con sensación como si se los arrancaran, si se los tiraran hacia adelante, al contrario de par. quadr. en que parece como si se los tiraran hacia atrás.

Sensación de magulladura en los ojos, sobre todo de noche, con imposibilidad para abrir los párpados (rhus tox).

Pupilas contraídas.

Vista baja y trastornos de la vista.

Debilidad paralítica de los músculos externos de ojos y de la acomodación (Kent).

Oídos

Ruido en el oído, como de agua que corre, con ligera sordera.

Sensación como si los oídos estuvieran tapados de manera intermitente.

Cara

La cara se pone pálida y enfermiza.

Cara pálida como la de un muerto con dolores, vértigo y náuseas.

Neuralgia facial, dolores desgarrantes.

Calambres en los maceteros, peores al abrir la boca.

Temblor y sacudidas en los músculos de la cara.

Parálisis de los músculos de la cara.

Insensibilidad de la cara (Kent).

Aparato digestivo

BOCA, FARINGE Y ESÓFAGO :

Sequedad de boca y lengua que está recubierta de una capa blanco amarillenta, pero sin sed.

Gusto metálico en la boca, parecido al de merc.

Sensación de sequedad en la garganta; dificultad para tragar como causada por parálisis de faringe; cocc. ind. es, con caust., un buenísimo remedio en parálisis diftéricas (Kent).

Estado paralítico de esófago; no puede tragar (Kent).

ESTÓMAGO :

En general, desea bebidas frías, particularmente cerveza (kali bichr.).

AVERSIÓN POR LOS ALIMENTOS, HASTA EL OLOR LE REPUGNA (colch).

Tendencia a hipo, eructos, ya de vacío, ya de amargos, ya pútridos.

NAUSEAS : el estado nauseoso es preponderante en la patogenesia de cocc. ind.; ESTADO NAUSEOSO CON DEBILIDAD Y PROFUNDA DEPRESIÓN; NAUSEAS AL ANDAR EN COCHE, TREN, BARCO; NAUSEAS PROVOCADAS, O EN TODO CASO, SIEMPRE AGRAVADAS AL TOMAR FRÍO; NAUSEAS QUE SOBREVIENTEN A LA MAÑANA CUANDO SE LEVANTA; NAUSEAS QUE SOBREVIENTEN CUANDO QUIERE BEBER; NAUSEAS QUE PROVOCAN ASCO POR LOS ALIMENTOS; NAUSEAS PROVOCADAS POR EL SIMPLE OLOR DE LOS ALIMENTOS (colch), ACCESOS DE NAUSEAS HASTA PERDER EL CONOCIMIENTO VÓMITOS.

Sensación de vacío, debilidad, en el estómago.

Sensación como si un gusano trepara en su estómago (Kent).

VIOLENTOS DOLORS CRAMPOIDES, OPRESIÓN COMO POR UNA GARRA, CALAMBRES EN EL ESTÓMAGO a veces, después de las comidas.

Opresión ansiosa de pellizco en el estómago con dificultad para respirar.

ABDOMEN Y DEPOSICIONES :

Dolores abdominales, como si los intestinos estuviesen magullados, a cada movimiento.

Sensación en el vientre, como si estuviera hueco y vacío.

Pellizcos contractivos en la parte superior del vientre, con suspensión de la respiración.

Gran distensión de abdomen por gases; cólicos ventosos con sensación dolorosa, como si el vientre estuviera lleno de agujas o guijarros puntiagudos.

Gases numerosos que van de aquí para allá en el abdomen, y cuya expulsión no alivia pues enseguida vuelve a formar nuevos, que durante mucho tiempo van a acumularse sin salir, obligando a acostarse, ya de un lado, ya del otro; agravación de todo esto hacia medianoche.

Sensación de gran presión en región inguinal, como si una hernia quisiera salir.

Constipación con tenesmo.

Deposiciones duras y difíciles, pequeñas, pero frecuentes, acuosas, amarillentas, blancuzcas.

Diarrea después de bebidas frías, o de andar en coche, en tren.

Órganos genitales

DEBILIDAD EXTREMA DURANTE LAS REGLAS; jaqueca con náuseas, vértigos, durante las reglas.

Todos los síntomas se agravan habitualmente durante el período menstrual.

Reglas adelantadas, abundantes y prolongadas; a menudo aparecen cada dos semanas y van acompañadas de distensión abdominal y dolores abdominales punzantes y constrictivos; agravados por todo movimiento, a cada movimiento respiratorio.

Dolores acompañados de sensación de constricción en el recto.

Hemorroides durante las reglas.

Dismenorrea con gran sensación de tensión en el abdomen; cólicos y dolores crampoides acompañados de gran debilidad; el remedio se parece, por esto último, a carb. an., pero mientras cocc. ind. esta debilidad se relaciona con la postración general del remedio, en carb. an., todo esto está generalmente ligado a lesión local de útero, un cáncer, por ej.

La debilidad de cocc. ind. no es como en china, consecuencia de pérdida de sangre demasiado grande.

En cocc. ind., las reglas pueden variar en cantidad; pueden también ser disminuidas hasta el punto de ser reemplazadas por leucorrea más o menos abundante.

Leucorrea abundante entre las reglas.

Aparato respiratorio

Sensación de vacío en el pecho; se siente tan débil que apenas puede hablar (arg. nit., stannum).

Disnea causada por una especie de espasmo de tráquea.

Aparato circulatorio

Corazón débil, así como las pulsaciones.

Latidos de corazón, especie de palpitaciones.

Espalda y extremidades

DEBILIDAD DE LOS MÚSCULOS CERVICALES CON SENSACIÓN DE PESADEZ DE LA CABEZA; los músculos cervicales parecen incapaces de sostener la cabeza (calc. phosph., ver. alb.).

Crujidos dolorosos en las vértebras cervicales a cada movimiento de cabeza.

DEBILIDAD PARALÍTICA GENERAL con debilidad en la espalda.

"La extrema debilidad de cocc. ind. se traduce por intensa lasitud de todo el cuerpo : mantenerse derecho es un verdadero ejercicio; no puede sostener su cabeza a causa de la debilidad de los músculos cervicales; presenta un verdadero estado parético de músculos dorso-lumbares y extremidades.

DOLOR PARALÍTICO EN LAS REGIONES LUMBO-SACRAS CON tirones ESPASMÓDICOS EN LOS MUSCLOS, QUE IMPIDEN el caminar; de ahí verdadera inmovilidad.

HOMBROS Y BRAZOS DOLOROSOS, como si se los hubieran golpeado.

LAS RODILLAS, QUE CRUJEN A CADA MOVIMIENTO, NO PUEDEN SER

DOBLADAS VOLUNTARIAMENTE y el movimiento voluntario reaparece únicamente después de algunos ejercicios de flexión provocados por la enfermera o el médico, o por el mismo enfermo.

LAS RODILLAS PARECEN FLAQUEAR cuando camina, y el sujeto oscila, tambalea, y amenaza con caer hacia un lado o el otro.

Parálisis de extremidades precedida de movimientos convulsivos de grupos musculares.

Parálisis de un lado.

Debilidad parálítica acompañada de ENTUMECIMIENTOS Y TEMBLOR : PIES Y MANOS

ALTERNATIVAMENTE ENTUMECIDOS; entumecimiento de antebrazo con sensación como si la mano estuviera hinchada (rhus tox); entumecimiento de pies al permanecer sentado (sec. corn).

Temblores peor a la noche.

TEMBLORES DE MANOS MIENTRAS COME; temblores de muslos al arrodillarse; temblores peores por excitación mental, o ejercicio muscular.

Relaciones

Antídotos

Coffea; nux vom.

COCCUS CACTI

Coccus cacti, o cochinilla de México, es un insecto hemíptero que vive en las hojas de ciertos cactus de México.

Hay varias especies : cochinilla gris o jaspeada, negra o Zaccatilla, y roja.

Para nuestro uso se emplea la gris.

Una vez que han alcanzado el desarrollo deseado, se las sumerge un instante en agua hirviendo y se las hace secar al sol o al horno.

Preparamos las diferentes dinamizaciones partiendo de una tintura madre obtenida haciendo macerar en alcohol a 90º las cochinillas enteras, previamente lavadas en agua tibia, secadas y pulverizadas.

Acción general y características

Coccus cacti es un pequeño remedio en el sentido de que no ha sido experimentado muy a fondo, y, por esto sus indicaciones son bastante restringidas.

Tiene marcada acción sobre las MUCOSAS, particularmente LAS DEL ÁRBOL RESPIRATORIO, donde desarrolla un estado catarral con abundantes mucosidades fibrosas, parecidas a gelatina, como las de kali bichr.; grandes cantidades de estas mucosidades se forman en nariz, garganta, vías respiratorias, en general, y también, vagina.

También tiene notable acción sobre los riñones, en los que determina trastornos parecidos a los de la nefritis parenquimatosa aguda.

Aunque ha curado algunos trastornos crónicos profundos, se emplea principalmente en las AFECCIONES AGUDAS (Kent).

Modalidades

Agravación

POR EL FRÍO : "el enfermo está frío y sus malestares aparecen con el tiempo frío; persisten sobre todo en invierno y duran hasta que vuelve el calor; sensible al frío, toma frío fácilmente" (Kent).

POR EL CALOR : "hay que distinguir entre el enfermo y sus síntomas; si se enferma por haberse expuesto al frío, sus síntomas, al contrario, van siempre menos bien en habitación caliente, cuando tiene demasiado calor en la cama, al beber caliente; mejora al contrario, bebiendo frío; estando en habitación fría; se agrava después de un esfuerzo, porque se acalora; el malestar, una vez comenzado, se contradice en su modalidad" (Kent).

POR EL TACTO, POR SIMPLE PRESIÓN DE LAS ROPAS : "hay hiperestesiageneral de piel y mucosas, es sensible hasta a la presión de las ropas" (Kent).

DESPUÉS DEL SUEÑO; DEL *LADO* IZQUIERDO.

Mejoría

AL CAMINAR; POR EL CALOR : el enfermo mismo; POR EL FRÍO : los síntomas del enfermo.

Síntomas mentales

Los síntomas mentales son principalmente DEPRESIÓN E INQUIETUD; gran tristeza; una nube lo oscurece todo; aprensión; gran tristeza con deseos de suicidarse; especialmente después de dormir : entre las 3 y las 4 de la mañana. Este estado puede alternar con locuacidad y animación, como la ch.

Cabeza

Despierta a la mañana con dolor de cabeza occipital, o cefalea frontal; se agrava por el trabajo mental, acostándose de espaldas, al toser, hacer un esfuerzo, a veces mejora por un movimiento lento.

Aparato digestivo

BOCA Y FARINGE :

El cepillarse los dientes le provoca tos (Boericke).

Odontalgia; dolores tirones, súbitos, en los dientes, peor por el frío y el calor.

Inflamación de garganta con enrojecimiento.

Sensación de ardor en la garganta, aumentada por el calor, sobre todo cuando tiene mucho calor en la cama, por bebidas tibias, un poco calientes (las bebidas muy calientes no le son tan perjudiciales); mejorada por bebidas frías.

Sensibilidad rino-faríngea; el menor contacto en paladar y encías, al examinarla la garganta, provoca esfuerzos para vomitar, aunque la garganta esté normal; al tragar, el paso de los alimentos por estas regiones le provoca esfuerzo para vomitar y a veces expulsa los alimentos de inmediato (Kent).

Aparato urinario

Necesidad urgente de orinar.

Dolores punzantes que van desde los riñones hasta la vejiga e irradian a lo largo de las piernas, aumentados por el movimiento.

Necesidad de orinar, pero incapacidad de emitir la orina antes de expulsar un pequeño coágulo de sangre.

Abundante depósito de uratos de color rojo ladrillo en la orina; cálculos renales.

Albuminuria.

Hematuria.

Orina fácil; disuria.

Órganos genitales

Inflamación de vulva con dolor de magulladura en los labios que están tan sensibles que no puede soportar ni el contacto de la ropa.

Inflamación de útero y vagina, con abundantes mucosidades espesas, blancas, fibrosas, parecidas a gelatina.
Reglas abundantes, demasiado frecuentes, demasiado largas, espesas con coágulos; grandes coágulos negros y consistentes llenan la cavidad uterina, son expulsados con dolores parecidos a los de parto (sabina), luego vuelven a formarse.

Hemorragia uterina con grandes coágulos abundantes, que llenan la vagina de tal manera que la mujer no puede orinar antes de haberlos expulsado (Kent).

Reglas intermitentes; SOLO CORREN AL ATARDECER Y A LA NOCHE (Boericke).

Aparato respiratorio

NARIZ :

Coriza con inflamación de la mucosa de las fosas nasales posteriores, donde se acumula mucus espeso, viscoso, muy difícil de expulsar.

Espesas mucosidades amarillas por la nariz, con tendencia a estornudar.

Gran sequedad de la nariz.

Las vías respiratorias arden después de la expulsión de mucosidades (Kent).

LARINGE, BRONQUIOS Y PULMONES :

Constante gorgajeo en la garganta por hinchazón de la úvula.

Cosquilleo laríngeo.

Tos sofocante, peor al despertar, con mucus espeso, blanco, tenaz, que atormenta.

Ataques de tos espasmódica, coqueluchoide, que comienza por vómito de moco espeso.

"Tos espasmódica que comienza con el frío y continúa durante todo el invierno con formación abundante de mucosidades en el pecho; esta tos espasmódica obliga al enfermo a hacer esfuerzos violentos para expulsarlas; el rostro se pone púrpura; finalmente vomita y devuelve largos filamentos de mucosidades fibrosas que llenan garganta y boca y ahogan.

Con los síntomas pectorales hay mucha disnea; no puede caminar sin tener dificultad para respirar; igualmente si hace una ascensión.

Después de haberse librado de gran cantidad de mucosidades, la tos cesa y tiene algunas horas de sosiego y luego sobreviene un nuevo ataque de tos terrible.

Estos ataques tienen tendencia a empeorar de noche, cuando se calienta su cama; si puede permanecer en habitación fresca, sin abrigarse demasiado, pasará más tiempo sin toser".

"La coqueluche de cocc. cac. tiene un carácter similar; el niño está en su cama y se ha quitado las frazadas, quiere que su habitación esté fresca y su madre dice que si ella puede llegar a tiempo para hacerle beber un poco de agua fresca, consigue hacer abortar el ataque.

Durante el ataque, el pecho se llena de mucosidades hasta que no puede respirar, y tiene que expulsarlas, cueste lo que cueste; no obstante, el niño resistirá y aguantará la respiración para impedir la tos.

La tos es peor después de comer, peor al despertarse, peor en habitación caliente". (Kent).

"Cepillarse los dientes le provoca tos". (Boericke).

"Al caminar contra el viento, pierde el aliento (nux mosch.). (Boericke).

COFFEA

Coffea cruda, o coffea arábica, o café crudo, o simplemente café, es el conocido fruto de un árbol de la familia de las rubiáceas, originario de Etiopía y Arabia, de donde fue llevado a las islas Borbón y Martinica; permanece siempre verde y alcanza una altura de 6 a 8 metros.

Tiene una baya oblonga, del tamaño de una cereza, rojo como ella y más oscuro cuando madura.

Tiene una pulpa dulce que rodea dos celdillas unidas; cada una contiene una semilla convexa del lado externo; estas semillas se conocen bajo el nombre de coffea cruda; encierran un principio activo, la cafeína, frecuentemente empleada en la terapéutica ordinaria.

Las diferentes dinamizaciones se preparan partiendo de una tintura madre obtenida de los granos sin torrar de coffea arábica.

Acción general del medicamento

Coffea cruda determina esencialmente ERETISMO NERVIOSO, EXCITACIÓN DE TODAS LAS FUNCIONES ORGÁNICAS, HIPERESTESIA DE TODOS LOS SENTIDOS, que le son muy característicos : la potencia visual se hace más sensible, el oído más sutil, el gusto más agudo, lo que aumenta la sensibilidad al dolor; los músculos son más móviles, tienen mayor tonicidad; los deseos sexuales más despiertos; hay exageración de actividad nerviosa de órganos digestivos y secretores, que produce sensación enfermiza de apetito excesivo, aumento de deseo de evacuaciones albinas y urinarias que son más fáciles.

El insomnio de diversos matices de intensidad que ocasiona el café permite juzgar hasta qué punto aumenta la actividad nerviosa y animal del organismo; lo mismo demuestra la excitación patológica particular del espíritu y el calor febril, a menudo considerable, que sigue a su ingestión. (Hughes).

"Una vez pasado este período de su acción, se constata que el cuerpo está dolorido, postrado, obnubilado, impotente.

El grado intermedio entre estos dos períodos lo marca la intervención del sistema circulatorio que se manifiesta por sensaciones de congestión, palpitaciones, etc., o del sistema gastrointestinal, que se manifiesta por trastornos digestivos, flatulencia y gases, etc.

Su acción no llega a producir lesiones orgánicas por su potencia dinámica; pero es evidente que la influencia de su acción largamente prolongada, ataca las funciones nutritivas y las propiedades vegetativas, provocando finalmente cierto desequilibrio en el buen funcionamiento de los órganos". (Dr. Espanet).

Características

1) CONSTITUCIÓN Y TEMPERAMENTO : Coffea desarrolla preferentemente sus síntomas en INDIVIDUOS COLÉRICOS Y SANGUÍNEOS, DE COMPLEXIÓN MORENA, ESPIGADOS, Y HASTA FLACOS Y ENCORVADOS. (Allen).

"Está relacionada con constituciones nerviosas y personas sensibles, impresionables, de carácter muy variable, caprichoso; en estas personas es apto, de preferencia a ignat. para curar afecciones dolorosas y espasmódicas, y también un potente medio para devolver al cerebro su actividad repentinamente deprimida por un acceso de alegría o emoción de placer demasiado viva". (Dr. Espanet).

2) EXALTACIÓN DE LA SENSIBILIDAD GENERAL : Bajo su influencia TODOS LOS SENTIDOS SE AGUDIZAN, SE HACEN MAS SUTILES; hay ACTIVIDAD DESACOSTUMBRADA DE CUERPO Y ESPÍRITU; está lleno de pensamientos, pronto para la acción, demasiado imaginativo; planea sin cesar proyectos y más proyectos para el porvenir y por esta causa no duerme.

Además rivaliza con aconit. y chamom. como REMEDIO DEL DOLOR AL QUE ES HIPERSENSIBLE. DOLORES INSOPORTABLES QUE LLEVAN A LA DESESPERACIÓN; EXASPERACIÓN, LAGRIMAS, AGITACIÓN, CON GRAN ANGUSTIA.

Si nos vemos ante un gran bebedor de café y éste presenta semejante estado, habrá que darle coffea que hará en él maravillas.

La principal localización de estos dolores es la cabeza, son especialmente unilaterales y van acompañados de sensación como si un clavo estuviera clavado en ella.

Prosopalgia debida especialmente a dientes malos; su dolor de muelas tiene la particularidad de ser únicamente soportable si se conserva en la boca agua fría manteniéndola sobre el diente doloroso; al contrario, la odontalgia de cham., provocada por la presencia de algo caliente en la boca, no se calma con bebidas frías.

Dismenorrea con cólicos excesivamente dolorosos, si hay anchos coágulos negros, a los que coffea no alivia, habrá que continuar con cham.

En pocas palabras, habrá que pensar en coffea frente a todos los dolores que parecen intolerables y desproporcionados con los signos orgánicos que los acompañan, y cuando no se encuentra, con ellos, síntomas característicos.

3) VARIABILIDAD DEL HUMOR : Llorar, reír, vuelve a llorar.

Este humor extremadamente variable, aproxima al remedio a assa foet., bell., hyosc., ignat., cimicif., platina, moschus, valer., etc.

4) SHOCK MENTAL : Es apropiado en el shock mental, consecuencia de sorpresas repentinas, sobre todo alegres.

Modalidades

Agravación

Por el frío (excepto el dolor de muelas que mejora con el frío) al aire libre; de noche; por emociones excesivas (sorpresas alegres).

Mejoría

Por el calor (excepto el dolor de muelas); estando acostado.

Síntomas mentales

Facultades *intelectuales* avivadas; comprensión más fácil.

Sensación de bienestar, vivacidad y alegría.

Excitación, irritabilidad, humor extremadamente variable.

Actúa con prontitud.

Está agitado, angustiado (acon.).

Las ideas acuden en tropel.

Sueño

El estado de sobreexcitación de coffea trae un INSOMNIO TAN MARCADO COMO CARACTERÍSTICO : el sujeto está calmo, aunque sin sueño, y todos sus sentidos están hiperagudizados; oye con gran claridad los ruidos más leves y más lejanos; su cerebro, lleno de multitud de ideas, trabaja en proyectos imaginarios; lo mismo si tiene el más leve trastorno de piel, la hiperestesia cutánea lo mantiene despierto; en las enfermedades eruptivas, por ej., la erupción pica o arde excesivamente y el enfermo se rasca hasta sangrar, lo que aleja despiadadamente toda posibilidad de sueño.

No tiene sueño y se mueve sin cesar; o duerme hasta las 3 de la mañana y después sólo consigue dormir.

Despierta sobresaltado; duerme turbado por sueños, pesadillas.

Insomnio después de actividad mental exagerada; cúmulo de ideas acompañadas de excitación nerviosa.

Cabeza

Congestión de cabeza con agitación espiritual.

Cefalalgia hemicraneana con sensación como de clavo clavado en el parietal; dolores violentos agravados por ruido, olores fuertes, narcóticos.

"Las neuralgias de coffea sobrevienen en ataques, accesos; son extraordinariamente agudas; si bien chamom. y spig. pueden comparársele, la indicación de coffea exige más nerviosidad, y sujetos más sensibles y más impacientes en el dolor, no solamente por temperamento, sino también por las disposiciones del espíritu : en general, el trabajo intelectual y una emoción viva agravan el dolor; el reposo, lo exaspera también o lo hace reaparecer; y esto se aplica particularmente a la jaqueca esencialmente nerviosa y que aparece a menudo al despertar, con la primera excitación exterior o emoción experimentada.

El clavo histérico también cede a coffea, cuando esta sensación dolorosa va acompañada de zumbidos de oídos, palpitaciones, hinchazón hipogástrica, gran tendencia a placeres venéreos e inconstancia en los gustos y el humor. (Dr. Espanet.).

Aparato digestivo

Odontalgia con dolores punzantes, intermitentes, intolerables, aliviados conservando agua helada en la boca, y que vuelven cuando esta agua se ha calentado (bismut., bryon., puls., caust., sepia, nat. sulf.) (Allen).

Bebe y come con prisa (Bell., hep. sulf., calc.); hambre excesivo.

Flatulencia; hinchazón hipogástrica; no puede tolerar ropas ajustadas.

Órganos genitales

Demasiada sobreexcitación durante las reglas, que son abundantes, reclama coffea, si no cham. o nux vom.

El útero, sede de potentes excitaciones nerviosas, parece muy sensible a la acción del remedio que disminuye y regula el flujo catamenial en mujeres hipersensibles.

También calma los dolores de parto demasiado violentos y la excesiva sobreexcitación nerviosa que lo acompañan o siguen.

Aparato circulatorio

AUMENTA LA ACCIÓN DEL CORAZÓN Y FRECUENCIA DE PULSO; pero este aumento de latidos cardíacos en frecuencia no va ACOMPAÑADO POR AUMENTO DE SU FUERZA; a la acción primitiva de excitación de la droga, sucede una acción secundaria de depresión y el músculo cardíaco se va debilitando, de tal manera que si se toma el medicamento el tiempo suficiente para llegar a ello, o si se absorbe café en exceso, el corazón muestra TENDENCIA A DILATACIÓN.

PALPITACIONES VIOLENTAS; latidos irregulares, especialmente después de una alegría excesiva o sorpresa feliz.

Espalda y extremidades

Neuralgia crural con dolores intolerables agravados por el movimiento, después de la cena y a la noche; mejorados por la presión.

Relaciones

Complementario

Aconit.

Antídotos

Coffea es el antídoto de bell. y opium en sus efectos sobre el encéfalo; de cham. en sus efectos sobre órganos génito-urinaros y médula espinal.

Es su propio antídoto en dosis muy atenuadas cuando su uso inmoderado ha producido efectos fatigosos, vértigos, gran impresionabilidad, insomnio.

Tabac. y caust. son sus antídotos más universales.

Incompatibles

Camphora, cocculus.

COLCHICUM AUTUMNALE

Colchicum autumnale o colchico, es una planta de la familia de las Liliáceas, muy común en praderas húmedas, a las que esmalta en otoño, con sus bellas flores violetas.

Preparamos la tintura madre por maceración de bulbos frescos, recogidos justo antes de la floración, en alcohol a 90º; de ella obtenemos por diluciones hahnemannianas sucesivas, las distintas dinamizaciones.

Acción general del medicamento

Actúa sobre el SISTEMA NERVIOSO produciendo profunda POSTRACIÓN, agotamiento, que repercute en el espíritu y el cuerpo.

"Posee acción electiva sobre LOS PLEXOS NERVIOSOS GANGLIONARES y principalmente el plexo solar, y lo mismo sobre los NERVIOS DE LA VIDA DE RELACIÓN que son la sede de numerosos dolores sobre todo en las partes fibrosas y serosas del organismo". (Dr. Espanet).

También afecta de manera marcada el TEJIDO MUSCULAR, PERIOSTEIO Y SINOVIALES ARTICULARES; parece ser más útil en afecciones crónicas que en agudas que interesan a estos tejidos.

En su influencia se encuentra LA MUCOSA DEL TUBO DIGESTIVO, en la que determinasíntomas interesantes. Su indicación en la DIATESIS URICA, como medicamento curativo de lagota, es clásica, y mucho se ha discutido para saber si aumenta o disminuye la cantidad de ácido úrico de la orina." "La ignorancia ha hecho que se confunda su acción terapéutica con la patogenética : del análisis de los hechos parece resultar que, administrado a gotosos aumenta en ellos la cantidad de ácido úrico eliminada - lo que es su efecto curativo - mientras que si se administra a individuos sanos, parece disminuir la producción de este producto de eliminación, lo que es su efecto patogenético". (Dr. Jousset).

Características

1) CONSTITUCIÓN Y TEMPERAMENTO : "Colchicum se adapta mejor a individuos nerviosos y delicados, a aquéllos cuya nutrición general sufre, a reumáticos cuyos dolores agudos se sitúan en articulaciones, cavidades serosas, particularmente en la región del peritoneo y pericardio". (Dr. Espanet).

2) GRAN POSTRACIÓN MUSCULAR; AGOTAMIENTO GENERAL DEL ESPÍRITU Y DEL CUERPO; todo movimiento, hasta el esfuerzo de pensar lo agrava (Dewey).

Los trastornos provocados por este remedio van acompañados de gran postración, agotamiento nervioso (Kent).

3) Un rasgo notable de este remedio es la TENDENCIA DE SUS DOLORES APASAR DE UNA ARTICULACIÓN A OTRA, de un lado a otro, de abajo a arriba y de arriba a abajo; estado reumático con o sin hinchazón articular, primero aquí, luego allá, pasando de una articulación a otra (Kent).

Esta tendencia errática hace parecer al remedio a : bryon, kalmia, kali sulf., lac. can., puls., sulfur, etc.

4) Otro rasgo característico y marcado es TENDENCIA A HIDROPESÍA : Derrame en cavidades serosas; edemas en extremidades; etc. (Kent).

Modalidades

Lateralidad

Una característica frecuente de los dolores de colch. es que ocupan UN SOLO LADO DEL CUERPO. (Dr. Espanet).

Agravación

EN OTOÑO; POR EL FRÍO; POR TIEMPO FRÍO Y HÚMEDO : enfermo friolento, sensible al frío; se agrava al tomar frío, por tiempo frío y húmedo. (Kent).

POR EL MOVIMIENTO : todos los síntomas se agravan por el movimiento; la agravación es tal que teme moverse; aversión y agravación por el movimiento, casi tan marcada como en bryon.

POR EL EJERCICIO MENTAL; POR TRASNOCHAR (cocc. ind.); POR TODA IMPRESIÓN EXTERIOR : La menor impresión exterior lo pone fuera de sí, y los sufrimientos le parecen insoportables (Jahr).

DE LA PUESTA A LA SALIDA DEL SOL; exacerbación de dolores desde el atardecer hasta la aurora (Jahr).

Mejoría

POR EL CALOR : los dolores mejoran por el calor, abrigándose, teniendo calor.

POR EL REPOSO : si el enfermo está perfectamente tranquilo, se siente mejor. (bryon.).

Síntomas mentales

GRAN POSTRACIÓN : abatimiento, mal humor; debilidad de memoria, olvido y distracciones.

Mal efecto de los insomnios y del surmenage por trabajo mental (Boericke), fatiga nerviosa y agotamiento causado por trabajo nocturno (Jahr); especialmente indicado en la debilidad después de falta de sueño, por ej., cuando una noche uno se acuesta más tarde que de costumbre y no duerme la cantidad de horas habitual (cocc. ind.) (Farrington).

Como nux vom., es SENSIBLE A TODAS LAS IMPRESIONES EXTERIORES : ruido, luz, olores, sobre todo, etc., que lo agravan; también las contrariedades; HIPERSENSIBILIDAD AL DOLOR como cham.

Sueño

Deseos de dormir de día con incapacidad para trabajar.

Insomnio de noche por sobreexcitabilidad nerviosa; despierta frecuentemente con angustia; calor nocturno con gran sed. (Jahr).

Cabeza

Hormigueo de la piel en frente y cuero cabelludo.

Dolor de cabeza, sobre todo frontal y temporal, pero también occipital y en la nuca, peor después de cenar y a la noche.

Presión dolorosa en el occipucio, sobre todo durante el trabajo intelectual.

Dolores de cabeza crampoides sobre todo sobre los ojos.

Ojos

Dolores en la profundidad del globo ocular.

Hinchazón y sensación de tracción en párpados inferiores.

Supuración de glándulas de Meibomius; iritis; inflamación de esclerótica (Jousset).

Ulceración de párpados, orzuelos; mucho lagrimeo al aire libre; las lágrimas son agrias, irritantes y provocan enrojecimiento en bordes de párpados.

Los síntomas del ojo son a menudo parecidos al reumatismo; no es raro encontrar iritis relacionada con un ataque de reumatismo, y este es uno de los grandes rasgos de colch (Kent).

Cara

Aspecto enfermizo, triste, desdichado, dolorido.

Hinchazón edematosa de cara.

Hormigueo en la piel de la cara como después de congelamiento.

Dolor crampoide en articulación temporomaxilar.

Dolores desgarrantes en una mitad de la cara, hasta la oreja y la cabeza.

Aparato digestivo

BOCA :

Crujir de dientes, dientes sensibles al apretar las mandíbulas.

Dolores en los dientes, que están sensibles; las encías se retraen hasta que los dientes se aflojan.

Estado reumático de dientes, encías y muelas (Kent).

ESTOMAGO :

LA VISTA Y ESPECIALMENTE EL OLOR DE LOS ALIMENTOS LE PROVOCAN VIOLENTAS NAUSEAS.

El olor a pescado, carne, huevos, alimentos gordos, le provoca náuseas, a veces tan violentas que puede llegar a desvanecerse.

Puede tener mucha sed, o, al *c o* tener sed; estos estados pueden alternar.

Violento ardor o frío de hielo en el estómago.

LAS NAUSEAS Y VÓMITOS SON RASGOS NOTABLES del remedio.

Náuseas y vómitos abundantes de mucosidades y bilis.

Esfuerzos violentos para vomitar seguidos de abundante vómito de alimentos; después, de bilis.

ABDOMEN Y DEPOSICIONES :

GASES ABUNDANTES E HINCHAZÓN METEÓRICA DE ABDOMEN.

Cuando en la dispepsia, hay en el estómago violento ardor o sensación de frío de hielo, con muchos gases en estómago abdomen o ambos a la vez colch. es excelente y deberá preferirse a veces a carb. veg., china o lycop., (Nash).

Colédoco y colon muy distendidos; sensación de plenitud y perpetuos gorgoteos (Boericke).

Para Dewey, colch. está entre ars. alb. y cinch. : tiene la debilidad del primero y el timpanismo del segundo; esto es particularmente cierto en estados tifoideos.

Sensación de magulladura en el abdomen.

Dolores espasmódicos, cólicos, dolores desgarrantes, ardientes, que obligan a doblarse en dos; agravados por el movimiento.

Gran magulladura y sensibilidad dolorosa en el abdomen con los cólicos; agravación al comer, al doblarse en dos (colocynth.) (Kent).

Diarrea con deposiciones formadas por mucosidades coaguladas parecidas a gelatina, con dolores violentos y cólicos.

Diarrea con deposiciones mucosas, sanguinolentas, mezcladas con falsas membranas, acompañadas de violento ardor en el ano.

Diarrea con deposiciones formadas por flujo líquido, pero que luego se enfría, forma una especie de gelatina.

Disentería otoñal con emisión de mucosidades blancas y violento tenesmo.

"La disentería otoñal, o la diarrea reumática, ceden más bien a colch. que a dulcam. o ipeca; este último afecta más bien a estómago y mucosas; dulcam., a las mucosas del intestino.

Corresponde maravillosamente a la disentería rectal o anal en la que los cólicos son poco vivos, pero que tiene sensación de presión anal, tenesmo, con evacuaciones muy débiles.

Merc. corr. sólo combate la disentería con afecciones del tubo intestinal y dolor anal" (Espanet).

Diarrea con caída del recto.

Hormigueo, prurito, ardor en el ano.

Aparato urinario

EMISIÓN POCO ABUNDANTE DE ORINA OSCURA CON TENESMO Y SENSACIÓN ARDIENTE.

Sensación ardiente y presión en vías urinarias y vejiga.

Depósito blancuzco en la orina (lycop). (Jahr).

Orina escasa, oscura, o suprimida; pasa gota a gota y deja sedimento blanco.

Orina sanguinolenta oscura, hasta negra como tinta; puede contener azúcar, albúmina, sangre. (Allen).

Aparato respiratorio

NARIZ :

Olfato hipersensible; **EXTREMADAMENTE SENSIBLE A LOS OLORES**; siente olores que otros no huelen; siente olores que le dan náuseas; los olores fuertes lo ponen fuera de sí.

No puede tolerar el olor de la cocina.

Esta agravación por los olores es tan fuerte que parece poseerlo.

Odia los olores, odia el olor a los alimentos, y la idea de comer : simplemente, si hablan de alimentos delante de él le dan náuseas.

BRONQUIOS, PULMONES Y PLEURA :

Tos frecuente, corta y seca.

Disnea; respiración dificultosa y opresión.

Puntadas en el pecho a veces al respirar.

Desgarramientos en el pecho con punzadas.

Dolores de excoriación en el pecho, al tacto y durante el movimiento (bryon).

Aparato circulatorio

Violentos latidos del corazón.

Los latidos pueden oírse estando al lado del lecho del enfermo.

Palpitaciones; disnea cardíaca.

Los ruidos del corazón son sofocados, indistintos, muy débiles; pericarditis.

Metástasis de la gota cardíaca con dolores punzantes en la región cardíaca y disnea (kalmia) (Farrington).

Espalda y extremidades

DEBILIDAD PARALÍTICA de músculos.

DEBILITAMIENTO GENERAL Y SENSIBILIDAD DOLOROSA de todo el cuerpo de manera que no puede moverse sin gemir (Jahr).

Dolores de excoriación en los riñones cuando se mueve; dolores musculares reumáticos; tortícolis; lumbago.

Dolores de forma reumatoidea en pequeñas o grandes articulaciones con hinchazón; sensación de ardor y sobre todo de desgarramiento; agravación por el tacto; **LAS ARTICULACIONES ENFERMAS ESTÁN MUY SENSIBLES AL TACTO Y AL MOVIMIENTO**, grita si le tocan la articulación dolorosa, o si se golpea el dedo grande del pie enfermo (Allen).

Dolores desgarrantes en extremidades, dedos y dedos grandes del pie, en los que tiene hormigueo como si se le hubieran helado.

Hinchazón caliente de articulaciones con dolores agudos durante el movimiento.

INFLAMACIÓN DEL DEDO GRANDE DEL PIE; GOTA DEL PIE; NO SOPORTA QUE LO TOQUEN NIPUEDE HACER EL MENOR MOVIMIENTO.

"Hinchazón articular rojo oscuro o pálido, extremadamente sensible al tacto y con **MARCADA TENDENCIA A VIAJAR DE UNA ARTICULACIÓN A OTRA.**

En el reumatismo propiamente dicho, colch. está indicado cuando comienza en una articulación y de ella pasa a otra o a otro lado del cuerpo; los dolores empeoran a la noche; la articulación está extremadamente sensible al tacto o al menor movimiento; la orina es roja oscura; el sujeto está extremadamente irritable, cualquier pequeñísima impresión exterior, como luz, ruido, un olor fuerte, lo afecta, y su dolor le parece insoportable.

En la gota, además de todo esto, el dedo gordo del pie está afectado y el paroxismo de los dolores sobreviene a la noche. (Farrington).

Piel

Hormigueos en diferentes regiones, como después de un congelamiento.

Transpiración ácida.

"El sujeto de colch. transpira continuamente, y a veces este sudor es frío; muy sensible al frío, una simple corriente de aire puede agotarlo y entonces sobrevienen de inmediato dolores reumáticos y gran disminución de orina y por consiguiente, disminución de productos de excreción, particularmente ácido úrico y uratos" (Kent).

Fiebre

Fiebre con fatiga dolorosa de las articulaciones de manos y pies, dolores, en hombros, caderas y riñones.

Colch. está indicado en estados tifoideos por el conjunto clínico siguiente : "Primero encontramos que el intelecto está oscureciendo; aunque el espíritu esté obnubilado, responde correctamente a las preguntas, mostrando que no está en estado de estupor completo; a menos que se lo interroge directamente sobre este tema, nada dice sobre su estado que no le parece peligroso no tiene el temor, el miedo a la muerte, que caracteriza a ciertos otros medicamentos indicados en la fiebre tifoidea.

Las pupilas están muy dilatadas y son muy imperfectamente sensibles a la luz.

Sudor frío a la frente ver. alb.).

Cuando trata de levantar la cabeza de la almohada, aquélla vuelve a caer hacia atrás, con la boca muy abierta; esto demuestra cuán debilitados están los músculos.

La cara tiene apariencia cadavérica; rasgos muy tirantes, nariz puntiaguda; lengua pesada, con dificultad para sacarla; en casos extremos está azulada, particularmente en la base; pérdida absoluta de facilidad de palabra y aliento frío.

A menudo, náuseas y vómitos, que pueden ir acompañados de eructos considerables.

Estos síntomas van asociados a agitación y calambres en las piernas.

El tronco, y particularmente el abdomen, están calientes y las extremidades frías.

Timpanismo abdominal, muy marcado.

Evacuaciones acuosas e involuntarias.

Estos síntomas se parecen mucho a los de ars. alb. por la intensidad de ladebilidad, y a cinch. por el timpanismo marcado del abdomen; colch. parece estar situado entre ambos, combinando la agitación y la debilidad de ars. con el timpanismo de cinch.

Los síntomas de colch. son principalmente abdominales; algunos podrían sugerir ver. alb. y este deberá colocarse al lado de colch., a fin de distinguirlos.

Carb. veg. también se parece a colch., por el enfriamiento del aliento, altimpanismo y la gran postración.

Pero carb. veg. parece especialmente indicado cuando hay verdadero abandono de fuerzas vitales; el sujeto está frío y casi sin pulso; de las rodillas a los pies, las piernas están frías, o las rodillas y los pies están helados, y las partes intermedias no; carb. veg. no tiene deposiciones acuosas, ya que las evacuaciones están ausentes, o si existen, son marrón oscuro y extremadamente fétidas" (Farrington).

Relaciones

Antídotos

Camph., coc. ind., nux vom., puls.

Después del abuso de colch., spig. es el remedio a emplear como antídoto. (Farrington).

COLOCYNTHIS; Error! Marcador no definido.

Colocynthis cucumis es una Cucurbitácea originaria del Japón, pero también se encuentra en Asia Menor y en las islas del Archipiélago y se ha aclimatado en Europa.

Preparamos nuestro medicamento con los frutos que tienen la forma de una pequeña calabaza, generalmente grande como una pera mediana; cuando están bien secos, los pulverizamos con las semillas y los tratamos enseguida como a todas las sustancias secas pulverizadas : sea por trituración, sea por alcohol.

Acción general del medicamento

Se reconocen a colocynthis relaciones fisiológicas y terapéuticas muy especiales con LOS PLEXOS LUMBO ABDOMINALES Y SACRO, CON LOS NERVIOS TRIGÉMINOS Y CIÁTICOS, en los que desarrolla dolores neurálgicos tan intensos como característicos en sus modalidades; existen siempre con gran excitación nerviosa y trastornos funcionales que son la consecuencia.

Después de ciertas experimentaciones se puede decir que el remedio parece actuar directamente sobre OVARIOS Y EPIDIDIMO.

En fin, se ha encontrado en un caso de envenenamiento por colocynt., peritonitis organizada alrededor de intestino y órganos genitales en la pelvis.

Características

1) CONSTITUCIÓN Y TIPO : Los sujetos reumáticos y gotosos, los que son simplemente nerviosos, de constitución seca, piel seca, amarillenta, escamosa, sede de prurito penoso, muy marcado a la noche; y en cama, tienen, con preferencia síntomas análogos a los de colocynth. y justifican su empleo. (Dr. Espanet).
2) DOLORS EXTREMADAMENTE VIOLENTOS QUE ARRANCAN QUEJAS Y GRITOS ALENFERMO, ACOMPAÑADOS POR AGITACIÓN EXTREMA, DESGARRANTES, CON CALAMBRES, GENERALMENTE DISCONTINUOS PERO MUY SEGUIDOS; EN CUALQUIER PARTE DEL CUERPO Y A VECES CON SENSACIÓN COMO SI LA REGIÓN DOLOROSA TUVIERA UNA LIGADURA DE ALAMBRE : APARECEN GENERALMENTE DESPUÉS DE CÓLERA, VEJAMEN, INDIGNACIÓN; SIEMPRE AGRAVADOS POR LA EXTENSIÓN Y CALMADOS POR LA FLEXIÓN; GENERALMENTE ALIVIADOS POR PRESIÓN DURA Y FUERTE Y POR CALOR.

A pesar de la agitación extrema, hay gran debilidad, con los dolores.

Un enfermo que sufre violentos cólicos, diarrea crónica dolorosa, a veces sedebilitará tanto que apenas podrá hablar; sensación de gran debilidad o aún desmayo, no son raras con los dolores (Kent).

Modalidades

Lateralidad

Izquierda.

Los dolores se observan de preferencia a la izquierda.

Agravación

POR CÓLERA, POR VIOLENTA EMOCIÓN QUE CONTRARIA AL SUJETO : los dolores de coloc. tienen a menudo origen singular : cólera o indignación.

Así las personas orgullosas y que fácilmente se ofenden, o disgustan, anormalmente susceptibles tienen fácilmente síntomas de coloc.; su acceso de cólera será seguido de violenta neuralgia en cabeza, ojos, a lo largo de la columna vertebral, intestinos, a lo largo del ciático.

Mejoría

POR LA PRESIÓN, los dolores neurálgicos se alivian generalmente por presión profunda.

POR EL CALOR; DOBLÁNDOSE EN DOS, POR LA FLEXIÓN : si el enfermo se queja del vientre, se dobla en dos, si de una ciática, flexiona la pierna dolorosa.

POR EL MOVIMIENTO.

Los dolores disminuyen por el movimiento; al menos, parecen peores por el reposo.

Síntomas mentales

Estado del sistema nervioso análogo al de las personas que sufren, desde hace largos años, violentas contrariedades, disgustos profundos : un hombre cuyos negocios no marchan, se pone irritable, y no tarda en mostrar agotamiento nervioso; una mujer celosa, torturada desde hace mucho tiempo por el proceder de un marido infiel, se vuelve poco a poco irritable y susceptible; la menor cosa la trastorna.

He aquí el estado mental del experimentador de coloc. (Kent).

EXTREMADAMENTE IRRITABLE, el sujeto de coloc.

ES HABITUALMENTE TRISTE, SU MAL HUMOR ES EXTREMO, TOMA TODO A MAL, NO RESPONDE CON GUSTO.

Jamás está contento y se enoja por nada.

MONTA EN CÓLERA MUY FÁCILMENTE.

Particularmente desagradable para convivir, no obstante se lo puede disculpar, porque generalmente es un hombre agotado por sus negocios, o una mujer abrumada por las preocupaciones y que se debate en una vida difícil.

ACCESOS DE CÓLERA VIOLENTOS que aparecen bruscamente cuando menos se los espera acompañados de dolores, calambres, neuralgias muy dolorosas que lo imposibilitan por largo rato.

También esta extrema irritabilidad, esta facilidad para encolerizarse, recuerda a bryon., cham., nux vom., staphis. etc.

Cabeza

Dolores neurálgicos desgarrantes en cuero cabelludo, provocados por cólera, aliviados por presión y calor., y peor con el reposo.

Cefaleas periódicas o intermitentes caracterizadas por dolores presivos, desgarrantes, generalmente frontales, aunque se pueden extender a toda la cabeza, dolores más marcados a la izquierda, agravados al agacharse o acostándose sobre la espalda o moviendo ojos y párpados.

Vértigos al girar rápidamente la cabeza PRINCIPALMENTE GIRANDO A LA IZQUIERDA.

Ojos

Dolores agudos, internos, penetrantes, ardientes; este ardor es más característico y más marcado en los ojos que en otras partes de la cara y de la cabeza, el los globos oculares más marcado a la izquierda, agravado al agacharse y *mejorado* por la presión.

Espasmos de párpado superior derecho.

Iritis con dolores agravado al atardecer y a la noche.

Cara

La expresión de la cara de coloc. es de inquietud, de angustia, *provoca* por la violencia de los dolores, cualquiera sea su localización, los rasgos están tirantes.

Neuralgias faciales con sensación de tirón, de tensión, de puntada, en *u* lado de la cara; dolores que irradian a la oreja, a los temporales y se extienden hasta los dientes y nariz; dolores más marcados a la izquierda; neuralgia suborbitaria izquierda, mejorada por el calor y la presión fuerte; dolores discontinuos, que aparecen en ondas sucesivas.

Los accesos neurálgicos son a menudo periódicos.

Dolores desgarrantes a lo largo del nervio infra-orbitario, en el orificio desalida; a veces este dolor da la sensación de alambre caliente, a veces de clavo frío y otras desgarrante, ardiente, con escozor, se extiende a menudo a toda la cara, generalmente del lado izquierdo; el enfermo no puede soportar el dolor, grita, se agita; dolores desgarrantes o ardientes que se extienden a la oreja y a la cabeza.

Todos estos dolores se alivian por presión, pero solamente al principio; cuando el dolor ha aumentado en violencia durante algunos días, el sitio doloroso es muy sensible y no puede soportar la presión (Kent).

Coloc. es uno de los remedios más frecuentemente indicado en neuralgias faciales con bell. y magn. phosph., los dolores de bell. son casi los más violentos y van acompañados de cara roja, cabeza caliente; ojos brillantes y gran sensibilidad de la región dolorosa al tacto; generalmente del lado derecho y provocado por el frío, mientras que los de coloc. son provocados por cólera, excitación, contrariedad y generalmente se localizan a la izquierda, se alivia por calor, mientras que el frío alivia a bell.

Los dolores de magn. phosph., se sienten a lo largo de los filetes nerviosos, generalmente a la derecha y son como un relámpago, muy rápidos, como descargas eléctricas; como los de coloc. mejoran por calor y presión y se agravan por frío.

Comparar también spigel. etc.

Aparato digestivo

BOCA :

Dientes dolorosos sobre todo a la izquierda.

Lengua roja, como en carne viva, y el enfermo se queja de sensación de ardor en su punta.

GUSTO MUY AMARGO.

ESTÓMAGO :

Sed violenta y aversión por los alimentos.

PAPAS Y FARINÁCEOS SON MAL DIGERIDOS, como en alumina (Kent).

Dolores calambroides como si el estómago estuviera apretado por unamano, mejorados por presión y calor; que sobrevienen después de comer y generalmente a la noche, tarde, impidiendo el sueño.

Náuseas y vómitos acompañan los dolores; aparecen consecutivamente a los dolores y no cesan hasta después que desaparecen los dolores.

ABDOMEN :

Abdomen distendido y muy doloroso : NINGÚN REMEDIO PRODUCE CÓLICOS MAS FUERTES : CÓLICOS MUY VIOLENTOS, TORTURANTES, TERRIBLES Y QUE EL ENFERMO NO PUEDE SOPORTAR SINO DOBLÁNDOSE EN DOS Y APOYANDO ALGO DURO SOBRE EL VIENTRE.

SON DE CARÁCTER NEURÁLGICOS Y LOS VÓMITOS Y LA DIARREA QUE LOS ACOMPAÑAN AMENUDO, PARECEN RESULTAR DEL EXCESO DE DOLOR ANTES QUE DE UN DESORDEN PARTICULAR DE ESTOMAGO O INTESTINO. (Nash).

Dolores extremadamente violentos, angustiosos, con calambres, DE PELLIZCO, COMO SI EL INTESTINO ESTUVIERA PELLIZCADO ENTRE DOS PINZAS, ASENTANDO ALREDEDOR DEL OMBLIGO; cólicos secos después de acceso de cólera, de comer demasiado o cosas indigestas, o papas, o farináceos (alum); acompañados de agitación y escalofrío general por todo el cuerpo, de expulsión de gases que alivian poco y pueden ser seguidos de deposiciones frecuentes mucosas o acuosas, espumosas, de color amarillo y con color de moho.

Magn. phosph. se parece a coloc. y mejora sobre todo por el calor, aunque también doblándose en dos, por presión fuerte y fricciones.

Ars. alb. y cham. tienen como punto de contacto con coloc. que la cólera provoca en ellos cólicos.

Staph. es otro buen remedio para los cólicos de los niños que tienen el mal carácter de cham. y de coloc. y hay que hacer el diagnóstico por las otras características de cada uno; más especialmente, en el niño de staph., los dientes se ponen negros y se carian temprano, hay ulceraciones y orzuelos en los párpados, en fin, la tendencia a los cólicos es crónica.

BOVISTA y ver. alb. tienen también cólicos que se alivian doblándose en dos.

Stannum. es otro gran remedio de los cólicos, tiene como característica, que lo único que alivia al niño es llevarlo con el vientre apoyado sobre el brazo.

Hay también que recordar a JALAPA, en los cólicos de los niños.

En fin DIOSCOREA tiene violentos cólicos, pero el dolor tiene tendencia a irradiar a otras partes del cuerpo, por ejemplo, espalda, brazos y sobre todo, el enfermo se alivia cuando pasea curvando fuertemente la cintura hacia atrás.

DEPOSICIONES :

Deposiciones disintéricas que vuelven cada vez que toma al menor alimento o bebida.

Aparato urinario

Frecuente necesidad de orinar con emisión de orina viscosa (phosph. ac.), fétida, en pequeña cantidad; la necesidad es imperiosa, frecuente.

Tenesmo vesical.

Ardores intensos a lo largo de la uretra al orinar.

Dolores en todo el abdomen al orinar.

Arena, pequeños cristales rojizos, duros, que se adhieren fuertemente al recipiente.

Coloc. puede ser muy útil en cólicos nefríticos, sobre todo a la izquierda, con dolores extremadamente violentos, con calambres que obligan a doblarse en dos.

Órganos genitales

Reglas poco abundantes acompañadas de dolores muy vivos, calambroides, en la región uterina, que obligan a la enferma a doblarse en dos.

Dolores penetrantes en los ovarios, aliviados al doblarse en dos, y por presión fuerte.

Calambres en los ovarios con dolores presivos hacia abajo, que obligan a doblarse en dos : le gusta tener el abdomen sostenido por algo que lo aprieta.

Estos dolores pueden ser provocados no solamente por aparición de reglas, sino por simple cólera o contrariedad.

Espalda y extremidades

Todos los músculos pueden estar dolorosos, calambres dolorosos; todos los nervios pueden ser sede de dolores agudos, desgarrantes; pero si el costado izquierdo es el más a menudo atacado, hay que señalar un dolor intenso, tironeante en el hombro derecho, y en el deltoides derecho (magn. phosph., sanguin.) así como una sensación penosa que aparece al caminar en el muslo derecho, como si el psoas fuese corto.

Dolores calambroides en la cadera, se acuesta sobre el lado que le duele.

Luxación espontánea de cadera. (Boericke).

CIÁTICA CON DOLORS DE TIPO DE CALAMBRES QUE SE EXTIENDEN DESDE LA CADERA HASTA EL HUECO PLOMITEO.

SOBRE LA CARA POSTERIOR DEL MUSLO.

SE LOCALIZA PARTICULARMENTE A LA IZQUIERDA; LOS DOLORS SON AGUDOS, TIRONEANTES, A VECES FULGURANTES ADEMÁS DE CON CALAMBRES; MEJORAN POR FLEXIÓN,

SE AGRAVAN POR EXTENSIÓN, POR FRÍO, POR REPOSO LO MISMO QUE POR CONTACTO LIGERO, MIENTRAS QUE EL CALOR, EL MOVIMIENTO Y UNA PRESIÓN FUERTE LO MEJORAN.

EN FIN, LOS DOLORES VAN ACOMPAÑADOS GENERALMENTE DE ENTUMECIMIENTO, como los derus. tox.

Articulaciones rígidas o impresión de encogimiento en los tendones; músculos y tendones parecen demasiado cortos.

Relaciones

Antídotos

Coffea, cham., staph.

Magn. phosph ES EL CRÓNICO DE coloc.

CONIUM MACULATUM

Conium maculatum, o cicuta grande, o cicuta oficial, planta de la familia de las umbelíferas, muy común en Francia y en toda Europa donde crece al borde de cercos y caminos.

La familia de las umbelíferas nos da tres plantas medicinales, todas vulgarmentellamadas cicuta, pero que no deben confundirse porque tienen propiedades terapéuticas muy diferentes : conium maculatum o cicuta grande; cicuta virosa Y aethusa cynapium o cicuta pequeña.

Conium maculatum tiene olor fétido, nauseoso, y sabor amargo y acre; es muy tóxica y causa frecuentes envenenamientos accidentales por su semejanza con el perifolio que es comestible.

Esta toxicidad fue utilizada en Grecia para la ejecución de condenados a muerte; se les hacía beber cicuta y todos conocen la narración de la muerte de Sócrates, ejecutado por sus conciudadanos, en el libro Fedón, de Platón.

Se recoge al comienzo de la floración, para preparar la tintura madre con la que obtenemos las diferentes dinamizaciones por diluciones Hahnemannianas sucesivas.

Acción general del medicamento

Si consideramos las consecuencias tóxicas de la absorción de conium mac. - propiedades tóxicas que debe a un alcaloide, la cicutina o conicina - vemos que según las dosis y disposición individual produce muchas variedades de envenenamiento.

La forma Socrática, forma parálitica y vertiginosa, es la más frecuente.

Los accidentes producidos por cicuta se desarrollan rápidamente; es un venenarápido en sus efectos.

Deslumbramientos, vértigos con trastornos de la vista y bamboleos constituyen los primeros síntomas, es la embriaguez cicútica.

Pronto los enfermos no pueden ya sostenerse, sus piernas vacilan y están obligados a acostarse.

La parálisis se completa en los miembros inferiores, movimiento y sensibilidades desaparecen, las partes paralizadas se enfrían y el frío como la parálisis sube hacia la parte superior del cuerpo; los músculos respiratorios se paralizan y la muerte llega en 2 ó 3 horas.

Los enfermos conservan la inteligencia hasta el fin.

La cara es pálida, el pulso deprimido, lento.

Convulsiones en las extremidades, parálisis de lengua, faringe y maxilar, dilatación de pupilas, fijeza de la mirada son los fenómenos últimos.

En otra variedad, los enfermos acusan gran cefalalgia, dolores de estómago muy intensos, vómitos, delirio que ya a veces hasta furor y alucinaciones.

Las convulsiones son habitualmente más marcadas que en la forma precedente.

Pero la parálisis casi nunca falta.

Conium actúa ante todo como DEPRESOR DEL SISTEMA CEREBRO ESPINAL; provoca PARÁLISIS DE TIPO ASCENDENTE causando la muerte POR PARÁLISIS DE MÚSCULOS RESPIRATORIOS.

El relato clásico de la muerte de Sócrates cuyo cuadro clínico ha dado su nombre a la forma de envenenamiento llamada Socrática que hemos descrito, es una descripción bien conocida de la acción de la cicuta.

"La acción casi única de las dosis masivas de conium, escribe Hughes, tiene lugar sobre los centros motores.

Si un experimentador continúa sirviéndose de sus piernas el efecto será, con toda probabilidad, sentido en ellas como se vio en Sócrates; si permanece en estado de reposo los efectos se declararán, en primer lugar en los ojos; hay desordenes de acomodación visual con vértigos, luego ptosis; con dosis más fuertes quedará la mirada fija y sin expresión, con un poco de dilatación de pupilas; más raramente diplopia.

Estos fenómenos implican parálisis de 30., 40., y 60. par y de miembros inferiores, denotan una acción del remedio sobre los cuerpos estriados y sus prolongaciones intracraneanas; la médula sólo es afectada más tarde.

Las patogenesias demuestran acción sobre los nervios de la laringe".

Conium actúa también sobre GANGLIOS Y TEJIDO GLANDULAR en los que determina congestión o atrofia.

Si se cree en los autores antiguos, su uso prolongado ha provocado a menudo atrofia de senos y testículos, así como supresión de leche y amenorrea.

Actúa sobre ciertas mucosas en las que produce un poco de catarro.

LA PIEL no escapa a su acción : "causa de vez en cuando erupción particular de la piel".

Pareira.

Características

1) CONSTITUCIÓN Y TIPO : Los síntomas que desarrolla conium se encuentran sobre todo en la vejez, especialmente en solteros, solteras y solterones, en la edad de la menopausia, también en casos de depresión de la economía, después de estados de debilidad, languidez, congestión local o pereza circulatoria".

Sujetos generalmente delgados, con fibra rígida; cabellos rubios, moquetados, tez pálida, enfermiza; labios secos, se pelan fácilmente; piel húmeda, con frecuentes erupciones pustulosas, aspecto triste (Chiron).

He aquí lo que conium pide para manifestar al máximo su acción.

2) DEBILIDAD MENTAL Y FÍSICA MARCADA : PARÁLISIS PROGRESIVA ASCENDENTE PRECEDIDA DE CONVULSIONES Y VÉRTIGOS : Gran debilidad física y mental; incapaz de soportar el menor esfuerzo físico sin agotarse; gran postración del sistema muscular, agotamiento, temblor; debilidad paralítica que aumenta poco a poco, como en cocc. ind.

Agotamiento de cuerpo y espíritu, es decir, lentitud de todas las actividades del cuerpo; el hígado se pone duro, grande, perezoso, la vejiga se hace perezosa y no puede vaciarse por completo, hay como un estado paralítico y la facultad de expulsión desaparece; el remedio marcha progresivamente hacia una debilidad paralítica.

En las fases del principio se fatiga extremadamente pronto, es débil, tiene temblores y esto progresa hasta que los miembros se paralizan.

3) INDURACIÓN DE TEJIDOS, PARTICULARMENTE LAS GLÁNDULAS, GENERALMENTE CONSECUTIVA A TRAUMATISMO : Infiltración de tejidos, en la región de una úlcera o inflamación a lo largo de los linfáticos, con hipertrofia de ganglios; se siente bajo la piel como una cadena de pequeños granos duros.

A cada pequeño resfrío, los ganglios del cuello se ponen grandes, duros y dolorosos.

Las ulceraciones se infiltran.

Nódulos, nudosidades en senos, glándulas, en cualquier parte del cuerpo, bajo la piel.

Se ha indicado mucho conium para nudosidades malignas de glándulas porque desde el principio, las infiltra de tal manera que se ponen duras como piedra (Kent).

4) SENSIBILIDAD : Los dolores de conium son pinchazos, punzantes; generalmente situados a lo largo de los trayectos nerviosos; van acompañados de entumecimiento.

No tiene generalmente dolores en úlceras y estados paralíticos.

Los trastornos de la sensibilidad, preceden a los motores, pero desaparecen cuando éstos se manifiestan.

Modalidades

Lateralidad

Derecha.

Agravación

TOMANDO FRÍO.

Los trastornos pueden ser provocados por frío, y a continuación de un golpe de frío, los ganglios se pueden indurar e hipertrofiar (Kent).

POR EL CELIBATO.

Los síntomas mentales, nerviosos, debilidad, temblores, aparecen a menudo en viudos que se ven privados súbitamente de sus funciones sexuales, también los célibes (Kent).

Hombres o mujeres que tienen una existencia genital reducida y cuyos órganos, obligados a una continencia excesiva, presentan poco a poco modificaciones anatómicas o funcionales.

POR EL ALCOHOL : los enfermos de conium, no pueden soportar la menor dosis de alcohol; el vino, la menor bebida alcohólica o estimulante, provocará temblores, enervamiento, debilidad de espíritu y cuerpo y postración (Kent).

De noche, estando acostado con la cabeza baja; al darse vuelta en su lecho.

Después de haber comido.

Antes y durante las reglas.

Por esfuerzo físico y mental.

Mejoría

En la oscuridad.

Por el movimiento y sobre todo al caminar.

Por el calor; dejando colgar las piernas; los miembros; los dolores u otros sufrimientos y el estado general se alivian dejando colgar las piernas fuera de la cama; o extendiéndose en su cama (Kent).

Síntomas mentales

Con. mac. tiene una acción tan profunda que puede paralizar poco a poco el funcionamiento de la inteligencia y llevarlo a un verdadero estado de idiotez.

Al principio el espíritu se fatiga como los músculos del cuerpo.

"El sujeto de con. mac.

ES INCAPAZ DE HACER UN ESFUERZO MENTAL; su espíritu es lento y perezoso; está en la imposibilidad de sostener un esfuerzo prolongado.

De carácter LENTO, APÁTICO, INDOLENTE, el sujeto de con. es pasivo, incapaz de fijar su atención en un punto. Nada le interesa, todo le es indiferente, porque todo es esfuerzo para él y este esfuerzo, por pequeño que sea le es imposible realizarlo.

Este estado de debilidad, de depresión se encuentra en toda la extensión de supatogenesia y caracteriza al enfermo de este remedio; ante todo es un asténico que no se ocupa de sus estudios o negocios.

LENTO PARA COMPRENDER LO QUE OYE O LEE, retiene difícilmente lo que oye o lee; DEBILIDAD DE MEMORIA".

Triste y TACITURNO, le agrada la soledad, porque la gente turba su patía, pero sin embargo, no quiere estar demasiado solo; melancolía tranquila, estado de entorpecimiento, de que sólo sale si un acontecimiento turba su vida habitual; se ofende y trastorna fácilmente por la menor cosa que necesite un esfuerzo o aplicación de su espíritu; pronto se deprime física y moralmente.

"Esta tristeza y esta melancolía pueden ser muy marcadas; permanece todo el día sentado en un rincón.

Taciturno y abatido, muy deprimido, no da otra razón que el sentirse infinitamente triste, tiene ideas extravagantes y caprichos que uno trata de hacerle abandonar razonando pero cuanto más se lo hace razonar más triste se pone.

NO PUEDE SOPORTAR NINGUNA EXCITACIÓN; ELLO PROVOCABA ANGUSTIA FÍSICA Y MENTAL, DEBILIDAD E INFINITA TRISTEZA.

Se encontrará este estado de con. en personas que han tenido una violenta pena, primero la memoria falla, olvidan, no pueden recordar cosas en el momento deseado; luego se ponen cada día más débiles y si la evolución continúa en el plano mental, llegará a verdadero estado de imbecilidad; pero puede evolucionar en lo físico y mental a la vez y una debilidad; parálisis general sobrevendrá, lo físico y lo mental corren parejos hacia la parálisis; sin embargo, en un momento dado habrá una detención en uno u otro plano, por ejemplo la debilidad del espíritu llegará a la idiotez, mientras que la del cuerpo quedará estacionaria". (Kent).

Sueño

Hay somnolencia diurna, con gran deseo de dormir de día, aún a la mañana.

También deseo de dormir temprano de noche, con debilitamiento en los párpados.

De noche, el sueño puede ser turbado por cefalalgia, epistaxis y sobre todo, gran calor, con agitación, miedos y sueños terroríficos.

SUDORES ABUNDANTES AL DORMIR, EN CUANTO CIERRA LOS OJOS, TRANSPIRA; es un síntoma característico del remedio que parece no encontrarse en ningún otro.

Sambucus, tiene exactamente lo contrario.

Cabeza

Se puede encontrar "cefalea agotadora a la mañana, al despertar, como si la cabeza estuviera llena y fuera a estallar.

Sensación de pesadez como si el enfermo estuviera intoxicado, agravado por la menor absorción de alcohol.

Sensación en la mitad derecha del cráneo, en la región parietal, como si tuviera un cuerpo extraño.

Sensación de ruptura unilateral.

Congestión dolorosa como por compresión en los temporales, peor después de las comidas. (Gels.).

Pero el gran síntoma de la cabeza ES EL VÉRTIGO, VÉRTIGO AL GIRAR LA CABEZA DE LADO (coloc., vértigo girando la cabeza del lado izquierdo); VÉRTIGO ESTANDO ACOSTADO AL DARSE VUELTA EN SU LECHO, O TRATAR DE LEVANTARSE, AUNQUE EL HECHO DE ESTAR ACOSTADO SEA MENOS IMPORTANTE QUE GIRAR LA CABEZA, YA SEA EN POSICIÓN HORIZONTAL O VERTICAL. (Nash).

Los objetos que lo rodean parecen girar alrededor de su lecho, y el menor movimiento exagera esta impresión.

Vértigo al menor movimiento de ojos, al más pequeño desplazamiento de globos oculares.

A propósito del vértigo de conium Nash da las comparaciones siguientes que es necesario anotar aquí.

VÉRTIGO Al girar la cabeza;

Con., calc. ost., kali carb.

Al mover la cabeza; Bryon., calc. ost., con.

Al mirar abajo; Phosph., spig., sulphur.

Al oler flores; Nux vom., phosph.

Después de trasnochar y por falta de sueño; Coccul., nux vom.

Al menor ruido; Theridion Al caminar; Nat. mur., nux vom., phosph., puls.

Al estudiar; Nat. mur.

Al comer o después de comer; Gratiola, nux vom., puls.

Como si girase; Bryon., con., cycl., puls.

Como si la cama girase; Conium.

Con desfallecimiento; Nux vom.

Con marcha vacilante; Arg. nit., gels., nux vom., phosph.

Con los ojos cerrados o en la oscuridad; Arg. nit., stram., therid.

Con trastornos en la vista; Cycl., gels., nux vom.

Al levantarse de su asiento; Bryon., phosph.

Al enderezarse después de estar agachado; Bell.

Al levantarse de su cama; Bryon., chelid., coccul.

Al agacharse; Bell., nux vom., puls., sulph.

Al subir; Calc. ost.

Al bajar; Borax, ferrum.

Al acostarse; Conium.

Que le obliga a acostarse; Bryon., coccul., phosph., puls.

VÉRTIGO OCCIPITAL; Gels., silic., petrol.

Después de haber dormido; Lach.

Por supresión de reglas; Cycl., puls.

Con tendencia a caer hacia adelante Bryon., podoph., alum., chelid. caust.,

manz. phosph., petrol., spig., stram.

Con tendencia a caer hacia Absint., bell., nux vom., bryon., atrás;

kali nit.

Con tendencia a caer hacia la derecha;

Kali nit., helod.

Con tendencia a caer hacia la izquierda;

Bell., dros., con., iod., salyc., acid.,

aur., zinc., silic., stram.

Ojos

LAGRIMEO EXCESIVO CON FOTOFobia INTENSA, AVERSIÓN POR LA LUZ, SIN INFLAMACIÓN O DESPROPORCIONADO CON LOS SIGNOS OBJETIVOS.

ULCERA DE CORNEA, los dolores se agravan de noche estando acostado, por la menor luz, mientras que se alivian por la oscuridad y la presión.

CATARATA cuando las características del remedio están presentes : lagrimeo excesivo y fotofobia intensa.

Paresia o parálisis de músculos del ojo (caust.).

Pereza o parálisis del elevador del párpado superior determinando ptosis de estérpárpado con características que permiten diferenciarlo de caust., gels., sepia.

Dolor en los ojos, acompañado de sensación de entumecimiento y de frío, a veces localizadas en mitad de la cabeza, otras generalizadas.

Oídos

Acumulación de cerumen rojizo.

Sensación al sonarse, como si los oídos estuvieran tapados.

Audición disminuida, o al contrario, en ciertos casos, sensibilidad exagerada del oído, esto último con más frecuencia.

Cara

En ciertas formas de envenenamiento por con. mac. cuando la parálisis de músculos respiratorios avanza lentamente, y produce asfixia progresiva, la cara está tumefacta y azulada, pero generalmente, extremadamente pálida.

Hay dolores neurálgicos, particularmente a lo largo de los nervios suborbitarios y más raramente en los nervios supraorbitarios.

Vuelven al atardecer y a la noche.

Hay que hacer notar también la sensación de escozor y prurito en la piel de la cara.

Temblor de labio inferior, labios secos en vesículas herpéticas.

Aparato digestivo

BOCA, FARINGE Y ESÓFAGO :

Rechinar de dientes.

Dolores sobre todo al comer; dientes que se aflojan sin caries (DIABETES).

Encías tumefactas.

En ciertas formas de envenenamiento la lengua está rígida, tumefacta, dolorosa y hay gran dificultad para hablar.

Generalmente boca y lengua están secas, se ha notado sin embargo, a veces, salivación abundante.

Gusto alterado, generalmente ácido o amargo.

Los músculos de la faringe pueden estar paralizados como todos los de con. : "el enfermo tiene sensación de plenitud en la garganta como si tuviera un cuerpo extraño y hace ensayos involuntarios para deglutir".

Sensación de plenitud y constricción de esófago, como si un cuerpo extraño existiera, obligándolo a tragar constantemente.

ESTOMAGO :

Hahnemann insiste en la ANOREXIA COMPLETA; también anota apetencia por ácidos, café, y sobre todo deseo

desenfrenado de sal (caust., nat. mur., phosph.), así como aversión POR LECHE (aeth., calc. ost., carb. veg., magn.

mur., magn. carb., sepia, silic., sulph.) que es mal soportada y produce después de su absorción distensión abdominal considerable.

Todos los autores están de acuerdo en señalar GRAN SED.

Eructos numerosos, muy ácidos, a veces ardientes o pútridos, rancios, acompañados a veces de un poco de regurgitación.

Náuseas, vómitos.

Calambres muy dolorosos en región epigástrica con irradiaciones a hipocondrio izquierdo y garganta, como si un cuerpo extraño subiese de estómago a faringe.

Digestión difícil con eructos, regurgitaciones agrias, deseo de vomitar; otras veces un desarrollo considerable de gases y eructos ruidosos que alivian (dispepsia flatulenta); estos síntomas van acompañados de gran sentimiento de debilidad y a veces cefalalgia.

ABDOMEN Y DEPOSICIONES :

Abdomen duro, sensible al tacto; con. produce cólicos muy violentos, acompañados de considerable cantidad de gases.

Hahnemann observa dolores y puntadas en ambos hipocondrios y en particular en región del hígado; hígado sensible al tacto; el enfermo siente sensación de constricción como si el lado derecho fuera apretado por una cuerda.

Los cólicos son generalmente secos, la constipación es generalmente deregla.

Constipación con necesidad frecuente y tenesmo; cuando hay deposiciones son duras y un hecho característico : el enfermo se pone muy débil después de cada una de ellas : **DEBILIDAD Y TEMBLOR DESPUÉS DE CADA DEPOSICIÓN**, (ars., arg. nit., ver. alb); otra característica : **LAS DEPOSICIONES PARECEN FRÍAS, LOS GASES PARECEN FRÍOS.**

(Sulph. : las deposiciones son ardientes, parecen calientes).

Sin embargo puede haber diarrea marcada : deposiciones mucosas, grises, verdosas, estriadas de sangre, con tenesmo y a veces emisión de sangre durante la deposición; son muy frecuentes de noche y escapan a veces involuntariamente. (phosph., hyosc.).

Diarrea crónica.

Aparato urinario

La debilidad muscular parética, característica de con., se encuentra aquí de manera marcada : **DIFICULTAD PARA EVACUAR TOTALMENTE EL CONTENIDO DE LA VEJIGA.**

ESCURRIMIENTO INTERMITENTE DE ORINA (clem. er.) **CON DOLOR**es cortantes después de la micción : disuria con **CHORRO INTERMITENTE** (clem. er.) y dolores en los riñones si la necesidad de orinar no es inmediatamente satisfecha.

Necesidad frecuente de orinar sobre todo de noche (hipertrofia de próstata).

Incontinencia diurna y sobre todo nocturna de orina.

Tenesmo, estranguria, con orina escasa y roja, dolores incisivos en el canal y escurrimiento de mucus y aún de pus en relación con cistitis o metritis.

El síntoma siguiente es característico de la inflamación del cuello : poco después de orinar, presión en forma de calambre en región del cuello de la vejiga con puntadas vivas durante varias horas y más viva al caminar que sentado.

Órganos genitales

MASCULINOS :

Hay una especie de debilidad parética : el sujeto tiene **DESEOS INTENSOS PERO ES INCAPAZ DE SATISFACERLOS.**

Las erecciones son incompletas, duran poco, cesan en el momento del coito; sillega a eyacular, **SERÁ SEGUIDO DE GRAN DEBILIDAD, TRISTEZA Y UNA.**

ESPECIE DE ESTADO HIPOCONDRIACO.

EYACULACIÓN INVOLUNTARIA CON PENSAMIENTOS LICENCIOSOS EN PRESENCIA DE UNA MUJER(phosph.), seguida de gran postración y mucha tristeza.

Esto afecta al enfermo y lo lleva a la hipocondría más negra; esto se puede encontrar en los dos sexos como consecuencia de placeres sexuales demasiado frecuentes o **RELACIONES SEXUALES POCO FRECUENTES O EXCESIVA ABSTINENCIA; MALOS EFECTOS DE LA SUPRESIÓN DE RELACIONES SEXUALES.**

Esto explica que con. sea buen remedio en solterones - cuando son castos - y enviadas o solteronas, también cuando son castas.

ESTADO DE DEBILIDAD GENITAL ACOMPAÑADO DE IRRITACIÓN VESICAL CON NECESIDAD FRECUENTE DE ORINAR Y DIFICULTAD DE EVACUACIÓN.

Escurrimiento prostático durante la deposición.

Testículos aumentados de volumen y duros.

FEMENINOS :

El efecto más constante de con.

ES RETARDAR LA APARICIÓN DE REGLAS : DISMINUIRLAS O SUPRIMIRLAS.

Reglas generalmente atrasadas, siempre poco abundantes y de corta duración.

Prurito vulvar y erupción, **AUMENTO DE VOLUMEN DE SENOS QUE SE PONEN PESADOS, Duros, DOLOROSOS**. (helon., lac. can., murex, phyto., puls. etc.), **ANTES** de las reglas o **DURANTE** las reglas, espasmos dolorosos de útero, dolor de constricción en la pelvis y sensibilidad de los senos; **DESPUÉS DE LAS REGLAS**, leucorrea ácida, lechosa, abundante durante algunos días.

Suspensión brusca de reglas.

Puede ser buen remedio si la suspensión se debe a golpe de frío o por habermetido las manos en agua fría.
Otra característica del remedio es INDURACIÓN en órganosgenitales : INDURACIÓN DE CUELLO Y CUERPO UTERINO.

AUMENTO DE VOLUMEN DE OVARIOS CON INDURACIÓN Y DOLORES PUNZANTES.

Hughes lo considera útil en "DEBILIDAD OVARICA por menstruación pobre yconcepción difícil o por congestiones pasivas, crónicas de estos órganos".

Tiene también marcada acción en LOS SENOS, SENOS FLOJOS Y ARRUGADOS ODESARROLLADOS Y DOLOROSOS; prurito en pezones y senos, DUREZA PARTICULARMENTE EN SENO DERECHO CON DOLOR AL TACTO Y PUNTADAS DURANTE LA NOCHE.

Las características, la acción de con. sobre las glándulas y las consecuenCIATERAPÉUTICAS que se pueden sacar son : las glándulas afectadas son de una dureza de piedra, y su induración es tan común en senos como en testículos, útero u ovarios; ordinariamente hay poco o nada de dolor; pero puede haber también dolores punzantes; está particularmente indicado si las induraciones provienen de traumatismos.

Para estas induraciones se puede comparar con : ASTERIAS RUBENS, que tieneinduración en los senos, especialmente a la izquierda, acompañada de dolores punzantes, que se agravan en el período que precede a las reglas; carbo. an., que tiene induración con dureza de piedra, acompañada de dolores ardientes y con tirones, la piel que los cubre es azulada generalmente; este remedio ha dado resultados que estimulan en cáncer de seno, en el período de ulceración cuando los bordes son indurados, azulados y segregan líquido icoroso muy irritante; graph. : presenta en los senos induración por obstrucción de canales de la glándula mamaria en mujeres friolentas y constipadas, con tendencia a erupciones con secreción de líquido como miel; reglas generalmente poco abundantes y de sangre pálida; iod., da buen resultado en mujeres flacas, de tez morena, cuyos senos son blandos, como atrofiados; se encuentra a menudo en los dos senos nudosidades cubiertas de piel de un rojo azulado del tamaño de una avellana, a menudo muy dolorosas; lapis albus, tiene en el seno una o varias nudosidades duras, muy duras, con dolores ardientes, punzantes y pinchazos.

Phytol, cuyos efectos desde el punto de vista clínico, recuerdan la mastitiscrónica; senos llenos de pequeñas nudosidades duras, muy sensibles y dolorosas, sobre todo durante las reglas.

Plumb., nos permite aliviar a enfermas con induración de senos, acompañada dedolores con pinchazos y ardientes, particularmente en mujeres con constipación obstinada, delgadas, con hígado deficiente, aspecto amarillo sucio de piel y conjuntivas.

Aparato respiratorio

NARIZ :

Comezón que obliga a rascarse el interior de la nariz y hacerlo sangrar (aur. triph.).

HIPEROSMIA. con. puede determinar frecuentes epistasis.

LARINGE, BRONQUIOS Y PULMONES :

Tos seca, espasmódica, con sacudidas, provocada por irritación laríngea y sensación como si hubiera en ese órgano, un lugar, un punto seco, sede de comezón incesante; peor de noche y aparece casi enseguida de acostarse obligándolo a sentarse; tos peor estando acostado, de noche.

Hyosc. tiene tos peor de noche, pero no tiene sensación de punto seco en lalaringe, después de inspiración profunda, al hablar o reír, y durante el embarazo.

Tos a veces gruesa, pero de expectoración difícil.

Aparato circulatorio

Con. debilita el corazón, hace que el pulso sea en un momento lleno y regular, un instante después débil e irregular; este síntoma no es raro como indicación del remedio en ancianos.

Palpitaciones, dolores presivos en la región del corazón.

Espalda y extremidades

DEBILIDAD DE LA ESPALDA ACOMPAÑADA DE DOLORES A LO LARGO DE LA COLUMNA

VERTEBRAL; esto puede ser el resultado de un traumatismo y persistir, desde una caída antigua sobre los riñones, por ejemplo.

Debilidad muscular progresiva considerable : los miembros inferiores sonlos primeros atacados, primero son sede de sacudidas musculares, luego temblores, entumecimiento que obligan al sujeto a reposar sus pies sobre una silla; músculos incapaces de esfuerzos, no puede mantenerse parado sin tambalear, ni caminar sin titubear; luego aparece paresia que pronto es seguida por verdadera parálisis que invade poco a poco las piernas, luego los muslos, luego el resto del cuerpo.

Extremidades fatigadas, paralizadas, con temblores; inseguridad de las manos;dedos y dedos grandes del pie entumecidos.

En la parálisis de con., la sensibilidad está poco afectada. (Farrington).

Después de traumatismo, particularmente en región lumbar dolor y estadode plétora en venas de miembros inferiores (Kent).

Piel

Coloración amarilla, sobre todo en palmas de las manos y uñas : unas amarillas.

La piel es sede de erupciones crónicas con prurito persistente; viejascicatrices dolorosas, con induraciones persistentes, sin dolores.
Herpes húmedos, o costrosos y ardientes : Manchas rojizas o azul verdoso porequimosis.
Sudores locales o generales que aparecen de día o de noche en cuanto se duerme solamente cuando cierra los ojos.
Relaciones
Antídotos
Nitr. ac., coffea.
Incompatibles
Psorinum.

CROTON TIGLIUM

Croton tiglium o piñón de la India, pequeño arbusto de la familia de las Euforbiáceas, crece en la India, China, Ceylán, las Molucas, etc.
De sus semillas se extrae un aceite conocido y empleado en terapéutica alopática con el nombre de aceite de croton.
Para la tintura madre homeopática se usan las semillas pulverizadas y tratadas por alcohol; las tres primeras dinamizaciones se obtienen por trituraciones hahnemannianas sucesivas.
Acción general del medicamento
Croton tiglium desarrolla EN LA PIEL, ESPECIALMENTE DE CARA Y ÓRGANOS GENITALES, EXANTEMA ECZEMATOSO.
La sola aplicación de algunas gotas sobre la piel basta para producir al cabo de algunas horas todos los signos de inflamación; sensibilidad dolorosa, enrojecimiento, calor y tumefacción, veinticuatro horas después se ven aparecer vesículas cuyo contenido, primero transparente, se vuelve purulento al segundo día.
Hay entonces verdaderas pústulas que pronto se hunden, ulceran y cubren de costra amarillenta.
Con frecuencia aparecen erupciones secundarias lejos de las regiones donde se aplicó el aceite, particularmente en escroto.
Es de acción tal sobre el intestino, que provoca diarrea abundante, que parecen tener otro origen que irritación inflamatoria de mucosa intestinal "pero más bien un trasudor de la parte acuosa de la sangre, análoga a la que provocan ELATERIUM y ver. alb., que también se observa en cólera asiático". (Hughes).
Finalmente, tiene influencia sobre MUCOSA DE ÁRBOL RESPIRATORIO en la que determina lesiones que provocan tos particular cuyas características veremos más adelante.

Características

- 1) ERUPCIÓN DE VESÍCULAS CUYO CONTENIDO SE VUELVE PRONTO SERO-PURULENTO, LUEGO SE HUNDEN, ULCERAN, Y CUBREN, AL SECAR, DE COSTRA AMARILLA; acompañada de dolores ardientes y escozor, PRURITO INTENSO, CON PIEL TAN FRÁGIL QUE LE RESULTA DOLOROSO RASCARSE; SOLO LO MEJORA UN FROTAMIENTO SUAVE; esto especialmente EN CARA Y ÓRGANOS GENITALES EXTERNOS.
- 2) DIARREA CUYAS DEPOSICIONES PRESENTAN LOS TRES CARACTERES SIGUIENTES :ACUOSAS, AMARILLAS, (apis calc. ostr., china, gratiola, hyosc., nat. sulf., thuya); SON EXPULSADAS SÚBITAMENTE DE UNA VEZ, COMO TIRO DE FUSIL (jatropha, gratiola, podoph., thuya); la menor CANTIDAD DE ALIMENTO O LIQUIDO LAS PROVOCA (arg. nit., ars. alb., aloes, etc.).
- 3) ALTERNANCIA DE TRASTORNOS CUTÁNEOS Y SÍNTOMAS INTERNOS :Una vez aparecida la erupción, las manifestaciones internas desaparecen : (diarrea, tos, etc.). (Kent).

Modalidades

Agravación

POR LA MENOR CANTIDAD DE ALIMENTO O BEBIDA; en verano POR TACTO; DURANTE LA NOCHE Y DE MAÑANA; POR LAVADO.

Cabeza

"Eczema vesiculoso más o menos mezclado con pústulas, en cuero cabelludo; vesículas y pústulas se ulceran, se cubren de costra amarilla que termina por caer, descubriendo la epidermis inflamada, roja, sensible al tacto.
Cuando casi ha terminado la descamación en un lugar, aparece una nueva erupción, y mientras se limpia un trozo de cuero cabelludo, la erupción comienza en otro.
Es la marcha de un eczema crónico.
Esas erupciones se localizan especialmente alrededor de los ojos, en sienes, cara y parte arriba de la cabeza.
A veces su aspecto exterior se parece tanto al de sepia que es difícil distinguirlos.
Sepia presenta la misma erupción pero es más indicado CUANDO LA EPIDERMIS SE DESPELLEJA Y SANGRA, EN COSTRA DE LECHE O ERUPCIONES DE LOS NIÑOS.
En crot. tigl. hay a menudo, al mismo tiempo, diarrea expedida en chorro por el menor trastorno digestivo o de otra índole; si la diarrea se prolonga, poco a poco cura la erupción de la cabeza, pero cuando la diarrea disminuye un poco, aparece un nuevo brote en la piel.
Todo esto indica claramente croton" (Kent).

Ojos

Síntomas inflamatorios : INFLAMACIÓN DE TODOS LOS TEJIDOS DEL OJO : iris y conjuntivas.

Vesículas, pústulas, en la córnea; párpados granulosos, muy inflamados.

A menudo hay, además, sensación dolorosa, COMO SI EL GLOBO OCULAR FUERA TIRADO DE ADELANTE HACIA ATRÁS POR UN HILO ATADO A SU PARTE POSTERIOR, O COMO SI EL NERVIÓ ÓPTICO TIRARA EL OJO HACIA ATRÁS, EN LA CABEZA.

Esto también se ve en par. quadr, pero en él se relaciona con fatiga de los ojos, surmenage de la vista, como el de los grabadores, bordadoras; va acompañado de neuralgias de la cabeza; cuando uno se encuentra ante dolores neurálgicos en los ojos con sensación de globos oculares que tiran hacia atrás, en sujetos con vista cansada, y si no hay, al mismo tiempo, fenómenos inflamatorios, se debe dar par. quadr., Si, al contrario, hay estado inflamatorio de tejidos del ojo, con sensación dolorosa de ojos que tiran hacia atrás, habrá que dar crot. tigl. (Kent).

Aparato digestivo

Crot. tigl. provoca diarrea especial, que es una de sus características.

Lo más notable de sus deposiciones es LO REPENTINO DE SU EMISIÓN, CADA UNA PARECE SURGIR EN UN SOLO CHORRO, DEL ANO, EN UNA OLA DE MATERIAS AMARILLAS, ACUOSAS, O BLANDAS; todo es expulsado a la vez, en un solo chorro.

En un caso de diarrea infantil de crot., la madre dirá : "Si Ud. viera ese brusco chorro violento, se asombraría, doctor, pues todo sale a la vez, en un solo chorro".

En ciertos casos, sólo consigue evacuar después de esfuerzos tenaces y prolongados; en otros, muy numerosas expulsiones sucesivas de pequeños chorros de materia líquida (Kent).

Además, abdomen distendido y muy sensible; muchos gorgoteos en intestino, y cuando el médico coloca la mano sobre el vientre, el enfermo dirá que lo siente gorgotear, como si estuviera lleno de agua; esto parece deberse a que colon y recto están llenos de líquido (Kent).

Otro síntoma especial : AL EJERCER PRESIÓN SOBRE EL VIENTRE Y ALREDEDOR DEL OMBLIGO, DOLOR EN RECTO, CON SENSACIÓN DE PUJO, COMO SI ESTE FUERA A SALIR AL EXPULSAR LA DEPOSICIÓN.

A veces se ha descrito esto como si el dolor siguiera el intestino en todo su recorrido, hasta el ano (Kent).

La absorción de un poco de agua o leche, que habitualmente no parece perjudicial en una diarrea, provoca, a veces, necesidad urgente de evacuar; NECESIDAD URGENTE DE EVACUAR DESPUÉS DE COMER O BEBER.

Si se trata de un niño, hay al mismo tiempo gran agotamiento, abdomen timpanizado, muchos gorgoteos, y en cuanto toma un trago de leche o chupa el seno materno, expulsa un chorro de materia líquida o blanda (Kent).

En el cólera infantil, junto con diarrea se pueden ver algunos vómitos, pero no son tan importantes como la diarrea, y sobre todo, náuseas, que pueden ser muy marcadas, aunque no haya vómitos.

Estas náuseas pueden recordar a ípoca que, después de haber vaciado su estómago, tiene náuseas violentas con esfuerzos agotadores para vomitar y el gran esfuerzo resultante; pero las evacuaciones no se parecen a las de crot. tigl.; están constituidas por pequeños chorros poco abundantes, de materia, con mucho tenesmo y náuseas y vómitos son el síntoma más importante.

En crot. tigl. las evacuaciones son abundantes, en el primer momento del cuadro clínico, mientras que náuseas y vómitos son raros y poco abundantes (Kent).

Órganos genitales

ERUPCIÓN VESICULOSA EN ESCROTO Y PENE, TAN SENSIBLE Y DOLOROSA AL TACTO, QUE LE ES IMPOSIBLE RASCARSE.

FRECUENTES COMEZONES CORROSIVAS EN ÓRGANOS GENITALES EXTERNOS CON ERUPCIÓN VESICULOSA.

Estrechamente ligado, en esto, con petrol., que tiene erupción fina, roja, de pequeñas vesículas granulosas en órganos genitales externos, con prurito intenso, a veces agravadas al rascarse, hasta llegar a sensación de ardor y finalmente ligera sangría que alivia.

Atroces DOLORS EN SENO Y PEZÓN, CUANDO EL NIÑO MAMA, COMO SI ESTUVIERA TIRADO HACIA ATRÁS, POR UN HILO, CONTRA LA PARED TORÁCICA POSTERIOR.

Como si tuviera un hilo atado atrás de la punta del seno, que le tirara hacia atrás, produciendo un dolor agudo, tirante, escozor, que a veces obliga a pasearse de un lado a otro del cuarto, noche y día.

ESTE TIRONEAR DOLOROSO COMO POR UN HILO, DE ADELANTE HACIA ATRÁS, ES UNA CARACTERÍSTICA DE crot., se encuentra en seno, ojo y ombligo (plumbum). (Kent).

Aparato respiratorio

VIOLENTOS ATAQUES DE TOS, CON DISNEA Y AHOGO, PEOR DE NOCHE, PEOR AL ACOSTARSE, OBLIGANDO A PERMANECER SENTADO.

Vías respiratorias tan irritadas, que las aspiraciones le provocan tos.

Esto puede durar cierto tiempo, después, poco a poco aparecerá una erupción en la piel, que progresará, mientras la tos disminuye; pero después de haber secado, poco a poco desaparecerá la erupción, y volverá la tos (Kent).

Piel

INFLAMACIÓN VESICULOSA EN LA PIEL : ENROJECIMIENTO CON PÚSTULAS QUE SE ULCERAN, Y FINALMENTE SE CUBREN CON UNA COSTRA AMARILLENTA QUE A SU VEZ DESAPARECE; ESTO VA ACOMPAÑADO POR INTENSO PRURITO ARDIENTE, PERO EL RASCARSE ES EXTREMADAMENTE DOLOROSO.

Aquí conviene considerar la semejanza con rhus tox., al que antidota.

Su erupción vesicular y pruriginosa lo coloca al lado de los otros medicamentos de la familia de rhus tox., en lo referente a síntomas de piel : anac., sepia, anagallis.

Las erupciones de crot. se localizan generalmente en órganos genitales; también rhus tox. puede provocar erupciones en esta zona y cuando se trata de un caso de intoxicación de rhus tox., el antídoto será generalmente crot. tigl.; cuando en circunstancias semejantes rhus tox. desarrolla erupciones vesículo-pustulosas pruriginosas limitadas a la palma de las manos, el remedio no será crot. sino anagal., que desarrolla en la palma de las manos una erupción como la de crot. en los órganos genitales.

Rhus tox. también puede desarrollar erupción en la palma de las manos, pero que no progresa como la de anagal. y crot.

"Los dolores ardientes de rhus tox. son como fuego y mucho más intensos que los de crot.; se agravan al aire y mejoran sumergiendo las partes afectadas en agua lo más caliente posible : las personas que tienen erupciones de rhus tox. en las manos, hablan de escaldarlas para aliviar el ardor y la comezón.

En crot. la zona eruptiva está generalmente tan desollada que no se puede tocar; pero si la erupción se atenúa y puede frotarla suavemente, el prurito se alivia; en rhus tox. al contrario, el menor contacto aumenta la comezón : por esto, en erupciones graves de rhus tox. en los dedos, los mantiene cuidadosamente separados uno de otro, para que no se toquen.

Aunque crot. y rhus tox. no son exactamente iguales, son bastante similares como para antidotarse (Kent).

Relaciones

Antídotos

Ant. tart.

CUPRUM METAL

El cobre es un metal de color rojo característico, muy maleable, dúctil y tenaz.

Se patina al aire cubriéndose de una capa verdosa de hidróxido de cobre (verdegris).

Se encuentra en la naturaleza, sobre todo en estado de pirita de cobre y sulfuro de hierro y a menudo también asociado a sulfuros de antimonio, de plata, plomo, arsénico.

También se encuentra en estado de óxido e hidróxido de cobre (malaquita, azurita).

Existe en la mayoría de nuestros alimentos vegetales y animales.

Las tres primeras dinamizaciones se preparan triturando cobre metálico precipitado.

Acción general del medicamento

Cuprum actúa electivamente sobre MEDULA Y SIMPÁTICO por cuyo intermedio ejerce influencia marcada en todo el organismo.

1) Por LOS NERVIOS SENSITIVOS, causa en músculos, huesos, articulaciones y vísceras, dolores excesivos que vuelven por accesos.

2) Por los NERVIOS MOTORES, determina en músculos PRIMERO CALAMBRES, después CONVULSIONES DESORDENADAS Y PAROXÍSTICAS que llegan a FENÓMENOS PARALÍTICOS que son, precisamente, el sello de su genio mórbido.

LOS MÚSCULOS VOLUNTARIOS están, bajo su influencia, en estado de excitabilidad perpetua; parecen como movidos por una fuerza extraña y presentan estremecimientos, calambres especialmente en pantorrillas, convulsiones que empiezan por extremidades y afectan más especialmente extensores.

También ocasiona, como consecuencia de su influencia en esta esfera, desórdenes múltiples en todas las funciones de relación.

También ataca LOS MÚSCULOS INVOLUNTARIOS, determina trastornos respiratorios, cardíacos y desórdenes mecánicos a lo largo de todas las vías digestivas.

3) Por los NERVIOS TROFICOS, afecta profunda y directamente la NUTRICIÓN : Lesiones ulcerosas que tienden a gangrena, aparecen en mucosas; herpes rebeldes secos, escamosos y muy pruriginosos; la energía vital se debilita, el organismo se consume y poco a poco se instala una caquexia particular que se parece enormemente a la de la tisis, si bien la auscultación no revela ningún signo propio de esta enfermedad.

Características

1) ESPASMOS MUSCULARES QUE PUEDEN LLEGAR A CONVULSIONES : AFECCIONES ESPASMÓDICAS.

CALAMBRES Y CONVULSIONES EXTREMADAMENTE VIOLENTOS, QUE APARECEN Y DESAPARECEN BRUSCAMENTE, ACOMPAÑADOS DE TRASTORNOS DIGESTIVOS Y NERVIOSOS :

Esta es su más grande característica; se la encuentra en la mayoría de los casos en que es útil.

EL ESPASMO MUSCULAR ESTA SIEMPRE PRESENTE, DESDE SIMPLE TEMBLOR DE DEDOS HASTA CONVULSIONES GENERALIZADAS; casi siempre, EL ESPASMO EMPIEZA POR CONTRACCIONES, SACUDIDAS DE DEDOS Y DEDOS GRANDES DEL PIE Y PRONTO SE GENERALIZA. (cic. vir., lo contrario).

Contractura espasmódica de músculos voluntarios.

Convulsiones : ESPASMOS TÓNICOS Y CLONICOS QUE EMPIEZAN EN LOS DEDOS, PRINCIPALMENTE LADO IZQUIERDO, Y SE EXTIENDEN A TODO EL CUERPO.

Epilepsia.

Los calambres son otro signo característico de su acción.

Pueden ser TÓNICOS O CLONICOS; LOCALES O GENERALES y a veces son reemplazados por tos espasmódica o respiración difícil (Hughes).

Calambres en extremidades, palma de manos, planta de pies, pantorrillas, con gran fatiga de extremidades.

ALIVIAR LOS CALAMBRES, ESPASMOS MUSCULARES, CONVULSIONES, es el primer y principal uso homeopático de cuprum. (Hughes).

2) AGOTAMIENTO CORPORAL Y ESPIRITUAL, DESPUÉS DE SURMENAGE CEREBRAL O INSOMNIO :

Esto se parece a coc. ind. y nux vom.; los otros síntomas deben decidir entre ellos.

3) HIPERSENSIBILIDAD : Sensibilidad exasperada; la piel, las verrugas están sensibles y también en su reacción, es tan hipersensible, que, cuando es necesario, remedios parcialmente indicados actuarán mal porque el sujeto está tan exageradamente sensible a todo, que la mínima dosis, la más suave, actúa con exceso; cualquier olor molesta, un remedio bien elegido agrava en vez de curar; cuprum alivia esta hipersensibilidad, y después, los remedios bien elegidos actuarán para traer la cura (Kent).

Esta hipersensibilidad es tanto física como psíquica; sujetos tan sensibles que no saben rodearse de simpatías porque son incapaces de dominarse, y reaccionan demasiado violentamente a cualquier influencia, aún mínima, pero que tienen hipersensibilidad exagerada.

Esta hipersensibilidad coloca al remedio al lado de bell., nux vom., y zinc. cuyas otras características permiten diferenciarlos.

Modalidades

Los síntomas tienen tendencia a aparecer PERIÓDICAMENTE Y EN GRUPOS; las afecciones comienzan o se localizan especialmente A LA IZQUIERDA.

Agravación

Por el tacto y presión; por aire frío y viento frío; por supresión intempestiva de transpiración o exantema, de noche; antes de las reglas; con luna nueva.

Mejoría

Por transpiración; bebiendo agua fría.

Síntomas mentales

Tiene gran variedad en los síntomas mentales : delirio, verborrea incoherente, pérdida de memoria.

En las diferentes formas de enfermedades cuyos síntomas cubre, como el cólera, ciertas fiebres como la fiebre puerperal, dismenorrea, congestión cerebral, y a las que conviene, hay delirio, inconsciencia, sacudidas, espasmos musculares y calambres (Kent).

Delirio con accesos de furor.

De manera general, el carácter es temeroso, miedoso; melancólico con accesos de gran angustia.

Agotamiento mental por surmenage intelectual y falta de sueño. (nux vom., coc).

Sueño

SUEÑO PROFUNDO con sacudidas musculares y temblor de extremidades.

Cabeza

Violenta congestión, violentos dolores en la cabeza; violentos dolores en vértex.

Sensación de CONTUSIÓN, de MAGULLADURA en el cerebro.

Sensación de reptación en vértex; dolores agudos repentinos en sienes.

Congestión de cerebro.

Meningitis.

Parálisis del cerebro acompañada de síntomas de colapso.

Metástasis cerebral de una afección de otro órgano.

DOLOR DE CABEZA DESPUÉS DE ATAQUE DE EPILEPSIA.

Ojos

ESPASMOS DE PÁRPADOS, MOVIMIENTOS CONVULSIVOS DE OJOS.

CONTRACCIÓN ESPASMÓDICA DE PÁRPADOS.

ROTACIÓN RÁPIDA DE GLOBOS OCULARES EN TODOS LOS SENTIDOS.

Cara

Pálida, ojos ojerosos.

En el momento de las convulsiones, de los ataques de coqueluche, CARA CIANOTICA, LABIOS AZULADOS.

Muecas, cara congestionada, labios azulados; contractura de mandíbulas con espuma en la boca.
MOVIMIENTOS ESPASMÓDICOS DE PÁRPADOS, espasmos clónicos, espasmos de músculo extrínsecos de los ojos, por ejemplo : DE GLOBOS OCULARES bajo los párpados cerrados; CIERRE ESPASMÓDICO DE PÁRPADOS (Kent).

Oídos

Zumbidos del lado sobre el que está acostado, al despertar, en cuanto se levanta, desaparecen.

Aparato digestivo

BOCA :

FUERTE GUSTO METÁLICO CON SALIVA ABUNDANTE; este ptialismo acompañado de gusto metálico recuerda a euphorb. que tiene abundante flujo de saliva, pero salada; iris vers., salivación abundante pero con sensación de ardor a lo largo de todo el tubo digestivo; merc., abundante salivación espesa, viscosa, fétida y muy mal aliento; trifol., sensación de hinchazón de glándulas salivares seguida de abundante saliva; nit. ac., cuyo ptialismo acompaña generalmente a estomatitis característica; iod., que puede tener salivación abundante y a veces fétida; jaborandi, pilocarpine, etc.

ALARGAMIENTO Y RETRACCIÓN CONSTANTE DE LA LENGUA, PARECIDOS A LOS MOVIMIENTOS DE LA LENGUA DE LAS SERPIENTES. (lach.).

TARTAMUDEO.

PARÁLISIS DE LA LENGUA.

FARINGE :

Sequedad de garganta con dificultad para tragar.

Cuando bebe el líquido desciende con ruido de "glu-glu". (laur.).

ESTOMAGO :

Apetencia de cosas frías más bien que calientes.

Muchos síntomas mejoran al beber agua fría; los espasmos se calman a veces bebiendo agua fría, como coc. cact. (Kent).; hipo y vómitos que mejoran bebiendo un trago de agua fría.

Vómitos acuosos, como flemas, después de beber leche.

HIPO; CALAMBRES DE ESTOMAGO; sensación de presión en estómago e intestino; calambres periódicos; sensación de presión excesivamente penosa en estómago y epigastrio, que se agrava por tacto y movimiento; DOLOR ESPASMÓDICO, ANGUSTIOSO, EN EL ESTOMAGO y bajo el apéndice xifoides, que parece querer quitarle la vida.

NAUSEAS ESPASMÓDICAS desde el bajo vientre hasta el gástrico, principalmente en epigastrio.

VÓMITOS violentos con calambres en el vientre, diarrea y convulsiones.

ABDOMEN Y DEPOSICIONES :

NEURALGIA DE TODOS LOS NERVIOS ABDOMINALES CON DOLORS COMO SI LE CLAVARAN UN PUÑAL EN EL ABDOMEN, HASTA LA ESPALDA.

Violentos cólicos con colores agudos como cuchilladas en el abdomen, agravados por presión y aliviados por calor.

CÓLICOS ESPASMÓDICOS CON CONVULSIONES Y GRITOS AGUDOS.

Sensación de presión en el vientre como por cuerpo duro, agravada al tocar.

Vientre duro con dolores violentos al menor tacto.

DIARREA VIOLENTA, a veces sanguinolenta, con gran debilidad; DOLORS CALAMBROIDES EN ABDOMEN Y PANTORRILLAS, CON DEPOSICIONES NEGRAS, DOLOROSAS, SANGUINOLENTAS, CON TENESMO Y DEBILIDAD.

CÓLERA CON ENFRIAMIENTO Y CIANOSIS; sensación de desasosiego en el hueco del estómago y gran disnea;

CALAMBRES SOBRE TODO, CALAMBRES TERRIBLES, los músculos de las pantorrillas y muslos parecen retraerse hacia las articulaciones; en camphora, lo que predomina es el colapso; en verat., evacuaciones y vómitos; en cupr., calambres.

Órganos genitales

MASCULINOS :

CALAMBRES QUE IMPIDEN EL COITO; calambres en pantorrillas y pies en cuanto comienza el acto : esto puede encontrarse en viejos solterones que se casan tarde, o en jóvenes prematuramente envejecidos por "farristas" o diversos abusos.

En tales casos, cupr. y graph. son dos buenos remedios, pero el primero produce calambres al principio del acto y graph. al final : sulf. también ha curado este estado (Kent).

FEMENINOS :

Reglas demasiado tardías y prolongadas.

Antes de las reglas, ebullición de sangre, latidos cardíacos y dolor de cabeza (Jahr).

CONVULSIONES Y CALAMBRES ANTES Y DURANTE LAS REGLAS.

Convulsiones después de supresión intempestiva de reglas.

Aparato urinario

Necesidad urgente de orinar, con emisión poco abundante.

Incontinencia nocturna de orina.

Aparato respiratorio

NARIZ :

Sensación de congestión violenta en la nariz. (melil. alb.)

LARINGE :

Espasmo de glotis.

Sensación de cosquilleo laríngeo.

TOS SECA Y ESPASMÓDICA con ruido de "glu-glu" con ahogos, como en la coqueluche, con vómitos y cianosis de cara; TOS MEJORADA BEBIENDO AGUA FRÍA (caust., opium, tabac.).

La tos espasmódica de cupr. puede hacer pensar en la de ambra gris., cina, cocc. cact., coral. y debe distinguirse.

COQUELUCHE con ataques durante los cuales el niño se pone rígido, su respiración se detiene, agitación y temblores musculares espasmódicos, con pérdida de consciencia; al cabo de un instante, vuelve en sí, vomita, pero sólo se recupera lentamente; también puede presentar durante los ataques verdadero estado cataléptico completo.

PULMONES Y PECHO :

SENSACIÓN DE CONSTRICCIÓN DEL PECHO CON DISNEA.

Ataques de asma con sofocación, peor hacia las 3 de la mañana (am. carb.) Asma espasmódica cuyos ataques alternan con vómitos espasmódicos.

Aparato circulatorio

CARDIALGIA CON SENSACIONES DE OPRESIÓN espasmódica, DE VIOLENTA PRESIÓN, SEGUIDAS DE VÓMITOS.

Palpitaciones.

Dolor precordial con angustia.

ANGINA DE PECHO (cactus grand., spig., etc.).

Degeneración grasosa de corazón (phytol.).

Pulso lento, o duro, lleno, rápido.

Espalda y extremidades

CONTRACTILIDAD ESPASMÓDICA DE MÚSCULOS VOLUNTARIOS; SACUDIDAS MUSCULARES;

ESPASMOS MUSCULARES; Temblores.

MOVIMIENTOS CONVULSIVOS QUE COMIENZAN EN DEDOS, O PIES Y SE

EXTIENDEN PROGRESIVAMENTE A TODO EL CUERPO; COREA PERIÓDICA (agar., tarent. h., ver. vir., zinc., etc.).

Espasmos musculares clónicos que comienzan en los dedos.

ESPASMOS TÓNICOS Y CLÓNICOS QUE COMIENZAN EN LOS DEDOS, principalmente lado izquierdo, y se extienden a todo el cuerpo; FLEXIÓN CONVULSIVA DE PULGAR HACIA LAS PALMAS DE LAS MANOS.

CONVULSIONES CON PULGAR DOBLADO ESPASMÓDICAMENTE EN EL PUÑO CERRADO,

EPILEPSIA cuyo ataque comienza por violenta constricción en parte inferior del pecho, o por contracciones, espasmos, en los dedos, para ganar todos los músculos del cuerpo (Kent).

En las convulsiones se aproxima a : bell., cicuta, cina, hyosc.

Calambres con gran fatiga de extremidades.

Calambres en palma de manos, planta de pies; CALAMBRES EN PANTORRILLAS (chamom., graph., lycop., sec. corn., etc.).

Dolores de contracción y de presión agravados por movimiento y tacto.

Piel

Azulada, marmólea.

Ulceraciones y puntos pruriginosos con pequeños granos en pliegues de articulaciones.

Erupciones que se parecen a sarna (Jahr).

Erupciones millares, sobre todo en pecho y manos (Jahr).

Relaciones

Complementario

Calc. ost.

Antídotos

Aur., bell., camph., hep. sulf., calc., merc., opium.

CHAMOMILLA

Chamomilla vulgaris o matricaria chamomilla o chamomilla común, chamomilla de Alemania, es una planta anual de la familia de las sinantéreas.

Crece en casi todas las comarcas de Europa al borde de los caminos, en terrenos incultos, secos, arenosos.

No hay que confundirla con chamomilla romana o anthremis nobilis, que se distingue de la chamomilla común por su tallo vivaz, su receptáculo acolchonado, pedúnculos huecos, y olor más fuerte.

Las flores de la Matricaria tienen, al contrario, olor agradable, suave, aromático y que se desarrolla sobre todo por la desecación; el sabor es fuerte y un poco amargo.

Se prepara, para uso homeopático, una tintura madre con la planta entera, recolectada en la época de la floración.

Acción general del medicamento

Chamomilla parece actuar sobre los NERVIOS SENSITIVOS, por cuyo intermedio produce HIPERESTESIA EXCESIVA : DOLORES INTOLERABLES, HIPERSENSIBILIDAD AL DOLOR.

EL DOLOR INTOLERABLE DE chamom, NO ESTA, EN APARIENCIA, EN PROPORCIÓN CON LA GRAVEDAD DEL CASO.

Desarrolla y cura un estado de hipersensibilidad al dolor que hace que el enfermo no pueda soportar el dolor más pequeño; toma inmediatamente proporciones extravagantes, como se encuentran en BEBEDORES DE CAFÉ, O PERSONAS AFICIONADAS A NARCÓTICOS.

Las impresiones aún muy ligeras, producen angustia y ansiedad moral; los ataques de dolor terminan a menudo en desfallecimiento.

El remedio es semejante aquí a valer., hep. sulf., calc., y ver. alb.

Chamom está especialmente indicado en tales estados cuando sobrevienen después del uso prolongado de narcóticos.

Este dolor intolerable se AGRAVA POR CALOR, Y AL ATARDECER O A LA NOCHE.

Se encuentra a menudo con esta hipersensibilidad o alternando con ella : SENSACIÓN DE ENTUMECIMIENTO principalmente en estados reumáticos o paralíticos. (Nash).

Esta hipersensibilidad es acompañada por un ESTADO MENTAL, que se puede definir así : IRRITABILIDAD TRISTE.

El sujeto es huraño, áspero, tosco, rencoroso; lo sabe y se da cuenta pero no puede hacer otra cosa; replica con maldad, cuando se habla, hasta es grosero, reconoce su mal carácter pero no puede dominar sus ímpetus.

Este estado mental característico está presente tanto en el adulto como en el niño, en que se manifiesta por llanto, gritos, y gruñidos; desea todo lo que ve pero lo rechaza cuando se le dan; sólo está tranquilo cuando lo alzan o pasean.

Chamom. actúa fuertemente sobre EL TUBO DIGESTIVO, y está especialmente recomendada cuando los niños se quejan de TRASTORNOS EN ESTA ESFERA DURANTE LA DENTICIÓN, lo que aproxima aquí al remedio a bell., indicado en trastornos de la dentición con síntomas nerviosos y tendencia a convulsiones; a calc. ostr., útil en trastornos de la dentición, en niños gordos, hinchados, con piel pálida, con diarrea; a coffea que tiene trastornos de dentición con agitación, insomnio, intolerancia al dolor y mejoría por agua fría; a kreosot, en niños caquéticos, con irritabilidad general y constipación.

Modalidades

Lateralidad

Más bien izquierda.

Agravación

a) POR CÓLERA : es uno de los mejores remedios de la cólera y trastornos que pueda traer. (bryon., nux vom., staphis., ignat., etc.).

b) POR CALOR, pero solamente los dolores de dientes y maxilares pues entérminos generales chamom es un friolento mejorado por calor (Kent).

c) Al aire libre, por el viento.

d) De noche, de las 9 - a medianoche.

Mejoría

a) POR CALOR : tiempo caluroso y húmedo.

b) ESTANDO ALZADO O ANDANDO EN COCHE.

Síntomas mentales

IRRITABLE, MALO, CAPRICHOSO, ÁSPERO, RENCOROSO; reconoce sus defectos pero es incapaz de actuar de otra manera.

Impaciente, y cuando habla no puede soportar que lo interrumpan.

NO TOLERA A NADIE A SU ALREDEDOR Y NO LE GUSTA QUE LE HABLEN; si responde, es con fastidio y aún con grosería.

Predispuesto a MONTAR EN CÓLERA, y sus cóleras son siempre de extrema violencia, al punto de enfermarlo.

ANSIOSO, AGITADO, IMPRESIONABLE; HIPERSENSIBLE A TODO, el más pequeño dolor lo exaspera.

EL NIÑO DE chamom. ES MALO, INSOPORTABLE, CAPRICHOSO, desea todo lo que ve, se encoleriza si le rehusan algo; grita hasta obtenerlo y lo rechaza no bien se lo dan.

SOLO ESTA TRANQUILO CUANDO LO TIENEN EN BRAZOS, Y LO PASEAN. (cina es lo contrario).

La calma mental contra indica absolutamente a chamom., AGITACIÓN E INSOMNIO, son característicos del remedio y lo aproximan a lo que Nash llama el trío de la agitación : acon., ars. alb., y rhus tox., pero la agitación de chamom. no va acompañada nunca del miedo tremendo y temor angustioso a la muerte de acon.

Por el contrario, es tal la desesperación de chamom. por la hipersensibilidad al dolor, que prefiere la muerte a los sufrimientos que padece.

La agitación de ars. alb., va acompañada de gran debilidad que no tiene chamom.

La agitación de rhus tox. se relaciona con el alivio del dolor por movimiento, mientras que la agitación y el insomnio de chamom. son consecuencia de la hipersensibilidad que hace que no pueda soportar su dolor, aunque sea mínimo : EXCESIVA INQUIETUD, ANSIEDAD QUE IMPULSA A TIRARSE DE UN LADO A OTRO, CON SENSACIÓN DE DOLOR DESGARRANTES.

Sueño

SOMNOLENCIA DE DÍA, al punto de dormirse comiendo, pero, DE NOCHE, INSOMNIO.

Tiene deseo de dormir, pero no lo consigue.

Sueño agitado, con gritos, gemidos, despierta sobresaltado : Sueños angustiosos, terroríficos, a veces con los ojos entreabiertos.

Cabeza

Sudores calientes, viscosos, en frente y cuero cabelludo.

Cefalea de toda la cabeza, con sensación de latidos, de estallido, de presión.

O también : cefalea tireante, punzante, de un solo lado de la cabeza con enrojecimiento de la mejilla de ese lado.

Vértigo con sensación de desfallecimiento, después del descanso, estando sentado o parado y mejorado acostándose.

Oídos

Hipersensibilidad del oído : asarum eur., nux vom; therid., zinc. met., bell., borax, coffea, cinch., nat. carb., silic.

Hipersensibilidad de las orejas que son especialmente sensibles al aire frío.

Dolores de oídos desgarrantes, por accesos y que lo hacen gritar.

Sensación de oídos tapados, con zumbidos.

Ojos

Sensación de latido, ardor, calor, en los ojos.

Blefaritis con ulceraciones costrosas en el borde de párpados.

Contracción espasmódica de párpados, pupilas contraídas.

Cara

En general caliente, ROJA, ARDIENTE, pero sobre todo puede presentar este síntoma característico : UNA MEJILLA ROJA Y CALIENTE, LA OTRA PÁLIDA Y FRÍA (acon.).

Transpiración en la cara, después de comer o beber.

Labios secos, agrietados, excoriados.

NEURALGIA FACIAL con dolores intolerables, desgarrantes, punzantes, tireantes, pulsátiles, agravados por calor. (spig.).

Aparato digestivo

BOCA :

SEQUEDAD DE BOCA Y LENGUA CON SED.

Aliento fétido, gusto ácido, o rancio, o amargo.

ODONTALGIA con dolores pulsátiles, punzantes, insoportables; los dientes parecen demasiado largos.

Esta odontalgia es PEOR SI SE PONE ALGO CALIENTE EN LA BOCA; O RECOMIENZA SI ENTRA EN PIEZA CALIENTE SE AGRAVA DE NOCHE, DESPUÉS DE LAS COMIDAS, POR EL CAFÉ; DISMINUYE POR BEBIDAS FRÍAS, POR APLICACIONES FRÍAS; el sujeto está exasperado, no puede soportar sus sufrimientos, está agitado, se tira de un lado al otro.

Lengua roja, resquebrajada o cargada de una capa amarillenta y espesa.

Aftas en la lengua.

FARINGE :

Sensación de constricción de garganta, con dolor, como provocado por una astilla.

Espasmo con imposibilidad de tragar alimentos sólidos, particularmente estando acostado.

Inflamación e hinchazón de parótidas y glándulas submaxilares.

ESTOMAGO :

CALAMBRES EN EL ESTOMAGO : gastralgia; los alimentos parecen quedar en el estómago con sensación de peso.

Sensación de plenitud y distensión del estómago.

Anorexia, AVERSIÓN ESPECIAL POR CAFÉ.

Gastralgia en bebedores de café.

En general chamom. tiene asco al café; después de tomarlo, puede haber náuseas, vómitos, sofocaciones; agrava o trae dolor de dientes; esto aproxima al remedio a fluor acid., phosph. ac.; lycop., nux vom., etc.

ABDOMEN, INTESTINO, DEPOSICIONES :

ABDOMEN HINCHADO, con piel tirante como un tambor; cólicos ventosos; CÓLICOS FLATULENTOS con hinchazón de vientre, con borbotismos; expulsa gases en pequeña cantidad y sin alivio.

Cólicos flatulentos excesivamente dolorosos con ansiedad y náuseas, después de haberse encolerizado, con mejillas rojas y transpiración caliente.

Diarreas, con deposiciones formadas por mucus flemoso y materia amarilloverdosa, como huevos revueltos con espinacas, DE OLOR FÉTIDO a huevo podrido, acompañados por CÓLICOS; ANO DOLOROSO, después de las deposiciones que son excoriantes.

Esta forma de diarrea se encuentra sobre todo en niños "QUE SACAN LOS DIENTES", o después de enfriamiento. Esta diarrea con deposiciones verdes se encuentra también en los medicamentos siguientes; que se le pueden comparar : acon.; deposiciones frecuentes, verdes parecidas a espinacas picadas, y acompañadas de tenesmo; arg. nit. : diarrea con deposiciones verdes como espinacas picadas y que se ponen verdes al secarse, cuando manchan la ropa, son expulsadas en chorros con mucha salpicadura y gases mezcladas con desechos epiteliales mucosos del intestino; bell. : diarrea con deposiciones verdosas, disentericas, con tenesmo; calc. phosph., cuya diarrea tiene deposiciones verdes, acuosas, que salpican, evacuadas violentamente y con gases fétidos; como la de chamom., es frecuente en niños en el momento de la dentición; dulcam. : deposiciones verdes mucosas, a veces sanguinolenta, sobre todo en verano, cuando el tiempo se hace súbitamente frío y húmedo; elater. : deposiciones acuosas, abundantes, espumosas, verde oliva, con dolores cortantes en el abdomen; gels. : diarrea súbita, y a menudo involuntaria, color crema, (calc. ostr.) o de te verde, después de mala noticia (phosph. acid.), de miedo (opium; ver. alb., arg. nit., puls.) o de cualquier otra excitación emocional, con lengua cargada blanca o amarilla; ipeca : diarrea con deposiciones verdes como pasto, acompañada por sensación de opresión en región umbilical, náuseas, a pesar de la lengua limpia; magn. carb. : cólicos con deposiciones verdes, acuosas, semejantes a la espuma que cubre la superficie de un estanque con ranas; podoph., mezer., sécale cuyas deposiciones son verde oliva, pútridas, sanguinolentas, con gran depresión y sensación de frío de hielo aunque no puede estar tapado en su lecho.

Órganos genitales

REGLAS ADELANTADAS, DEMASIADO ABUNDANTES, DE SANGRE NEGRA, CON MUCHOS COÁGULOS, acompañadas DE CÓLICOS VIOLENTOS, sensibilidad en región ovárica, tirones en muslos y piernas y frecuentes deseos de orinar; al mismo tiempo humor insoportable y tendencia a encolerizarse por nada. Para las reglas abundantes, adelantadas, con coágulos, pensar en amom. carb., bell., cocc. cact., china, cycl., kali mur., platina, sabina, etc.

Metrorragia de sangre negra, con coágulos, acompañada de cólicos como dolores de parto.

CÓLICOS MENSTRUALES DESPUÉS DE CÓLERA.

Leucorrea amarilla, ácida, corrosiva, siempre muy abundante después de las comidas.

Senos duros y sensibles al tacto, con dolores tironeantes, sensibilidad de senos en niñas Amenaza de aborto después de emoción, cólera, con espasmos, convulsiones, escurrimiento de sangre oscura.

Rigidez de cuello; dolores intolerables; dolores de parto que empiezan en la espalda y van hacia abajo, hacia la cara interna de los muslos, intolerables, grita que no puede soportar más y sus quejidos son desproporcionados con los dolores.

Aparato respiratorio

NARIZ :

Hipersensibilidad a olores, aur. met., coffea, colch., nux mosch., graph., etc.

Síntomas de catarro de mucosa; secreción de mucus caliente y acuoso y sin embargo la nariz tiene sensación de estar tapada.

LARINGE Y PECHO :

Sensación de aspereza y constricción en laringe; ronquera.

Catarro bronquial, solo o acompañando el catarro nasal.

TOS SECA, IRRITANTE, CON COSQUILLO CONSTANTE EN LA GARGANTA.

PEOR DE NOCHE, DE LAS 9 A MEDIANOCHE CUANDO DUERME.

(Verbascum) y que no despierta al enfermo.

TOS PEOR EN INVIERNO; el niño se pone colérico cuando tose.

Tos crónica agravada por viento y tiempo frío.

Aparato circulatorio

Palpitaciones con ansiedad, temblores y dolores como si le aplastaran el corazón.

Espalda y extremidades

Violentos dolores reumáticos que sacan al enfermo de la cama, y lo obligan a caminar por todos lados.

Dolores agudos, tironeantes, angustiosos, desgarrantes, que agitan al enfermo que no los puede soportar y le parecen siempre más violentos de lo que en realidad son.

DOLORES CON ENTUMECIMIENTO DE PARTES AFECTADAS.

Dolores de CIÁTICA, principalmente izquierda; desgarrantes, peor de noche en cama y por el menor movimiento, mientras que el reposo los calma un poco; son intolerables y el enfermo hipersensible, no los puede soportar.

Calambres en pantorrillas, principalmente de noche.

Piel

Húmeda y ardiente, el cuerpo se estremece de frío, cara y aliento calientes, alternativas de calor y escalofríos.

Sudor caliente en la cabeza, que moja el cabello.

Fiebre

ESCALOFRÍOS RÁPIDOS con frío glacial; escalofríos en todo el cuerpo en cuanto se descubre;
ALTERNATIVAS DE CALOR Y ESCALOFRÍOS, CALOR violento con enrojecimiento de mejillas, ardor en los ojos y sed viva; UNA MEJILLA ROJA Y CALIENTE, LA OTRA PÁLIDA Y FRÍA.
SUDORES ABUNDANTES; calientes, generalizados o localizados en cabeza y manos; ACOMPAÑADOS DE SED.

Relaciones

Complementarios

Bell., magn. carb.

Antídotos

Camph., coffea, nux vom., puls.

CHELIDONIUM MAJUS

Chelidonium majus o gran chelidonium, llamado también "hierba de las verrugas" o "de la golondrina" o quelidonia; es una planta de la familia de las Papaveráceas.

Crece en Europa y América, en lugares húmedos, escombros, viejos muros, peñascos.

Su flor es de un amarillo brillante.

Sus hojas aladas, profundamente teñidas de un verde tierno; su raíz es marrónrojizo y toda la planta contiene jugo amarillo, viscoso, amargo y cáustico.

En el tiempo de los espagiristas, se designó a esta planta como remedio del hígado por el color de su jugo, parecida al de la bilis.

Esto es, en realidad, una confirmación de la experiencia más antigua.

Usada como cáustico desde su origen, los médicos griegos, Galeno entre otros, la empleaba contra enfermedades del hígado, especialmente la ictericia, y también diversas oftalmias.

Este último uso le valió más tarde, su segundo nombre de "Eclair" y Salignacpiensa que el nombre "Golondrina", en griego, "KELIDON", viene también de la virtud oftálmica, sea porque los nidos de golondrina tenían fama de buenos para las enfermedades de los ojos, o porque se asignaba a estos pájaros la virtud de dar la vista a sus pichones con el jugo de la planta.

Dioscórides pretendía que aclaraba la vista, y Plinio habla de un coliriollamado CHELIDONIEN.

En el siglo XVII, Schälbern cultiva la misma práctica en amaurosis y cataratas.

Menos antiguamente chelid. se utilizaba contra oftalmias escrofulosas, ulcerosaso no, queratitis, manchas córneas.

La chelidonia ha sido más generalmente usada en la ictericia por los más grandes médicos de todos los tiempos :

Galeno, Dioscórides, Paracelso, Boerhave, Hufeland, Rademacher.

Paracelso lo consideraba como el drenador de aurum en enfermedades del hígado, como nos dice el Dr. Nebel.

Van Helmont la recomienda en la ascitis.

Fue utilizada también en fiebres intermitentes, gota, pituitas, inflamaciones de pecho, congestión de bazo, para la que Recamier le reconoce acción eléctrica.

En su "tratado de las plantas medicinales indígenas", Cazen, lo recomienda contra callos y verrugas, úlceras de mala índole, fistulas, tumores escrofulosos, tiña.

Grand Clement en erupciones vesiculosas y herpéticas.

Es interesante la opinión de Sace que la considera una vulveraria superior aarnica.

En 1896 él médico ruso Denissenko la empleó "intus et extra" en epitelomas y publicó resultados interesantes, confirmados por Robinson en Francia, pero negado por otros experimentadores.

Sin embargo, para su estudio preciso y sistemático hay que llegar a las experiencias homeopáticas de Hahnemann, Buchmann, Berridge, Teste.

LA COMPOSICIÓN QUÍMICA comprende dos alcaloides : LA SANGUINARIA O CHELERYTHRINE que es la más abundante, y en proporción menor la chelidonia.

Hacemos nuestra tintura madre con la planta fresca entera, en el momento de su floración; y con esta tintura preparamos por diluciones homeopáticas, nuestras diferentes dinamizaciones.

Acción general del medicamento

"La experiencia milenaria del remedio estaba en la verdad revelada por lo esencial de su acción, de su electividad : el hígado, LA FUNCIÓN HEPÁTICA.

Toda su influencia irradia de este centro.

Diremos que su dominante es una acción de irritación, de inflamación digestiva, gastro-hepático-intestinal, con electividad típica sobre el hígado.

La flemasia gastrointestinal, es de carácter doloroso y catarral.

En cuanto al hígado, afectado de una manera bastante profunda, hasta la evolución de las hepatitis graves.

Esto lo han confirmado los más recientes experimentos de nuestra escuela, debidos al Dr. Hinsdale, quien administró el producto a conejos, cuya anatomopatología reveló en el hígado un estado más edematoso que congestivo, por estar las células llenas de líquido y por un comienzo de degeneración; esto acompañado de estasis biliar; en total, más hipertrofia que congestión.

En los PULMONES, el mismo autor constató fuerte congestión de las partes superficiales, desorganización del pulmón en las regiones más congestionadas, inflamación y espesamiento de pleura.

En EL DUODENO paresía motriz, acción hiposteniante.

Los estudios clínicos del maravilloso observador que fue Burnett, nos dan por vía indirecta datos precisos, sobre EL HÍGADO DE chelid.

Refiriéndose a las indicaciones de Rademacher, daba a este remedio una acción sobre el hígado interior, células hepáticas y vías biliares.

De sus resultados clínicos, infirió QUE chelid. responde al aumento DE VOLUMEN VERTICAL DEL HÍGADO, mientras que CARDUUS M. responde a su aumento transversal y actúa sobre todo sobre el LÓBULO DERECHO. Chelid. corresponde especialmente, sobre todo en estados crónicos y según Nebel, a superproducción de indol con eliminación, dando al enfermo un olor fecaloide.

Paralela a esta acción central, chelid. posee algunas electividades secundarias pero importantes : SOBRE EL PULMÓN, como lo prueba la experimentación de Hinsdale, quien lamenta que no sea más usado en flegmasias pleuro pulmonares; sobre los RIÑONES irritados con hiperfuncionamiento primero, luego producción de cilinduria y trastornos de eliminación de cloruros; SISTEMA NERVIOSO, donde se desarrolla acción depresiva análoga a la de los narcóticos; SOBRE LA PIEL, que manifiesta producciones herpéticas; SOBRE EL APARATO LOCOMOTOR, con fenómenos reumáticos banales y neuralgia de miembros.

Si tenemos en cuenta estos últimos fenómenos, la acción profunda sobre el hígado y el aumento de eliminaciones úricas, vemos aparecer un remedio para el artrismo que los mejores entendidos atribuyen a trastorno fundamental de hígado.

Notemos que según las observaciones de Burnett el remedio actúa más sobre el lóbulo derecho que el izquierdo y que aquí, según Roger Glénard en su estudio sobre el hepatismo va más fácilmente asociado a las funciones nutritivas y por consiguiente al artrismo, mientras que el lóbulo izquierdo es influenciado por intoxicaciones de origen digestivo.

No se puede considerar como probable que en el origen de la formación del estado artrítico, cuya primera causa fue alimenticia, es el lóbulo izquierdo el primero atacado y que la falla del lóbulo derecho sea una grave agravación y el fin de la evolución de la primera faz.

Características

1) CONSTITUCIÓN : Este remedio parece actuar en todo el organismo pero casi siempre el hígado está interesado y es particularmente indicado en lo que se llamó "temperamentos biliosos" (Kent).

Personas delgadas, secas, con cabellos rubios, tez gris, amarillenta, muy irritables y sujetas a afecciones hepáticas. (CHIRON).

Corresponde más a menudo a sujetos rubios y delgados indolentes, perezosos, no les gusta moverse, propensos a trastornos biliosos, COLEMICOS.

SU FACIES AMARILLENTO puede, en estados agudos y paroxísticos, presentar enrojecimiento oscuro de mejillas sobre fondo amarillento; PUNTA DE LA NARIZ HINCHADA Y ROJA.

PALMA de manos particularmente amarillas.

EL ENFERMO TIENE OLOR FECALOIDE. (sulphur, el olor de la deposición).

EL NIÑO DE chamom., según Teste, está mejor representado por niños rubios, de carácter dulce, pero fácilmente ansiosos.

"La mujer de chamom. habitualmente tiene reglas profusas, generalmente atrasadas, a veces adelantadas y de ordinario demasiado largas.

Sufre a menudo leucorrea que mancha su ropa de amarillo de bilis.

"EN LO PSÍQUICO EL ENFERMO CH. ES INDOLENTE, PEREZOSO, DE MAL HUMOR, PROPENSO A HIPOCONDRIA; la melancolía toma a veces forma religiosa con miedo a condenarse, o ideas de suicidio, miedo de volverse loco.

Intellectualmente sufre el mismo entorpecimiento, teme el trabajo mental.

En estados agudos puede haber delirio tranquilo, seguido de letargia.

Sueño a menudo agitado por sueños fúnebres, con cadáveres, funerales.

Durante el día, gran tendencia a somnolencia que puede ser muy marcada, aún caminando al aire libre". (Duprat).

2) DOLOR SORDO O AGUDO, LOCALIZADO EN ÁNGULO DE OMOPLATO DERECHO : (Kali c., merc., chenop. ant.).

(Para un dolor parecido en ángulo de omoplato izquierdo : sanguin., chenop., clauco, abies, card. mar., podoph.).

Este es el síntoma clave preeminente que da su indicación principal en cualquier parte en que pueda ser útil.

Síndromes generales

Chelid. evoca : 1) el síndrome COLEMICO todos cuyos caracteres tiene 2) el síndrome ARTRITISMO con manifestaciones reumáticas y artríticas, siempre con acentuación de la nota hepática.

3) en estados CRÓNICOS la característica importante, según Nebel, reside en OLOR FECALOIDE DEL ENFERMO que responde a superproducción y eliminación de indol.

4) el síndrome agudo GRIPAL DE FORMA a la vez digestiva, biliosa y respiratoria, con entorpecimiento general, fatiga de miembros, globos oculares doloridos, cefalea derecha.

5) síndrome febril, gripal o bilioso, en fiebre intermitente o continua, acentuada a la tarde, hacia las 16, congestión roja oscura de mejillas sobre fondo amarillo. (Duprat).

Modalidades

Lateralidad

Derecha

Mejoría

a) POR CALOR : los dolores de hígado, estómago, pecho, mejoran por calor; desea leche caliente, líquidos calientes, alimentos calientes, por esta razón.

Sin embargo, los síntomas de la cabeza hacen la excepción, el calor los provoca o agrava (Kent).

b) COMER MEJORA los síntomas mentales (Kent), lo mismo que ciertos síntomas del estómago. (anacard.).

c) POR PRESIÓN PROFUNDA.

Agravación

A las 4 de la mañana y 4 de la tarde.

POR CALOR (DOLORES DE CABEZA).

Por cambio de tiempo.

POR TACTO SUPERFICIAL.

Por movimiento.

Síntomas mentales

El enfermo parece presa de una especie de gran letargia, profunda pereza generalizada y tiene tendencia a escapar de todo esfuerzo.

PEREZA DE TODA LA ECONOMÍA, DEL ESPÍRITU, imposibilidad para pensar, meditar.

Entumecimiento general.

Tiene horror al movimiento, pues su debilidad es grande, sobre todo a la mañana; tendencia a modorra sobre todo después de las comidas.

EXALTACIÓN DEL ESPÍRITU ALTERNANDO CON DEPRESIÓN.

"Con los desórdenes del hígado, escribe Kent, melancolía, pesadez mental, incapacidad de pensar; con los desórdenes del corazón, gran excitación".

Ausencia de memoria.

AGITACIÓN, ANSIEDAD, TRISTEZA, como si hubiese cometido un acto reprensible o fuese a pasarle algo enojoso; tendencia a despecho, a cólera.

ALUCINACIONES SENSORIALES, LO PERSIGUE UN OLORES NAUSEABUNDO A MATERIA FECAL, como si todos los objetos que lo rodean estuvieran sucios. (Dr. Nebel).

El sujeto de sulphur presenta la misma impresión pero el olor parece venir de él mismo, como si su propio cuerpo exhalase olor a materia fecal.

Sueño

Somnolencia con sopor de día, con bostezos.

Sueño agitado sobre todo hasta media noche.

Sueños confusos, penosos, que no puede recordar.

Cabeza

Sensación de frío glacial en occipucio y nuca.

CEFALEA con dolores desgarrantes en la cabeza, PARTICULARMENTE A LA DERECHA, que desciende atrás de la oreja, hacia el omoplato.

Neuralgia sobre el ojo, en malar, parietal, y oreja derechos, con lagrimeo muy marcado y precedida de dolores hepáticos.

Se puede comparar esta cefalea a la de act. rac., que también se localiza arriba del ojo derecho, con irradiaciones a sienes y órbita; pero ésta está ligada a trastornos útero-ováricos, es más marcada en el momento de las reglas y va acompañada de una moral y características particulares, mientras la cefalea de chelid. es periódica, comienza a la mañana al despertar y continúa durante el día, por accesos precedidos de bostezos y escalofríos y puede terminar en ligera transpiración.

El ojo está doloroso al movimiento y a menudo se queja de dolor dorsal en punta de omoplato derecho, característica del remedio, orina oscura, caoba, teazamarilla.

Chelid, RESPONDE A JAQUECAS LLAMADAS "BILIOSAS", con trastornos digestivos y hepáticos.

Los dolores de cabeza, SON PROVOCADOS POR EL CALOR, a la inversa de los síntomas de estómago, hígado, pulmón, etc.; se agravan por movimiento; el sujeto desea estar acostado, perfectamente tranquilo, en pieza oscura y mejora vomitando bilis (Kent).

Vértigos asociados a náuseas y trastornos hepáticos; le parece que los objetos giran y que él va a caer hacia adelante.

Cara

Tez gris sucio, o al contrario, ICTERICIA VERDADERA.

Tez amarilla sobre todo en frente, mejillas, nariz.

Ojos

ESCLEROTICA COLOR AMARILLO.

Calor, escozor y prurito de párpados con enrojecimiento e hinchazón de borde libre.

Dolor presivo en globos oculares agravado mirando arriba.

Parece que el ojo es tan grande que el párpado no pudiera cubrirlo.

Neuralgia supraorbitaria, derecha, principalmente, con lagrimeo profuso y ligada a trastornos, hepáticos, mejoría por presión.

Sensación dolorosa mirando arriba.

Espasmos de párpados.

"Opacidad de córnea y cristalino, confirmación de indicación antigua por la clínica homeopática, irritación bléfaros conjuntival, con o sin orzuelo.

Oídos

Sensación como si le saliera viento de los oídos.

Pérdida del oído al toser.

Aparato digestivo

BOCA :

Mal olor fecaloide objetivo de la boca.

Subjetivamente la siente pastosa, con gusto amargo.

LENGUA CARGADA, CUBIERTA DE CAPA AMARILLENTA, ANCHA, FINA, QUE CONSERVA LA IMPRESIÓN DE LOS DIENTES.

No hay que confundir, por este último síntoma, a chelid. con merc., que tiene lengua grande fina, cargada, conserva la impresión de los dientes, pero con aliento extremadamente fétido, de una fetidez particular y que, a pesar de la gran humedad de boca y lengua, tiene mucha sed; mucha salivación; y cuyas encías son muy esponjosas y sangran fácilmente.

Hydrast., que también tiene lengua extendida, blanca, cargada, hinchada, conserva más o menos la impresión de los dientes; tiene gusto amargo; pero no puede tolerar pan y vegetales; tiene constitución en la cual el cáncer se desarrolla muy fácilmente.

Kali bich. : lengua extendida, cubierta por capa espesa, amarilla en la base y conserva la impresión de los dientes, pero tiene salivación viscosa y otras características que impiden confundirlo con chelid. podoph. : lengua ancha, extendida, húmeda, con sensación de ardor que no tiene chelid.

Hay que comparar aquí ars. alb. y rhus tox.

FARINGE :

Espasmo constrictivo con deglución difícil.

ESTOMAGO :

Desea leche.

(Apis, ars., aurum., bryon., calc., lac. can., merc., nat. mur., nux vom., phosph. ac., rhus tox., silic., staph.) y también cosas ácidas. (hep. sulf. calc., sepia, ver. alb.).

Asco por carne, queso y café.

Prefiere bebidas y alimentos calientes. (ars., lycop., bryon., lac. can.).

Náuseas, vómitos; regurgitación de agua amarga.

Gastralgia; dolores de estómago que irradian hacia la espalda y omoplato derecho.

Comer alivia momentáneamente la gastralgia (anacard., lach., sepia, phosph., ignat., iod.).

Especialmente cuando es acompañada de síntomas hepáticos.

ABDOMEN :

Distensión.

Sensación de opresión alrededor del abdomen.

AUMENTO DE VOLUMEN DEL HÍGADO QUE ESTA MUY SENSIBLE A LA PRESIÓN; para Burnett, este aumento sería sobre todo marcado perpendicularmente, mientras que en card. mar., lo sería sobre todo horizontalmente.

CONGESTIÓN DEL HÍGADO, china tiene también hígado duro, hipertrofiado, muy sensible a la presión, con timpanismo abdominal; piel amarilla, orina turbia y oscura y constipación.

Chionanthus : hígado grande, sensible; lengua cargada y constipación con deposiciones desteñidas, grisáceas y orina muy oscura.

Mag. mur. : hígado hipertrofiado con dolores presivos, no puede digerir leche; constipado; se agrava si se acuesta sobre el lado derecho.

Nat. sulf. : hígado aumentado de volumen, sensible al tacto, dolor con pinchazos; mejora acostándose sobre el hígado, aunque no puede soportar nada ajustado en el talle.

DOLORES PICANTES EN EL HÍGADO, QUE IRRADIAN A LA ESPALDA, AL ÁNGULO INFERIOR DEL OMOPLATO DERECHO (chenop. anthel.).

Dolor que parte de la región del hígado y va hacia el hombro derecho o espalda, debajo del omoplato derecho.
Cólicos hepáticos.

Ictericia.

Cólicos con retracción calambroidea de ombligo y náuseas.

Puntadas sordas arriba del ombligo que lo obligan a doblarse endos. (Jahr).

"Dolores de constricción DE CUERDA ALREDEDOR DEL ABDOMEN.

(Cact., calc. c., conium, coccul., lycop., nux vom., sepia) a la altura del ombligo; la retracción espasmódica de ombligo con náuseas, mejorada por el vino".

ANO Y DEPOSICIONES :

COMEZÓN, HORMIGUEO, puntadas en recto y ano.

Alum. : prurito anal todas las noches y después de la deposición; constipación con deposiciones duras como piedra.

Cina : prurito anal acompañado por la presencia de vermes en el intestino.

Collins. : prurito y ardores en el ano con hemorroides procliventes mejoradas por lociones de agua fría; también es constipada.

Graph. tiene comezón anal, con secreción y tendencia a formación de vesículas eruptivas.

Teucrium : prurito anal con constante irritación, de noche, en el lecho, que le impide dormir.

HEMORROIDES, CONSTIPACIÓN, DEPOSICIONES DURAS, REDONDAS, PARECIDAS A EXCREMENTO DE OVEJA, DE COLOR BLANCO, ARCILLOSO O AMARILLO, ESTA COLORACIÓN AMARILLO ORO DE LA DEPOSICIÓN ES LA MÁS CARACTERÍSTICA DEL REMEDIO.

ALTERNANCIA DE DIARREA Y CONSTIPACIÓN (ant. crud., collins., nux vom., podophyl.).

Aparato urinario

Dolores y puntadas en zona renal.

Frecuentes deseos de orinar.

Orina abundante, espumosa, de color amarillo u oscura, como cerveza.

"EXCITACIÓN SECRETORA E INFLAMACIÓN con aparición de cilindros y mala eliminación de cloruros.

Frecuentes depósitos úricos en la orina y orina icterica".

Aparato respiratorio

Tos seca, hueca, convulsiva con espasmos.

Tos muy penosa a la mañana, con sensación de polvillo detrás del esternón.

Expectoración difícil de esputos mucosos y abundantes.

TOS ESPASMÓDICA, COQUELUCHOIDEA, gruesa desde el principio.

El ataque va acompañado por emisión de pequeñas masas de mucosidades.

Teste empleó chelid. en la COQUELUCHE con éxito, al lado de coral. que era su gran remedio.

SÍNDROME BRONQUITICO, de carácter CATARRAL; especialmente en el niño.

Esto fue confirmado por Teste y recientemente por Rogal.

SÍNDROME ASMÁTICO, en artríticos biliosos, con influencia de los cambios de tiempo y manifestaciones nocturnas; con sensación de constricción en región DIAFRAGMÁTICA.

Constricción en pecho : INSPIRACIONES RÁPIDAS Y CORTAS; DISNEA CON LATIDO EN ALAS DE LA NARIZ, congestión, obstrucción, neumonía sobre todo CATARRAL; pulmón y pleura DERECHOS electivamente interesados EN LA BASE; son las neumonías llamadas biliosas.

Aquí "el Keynote" del DOLOR BAJO EL OMOPLATO DERECHO está presente, con pinchazos a través de la base del tórax con sensación de estar DEMASIADO APRETADO EN LA REGIÓN DIAFRAGMÁTICA.

En estos estados pulmonares se constata frecuentemente MOVIMIENTO DE FUELLE DE ALAS DE LA NARIZ, SOBRE TODO EN EL NIÑO. (DUPRAT).

Ant. tart. también tiene disnea con fosas nasales muy dilatadas y movimiento de latidos de alas de la nariz, sincrónico con los movimientos respiratorios; respiración ruidosa y gran acumulación de mucosidades en el pecho que el enfermo no puede expectorar; lycop. : síntoma parecido en afecciones pulmonares, asma, neumonía, principalmente de base derecha, en afecciones pulmonares y abdominales; los movimientos son habitualmente rápidos y no siempre sincrónicos con los de la respiración.

Phosph. : latido de alas de la nariz, con disnea durante neumonía o congestión pulmonar y pyrog. : durante toxemia grave.

DOLORES EN LADO DERECHO DEL PECHO al inspirar profundamente; DOLORES EN PARTE INFERIOR DE PULMÓN DERECHO; merc. : vivo dolor en la base del pulmón derecho, no puede estar acostado del lado derecho; card. mar. : pleurodinia en parte inferior derecha de tórax, con dolores picantes, peor por movimiento y caminar; kali carb. : dolores picantes a través de la parte inferior del pulmón derecho, luego por presión.

No hay que confundir con bryon. : que se agrava como chelid. por movimiento.

Espalda y extremidades

Rigidez de nuca al desviar la cabeza a la izquierda.

Dolor DE ESPALDA A LA ALTURA DE LA PUNTA DEL OMOPLATO DERECHO, este es el gran "Keynote" y se puede comparar según Farrington a chenop., anthel, pero cuyo dolor se sitúa, no a la altura de la punta del

omoplato derecho sino más bajo y más cerca de la columna vertebral; bryon. difiere por las deposiciones que son duras, secas y marrones o, si hay diarrea que es pulposa, profusa y acompañada de cólico parecido a coloc. y a veces tiene olor a "queso rancio".

Angost. tiene dolor agudo picante va debajo del omoplato derecho hacia el seno, bajo el pezón.

Lycop. : ofrece un dolor parecido a chelid., en la espalda, pero se diferencia fácilmente por los borborismos en hipocondrio derecho, gusto ácido, más bien que amargo en la boca, vómitos ácidos, sensación de plenitud gastrointestinal después de ingerir la más pequeña cantidad de alimento y el carácter de los dolores que son profundos, mientras los de chelid. son agudos y punzantes. (chen. glauci., ran. bulb.) tienen como lobelia syph., dolores de espalda a la altura de la punta del omoplato izquierdo.

Dolores en brazos, hombros, punta de dedos; toda la carne dolorosa al tacto.

"Dolores neurálgicos de miembros.

Las características son : electividad por LADO DERECHO especialmente HOMBRO DERECHO; AGRAVACIÓN POR CAMBIOS DE TIEMPO Y PRESIÓN, MEJORÍA POR CALOR Y NO MEJORÍA POR TRANSPIRACIÓN. Tres particularidades son : fuerte DOLOR EN EL TALÓN, más a menudo a la derecha, como si el calzado estuviese muy apretado, fenómeno producido en varias experimentaciones - EL FRÍO - Pronunciado en la PUNTA DE LOS DEDOS - EL FRÍO GLACIAL del PIE DERECHO (lycop., sulphur). (Duprat).

Rigidez de músculos de miembros inferiores.

Piel

TEZ ICTÉRICA.

ICTERICIA MAS O MENOS MARCADA.

Calor y PRURITO.

SÍNDROME PRURIGINOSO mantenido sobre todo por impregnación biliar, mejorado comiendo.

Manifestaciones herpéticas, eczematosas.

Teste las observó frecuentemente en REGIÓN ESTERNAL y anterior del tórax y ESPALDA.

Producciones ACNEIFORMES, pustulosas sobre todo en la cara.

PRODUCCIONES VERRUGOSAS : su destrucción por aplicación de jugo fresco es un viejo remedio popular y fundado.

Viejas ulceraciones de carácter pútrido.

Chelid. ha sido también utilizado localmente contra psoriasis, lupus, epitelomas.

La DISPOSICIÓN A TRANSPIRACIÓN es a menudo muy marcada al menor esfuerzo.

La piel del enfermo exhala olor fecaloideo.

Relaciones

Antídotos

Chamom.

Complementarios

Bryon., lycop., sulfur y ars. alb.

Le siguen bien y a menudo habrá que recurrir a ellos para completar la cura. (Allen).

DIGITALIS PURPÚREA

Digitalis purpúrea, o guantelete, o guante de nuestra señora, planta herbácea, bianual o vivaz, de la familia de las excofolariáceas, crece espontáneamente en Francia y otras partes de Europa, en bosques, terrenos elevados, rocosos, arenosos y jardines, donde se cultiva por sus flores.

En este caso carece de utilidad para la preparación del remedio.

Su actividad varía según el país de donde procede.

Para el empleo terapéutico se usan las plantas que crecen espontáneamente, en terrenos elevados, secos y rocosos, especialmente en los Vosgos, donde se recogen las hojas de las que se extrae la digitalina.

Contiene gran cantidad de principios activos.

De los tantos nombres que se han propuesto para designarla, adoptaremos el de Pouchet, que se basa en tres grupos : digitonina, digitaleína, digitalina.

La más conocida y casi única que se emplea es la digitalina cristalizada de Nativelle.

La tintura madre para el uso homeopático se prepara con hojas del segundo año, cosechadas un poco antes o al comienzo de la floración.

Acción general del medicamento

Digitalis actúa, sin lugar a dudas, sobre el SISTEMA NERVIOSO : si se administra durante un tiempo demasiado largo, o la dosis ha sido muy elevada, se constatan vértigos, cefalalgia, sensación de pesadez en la cabeza, zumbidos de oídos, oscurecimiento de vista, diplopia, angustia precordial.

También se ha observado verdadero delirio digitalico, cuya característica sería amnesia inmediata y confusión de ideas; sería preferentemente nocturno y análogo al delirio alcohólico.

La digital excita el GRAN SIMPÁTICO, particularmente las terminaciones de su cordón cervical.

Pero su gran acción es la que ejerce sobre EL CORAZÓN : hace primero más lentos los latidos, para acelerarlos después.

Las pequeñas dosis excitarían al centro nervioso regulador del corazón situado en la médula alargada y enviando sus irradiaciones al órgano, determinando así una disminución notable de contracciones cardíacas; una dosis fuerte provocaría una parálisis de este centro, lo que traería aceleración de latidos del corazón puesto que los centros músculo-motores (ganglios cardíacos) actuarían sin ser frenados por el centro moderador.

La digital actúa sobre el corazón, no solamente por intermedio del sistema nervioso, sino también influenciando directamente el miocardio, de manera idéntica a la de las excitaciones directas eléctricas o mecánicas : la arritmia digital ha sido bien descripta en las intoxicaciones producidas por el remedio.

Digitalis tiene sobre el APARATO DIGESTIVO acción emetocatórtica análoga a la del antimonio.

En el riñón determina aumento de excreción de orina y disminución de cantidad de urea.

Espanet dice : "El aumento de frecuencia del pulso bajo la influencia de la digital no podría ponerse en duda, ni ser considerado como un efecto más frecuente que su retardación.

Pero cuando el pulso está acelerado, mayor es la debilidad.

Habitualmente se constatan palpitaciones tumultuosas sin causa apreciable; pulsaciones irregulares e intermitentes, generalmente con una pulsación fuerte y llena entre dos débiles.

Hay sujetos en los que retarda siempre, por efecto inicial sedativo, los latidos del corazón; esto depende de la dosis, a veces es la idiosincrasia.

La digitalina opera mucho más frecuentemente y más puramente este efecto.

Sea como sea, su acción sobre el corazón es directa, asténica en su plenitud y concuerda perfectamente con la sedación simultánea que afecta riñones y órganos abdominales con atonía real, aunque los vómitos iniciales atestiguan cierta irritabilidad gástrica.

La opresión, congestiones torácicas, aflujo desordenado de sangre al corazón ya la cabeza, acusan más bien una debilidad de la inervación del órgano central de la circulación, un debilitamiento de la energía del corazón, aunque y sobre todo, cuando los latidos precipitados de estos órganos, disnea, sensaciones de calor por tufaradas, de los órganos sanguíneos del pecho, denotan congestión activa, flegmasia franca; al contrario, todos proclaman pasividad, o tendencia a este estado asténico.

La debilidad nerviosa, agotamiento intenso, angustia extrema, postración, desfallecimientos, atestiguan que los efectos de digitalis están bajo la dependencia del sistema ganglionar.

Los órganos que estos nervios animan abundan en síntomas que prueban su debilitamiento : éstasis sanguínea en capilares, atonía de vasos linfáticos, entorpecimiento de los órganos de la vida animal, convulsiones, desfallecimientos con sudor general, vértigos con temblor, sensación de ondulación en el cerebro, como si contuviera agua, congestión en la cabeza, palidez del rostro, náuseas, vómitos, sensación de debilidad, como si la vida se retirase del epigastrio, hinchazón de vientre, diarrea, deposiciones involuntarias, retención de orina o flujo urinario, constricción sofocante del pecho, congestión en el pecho, disnea, palpitaciones violentas, efervescentes de la sangre, frío y entumecimiento de extremidades.

"Si la acción electiva de la digital sobre el sistema nervioso ganglionar se hace sentir sobre el corazón por el plexo cardíaco, no es menos real sobre los vasos linfáticos, en los límites de influencia de los ramales terminales del simpático en riñones, estómago, hígado, por sus respectivos plexos.

Los vasos linfáticos, privados de tono, ya no absorben tanto, o cesan de absorber la serosidad que trasuda de las membranas serosas en las cavidades esplánicas y del tejido celular; esta trasudación que constituye el fenómeno de exosmosis aumenta por la astenia general, recayendo indistintamente sobre todos los vasos capilares.

Así se forman las colecciones serosas.

La distensión se manifiesta, la parte edematizada está más a menudo floja y tensa, la piel, fría que caliente y pálida que roja; la hidropesía es pasiva.

La agudeza de los fenómenos hidrópicos, piel caliente, pulso tenso, edema nítido, indicarían scilla.

Una mayor astenia, temblor, debilidad de músculos voluntarios, decoloración de mucosas, indican más bien merc.

La subagudeza con eretismo pediría sulphur; colch., que tiene mucha afinidad para las serosas, puede preferirse a digit. cuando el derrame es subagudo y seroso.

Para diferenciar, en lo posible, la relación de digit. con la astenia de vasos capilares linfáticos, hay que hacer notar que esta astenia recae más generalmente sobre todos los capilares, como lo demuestran la cianosis de labios y otras partes, secreción muy abundante de orina, sudores excesivos, sudores fríos, ictericia, congestiones y estancamientos linfáticos".

Todo esto ha sido confirmado por experiencias de laboratorio, la toxicología y la observación clínica.

Prescripta sin discernimiento neto y demasiado a menudo fuera de su esfera de indicaciones.

Digit. puede ser extremadamente perjudicial; pero administrada según las indicaciones que nos dan su patogenesia y la ley de los semejantes, es uno de nuestros más útiles y preciosos medicamentos cardíacos.

Características

CONSTITUCIÓN Y TEMPERAMENTO : "Comparando la patogenesia de digit. y la de antim., descubrimos entre ambos numerosos puntos de contacto; estas analogías van hasta el estado constitucional al que los dos corresponden de preferencia.

El de los TEMPERAMENTOS VENOSOS, o LINFÁTICOS.

Un aumento de actividad en los linfáticos disminuye la tonicidad de estos vasos por obstrucción y tensión; los materiales destinados a la nutrición, primero convenientemente elaborados y asimilados, lo hacen demasiado o demasiado poco, trayendo debilitamiento general y diatesis venosa o linfática.

Esto corresponde a la constitución de grandes comedores, a las flegmáticas, o linfáticas. (Espanet).

Modalidades

Agravación

Por movimiento; después de las comidas; por la música.

Mejoría

Cuando el estómago está vacío; al aire libre.

Síntomas mentales

El abatimiento, la angustia y la tristeza con temor a la muerte son los caracteres generales de los trastornos psíquicos producidos por digit.; en algunos, se agrega : gran indiferencia y una especie de embotamiento.

Un estado contrario : lucidez espiritual neta, facilidad para el trabajo se observan a veces, como efecto primitivo, al principio de la experiencia, con dosis muy débiles.

Esta acción tiene alguna analogía con al de coffea.

Sueño

Agitado, interrumpido por necesidad frecuente de orinar, erecciones y poluciones, sueños inquietantes.

Sueño turbado por sueños ansiosos, con sobresaltos.

Se sobresalta durmiendo, por el temor ilusorio de que va a caer desde lo alto.

Dormita agitado.

Sueño profundo, efecto consecutivo.

Cabeza

Cefalalgia total, presiva, agravada al atardecer; cefalalgia con dolores atroces en la frente con tufaradas de calor, encandilamiento y zumbidos de oídos.

Puntadas, dolores desgarrantes, en una de las sienes, en un pequeño punto de la cabeza, en el occipucio.

Sensaciones de ondulación, de pulsaciones, de crujidos súbitos durante el sueño, con miedo.

Vértigo sin características marcadas y que puede ir acompañado de temblor.

Ojos

Visión siempre turbia, a veces, completamente abolida.

Discromatopsia : los objetos parecen amarillos, verdes.

Diplopia.

Chispas delante de los ojos.

Estremecimiento, después dilatación de pupilas, a veces con exoftalmia.

A veces los ojos se van hacia la derecha o la izquierda; disposición de los ojos a volverse hacia el costado.

Conjuntivitis con quemosis; inflamación de glándulas de Meibomius.

Lagrimo; dolor presivo enorme en globos oculares, agravado al tocarlos.

Oídos

Zumbidos y tintinear en los oídos, seguido de sordera más o menos completa.

Cara

Pálida, Lívida.

Palidez azulada en individuos que sufren ataques cardíacos; a veces parece que el pulso va a detenerse.

La cara se pone azul; los dedos también.

Color azul de labios y párpados.

Dolores con tirones, calambroideos, puntadas, que aumentan por movimiento y disminuyen apoyando la mano encima, especialmente en los pómulos.

Erupción como excema, con prurito, en mejillas o mentón.

Aparato digestivo

BOCA :

Labios hinchados con erupción parecida a herpes.

Digit. produce fetidez bucal, hinchazón de lengua que puede tomar un tinte azulado y cubrirse de capa blanca; gusto soso, dulzón, fétido; "la boca parecería tapizada de terciopelo".

Todos los autores observan salivación abundante.

GARGANTA Y FARINGE :

Deglución dolorosa por aspereza de la garganta que está como hinchada.

ESTÓMAGO :

Inapetencia completa.

SED VIVA con gran deseo de bebidas ácidas o amargas.

BEBE MUCHO Y COME POCO (sulf).

SENSACIÓN DE DEBILIDAD EN EL ESTOMAGO COMO SI LA VIDA FUERA A EXTINGUIRSE, sobretodo inmediatamente después de comer.

"SENSACIÓN DE DEBILIDAD EN EL ESTOMAGO, DE DESFALLECIMIENTO, COMO SI FUERA ADESVANECERSE; LE PARECE QUE VA A MORIR Y EL COMER NO LO MEJORA; ES UNA DEBILIDAD NERVIOSA, MORTAL, que a menudo acompaña a trastornos cardíacos, hepáticos o intestinales de digit.

No debe sorprender el encontrar mucha postración nerviosa; inquietud y grandebilidad nerviosa; lasitud, debilidad extrema, se desvanece por nada; sensación de debilidad terrible que empieza en el estómago" (Kent).

NAUSEAS, DESEO DE VOMITAR, ACOMPAÑADA POR AGOTAMIENTO MORAL, INQUIETUD Y GRANDEBILIDAD.

El olor de los alimentos despierta náusea mortal, con gran debilidad, y sensación de que va a morir : A VECES LAS NAUSEAS DE ALIVIAN COMIENDO, PERO LA SENSACIÓN DE DEBILIDAD, DE DESFALLECIMIENTO, PERSISTE, náuseas persistentes, sensibilidad extrema en hueco del estómago, desfallecimiento como si fuera a morir, parecen partir de la región gástrica, asociadas a trastornos cardíacos, ictericia y trastornos hepáticos del remedio (Kent).

ABDOMEN :

Con excepción de algunas puntadas en diferentes puntos de vientre, y que se extienden a veces hasta los testículos, los dolores abdominales de digit. son cólicos, pellizcos, retortijones, con borborismos, gran cantidad de gases y diarrea.

Digit. parece tener afinidad especial con el hígado, donde desarrolla una perturbación a veces profunda.

SENSIBILIDAD Y DOLOR PRESIVO EN LA REGIÓN HEPÁTICA; CONGESTIÓN E HINCHAZÓN DE HÍGADO; DOLOR EN EL HÍGADO; PEREZA HEPÁTICA CON ICTERICIA, DEPOSICIONES DESCOLORIDAS Y PULSO LENTO.

DEPOSICIONES :

La constipación es un síntoma primitivo de la acción del remedio.

Hay sobre todo diarrea más o menos abundante con deposiciones dolorosas, a veces involuntarias, lo mismo que la orina, líquida, a veces cenicientas como en la ictericia, otras veces contienen mucus.

Aparato urinario

En el riñón, tiene doble acción según la dosis : a dosis débil, orina muy abundante; a dosis tóxicas y muy fuertes disminución y hasta supresión, después diuresis consecutiva, diuresis producida de golpe por dosis débiles.

Retención de orina; necesidad penosa y casi inútil de orinar, con emisión de orina caliente, ardiente y excesivamente escasa; emisión difícil, como si hubiera estrechamiento de uretra; orina oscura, tirando a marrón y rojizo.

Incontinencia.

Órganos genitales

Apetito venéreo muy exaltado con erecciones y poluciones frecuentes.

Edema de escroto y prepucio.

Hinchazón de testículos : dolor de magulladura en testículos.

Hipertrofia de próstata.

Hipertrofia prostática antigua, con deseo continuo, molesto de orinar.

Aparato circulatorio

Digit. ejerce principalmente su acción sobre este aparato; es un remedio del corazón.

LATIDOS DÉBILES, IRREGULARES, LENTOS, FÁCILMENTE ACELERADOS; DEBILIDAD

EXTREMA DEL MIOCARDIO CUYOS LATIDOS IRREGULARES, SIN ENERGÍA NO SIEMPRE

PRODUCEN PULSACIÓN RADIAL, ARRITMIA; PULSO IRREGULAR, LENTO, DÉBIL, A VECES

INSENSIBLE; todo con edemas de importancia variable, orina escasa, espesa, roja, disnea, insomnio, trastornos de vista, etc. conjunto de síntomas que son calco de los de la ASISTOLIA.

PALPITACIONES DEL CORAZÓN; SENSACIÓN REPENTINA, COMO SI EL CORAZÓN SE

DETUVIERA, EL MENOR ESFUERZO MUSCULAR HACE PENOSO E INTERMITENTE EL

FUNCIONAMIENTO DEL CORAZÓN CUYO MIOCARDIO ESTÁ DÉBIL.

ARRITMIA CON LATIDOS DEL CORAZÓN SENSIBLE AL OÍDO, ANGUSTIA.

PULSO LENTO; pulso violento pero rápido; pulso arritmico.

Aparato respiratorio

Presenta trastornos relacionados con los de la circulación.

Tos con expectoración de mucosidades sanguinolentas en congestión hipostática de pulmón.

Tos especialmente marcada de noche, a medianoche.

Tos molesta, calambroidea, seca provocada por hablar, caminar, beber frío.

Respiración penosa, disneica, sobre todo de noche, estando acostado, y de día, al caminar, estando sentado.

Respiración irregular, muy dificultosa.

Deseo continuo de respirar profundamente.

Cuando se duerme, se diría que la respiración va a detenerse, y despierta con respiración ruidosa (lach., phosph., carbo v.).

Tiene miedo de ahogarse durante el sueño; sabe que cada vez que se duerme sesofoca y teme dormirse por miedo de ahogarse.

Sólo puede respirar jadeando.

Congestión de la base de ambos pulmones; en este caso sólo puede respirar sentado, no puede acostarse; al contrario, cuando no hay nada en los pulmones, digit. está mejor acostado de espaldas, sin almohada.

Espalda y extremidades

Debilidad, pesadez, entumecimiento, una especie de parálisis en las extremidades.

Manos frías; entumecimiento fácil de los dedos; pies fríos.

Piel

En piel, sólo podemos señalar ictericia y anasarca.

Relaciones

Cinchona antidota la acción directa de digit. y aumenta la ansiedad.

DROSELA ROTUNDIFOLIA

Drosera, rosella o hierba del rocío, así nombrada por las gotas que salpican la superficie de sus hojas, y que son producto de una secreción emitida por los pelos glandulares que las cubren y que llevan cada una en su punta una gotita de líquido viscoso, límpido, antiguamente muy buscado por los alquimistas que le suponían virtudes maravillosas, es una planta herbácea, vivaz; de la familia de las droseráceas.

Crece en toda Francia, en terrenos turbosos cubiertos de musgo, en prados húmedos, al borde de ciertos pantanos.

Los animales no la tocan porque el instinto les enseña que les es funesta; afectaría particularmente a carneros, de los mortales : circunstancia que consideran extraña los médicos alópatas, pero que nosotros utilizamos con gran éxito en afecciones de vías aéreas.

Preparamos por maceración, en alcohol de 90º de la planta entera, recolectada al comienzo de la floración, una tintura madre con la que obtenemos por diluciones sucesivas las diversas dinamizaciones.

Acción general del medicamento

Aunque parece tener una acción de cierta extensión, ES LA ACCIÓN IRRITANTE DE DROSELA SOBRE MUCOSA LARÍNGEA Y GRANDES BRONQUIOS, lo que ha consagrado su reputación.

Hahnemann la describió con razón, como el principal medicamento de los ataques de coqueluche y toses coqueluchoideas.

Modalidades

Agravación

Después de media noche, acostado, al acostarse, con el calor del lecho, al cantar, reír.

Mejoría

Por movimiento.

Síntomas mentales

Abatimiento, tristeza, inquietud.

Produce un estado psíquico parecido al que se ha descrito bajo el nombre de DELIRIO DE PERSECUCIÓN : ansiedad, angustia e inquietud continua, como si temiera ser engañado por todo el mundo, como si todos los hombres fuesen sus enemigos.

Este estado va acompañado por agitación, sensación de calor que recorrerá rápidamente todo el cuerpo, pero principalmente la cara, miedo a la soledad, tristeza, impulso al suicidio, particularmente de tirarse al agua.

Cabeza

EL VÉRTIGO DE DROSELA se produce al caminar al aire libre, con tendencia a caer del lado izquierdo.

Cefalalgia al caminar, al inclinarse para escribir, aliviada al apoyarla mano sobre el lado doloroso; sensación de presión, de tirón de adentro a afuera.

Dolor pruriginoso y de excoiación de cuero cabelludo.

ADENITIS CERVICAL (de origen tuberculoso).

Ojos

Dros. produce en ellos algunos síntomas : blefaritis con aglutinación y prurito de párpados; dolores de adentro a afuera que aumentan por tacto; estrechamiento de pupila y ambliopía que se manifiesta cuando se miran pequeños objetos, o se entra de la claridad a pieza oscura.

Oídos

Dros. produce dolores y trastornos de audición : dolores punzantes, cosquilleos en oído externo e interno; ruidos comparables a redoble de tambor lejano; sordera con zumbido de oídos.

Cara

Dolores principalmente en mejilla izquierda, perforantes por sacudidas.

Dolores en articulación temporomaxilar, aumentados al mover la mandíbula.

Aparato digestivo

Tiene pocos síntomas marcados.

EN LA BOCA, determina dolor de dientes con sensación de frío; dolores y aftas en la lengua; sensación de ardor como por pimienta; salivación acuosa.

EN EL ESTÓMAGO, náuseas; pérdida de apetito alternando con hambrecanina; dolor de garra en hueco del estómago, que disminuye por movimientos respiratorios y aumenta cuando se sienta o se agacha.

EN EL ABDOMEN, puede haber cólicos, dolores cortantes, que aumentan si permanece sentado, acompañados por diarrea con tenesmo.

Ganglios tuberculosos abdominales.

Aparato respiratorio

La principal acción de dros se localiza en aparato respiratorio.

Inflamación de mucosa laríngea, laringitis con COSQUILLEO EN LA LARINGEO SENSACIÓN COMO SI LA LARINGE ESTUVIERA CERRADA por cuerpo extraño; ronquera con voz baja hueca; sensación de sequedad y raspadura en garganta.

Tos espasmódica al atardecer y la noche, y accesos de sofocación; tos durante el día por ataques seguidos de gran debilidad, con respiración sibilante; ruido penetrante, agudo, durante la inspiración (tos coqueluchoide); tos con vómitos de alimento primero y de mucosidades enseguida; sensación como si las vías respiratorias no se pudieran dilatar bastante para dar a la respiración toda su libertad.

Tos seca, espasmódica, violenta, día y noche, QUE EXCITA AL VÓMITO; PEOREN CAMA; DURANTE EL ACCESO LA CARA SE PONE VIOLETA; tos incesante, a intervalos tan cortos que apenas encuentra tiempo para respirar y hablar; al toser DOLOR EN EL PECHO, ABAJO DE LAS COSTILLAS Y EN BAJO VIENTRE, dolores ALIVIADOS POR PRESIÓN DE LAS MANOS.

TOS BREVE, RÁPIDA, PRECIPITADA POR ATAQUES VIOLENTOS QUE SE REPITEN BASTANTE A MENUDO, CON AMENAZA DE SOFOCACIÓN : DOLOR AL TOSER ABAJO DE LAS COSTILLAS; EL NIÑO LLEVA LA MANO AL PUNTO DOLOROSO, RUIDO PENETRANTE Y CARACTERÍSTICO DE LA TOS DE LA COQUELUCHE (GRITO DE GALLO) DURANTE LA INSPIRACIÓN, Y DESPUÉS DE CADA ATAQUE DE TOS, VÓMITOS DE ALIMENTO PRIMERO, Y DESPUÉS DE MUCOSIDADES FIBROSAS; LOS ATAQUES DE TOS SOLO CESAN CUANDO HA VÓMITADO O EXPECTORADO ALGO DE MUCOSIDADES, PIERDE SANGRE POR LA NARIZ Y BOCA.

CARA VIOLÁCEA SOLAMENTE DURANTE EL ACCESO DE TOS.

LA TOS SE EXASPERA POR EL CALOR DEL LECHO Y LOS ACCESOS MAS VIOLENTOS VIENEN DESPUÉS DE MEDIANOCHE.

EL NIÑO SE AGITA PORQUE EL MOVIMIENTO LO ALIVIA, TIENE POCO O NADA DE FIEBRE; así tiene, es por accesos regulares de escalofríos y calor; sed después del escalofrío; sudor caliente de noche.

DESPUÉS DE LOS VÓMITOS FRECUENTES, LO QUE MAS A MENUDO SE OBSERVA EN dros., SON ESPUTOS ESTRIADOS DE SANGRE.

NO HAY APETITO; CONSTIPACIÓN; TRISTEZA.

Tal es el cuadro sintomático dado por Chargé de la COQUELUCHE, poniendo adros. por su similitud patogenética como gran medicamento para esta afección.

Queda sobreentendido que dros. no es el único medicamento de la coqueluche ya que considerando coqueluche igual a dros., traería muchos fracasos.

Si los espasmos dominan, habrá que recurrir a cupr. acet.; cuyas indicaciones son las siguientes : tos con accesos repetidos y prolongados de sofocación durante los cuales el niño se pone rígido y pierde el conocimiento; cara y labios azulados; después de la tos, vómitos; rales mucosos en el pecho y espasmos convulsivos.

Se alivia por algunos tragos de agua fría; después del ataque pide beber un poco de agua fría.

Sopor entre los accesos.

Coral. rubr., es otro remedio de la coqueluche, cuando la sofocación es extrema, los ataques son tan violentos que pierde el conocimiento, pierde la respiración, la cara se pone púrpura o negra; hay gran agotamiento después del acceso.

Está particularmente indicado cuando hay agravación de mañana.

Cina, indicada por convulsiones o rigidez del cuerpo durante o inmediatamente después de ataque, en niños que tienen también síntomas de vermes.

En ipeca, la tos va acompañada de mucha angustia, sofocación, en el momento del ataque, el cuerpo se pone rígido y la cara roja o violácea; sangra fácilmente de la nariz, pero sobre todo hay muchos rales mucosos en bronquios, náuseas muy marcadas durante el ataque y finalmente vómito abundante de mucus, que lo alivia.

Se pone rígido por espasmo tónico de extensores, mientras en cuprum. el espasmo de los flexores predomina.

Hay tendencia marcada a diarrea.

En kali carb. los ataques vienen sobre todo después de medianoche, hacia las 3 de la mañana, o al comienzo del día trayendo vómito de alimentos tomados la víspera, al atardecer; hinchazón edematosa de párpado superior que forma un redondel sobre el ojo.

En hyosc., lo que domina es que no se puede acostar al niño sin que le dé tos, peor que nunca; cesa en cuanto lo paran.

Stram., está indicado en la forma francamente convulsiva de la coqueluche; a la violencia de los ataques se agregan movimientos espasmódicos violentos de extremidades; casi siempre las convulsiones cruzan de brazo izquierdo a pie derecho o viceversa; luego la cabeza o solamente los músculos de los maxilares, o labios, agitación, temblor de manos, dar vuelta de ojos.

Gran enrojecimiento de cara, ojos centelleantes, sed viva.

Cuando la coqueluche amenaza con eternizarse por recaídas frecuentes cuya causa cuesta encontrar, sulph., es excelente; inclinación constante a toser, pero la tos aborta lo más a menudo y no llega a toser con facilidad.

La coqueluche deja a menudo tos obstinada, hueca, seca, breve, con ronquera a la mañana; tos excitada por la presencia, en garganta, de mucosidades adherentes difíciles de desprender y que no traga por no saberlas expectorar; a menudo emisión involuntaria de orina durante el ataque; caust., borra entonces la tos y cubre el cuadro de la constitución.

Dolores en tórax, al inspirar y expirar, que disminuyen por presión de la mano y aumentan a veces cuando está sentado y desaparecen por movimiento.

Numerosos autores enseñan que dros. es eficaz en TUBERCULOSIS.

Hahnemann la aconseja principalmente en TISIS LARÍNGEA, con tos, expectoración amarillenta y ronquera.

El Dr. Curie ha producido tuberculosis en gatos por empleo prolongado de dros. en tintura madre y la preconiza en la tisis.

Según sus experiencias tiene acción particularmente electiva sobre ganglios cervicales y abdominales.

En Inglaterra, el Dr. Tyler ha estudiado largamente la acción y empleo de dros. en tuberculosis y ha llegado a la conclusión siguiente: "en numerosas enfermedades, cuando hay antecedentes hereditarios tuberculosos, Dros. puede ser adecuado.

En la pleuresía (de gatos en experiencia, del Dr. Curie, fueron atacados de derrames pleurales), dros. puede ser curativo, pero no hay que creer que curará todos los casos de tuberculosis pulmonar, ganglionar o todos aquellos en que sus antecedentes tengan una historia tuberculosa: actuará solamente en numerosos casos, en que los síntomas lo indiquen y con rapidez a veces sorprendente.

Como ha dicho Hahnemann, dros. es una planta medicinal extraordinaria y es probable que no conozcamos todas sus posibilidades".

Espalda y extremidades

Dros. produce dolores convulsivos y puntadas en la espalda.

Estas puntadas vuelven, como una neuralgia en la cadera.

Rigidez de nuca (Jousset).

Hahnemann ha subrayado su acción sobre los huesos largos, lo mismo que en ciertas articulaciones como el hombro, cadera, tibia terciaña. (Dr. Renard).

Determina dolores en articulaciones, huesos, músculos.

Estos dolores son contusivos, acompañados de puntadas, disminuyen lo más a menudo por movimiento, pero se pueden observar las condiciones contrarias; se agravan por tacto. (Jousset).

Produce también contracción espasmódica de flexores de la mano, temblor en rodillas y una especie de parálisis de piernas que da a la marcha aspecto vacilante e incierto. (Jousset).

Relaciones

Complementarios

De nux vom.

Sigue bien a sambuc., sulf., veratr.

Es bien seguido por calc., puls., sulf.

DULCAMARA

Solanum Dulcamara o "dulce-amarga" es una planta enredadera de la familia de las solanáceas.

Muy común en Francia, crece en lugares húmedos, al borde de arroyos.

El sabor de sus hojas primero dulce, luego amargo, le ha valido su nombre.

Preparamos la tintura madre con la que obtenemos por diluciones sucesivas las diferentes dinamizaciones haciendo macerar en alcohol a 90º flores y tallos recogidos un poco antes de la floración.

Acción general del medicamento

PIEL Y MUCOSAS son de acción preferida por dulcam.

Su acción procede siempre de aquella a éstas, los desórdenes internos que produce, que son flogosis con hipersecreción, tienen casi invariablemente un punto de partida cutáneo, pero sólo se adapta a esta especie de metástasis si son recientes o cuando han perdido este carácter, si permanecen en relación con la piel por pruritos, enrojecimientos, erupciones que aparecen de vez en cuando.

Dulcam. actúa sobre todo sobre pieles finas y es EN LAS REGIONES DONDE LA EPIDERMIS ES MÁS DELGADA (cara, pecho, pliegues de articulaciones, palma de manos, axilas, parte superior interna de muslos,

órganos genitales externos) donde desarrolla sus lesiones que dan fácilmente abundante secreción viscosa y maloliente.

EL SISTEMA LINFÁTICO está también en su esfera de acción, así como EL APARATO FIBRO MUSCULAR : en su estudio patogenético veremos que encaja bien en ciertos dolores reumáticos.

También actúa SOBRE SISTEMA NERVIOSO, particularmente MEDULA Y SIMPÁTICO en los que se han notado numerosos síntomas de depresión.

Numerosas observaciones de toxicología han demostrado que tiene cierta acción sobre el PARENQUIMA RENAL. Características

CONSTITUCIÓN Y TIPO : Dulcam. se adapta mejor a jóvenes de piel fina, permeable, constitución linfática, que se resfrían fácilmente; agitados e irritables, muy friolentos y sensibles al menor cambio de tiempo.

Es uno de los medicamentos prominentes DE LA CONSTITUCIÓN HIDROGENOIDE de Grunovgl. (nat. sulf., thuya, caust., nux mosch., rhus tox, ars. alb., calc. ost., aranea diad.).

Modalidades

Lateralidad

Más bien izquierda.

Agravación

a) POR HUMEDAD, POR FRÍO HÚMEDO, POR TIEMPO LLUVIOSO.

Desarrolla particularmente bien su acción por tiempo húmedo y frío, cuyo estado higrométrico y temperaturas facilitan reacciones de piel sobre mucosas.

Esta influencia de la humedad, del frío húmedo, es su gran característica, el punto central, alrededor del cual irradian todos sus síntomas; agravación por humedad, por frío húmedo, síntomas agravados o causados por cambio de tiempo de calor a frío húmedo, especialmente si es súbito.

Dulcam. ES AL FRÍO HÚMEDO, LO QUE acon. AL FRÍO SECO.

El fin del verano, el otoño con sus días calurosos y sus noches frías y húmedas son especialmente favorables a su acción; responde muy bien por similitud de síntomas, a estados que son consecuencia del tiempo húmedo, enfriamientos, después de haberse expuesto a la lluvia; síntomas debidos a haber estado sentado mucho tiempo sobre la tierra fría y húmeda, o en gente que trabaja en sótanos fríos y húmedos, frigoríficos, etc.

Entre los remedios de tiempo húmedo se puede comparar a aran. diad., calc. ost., calc. phosph., particularmente sensible a la humedad de la nieve derretida, nat. sulf., nux mosch., rhod., rhus tox.

b) Por transpiración resumida; por supresión después de enfriamiento por tiempo húmedo, de erupción cutánea.

c) De noche, por reposo y al calor del lecho.

Mejoría

Por tiempo seco, igual por movimiento.

Síntomas mentales

Se puede atribuir a dulcam. cierta AGITACIÓN MENTAL, con inaptitud para el trabajo y un grado marcado DE IMPULSOS A LA CÓLERA; se ha notado gran impaciencia; DESEO IMPACIENTE DE CUALQUIER OBJETO QUE RECHAZA EN CUANTO LO OBTIENE (cham., cina, rheum, staphy.).

También tiene cierto estado de confusión mental; le cuesta encontrar la palabra justa.

Delirio sin características netas; alucinaciones de oído, y vista a la mañana, al despertar.

Sueño

Estado de somnolencia con bostezos durante el día; durante la noche, produce insomnio con mucha agitación física o sueño agitado con movimientos continuos en la cama.

Sueños espantosos y PRURITO VIOLENTO DE PIEL turban el sueño.

Despierta con pesadilla como si lo llamaran y cree ver cerca de él un fantasma que escapa.

Cabeza

Exteriormente COSTRAS GRUESAS, MARRÓN AMARILLENTO, EN CUERO CABELLUDO QUE SANGRAN FÁCILMENTE cuando las rasca y determinan caídas de cabello.

Produce DOLORES DE CABEZA, en general sordos y estupefactivos, dolores presivos taladrantes de adentro hacia afuera, acompañados de pereza, frío general con sensación de calor en la cabeza y náuseas.

En general aumentan cuando se levanta y disminuyen cuando se acuesta.

Estos dolores son raramente punzantes o pueden localizarse en todos los puntos del cráneo pero, son más notables en occipucio y nuca, van acompañados de sensación de hinchazón.

Dolores de cabeza llamados "reumáticos"; aparecen en tiempo frío y húmedo o al pasar bruscamente de un lugar soleado y caliente a un local húmedo y frío.

Vértigo, a la mañana, al levantarse con temblor y debilidad. (bryon. y lycop.).

Ojos

IRRITACIÓN DE CONJUNTIVA; CONJUNTIVITIS, PTOSIS DE PÁRPADO SUPERIOR; síntomas que aparecen sobre todo relacionados con las condiciones atmosféricas que responden a su acción o al menos a su principal modalidad de agravación; el frío húmedo.

"PUPILAS ALTERNATIVAMENTE DILATADAS Y CONTRAÍDAS.

OJOS SENSIBLES A LA LUZ; SE INFLAMAN FÁCILMENTE".

Oídos

Dolores nocturnos con náuseas, zumbidos, tintineos.

Catarro de oído medio; que aparece o se agrava por frío húmedo.

Cara

Palidez con enrojecimiento circunscripto de mejillas.

VERRUGAS ANCHAS Y LISAS EN LA CARA.

Impétigo con costras gruesas, amarillentas en la cara.

Neuralgia facial con dolores peor a la menor exposición al frío húmedo; dolores penetrantes en mejillas, que se extienden hasta las orejas, precedidos de sensación de frío en las partes atacadas (agar.).

Dolores desgarrantes de neuralgia facial después de desaparición brusca de herpes en la cara.

Aparato digestivo

BOCA :

HIPERSALIVACIÓN : necesidad constante de tragar o expectorar, carraspea constantemente, sobre todo cuando ha tomado frío.

Saliva tenaz, jabonosa y de olor pútrido, es buen remedio en estomatitis mercurial, cuando hay agravación por tiempo húmedo; se ha notado también sequedad de boca con gran sed.

ESTOMAGO :

SED ARDIENTE DE BEBIDAS FRÍAS.

Hambre con repugnancia por todos los alimentos y saciedad súbita.

Tiene acción muy marcada sobre el estómago : produce regurgitaciones con sensación de raspar la garganta, náuseas acompañadas de sensación de constricción en la garganta y vómitos mucosos con calor y ansiedad.

Produce también dolores de estómago con sensación de presión y contracción.

ABDOMEN Y DEPOSICIONES :

Produce cólicos con dolores cortantes, encontrando su simillium en clínica cuando sobrevienen después de exposición a frío húmedo.

Todos los dolores abdominales de dulcam. van acompañados de producción de gas, borborismos; parecen ligados a la existencia de gas cuya emisión los alivia.

Sensación como si fuera a tener diarrea, aliviada por emisión de gases.

DIARREA MUCOSA CON DEPOSICIONES VERDES, VISCOSAS O AMARILLENTAS, A VECES SANGUINOLIENTAS, SOBRE TODO EN VERANO CUANDO EL TIEMPO SE PONE SÚBITAMENTE HÚMEDO Y FRÍO, O DESPUÉS DE LA DESAPARICIÓN DE UNA ERUPCIÓN.

Diarrea alternando con la aparición de una erupción o con dolores reumáticos.

Aparato urinario

Dulcam. determina los síntomas siguientes : deseo frecuente de orinar, con micciones dolorosas gota a gota.

Necesidad frecuente de orinar, después de exposición a frío húmedo.

Debe orinar cuando tiene frío.

Catarro de vejiga después de haber tomado frío en tiempo húmedo y frío.

Iscuria después de caminar descalzo en la humedad.

La orina deja depósito espeso, purulento.

Órganos genitales

Supresión de reglas por humedad o frío húmedo.

Reglas atrasadas, cortas, poco abundantes.

APARICIÓN DE RASH CUTÁNEO ANTES DE LA APARICIÓN DE LAS REGLAS. (bell., conium, que tiene rash durante las reglas profundas; graph.).

Aparato respiratorio

NARIZ :

LA NARIZ SE TAPA CUANDO EL SUJETO SE EXPONE AL FRÍO HÚMEDO, A LLUVIA FRÍA; LE GUSTA RESPIRAR AIRE CALIENTE, PUES EL MENOR AIRE FRÍO TAPA LA NARIZ.

Coriza seca después de haberse expuesto al frío húmedo, con impresión de tenerla nariz obstruida.

El "catarro de heno" que ciertos enfermos padecen en otoño, es a menudo curado por dulcam. cuando las características lo llaman.

BRONQUIOS Y PULMONES :

Dolores sordos, presivos, en el pecho, particularmente del lado izquierdo.

Durante la tos, sufre de dolor constrictivo en el epigastrio, sólo puede toser si apoya fuertemente la mano en la región dolorosa.

Tos peor por frío húmedo, con cosquilleo en la laringe y expectoración fácil.

Tos de invierno o de otoño, peor por frío húmedo, seca, atormentadora.

Espalda y extremidades

Entumecimiento y rigidez de nuca y hombro, después de exposición al frío húmedo, tortícolis. (calc. ost., lachn., nux vom., rhus tox).

Dolor en base de riñones, como después de estar demasiado tiempo doblado en dos.

Lumbago.

Dolores sordos continuos o tironeantes en extremidades agravados por frío húmedo, a la noche antes de medianoche y en reposo; mejorados por movimiento.

Dolores reumáticos más bien musculares que en articulaciones, consensación de frío, sobreviniendo o agravados por tiempo frío y húmedo.

Piel

Piel fina y delicada a la que el frío húmedo trae erupciones.

Prurito agravado por frío.

Erupciones en placas, con escamas, HÚMEDAS Y QUE SUPURAN, después del rascado; rojas o rodeadas de aureola roja como picadura de pulga; sangran al tacto; agravadas por agua fría y tacto; erupciones húmedas en cara, partes genitales, manos, etc. (graph., crot. tig., hep. sulf., mezer., rhus tox, etc.).

Erupción de pústulas pruriginosas que pasan a la supuración y se cubren de costras.

Erupciones costrosas, con adenitis en las proximidades.

Grandes verrugas anchas y lisas en cara y manos, en la cara dorsal.

Las GLÁNDULAS, pueden ser atacadas, los ganglios de cuello, axila, ingle, están a menudo aumentados de volumen, pero raramente dolorosos y esto viene bruscamente a continuación de la aparición súbita de tiempo lluvioso y frío.

Relaciones

Incompatible

Acet. acid., bell., lach.

Antídotos

Camph., cuprum, ipeca, merc.

Complementarios

De bar. carb., cuyas afecciones glandulares son similares; actúa bien después de cal., bryon., lycop., rhus tox., sepia.

Se parece a nat. sulf., en lo que concierne a la humedad, por su tendencia asmática y diarreica y a thuya por sus manifestaciones cutáneas.

EUPATORIUM PERFOLIATUM

Eupatorium perfoliatum, planta originaria de América del Norte, pertenece a las Sinantéreas corimbíferas; viven en praderas y al borde de ríos.

Los indígenas de América la empleaban, en tiempos remotos, en fiebres intermitentes; de ahí los nombres de "Weed" "AGUE WEED" (hierba india, hierba contra la fiebre intermitente).

Sus flores y hojas, tienen gusto amargo y sabor particular, desprovisto de acritud y astringencia.

La tintura madre se prepara con toda la planta fresca en el momento de la floración, macerada en alcohol a 90° y por diluciones sucesivas se obtienen las diversas dinamizaciones.

Acción general del medicamento

Su principal característica es un síntoma que domina la patogenesia : SENSACIÓN DE MAGULLADURA, DE ROTURA, EN TODO EL CUERPO (amica, bellis per., pyrog., bapth., ruta) CON DOLOR CRUEL, PROFUNDO, QUE PARECE SITUARSE EN LOS HUESOS, COMO SI ESTUVIERAN ROTOS, y que ha hecho que, en América, se le de el nombre popular de "BONE SET" (que calma los huesos); DOLORS INTERNOS EN EXTREMIDADES Y ESPALDA, COMO SI ESTUVIERAN ROTOS; SENSIBILIDAD DOLOROSA DE HUESOS; DOLORS EN LAS MUÑECAS COMO SI ESTUVIERAN ROTAS Y DISLOCADAS; DOLOR Y SENSIBILIDAD EN LAS PIERNAS; RIGIDEZ Y DOLORIMIENTO GENERAL CUANDO SE LEVANTA PARA CAMINAR; PANTORRILLAS DOLOROSAS COMO SI LAS HUBIERAN GOLPEADO; DOLORS QUE PARECEN SITUADOS PROFUNDAMENTE EN LOS HUESOS Y LE ARRANCAN GEMIDOS.

Todo esto es característico y puede encontrarse en la gripe, fiebre intermitente, fiebre biliosa, bronquitis (sobre todo en ancianos), y muchas otras enfermedades. (Nash).

También se encuentra otro grupo de síntomas : cefalalgia intensa, consensibilidad de cuero cabelludo y ojos, enrojecimiento de cara, náuseas y postración, dolores en región hepática, constipación y orina fuertemente coloreada.

Síntomas mentales

La única característica es : MUY AGITADO; no puede permanecer en reposo aunque el movimiento no lo alivia; desea estar tranquilo pero no puede.

Cabeza

Dolores penetrantes, latentes, presivos, como si tuviera un gorro de plomo cubriendo, comprimiendo, la caja craneana; dolor, sensación de dolorimiento en el vértex y detrás de la cabeza con dolorimiento en globos oculares.

Dolor occipital, después de haberse acostado, con sensación de pesadez.

Dolor de cabeza periódico cada 30. y 70. día.
Vértigo, sensación de que va a caer hacia la izquierda.
Ojos
CONJUNTIVAS ENROJECIDAS; lagrimeo como en coriza violento.
Sensación de magulladura dolorosa en pupilas (bryon., gels.) en globos oculares que están muy sensibles a la presión.
Aparato digestivo
Lengua cubierta de espesa capa amarillenta.
Gran sed.
Vómitos precedidos de sed.
Vómito al fin del escalofrío febril.
Vomita todo lo que toma y bilis, con gran sensibilidad en epigastrio y temblores.
Sensación de plenitud y dolor en región del hígado, con constipación, como por congestión de circulación del sistema porta.
Deposiciones frecuentes, verdes, líquidas, con calambres y sed terrible.
"Al final de los ataques de bilis puede haber diarrea con emisión de abundantes deposiciones verdes, líquidas o semi-líquidas; si se prolonga y el intestino se ha vaciado mucho, esto desaparecerá y habrá constipación secundaria con deposición clara y sin bilis, de vez en cuando (Kent).
Aparato respiratorio
NARIZ :
Coriza con estornudos y sensación de rotura dolorosa; resfriado gripal con gran dolor en músculos y huesos.
LARINGE, BRONQUIOS Y PULMONES :
RONQUERA SOBRE TODO A LA MAÑANA, como caust., pero mientras éste tiene más sensación de ardor y desolladura, eupat. tiene más sensibilidad DOLOROSA EN EL PECHO.
Ran. bulb. : dolores en el pecho al caminar, al darse vuelta, tiene que apretarse el pecho con las manos porque le duele (bryon., dros., kreos., nat. sulf., sepia); los dos remedios tienen dolores óseos en la gripe, pero en eupat. son más marcados.
En cuanto a la ronquera, si ni caust. ni eupat. pueden curarla el sulfuro será el complementario que lo logrará (Nash).
Tos seca, agotadora, que parece sacudir todo el cuerpo dolorosamente, como si fuera a romperlo y el menor movimiento la agrava.
"Encontramos esta tos en bronquitis capilar a la que cura y tiene en común con bryon y phosph.
Eupat. ES EXCESIVAMENTE SENSIBLE AL AIRE FRÍO, como nux vom. que también tiene dolores de huesos y quiere estar bien abrigado, y en cuarto caliente; a menudo, al levantar ligeramente las frazadas aumenta los escalofríos, lo que también pasa en eupat., por eso se parecen en esto, pero en eupat. hay tristeza abrumadora; el enfermo de nux vom. jamás habla de la muerte, pues está demasiado irascible para dejar este mundo; cosa que no pasa en eupat., que está lleno de tristeza (Kent).
Disnea muy grande que obliga al enfermo a acostarse con cabeza y hombros muy levantados.
Espalda y extremidades
Dolores intolerables en espalda y piernas, como si los huesos estuvieran rotos.
Grandes dolores en todas las extremidades; las pantorrillas parecen haber sido golpeadas; sensibilidad dolorosa en las muñecas como si estuvieran dislocadas.
Doloración y tumefacción de pies.
Dolores gotosos en extremidades e inflamación de tofos articulares, asociados con dolor de cabeza.
Fiebre
Fiebre con estado general parecido al de la gripe.
Lasitud general que llega a postración.
Se puede comparar a bryon. con las diferencias siguientes : en bryon la transpiración es fácil y abundante y en eupat., débil; los dolores de eupat. agitan mucho los de bryon. obligan a permanecer tranquilo e inmóvil.
La agitación de eupat. no calma los sufrimientos como rhus tox., cuyos dolores análogos se alivian por movimiento y cambio de posición.
El período de frío del acceso de fiebre va acompañado de muchos escalofríos y temblores; la sed aparece varias horas antes del escalofrío y a veces de calma antes, pero otras continúa durante el escalofrío y el estado de calor; violentos dolores en los huesos antes del escalofrío; generalmente éste comienza entre las 7 y las 9 de la mañana.
También se da como característica, un vómito de bilis entre el estado de escalofrío y el de calor.
Hay poco o nada de transpiración al final del acceso.

EUPHRASIA

O hiedra de la oftalmía, bonita planta anual, crece comúnmente en prados, canchales de césped, etc.
Preparamos con la planta entera puesta a macerar en alcohol a 90º la tintura madre con la cual obtenemos las diferentes dinamizaciones.

Acción general del medicamento

Actúa de manera electiva sobre mucosas de los ojos y de la parte superior del árbol respiratorio, particularmente de la nariz, donde determina inflamación neta y característica.

Modalidades

Agravación

Al atardecer; en la casa; en el interior; por calor, humedad; después de exposición al viento fuerte del sud; por tacto (hepar sulf., calc.).

Síntomas oculares

Produce violenta inflamación de párpados, verdadera blefaritis; los párpados se ponen rojos e inyectados, principalmente en su superficie interna conjuntival, esto puede llegar hasta la ulceración con secreción espesa y excoriente.

INFLAMACIÓN Y ULCERACIÓN DE BORDE DE PÁRPADOS, con dolor de cabeza.

ENROJECIMIENTO INFLAMATORIO DE CONJUNTIVA, con sensación de presión en los ojos.

INFLAMACIÓN DE CORNEA.

SENSACIÓN DE ESCOZOR EN LOS OJOS COMO POR ARENA.

HINCHAZÓN Y AGLUTINACIÓN DE PÁRPADOS.

SECRECIÓN ABUNDANTE DE LAGRIMAS CORROSIVAS; sobre todo si se expone al viento.

Secreción abundante de mucosidades a veces sanguinolentas, por ojos y párpados.

Fotofobia, sobre todo a plena luz del día y al sol, pero soporta todavía menos la luz artificial (acon. tiene fotofobia sobre todo marcada por la luz del sol y bell. por la luz artificial). (Farrington); la fotofobia va acompañada a menudo por dolores en senos frontales.

Se puede comparar aquí euphr. con los remedios concordantes siguientes : merc. sol. también tiene blefaritis marcada y conjuntivitis parecida, después de enfriamiento; los síntomas que lo diferencian son los siguientes : la secreción es menos espesa que en euphr.; tiene marcada agravación por el calor del fuego.

Ars. también tiene secreción de lágrimas acres y formación de flictenas de córnea; ambas están bien indicados en tales casos, cuando son escrofulosos.

Pero ars. tiene sensación de ardor más marcada, verdadera sensación de ardor como fuego especialmente después de media noche; si no siempre, este síntoma es a veces aliviado por aplicaciones de agua caliente; euphr. no tiene la agitación de ars.

Otro remedio parecido a euphr. es rhus tox., que tiene lágrimas profusas, surgentes, ardientes que excorían la mejilla; secreción purulenta acre; pero el pus es menos espeso en rhus tox. que ataca sobre todo el ojo derecho, euphr.

ambos; en la iritis reumática, rhus tox. tiene dolores como pinchazos del ojo hasta el occipucio, con mucha agitación y angustia, sobre todo durante la noche.

kali iod., kreos., y nat. mur., tienen también lagrimeo abundante y muy irritante, y son comparables aquí con euphr.

Euphr. también está indicado en conjuntivitis de origen traumático, cuando tiene los síntomas arriba descritos.

Acon. buen remedio para los golpes, no tiene aplicación en la secreción acre, en la formación de pequeñas flictenas que pueden sobrevenir simp. y led. pal. serían más parecidos.

Aparato respiratorio

CORIZA FLUENTE Y VIOLENTO, CON SECRECIÓN ABUNDANTE DE LIQUIDO MUCOSO NO IRRITANTE, CON LAGRIMEO ABUNDANTE, PERO ACRE E IRRITANTE.

Ailium cepa, tiene un síntoma parecido, pero con características diferentes : coriza, con secreción excoriente, con abundante lagrimeo no irritante.

El coriza se puede acompañar de tos frecuente y expectoración.

Tos coqueluchoidea solamente de día con lagrimeo abundante.

Órganos genitales femeninos

Amenorrea con síntomas catarrales de ojos y nariz; abundante lagrimeo irritante.

FERRUM METALICUM

Es uno de los metales más antiguamente conocidos.

En estado puro es blanco grisáceo, duro, granuloso o laminoso, muy dúctil.

Adquiere por pulido, un hermoso brillo.

Su densidad es de 7-8 y funde a 1.500°.

Es quizá el metal más difundido en la naturaleza.

Aunque escaso en estado nativo, sus minerales son muy numerosos.

Magnetita, Oligisto, Limonita, Siderosa, etc.

Se encuentra en ciertas aguas minerales, en la constitución de plantas y animales.

Es utilizado bajo las formas más variadas : en polvo metálico y en estado desal cuyo número es considerable; pero en homeopatía se utiliza el hierro metálico, acetato, fosfato y percloruro. (ferrum muriaticum).

Las tres primeras dinamizaciones se hacen por trituración de limadura de hierro con azúcar de leche; la 4a., haciendo una dilución de la 3a. trituración con una mezcla mitad agua, mitad alcohol; la 5a. y siguientes por medio del alcohol puro.

Acción general del medicamento

El hierro y en general todas las preparaciones ferruginosas que son absorbidas por LA SANGRE, determinan en ella cambios notables, lo mismo en LOS VASOS, a los que dilatan; actúan sobre todos los ÓRGANOS RELACIONADOS CON LA HEMATOPOYESIS, MÚSCULOS Y SISTEMA NERVIOSO.

Lo que encontramos en primera línea, en el estudio patogenético de ferrum, es su influencia sobre SANGRE y HEMATOGENESIS; sólo se puede comprender esta influencia colocándose en el punto de vista homeopático, es decir, estudiando su acción fisiológica y terapéutica.

La escuela oficial parte del hecho que el hierro es útil en la clorosis y que la lesión capital de esta afección es insuficiencia de fijación del hierro por los glóbulos sanguíneos.

Resulta de estudios más recientes, que lo que disminuye no es el número de glóbulos rojos sino su riqueza en hemoglobina y por el método cronométrico cuando se da con éxito hierro a una clorótica, se ve aumentar la coloración progresivamente.

De este hecho terapéutico se ha sacado la conclusión de que el hierro interviene proveyendo a la sangre el suplemento de hierro que necesita para su constitución crónica normal.

A esta manera de ver algunos alópatas han opuesto dos objeciones capitales que nuestra escuela había formulado desde el primer día : que la clorosis cura a menudo sin hierro y que los alimentos encierran casi siempre más hierro del que es necesario para la reconstitución de la sangre.

Se ha demostrado que la eliminación cotidiana de hierro, en el hombre sano no excede de 5 centigramos, que se hace principalmente por la bilis y que los alimentos absorbidos cada día, cualesquiera sean, contienen una cantidad superior.

Forzosamente se llega a la conclusión de que cuando el hierro cura una clorosis, opera como todos los medicamentos del mundo, excitando una función perturbada, llevándola a su restablecimiento normal.

Además de que la clorosis puede curar sin hierro, éste está lejos de convenir a todos los casos y muchos se agravan con él; hay que seguir la ley homeopática : el hierro, para ser útil, reclama indicaciones especiales y características particulares.

El desconocimiento de este principio de toda terapéutica, ha hecho que entre los alópatas se hayan establecido las prácticas más opuestas al respecto.

Comencemos pues por analizar la acción fisiológica del metal sobre la hematosi.

Se ha creído injustamente que el uso prolongado de ferruginos ERA CAPAZ DE ENGENDRAR PLÉTORA considerada como la exageración de lo que, por error, se cree ser el estado, la acción fisiológica del hierro, y que es en cambio, un efecto terapéutico en cloróticos.

He aquí la verdad : el primer efecto, en pequeñas dosis, es acrecentar las oxidaciones en el hombre sano, aumentar la riqueza de la sangre en hemoglobina, que trae verdadera plétora, con cierto grado de fiebre : exageración de temperatura y pulso.

Estos son en todos los casos, efectos muy pasajeros, y el uso prolongado de dosis medias o pequeñas, ofrece resultados muy diferentes cuyo cuadro más conocido, es el abuso de aguas minerales ferruginosas, cuadro absolutamente inverso a lo que la teoría ha admitido : decoloración y tinte ceroso de tegumentos : enfriamiento de extremidades con edema; debilidad general y sofocación al menor esfuerzo, palpitaciones cardíacas a la menor emoción, pues sensibilidad y emotividad aumentan en proporciones extraordinarias.

Bajo la más pequeña influencia de esta clase, las mejillas habitualmente decoloradas se colorean vivamente de un rojo oscuro y hay vértigos y síncope; dolores de cabeza, a menudo periódicos, con paroxismos después de medianoche; opresión asmática a la misma hora; epistaxis después de síntomas congestivos al costado de la cabeza. La hemoptisis por abuso de hierro son bien conocidas, a tal punto, que llegaba a suprimirse su uso en personas predispuestas a tisis : las hemoptisis de origen férrico se relacionan con una apariencia florida que puede engañar al observador superficial.

El hierro excita neuralgias en zonas múltiples pero todas con una misma característica : producción de parálisis vaso-motrices bruscas.

La verdadera característica del hierro es : con ese fondo de anemia y plétora serosa; disminución de hemoglobina y de avidez de la sangre por el oxígeno, en la irregularidad y en lo súbito de las reacciones vaso-motrices, bajo cualquier influencia refleja : la coloración súbita de la cara es el grado más ligero; las congestiones viscerales son el último término pasando por hemorragias de superficies mucosas.

La cabeza es la parte que se congestiona más comúnmente; enseguida los pulmones.

Las hemorragias vienen por orden de frecuencia; epistaxis, hemoptisis y finalmente hemorroides fluentes.

Esta es entonces, la forma de anemia propia del hierro y es cierto que la característica general sobre la que hemos insistido basta para que empleado según esta directiva pueda ser útil.

La prueba de que esta indicación es conforme a la ley de similitud es el buen resultado de las dosis infinitesimales, siempre que haya conformidad exacta de síntomas en las principales funciones y sobre todo de los síntomas gastrointestinales.

En otras condiciones no es menos, positivo que el medicamento sólo da éxitos a dosis ponderables aunque sean pequeñas; la ley homeopática así lo prueba.

Se debe saber que el hierro en dosis tales es muy mal tolerado por el estómago; de ahí que sabiendo que poseemos otros medicamentos muy eficaces de la clorosis, variables según las indicaciones particulares, dirijamos la vista a estos últimos, más fáciles de manejar porque deben darse en dosis infinitesimales, o al menos, tienen en esas dosis su máximo de eficacia.

Los síntomas cefálicos del hierro son de dos órdenes : según estén ligados a anemia de cerebro o a congestión encefálica, la distinción de las dos es difícil en ciertos casos.

El primer estado nos recuerda opium; el segundo, los efectos de glonoin.

Los dolores de cabeza tienen bastante postración, agitación y alivian por movimiento, aunque son incapaces de todo esfuerzo serio; somnolencia diurna, después de las comidas sobre todo; agitación nocturna, con período de insomnio cabeza caliente, extremidades frías.

Tiene, como bell., viva excitabilidad sensorial, agravación por el menor ruido, latidos en el cráneo y palpitaciones cardíacas.

La diferencia está en la anemia profunda, que es el fondo común y necesario de las indicaciones de ferrum.

En la aplicación se tendrá en cuenta el estado moral : ferr. no tiene los arrebatos de bell., pero sí una profunda melancolía que puede llegar hasta hipocondría, humor pelear, deseo de soledad, debilitamiento de memoria.

El vértigo es un síntoma importante y además de tener zumbidos de oído aparecen el momento de dejar la posición horizontal para tomar la vertical.

Así se demuestra que los trastornos circulatorios de ferr. dependen del sistema nervioso vaso motor, son de orden vaso dilatador y se determinan sobre todo por acciones reflejas.

Si hubiera necesidad de una demostración evidente se la encontraría en el efecto que produce el metal en el hombre sano y en que alivia síntomas manifiestos de bocio exoftálmico : salida de globos oculares, hipertrofia de tiroides, palpitaciones cardíacas, es decir la triada característica con la forma paroxística, accesos de disnea.

Nada más legítimo que el hierro en la enfermedad de Basedow, cuando se producen mujeres cloróticas y amenorreicas.

Características

1) CONSTITUCIÓN Y TIPO : Actúa sobre todo en sujetos propensos A IRREGULARIDADES EN LA DISTRIBUCIÓN DE LA SANGRE.

Sus mejillas están coloreadas de rojo vivo que les da falsa apariencia de salud floreciente, pero en realidad es marca de plétora ilusoria; cuando no son excitados por una causa exterior cualquiera, sus mejillas toman coloración pálida y terrosa.

Otros síntomas traicionan esta irregularidad de circulación de la sangre : violento dolor de cabeza, martilleante, latente, generalmente periódico, peor después de medianoche; pérdida de sangre por nariz y aflujo de sangre a mejillas; disnea asociada a sensación de congestión de pecho, hemoptisis congestivas, etc.; ENROJECE A LA MENOR EMOCIÓN, que agrava todos los otros síntomas.

Mucosas anormalmente pálidas, sobre todo las de la boca; si se trata de jóvenes solteras las reglas son profusas, de sangre muy pálida, casi acuosa.

Tales sujetos son HIPERSENSIBLES Y SIEMPRE FATIGADOS; sus músculos se ponen blandos y relajados, y al mismo tiempo adelgazan poco a poco, Y SON INCAPACES DE ESFUERZO PROLONGADO.

2) TENDENCIA A HEMORRAGIAS : A menudo las congestiones locales tan características de ferr. van acompañadas de hemorragias por nariz, pulmones, útero, riñones, etc. y el remedio viene así a ser uno de nuestros mejores medicamentos para HEMORRAGIAS EN SUJETOS ANÉMICOS Y DEBILITADOS QUE PRESENTAN LOS SÍNTOMAS MENCIONADOS.

Modalidades

Lateralidad

Izquierda inferior y derecha superior.

Agravación

a) CUANDO ESTA EN REPOSO : "Hay una cosa curiosa que se encuentra en todas las condiciones de su constitución : dolores y sufrimientos sobrevienen durante el reposo.

Palpitaciones, disnea y debilidad sobrevienen durante el reposo; el estado mejora moviéndose suavemente, pero todo esfuerzo fatiga y produce desmayos.

TODO MOVIMIENTO RÁPIDO agrava los síntomas.

Los dolores mejoran moviéndose suavemente en la casa de manera que el esfuerzo no excite ni fatigue" (Kent).

b) POR MOVIMIENTO RÁPIDO, una actividad fatigante, un movimiento que lo excite; todo movimiento rápido, la menor precipitación, provocan oscurecimiento de vista, vértigo, los objetos parecen girar a su alrededor, está

obligado a sentarse; todo esto con cara colorada; cuando está solo y en reposo, la cara se pone pálida y fría, pero el menor movimiento rápido, la menor excitación, la provocan enrojecimiento de mejillas (Kent).

c) De noche, A MEDIANOCHE sobre todo.

d) Mientras transpira.

e) Después de abluciones frías, o al contrario después de calentarse.

f) DESPUÉS DE HEMORRAGIA ABUNDANTE, DE PERDIDA ABUNDANTE DE LIQUIDOHUMORAL CUALQUIERA, como china.

Mejoría

a) AL MOVERSE SUAVEMENTE CAMINANDO LENTAMENTE. (puls.).

"Agitado en reposo, está obligado a mover sus miembros, dolores desgarrantes sordos en miembros, aliviados al moverse suavemente, tranquilamente". (Kent).

b) DESPUÉS DE LEVANTARSE.

c) POR CALOR :Ferr. es un "remedio muy frío", mejorado con calor (EXCEPTO DOLORES DE CUELLO, CARA Y DIENTES, QUE MEJORAN POR FRÍO); la mayoría de dolores se alivian por calor; desea estar al calor y teme al aire frío o la menor corriente de aire (Kent).

Síntomas mentales

TAN-DEPRIMIDO MORAL COMO FÍSICAMENTE.

Hay mucha DEPRESIÓN Y FATIGA DEL ESPÍRITU que está confuso, desanimado.

Una pequeñez lo inquieta y desanima.

HIPERSENSIBLE, extremadamente irritable; una pequeñez lo encoleriza; la más pequeña contrariedad lo pone fuera de sí.

El menor ruido, un simple roce de papel lo vuelve loco; le provoca agitación nerviosa y lo obliga a levantarse y caminar.

"Ferr. se adapta bien a anémicos o cloróticos, jóvenes, que sufren de falsa plétora con tufaradas de calor frecuentes dejando a continuación los tejidos de la cara completamente pálidos, exangües e hinchados : sobrevienen a la menor emoción o ejercicio.

El tipo de ferr. agrega a esta emotividad una irritabilidad constante tal que la más débil contradicción, el ruido más insignificante, le parecen insoportables".

Cabeza

Gran sensibilidad de cuero cabelludo, está obligado a dejar sus cabellos sueltos (Kent).

Dolor de cabeza congestivo, martilleante, latente, como golpes de martillo. (bell., china, nat. mur., glonoin.)

Congestión con dolores de cabeza latentes con cara roja y fría.

Dolor de cabeza con sensación de plétora y distensión de cabeza y cara roja, que mejoran por presión; se agravan por todo movimiento rápido, por tos; dolores latentes en occipucio, al toser, subir una escalera, sentarse o levantarse del asiento, a menos de hacerlo todo muy lentamente, pronto provocará sensación de martilleo doloroso y dilatación, distensión de cabeza.

A veces los dolores de cabeza se alivian caminando suavemente.

Dolores latentes en occipucio y nuca, con irradiación a dientes.

Confusión mental con dolor de cabeza latente.

Dolor de cabeza latente, congestivo, provocado por excitación o enfriamiento, duran 3 o 4 días o una semana.

Al escribir o por ejercicio mental, el dolor de cabeza vuelve.

Dolores de cabeza latentes y desórdenes mentales que acompañan o siguen a hemorragia en parturientas (Kent).

Ojos

Hinchazón y enrojecimiento de párpados.

Los párpados parecen hinchados.

Ojos rojos con dolores ardientes.

Toda clase de trastornos visuales provocados por congestión de cabeza.

Oídos

Zumbidos, tintineos, sobre todo al aproximarse las reglas.

Hipersensibilidad al ruido.

Cara

Pálida, terrosa, pero enrojece fácilmente al menor esfuerzo o la más ligera emoción.

Puede estar ligeramente hinchada, con apariencia de falsa plétora.

Enrojecimiento de cara, con apariencia engañosa de sana frescura, en un individuo que no puede caminar rápido en la calle ni soportar ningún esfuerzo.

"La mujer sensible que tiene necesidad de ferr. met., tiene a menudo la cara roja, y se queja de que nadie la cree enferma; parece en buena salud y sin embargo se sofoca al subir escaleras, se siente débil, fácilmente laxa y desearía estar siempre acostada" (Kent).

Palidez de conjuntivas y labios, así como de lóbulos de las orejas que están descoloridos.

Aparato digestivo

BOCA :

Extrema palidez de mucosa bucal.

Dolor de muelas aliviado por agua fría.

Boca pastosa.

Mal gusto a huevo podrido.

La lengua le da sensación de estar como quemada (Kent).

ESTOMAGO :

HAMBRE CANINA; HA SIDO FIJADO EN LAS PATOGENESIAS : EL DOBLE DE UNA COMIDA ORDINARIA LE PARECE APENAS SUFICIENTE.

HAMBRE VORAZ, ALTERNANDO CON PERDIDA COMPLETA DE APETITO.

Deseo de pan y manteca.

Asco por la carne, opuesto a nat. mur.

Aversión por leche, cerveza, té, tabaco, a los cuales está sin embargo acostumbrado; los vinos dulces le agradan, pero los ácidos, como todas las cosas ácidas le caen mal.

Intolerancia por huevos.

El estómago no digiere nada y sin embargo no hay náuseas : los alimentos entran en el estómago y son enseguida vomitados sin náuseas, como expulsados simplemente por este órgano; la náusea es la excepción de ferr. met.

Parece que no hay en el estómago secreción capaz de digerir el alimento que es vomitado como fue ingerido; vomita apenas ha comido; vomita alimentos a boca llena hasta que el estómago esté vacío (phosph.); regurgitación de alimentos, distensión y peso en el estómago después de comer.

Vómitos de principio de embarazo en una mujer que vomita sus alimentos sin náuseas; es débil, blanda y tiene la cara roja de ferrum.

El estómago de ferr. se parece a una bolsa de cuero que no puede digerir nada, si se lo llena se vacía tan rápidamente como se llenó.

En cuanto se vacía, los vómitos cesan hasta que vuelve a comer.

Lo que vomita tiene gusto agrio.

Vómito de alimentos después de medianoche.

Dispepsia flatulenta (carb. veg., china, arg. nit.).

ABDOMEN Y DEPOSICIONES :

Sensación de dolorimiento de intestinos como de contusión o si hubiera tomado un catártico.

Deposiciones con materia sin digerir, indolora, nocturna o después de comer o beber (china, crot. tig.).

Diarrea con deposiciones líquidas, acres, irritantes.

Diarrea matinal.

"Ferr. met. es, a veces, indicado como remedio contra la diarrea de las últimas fases de la tisis; parará a veces esta diarrea cuando el enfermo está cerca del fin, pero es posible que ya no viva mucho".

Esta diarrea no es generalmente dolorosa, sino molesta; es preferible no suprimirla y dejar al enfermo ir lentamente a su fin (no cortar bruscamente esta diarrea).

El mejor remedio para la diarrea en las últimas fases de la tuberculosis es el lact. administrado en pequeñas cantidades y repetido tan a menudo como el enfermo y los que lo rodean lo deseen (Kent).

Prolapso de recto.

Diarrea y constipación alternadas.

Constipación con deposiciones duras y necesidades ineficaces.

Aparato urinario

RELAJAMIENTO DE ESFÍNTER VESICAL, que es débil e irregular en su tonacidad muscular.

MICCIONES INVOLUNTARIAS EN UN MOVIMIENTO SÚBITO, al caminar toser; cuando el niño juega la orina escapa gota o gota y moja su camisa, pero esto cesa cuando queda tranquilo.

La vejiga está tan relajada que no puede contener la orina y en cuanto se acumula un poco, la deja escapar.

El relajamiento muscular se encuentra aquí, como en todo el remedio (Kent).

Micciones involuntarias peor durante el día.

Orina más escasa y más oscura; albuminosa.

Órganos genitales femeninos

Reglas adelantadas, demasiado abundantes, duran demasiado, con enrojecimiento brillante de cara, zumbidos de oídos (china) : corrimiento de sangre pálida, acuosa y debilitante (Nash).

Las reglas cesan un día a dos, luego vuelven.

Corrimiento abundante, metrorragia o al contrario amenorrea, o simplemente leucorrea sanguinolenta; supresión de reglas con gran excitación nerviosa, cara roja, debilidad y palpitaciones.

Prolapso uterino.

Insensibilidad de vagina durante el coito.

Aparato circulatorio

Palpitaciones del corazón, provocadas por emoción, miedo, excitación, esfuerzo.

Latidos precipitados del corazón, funcionamiento demasiado rápido del musculocardíaco o, a veces, funcionamiento demasiado lento.

RESPIRACIÓN ANÉMICA.

Hipertrofia del corazón.

Sensación de opresión cardíaca.

Pulso lleno, pero blando y que cede bajo los dedos; o pequeño y débil; se acelera, al atardecer.

Sensación de pulsaciones, de latidos a través de todo el cuerpo.

DISTRIBUCIÓN IRREGULAR DE LA SANGRE; aflujo de sangre a la cara, alpecho, CONGESTIONES

LOCALES QUE PUEDEN IR ACOMPAÑADAS DE HEMORRAGIAS, TENDENCIA a hemorragias.

COLORSIS.

"Ciertas personas piensan que se puede tomar dosis ilimitadas de hierro : esto es un grave error.

Es posible que no haya otro remedio que se haya mal prescripto y del que se ha abusado tanto como el hierro.

Así como se puede ahogar una persona con demasiado agua, envenenarlo por exceso de cloruro de sodio, enfermarla por demasiados elementos constitucionales u orgánicos comunes, lo mismo se puede saturar el organismo con hierro y provocar síntomas mórbidos.

Al estudiar los efectos tóxicos de esta sustancia sobre la sangre, se encuentra que su acción principal es reducir la tasa de hemoglobina y por consiguiente la de oxígeno en la sangre arterial; se encuentra también disminución de cantidad de ácido carbónico en la sangre venosa.

Todo esto es paralelo con disminución de glóbulos rojos, el número de leucocitos puede estar un poco aumentado.

El estado de la sangre es el mismo que en la clorosis, el efecto del hierro imposibilita a los glóbulos rojos de acarrear al torrente circulatorio una cantidad normal de hemoglobina.

No debemos confundir los efectos sobre un clorótico.

Habrà en este último, aumento de hemoglobina, de apetito, de la actividad del cuerpo y del vigor, hasta tanto el enfermo tenga la dosis que puede soportar; si se va más allá, los síntomas serán invertidos; en el primer caso, si se da hierro a un individuo cuya sangre es normal, no podrá ser utilizado por la sangre y será rechazado como sustancia extraña e inasimilable, por los intestinos; ferr. es el similar patológico de la clorosis y es entonces el remedio más a menudo indicado; sigue bien a china, pero no debe ser empleado simultáneamente con él.

En fin, no es el remedio exclusivo de la clorosis y debemos diferenciarlo de puls., calc. ost., graph., etc.".

Aparato respiratorio

NARIZ :

Coriza que termina en pérdida de sangre.

Epistaxis por nada, particularmente al agacharse.

BRONQUIOS Y PULMONES :

Tos seca, espasmódica, que comienza después de las comidas, con vómitos alimenticios.

Tos espasmódica sobre todo a la mañana, con expectoración de mucosidades tenaces y transparentes.

Tos con esputos de sangre, sobre todo de noche o a la mañana.

Tos después de pérdida de líquido humoral, sangre etc.

Sensación de estrechez y opresión en el pecho, de constricción; aflujo de sangre al pecho, hemoptisis (millef.).

Espalda y extremidades

Sujeto débil y postrado, debilidad al hablar.

Laxitud y sensación de pesadez en los miembros; necesidad, continua de cambiar de posición.

Lumbago mejorado al caminar lentamente.

Dolores reumáticos mejorados por calor y por movimiento lento; agravados por frío, por esfuerzo o movimiento rápido.

Los dolores de ferr. sobrevienen sobre todo de noche cuando trata de estar tranquilo en su lecho.

Dolores violentos en músculos y a lo largo de los nervios.

Dolores que le dan la impresión de que va a perder la facultad de mover la parte dolorida.

DOLORES EN ZONA DEL DELTOIDES; no puede ya mover el brazo; se pueden encontrar en los dos hombros, aunque ciertos autores pretenden que son más característicos a la izquierda (sticta pulm.; a la derecha : sanguin.).

Puntadas desgarrantes en articulación de hombro y brazo, con pesadez de miembro del lado afectado.

DOLORES PUNZANTES, DESGARRANTES, EN ARTICULACIÓN COXO-FEMORAL, que pueden irradiar a todo lo largo de la pierna que parece pesada.

Calambres en pantorrillas.

Edema de extremidades.

Piel

Acné en cara, pecho y espalda.

Fiebre

Escalofríos particularmente al atardecer, que se prolongan a la noche.

Durante el escalofrío, frío en extremidades con cabeza y cara calientes y mejillas rojas.

Sed durante el escalofrío.

Los escalofríos mejoran después de haber comido.
Calor a la tarde, sobre todo en las manos.
Sudores abundantes y debilitantes.
Sudor nocturno con olor fuerte.
Todos los síntomas se agravan durante la transpiración.
Todos los síntomas febriles mejoran moviéndose suavemente.
En fiebre intermitente, después de abuso de quinina (Kent).
Relaciones
Antídotos
Ars. alb., hep. sulf. calc., puls.
Complementarios
China, alum., hamam.

FLUORIC ACID

O ácido fluorhídrico, anhidro, es un gas incoloro y muy soluble en agua.
Hidratado, y lo más concentrado posible, es un líquido incoloro de densidadde 1,06, hierve a los 30ø, su olor es picante y penetrante; produce vapores blancos espesos y se mezcla en agua en todas proporciones.
Toma su nombre del flúor de donde se obtiene destilando esta sal con ácidosulfúrico concentrado.
Ataca el vidrio, porcelana y la mayoría de los metales y en general todos los cuerpos que contienen silicium.
Para preparar las 6 primeras dinamizaciones se procede a diluir el ácidofluorhídrico líquido en agua destilada, para las tres primeras, luego se hace una mezcla a partes iguales de agua y alcohol para las tres siguientes y a continuación se diluirá en alcohol la 7a. dinamización y las más elevadas.
Acción general del medicamento
Fluoric. acid. actúa principalmente sobre TEJIDOS INFERIORES DEL CUERPO, HUESOS, MÚSCULOS, PIEL Y FANERAS.
Ejerce sobre TEJIDO ÓSEO acción profunda por la cual está muy cerca desilic.
Está indicado por los síntomas que desarrolla, en caries óseas, particularmente en huesos largos y también en necrosis de huesos temporales-mastoideos, así como fistulas dentarias; la supuración que acompaña estas necrosis, es líquida y excoriante.
También actúa sobre MÚSCULOS, determina aumento de resistencia muscular; un individuo, bajo su influencia es capaz de desarrollar más trabajo muscular; tiene más capacidad para soportar el calor del verano o frío del invierno; en una palabra, el remedio tiene un efecto general de producción de vigor; es un tónico muscular.
Se le puede aproximar aquí a rhus tox., que da más resistencia a la fatiga muscular; a ars. alb., a coffea, a FORMI ACID.
Ha producido, y por consiguiente, es útil en la cura DE VENAS VARICOSAS (calc. fluor.).
En la piel, determina un estado de rudeza y dureza al mismo tiempo que erupciones de naturaleza variada.
Hay mucho prurito y pocos remedios desarrollan tanta comezón como él; esta comezón se alivia por frío y aumenta por calor.
Fluor acid. es UN MODIFICADOR DE ACCIÓN MUY PROFUNDA, mirado por Kent, a la vez como antipsórico, antisifilítico y antisicótico.
Es insidioso en su acción y sus síntomas son lentos en aparecer; separecen a los que se desarrollan en las enfermedades más profundas, de marcha crónica, las más constitucionales. (Espanet).
Características
1) CONSTITUCIÓN Y TIPO : Fluor acid. corresponde particularmente bien a síntomas de enfermedades que sobrevienen a gente vieja o particularmente envejecida, en sífilíticos abundantemente mercurializados; en jóvenes con aspecto de viejos. (Allen).
2) SENSACIÓN DE CALOR DESUDADO, DE QUEMADURA.
ACRITUD.
Estas palabras describen los síntomas del remedio.
Al anochecer y a la noche gran calor que parece desprenderse del cuerpo, sin que haya aumento de temperatura; la piel se pone muy caliente; y el cuerpo parece exhalar gran calor.
Los pies queman, escuecen, y los saca del lecho, o busca un lugar frío en la cama, para refrescar los pies o las manos.
La planta de los pies y palmas de las manos transpiran y esta transpiración es acre, excoriante, excoiación entre dedos de los pies, causada por transpiración maloliente, acre, irritante, entre los dedos grandes de los pies; lagrimeo acre, secreción acre por nariz; sudor acre, etc.
Sensación de ardor y dolores ardientes (Kent).
Modalidades
Lateralidad
Derecha superior, izquierda inferior.
Agravación

a) POR CALOR, a menudo se agrava por cosas calientes, estando muy abrigado, por aire caliente; se sofoca un poco como puls., en cuarto caliente; desea refrescarse la cara en agua fría, esto le hace bien; bebidas calientes provocan indigestión o diarrea (Kent).

b) Cuando está de pie o sentado.

c) Por vino y estimulantes. (zincum).

Mejoría

a) POR FRÍO, APLICACIONES FRÍAS, AL AIRE LIBRE.

b) Después de corto sueño, que parece aliviarlo.

Síntomas mentales

"Exaltación y alegría; INDIFERENCIA POR LOS QUE MAS QUIERE, aversión por un mujer, hijos, sus mejores amigos; ha perdido ese buen cariño, noble y ordenado, esa amistad y simple camaradería que existe en todo hombre normal, y sin embargo lucha contra ello; un hombre normal considera a su mujer su mejor amiga y prefiere estar cerca de ella antes que ir a otra parte, para él no hay nada como su hogar; cuando un hombre llega a desear ir a otra parte, abandonar su casa, donde todo lo abruma, no quiere ya a sus hijos como antes, necesita fluor. acid.; sensación de indiferencia por los que más ama.

El estado de sepia, se le parece, pero sepia es más frecuentemente indicado en mujeres; estando lo más a menudo en relación con trastornos útero-ováricos" (Kent).

Reticencia y silencio; permanece sentado en un rincón sin decir nada.

"Esto se parece a puls.; puede encontrarse en locos, que permanecen todo un día sentados en un rincón sin decir nada, sin pronunciar palabra, responden apenas cuando les hablan quedan así, sin hacer nada, comiendo solamente si se les presentan alimentos, se dejan llevar dócilmente a su cuarto en el momento de ir a dormir, no resisten nada de lo que se les quiere hacer; fuera de esto, ocioso y mudo; se encuentra un estado parecido en puls. al cual se parece mucho.

Todo esto es un poco de locura, pero la causa principal es fatiga y lasitud de un cerebro fatigado.

Agotamiento mental provocado por surmenage intelectual o abandonarse a los vicios.

"Personas con surmenage, que han exigido a su cerebro un esfuerzo demasiado grande o prolongado, para instalar o hacer prosperar un negocio o empresa.

Depresión mental, con melancolía y gran tristeza en jóvenes que han dañado su sistema nervioso, por abuso de funciones genitales o masturbación." "Individuos que tienen continuamente necesidad de cambiar de amante; especie de trastorno psíquico que hace que se canse pronto de la misma mujer y cambie sin cesar, yendo de mal en peor, hasta llegar a hacerse completamente disoluto.

Si un hombre joven no puede pasar sin mujer, pero se limita a una sola, esto no es nada; pero si va de una a otra hasta llegar a apostarse en las esquinas para hablarles y desear todas las mujeres que pasen, necesitará fluor. acid.; que convendrá a este estado como picr. ac. y sepia.

Estos remedios convienen particularmente cuando hay este desorden del cuerpo humano y este debilitamiento intelectual, que rebajan todos los sentimientos del hombre, provocándole ese estado psíquico llamado : "bajeza de espíritu".

Esto se encuentra en el "don Juan" (Kent).

Sueño

Deseo continuo de dormir, sobre todo a la mañana y particularmente las últimas horas de medio día Al atardecer, deseo de dormir, casi constantemente, seguido de un largo sueño de noche.

Insomnio toda la noche, seguido a veces hacia la mañana de corto sueño reparador.

A la mañana, al despertar, se encuentra mejor, aún después de haber dormido poco.

Sueño profundo y largo, hasta entrada la mañana, con aturdimiento al despertar.

Muchos sueños, principalmente de muerte o cosas terroríficas; los sueños son a veces tan patentes como si las cosas pasaran en realidad, pero los olvida pronto.

A menudo los sueños no tienen lugar sino a la mañana o después de medianoche.

Cabeza

Sensación de entumecimiento de cuero cabelludo.

Los cabellos pierden brillo, se quiebran, caen.

Alopecia.

Cabeza turbada, principalmente a la mañana al despertar hasta el desayuno, y sobre todo del lado derecho o del occipucio.

Dolores presivos en la cabeza, a veces suben de la nuca o en los huesos de la frente, pero sobre todo en los dos temporales y a los dos lados del occipucio.

Dolor de cabeza que pasa rápido de un punto a otro, con sensación de peligro inminente.

Caries de huesecillos y mastoides con secreción abundante; agravada por el calor (silic. se agrava por frío).

Exostosis.

Ojos

Sensación como si un soplo de aire pasara a través de los ojos; sensación como si se abrieran los párpados a la fuerza y un viento fresco soplara encima.

Fístula lagrimal.

Sensación de prurito intenso en ángulo interno del ojo.

Cara

Calor en la cara, sobre todo después de haber hablado mucho o haber tomado vino.

Gran necesidad de lavarse la cara con agua fría.

Músculos de la cara siempre en movimiento.

Dolores en huesos faciales, ya espasmódicos, ya ardientes o como si allírevolvieran un cuerpo puntiagudo.

Sensación de congestión con calambres en las mandíbulas.

Erupción herpética y costrosa en la cara, en niños; granitos rezumantessobre fondo rojo, con mucho prurito que obliga a rascarse.

Costra de leche con erupción en cuero cabelludo.

Aparato digestivo

BOCA :

Los dientes se deterioran o caen fácilmente; fistula dentaria con secreción.

Afecta particularmente los dientes y maxilar superior.

Sensación de calor en los dientes.

FARINGE :

Ulceraciones crónicas de garganta, muy sensibles al frío.

Fluor. acid., es muy indicado en antiguos sifilíticos, no tanto para ulceraciones faríngeas específicas del segundo período, sino para las que aparecen muy tarde, acompañando a trastornos nerviosos crónicos; muy a menudo la enfermedad se manifiesta de nuevo en la garganta bajo forma de pequeñas ulceraciones gomosas o pequeños promontorios gomosos; silic. es a veces indicado en estos casos, es buen medicamento para eliminar mercurio del organismo; bajo la forma dinamizada, silic. y merc. son enemigos (Kent).

ESTOMAGO :

Desea agua fría, tiene continuamente hambre, sensación de debilidad en el estómago, come todo el tiempo, y esto le alivia el hambre, pero por poco tiempo, como en iod.

Desea alimentos muy condimentados; necesita excitar su apetito y lo consigue con condimentos.

A veces el apetito es variable; a pesar de tener un hambre terrible no puede comer y sin embargo está mejor cuando tiene alimento en el estómago, mejora después de haber comido.

Repugnancia por el café, más tarde, después de haber experimentado lo contrario los primeros días.

Calor en el estómago antes de comer.

Eructos agrios.

Los síntomas estomacales se alivian apretando bien las ropas en esa zona.

Eructos frecuentes de aire.

ABDOMEN Y DEPOSICIONES :

Muchos borborismos y vientos frecuentes, generalmente fétidos.

Sensación de desfallecimiento como de vacío en región umbilical, con necesidad de respirar profundamente y mejorada apretando el vientre.

Dolores en el lado izquierdo del vientre, como en el bazo.

Dolorimiento al nivel del hígado.

Comezón anal, a veces intensa.

El ano sale durante la deposición; después de la deposición, hemorragia hemorroidaria abundante; hemorroides con constipación; prurito alrededor y en el ano, en el periné, etc. (Kent).

Fístula anal.

Deposición diarreica cada mañana después del café y a la noche tarde, con tenesmo y salida del recto, en un hemorroidario.

Deposiciones abundantes, algunas veces con dolores de pinchazos en el abdomen; deposiciones diarreicas cada dos días; un poco más tarde, con retrogresión de las 2 de la mañana hasta medio día.

Antes de las deposiciones, muchos vientos muy fétidos.

Diarrea biliosa con aversión por el café.

Aparato urinario

Antes y después de la emisión de orina, dolor en vejiga o cuello de vejiga; la presión también es dolorosa.

Secreción urinaria disminuida los primeros días, aumentada los días siguientes.

Olor penetrante, picante, de la orina.

Emisión fácil de orina clara, no aumentada, con sensación de bienestar después.

Dado en la hidropesía, cuando está indicado por los otros síntomas, provoca frecuentes y francas micciones que traen gran alivio.

Órganos genitales

MASCULINOS :

Eyacuación menos pronta que antes, y muy abundante, sin ninguna incomodidad después.

Apetito venéreo disminuido sin impotencia, los primeros días, o bien, deseoviolento de coito, con erecciones de noche sobre todo, durante el sueño.

Eretismo sexual intolerable; las erecciones lo tienen despierto de noche.

Tiene reacciones no solamente cuando está cerca de una mujer, sino todo el tiempo.

A veces, al principio de una blenorragia, este estado de priapismo y de deseosexual intenso e irresistible, con edema de prepucio, puede ser curada por fluor. acid., hay casos en que este priapismo pide cantharis, pero estos dos remedios difieren tanto que no se pueden confundir.

FEMENINOS :

Reglas demasiado adelantadas, más abundantes que antes, demasiado largas.

Metrorragia crónica con sufrimientos asmáticos.

Leucorrea amarillenta abundante, corrosiva, con excoriaciones y sensación de ardor en partes genitales externas.

Ulceraciones de cuello.

Aparato respiratorio

NARIZ :

Después de beber, de noche, cerveza o vino, coriza súbito a la mañana, con secreción violenta y a veces irritante.

Estornudos frecuentes a la mañana.

Accesos de coriza que aparecen y desaparecen súbitamente.

Catarro nasal crónico, con ulceraciones; sensación de obstrucción y plenitud dolorosa en la frente.

Ozena con secreción maloliente, acre y necrosis de huesos en la nariz.

BRONQUIOS Y PULMONES :

Necesidad de respirar profundamente a veces con sensación de plenitud en el pecho.

Opresión, respiración difícil, gran disnea.

Dolor en el lado izquierdo del pecho, al respirar.

Aparato circulatorio

Un rasgo excelente y útil de este remedio es su capacidad para producir várices y úlceras varicosas.

Las venas pueden hacerse varicosas en cualquier lugar, en el ano por ejemplo, donde forman hemorroides salientes después de la deposición, pero sobre todo en los miembros inferiores; tendencia a formación de ulceraciones varicosas, indolentes, con bordes inflamados, brillantes, y duros.

Espalda y extremidades

Sensación de calor como de sople caliente en la nuca, que sube hacia el occipucio, o se dirige hacia el hombro.

Dolores dorsales, profundos, en el interior, debajo de la punta de los omoplatos, particularmente estando sentado y sobre todo yendo en coche.

CARIES DE HUESOS, PARTICULARMENTE DE HUESOS LARGOS (aunque indicado también en carie de huesos del macizo facial), con trayectos fistulosos y secreción excoriante, acre.

Fluor. acid. tiene mucha analogía con silic. y le sigue bien cuando ha sido dado demasiado frecuentemente por médicos que no saben que no hay que darlo a dosis muy aproximadas; no solamente antidota las consecuencias del abuso de silic., sino que lo sigue bien.

Uno se sorprende, a veces, al ver en ciertos casos, al enfermo oscilar como un péndulo, entre el calor y el frío.

Tenemos por ejemplo, un enfermo que sufre por calor, por estar demasiado abrigado, por estar en pieza caliente sobre todo a la noche, que está siempre lagrimeante y triste y puede ser rubio; es un sujeto de puls., todo el mundo puede ver esto.

Pero después de haber dado este remedio durante cierto tiempo, se verá que se va al otro extremo, se hace friolento, quiere estar abrigado, busca el calor : silic. ha seguido a puls., y es sorprendente, a veces, ver cuán a menudo, un enfermo que deja puls., va hacia silic. : silic. entra más profundamente en el caso, cura más profundamente y es el crónico natural de puls.

Otros remedios siguen también a puls., pero silic., más frecuentemente que ningún otro.

Pero cuando silic. ha sido administrado durante cierto tiempo y ha hecho al enfermo menos friolento (hay que recordar que silic. tiene a veces algo de puls. : en algunos de sus síntomas se agrava por mucho calor); poco a poco se siente incomodado por el calor, rechaza sus cobijas, quiere estar poco arropado : en ese momento fluor. acid. entra en escena.

Sigue a silic. tan naturalmente como silic. sigue a puls.

Viven los tres juntos.

Hay otros remedios que viven de a tres; los más corrientes son sulph., calc., y lycop.; sulph., ars., y sepia, o coloc., caust., y staph., que a menudo se siguen de manera cíclica.

Volviendo a puls., silic. y fluor. acid. vemos que se parecen de manera general en cuanto a la naturaleza de sus síntomas.

Puls. corresponde a trastornos más agudos, a las primeras fases de una enfermedad crónica, a su período activo.

Quitara o suavizará lo agudo de la enfermedad, y será seguido por un remedio complementario, elegido según los síntomas que sobrevengan.

Hay casos que se agravarían mucho, si se diera al principio un remedio de acción tan profunda como silic., pero si se comienza por puls., se puede suavizar el caso y preparado para recibir útilmente silic. a condición de que ambos parezcan concordar en sus síntomas.

Un caso muy serio, debe recibir primero puls. y una vez preparado el camino puede seguirla silic (Kent).

Gran disposición a mover constantemente toda parte del cuerpo.

Muestra su mal humor en rasgos de la cara y movimientos.

Manos, dedos, pies, maxilares, labios, cejas, párpados y músculos de la cara constantemente en movimiento.

Dolores osteóscopos en los brazos, que pasan del derecho al izquierdo.

A la mañana, al despertar, el brazo, sobre todo el derecho, pesado, como entumecido, o como golpeado y helado.

Entumecimiento de mano y brazo, hacia la mañana con estremecimiento y debilidad paralítica hasta mediodía.

Falta de fuerza, debilidad, torpeza y sensación paralítica en las manos.

Palma de manos rojas, calientes, con sudor continuo.

Dolores y sensación de magulladura en caderas y muslo.

Entumecimiento fácil de piernas.

Sensación de ardor en planta de pies.

Sudor irritante en los pies.

Circulación lenta en las extremidades, manos y pies fríos : al atardecer las extremidades queman, y están como fiebriles porque es la hora de una especie de estado febril, pero a la mañana y de día, las extremidades están frías (Kent).

Piel

Lo que muestra bien que el remedio tiene acción muy profunda, que perturba las funciones de la nutrición y asimilación de manera profunda, es que bajo su influencia, piel, cabellos y uñas presentan síntomas marcados.

Cada vez que esto pasa, sabemos que el remedio que presenta tales trastornos en esta esfera tiene gran profundidad de acción y actúa muy largamente.

Especies de pequeñas costras, aparecen acá o allá sobre la piel, sin ninguna tendencia a desaparecer, los cabellos pierden brillo y caen; su extremo está seco, se quiebran fácilmente.

Las uñas crecen mal, presentan estrías y crecen rápido y mal, se deforman, demasiado gruesas en ciertas partes y demasiado delgadas en otras; quebradizas, se rompen fácilmente.

Tendencia a lesiones cutáneas, donde la piel tiene circulación poco marcada o donde cubre, sin plano muscular subyacente espeso, un hueso, articulación o cartílago, como en las orejas o región de la tibia, fácilmente se forman ulceraciones (Kent).

Dolores ardientes, circunscriptos a diversos lugares de la piel.

Estado particular de aspereza y dureza de la piel, que produce erupciones cutáneas de naturaleza variada.

Hay pocos remedios que provoquen tanta comezón general y persistente; aumentada por calor, y se alivia por frío.

Prurito en la cabeza, cejas, párpados y cara; el prurito se manifiesta sobre todo en parte posterior del cuerpo, espalda, y se agrava hacia la noche, o aparece a la noche y la mañana.

En la mayoría de los casos, el prurito es con pinchazos y hormigueos, circunscriptos en lugares pequeños, que obliga imperiosamente a rascarse, y seguido a veces de granitos agrupados.

Antiguas cicatrices se vuelven pruriginosas, rojas en sus bordes y se cubren de pequeñas vesículas.

Aparición de pequeñas telangetáceas en forma de pequeñas vesículas sanguinolentas, de granitos desde el tamaño de un grano de mijo hasta un grano de cáñamo.

Herpes secos, pruriginosos; ardientes.

Hinchazones varicosas obstinadas.

Úlceras tórpidas; ulceraciones varicosas.

Sensación como si un vapor caliente fuera emitido por los poros de la piel.

Es sobre todo, cuando está acostado, bajo sus cobijas, cuando tiene esa sensación de gran calor, de una especie de evaporación de lejía caliente por la piel; esto no es fiebre; no tiene fiebre, sino una especie de estado crónico de calor, una emisión de calor, sin sed, ni aumento de temperatura (Kent).

Relaciones

Complementarias

Coca, silic.

Conviene después de ars. alb. en ascitis de los ebrios; después de kalicarb. en coxalgia; después de coffea, staph., en el tratamiento de ciertos dolores dentarios; después de phosph. en diabetes; después de silic. y simph. en enfermedades óseas; después de spong. en bocio.

GELSEMIUM SEMPERVIRENS

Gelsemium, jazmín de Virginia o silvestre, o amarillo, es un arbusto trepador de la familia de las Loganiáceas, con bellas flores que abren en primavera y exhalan un delicioso perfume.

Originario de Virginia, en el sud de América del Norte; se encuentra frecuentemente en Texas, Florida y México.

Se prepara la tintura madre con la que obtenemos por diluciones sucesivas las diferentes dinamizaciones; en EE. UU. se utiliza la raíz recién recolectada un poco antes de su floración.

Se puede también partir de trituraciones preparadas con la raíz seca.

Acción general del medicamento

En casos de envenenamiento por la planta, que es extremadamente venenosa, particularmente corteza y sobre todo raíces, el síntoma predominante y universal ES PARÁLISIS DE NERVIOS MOTORES.

Al principio, el espíritu está lúcido; cuando mucho hay estado de ligera estupefacción con pereza mental y de la emotividad.

Avanzando en sus efectos tóxicos, notamos que los esfínteres se relajan, dejan pasar involuntariamente orina y materia fecal.

Más tarde la respiración se hace trabajosa como si la musculatura del pecho no pudiera asegurar los movimientos respiratorios.

Finalmente el músculo cardíaco cede y el enfermo muere.

Considerando estos síntomas como presentando en resumen la acción del medicamento, vemos, si examinamos con más detalles su patogenesia, que parece concentrar principalmente su influencia sobre EL SISTEMA NERVIOSO en que tiene acción electiva, DEPRESIVA Y PARALIZANTE, produciendo primero diversos grados de PARÁLISIS DE CENTROS MOTORES, DESPUÉS DE CENTROS SENSORIALES.

Su acción paralítica va acompañada por cierto grado de ESTUPEFACCIÓN DEL ESPÍRITU Y PEREZA DE PENSAMIENTO y EMOTIVIDAD : parálisis de grupos variados de músculos alrededor de ojos, laringe, pecho, esfínteres, extremidades, etc.

También tiene alguna afinidad con MUCOSAS en que origina INFLAMACIONES CATARRALES más o menos marcadas.

"Los síntomas de gels., son principalmente de ORIGEN CONGESTIVO, (Kent); esta hiperemia pasiva a la vez venosa y arterial, es consecutiva a su acción sobre nervios vaso-motores.

Hiperemia cerebral, aflujo de sangre a cerebro y médula; las extremidades se ponen frías y cabeza y columna vertebral calientes, ardientes; a través de estas lesiones de cerebro y médula se manifiesta la mayoría de sus síntomas.

Asociados a trastornos cerebro-medulares, vemos convulsiones de extremidades, calambres en músculos de espalda y dedos.

Sensación de frío en dedos y a veces piernas heladas hasta las rodillas, mientras la cabeza está caliente y la cara congestionada, violeta; al mismo tiempo, ojos inyectados y pupilas dilatadas (aunque a veces contraídas); el enfermo se siente aturdido, atontado, y habla como si tuviera delirio.

Gran sensación de frío que sube a lo largo de la espalda, desde el coxis hasta el occipucio; escalofrío como si le frotaran la espalda con hielo; los dolores se extienden a lo largo de la columna vertebral, por la espalda, de abajo hacia arriba.

Puede haber, al mismo tiempo que esos síntomas de hiperemia cerebral, sensación de rigidez, contracción hacia atrás de los músculos de la nuca, al punto que no puede doblarse hacia adelante.

Puede haber también, asociados a esto, dolores violentos a lo largo de la columna vertebral y gran sensación de frío. Esto hace pensar en ciertas formas de meningitis cerebro espinal.

Dolores en base de cerebro y nuca.

En todos estos casos, piel muy caliente y temperatura elevada; a veces al principio, escalofríos violentos.

Gels. merece toda atención cuando habiéndose presentado los síntomas con cierta intermitencia, la lengua se carga, aparecen náuseas que terminan en vómitos biliosos, y la fiebre se hace continua con ascensión neta a la tarde; los escalofríos han desaparecido, dejan al enfermo en un estado parecido al de la fiebre tifoidea, con mucha sequedad de lengua, sin sed, dolor de cabeza y embrutecimiento de espíritu; finalmente delirio y todos los síntomas de la fiebre tifoidea se instalan con fiebre alta de tipo continuo.

Los síntomas de gels. sobrevienen con cierta lentitud, de manera casi insidiosa.

Mientras que los casos de acon. y bell. sobrevienen sobre todo en climas fríos y vivos, cuando el frío es muy intenso y la gente que se expone a él es afectada muy rápida y violentamente; los de gels. sobrevienen con cierta lentitud y se encuentran en climas más cálidos, más húmedos, cuyos habitantes tienen reacciones más lentas; sus resfríos, no son provocados por exposición al frío vivo y seco, sino por haber tomado frío después de haber tenido demasiado calor.

LOS RESFRÍOS Y ENFRIAMIENTOS DE INVIERNOS CLEMENTES, TENDRÁN MÁS BIEN NECESIDAD DE gels.

MIENTRAS QUE LOS DE UN INVIERNO RÍGUROSO PEDIRÁN MÁS PROBABLEMENTE aconit. y bell.

Gels. ha sido empleado sobre todo en afecciones agudas de marcha lenta, largas, que tienden a la cronicidad, pero no en afecciones verdaderamente crónicas; no es un medicamento de acción corta, aunque lento en desarrollarse; en esto se parece a bryon. que también conviene a climas cálidos, cuyos males sobrevienen lentamente aunque puede haber súbitos, pero jamás tan violentos como bell".

Características

1) CONSTITUCIÓN Y TIPO : Este precioso medicamento del sistema nervioso conviene especialmente a individuos sensibles, irritables, que tienen marcada debilidad general con muchos temblores (J. H. Martin). Niños, jóvenes extremadamente nerviosos, muy irritables de cara abotagada, que se pone súbitamente roja, violeta, y aspecto estúpido. (Chirón).

2) COMPLETA RELAJACIÓN Y POSTRACIÓN DE TODO EL SISTEMA MUSCULAR CON PARÁLISIS MOTRIZ COMPLETA E INCOMPLETA; TEMBLORES.

Esta postración muscular, parece ser consecuencia de incapacidad de nervios motores para transmitir el influjo nervioso voluntario.

También tenemos este síntoma : LOS MÚSCULOS PARECEN NO PODER YA OBEDECER A LA VOLUNTAD. Este estado se efectúa gradualmente : el primer síntoma es SENSACIÓN DE LAXITUD Y DEBILIDAD GENERAL; se siente tan débil que desea acostarse (pícr. acid.). y tiene tendencia a adormecerse; EL PULSO SE VUELVE DÉBIL Y LENTO PARA REFORZARSE Y ACELERARSE AL MENOR MOVIMIENTO.

Hay que insistir en el valor de este síntoma que es un guía precioso para la elección del remedio en fiebres que le son características : SENSACIÓN DE GRAN FATIGA EN TODO EL CUERPO Y LOS MIEMBROS QUE APARECEN PESADOS, MUY PESADOS; no puede levantar la cabeza de la almohada, ni los miembros de su lecho; parecen demasiado pesados.

Más tarde ESTA LAXITUD GENERAL VA ACOMPAÑADA DE TEMBLORES.

Al tratar de caminar, sus piernas tiemblan o si trata de asir algo, sus manos tiemblan; si trata de sacar la lengua tiembla; todo esto por debilidad.

Si debiéramos dar a gels. un calificativo para indicar su principal característica.

Nash indicaría : el "REMEDIO TEMBLOROSO".

A veces, el temblor es tan intenso que el enfermo está como sacudido por violento escalofrío aunque, en realidad, no haya verdadero escalofrío ni subjetivo ni objetivo.

Esta debilidad llega a esto de PARÁLISIS COMPLETA y entonces aparecen síntomas como los siguientes : los párpados caen (sepia, caust.) a veces se cierran completamente.

LOS DEDOS YA NO OBEDECEN, no puede hacer con ellos lo que desea, ni dirigir sus pies cuando camina, aunque el sensorio permanece intacto pero con un ligero sopor; sabe perfectamente lo que quiere o debe hacer, pero no puede.

Y esta debilidad muscular es tan marcada que se encuentra en todas partes.

ACOMPAÑA NEURALGIAS, ESPASMOS Y CONVULSIONES que provoca y cura el remedio; en la neuralgia de trigémino de gels., hay ptosis de párpado del mismo lado por debilidad.

PARÁLISIS DE GRUPOS VARIADOS DE MÚSCULOS, en garganta, laringe, esfínteres, pecho, extremidades, etc.

3) HIPERSENSIBILIDAD NERVIOSA : Gels. está a menudo indicado en trastornos nerviosos motivados por BRUSCA EXCITACIÓN O EMOCIÓN VIOLENTA, malas noticias, temor por suceso imprevisto; o también en trastornos nerviosos ligados con gran timidez a vencer; uno de los efectos más frecuentes que los acompañan es diarrea.

Deposiciones involuntarias provocadas por susto o sorpresa acompañada de susto, espanto.

Bajo la impresión de una sorpresa se pone débil, se siente agotado; todos sus miembros se debilitan y es incapaz de resistir las contrariedades; a la menor, su corazón palpita.

Esto se parece a arg. nit. que tiene este síntoma singular : al vestirse para ir al teatro, es presa de súbito ataque de diarrea que provoca más o menos laxitud, y se ve obligada a evacuar varias veces antes de terminar de vestirse.

Los que deben aparecer ante un auditorio, se ven impedidos de hacerlo por ataque súbito de diarrea.

Una dama tiene un ataque súbito de diarrea en el momento que debe encontrarse con amigos que sabe que la abrumarán, la agitan; LA APRENSIÓN PROVOCA DIARREA.

Estos síntomas se encuentran en arg. nit. que está tan estrechamente ligado con gels., que en ciertos momentos, uno parece hacer el trabajo del otro (kent).

Modalidades

Agravación

Por tiempo húmedo, niebla, tormenta; por emociones, malas noticias, agitación nerviosa cuando piensa en sus dolores (calc. ph., etc.).

A las 10 de la mañana.

Por tabaco.

Mejoría

Al aire libre.

Por estimulantes.

Después de orinar abundantemente.

Inclinándose hacia adelante.

Síntomas mentales

El sujeto de gels. ES LENTO, PEREZOSO, DORMIDO; TEME AL MOVIMIENTO.

SUS FACULTADES MENTALES ESTÁN ENTORPECIDAS : no puede pensar claramente ni fijar su atención. Desea permanecer tranquilo; no quiere que le hablen, ni siquiera tener a alguien cerca para acompañarlo, aunque éste permanezca silencioso.

Este deseo de soledad, no es provocado como en sepia por tristeza o porque todo lo abruma o lo irrite, gels. quiere, por sobre todas las cosas, estar en paz, porque tiene pereza para hablar y pensar y la presencia de alguien cerca, aún silencioso, lo fatiga.

Este estado de espíritu se suspende a veces temporariamente para dar lugar A ESTADO DE EXCITACIÓN; pero éste no es el efecto verdadero del remedio, es el resultado de la reacción del organismo, como el insomnio sucede en opium al sopor y torpeza característicos.

SOBREEXCITACIÓN EMOCIONAL, después del miedo, shock mental, que CONDUCE A TRASTORNOS FUNCIONALES, consecuencias molestas de susto, emoción, mal noticia.

Trae de actores.

EL NIÑO SE AFERRA A SU NODRIZA GRITANDO, COMO SI TUVIERA MIEDO DE CAER.

Esto se encuentra también en Bórax, con la diferencia que en éste, esto sólo aparece cuando la nodriza se inclina para poner al niño en su cama, o en cada movimiento de descenso al acunarlo.

Sueño

Muy agitado, le cuesta mucho dormir; la menor agitación lo mantiene despierto.

Cuando tiene fiebre, sueño profundo, comatoso; cuando no tiene este sueño comatoso, está en estado de excitación nerviosa que lo mantiene despierto a causa de un aflujo de pensamientos al cerebro, pero pensamientos vagos, sin coordinación porque el cerebro no funciona ordenadamente (Kent).

Cabeza

Dolores de cabeza de TIPO CONGESTIVO.

El dolor más violento está en el occipucio donde hay a veces sensación de latidos, martilleo : puede tener una sensación semejante en base del cráneo donde cada pulsación cardíaca se siente como un martillazo.

Dolores de cabeza tan violentos que no puede estar parado y debe acostarse, por estar completamente agotado de laxitud como si estuviera paralizado por el dolor.

Conviene mencionar un dolor de cabeza occipital que obliga a caminar o girar la cabeza sobre la almohada de un lado a otro.

Pero en general hay alivio cuando está acostado, la cabeza bien calzada por las almohadas y tranquilo; durante ese tiempo, cara congestionada, roja, violeta oscura, y el enfermo está completamente embrutecido.

Un instante después de aparecer el dolor de cabeza, toda la cabeza parece congestionada, el dolor es tan violento, que no lo puede describir; pierde la facultad de decir sus síntomas, queda embrutecido en su cama, inmóvil, calzado en sus almohadas, pupilas dilatadas, cara marmórea, extremidades frías.

Gels. tiene también dolores de cabeza de carácter neurálgico entemporales y arriba de los ojos, acompañados de náuseas y agravados por vómitos que de ellos resultan; SE ALIVIA DESPUÉS DE MICCIÓN ABUNDANTE, ES DECIR QUE LA ORINA HASTA ENTONCES POCO ABUNDANTE AUMENTA SÚBITAMENTE Y EL DOLOR DE CABEZA SE CALMA (Kent).

Cefalea sorda, fatigante en base del cerebro; desea acostarse, la cabeza alta y quedarse completamente tranquilo; se agrava por trabajo mental, humo de tabaco, acostado con la cabeza baja, es más fuerte por el calor del sol, desaparece cuando se pone (glonoin., nat. mur., sang., spig.); mejora temporariamente por presión y estimulantes, es a menudo consecuencia de una salida de régimen, "de un desarreglo".

Jaqueca precedida por trastornos de la vista, hasta por una especie de ceguera; (cyclam. : dolor de cabeza con ceguera a la mañana, centelleo delante de los ojos, acompañado de vértigo; además los objetos parecen girar.) (Iris vers., kali bich; oleand. cuya cefalea va acompañada de sensación como si los ojos tiraran hacia atrás).

La mayoría de estas jaquecas no van acompañadas por muchas náuseas y vómitos, sino por gran DEBILIDAD Y TEMBLORES característicos.

Durante la jaqueca, está embrutecido, estúpido y su cara roja oscura, como si estuviera bajo la influencia del alcohol; además puede tener sensación de círculo alrededor de la cabeza carbón ac., iodine, merc., sulph., sang. e iris vers. tiene jaqueca parecida a gels. pero con mucho más náuseas y vómitos y mucho menos, a veces nada, de debilidad y temblores.

DEFLOR. tiene durante la jaqueca, abundante flujo de orina, pero que no aliviana.

Ojos

Neuralgia supra orbitaria con contracciones y tirones musculares; sensación de magulladura detrás de las órbitas.

DILATACIÓN DE PUPILAS, por parálisis del tercer par (nervio ocular común) que inerva fibras circulares del iris; en consecuencia como ya no hay resistencia a la acción de las fibras radiantes, la pupila se dilata.

En bell. al contrario, la pupila se dilata por acción excitante sobre el ganglio simpático que inerva las fibras radiantes del iris y cuya acción sobrepasa entonces la de las fibras circulares.

Physost., contrae la pupila, excitando el nervio motor ocular común, por eso actuará sobre la pupila dilatada por bell. (Dewey).

DESIGUALDAD PUPILAR.

PARÁLISIS DE DIVERSOS GRUPOS MUSCULARES DEL OJO : DIPLOPIA por paresiade músculos del ojo; ESTRABISMO; PTOSIS DE PÁRPADOS (sepia; caust., rhus en casos de ptosis de origen reumático).

Visión turbia : los objetos se ven como en unaniebla. (cyclam., phosph.).

Gran inflamación con opacidad del cuerpo vítreo; inflamación serosa,retinitis albuminúrica.

Cara

Cara que se pone súbitamente rojo oscuro y caliente con expresión estúpida. (opium, bapt.).

Cara marmórea, violácea con vértigo y vista disminuida.

Contracción de músculos de la cara, particularmente alrededor de laboca; temblor de mentón.

Neuralgia facial, con dolores punzantes, que aparecen bruscamente y demanera tal, que hacen sobresaltar al enfermo al mismo tiempo la cara está congestionada y sus neuralgias van acompañadas de vértigos y trastornos de visión.

Aparato digestivo

BOCA :

Sensación de sequedad en la boca.

Lengua cubierta por ESPESA CAPA AMARILLENTA.

Lengua hinchada, tan abultada que apenas puede hablar.

TEMBLOR DE LENGUA, cuando la saca.

PARÁLISIS DE VELO DEL PALADAR.

El enfermo traga difícilmente y apenas articula las palabras.

FARINGE :

Garganta irritada y sensible, con inflamación que acompaña un catarro nasal.

Dificultad para tragar, sobre todo alimentos calientes.

Puntadas dolorosas en el oído, al tragar (hep. sulph., nux vom.). sobre todo ala derecha.

Sensación de cuerpo extraño en la garganta, que no puede tragar.

DISFAGIA POR PARÁLISIS; parálisis post-diftérica.

El estado parético de músculos de la faringe explica el empleo de gels. en estasparálisis post-diftéricas.

ESTOMAGO :

En general el enfermo de gels. NO TIENE SED.

Hipo peor de noche.

Sensación de vacío y debilidad en el estómago o como si tuviera un peso.

Náuseas y vómitos.

Pyrosis.

INTESTINO Y DEPOSICIONES :

Sensibilidad de paredes abdominales.

DIARREA SÚBITA, INDOLORA, INVOLUNTARIA, COPIOSA, DE COLOR CREMA(calc. carb.) O VERDE (CONSECUENCIA DE MALA NOTICIA). (phosph. ac.).

POR MIEDO (opium; ver. arg. nit. en casos crónicos sobre todo; y puls.).

O DE CUALQUIER EXCITACIÓN EMOCIONAL, CON LENGUA BLANCA O AMARILLA.

Aparato urinario

Emisiones frecuentes y abundantes de orina clara como agua, límpida, acompañadas de escalofríos y temblores.

Parálisis parcial de vejiga; sensación de micción incompleta, miccionesintermitentes, la micción se detiene y después recomienza; (clemat.); incontinencia de orina.

Órganos genitales

MASCULINOS :

Igual estado de laxitud y debilidad, característica general del remedio; impotencia, incapacidad, relajamiento de órganos.

Postración y pérdida de energía de órganos genitales; escroto cubierto de sudor;espermatorrea sin erecciones; impotencia por onanismo.

Gonorrea al principio; secreción poco abundante; dolores débiles salvoen el meato donde hay mucho escozor.

FEMENINOS :

VAGINISMO.

Sensación de pesadez en útero; sensación como si el útero fuera apretado por unamano (cham., nux vom., ustil., cactus).

Reglas atrasadas, poco abundantes.

Afonía y dolor de la garganta durante reglas.

Dismenorrea neurálgica con flujo poco abundante.

Reglas atrasadas, poco abundantes, acompañadas de dolores agudos como de parto,en región uterina, con irradiaciones a espalda y caderas. (cimic.).

Gels. está a menudo indicado durante el parto cuando hay dilatacióndifícil por rigidez de cuello.

Aparato respiratorio

NARIZ :

Coriza agudo en su primera faz; sensación de plenitud en cabeza y sobre todo en base de nariz, fiebre con escalofríos, que corren de abajo hacia arriba a lo largo de la espalda, con gran deseo de aproximarse al fuego, violentos estornudos y la nariz deja correr líquido acre y excoriante; el resfrío tiene tendencia a descender a la garganta y todo ello va acompañado de gran laxitud y violenta sensación de pesadez en miembros. Predisposición a resfriarse al menor cambio de tiempo sobre todo si la temperatura pasa de caliente a más fresca.

LARINGE, BRONQUIOS Y PULMONES :

AFONÍA POR PARÁLISIS DE CUERDAS VOCALES.

Tos seca con pecho doloroso y coriza fluente.

Afecciones espasmódicas de pulmón y diafragma.

Extrema lentitud de respiración con sensación de peso en el pecho y postración.

Esto nos muestra que el estado parético se puede manifestar en éste como en todos los otros aparatos del organismo.

Aparato circulatorio

Palpitaciones; sensación como si el corazón fuese a dejar de latir, y de muerte próxima; debe levantarse y caminar para encontrar alivio.

Espalda y extremidades

SENSACIÓN DE DOLOR PESADO, DE PESADEZ DOLOROSA; EN MASAS MUSCULARES, RELAJAMIENTO Y PARÁLISIS DE TODO EL SISTEMA MUSCULAR FATIGA LOS MÚSCULOS PARECEN MAGULLADOS; EL MENOR, MOVIMIENTO FATIGA.

TEMBLOR EXCESIVO de todos los miembros y debilidad excesiva (agaric., conium, mygale, merc., stram., sécale, arg. nit., phosph.).

PERDIDA DE CONTROL MUSCULAR; está torpe y los músculos ya no obedecen a su voluntad.

"El temblor, la falta de coordinación de movimientos y la debilidad parésica se observan sobre todo con gran excitación; esto se encuentra también en afecciones febriles y puede persistir después de su desaparición; gels. es muy útil en casos de parálisis que han empezado durante un período de fiebre" (Kent).

Dolores agudos de localización profunda en músculos y articulaciones.

Dolores en cuello, sobre todo en región esternal y clavicular.

Dolor en región sacro lumbar, que suben de abajo hacia arriba, a lo largo de los músculos de la espalda, o irradian a caderas y extremidades inferiores.

Calambres en músculos del antebrazo; calambre de los escritores.

Ciática obstinada, con dolores ardientes, que sobrevienen en ataques, acompañada de temblores y gran debilidad de miembros inferiores, del lado enfermo; los dolores se agravan por reposo, cuando comienza a moverse, como rhus tox, y mejoran por continuación del movimiento y transpiración.

Neuralgia crural anterior.

Contracción espasmódica de dedos grandes de los pies.

Piel

Erupción parecida a la de la rubéola, principalmente en la cara; piel roja y pruriginosa; síntomas catarrales con gran postración, estupor y ausencia de sed.

Fiebre

Jamás tiene la forma activa y violenta de la de acon. y bell.

Sus caracteres son : escalofríos sin sed, a lo largo de toda la columna vertebral, como la de frío que sube de sacro a occipucio, durante el estado de calor, calor ardiente en todo el cuerpo, pero sobre todo en la cara, con sensación de plenitud en la cabeza; en fin, transpiración abundante, agotadora.

Todo esto ACOMPAÑADO DE MUCHO SOPOR, ABATIMIENTO, Y GRAN POSTRACIÓN;

MUCHO DOLOR MUSCULAR, Y GRAN SENSACIÓN DE PESADEZ EN MIEMBROS; TAMBIÉN HAY AUSENCIA DE SED.

Gels. está indicado en FIEBRE INTERMITENTE con ESCALOFRÍO NERVIOSO característico, a saber GRAN TEMBLOR CON CASTAÑETE DE DIENTES, sin que haya al mismo tiempo verdadera sensación de frío ni objetiva ni subjetiva; EL ENFERMO TIEMBLA DE TAL MODO QUE PIDE QUE LO SUJETEN, esta clase de escalofrío se encuentra también en histeria o enfermedades orgánicas del corazón. (Nash).

En la POSTRACIÓN NERVIOSA QUE PRECEDE A LA FIEBRE TIFOIDEA y que tanto le parece, gels. es un medicamento de primer plano dado a tiempo, puede hacer abortar una fiebre tifoidea.

Nash lo coloca entre bapt., y bell.

Como bapt., tiene gran postración, gran sensación de dolorimiento muscular, pero no tiene la lengua ni las otras características del medicamento; ambos tienen coloración rojo oscuro de la cara con expresión de completo embrutecimiento, pero bapt. ataca sobre todo el sensorio; el paciente se duerme, mientras trata de responder a las preguntas que le hacen, mientras que en gels. este estupor es causado por la postración nerviosa que trae; en fin la fetidez de las deposiciones, sudores y orina de bapt. no se encuentran en gels.; pero la gran diferencia que hay entre ellos es una relación de grado e intensidad; gels. actúa más suavemente que bapt. y lo precede, gels. tiene como bell., congestión de cerebro con dilatación pupilar pero menos intensa y no tiene el delirio activo y violento de bell.

Relaciones

Antídotos

China, coffea, digit., nux mosch.

GLONOINE

Con este nombre se designa un medicamento preparado con nitroglicerina; Hering, su introductor en la práctica médica, lo llamó glonoine por su fórmula química : glono.

Las diferentes dinamizaciones se preparan por diluciones hahnemannianas sucesivas.

Acción general del medicamento

VIOLENTAS Y REPENTINAS IRREGULARIDADES DE CIRCULACIÓN, con HIPEREMIA CEREBRAL ACTIVA, PALPITACIONES DE CORAZÓN, etc. en una palabra, un conjunto de síntomas parecidos a la insolación, al "coup de chaleur"; sin que haya fiebre ni inflamación.

Características

1) CONSTITUCIÓN Y TEMPERAMENTO : Desarrolla particularmente bien su acción en individuos nerviosos, pletóricos, sanguíneos, sensibles, a los que la enfermedad invade bruscamente.

2) TENDENCIA A SÚBITAS Y VIOLENTAS IRREGULARIDADES EN LA CIRCULACIÓN, CON FLUJO DE SANGRE A CABEZA Y CORAZÓN; INTENSOS DOLORS CAFAICOS LATENTES CON SENSACIÓN DE PLENITUD EN VASOS DEL CUELLO; CONGESTIÓN CEREBRAL.

Actúa muy violenta y rápidamente.

Como consecuencia de la perturbación súbita y violenta que determina en la circulación, hay que hacer notar en primer lugar DOLOR DE CABEZA LATENTE, muy característico; puede existir en toda la cabeza o solamente en frente, occipicio, es decir, en cualquier región localizada de la cabeza.

Y este latido no es simple sensación subjetiva, sino que responde a una manifestación objetiva de congestión circulatoria en la cabeza : la congestión que provoca es tan violenta que los vasos parecerían estallar.

Además estos latidos son sincrónicos con las pulsaciones cardíacas.

La sangre parece llegar hacia la cabeza en un flujo abundante y violento, colmado al máximo los vasos; las yugulares externas parecen dos cuerdas, sinuosas, visibles bajo la piel : las carótidas laten con violencia, están duras, tensas, no se aplastan por presión.

Cara violentamente roja.

Estos latidos van acompañados de dolores violentos, profundos, en la cabeza, con sensación de gran angustia.

Conviene comparar aquí a glon. con bell., ya que son semejantes en tantos puntos.

Los síntomas de glon. se agravan al inclinar la cabeza hacia atrás, por tiempo húmedo, aplicaciones frías que llegan hasta causar espasmo; mejora descubriéndose, al aire libre; a veces, el enfermo está obligado a levantarse y pasearse, a pesar del dolor que le causa; un síntoma muy marcado y que pronto aparece en la congestión cerebral causado por supresión de reglas, o predomina en malos efectos del "coup de chaleur", o antes de convulsiones puerperales, en una sensación como si la cabeza estuviera enormemente grande, parece hinchada.

Este síntoma también puede encontrarse en bell. pero no es tan marcado como en glon. bell. se alivia cuando se inclina hacia atrás y se levanta, manteniendo la cabeza descubierta, al frío, si bien glon. tiene el grito encefálico, es menos característico que en bell. (Farrington).

El rasgo más manifiesto de este remedio, escribe Kent, ES OLEADA DE SANGRE HACIA LA CABEZA O EL CORAZÓN.

El enfermo describe a menudo su estado diciendo que tiene sensación COMO SI TODA LA SANGRE DE SU ORGANISMO SE PRECIPITARA HACIA SU CORAZÓN, ACOMPAÑADA DE SENSACIÓN DE CALOR EN EL CORAZÓN O LADO IZQUIERDO DEL PECHO : o bien se queja de AFLUJO PRECIPITADO DE SANGRE A LA CABEZA, DONDE TIENE SENSACIÓN DE CALOR VIOLENTO, O BIEN FUEGO INTERNO QUE VA DE SU ESTÓMAGO HASTA LA CABEZA, A VECES CON PERDIDA DE CONOCIMIENTO.

Se queja también de sensación de ondulación dolorosa en la cabeza, como si el casco craneano se dilatase y contrajese rítmicamente.

Con ello hay dolor intenso como si la cabeza fuese a estallar o sensación de gran magulladura en la cabeza.

A veces, el aflujo sanguíneo, va acompañado de latidos violentos, sincrónicos con los del corazón y si el enfermo se queja de esta sensación de magulladura en la cabeza, cada pulsación es dolorosa, cada una es como un martillazo en el cráneo; hay también pulsaciones dolorosas y no dolorosas.

Estos latidos son muy violentos y cuando llegan al máximo en la cabeza, se sienten también en extremidades; hay pulsaciones en los dedos, espalda, todo el cuerpo parece palpar.

Si estos latidos continúan, sobreviene contusión en el cráneo, y cada uno de ellos es doloroso.

En este estado, a cada paso que puede dar, a la sacudida del menor movimiento, hay sensación como si le aplastaran la cabeza.

Los vómitos que acompañan a este estado, alivian.

Las extremidades están frías, cubiertas de sudor, pálidas, mientras la cabeza está caliente, cara rojo púrpura; pupilas dilatadas, y ojos inyectados.

Al cabo de poco tiempo, la lengua se pone seca, roja, luego marrón; boca muy seca aunque no tiene mucha sed.

En fin, hay confusión de espíritu y hasta pérdida de conocimiento.

Modalidades

Agravación

Por vino, aguardiente (zinc., fluor. acid.); al sol, después de agravación a los rayos del sol (lach.).

Por la luz de gas o delante de un gran fuego.

Por ruido.

Inclinándose hacia atrás, al acostarse.

De 6 de la mañana, a medio día.

Por tiempo húmedo, aplicaciones frías.

Después de cortarse el cabello (bell).

Después de sueño corto, mientras que un sueño prolongado lo alivia.

Mejoría

DESCUBRIÉNDOSE, al aire libre, al pasearse.

Síntomas mentales

Trastorno de las ideas; PERDIDA MOMENTÁNEA DE MEMORIA PERO PERDIDA DE MEMORIA ESPECIAL; CONFUSIÓN DE LUGARES, NO RECUERDA DONDE VIVE Y LOS LUGARES FAMILIARES LE PARECEN EXTRAÑOS.

Otro remedio para esta confusión de lugares es petrol. y también bar., carb.

A veces, la congestión cerebral es tan grande, que pone al enfermo furioso, trata de escapar, de saltar por la ventana.

En ciertos casos, está lleno de angustia, aprensiones; tiene miedo de ser envenenado (bapt., hyosc., kali bich., rhus tox).

Glon. es, a veces útil en malos efectos del miedo.

Cabeza

CONGESTIÓN DE CEREBRO, EN ALTERNATIVAS DE CONGESTIÓN DE CABEZA Y CORAZÓN.

LATIDOS DOLOROSOS EN LA CABEZA, SINCRÓNICOS CON LAS PULSACIONES CARDIACAS Y LOS LATIDOS DEL PULSO.

CEFALEA LATENTE, PULSATIL; SE TOMA LA CABEZA ENTRE LAS MANOS.

NO PUEDE EXTENDERSE, ACOSTARSE, LE PARECE QUE RECIBE GOLPES EN LA CABEZA.

TIENE SENSACIÓN DE QUE SU CEREBRO ESTÁ HIPERTROFIADO, PLETORIZADO,

CONGESTIONADO AL EXTREMO, DEMASIADO GRANDE PARA SU CABEZA, CADA PULSACIÓN,

CADA LATIDO DEL CORAZÓN, CADA PASO QUE DA, CADA RUIDO, LE RESUEÑAN

DOLOROSAMENTE.

INSOLACIÓN; dolor de cabeza debido al sol, siente su cefalea aumentary disminuir cada día con la salida y puesta del sol (kal., nat. carb.).

Glon. es aplicable a la insolación, sea a causa de los síntomas de congestión de cabeza que determina y que se parecen a los de esta afección, sea a causa de los síntomas que muestran que la congestión prolongada del cerebro ha producido efectos depresivos.

La cara se pone más bien pálida; el pulso, que primitivamente era lleno y duro, se hace blando y débil; la respiración difícil, no a causa de una molestia en el pecho, sino por congestión bulbar.

La mirada es a menudo fija.

El enfermo puede estar inconsciente.

Por eso glon. es nuestro mejor remedio para las consecuencias del demasiado calor ya sean trastornos causados por los rayos directos del sol ardiente, o por calor demasiado ardiente, ya provengan del calor de una hornalla, como es el caso de los fundidores, o mecánicos.

Estos efectos del sol o del calor no se localizan solamente en la cabeza, pueden atacar todo el cuerpo; hay entonces disnea, palpitaciones, náuseas y vómitos, lengua blanca; esto no es de origen gástrico, sino cerebral (bell., apomorp., rhus tox.); ausencia de apetito, horrible sensación de vacío en el estómago, y a menudo, un poco de diarrea (Farrington).

Congestión intensa de cerebro por reglas suprimidas o atrasadas; dolor de cabeza latente en lugar de reglas.

Dolor de cabeza violento, después de hemorragia uterina violenta (china), flujo de sangre en la cabeza en embarazadas.

Trastornos cefalálgicos después de haber trabajado mucho con luz de gas, si la luz caliente cae directamente sobre la cabeza; no puede soportar el calor en la cabeza, ya sea de fuego o sol (lach., nat. carb.).

Dolores de cabeza de los burócratas que trabajan con la luz de un pícode gas cerca de la cabeza y que irradia calor que los incomoda; esta luz caliente tan cerca de la cabeza los hace propensos a dolores de cabeza.

Convulsiones en niños, después de congestión cerebral, durante meningitis o dentición con síntomas parecidos a bell.

Glon. es uno de nuestros mejores remedios para la forma congestiva de convulsiones puerperales, que se anuncia por aflujo de sangre a la cabeza, enrojecimiento brillante de cara, que parece hinchada; pulso lleno y duro; y albúmina en la orina.

También es útil en hiperemias menos violentas de cerebro y aflujo menos agudo en la cabeza.

Esto se presenta por crisis, en cualquier momento, por ejemplo, caminando por la calle, siente un aflujo de sangre en la cabeza, como tufarada de calor, o enrojecimiento de cara; manos y pies también fríos; está cubierto de sudor, mira alrededor y ya no reconoce su camino para volver, no recuerda donde vive, mira sin reconocer caras de amigos y se pierde cerca de su casa.

Todo esto pasa pronto y de nuevo se siente mejor.

Este aflujo de sangre de la cabeza, va acompañado de vértigo, titubea, está obligado a apoyarse en la pared o los muebles.

Estos trastornos se presentan sobre todo en días calurosos o por calor y la luz del sol.

Al principio, espaciados, se hacen frecuentes y forman las fases preliminares del estado apoplético (Kent).

En casos de apoplexia cerebral, glon. puede ser útil, cuando la tensión continúa siendo muy elevada (Kent).

Glon. y opium, son dos grandes remedios para la apoplejía.

Ambos presentan estado comatoso, pero en opium la pérdida de conciencia es más completa, más profunda; la cara tiene signos parecidos, pero en opium el maxilar inferior está caído y tiene movimientos espasmódicos en comisuras de la boca; en opium, pupilas contraídas, en glon. dilatadas; en opium, pulso lleno y lento y respiración estertorosa, lenta e irregular, con sopor extremadamente profundo.

VÉRTIGO AL TOMAR LA POSICIÓN VERTICAL, AL PONERSE DE PIE, AL SENTARSE en su cama, al levantarse a la mañana.

Cara

CARA ROJA, CALIENTE, CONGESTIONADA, A VECES CUBIERTA DE SUDOR.

El enrojecimiento se va OSCURECIENDO Y LA CARA PUEDE PONERSE ROJO OSCURO, VIOLETA; EXPRESIÓN DE ESTUPIDEZ.

En ciertos casos, puede haber ALTERNATIVAS DE ENROJECIMIENTO Y PALIDEZ.

También sensación COMO SI LA CARA ESTUVIERA HINCHADA.

Aparato digestivo

BOCA Y GARGANTA :

DOLORES PULSAILES EN TODOS LOS DIENTES, COMO sulph., siente su corazón latir en los dientes.

Labio inferior hinchado.

Lengua cargada, que conserva la impresión de los dientes; gusto pervertido; gusto a canela o piñas; aliento dulzón y aromático.

La garganta parece hinchada por estado de congestión de cuello, cuyos vasos están distendidos; como lach., no puede soportar un cuello ajustado.

ESTOMAGO E INTESTINOS :

Los trastornos digestivos de glon., no son característicos; eructos, náuseas, constituyen un estado de malestar impreciso relacionado con trastornos circulatorios, mucho más importantes.

Agravación por vino y estimulantes.

Constipación con hemorroides dolorosas y pruriginosas.

Diarrea con deposiciones abundantes y negruzcas.

Órganos genitales

LOS TRASTORNOS CEREBRALES DE LA MENSTRUACIÓN, LA CONGESTIÓN INTENSA DEL CEREBRO, causados en mujeres plétóricas por BRUSCA SUPRESIÓN DE REGLAS, encuentran en glon. su más exacto simillibis.

No solamente alivia durante el período menstrual, sino que es también particularmente útil en la época de la MENOPAUSIA.

No actúa como lach. o sulph., en las tufaradas de calor general de este período, sino que es precioso cuando son violentas y se localizan en el cerebro.

Es también útil en ESTADOS CONGESTIVOS DE CEREBRO DURANTE EL EMBARAZO.

Glon. ha detenido CONVULSIONES PUERPERALES en que predomina el síntoma hiperemia violenta del cerebro.

Aparato circulatorio

TRABAJO LABORIOSO DEL CORAZÓN QUE ESTÁ AGITADO.

Violentas palpitaciones con latidos en carótidas y ANSIEDAD PRECORDIAL; la sangre parece afluir al corazón o subir violentamente a la cabeza.

Cualquier movimiento produce aflujo de sangre al corazón y un instante de desfallecimiento.

PALPITACIONES.

PULSACIONES VISIBLES EN TODA LA SUPERFICIE DEL CUERPO.

LATIDOS en todo el cuerpo, hasta la punta de los dedos.

PULSO RÁPIDO, ACELERADO.

VARIACIONES EXTRAÑAS DEL PULSO, QUE SE ACELERA, DISMINUYE, LUEGO ACELERA; pulso intermitente, ya DURO, SALTARÍN O DEPRESIBLE HASTA HACERSE APENAS PERCEPTIBLE.

Aparato respiratorio

Deseo de respirar profundamente; sensación de congestión y constricción del pecho.

Espalda y extremidades

Sensación de constricción alrededor del cuello, como si una venda lo rodease, o como si el cuello de la ropa estuviera muy ajustado.

Dolores punzantes en región del corazón hacia la espalda, entre los dos hombros; sensación de ardor entre los dos hombros. (lycop).

Languidez general, debilidad, insensibilidad, gran fatiga, con deseo de permanecer sentado o acostado aunque sienta que podría moverse.

Sensación de debilidad y entumecimiento; temblores; dolores en los miembros, comparables a los de una sacudida eléctrica.

Relaciones

Antídotos

Acon.

DROSELA ROTUNDIFOLIA

Drosera, rosella o hiebra del rocío, así nombrada por las gotas que salpican la superficie de sus hojas, y que son producto de una secreción emitida por los pelos glandulares que las cubren y que llevan cada una en su punta una gotita de líquido viscoso, límpido, antiguamente muy buscado por los alquimistas que le suponían virtudes maravillosas, es una planta herbácea, vivaz; de la familia de las droseráceas.

Crece en toda Francia, en terrenos turbosos cubiertos de musgo, en prados húmedos, al borde de ciertos pantanos.

Los animales no la tocan porque el instinto les enseña que les es funesta; afectaría particularmente a carneros, de los mortal : circunstancia que consideran extraña los médicos alópatas, pero que nosotros utilizamos con gran éxito en afecciones de vías aéreas.

Preparamos por maceración, en alcohol de 90º de la planta entera, recolectada al comienzo de la floración, una tintura madre con la que obtenemos por diluciones sucesivas las diversas dinamizaciones.

Acción general del medicamento

Aunque parece tener una acción de cierta extensión, ES LA ACCIÓN IRRITANTE DE DROSELA SOBRE MUCOSA LARÍNGEA Y GRANDES BRONQUIOS, lo que ha consagrado su reputación.

Hahnemann la describió con razón, como el principal medicamento de los ataques de coqueluche y toses coqueluchoideas.

Modalidades

Agravación

Después de media noche, acostado, al acostarse, con el calor del lecho, al cantar, al reír.

Mejoría

Por movimiento.

Síntomas mentales

Abatimiento, tristeza, inquietud.

Produce un estado psíquico parecido al que se ha descrito bajo el nombre de DELIRIO DE PERSECUCIÓN : ansiedad, angustia e inquietud continua, como si temiera ser engañado por todo el mundo, como si todos los hombres fuesen sus enemigos.

Este estado va acompañado por agitación, sensación de calor que recorre rápidamente todo el cuerpo, pero principalmente la cara, miedo a la soledad, tristeza, impulso al suicidio, particularmente de tirarse al agua.

Cabeza

EL VÉRTIGO DE DROSELA se produce al caminar al aire libre, con tendencia a caer del lado izquierdo.

Cefalalgia al caminar, al inclinarse para escribir, aliviada al apoyarla mano sobre el lado doloroso; sensación de presión, de tirón de adentro a afuera.

Dolor pruriginoso y de excoriación de cuero cabelludo.

ADENITIS CERVICAL (de origen tuberculoso).

Ojos

Dros. produce en ellos algunos síntomas : blefaritis con aglutinación y prurito de párpados; dolores de adentro a afuera que aumentan por tacto; estrechamiento de pupila y ambliopía que se manifiesta cuando se miran pequeños objetos, o se entra de la claridad a pieza oscura.

Oídos

Dros. produce dolores y trastornos de audición : dolores punzantes, cosquilleos en oído externo e interno; ruidos comparables a redoble de tambor lejano; sordera con zumbido de oídos.

Cara

Dolores principalmente en mejilla izquierda, perforantes por sacudidas.

Dolores en articulación temporomaxilar, aumentados al mover la mandíbula.

Aparato digestivo

Tiene pocos síntomas marcados.

EN LA BOCA, determina dolor de dientes con sensación de frío; dolores y aftas en la lengua; sensación de ardor como por pimienta; salivación acuosa.

EN EL ESTOMAGO, náuseas; pérdida de apetito alternando con hambrecanina; dolor de garra en hueco del estómago, que disminuye por movimientos respiratorios y aumenta cuando se sienta o se agacha.

EN EL ABDOMEN, puede haber cólicos, dolores cortantes, que aumentan si permanece sentado, acompañados por diarrea con tenesmo.

Ganglios tuberculosos abdominales.

Aparato respiratorio

La principal acción de dros se localiza en aparato respiratorio.

Inflamación de mucosa laríngea, laringitis con COSQUILLEO EN LA LARINGEO SENSACIÓN COMO SI LA LARINGE ESTUVIERA CERRADA por cuerpo extraño; ronquera con voz baja hueca; sensación de sequedad y raspadura en garganta.

Tos espasmódica al atardecer y la noche, y accesos de sofocación; tos durante el día por ataques seguidos de gran debilidad, con respiración sibilante; ruido penetrante, agudo, durante la inspiración (tos coqueluchoide); tos con vómitos de alimento primero y de mucosidades enseguida; sensación como si las vías respiratorias no se pudieran dilatar bastante para dar a la respiración toda su libertad.

Tos seca, espasmódica, violenta, día y noche, QUE EXCITA AL VOMITO; PEOREN CAMA; DURANTE EL ACCESO LA CARA SE PONE VIOLETA; tos incesante, a intervalos tan cortos que apenas encuentra tiempo para respirar y hablar; al toser DOLOR EN EL PECHO, ABAJO DE LAS COSTILLAS Y EN BAJO VIENTRE, dolores ALIVIADOS POR PRESIÓN DE LAS MANOS.

TOS BREVE, RÁPIDA, PRECIPITADA POR ATAQUES VIOLENTOS QUE SE REPITEN BASTANTE A MENUDO, CON AMENAZA DE SOFOCACIÓN : DOLOR AL TOSER ABAJO DE LAS COSTILLAS; EL NIÑO LLEVA LA MANO AL PUNTO DOLOROSO, RUIDO PENETRANTE Y CARACTERÍSTICO DE LA TOS DE LA COQUELUCHE (GRITO DE GALLO) DURANTE LA INSPIRACIÓN, Y DESPUÉS DE CADA ATAQUE DE TOS, VÓMITOS DE ALIMENTO PRIMERO, Y DESPUÉS DE MUCOSIDADES FIBROSAS; LOS ATAQUES DE TOS SOLO CESAN CUANDO HA VOMITADO O EXPECTORADO ALGO DE MUCOSIDADES, PIERDE SANGRE POR LA NARIZ Y BOCA.

CARA VIOLETA SOLAMENTE DURANTE EL ACCESO DE TOS.

LA TOS SE EXASPERA POR EL CALOR DEL LECHO Y LOS ACCESOS MAS VIOLENTOS

VINIENDO DESPUÉS DE MEDIANOCHE.

EL NIÑO SE AGITA PORQUE EL MOVIMIENTO LO ALIVIA, TIENE POCO O NADA DE FIEBRE; o si tiene, es por accesos regulares de escalofríos y calor; sed después del escalofrío; sudor caliente de noche.

DESPUÉS DE LOS VÓMITOS FRECUENTES, LO QUE MAS A MENUDO SE OBSERVA EN dros.,

SON ESPUTOS ESTRIADOS DE SANGRE.

NO HAY APETITO; CONSTIPACIÓN; TRISTEZA.

Tal es el cuadro sintomático dado por Chargé de la COQUELUCHE, poniendo adros. por su similitud patogenética como gran medicamento para esta afección.

Queda sobreentendido que dros. no es el único medicamento de la coqueluche ya que considerando coqueluche igual a dros., traería muchos fracasos.

Si los espasmos dominan, habrá que recurrir a cupr. acet.; cuyas indicaciones son las siguientes : tos con accesos repetidos y prolongados de sofocación durante los cuales el niño se pone rígido y pierde el conocimiento; cara y labios azulados; después de la tos, vómitos; rales mucosos en el pecho y espasmos convulsivos.

Se alivia por algunos tragos de agua fría; después del ataque pide beber un poco de agua fría.

Sopor entre los accesos.

Coral. rubr., es otro remedio de la coqueluche, cuando la sofocación es extrema, los ataques son tan violentos que pierde el conocimiento, pierde la respiración, la cara se pone púrpura o negra; hay gran agotamiento después del acceso.

Está particularmente indicado cuando hay agravación de mañana.

Cina, indicada por convulsiones o rigidez del cuerpo durante o inmediatamente después de ataque, en niños que tienen también síntomas de vermes.

En ipeca, la tos va acompañada de mucha angustia, sofocación, en el momento del ataque, el cuerpo se pone rígido y la cara roja o violácea; sangra fácilmente de la nariz, pero sobre todo hay muchos rales mucosos en bronquios, náuseas muy marcadas durante el ataque y finalmente vómito abundante de mucus, que lo alivia.

Se pone rígido por espasmo tónico de extensores, mientras en cuprum. el espasmo de los flexores predomina.

Hay tendencia marcada a diarrea.

En kali carb. los ataques vienen sobre todo después de medianoche, hacia las 3 de la mañana, o al comienzo del día trayendo vómito de alimentos tomados la víspera, al atardecer; hinchazón edematosa de párpado superior que forma un redondel sobre el ojo.

En hyosc., lo que domina es que no se puede acostar al niño sin que le dé tos, peor que nunca; cesa en cuanto lo paran.

Stram., está indicado en la forma francamente convulsiva de la coqueluche; a la violencia de los ataques se agregan movimientos espasmódicos violentos de extremidades; casi siempre las convulsiones cruzan de brazo izquierdo a pie derecho o viceversa; luego la cabeza o solamente los músculos de los maxilares, o labios, agitación, temblor de manos, dar vuelta de ojos.

Gran enrojecimiento de cara, ojos centelleantes, sed viva.

Cuando la coqueluche amenaza con eternizarse por recaídas frecuentes cuya causa se encuentra, sulph., es excelente; inclinación constante a toser, pero la tos aborta lo más a menudo y no llega a toser con facilidad.

La coqueluche deja a menudo tos obstinada, hueca, seca, breve, con ronquera a la mañana; tos excitada por la presencia, en garganta, de mucosidades adherentes difíciles de desprender y que no traga por no saberlas expectorar; a menudo emisión involuntaria de orina durante el ataque; caust., borra entonces la tos y cubre el cuadro de la constitución.

Dolores en tórax, al inspirar y expirar, que disminuyen por presión de la mano y aumentan a veces cuando está sentado y desaparecen por movimiento.

Numerosos autores enseñan que dros. es eficaz en TUBERCULOSIS.

Hahnemann la aconseja principalmente en TISIS LARÍNGEA, con tos, expectoración amarillenta y ronquera.

El Dr. Curie ha producido tuberculosis en gatos por empleo prolongado de dros. en tintura madre y la preconiza en la tisis.

Según sus experiencias tiene acción particularmente electiva sobre ganglios cervicales y abdominales.

En Inglaterra, el Dr. Tyler ha estudiado largamente la acción y empleo de dros. en tuberculosis y ha llegado a la conclusión siguiente: "en numerosas enfermedades, cuando hay antecedentes hereditarios tuberculosos, Dros. puede ser adecuado.

En la pleuresía (de gatos en experiencia, del Dr. Curie, fueron atacados de derrames pleurales), dros. puede ser curativo, pero no hay que creer que curará todos los casos de tuberculosis pulmonar, ganglionar o todos aquellos en que sus antecedentes tengan una historia tuberculosa: actuará solamente en numerosos casos, en que los síntomas lo indiquen y con rapidez a veces sorprendente.

Como ha dicho Hahnemann, dros. es una planta medicinal extraordinaria y es probable que no conozcamos todas sus posibilidades".

Espalda y extremidades

Dros. produce dolores convulsivos y puntadas en la espalda.

Estas puntadas vuelven, como una neuralgia en la cadera.

Rigidez de nuca (Jousset).

Hahnemann ha subrayado su acción sobre los huesos largos, lo mismo que en ciertas articulaciones como el hombro, cadera, tibia terciaña. (Dr. Renard).

Determina dolores en articulaciones, huesos, músculos.

Estos dolores son contusivos, acompañados de puntadas, disminuyen lo más a menudo por movimiento, pero se pueden observar las condiciones contrarias; se agravan por tacto. (Jousset).

Produce también contracción espasmódica de flexores de la mano, temblor de rodillas y una especie de parálisis de piernas que da a la marcha aspecto vacilante e incierto. (Jousset).

Relaciones

Complementarios

De nux vom.

Sigue bien a sambuc., sulf., veratr.

Es bien seguido por calc., puls., sulf.

DULCAMARA

Solanum Dulcamara o "dulce-amarga" es una planta enredadera de la familia de las solanáceas.

Muy común en Francia, crece en lugares húmedos, al borde de arroyos.

El sabor de sus hojas primero dulce, luego amargo, le ha valido su nombre.

Preparamos la tintura madre con la que obtenemos por diluciones sucesivas las diferentes dinamizaciones haciendo macerar en alcohol a 90º flores y tallos recogidos un poco antes de la floración.

Acción general del medicamento

PIEL Y MUCOSAS son de acción preferida por dulcam.

Su acción procede siempre de aquélla a éstas, los desórdenes internos que produce, que son flogosis con hipersecreción, tienen casi invariablemente un punto de partida cutáneo, pero sólo se adapta a esta especie de metástasis si son recientes o cuando han perdido este carácter, si permanecen en relación con la piel por pruritos, enrojecimientos, erupciones que aparecen de vez en cuando.

Dulcam. actúa sobre todo sobre pieles finas y es EN LAS REGIONES DONDE LA EPIDERMIS ES MÁS DELGADA (cara, pecho, pliegues de articulaciones, palma de manos, axilas, parte superior interna de muslos, órganos genitales externos) donde desarrolla sus lesiones que dan fácilmente abundante secreción viscosa y maloliente.

EL SISTEMA LINFÁTICO está también en su esfera de acción, así como EL APARATO FIBRO MUSCULAR : en su estudio patogenético veremos que encaja bien en ciertos dolores reumáticos.

También actúa SOBRE SISTEMA NERVIOSO, particularmente MEDULA Y SIMPÁTICO en los que se han notado numerosos síntomas de depresión.

Numerosas observaciones de toxicología han demostrado que tiene cierta acción sobre el PARENQUIMA RENAL. Características

CONSTITUCIÓN Y TIPO : Dulcam. se adapta mejor a jóvenes de piel fina, permeable, constitución linfática, que se resfrían fácilmente; agitados e irritables, muy friolentos y sensibles al menor cambio de tiempo.

Es uno de los medicamentos prominentes DE LA CONSTITUCIÓN HIDROGENOIDE de Grunvogel. (nat. sulf., thuya, caust., nux mosch., rhus tox, ars. alb., calc. ost., aranea diad.).

Modalidades

Lateralidad

Más bien izquierda.

Agravación

a) POR HUMEDAD, POR FRÍO HÚMEDO, POR TIEMPO LLUVIOSO.

Desarrolla particularmente bien su acción por tiempo húmedo y frío, cuyo estado higrométrico y temperaturas facilitan reacciones de piel sobre mucosas.

Esta influencia de la humedad, del frío húmedo, es su gran característica, el punto central, alrededor del cual irradian todos sus síntomas; agravación por humedad, por frío húmedo, síntomas agravados o causados por cambio de tiempo de calor a frío húmedo, especialmente si es súbito.

Dulcam. ES AL FRÍO HÚMEDO, LO QUE acon. AL FRÍO SECO.

El fin del verano, el otoño con sus días calurosos y sus noches frías y húmedas son especialmente favorables a su acción; responde muy bien por similitud de síntomas, a estados que son consecuencia del tiempo húmedo, enfriamientos, después de haberse expuesto a la lluvia; síntomas debidos a haber estado sentado mucho tiempo sobre la tierra fría y húmeda, o en gente que trabaja en sótanos fríos y húmedos, frigoríficos, etc.

Entre los remedios de tiempo húmedo se puede comparar a aran. diad., calc. ost., calc. phosph., particularmente sensible a la humedad de la nieve derretida, nat. sulf., nux mosch., rhodo., rhus tox.

b) Por transpiración resumida; por supresión después de enfriamiento por tiempo húmedo, de erupción cutánea.

c) De noche, por reposo y al calor del lecho.

Mejoría

Por tiempo seco, igual por movimiento.

Síntomas mentales

Se puede atribuir a dulcam. cierta AGITACIÓN MENTAL, con inaptitud para el trabajo y un grado marcado DE IMPULSOS A LA CÓLERA; se ha notado gran impaciencia; DESEO IMPACIENTE DE CUALQUIER OBJETO QUE RECHAZA EN CUANTO LO OBTIENE (cham., cina, rheum, staphy.).

También tiene cierto estado de confusión mental; le cuesta encontrar la palabra justa.

Delirio sin características netas; alucinaciones de oído, y vista a la mañana, al despertar.

Sueño

Estado de somnolencia con bostezos durante el día; durante la noche, produce insomnio con mucha agitación física o sueño agitado con movimientos continuos en la cama.

Sueños espantosos y PRURITO VIOLENTO DE PIEL turban el sueño.

Despierta con pesadilla como si lo llamaran y cree ver cerca de él un fantasma que escapa.

Cabeza

Exteriormente COSTRAS GRUESAS, MARRÓN AMARILLENTO, EN CUERO CABELLUDO QUE SANGRAN FÁCILMENTE cuando las rasca y determinan caídas de cabello.

Produce DOLORS DE CABEZA, en general sordos y estupefactivos, dolores presivos taladrantes de adentro hacia afuera, acompañados de pereza, frío general con sensación de calor en la cabeza y náuseas.

En general aumentan cuando se levanta y disminuyen cuando se acuesta.

Estos dolores son raramente punzantes o pueden localizarse en todos los puntos del cráneo pero, son más notables en occipucio y nuca, van acompañados de sensación de hinchazón.

Dolores de cabeza llamados "reumáticos"; aparecen en tiempo frío y húmedo o al pasar bruscamente de un lugar soleado y caliente a un local húmedo y frío.

Vértigo, a la mañana, al levantarse con temblor y debilidad. (bryon. y lycop.).

Ojos

IRRITACIÓN DE CONJUNTIVA; CONJUNTIVITIS, PTOSIS DE PÁRPADO SUPERIOR; síntomas que aparecen sobre todo relacionados con las condiciones atmosféricas que responden a su acción o al menos a su principal modalidad de agravación; el frío húmedo.

"PUPILAS ALTERNATIVAMENTE DILATADAS Y CONTRAÍDAS.

OJOS SENSIBLES A LA LUZ; SE INFLAMAN FÁCILMENTE".

Oídos

Dolores nocturnos con náuseas, zumbidos, tintineos.

Catarro de oído medio; que aparece o se agrava por frío húmedo.

Cara

Palidez con enrojecimiento circunscripto de mejillas.

VERRUGAS ANCHAS Y LISAS EN LA CARA.

Impétigo con costras gruesas, amarillentas en la cara.

Neuralgia facial con dolores peor a la menor exposición al frío húmedo; dolores penetrantes en mejillas, que se extienden hasta las orejas, precedidos de sensación de frío en las partes atacadas (agar.).

Dolores desgarrantes de neuralgia facial después de desaparición brusca de herpes en la cara.

Aparato digestivo

BOCA :

HIPERSALIVACIÓN : necesidad constante de tragar o expectorar, carraspea constantemente, sobre todo cuando ha tomado frío.

Saliva tenaz, jabonosa y de olor pútrido, es buen remedio en estomatitis mercurial, cuando hay agravación por tiempo húmedo; se ha notado también sequedad de boca con gran sed.

ESTOMAGO :

SED ARDIENTE DE BEBIDAS FRÍAS.

Hambre con repugnancia por todos los alimentos y saciedad súbita.

Tiene acción muy marcada sobre el estómago : produce regurgitaciones con sensación de raspar la garganta, náuseas acompañadas de sensación de constricción en la garganta y vómitos mucosos con calor y ansiedad.

Produce también dolores de estómago con sensación de presión y contracción.

ABDOMEN Y DEPOSICIONES :

Produce cólicos con dolores cortantes, encontrando su simillimum en clínica cuando sobrevienen después de exposición a frío húmedo.

Todos los dolores abdominales de dulcam. van acompañados de producción de gas, borborigmos; parecen ligados a la existencia de gas cuya emisión los alivia.

Sensación como si fuera a tener diarrea, aliviada por emisión de gases.

DIARREA MUCOSA CON DEPOSICIONES VERDES, VISCOSAS O AMARILLENTAS, A VECES SANGUINOLIENTAS, SOBRE TODO EN VERANO CUANDO EL TIEMPO SE PONE SÚBITAMENTE HÚMEDO Y FRÍO, O DESPUÉS DE LA DESAPARICIÓN DE UNA ERUPCIÓN.

Diarrea alternando con la aparición de una erupción o con dolores reumáticos.

Aparato urinario

Dulcam. determina los síntomas siguientes : deseo frecuente de orinar, con micciones dolorosas gota a gota.

Necesidad frecuente de orinar, después de exposición a frío húmedo.

Debe orinar cuando tiene frío.

Catarro de vejiga después de haber tomado frío en tiempo húmedo y frío.

Iscuria después de caminar descalzo en la humedad.

La orina deja depósito espeso, purulento.

Órganos genitales

Supresión de reglas por humedad o frío húmedo.

Reglas atrasadas, cortas, poco abundantes.

APARICIÓN DE RASH CUTÁNEO ANTES DE LA APARICIÓN DE LAS REGLAS. (bell., conium, que tiene rash durante las reglas profusas; graph.).

Aparato respiratorio

NARIZ :

LA NARIZ SE TAPA CUANDO EL SUJETO SE EXPONE AL FRÍO HÚMEDO, A LLUVIA FRÍA; LE GUSTA RESPIRAR AIRE CALIENTE, PUES EL MENOR AIRE FRÍO TAPA LA NARIZ.

Coriza seca después de haberse expuesto al frío húmedo, con impresión de tenerla nariz obstruida.

El "catarro de heno" que ciertos enfermos padecen en otoño, es a menudo curado por dulcam. cuando las características lo llaman.

BRONQUIOS Y PULMONES :

Dolores sordos, presivos, en el pecho, particularmente del lado izquierdo.

Durante la tos, sufre de dolor constrictivo en el epigastrio, sólo puede toser si apoya fuertemente la mano en la región dolorosa.

Tos peor por frío húmedo, con cosquilleo en la laringe y expectoración fácil.

Tos de invierno o de otoño, peor por frío húmedo, seca, atormentadora.

Espalda y extremidades

Entumecimiento y rigidez de nuca y hombro, después de exposición al frío húmedo, tortícolis. (calc. ost., lachn., nux vom., rhus tox).

Dolor en base de riñones, como después de estar demasiado tiempo doblado en dos.

Lumbago.

Dolores sordos continuos o tironeantes en extremidades agravados por frío húmedo, a la noche antes de medianoche y en reposo; mejorados por movimiento.

Dolores reumáticos más bien musculares que en articulaciones, consensación de frío, sobreviniendo o agravados por tiempo frío y húmedo.

Piel

Piel fina y delicada a la que el frío húmedo trae erupciones.

Prurito agravado por frío.

Erupciones en placas, con escamas, HÚMEDAS Y QUE SUPURAN, después del rascado; rojas o rodeadas de aureola roja como picadura de pulga; sangran al tacto; agravadas por agua fría y tacto; erupciones húmedas en cara, partes genitales, manos, etc. (graph., crot. tig., hep. sulf., mezer., rhus tox, etc.).

Erupción de pústulas pruriginosas que pasan a la supuración y se cubren de costras.

Erupciones costrosas, con adenitis en las proximidades.

Grandes verrugas anchas y lisas en cara y manos, en la cara dorsal.

Las GLÁNDULAS, pueden ser atacadas, los ganglios de cuello, axila, ingle, están a menudo aumentados de volumen, pero raramente dolorosos y esto viene bruscamente a continuación de la aparición súbita de tiempo lluvioso y frío.

Relaciones

Incompatible

Acet. acid., bell., lach.

Antídotos

Camph., cuprum, ipeca, merc.

Complementarios

De bar. carb., cuyas afecciones glandulares son similares; actúa bien después de cal., bryon., lycop., rhus tox., sepia.

Se parece a nat. sulf., en lo que concierne a la humedad, por sutendencia asmática y diarreica y a thuya por sus manifestaciones cutáneas.

EUPATORIUM PERFOLIATUM

Eupatorium perfoliatum, planta originaria de América del Norte, pertenece a las Sinantéreas corimbíferas; viven en praderas y al borde de ríos.

Los indígenas de América la empleaban, en tiempos remotos, en fiebres intermitentes; de ahí los nombres de "Weed" "AGUE WEED" (hierba india, hierba contra la fiebre intermitente).

Sus flores y hojas, tienen gusto amargo y sabor particular, desprovisto de acritud y astringencia.

La tintura madre se prepara con toda la planta fresca en el momento de la floración, macerada en alcohol a 90° y por diluciones sucesivas se obtienen las diversas dinamizaciones.

Acción general del medicamento

Su principal característica es un síntoma que domina la patogenesia : SENSACIÓN DE MAGULLADURA, DE ROTURA, EN TODO EL CUERPO (arnica, bellis per., pyrog., bapth., ruta) CON DOLOR CRUEL, PROFUNDO, QUE PARECE SITUARSE EN LOS HUESOS, COMO SI ESTUVIERAN ROTOS, y que ha hecho que, en América, se le de el nombre popular de "BONE SET" (que calma los huesos); DOLORES INTERNOS EN EXTREMIDADES Y ESPALDA, COMO SI ESTUVIERAN ROTOS; SENSIBILIDAD DOLOROSA DE HUESOS; DOLORES EN LAS MUÑECAS COMO SI ESTUVIERAN ROTAS Y DISLOCADAS; DOLOR Y SENSIBILIDAD EN LAS PIERNAS; RIGIDEZ Y DOLORIMIENTO GENERAL CUANDO SE LEVANTA PARA CAMINAR; PANTORRILLAS DOLOROSAS COMO SI LAS HUBIERAN GOLPEADO; DOLORES QUE PARECEN SITUADOS PROFUNDAMENTE EN LOS HUESOS Y LE ARRANCAN GEMIDOS.

Todo esto es característico y puede encontrarse en la gripe, fiebre intermitente, fiebre biliosa, bronquitis (sobre todo en ancianos), y muchas otras enfermedades. (Nash).

También se encuentra otro grupo de síntomas : cefalalgia intensa, consensibilidad de cuero cabelludo y ojos, enrojecimiento de cara, náuseas y postración, dolores en región hepática, constipación y orina fuertemente coloreada.

Síntomas mentales

La única característica es : MUY AGITADO; no puede permanecer en reposo aunque el movimiento no lo alivia; desea estar tranquilo pero no puede.

Cabeza

Dolores penetrantes, latentes, presivos, como si tuviera un gorro de plomo cubriendo, comprimiendo, la caja craneana; dolor, sensación de dolorimiento en el vértex y detrás de la cabeza con dolorimiento en globos oculares.

Dolor occipital, después de haberse acostado, con sensación de pesadez.

Dolor de cabeza periódico cada 30. y 70. día.

Vértigo, sensación de que va a caer hacia la izquierda.

Ojos

CONJUNTIVAS ENROJECIDAS; lagrimeo como en coriza violento.

Sensación de magulladura dolorosa en pupilas (bryon., gels.) en globos oculares que están muy sensibles a la presión.

Aparato digestivo

Lengua cubierta de espesa capa amarillenta.

Gran sed.

Vómitos precedidos de sed.

Vómito al fin del escalofrío febril.

Vomita todo lo que toma y bilis, con gran sensibilidad en epigastrio y temblores.

Sensación de plenitud y dolor en región del hígado, con constipación, como por congestión de circulación del sistema porta.

Deposiciones frecuentes, verdes, líquidas, con calambres y sed terrible.

"Al final de los ataques de bilis puede haber diarrea con emisión de abundantes deposiciones verdes, líquidas o semi-líquidas; si se prolonga y el intestino se ha vaciado mucho, esto desaparecerá y habrá constipación secundaria con deposición clara y sin bilis, de vez en cuando (Kent).

Aparato respiratorio

NARIZ :

Coriza con estornudos y sensación de rotura dolorosa; resfrío gripal con gran dolor en músculos y huesos.

LARINGE, BRONQUIOS Y PULMONES :

RONQUERA SOBRE TODO A LA MAÑANA, como caust., pero mientras éste tiene más sensación de ardor y desolladura, eupat. tiene más sensibilidad DOLOROSA EN EL PECHO.

Ran. bulb. : dolores en el pecho al caminar, al darse vuelta, tiene que apretarse el pecho con las manos porque le duele (bryon., dros., kreos., nat. sulf., sepiá); los dos remedios tienen dolores óseos en la gripe, pero en eupat. son más marcados.

En cuanto a la ronquera, si ni caust. ni eupat. pueden curarla el sulfúrico será amenudo el complementario que lo logrará (Nash).

Tos seca, agotadora, que parece sacudir todo el cuerpo dolorosamente, como si fuera a romperlo y el menor movimiento la agrava.

"Encontramos esta tos en bronquitis capilar a la que cura y tiene en común con bryon y phosph.

Eupat. ES EXCESIVAMENTE SENSIBLE AL AIRE FRÍO, como nux vom. que también tiene dolores de huesos y quiere estar bien abrigado, y en cuarto caliente; a menudo, al levantar ligeramente las frazadas aumenta los escalofríos, lo que también pasa en eupat., por eso se parecen en esto, pero en eupat. hay tristeza abrumadora; el enfermo de nux vom. jamás habla de la muerte, pues está demasiado irascible para dejar este mundo; cosa que no pasa en eupat., que está lleno de tristeza (Kent).

Disnea muy grande que obliga al enfermo a acostarse con cabeza y hombros muy levantados.

Espalda y extremidades

Dolores intolerables en espalda y piernas, como si los huesos estuvieran rotos.

Grandes dolores en todas las extremidades; las pantorrillas parecen haber sido golpeadas; sensibilidad dolorosa en las muñecas como si estuvieran dislocadas.

Doloración y tumefacción de pies.

Dolores gotosos en extremidades e inflamación de tofos articulares, asociados con dolor de cabeza.

Fiebre

Fiebre con estado general parecido al de la gripe.

Lasitud general que llega a postración.

Se puede comparar a bryon. con las diferencias siguientes : en bryon la transpiración es fácil y abundante y en eupat., débil; los dolores de eupat. agitan mucho los de bryon. obligan a permanecer tranquilo e inmóvil.

La agitación de eupat. no calma los sufrimientos como rhus tox., cuyos dolores análogos se alivian por movimiento y cambio de posición.

El período de frío del acceso de fiebre va acompañado de muchos escalofríos y temblores; la sed aparece varias horas antes del escalofrío y a veces de calma antes, pero otras continúa durante el escalofrío y el estado de calor; violentos dolores en los huesos antes del escalofrío; generalmente éste comienza entre las 7 y las 9 de la mañana.

También se da como característica, un vómito de bilis entre el estado de escalofrío y el de calor.

Hay poco o nada de transpiración al final del acceso.

EUPHRASIA

O hierba de la oftalmía, bonita planta anual, crece comúnmente en prados, canchales de césped, etc.

Preparamos con la planta entera puesta a macerar en alcohol a 90º la tintura madre con la cual obtenemos las diferentes dinamizaciones.

Acción general del medicamento

Actúa de manera electiva sobre mucosas de los ojos y de la parte superior del árbol respiratorio, particularmente de la nariz, donde determina inflamación neta y característica.

Modalidades

Agravación

Al atardecer; en la casa; en el interior; por calor, humedad; después de exposición al viento fuerte del sud; por tacto (hepar sulf., calc.).

Síntomas oculares

Produce violenta inflamación de párpados, verdadera blefaritis; los párpados se ponen rojos e inyectados, principalmente en su superficie interna conjuntival, esto puede llegar hasta la ulceración con secreción espesa y excoriante.

INFLAMACIÓN Y ULCERACIÓN DE BORDE DE PÁRPADOS, con dolor de cabeza.

ENROJECIMIENTO INFLAMATORIO DE CONJUNTIVA, con sensación de presión en los ojos.

INFLAMACIÓN DE CORNEA.

SENSACIÓN DE ESCOZOR EN LOS OJOS COMO POR ARENA.

HINCHAZÓN Y AGLUTINACIÓN DE PÁRPADOS.

SECRECIÓN ABUNDANTE DE LAGRIMAS CORROSIVAS; sobre todo si se expone al viento.

Secreción abundante de mucosidades a veces sanguinolentas, por ojos y párpados.

Fotofobia, sobre todo a plena luz del día y al sol, pero soporta todavía menos la luz artificial (acon. tiene fotofobia sobre todo marcada por la luz del sol y bell. por la luz artificial). (Farrington); la fotofobia va acompañada a menudo por dolores en senos frontales.

Se puede comparar aquí euphr. con los remedios concordantes siguientes : merc. sol. también tiene blefaritis marcada y conjuntivitis parecida, después de enfriamiento; los síntomas que lo diferencian son los siguientes : la secreción es menos espesa que en euphr.; tiene marcada agravación por el calor del fuego.

Ars. también tiene secreción de lágrimas acres y formación de flictenas de córnea; ambas están bien indicados en tales casos, cuando son escrofulosos.

Pero ars. tiene sensación de ardor más marcada, verdadera sensación de ardor como fuego especialmente después de media noche; si no siempre, este síntoma es a veces aliviado por aplicaciones de agua caliente; euphr. no tiene la agitación de ars.

Otro remedio parecido a euphr. es rhus tox., que tiene lágrimas profusas, surgentes, ardientes que excorían la mejilla; secreción purulenta acre; pero el pus es menos espeso en rhus tox. que ataca sobre todo el ojo derecho, euphr. ambos; en la iritis reumática, rhus tox. tiene dolores como pinchazos del ojo hasta el occipucio, con mucha agitación y angustia, sobre todo durante la noche.

kali iod., kreos., y nat. mur., tienen también lagrimeo abundante y muy irritante, y son comparables aquí con euphr.

Euphr. también está indicado en conjuntivitis de origen traumático, cuando tiene los síntomas arriba descritos.

Acon. buen remedio para los golpes, no tiene aplicación en la secreción acre, en la formación de pequeñas flictenas que pueden sobrevenir simp. y led. pal. serían más parecidos.

Aparato respiratorio

CORIZA FLUENTE Y VIOLENTO, CON SECRECIÓN ABUNDANTE DE LIQUIDO MUCOSO NO IRRITANTE, CON LAGRIMEO ABUNDANTE, PERO ACRE E IRRITANTE.

Ailium cepa, tiene un síntoma parecido, pero con características diferentes : coriza, con secreción excoriante, con abundante lagrimeo no irritante.

El coriza se puede acompañar de tos frecuente y expectoración.

Tos coqueluchoidea solamente de día con lagrimeo abundante.

Órganos genitales femeninos

Amenorrea con síntomas catarrales de ojos y nariz; abundante lagrimeo irritante.

FERRUM METALICUM

Es uno de los metales más antiguamente conocidos.

En estado puro es blanco grisáceo, duro, granuloso o laminoso, muy dúctil.

Adquiere por pulido, un hermoso brillo.

Su densidad es de 7-8 y funde a 1.500°.

Es quizá el metal más difundido en la naturaleza.

Aunque escaso en estado nativo, sus minerales son muy numerosos.

Magnetita, Oligisto, Limonita, Siderosa, etc.

Se encuentra en ciertas aguas minerales, en la constitución de plantas y animales.

Es utilizado bajo las formas más variadas : en polvo metálico y en estado desal cuyo número es considerable; pero en homeopatía se utiliza el hierro metálico, acetato, fosfato y percloruro. (ferrum muriaticum).

Las tres primeras dinamizaciones se hacen por trituración de limadura de hierro con azúcar de leche; la 4a., haciendo una dilución de la 3a. trituración con una mezcla mitad agua, mitad alcohol; la 5a. y siguientes por medio del alcohol puro.

Acción general del medicamento

El hierro y en general todas las preparaciones ferruginosas que son absorbidas por LA SANGRE, determinan en ella cambios notables, lo mismo en LOS VASOS, a los que dilatan; actúan sobre todos los ÓRGANOS RELACIONADOS CON LA HEMATOPOYESIS, MÚSCULOS Y SISTEMA NERVIOSO.

Lo que encontramos en primera línea, en el estudio patogenético de ferrum, es su influencia sobre SANGRE y HEMATOGENESIS; sólo se puede comprender esta influencia colocándose en el punto de vista homeopático, es decir, estudiando su acción fisiológica y terapéutica.

La escuela oficial parte del hecho que el hierro es útil en la clorosis y que la lesión capital de esta afección es insuficiencia de fijación del hierro por los glóbulos sanguíneos.

Resulta de estudios más recientes, que lo que disminuye no es el número de glóbulos rojos sino su riqueza en hemoglobina y por el método cronométrico cuando se da con éxito hierro a una clorótica, se ve aumentar la coloración progresivamente.

De este hecho terapéutico se ha sacado la conclusión de que el hierro interviene proveyendo a la sangre el suplemento de hierro que necesita para su constitución crónica normal.

A esta manera de ver algunos alópatas han opuesto dos objeciones capitales que nuestra escuela había formulado desde el primer día : que la clorosis cura a menudo sin hierro y que los alimentos encierran casi siempre más hierro del que es necesario para la reconstitución de la sangre.

Se ha demostrado que la eliminación cotidiana de hierro, en el hombre sano no excede de 5 centigramos, que se hace principalmente por la bilis y que los alimentos absorbidos cada día, cualesquiera sean, contienen una cantidad superior.

Forzosamente se llega a la conclusión de que cuando el hierro cura una clorosis, opera como todos los medicamentos del mundo, excitando una función perturbada, llevándola a su restablecimiento normal.

Además de que la clorosis puede curar sin hierro, éste está lejos de convenir a todos los casos y muchos se agravan con él; hay que seguir la ley homeopática : el hierro, para ser útil, reclama indicaciones especiales y características particulares.

El desconocimiento de este principio de toda terapéutica, ha hecho que entre los alópatas se hayan establecido las prácticas más opuestas al respecto.

Comencemos pues por analizar la acción fisiológica del metal sobre la hematosi.

Se ha creído injustamente que el uso prolongado de ferruginos ERA CAPAZ DE ENGENDRAR PLÉTORA considerada como la exageración de lo que, por error, se cree ser el estado, la acción fisiológica del hierro, y que es en cambio, un efecto terapéutico en cloróticos.

He aquí la verdad : el primer efecto, en pequeñas dosis, es acrecentar las oxidaciones en el hombre sano, aumentar la riqueza de la sangre en hemoglobina, que trae verdadera plétora, con cierto grado de fiebre : exageración de temperatura y pulso.

Estos son en todos los casos, efectos muy pasajeros, y el uso prolongado de dosis medias o pequeñas, ofrece resultados muy diferentes cuyo cuadro más conocido, es el abuso de aguas minerales ferruginosas, cuadro absolutamente inverso a lo que la teoría ha admitido : decoloración y tinte ceroso de tegumentos : enfriamiento de extremidades con edema; debilidad general y sofocación al menor esfuerzo, palpitaciones cardíacas a la menor emoción, pues sensibilidad y emotividad aumentan en proporciones extraordinarias.

Bajo la más pequeña influencia de esta clase, las mejillas habitualmente decoloradas se colorean vivamente de un rojo oscuro y hay vértigos y síncope; dolores de cabeza, a menudo periódicos, con paroxismos después de medianoche; opresión asmática a la misma hora; epistaxis después de síntomas congestivos al costado de la cabeza. La hemoptisis por abuso de hierro son bien conocidas, a tal punto, que llegaba a suprimirse su uso en personas predispuestas a tisis : las hemoptisis de origen férrico se relacionan con una apariencia florida que puede engañar al observador superficial.

El hierro excita neuralgias en zonas múltiples pero todas con una misma característica : producción de parálisis vaso-motrices bruscas.

La verdadera característica del hierro es : con ese fondo de anemia y plétora serosa; disminución de hemoglobina y de avidéz de la sangre por el oxígeno, en la irregularidad y en lo súbito de las reacciones vaso-motrices, bajo cualquier influencia refleja : la coloración súbita de la cara es el grado más ligero; las congestiones viscerales son el último término pasando por hemorragias de superficies mucosas.

La cabeza es la parte que se congestiona más comúnmente; enseguida los pulmones.

Las hemorragias vienen por orden de frecuencia; epistaxis, hemoptisis y finalmente hemorroides fluentes.

Esta es entonces, la forma de anemia propia del hierro y es cierto que la característica general sobre la que hemos insistido basta para que empleado según esta directiva pueda ser útil.

La prueba de que esta indicación es conforme a la ley de similitud es el buen resultado de las dosis infinitesimales, siempre que haya conformidad exacta de síntomas en las principales funciones y sobre todo de los síntomas gastrointestinales.

En otras condiciones no es menos, positivo que el medicamento sólo da éxitos a dosis ponderables aunque sean pequeñas; la ley homeopática así lo prueba.

Se debe saber que el hierro en dosis tales es muy mal tolerado por el estómago; de ahí que sabiendo que poseemos otros medicamentos muy eficaces de la clorosis, variables según las indicaciones particulares, dirijamos la vista a estos últimos, más fáciles de manejar porque deben darse en dosis infinitesimales, o al menos, tienen en esas dosis su máximum de eficacia.

Los síntomas cefálicos del hierro son de dos órdenes : según estén ligados a anemia de cerebro o a congestión encefálica, la distinción de las dos es difícil en ciertos casos.

El primer estado nos recuerda opium; el segundo, los efectos de glonoin.

Los dolores de cabeza tienen bastante postración, agitación y alivian por movimiento, aunque son incapaces de todo esfuerzo serio; somnolencia diurna, después de las comidas sobre todo; agitación nocturna, con período de insomnio cabeza caliente, extremidades frías.

Tiene, como bell., viva excitabilidad sensorial, agravación por el menor ruido, latidos en el cráneo y palpitaciones cardíacas.

La diferencia está en la anemia profunda, que es el fondo común y necesario de las indicaciones de ferrum.

En la aplicación se tendrá en cuenta el estado moral : ferr. no tiene los arrebatos de bell., pero sí una profunda melancolía que puede llegar hasta hipocondría, humor peleador, deseo de soledad, debilitamiento de memoria.

El vértigo es un síntoma importante y además de tener zumbidos de oído aparecen el momento de dejar la posición horizontal para tomar la vertical.

Así se demuestra que los trastornos circulatorios de ferr. dependen del sistema nervioso vaso motor, son de orden vaso dilatador y se determinan sobre todo por acciones reflejas.

Si hubiera necesidad de una demostración evidente se la encontraría en el efecto que produce el metal en el hombre sano y en que alivia síntomas manifiestos de bocio exoftálmico : salida de globos oculares, hipertrofia de tiroides, palpitaciones cardíacas, es decir la triada característica con la forma paroxística, accesos de disnea.

Nada más legítimo que el hierro en la enfermedad de Basedow, cuando se producen mujeres cloróticas y amenorreicas.

Características

1) CONSTITUCIÓN Y TIPO : Actúa sobre todo en sujetos propensos A IRREGULARIDADES EN LA DISTRIBUCIÓN DE LA SANGRE.

Sus mejillas están coloreadas de rojo vivo que les da falsa apariencia de salud floreciente, pero en realidad es marca de plétora ilusoria; cuando no son excitados por una causa exterior cualquiera, sus mejillas toman coloración pálida y terrosa.

Otros síntomas traicionan esta irregularidad de circulación de la sangre : violento dolor de cabeza, martilleante, latente, generalmente periódico, peor después de medianoche; pérdida de sangre por nariz y aflujo de sangre a mejillas; disnea asociada a sensación de congestión de pecho, hemoptisis congestivas, etc.; ENROJECE A LA MENOR EMOCIÓN, que agrava todos los otros síntomas.

Mucosas anormalmente pálidas, sobre todo las de la boca; si se trata de jóvenes solteras las reglas son profusas, de sangre muy pálida, casi acuosa.

Tales sujetos son HIPERSENSIBLES Y SIEMPRE FATIGADOS; sus músculos se ponen blandos y relajados, y al mismo tiempo adelgazan poco a poco, Y SON INCAPACES DE ESFUERZO PROLONGADO.

2) TENDENCIA A HEMORRAGIAS : A menudo las congestiones locales tan características de ferr. van acompañadas de hemorragias por nariz, pulmones, útero, riñones, etc. y el remedio viene así a ser uno de nuestros mejores medicamentos para HEMORRAGIAS EN SUJETOS ANÉMICOS Y DEBILITADOS QUE PRESENTAN LOS SÍNTOMAS MENCIONADOS.

Modalidades

Lateralidad

Izquierda inferior y derecha superior.

Agravación

a) CUANDO ESTA EN REPOSO : "Hay una cosa curiosa que se encuentra en todas las condiciones de su constitución : dolores y sufrimientos sobrevienen durante el reposo.

Palpitaciones, disnea y debilidad sobrevienen durante el reposo; el estado mejora moviéndose suavemente, pero todo esfuerzo fatiga y produce desmayos.

TODO MOVIMIENTO RÁPIDO agrava los síntomas.

Los dolores mejoran moviéndose suavemente en la casa de manera que el esfuerzo no excite ni fatigue" (Kent).

b) POR MOVIMIENTO RÁPIDO, una actividad fatigante, un movimiento que lo excite; todo movimiento rápido, la menor precipitación, provocan oscurecimiento de vista, vértigo, los objetos parecen girar a su alrededor, está obligado a sentarse; todo esto con cara colorada; cuando está solo y en reposo, la cara se pone pálida y fría, pero el menor movimiento rápido, la menor excitación, la provocan enrojecimiento de mejillas (Kent).

c) De noche, A MEDIANOCHE sobre todo.

d) Mientras transpira.

e) Después de abluciones frías, o al contrario después de calentarse.

f) DESPUÉS DE HEMORRAGIA ABUNDANTE, DE PERDIDA ABUNDANTE DE LIQUIDOHUMORAL CUALQUIERA, como china.

Mejoría

a) AL MOVERSE SUAVEMENTE CAMINANDO LENTAMENTE. (puls.).

"Agitado en reposo, está obligado a mover sus miembros, dolores desgarrantes sordos en miembros, aliviados al moverse suavemente, tranquilamente". (Kent).

b) DESPUÉS DE LEVANTARSE.

c) POR CALOR :Ferr. es un "remedio muy frío", mejorado con calor (EXCEPTO DOLORES DE CUELLO, CARA Y DIENTES, QUE MEJORAN POR FRÍO); la mayoría de dolores se alivian por calor; desea estar al calor y teme al aire frío o la menor corriente de aire (Kent).

Síntomas mentales

TAN-DEPRIMIDO MORAL COMO FÍSICAMENTE.

Hay mucha DEPRESIÓN Y FATIGA DEL ESPÍRITU que está confuso, desanimado.

Una pequeñez lo inquieta y desanima.

HIPERSENSIBLE, extremadamente irritable; una pequeñez lo encoleriza; la más pequeña contrariedad lo pone fuera de sí.

El menor ruido, un simple roce de papel lo vuelve loco; le provoca agitación nerviosa y lo obliga a levantarse y caminar.

"Ferr. se adapta bien a anémicos o cloróticos, jóvenes, que sufren de falsaplétora con tufaradas de calor frecuentes dejando a continuación los tejidos de la cara completamente pálidos, exangües e hinchados : sobrevienen a la menor emoción o ejercicio.

El tipo de ferr. agrega a esta emotividad una irritabilidad constante tal que lamás débil contradicción, el ruido más insignificante, le parecen insoportables".

Cabeza

Gran sensibilidad de cuero cabelludo, está obligado a dejar sus cabellos sueltos (Kent).

Dolor de cabeza congestivo, martilleante, latente, como golpes demartillo. (bell., china, nat. mur., glonoin.)

Congestión con dolores de cabeza latentes con cara roja y fría.

Dolor de cabeza con sensación de plétora y distensión de cabeza y cara roja, quemejoran por presión; se agravan por todo movimiento rápido, por tos; dolores latentes en occipucio, al toser, subir una escalera, sentarse o levantarse del asiento, a menos de hacerlo todo muy lentamente, pronto provocará sensación de martilleo doloroso y dilatación, distensión de cabeza.

A veces los dolores de cabeza se alivian caminando suavemente.

Dolores latentes en occipucio y nuca, con irradiación a dientes.

Confusión mental con dolor de cabeza latente.

Dolor de cabeza latente, congestivo, provocado por excitación o enfriamiento, duran 3 o 4 días o una semana.

Al escribir o por ejercicio mental, el dolor de cabeza vuelve.

Dolores de cabeza latentes y desórdenes mentales que acompañan o siguen a hemorragia en parturientas (Kent).

Ojos

Hinchazón y enrojecimiento de párpados.

Los párpados parecen hinchados.

Ojos rojos con dolores ardientes.

Toda clase de trastornos visuales provocados por congestión de cabeza.

Oídos

Zumbidos, tintineos, sobre todo al aproximarse las reglas.

Hipersensibilidad al ruido.

Cara

Pálida, terrosa, pero enrojece fácilmente al menor esfuerzo o la más ligera emoción.

Puede estar ligeramente hinchada, con apariencia de falsa plétora.

Enrojecimiento de cara, con apariencia engañosa de sana frescura, en un individuo que no puede caminar rápido en la calle ni soportar ningún esfuerzo.

"La mujer sensible que tiene necesidad de ferr. met., tiene a menudo la cara roja, y se queja de que nadie la cree enferma; parece en buena salud y sin embargo se sofoca al subir escaleras, se siente débil, fácilmente laxa y desearía estar siempre acostada" (Kent).

Palidez de conjuntivas y labios, así como de lóbulos de las orejas que están descoloridos.

Aparato digestivo

BOCA :

Extrema palidez de mucosa bucal.

Dolor de muelas aliviado por agua fría.

Boca pastosa.

Mal gusto a huevo podrido.

La lengua le da sensación de estar como quemada (Kent).

ESTOMAGO :

HAMBRE CANINA; HA SIDO FIJADO EN LAS PATOGENESIAS : EL DOBLE DE UNA COMIDA ORDINARIA LE PARECE APENAS SUFICIENTE.

HAMBRE VORAZ, ALTERNANDO CON PERDIDA COMPLETA DE APETITO.

Deseo de pan y manteca.

Asco por la carne, opuesto a nat. mur.

Aversión por leche, cerveza, té, tabaco, a los cuales está sin embargo acostumbrado; los vinos dulces le agradan, pero los ácidos, como todas las cosas ácidas le caen mal.

Intolerancia por huevos.

El estómago no digiere nada y sin embargo no hay náuseas : los alimentos entran en el estómago y son enseguida vomitados sin náuseas, como expulsados simplemente por este órgano; la náusea es la excepción de ferr. met.

Parece que no hay en el estómago secreción capaz de digerir el alimento que es vomitado como fue ingerido; vomita apenas ha comido; vomita alimentos a boca llena hasta que el estómago esté vacío (phosph.); regurgitación de alimentos, distensión y peso en el estómago después de comer.

Vómitos de principio de embarazo en una mujer que vomita sus alimentos sin náuseas; es débil, blanda y tiene la cara roja de ferrum.

El estómago de ferr. se parece a una bolsa de cuero que no puede digerir nada, si se lo llena se vacía tan rápidamente como se llenó.

En cuanto se vacía, los vómitos cesan hasta que vuelve a comer.

Lo que vomita tiene gusto agrio.

Vómito de alimentos después de medianoche.

Dispepsia flatulenta (carb. veg., china, arg. nit.).

ABDOMEN Y DEPOSICIONES :

Sensación de dolorimiento de intestinos como de contusión o si hubiera tomado un catártico.

Deposiciones con materia sin digerir, indolora, nocturna o después de comer o beber (china, crot. tig.).

Diarrea con deposiciones líquidas, acres, irritantes.

Diarrea matinal.

"Ferr. met. es, a veces, indicado como remedio contra la diarrea de las últimas fases de la tisis; parará a veces esta diarrea cuando el enfermo está cerca del fin, pero es posible que ya no viva mucho".

Esta diarrea no es generalmente dolorosa, sino molesta; es preferible no suprimirla y dejar al enfermo ir lentamente a su fin (no cortar bruscamente esta diarrea).

El mejor remedio para la diarrea en las últimas fases de la tuberculosis es el lact. administrado en pequeñas cantidades y repetido tan a menudo como el enfermo y los que lo rodean lo deseen (Kent).

Prolapso de recto.

Diarrea y constipación alternadas.

Constipación con deposiciones duras y necesidades ineficaces.

Aparato urinario

RELAJAMIENTO DE ESFÍNTER VESICAL, que es débil e irregular en su tonacidad muscular.

MICCIONES INVOLUNTARIAS EN UN MOVIMIENTO SÚBITO, al caminar toser; cuando el niño juega la orina escapa gota o gota y moja su camisa, pero esto cesa cuando queda tranquilo.

La vejiga está tan relajada que no puede contener la orina y en cuanto se acumula un poco, la deja escapar.

El relajamiento muscular se encuentra aquí, como en todo el remedio (Kent).

Micciones involuntarias peor durante el día.

Orina más escasa y más oscura; albuminosa.

Órganos genitales femeninos

Reglas adelantadas, demasiado abundantes, duran demasiado, con enrojecimiento brillante de cara, zumbidos de oídos (china) : corrimiento de sangre pálida, acuosa y debilitante (Nash).

Las reglas cesan un día a dos, luego vuelven.

Corrimiento abundante, metrorragia o al contrario amenorrea, o simplemente leucorrea sanguinolenta; supresión de reglas con gran excitación nerviosa, cara roja, debilidad y palpitaciones.

Prolapso uterino.

Insensibilidad de vagina durante el coito.

Aparato circulatorio

Palpitaciones del corazón, provocadas por emoción, miedo, excitación, esfuerzo.

Latidos precipitados del corazón, funcionamiento demasiado rápido del músculo cardíaco o, a veces, funcionamiento demasiado lento.

RESPIRACIÓN ANÉMICA.

Hipertrofia del corazón.

Sensación de opresión cardíaca.

Pulso lleno, pero blando y que cede bajo los dedos; o pequeño y débil; se acelera, al atardecer.

Sensación de pulsaciones, de latidos a través de todo el cuerpo.

DISTRIBUCIÓN IRREGULAR DE LA SANGRE; aflujo de sangre a la cara, alpecho, CONGESTIONES

LOCALES QUE PUEDEN IR ACOMPAÑADAS DE HEMORRAGIAS, TENDENCIA a hemorragias.

CLOROSIS.

"Ciertas personas piensan que se puede tomar dosis ilimitadas de hierro : esto es un grave error.

Es posible que no haya otro remedio que se haya mal prescrito y del que se ha abusado tanto como el hierro.

Así como se puede ahogar una persona con demasiado agua, envenenarlo por exceso de cloruro de sodio, enfermarla por demasiados elementos constitucionales u orgánicos comunes, lo mismo se puede saturar el organismo con hierro y provocar síntomas mórbidos.

Al estudiar los efectos tóxicos de esta sustancia sobre la sangre, se encuentra que su acción principal es reducir la tasa de hemoglobina y por consiguiente la de oxígeno en la sangre arterial; se encuentra también disminución de cantidad de ácido carbónico en la sangre venosa.

Todo esto es paralelo con disminución de glóbulos rojos, el número de leucocitos puede estar un poco aumentado.

El estado de la sangre es el mismo que en la clorosis, el efecto del hierro imposibilita a los glóbulos rojos de acarrear al torrente circulatorio una cantidad normal de hemoglobina.

No debemos confundir los efectos sobre un clorótico.

Habrà en este último, aumento de hemoglobina, de apetito, de la actividad del cuerpo y del vigor, hasta tanto el enfermo tenga la dosis que puede soportar; si se va más allá, los síntomas serán invertidos; en el primer caso, si se da hierro a un individuo cuya sangre es normal, no podrá ser utilizado por la sangre y será rechazado como sustancia extraña e inasimilable, por los intestinos; ferr. es el similar patológico de la clorosis y es entonces el remedio más a menudo indicado; sigue bien a china, pero no debe ser empleado simultáneamente con él.

En fin, no es el remedio exclusivo de la clorosis y debemos diferenciarlo de puls., calc. ost., graph., etc."

Aparato respiratorio

NARIZ :

Coriza que termina en pérdida de sangre.

Epistaxis por nada, particularmente al agacharse.

BRONQUIOS Y PULMONES :

Tos seca, espasmódica, que comienza después de las comidas, con vómitos alimenticios.

Tos espasmódica sobre todo a la mañana, con expectoración de mucosidades tenaces y transparentes.

Tos con esputos de sangre, sobre todo de noche o a la mañana.

Tos después de pérdida de líquido humoral, sangre etc.

Sensación de estrechez y opresión en el pecho, de constricción; aflujo de sangre al pecho, hemoptisis (millef.).

Espalda y extremidades

Sujeto débil y postrado, debilidad al hablar.

Laxitud y sensación de pesadez en los miembros; necesidad, continua de cambiar de posición.

Lumbago mejorado al caminar lentamente.

Dolores reumáticos mejorados por calor y por movimiento lento; agravados por frío, por esfuerzo o movimiento rápido.

Los dolores de ferr. sobrevienen sobre todo de noche cuando trata de estar tranquilo en su lecho.

Dolores violentos en músculos y a lo largo de los nervios.

Dolores que le dan la impresión de que va a perder la facultad de mover la parte dolorida.

DOLORES EN ZONA DEL DELTOIDES; no puede ya mover el brazo; se pueden encontrar en los dos hombros, aunque ciertos autores pretenden que son más característicos a la izquierda (sticta pulm.); a la derecha : sanguin.).

Puntadas desgarrantes en articulación de hombro y brazo, con pesadez de miembro del lado afectado.

DOLORES PUNZANTES, DESGARRANTES, EN ARTICULACIÓN COXO-FEMORAL, que pueden irradiar a todo lo largo de la pierna que parece pesada.

Calambres en pantorrillas.

Edema de extremidades.

Piel

Acné en cara, pecho y espalda.

Fiebre

Escalofríos particularmente al atardecer, que se prolongan a la noche.

Durante el escalofrío, frío en extremidades con cabeza y cara calientes y mejillas rojas.

Sed durante el escalofrío.

Los escalofríos mejoran después de haber comido.

Calor a la tarde, sobre todo en las manos.

Sudores abundantes y debilitantes.

Sudor nocturno con olor fuerte.

Todos los síntomas se agravan durante la transpiración.

Todos los síntomas febriles mejoran moviéndose suavemente.
En fiebre intermitente, después de abuso de quinina (Kent).

Relaciones

Antídotos

Ars. alb., hep. sulf. calc., puls.

Complementarios

China, alum., hamam.

FLUORIC ACID

O ácido fluorhídrico, anhidro, es un gas incoloro y muy soluble en agua.

Hidratado, y lo más concentrado posible, es un líquido incoloro de densidadde 1,06, hierve a los 30ø, su olor es picante y penetrante; produce vapores blancos espesos y se mezcla en agua en todas proporciones.

Toma su nombre del flúor de donde se obtiene destilando esta sal con ácidosulfúrico concentrado.

Ataca el vidrio, porcelana y la mayoría de los metales y en general todos los cuerpos que contienen silicium.

Para preparar las 6 primeras dinamizaciones se procede a diluir el ácido fluorhídrico líquido en agua destilada, para las tres primeras, luego se hace una mezcla a partes iguales de agua y alcohol para las tres siguientes y a continuación se diluirá en alcohol la 7a. dinamización y las más elevadas.

Acción general del medicamento

Fluoric. acid. actúa principalmente sobre TEJIDOS INFERIORES DEL CUERPO, HUESOS, MÚSCULOS, PIEL Y FANERAS.

Ejerce sobre TEJIDO ÓSEO acción profunda por la cual está muy cerca desilic.

Está indicado por los síntomas que desarrolla, en caries óseas, particularmente en huesos largos y también en necrosis de huesos temporales-mastoideos, así como fistulas dentarias; la supuración que acompaña estas necrosis, es líquida y excoriante.

También actúa sobre MÚSCULOS, determina aumento de resistencia muscular; un individuo, bajo su influencia es capaz de desarrollar más trabajo muscular; tiene más capacidad para soportar el calor del verano o frío del invierno; en una palabra, el remedio tiene un efecto general de producción de vigor; es un tónico muscular.

Se le puede aproximar aquí a rhus tox., que da más resistencia a la fatiga muscular; a ars. alb., a coffea, a FORMI ACID.

Ha producido, y por consiguiente, es útil en la cura DE VENAS VARICOSAS (calc. fluor.).

En la piel, determina un estado de rudeza y dureza al mismo tiempo que erupciones de naturaleza variada.

Hay mucho prurito y pocos remedios desarrollan tanta comezón como él; esta comezón se alivia por frío y aumenta por calor.

Fluor acid. es UN MODIFICADOR DE ACCIÓN MUY PROFUNDA, mirado por Kent, a la vez como antipsórico, antisifilítico y antisicótico.

Es insidioso en su acción y sus síntomas son lentos en aparecer; se parecen a los que se desarrollan en las enfermedades más profundas, de marcha crónica, las más constitucionales. (Espanet).

Características

1) CONSTITUCIÓN Y TIPO : Fluor acid. corresponde particularmente bien a síntomas de enfermedades que sobrevienen a gente vieja o particularmente envejecida, en sífilíticos abundantemente mercurializados; en jóvenes con aspecto de viejos. (Allen).

2) SENSACIÓN DE CALOR DESUDADO, DE QUEMADURA.

ACRITUD.

Estas palabras describen los síntomas del remedio.

Al anochecer y a la noche gran calor que parece desprenderse del cuerpo, sin que haya aumento de temperatura; la piel se pone muy caliente; y el cuerpo parece exhalar gran calor.

Los pies queman, escuecen, y los saca del lecho, o busca un lugar frío en la cama, para refrescar los pies o las manos.

La planta de los pies y palmas de las manos transpiran y esta transpiración es acre, excoriante, excoiación entre dedos de los pies, causada por transpiración maloliente, acre, irritante, entre los dedos grandes de los pies; lagrimeo acre, secreción acre por nariz; sudor acre, etc.

Sensación de ardor y dolores ardientes (Kent).

Modalidades

Lateralidad

Derecha superior, izquierda inferior.

Agravación

a) POR CALOR, a menudo se agrava por cosas calientes, estando muy abrigado, por aire caliente; se sofoca un poco como puls., en cuarto caliente; desea refrescarse la cara en agua fría, esto le hace bien; bebidas calientes provocan indigestión o diarrea (Kent).

b) Cuando está de pie o sentado.

c) Por vino y estimulantes. (zincum).

Mejoría

a) POR FRÍO, APLICACIONES FRÍAS, AL AIRE LIBRE.

b) Después de corto sueño, que parece aliviarlo.

Síntomas mentales

"Exaltación y alegría; INDIFERENCIA POR LOS QUE MAS QUIERE, aversión por un mujer, hijos, sus mejores amigos; ha perdido ese buen cariño, noble y ordenado, esa amistad y simple camaradería que existe en todo hombre normal, y sin embargo lucha contra ello; un hombre normal considera a su mujer su mejor amiga y prefiere estar cerca de ella antes que ir a otra parte, para él no hay nada como su hogar; cuando un hombre llega a desear ir a otra parte, abandonar su casa, donde todo lo abrume, no quiere ya a sus hijos como antes, necesita fluir. acid.; sensación de indiferencia por los que más ama.

El estado de sepiá, se le parece, pero sepiá es más frecuentemente indicado en mujeres; estando lo más a menudo en relación con trastornos útero-ováricos" (Kent).

Retencia y silencio; permanece sentado en un rincón sin decir nada.

"Esto se parece a puls.; puede encontrarse en locos, que permanecen todo un día sentados en un rincón sin decir nada, sin pronunciar palabra, responden apenas cuando les hablan quedan así, sin hacer nada, comiendo solamente si se les presentan alimentos, se dejan llevar dócilmente a su cuarto en el momento de ir a dormir, no resisten nada de lo que se les quiere hacer; fuera de esto, ocioso y mudo; se encuentra un estado parecido en puls. al cual se parece mucho. Todo esto es un poco de locura, pero la causa principal es fatiga y lasitud de un cerebro fatigado.

Agotamiento mental provocado por surmenage intelectual o abandonarse a los vicios.

"Personas con surmenage, que han exigido a su cerebro un esfuerzo demasiado grande o prolongado, para instalar o hacer prosperar un negocio o empresa.

Depresión mental, con melancolía y gran tristeza en jóvenes que han dañado su sistema nervioso, por abuso de funciones genitales o masturbación." "Individuos que tienen continuamente necesidad de cambiar de amante; especie de trastorno psíquico que hace que se cansen pronto de la misma mujer y cambie sin cesar, yendo de mal en peor, hasta llegar a hacerse completamente disoluto.

Si un hombre joven no puede pasar sin mujer, pero se limita a una sola, esto no es nada; pero si va de una a otra hasta llegar a apostar en las esquinas para hablarles y desear todas las mujeres que pasen, necesitará fluir. acid.; que convendrá a este estado como picr. ac. y sepiá.

Estos remedios convienen particularmente cuando hay este desorden del cuerpo humano y este debilitamiento intelectual, que rebajan todos los sentimientos del hombre, provocándole ese estado psíquico llamado : "bajeza de espíritu".

Esto se encuentra en el "don Juan" (Kent).

Sueño

Deseo continuo de dormir, sobre todo a la mañana y particularmente las últimas horas de medio día Al atardecer, deseo de dormir, casi constantemente, seguido de un largo sueño de noche.

Insomnio toda la noche, seguido a veces hacia la mañana de corto sueño reparador.

A la mañana, al despertar, se encuentra mejor, aún después de haber dormido poco.

Sueño profundo y largo, hasta entrada la mañana, con aturdimiento al despertar.

Muchos sueños, principalmente de muerte o cosas terroríficas; los sueños son a veces tan patentes como si las cosas pasaran en realidad, pero los olvida pronto.

A menudo los sueños no tienen lugar sino a la mañana o después de medianoche.

Cabeza

Sensación de entumecimiento de cuero cabelludo.

Los cabellos pierden brillo, se quiebran, caen.

Alopecia.

Cabeza turbada, principalmente a la mañana al despertar hasta el desayuno, y sobre todo del lado derecho o del occipucio.

Dolores presivos en la cabeza, a veces suben de la nuca o en los huesos de la frente, pero sobre todo en los dos temporales y a los dos lados del occipucio.

Dolor de cabeza que pasa rápido de un punto a otro, con sensación de peligro inminente.

Caries de huesecillos y mastoides con secreción abundante; agravada por el calor (silic. se agrava por frío).

Exostosis.

Ojos

Sensación como si un soplo de aire pasara a través de los ojos; sensación como si le abrieran los párpados a la fuerza y un viento fresco soplara encima.

Fístula lagrimal.

Sensación de prurito intenso en ángulo interno del ojo.

Cara

Calor en la cara, sobre todo después de haber hablado mucho o haber tomado vino.

Gran necesidad de lavarse la cara con agua fría.

Músculos de la cara siempre en movimiento.

Dolores en huesos faciales, ya espasmódicos, ya ardientes o como si allírevolvieran un cuerpo puntiagudo.

Sensación de congestión con calambres en las mandíbulas.

Erupción herpética y costrosa en la cara, en niños; granitos rezumantessobre fondo rojo, con mucho prurito que obliga a rascarse.

Costra de leche con erupción en cuero cabelludo.

Aparato digestivo

BOCA :

Los dientes se deterioran o caen fácilmente; fistula dentaria con secreción.

Afecta particularmente los dientes y maxilar superior.

Sensación de calor en los dientes.

FARINGE :

Ulceraciones crónicas de garganta, muy sensibles al frío.

Fluor. acid., es muy indicado en antiguos sifilíticos, no tanto para ulceraciones faríngeas específicas del segundo período, sino para las que aparecen muy tarde, acompañando a trastornos nerviosos crónicos; muy a menudo la enfermedad se manifiesta de nuevo en la garganta bajo forma de pequeñas ulceraciones gomosas o pequeños promontorios gomosos; silic. es a veces indicado en estos casos, es buen medicamento para eliminar mercurio del organismo; bajo la forma dinamizada, silic. y merc. son enemigos (Kent).

ESTÓMAGO :

Desea agua fría, tiene continuamente hambre, sensación de debilidad en el estómago, come todo el tiempo, y esto le alivia el hambre, pero por poco tiempo, como en iod.

Desea alimentos muy condimentados; necesita excitar su apetito y lo consigue con condimentos.

A veces el apetito es variable; a pesar de tener un hambre terrible no puede comer y sin embargo está mejor cuando tiene alimento en el estómago, mejora después de haber comido.

Repugnancia por el café, más tarde, después de haber experimentado lo contrario los primeros días.

Calor en el estómago antes de comer.

Eructos agrios.

Los síntomas estomacales se alivian apretando bien las ropas en esa zona.

Eructos frecuentes de aire.

ABDOMEN Y DEPOSICIONES :

Muchos borborigmos y vientos frecuentes, generalmente fétidos.

Sensación de desfallecimiento como de vacío en región umbilical, con necesidad de respirar profundamente y mejorada apretando el vientre.

Dolores en el lado izquierdo del vientre, como en el bazo.

Dolorimiento al nivel del hígado.

Comezón anal, a veces intensa.

El ano sale durante la deposición; después de la deposición, hemorragia hemorroidaria abundante; hemorroides con constipación; prurito alrededor y en el ano, en el periné, etc. (Kent).

Fistula anal.

Deposición diarreica cada mañana después del café y a la noche tarde, con tenesmo y salida del recto, en un hemorroidario.

Deposiciones abundantes, algunas veces con dolores de pinchazos en el abdomen; deposiciones diarreicas cada dos días; un poco más tarde, con retrogresión de las 2 de la mañana hasta medio día.

Antes de las deposiciones, muchos vientos muy fétidos.

Diarrea biliosa con aversión por el café.

Aparato urinario

Antes y después de la emisión de orina, dolor en vejiga o cuello de vejiga; la presión también es dolorosa.

Secreción urinaria disminuida los primeros días, aumentada los días siguientes.

Olor penetrante, picante, de la orina.

Emisión fácil de orina clara, no aumentada, con sensación de bienestar después.

Dado en la hidropesía, cuando está indicado por los otros síntomas, provoca frecuentes y francas micciones que traen gran alivio.

Órganos genitales

MASCULINOS :

Eyacuación menos pronta que antes, y muy abundante, sin ninguna incomodidad después.

Apetito venéreo disminuido sin impotencia, los primeros días, o bien, deseoso violento de coito, con erecciones de noche sobre todo, durante el sueño.

Eretismo sexual intolerable; las erecciones lo tienen despierto de noche.

Tiene reacciones no solamente cuando está cerca de una mujer, sino todo el tiempo.

A veces, al principio de una blenorragia, este estado de priapismo y de deseo sexual intenso e irresistible, con edema de prepucio, puede ser curada por fluor. acid., hay casos en que este priapismo pide cantharis, pero estos dos remedios difieren tanto que no se pueden confundir.

FEMENINOS :

Reglas demasiado adelantadas, más abundantes que antes, demasiado largas.

Metrorragia crónica con sufrimientos asmáticos.

Leucorrea amarillenta abundante, corrosiva, con excoriaciones y sensación de ardor en partes genitales externas.

Ulceraciones de cuello.

Aparato respiratorio

NARIZ :

Después de beber, de noche, cerveza o vino, coriza súbito a la mañana, con secreción violenta y a veces irritante.

Estornudos frecuentes a la mañana.

Accesos de coriza que aparecen y desaparecen súbitamente.

Catarro nasal crónico, con ulceraciones; sensación de obstrucción y plenitud dolorosa en la frente.

Ozena con secreción maloliente, acre y necrosis de huesos en la nariz.

BRONQUIOS Y PULMONES :

Necesidad de respirar profundamente a veces con sensación de plenitud en el pecho.

Opresión, respiración difícil, gran disnea.

Dolor en el lado izquierdo del pecho, al respirar.

Aparato circulatorio

Un rasgo excelente y útil de este remedio es su capacidad para producir várices y úlceras varicosas.

Las venas pueden hacerse varicosas en cualquier lugar, en el ano por ejemplo, donde forman hemorroides salientes después de la deposición, pero sobre todo en los miembros inferiores; tendencia a formación de ulceraciones varicosas, indolentes, con bordes inflamados, brillantes, y duros.

Espalda y extremidades

Sensación de calor como de soplo caliente en la nuca, que sube hacia el occipucio, o se dirige hacia el hombro.

Dolores dorsales, profundos, en el interior, debajo de la punta de los omoplatos, particularmente estando sentado y sobre todo yendo en coche.

CARIES DE HUESOS, PARTICULARMENTE DE HUESOS LARGOS (aunque indicada también en carie de huesos del macizo facial), con trayectos fistulosos y secreción excoriante, acre.

Fluor. acid. tiene mucha analogía con silic. y le sigue bien cuando ha sido dado demasiado frecuentemente por médicos que no saben que no hay que darlo a dosis muy aproximadas; no solamente antidota las consecuencias del abuso de silic., sino que lo sigue bien.

Uno se sorprende, a veces, al ver en ciertos casos, al enfermo oscilar como un péndulo, entre el calor y el frío.

Tenemos por ejemplo, un enfermo que sufre por calor, por estar demasiado abrigado, por estar en pieza caliente sobre todo a la noche, que está siempre lagrimeante y triste y puede ser rubio; es un sujeto de puls., todo el mundo puede ver esto.

Pero después de haber dado este remedio durante cierto tiempo, se verá que se va al otro extremo, se hace friolento, quiere estar abrigado, busca el calor : silic. ha seguido a puls., y es sorprendente, a veces, ver cuán a menudo, un enfermo que deja puls., va hacia silic. : silic. entra más profundamente en el caso, cura más profundamente y es el crónico natural de puls.

Otros remedios siguen también a puls., pero silic., más frecuentemente que ningún otro.

Pero cuando silic. ha sido administrado durante cierto tiempo y ha hecho al enfermo menos friolento (hay que recordar que silic. tiene a veces algo de puls. : en algunos de sus síntomas se agrava por mucho calor); poco a poco se siente incomodado por el calor, rechaza sus cobijas, quiere estar poco arropado : en ese momento fluor. acid. entra en escena.

Sigue a silic. tan naturalmente como silic. sigue a puls.

Viven los tres juntos.

Hay otros remedios que viven de a tres; los más corrientes son sulph., calc. y lycop.; sulph., ars., y sepia, o coloc., caust., y staph., que a menudo se siguen de manera cíclica.

Volviendo a puls., silic. y fluor. acid. vemos que se parecen de manera general en cuanto a la naturaleza de sus síntomas.

Puls. corresponde a trastornos más agudos, a las primeras fases de una enfermedad crónica, a su período activo.

Quitará o suavizará lo agudo de la enfermedad, y será seguido por un remedio complementario, elegido según los síntomas que sobrevengan.

Hay casos que se agravarían mucho, si se diera al principio un remedio de acción tan profunda como silic., pero si se comienza por puls., se puede suavizar el caso y prepararlo para recibir útilmente silic. a condición de que ambos parezcan concordar en sus síntomas.

Un caso muy serio, debe recibir primero puls. y una vez preparado el camino puede seguirla silic. (Kent).

Gran disposición a mover constantemente toda parte del cuerpo.

Muestra su mal humor en rasgos de la cara y movimientos.
 Manos, dedos, pies, maxilares, labios, cejas, párpados y músculos de la cara constantemente en movimiento.
 Dolores osteóscopos en los brazos, que pasan del derecho al izquierdo.
 A la mañana, al despertar, el brazo, sobre todo el derecho, pesado, como entumecido, o como golpeado y helado.
 Entumecimiento de mano y brazo, hacia la mañana con estremecimiento y debilidad parálitica hasta mediodía.
 Falta de fuerza, debilidad, torpeza y sensación parálitica en las manos.
 Palma de manos rojas, calientes, con sudor continuo.
 Dolores y sensación de magulladura en caderas y muslo.
 Entumecimiento fácil de piernas.
 Sensación de ardor en planta de pies.
 Sudor irritante en los pies.
 Circulación lenta en las extremidades, manos y pies fríos : al atardecerlas extremidades queman, y están como afebradas porque es la hora de una especie de estado febril, pero a la mañana y de día, las extremidades están frías (Kent).

Piel

Lo que muestra bien que el remedio tiene acción muy profunda, que perturba las funciones de la nutrición y asimilación de manera profunda, es que bajo su influencia, piel, cabellos y uñas presentan síntomas marcados. Cada vez que esto pasa, sabemos que el remedio que presenta tales trastornos en esta esfera tiene gran profundidad de acción y actúa muy largamente.
 Especies de pequeñas costras, aparecen acá o allá sobre la piel, sin ninguna tendencia a desaparecer, los cabellos pierden brillo y caen; su extremo está seco, se quiebran fácilmente.
 Las uñas crecen mal, presentan estrías y crecen rápido y mal, se deforman, demasiado gruesas en ciertas partes y demasiado delgadas en otras; quebradizas, se rompen fácilmente.
 Tendencia a lesiones cutáneas, donde la piel tiene circulación poco marcada o donde cubre, sin plano muscular subyacente espeso, un hueso, articulación o cartilago, como en las orejas o región de la tibia, fácilmente se forman ulceraciones (Kent).
 Dolores ardientes, circunscriptos a diversos lugares de la piel.
 Estado particular de aspereza y dureza de la piel, que produce erupciones cutáneas de naturaleza variada.
 Hay pocos remedios que provoquen tanta comezón general y persistente; aumentada por calor, y se alivia por frío.
 Prurito en la cabeza, cejas, párpados y cara; el prurito se manifiesta sobretudo en parte posterior del cuerpo, espalda, y se agrava hacia la noche, o aparece a la noche y la mañana.
 En la mayoría de los casos, el prurito es con pinchazos y hormigueos, circunscriptos en lugares pequeños, que obliga imperiosamente a rascarse, y seguido a veces de granitos agrupados.
 Antiguas cicatrices se vuelven pruriginosas, rojas en sus bordes y secubren de pequeñas vesículas.
 Aparición de pequeñas telangetáceas en forma de pequeñas vesículas sanguinolentas, de granitos desde el tamaño de un grano de mijo hasta un grano de cáñamo.
 Herpes secos, pruriginosos; ardientes.
 Hinchazones varicosas obstinadas.
 Úlceras tórpidas; ulceraciones varicosas.
 Sensación como si un vapor caliente fuera emitido por los poros de la piel.
 Es sobre todo, cuando está acostado, bajo sus cobijas, cuando tiene esa sensación de gran calor, de una especie de evaporación de lejía caliente por la piel; esto no es fiebre; no tiene fiebre, sino una especie de estado crónico de calor, una emisión de calor, sin sed, ni aumento de temperatura (Kent).

Relaciones

Complementarias

Coca, silic.

Conviene después de ars. alb. en ascitis de los ebrios; después de kalicarb. en coxalgia; después de coffea, staph., en el tratamiento de ciertos dolores dentarios; después de phosph. en diabetes; después de silic. y simph. en enfermedades óseas; después de spong. en bocio.

GELSEMIUM SEMPERVIRENS

Gelsemium, jazmín de Virginia o silvestre, o amarillo, es un arbusto trepador de la familia de las Loganiáceas, con bellas flores que abren en primavera y exhalan un delicioso perfume.
 Originario de Virginia, en el sud de América del Norte; se encuentra frecuentemente en Texas, Florida y México.
 Se prepara la tintura madre con la que obtenemos por diluciones sucesivas las diferentes dinamizaciones; en EE. UU. se utiliza la raíz recién recolectada un poco antes de su floración.
 Se puede también partir de trituraciones preparadas con la raíz seca.
 Acción general del medicamento
 En casos de envenenamiento por la planta, que es extremadamente venenosa, particularmente corteza y sobre todo raíces, el síntoma predominante y universal ES PARÁLISIS DE NERVIOS MOTORES.

Al principio, el espíritu está lúcido; cuando mucho hay estado de ligera estupefacción con pereza mental y de la emotividad.

Avanzando en sus efectos tóxicos, notamos que los esfínteres se relajan, dejan pasar involuntariamente orina y materia fecal.

Más tarde la respiración se hace trabajosa como si la musculatura del pecho no pudiera asegurar los movimientos respiratorios.

Finalmente el músculo cardíaco cede y el enfermo muere.

Considerando estos síntomas como presentando en resumen la acción del medicamento, vemos, si examinamos con más detalles su patogenesia, que parece concentrar principalmente su influencia sobre EL SISTEMA NERVIOSO en que tiene acción electiva, DEPRESIVA Y PARALIZANTE, produciendo primero diversos grados de PARÁLISIS DE CENTROS MOTORES, DESPUÉS DE CENTROS SENSORIALES.

Su acción paralítica va acompañada por cierto grado de ESTUPEFACCIÓN DEL ESPÍRITU Y PEREZA DE PENSAMIENTO y EMOTIVIDAD : parálisis de grupos variados de músculos alrededor de ojos, laringe, pecho, esfínteres, extremidades, etc.

También tiene alguna afinidad con MUCOSAS en que origina INFLAMACIONES CATARRALES más o menos marcadas.

"Los síntomas de gels., son principalmente de ORIGEN CONGESTIVO, (Kent); esta hiperemia pasiva a la vez venosa y arterial, es consecutiva a su acción sobre nervios vaso-motores.

Hiperemia cerebral, aflujo de sangre a cerebro y médula; las extremidades se ponen frías y cabeza y columna vertebral calientes, ardientes; a través de estas lesiones de cerebro y médula se manifiesta la mayoría de sus síntomas.

Asociados a trastornos cerebro-medulares, vemos convulsiones de extremidades, calambres en músculos de espalda y dedos.

Sensación de frío en dedos y a veces piernas heladas hasta las rodillas, mientras la cabeza está caliente y la cara congestionada, violeta; al mismo tiempo, ojos inyectados y pupilas dilatadas (aunque a veces contraídas); el enfermo se siente aturdido, atontado, y habla como si tuviera delirio.

Gran sensación de frío que sube a lo largo de la espalda, desde el coxis hasta el occipucio; escalofrío como si le frotaran la espalda con hielo; los dolores se extienden a lo largo de la columna vertebral, por la espalda, de abajo hacia arriba.

Puede haber, al mismo tiempo que esos síntomas de hiperemia cerebral, sensación de rigidez, contracción hacia atrás de los músculos de la nuca, al punto que no puede doblarse hacia adelante.

Puede haber también, asociados a esto, dolores violentos a lo largo de la columna vertebral y gran sensación de frío. Esto hace pensar en ciertas formas de meningitis cerebro espinal.

Dolores en base de cerebro y nuca.

En todos estos casos, piel muy caliente y temperatura elevada; a veces al principio, escalofríos violentos.

Gels. merece toda atención cuando habiéndose presentado los síntomas con cierta intermitencia, la lengua se carga, aparecen náuseas que terminan en vómitos biliosos, y la fiebre se hace continua con ascensión neta a la tarde; los escalofríos han desaparecido, dejan al enfermo en un estado parecido al de la fiebre tifoidea, con mucha sequedad de lengua, sin sed, dolor de cabeza y embrutecimiento de espíritu; finalmente delirio y todos los síntomas de la fiebre tifoidea se instalan con fiebre alta de tipo continuo.

Los síntomas de gels. sobrevienen con cierta lentitud, de manera casi insidiosa.

Mientras que los casos de acon. y bell. sobrevienen sobre todo en climas fríos y vivos, cuando el frío es muy intenso y la gente que se expone a él es afectada muy rápida y violentamente; los de gels. sobrevienen con cierta lentitud y se encuentran en climas más cálidos, más húmedos, cuyos habitantes tienen reacciones más lentas; sus resfríos, no son provocados por exposición al frío vivo y seco, sino por haber tomado frío después de haber tenido demasiado calor.

LOS RESFRÍOS Y ENFRIAMIENTOS DE INVIERNOS CLEMENTES, TENDRÁN MÁS BIEN NECESIDAD DE gels.

MIENTRAS QUE LOS DE UN INVIERNO RIGUROSO PEDIRÁN MÁS PROBABLEMENTE aconit. y bell.

Gels ha sido empleado sobre todo en afecciones agudas de marcha lenta, largas, que tienden a la cronicidad, pero no en afecciones verdaderamente crónicas; no es un medicamento de acción corta, aunque lento en desarrollarse; en esto se parece a bryon. que también conviene a climas cálidos, cuyos males sobrevienen lentamente aunque puede haber súbitos, pero jamás tan violentos como bell".

Características

1) CONSTITUCIÓN Y TIPO : Este precioso medicamento del sistema nervioso conviene especialmente a individuos sensibles, irritables, que tienen marcada debilidad general con muchos temblores (J. H. Martin).

Niños, jóvenes extremadamente nerviosos, muy irritables de cara abotagada, que se pone súbitamente roja, violeta, y aspecto estúpido. (Chirón).

2) COMPLETA RELAJACIÓN Y POSTRACIÓN DE TODO EL SISTEMA MUSCULAR CON PARÁLISIS MOTRIZ COMPLETA E INCOMPLETA; TEMBLORES.

Esta postración muscular, parece ser consecuencia de incapacidad de nerviosmotores para transmitir el influjo nervioso voluntario.

También tenemos este síntoma : LOS MÚSCULOS PARECEN NO PODER YA OBEDECER A LA VOLUNTAD. Este estado se efectúa gradualmente : el primer síntoma es SENSACIÓN DE LAXITUD Y DEBILIDAD GENERAL; se siente tan débil que desea acostarse (pícr. acid.) y tiene tendencia a adormecerse; EL PULSO SE VUELVE DÉBIL Y LENTO PARA REFORZARSE Y ACELERARSE AL MENOR MOVIMIENTO.

Hay que insistir en el valor de este síntoma que es un guía precioso para la elección del remedio en fiebres que le son características : SENSACIÓN DE GRAN FATIGA EN TODO EL CUERPO Y LOS MIEMBROS QUE APARECEN PESADOS, MUY PESADOS; no puede levantar la cabeza de la almohada, ni los miembros de su lecho; parecen demasiado pesados.

Más tarde ESTA LAXITUD GENERAL VA ACOMPAÑADA DE TEMBLORES.

Al tratar de caminar, sus piernas tiemblan o si trata de asir algo, sus manos tiemblan; si trata de sacar la lengua tiembla; todo esto por debilidad.

Si debiéramos dar a gels. un calificativo para indicar su principal característica.

Nash indicaría : el "REMEDIO TEMBLOROSO".

A veces, el temblor es tan intenso que el enfermo está como sacudido por violento escalofrío aunque, en realidad, no haya verdadero escalofrío ni subjetivo ni objetivo.

Esta debilidad llega a esto de PARÁLISIS COMPLETA y entonces aparecen síntomas como los siguientes : los párpados caen (sepia, caust.) a veces se cierran completamente.

LOS DEDOS YA NO OBEDECEN, no puede hacer con ellos lo que desea, ni dirigir sus pies cuando camina, aunque el sensorio permanece intacto pero con un ligero sopor; sabe perfectamente lo que quiere o debe hacer, pero no puede.

Y esta debilidad muscular es tan marcada que se encuentra en todas partes.

ACOMPAÑA NEURALGIAS, ESPASMOS Y CONVULSIONES que provoca y cura el remedio; en la neuralgia de trigémino de gels., hay ptosis de párpado del mismo lado por debilidad.

PARÁLISIS DE GRUPOS VARIADOS DE MÚSCULOS, en garganta, laringe, esfínteres, pecho, extremidades, etc.

3) HIPERSENSIBILIDAD NERVIOSA : Gels. está a menudo indicado en trastornos nerviosos motivados por BRUSCA EXCITACIÓN O EMOCIÓN VIOLENTA, malas noticias, temor por suceso imprevisto; o también en trastornos nerviosos ligados con gran timidez a vencer; uno de los efectos más frecuentes que los acompañan es diarrea.

Deposiciones involuntarias provocadas por susto o sorpresa acompañada de susto, espanto.

Bajo la impresión de una sorpresa se pone débil, se siente agotado; todos sus miembros se debilitan y es incapaz de resistir las contrariedades; a la menor, su corazón palpita.

Esto se parece a arg. nit. que tiene este síntoma singular : al vestirse para ir al teatro, es presa de súbito ataque de diarrea que provoca más o menos laxitud, y se ve obligada a evacuar varias veces antes de terminar de vestirse.

Los que deben aparecer ante un auditorio, se ven impedidos de hacerlo por ataque súbito de diarrea.

Una dama tiene un ataque súbito de diarrea en el momento que debe encontrarse con amigos que sabe que la abrumarán, la agitan; LA APRENSIÓN PROVOCA DIARREA.

Estos síntomas se encuentran en arg. nit. que está tan estrechamente ligado con gels., que en ciertos momentos, uno parece hacer el trabajo del otro (kent).

Modalidades

Agravación

Por tiempo húmedo, niebla, tormenta; por emociones, malas noticias, agitación nerviosa cuando piensa en sus dolores (calc. ph., etc.).

A las 10 de la mañana.

Por tabaco.

Mejoría

Al aire libre.

Por estimulantes.

Después de orinar abundantemente.

Inclinándose hacia adelante.

Síntomas mentales

El sujeto de gels. ES LENTO, PEREZOSO, DORMIDO; TEME AL MOVIMIENTO.

SUS FACULTADES MENTALES ESTÁN ENTORPECIDAS : no puede pensar claramente ni fijar su atención.

Desea permanecer tranquilo; no quiere que le hablen, ni siquiera tener a alguien cerca para acompañarlo, aunque éste permanezca silencioso.

Este deseo de soledad, no es provocado como en sepia por tristeza o porque todo lo abruma o lo irrita, gels. quiere, por sobre todas las cosas, estar en paz, porque tiene pereza para hablar y pensar y la presencia de alguien cerca, aún silencioso, lo fatiga.

Este estado de espíritu se suspende a veces temporariamente para dar lugar A ESTADO DE EXCITACIÓN; pero éste no es el efecto verdadero del remedio, es el resultado de la reacción del organismo, como el insomnio sucede en opium al sopor y torpeza característicos.

SOBREEXCITACIÓN EMOCIONAL, después del miedo, shock mental, que CONDUCE A TRASTORNOS FUNCIONALES, consecuencias molestas de susto, emoción, mal noticia.

Trae de actores.

EL NIÑO SE AFERRA A SU NODRIZA GRITANDO, COMO SI TUVIERA MIEDO DE CAER.

Esto se encuentra también en Bórax, con la diferencia que en éste, esto sólo aparece cuando la nodriza se inclina para poner al niño en su cama, o en cada movimiento de descenso al acunarlo.

Sueño

Muy agitado, le cuesta mucho dormirse; la menor agitación lo mantiene despierto.

Cuando tiene fiebre, sueño profundo, comatoso; cuando no tiene este sueño comatoso, está en estado de excitación nerviosa que lo mantiene despierto a causa de un aflujo de pensamientos al cerebro, pero pensamientos vagos, sin coordinación porque el cerebro no funciona ordenadamente (Kent).

Cabeza

Dolores de cabeza de TIPO CONGESTIVO.

El dolor más violento está en el occipucio donde hay a veces sensación de latidos, martilleo : puede tener una sensación semejante en base del cráneo donde cada pulsación cardíaca se siente como un martillazo.

Dolores de cabeza tan violentos que no puede estar parado y debe acostarse, por estar completamente agotado de laxitud como si estuviera paralizado por el dolor.

Conviene mencionar un dolor de cabeza occipital que obliga a caminar o girar la cabeza sobre la almohada de un lado a otro.

Pero en general hay alivio cuando está acostado, la cabeza bien calzada por las almohadas y tranquilo; durante ese tiempo, cara congestionada, roja, violeta oscuro, y el enfermo está completamente embrutecido.

Un instante después de aparecer el dolor de cabeza, toda la cabeza parece congestionada, el dolor es tan violento, que no lo puede describir; pierde la facultad de decir sus síntomas, queda embrutecido en su cama, inmóvil, calzado en sus almohadas, pupilas dilatadas, cara marmórea, extremidades frías.

Gels. tiene también dolores de cabeza de carácter neurálgico entemporales y arriba de los ojos, acompañados de náuseas y agravados por vómitos que de ellos resultan; SE ALIVIA DESPUÉS DE MICCIÓN ABUNDANTE, ES DECIR QUE LA ORINA HASTA ENTONCES POCO ABUNDANTE AUMENTA SÚBITAMENTE Y EL DOLOR DE CABEZA SE CALMA (Kent).

Cefalea sorda, fatigante en base del cerebro; desea acostarse, la cabeza alta y quedarse completamente tranquilo; se agrava por trabajo mental, humo de tabaco, acostado con la cabeza baja, es más fuerte por el calor del sol, desaparece cuando se pone (glonoin., nat. mur., sang., spig.); mejora temporariamente por presión y estimulantes, es a menudo consecuencia de una salida de régimen, "de un desarreglo".

Jaqueca precedida por trastornos de la vista, hasta por una especie de ceguera; (cyclam. : dolor de cabeza con ceguera a la mañana, centelleo delante de los ojos, acompañado de vértigo; además los objetos parecen girar.) (Iris vers., kali bich; oleand. cuya cefalea va acompañada de sensación como si los ojos tiraran hacia atrás).

La mayoría de estas jaquecas no van acompañadas por muchas náuseas y vómitos, sino por gran DEBILIDAD Y TEMBLORES característicos.

Durante la jaqueca, está embrutecido, estúpido y su cara roja oscura, como si estuviera bajo la influencia del alcohol; además puede tener sensación de círculo alrededor de la cabeza carb. ac., iodine, merc., sulph., sang. e iris vers. tiene jaqueca parecida a gels. pero con mucho más náuseas y vómitos y mucho menos, a veces nada, de debilidad y temblores.

DEFLOR. tiene durante la jaqueca, abundante flujo de orina, pero que no aliviana.

Ojos

Neuralgia supra orbitaria con contracciones y tirones musculares; sensación de magulladura detrás de las órbitas.

DILATACIÓN DE PUPILAS, por parálisis del tercer par (nervio ocular común) que inerva fibras circulares del iris; en consecuencia como ya no hay resistencia a la acción de las fibras radiantes, la pupila se dilata.

En bell. al contrario, la pupila se dilata por acción excitante sobre el ganglio simpático que inerva las fibras radiantes del iris y cuya acción sobrepasa entonces la de las fibras circulares.

Physost., contrae la pupila, excitando el nervio motor ocular común, por eso actuará sobre la pupila dilatada por bell. (Dewey).

DESIGUALDAD PUPILAR.

PARÁLISIS DE DIVERSOS GRUPOS MUSCULARES DEL OJO : DIPLOPIA por paresia de músculos del ojo; ESTRABISMO; PTOSIS DE PÁRPADOS (sepia; caust., rhus en casos de ptosis de origen reumático).

Visión turbia : los objetos se ven como en una niebla. (cyclam., phosph.).

Gran inflamación con opacidad del cuerpo vítreo; inflamación serosa, retinitis albuminúrica.

Cara

Cara que se pone súbitamente roja oscura y caliente con expresión estúpida. (opium, bapt.).

Cara marmórea, violácea con vértigo y vista disminuida.
 Contracción de músculos de la cara, particularmente alrededor de laboca; temblor de mentón.
 Neuralgia facial, con dolores punzantes, que aparecen bruscamente y de manera tal, que hacen sobresaltar al enfermo al mismo tiempo la cara está congestionada y sus neuralgias van acompañadas de vértigos y trastornos de visión.

Aparato digestivo
BOCA :
 Sensación de sequedad en la boca.
 Lengua cubierta por ESPESA CAPA AMARILLENTEA.
 Lengua hinchada, tan abultada que apenas puede hablar.
 TEMBLOR DE LENGUA, cuando la saca.
 PARÁLISIS DE VELO DEL PALADAR.
 El enfermo traga difícilmente y apenas articula las palabras.

FARINGE :
 Garganta irritada y sensible, con inflamación que acompaña un catarro nasal.
 Dificultad para tragar, sobre todo alimentos calientes.
 Puntadas dolorosas en el oído, al tragar (hep. sulph., nux vom.). sobre todo ala derecha.
 Sensación de cuerpo extraño en la garganta, que no puede tragar.
 DISFAGIA POR PARÁLISIS; parálisis post-diftérica.
 El estado parético de músculos de la faringe explica el empleo de gels. en estas parálisis post-diftéricas.

ESTOMAGO :
 En general el enfermo de gels. NO TIENE SED.
 Hipo peor de noche.
 Sensación de vacío y debilidad en el estómago o como si tuviera un peso.
 Náuseas y vómitos.
 Pyrosis.

INTESTINO Y DEPOSICIONES :
 Sensibilidad de paredes abdominales.
 DIARREA SÚBITA, INDOLORA, INVOLUNTARIA, COPIOSA, DE COLOR CREMA(calc. carb.) O VERDE (CONSECUENCIA DE MALA NOTICIA). (phosph. ac.).
 POR MIEDO (opium; ver. arg. nit. en casos crónicos sobre todo; y puls.).
 O DE CUALQUIER EXCITACIÓN EMOCIONAL, CON LENGUA BLANCA O AMARILLA.

Aparato urinario
 Emisiones frecuentes y abundantes de orina clara como agua, límpida, acompañadas de escalofríos y temblores.
 Parálisis parcial de vejiga; sensación de micción incompleta, micciones intermitentes, la micción se detiene y después recommienza; (clemat.); incontinencia de orina.

Órganos genitales
MASCULINOS :
 Igual estado de laxitud y debilidad, característica general del remedio; impotencia, incapacidad, relajamiento de órganos.
 Postración y pérdida de energía de órganos genitales; escroto cubierto de sudor; espermatorrea sin erecciones; impotencia por onanismo.
 Gonorrea al principio; secreción poco abundante; dolores débiles salvo en el meato donde hay mucho escozor.

FEMENINOS :
VAGINISMO.
 Sensación de pesadez en útero; sensación como si el útero fuera apretado por una mano (cham., nux vom., ustil., cactus).
 Reglas atrasadas, poco abundantes.
 Afonía y dolor de la garganta durante reglas.
 Dismenorrea neurálgica con flujo poco abundante.
 Reglas atrasadas, poco abundantes, acompañadas de dolores agudos como de parto, en región uterina, con irradiaciones a espalda y caderas. (cimic.).
 Gels. está a menudo indicado durante el parto cuando hay dilatación difícil por rigidez de cuello.

Aparato respiratorio
NARIZ :
 Coriza aguda en su primera faz; sensación de plenitud en cabeza y sobre todo en base de nariz, fiebre con escalofríos, que corren de abajo hacia arriba a lo largo de la espalda, con gran deseo de aproximarse al fuego, violentos estornudos y la nariz deja correr líquido acre y excoriante; el resfrío tiene tendencia a descender a la garganta y todo ello va acompañado de gran laxitud y violenta sensación de pesadez en miembros.
 Predisposición a resfriarse al menor cambio de tiempo sobre todo si la temperatura pasa de caliente a más fresca.

LARINGE, BRONQUIOS Y PULMONES :

AFONÍA POR PARÁLISIS DE CUERDAS VOCALES.

Tos seca con pecho doloroso y coriza fluente.

Afecciones espasmódicas de pulmón y diafragma.

Extrema lentitud de respiración con sensación de peso en el pecho y postración.

Esto nos muestra que el estado parético se puede manifestar en éste como entodos los otros aparatos del organismo.

Aparato circulatorio

Palpitaciones; sensación como si el corazón fuese a dejar de latir, y de muerte próxima; debe levantarse y caminar para encontrar alivio.

Espalda y extremidades

SENSACIÓN DE DOLORS PESADOS, DE PESADEZ DOLOROSA; EN MASAS MUSCULARES, RELAJAMIENTO Y PARÁLISIS DE TODO EL SISTEMA MUSCULAR FATIGA LOS MÚSCULOS PARECEN MAGULLADOS; EL MENOR, MOVIMIENTO FATIGA.

TEMBLOR EXCESIVO de todos los miembros y debilidad excesiva (agaric., conium, mygale, merc., stram., sécale, arg. nit., phosph.).

PERDIDA DE CONTROL MUSCULAR; está torpe y los músculos ya no obedecen asu voluntad.

"El temblor, la falta de coordinación de movimientos y la debilidad parésica seobservan sobre todo con gran excitación; esto se encuentra también en afecciones febriles y puede persistir después de su desaparición; gels. es muy útil en casos de parálisis que han empezado durante un período de fiebre" (Kent).

Dolores agudos de localización profunda en músculos y articulaciones.

Dolores en cuello, sobre todo en región esterno cleidomastoidea.

Dolor en región sacro lumbar, que suben de abajo hacia arriba, a lo largo demúsculos de la espalda, o irradian a caderas y extremidades inferiores.

Calambres en músculos del antebrazo; calambre de los escritores.

Ciática obstinada, con dolores ardientes, que sobrevienen en ataques,acompañada de temblores y gran debilidad de miembros inferiores, del lado enfermo; los dolores se agravan por reposo, cuando comienza a moverse, como rhus tox, y mejoran por continuación del movimiento y transpiración.

Neuralgia crural anterior.

Contracción espasmódica de dedos grandes de los pies.

Piel

Erupción parecida a la de la rubéola, principalmente en la cara; piel roja y pruriginosa; síntomas catarrales con gran postración, estupor y ausencia de sed.

Fiebre

Jamás tiene la forma activa y violenta de la de acon. y bell.

Sus caracteres son : escalofríos sin sed, a lo largo de toda la columnavertebral, como la de frío que sube de sacro a occipucio, durante el estado de calor, calor ardiente en todo el cuerpo, pero sobre todo en la cara, con sensación de plenitud en la cabeza; en fin, transpiración abundante, agotadora.

Todo esto ACOMPAÑADO DE MUCHO SOPOR, ABATIMIENTO, Y GRAN POSTRACIÓN;

MUCHODOLOR MUSCULAR, Y GRAN SENSACIÓN DE PESADEZ EN MIEMBROS; TAMBIÉN HAY AUSENCIA DE SED.

Gels. está indicado en FIEBRE INTERMITENTE con ESCALOFRÍO NERVIOSOcaracterístico, a saber GRAN TEMBLOR CON CASTAÑETEO DE DIENTES, sin que haya al mismo tiempo verdadera sensación de frío ni objetiva ni subjetiva; EL ENFERMO TIEMBLA DE TAL MODO QUE PIDE QUE LO SUJETEN, esta clase de escalofrío se encuentra también en histeria o enfermedades orgánicas del corazón. (Nash).

En la POSTRACIÓN NERVIOSA QUE PRECEDE A LA FIEBRE TIFOIDEA y que tantose le parece, gels. es un medicamento de primer plano dado a tiempo, puede hacer abortar una fiebre tifoidea.

Nash lo coloca entre bapt., y bell.

Como bapt., tiene gran postración, gran sensación de dolorimiento muscular, perono tiene la lengua ni las otras características del medicamento; ambos tienen coloración rojo oscuro de la cara con expresión de completo embrutecimiento, pero bapt. ataca sobre todo el sensorio; el paciente se duerme, mientras trata de responder a las preguntas que le hacen, mientras que en gels. este estupor es causado por la postración nerviosa que trae; en fin la fetidez de las deposiciones, sudores y orina de bapt. no se encuentran en gels.; pero la gran diferencia que hay entre ellos es una relación de grado e intensidad; gels. actúa más suavemente que bapt. y lo precede, gels. tiene como bell., congestión de cerebro con dilatación pupilar pero menos intensa y no tiene el delirio activo y violento de bell.

Relaciones

Antídotos

China, coffea, digit., nux mosch.

GLONOINE

Con este nombre se designa un medicamento preparado con nitroglicerina; Hering, su introductor en la práctica médica, lo llamó glonoine por su fórmula química : glono.

Las diferentes dinamizaciones se preparan por diluciones hahnemannianas sucesivas.

Acción general del medicamento

VIOLENTAS Y REPENTINAS IRREGULARIDADES DE CIRCULACIÓN, con HIPEREMIA CEREBRAL ACTIVA, PALPITACIONES DE CORAZÓN, etc. en una palabra, un conjunto de síntomas parecidos a la insolación, al "coup de chaleur"; sin que haya fiebre ni inflamación.

Características

1) CONSTITUCIÓN Y TEMPERAMENTO : Desarrolla particularmente bien su acción en individuos nerviosos, pletóricos, sanguíneos, sensibles, a los que la enfermedad invade bruscamente.

2) TENDENCIA A SÚBITAS Y VIOLENTAS IRREGULARIDADES EN LA CIRCULACIÓN, CON FLUJO DE SANGRE A CABEZA Y CORAZÓN; INTENSOS DOLORS CAVALGOS LATENTES CON SENSACIÓN DE PLENITUD EN VASOS DEL CUELLO; CONGESTIÓN CEREBRAL.

Actúa muy violenta y rápidamente.

Como consecuencia de la perturbación súbita y violenta que determina en la circulación, hay que hacer notar en primer lugar DOLOR DE CABEZA LATENTE, muy característico; puede existir en toda la cabeza o solamente en frente, occipucio, es decir, en cualquier región localizada de la cabeza.

Y este latido no es simple sensación subjetiva, sino que responde a una manifestación objetiva de congestión circulatoria en la cabeza : la congestión que provoca es tan violenta que los vasos parecerían estallar.

Además estos latidos son sincrónicos con las pulsaciones cardíacas.

La sangre parece llegar hacia la cabeza en un flujo abundante y violento, colmado al máximo los vasos; las yugulares externas parecen dos cuerdas, sinuosas, visibles bajo la piel : las carótidas laten con violencia, están duras, tensas, no se aplastan por presión.

Cara violentamente roja.

Estos latidos van acompañados de dolores violentos, profundos, en la cabeza, con sensación de gran angustia.

Conviene comparar aquí a glon. con bell., ya que son semejantes en tantos puntos.

Los síntomas de glon. se agravan al inclinar la cabeza hacia atrás, por tiempo húmedo, aplicaciones frías que llegan hasta causar espasmo; mejora descubriéndose, al aire libre; a veces, el enfermo está obligado a levantarse y pasearse, a pesar del dolor que le causa; un síntoma muy marcado y que pronto aparece en la congestión cerebral causado por supresión de reglas, o predomina en malos efectos del "coup de chaleur", o antes de convulsiones puerperales, en una sensación como si la cabeza estuviera enormemente grande, parece hinchada.

Este síntoma también puede encontrarse en bell. pero no es tan marcado como en glon. bell. se alivia cuando se inclina hacia atrás y se levanta, manteniendo la cabeza descubierta, al frío, si bien glon. tiene el grito encefálico, es menos característico que en bell. (Farrington).

El rasgo más manifiesto de este remedio, escribe Kent, ES OLEADA DE SANGRE HACIA LA CABEZA O EL CORAZÓN.

El enfermo describe a menudo su estado diciendo que tiene sensación COMO SI TODA LA SANGRE DE SU ORGANISMO SE PRECIPITARA HACIA SU CORAZÓN, ACOMPAÑADA DE SENSACIÓN DE CALOR EN EL CORAZÓN O LADO IZQUIERDO DEL PECHO : o bien se queja de AFLUJO PRECIPITADO DE SANGRE A LA CABEZA, DONDE TIENE SENSACIÓN DE CALOR VIOLENTO, O BIEN FUEGO INTERNO QUE VA DE SU ESTÓMAGO HASTA LA CABEZA, A VECES CON PERDIDA DE CONOCIMIENTO.

Se queja también de sensación de ondulación dolorosa en la cabeza, como si el casco craneano se dilatase y contrajese rítmicamente.

Con ello hay dolor intenso como si la cabeza fuese a estallar o sensación de gran magulladura en la cabeza.

A veces, el aflujo sanguíneo, va acompañado de latidos violentos, sincrónicos con los del corazón y si el enfermo se queja de esta sensación de magulladura en la cabeza, cada pulsación es dolorosa, cada una es como un martillazo en el cráneo; hay también pulsaciones dolorosas y no dolorosas.

Estos latidos son muy violentos y cuando llegan al máximo en la cabeza, se sienten también en extremidades; hay pulsaciones en los dedos, espalda, todo el cuerpo parece palpar.

Si estos latidos continúan, sobreviene contusión en el cráneo, y cada uno de ellos es doloroso.

En este estado, a cada paso que puede dar, a la sacudida del menor movimiento, hay sensación como si le aplastaran la cabeza.

Los vómitos que acompañan a este estado, alivian.

Las extremidades están frías, cubiertas de sudor, pálidas, mientras la cabeza está caliente, cara roja púrpura; pupilas dilatadas, y ojos inyectados.

Al cabo de poco tiempo, la lengua se pone seca, roja, luego marrón; boca muy seca aunque no tiene mucha sed.

En fin, hay confusión de espíritu y hasta pérdida de conocimiento.

Modalidades

Agravación

Por vino, aguardiente (zinc., fluor. acid.); al sol, después de agravación a los rayos del sol (lach.).

Por la luz de gas o delante de un gran fuego.

Por ruido.

Inclinándose hacia atrás, al acostarse.

De 6 de la mañana, a medio día.

Por tiempo húmedo, aplicaciones frías.

Después de cortarse el cabello (bell).

Después de sueño corto, mientras que un sueño prolongado lo alivia.

Mejoría

DESCUBRIÉNDOSE, al aire libre, al pasearse.

Síntomas mentales

Trastorno de las ideas; PERDIDA MOMENTÁNEA DE MEMORIA PERO PERDIDA DE MEMORIA ESPECIAL; CONFUSIÓN DE LUGARES, NO RECUERDA DONDE VIVE Y LOS LUGARES FAMILIARES LE PARECEN EXTRAÑOS.

Otro remedio para esta confusión de lugares es petrol. y también bar., carb.

A veces, la congestión cerebral es tan grande, que pone al enfermo furioso, trata de escapar, de saltar por la ventana.

En ciertos casos, está lleno de angustia, aprensiones; tiene miedo de ser envenenado (bapt., hyosc., kali bich., rhus tox).

Glon. es, a veces útil en malos efectos del miedo.

Cabeza

CONGESTIÓN DE CEREBRO, EN ALTERNATIVAS DE CONGESTIÓN DE CABEZA Y CORAZÓN.

LATIDOS DOLOROSOS EN LA CABEZA, SINCRÓNICOS CON LAS PULSACIONES CARDIACAS Y LOS LATIDOS DEL PULSO.

CEFALEA LATENTE, PULSATIL; SE TOMA LA CABEZA ENTRE LAS MANOS.

NO PUEDE EXTENDERSE, ACOSTARSE, LE PARECE QUE RECIBE GOLPES EN LA CABEZA.

TIENE SENSACIÓN DE QUE SU CEREBRO ESTÁ HIPERTROFIADO, PLETORIZADO, CONGESTIONADO AL EXTREMO, DEMASIADO GRANDE PARA SU CABEZA, CADA PULSACIÓN, CADA LATIDO DEL CORAZÓN, CADA PASO QUE DA, CADA RUIDO, LE RESUEÑAN DOLOROSAMENTE.

INSOLACIÓN; dolor de cabeza debido al sol, siente su cefalea aumentary disminuir cada día con la salida y puesta del sol (kal., nat. carb.).

Glon. es aplicable a la insolación, sea a causa de los síntomas de congestión de cabeza que determina y que se parecen a los de esta afección, sea a causa de los síntomas que muestran que la congestión prolongada del cerebro ha producido efectos depresivos.

La cara se pone más bien pálida; el pulso, que primitivamente era lleno y duro, se hace blando y débil; la respiración difícil, no a causa de una molestia en el pecho, sino por congestión bulbar.

La mirada es a menudo fija.

El enfermo puede estar inconsciente.

Por eso glon. es nuestro mejor remedio para las consecuencias del demasiadocalor ya sean trastornos causados por los rayos directos del sol ardiente, o por calor demasiado ardiente, ya provengan del calor de una hornalla, como es el caso de los fundidores, o mecánicos.

Estos efectos del sol o del calor no se localizan solamente en la cabeza, pueden atacar todo el cuerpo; hay entonces disnea, palpitaciones, náuseas y vómitos, lengua blanca; esto no es de origen gástrico, sino cerebral (bell., apomorp., rhus tox.); ausencia de apetito, horrible sensación de vacío en el estómago, y a menudo, un poco de diarrea (Farrington).

Congestión intensa de cerebro por reglas suprimidas o atrasadas; dolor de cabeza latente en lugar de reglas.

Dolor de cabeza violento, después de hemorragia uterina violenta (china), flujo de sangre en la cabeza en embarazadas.

Trastornos cefalálgicos después de haber trabajado mucho con luz de gas, si la luz caliente cae directamente sobre la cabeza; no puede soportar el calor en la cabeza, ya sea de fuego o sol (lach., nat. carb.).

Dolores de cabeza de los burócratas que trabajan con la luz de un gas cerca de la cabeza y que irradia calor que los incomoda; esta luz caliente tan cerca de la cabeza los hace propensos a dolores de cabeza.

Convulsiones en niños, después de congestión cerebral, durante meningitis o dentición con síntomas parecidos a bell.

Glon. es uno de nuestros mejores remedios para la forma congestiva de convulsiones puerperales, que se anuncia por aflujo de sangre a la cabeza, enrojecimiento brillante de cara, que parece hinchada; pulso lleno y duro; y albúmina en la orina.

También es útil en hiperemias menos violentas de cerebro y aflujo menos agudo en la cabeza.

Esto se presenta por crisis, en cualquier momento, por ejemplo, caminando por la calle, siente un aflujo de sangre en la cabeza, como tufarada de calor, o enrojecimiento de cara; manos y pies también fríos; está cubierto de sudor, mira alrededor y ya no reconoce su camino para volver, no recuerda donde vive, mira sin reconocer caras de amigos y se pierde cerca de su casa.

Todo esto pasa pronto y de nuevo se siente mejor.

Este aflujo de sangre de la cabeza, va acompañado de vértigo, titubea, está obligado a apoyarse en la pared o los muebles.

Estos trastornos se presentan sobre todo en días calurosos o por calor y la luz del sol.

Al principio, espaciados, se hacen frecuentes y forman las fases preliminares del estado apoplético (Kent).

En casos de apoplejía cerebral, glon. puede ser útil, cuando la tensión continúa siendo muy elevada (Kent).

Glon. y opium, son dos grandes remedios para la apoplejía.

Ambos presentan estado comatoso, pero en opium la pérdida de conciencia es más completa, más profunda; la cara tiene signos parecidos, pero en opium el maxilar inferior está caído y tiene movimientos espasmódicos en comisuras de la boca; en opium, pupilas contraídas, en glon. dilatadas; en opium, pulso lleno y lento y respiración estertorosa, lenta e irregular, con sopor extremadamente profundo.

VÉRTIGO AL TOMAR LA POSICIÓN VERTICAL, AL PONERSE DE PIE, AL SENTARSE en su cama, al levantarse a la mañana.

Cara

CARA ROJA, CALIENTE, CONGESTIONADA, A VECES CUBIERTA DE SUDOR.

El enrojecimiento se va OSCURECIENDO Y LA CARA PUEDE PONERSE ROJO OSCURO, VIOLETA; EXPRESIÓN DE ESTUPIDEZ.

En ciertos casos, puede haber ALTERNATIVAS DE ENROJECIMIENTO Y PALIDEZ.

También sensación COMO SI LA CARA ESTUVIERA HINCHADA.

Aparato digestivo

BOCA Y GARGANTA :

DOLORES PULSAILES EN TODOS LOS DIENTES, COMO sulph., siente su corazón latir en los dientes.

Labio inferior hinchado.

Lengua cargada, que conserva la impresión de los dientes; gusto pervertido; gusto a canela o piñas; aliento dulzón y aromático.

La garganta parece hinchada por estado de congestión de cuello, cuyos vasos están distendidos; como lach., no puede soportar un cuello ajustado.

ESTOMAGO E INTESTINOS :

Los trastornos digestivos de glon., no son característicos; eructos, náuseas, constituyen un estado de malestar impreciso relacionado con trastornos circulatorios, mucho más importantes.

Agravación por vino y estimulantes.

Constipación con hemorroides dolorosas y pruriginosas.

Diarrea con deposiciones abundantes y negruzcas.

Órganos genitales

LOS TRASTORNOS CEREBRALES DE LA MENSTRUACIÓN, LA CONGESTIÓN INTENSA DEL CEREBRO, causados en mujeres plétóricas por BRUSCA SUPRESIÓN DE REGLAS, encuentran en glon. su más exacto simillibus.

No solamente alivia durante el período menstrual, sino que es también particularmente útil en la época de la MENOPAUSIA.

No actúa como lach. o sulph., en las tufaradas de calor general de este período, sino que es precioso cuando son violentas y se localizan en el cerebro.

Es también útil en ESTADOS CONGESTIVOS DE CEREBRO DURANTE EL EMBARAZO.

Glon. ha detenido CONVULSIONES PUERPERALES en que predomina el síntoma hiperemia violenta del cerebro.

Aparato circulatorio

TRABAJO LABORIOSO DEL CORAZÓN QUE ESTA AGITADO.

Violentas palpitaciones con latidos en carótidas y ANSIEDAD PRECORDIAL; la sangre parece afluir al corazón o subir violentamente a la cabeza.

Cualquier movimiento produce aflujo de sangre al corazón y un instante de desfallecimiento.

PALPITACIONES.

PULSACIONES VISIBLES EN TODA LA SUPERFICIE DEL CUERPO.

LATIDOS en todo el cuerpo, hasta la punta de los dedos.

PULSO RÁPIDO, ACELERADO.

VARIACIONES EXTRAÑAS DEL PULSO, QUE SE ACELERA, DISMINUYE, LUEGO ACELERA; pulso intermitente, ya DURO, SALTARÍN O DEPRESIBLE HASTA HACERSE APENAS PERCEPTIBLE.

Aparato respiratorio

Deseo de respirar profundamente; sensación de congestión y constricción del pecho.

Espalda y extremidades

Sensación de constricción alrededor del cuello, como si una venda lo rodease, o como si el cuello de la ropa estuviera muy ajustado.

Dolores punzantes en región del corazón hacia la espalda, entre los dos hombros; sensación de ardor entre los dos hombros. (lycop).

Languidez general, debilidad, insensibilidad, gran fatiga, con deseo de permanecer sentado o acostado aunque sienta que podría moverse.

Sensación de debilidad y entumecimiento; temblores; dolores en los miembros, comparables a los de una sacudida eléctrica.

Relaciones

Antídotos

Acon.

GRAPHITES

Llamado también plumbagina es un carbón mineral casi puro, ligeramente mezclado con hierro.

Se encuentra en minas de metal, principalmente en Inglaterra y Baviera.

Una especie de Graphito artificial se forma en los altos hornos durante la fundición del hierro.

Se presenta como sustancia de un gris negrozco brillante, grasa al tacto, insípida e inodora.

Es la mina de plomo usada para fabricar lápices negros.

Se preparan las tres primeras dinamizaciones para uso homeopático, por trituración.

Acción general del medicamento

Como todos los antipsóricos, GRAPHITES es un medicamento de acción muy profunda, potente en enfermedades crónicas caracterizadas por trastornos de piel, cabello, uñas, glándulas y mucosas, en los cuales el enfermo se pone anémico, con tez pálida, cerosa (Kent).

Su principal punto de ataque es LA PIEL, donde produce ERUPCIONES HÚMEDAS, GRIETAS, RASGADURAS DE DIFERENTES CLASES.

Hay ulceraciones con tendencia a extenderse y rezumar MUCUS GLUTINOSO DE ASPECTO CARACTERÍSTICO.

La secreción purulenta de estas ulceraciones es a veces mezclada con mucus menos espeso, sanguinolento, acuoso, QUE IRRITA LOS ALREDEDORES.

Cuando hay leucorrea, es copiosa y aglutinante, abundante al punto de correr a lo largo de los muslos a los que ulcera; la secreción de oídos también tiene este carácter.

A veces es mal oliente; olor a salmuera, a ahumado; a veces esta fetidez extrema.

Estas secreciones extremadamente fétidas pueden venir de cualquier parte del cuerpo (Kent).

Graph. actúa también sobre GLÁNDULAS LINFÁTICAS que están hipertrofiadas y pueden supurar, dejando entonces correr líquido acre, a veces muy fétido.

Tiene sobre todo acción muy marcada sobre SISTEMA VENOSO; produce perturbaciones notables EN CIRCULACIÓN VENOSA ABDOMINAL, PERO PARTICULARMENTE EN EL DOMINIO DE LA VENA PORTA, donde aparecen éstasis que traen trastornos profundos de plasticidad primero : enseguida de nutrición cuando la congestión venosa predomina, trae estado de irritabilidad intestinal que lleva a constipación; pero su fondo de acción es ante todo la distensión.

A pesar de un eritema inicial que no es el efecto principal, este veneno tiene la anestesia : por eso produce insuficiencias funcionales múltiples.

Mal elaboradas, las secreciones son incompletas, se descomponen fácilmente y exhalan olor fétido; el sistema linfático se obstruye; las superficies internas presentan flujos característicos abundantes : diarrea, leucorrea, broncorrea, sialorrea, rinitis fluente, etc. la fibra, cuya contractilidad, cuyo tono están disminuidos, se relaja y los tejidos se hinchan. (Espanet).

El enfermo de graph. TIENE TENDENCIA A HEMORRAGIAS de sangre ligera y pálida; las hemorragias por nariz, oídos, útero, ulceraciones y erupciones son comunes; la más ligera provocación mucosa de nariz inflamada, sangra; o bien la mucosa nasal sangra fácilmente de vez en cuando, y también cuando debe aparecer el flujo menstrual; en otros individuos sangran en ese momento las hemorroides, de manera que parece hemorragia de sustitución.

En piernas se desarrollan venas varicosas y dan ulceraciones que sangran (Kent).

Todo anuncia astenia, falta de contractilidad de vasos capilares venosos y linfáticos. (Espanet).

Esta pereza circulatoria de graph. engendra también fibrosidad y anemia característica del remedio.

Características

1) CONSTITUCIÓN Y TEMPERAMENTO : Graph. parece actuar particularmente bien en INDIVIDUOS DE TENDENCIA A SER GORDOS, OBESOS.

Por su constitución recuerda a calc. ost. pero como en este último, el aspecto rogado del sujeto no se debe a buena salud; va acompañado al contrario, de trastornos profundos de nutrición, la grasa de graph., como la de calc. ost. es una "mala grasa".

Para definir en una frase al sujeto de graph. con su cortejo de males, diremos que es UN SUJETO GORDO, DE CONSTITUCIÓN TOSCA, TRISTE, CONSTIPADO, FACIES VULTUOSA, QUE SUFRE IRREGULARIDADES CIRCULATORIAS; PRESENTA EN PIEL ERUPCIONES COSTROSAS CON SUPURACIÓN DE LÍQUIDO ESPESO COMO MIEL.

Este carbón impuro, mezclado con un poco de hierro, manifiesta en el conjunto de síntomas, una asociación patogenética, que recuerda su asociación química; muestra el estado anémico, la sangre pobre y la cara roja de ferr.; obesidad, hinchazón y alteraciones de piel de calc. carb., trastornos digestivos y flatulencia de carb. veg. LA MUJER DE graph. TIENE ASPECTO Y ESQUELETO MASCULINO Y EN ELLA, COMO EN EL HOMBRE EXISTE FALTA DE CALOR ANIMAL DEBIDA A INSUFICIENTE OXIDACIÓN DE LA SANGRE ESTA GENTE TIENE SIEMPRE FRÍO.

PODEMOS citar y comparar junto a calc. ost. por su tendencia a obesidad al sujeto de ammom. mur. cuyo tronco es ancho y gordo, pero de piernas delgadas; capsic. : constitución débil y pletórica, cabello rubio, ojos azules, saltones, indolente, teme todo género de ejercicios; puls. : indicada sobre todo en mujeres rubias, tímidas, lentas en sus movimientos, con gran tendencia a engrosar y a reglas poco abundantes y prolongadas.

Volviendo a graph., sus efectos no concuerdan solamente con lo que constituye materialmente los temperamentos linfáticos y venosos, sino linfáticos; además melancolía, irascibilidad, desaliento, y desesperación de los segundos. (Espanet).

2) VACILACIÓN; TRISTEZA Y MELANCOLÍA; ANGUSTIA Y APRENSIÓN.

De carácter excesivamente tímido e indeciso, incapaz de decidir algo, con falta de disposición para el trabajo, el paciente de graph. es triste, melancólico, se queja sin cesar, sobre todo si es mujer; la música la hace llorar, está ansiosa, angustiada, obsesionada por temor a desgracias o accidentes involuntarios, lo que la agita y le impide quedarse quieta.

Esta tristeza ansiosa, esta aprensión son una marca característica del remedio.

3) LESIONES CUTÁNEAS QUE SEGREGAN LIQUIDO ESPESO COMO MIEL : Esta es quizá, su mayor característica.

Se la puede encontrar en todas partes, pero sobre todo SOBRE O DETRÁS DEL PABELLÓN DE LA OREJA, en región mastoidea, cabeza, cara, PÁRPADOS, órganos genitales.

Las lesiones de esta clase en párpados le son muy características : eczema de párpados, erupciones húmedas en párpados, bordes fisurados, cubiertos de caspa, costras; graph. es el primer remedio para afecciones eczematosas de párpados, staphis. le sigue de cerca.

4) LAS UÑAS DE LOS DEDOS Y DEDOS GRANDES DEL PIE SE DEFORMAN Y SE HACEN GRIETAS :

Nash escribe : no olvidemos jamás a graph. cuando observemos este estado de las uñas (ant. crud., thuya, silic.).

Sensaciones particulares

a) DOLORS PRESIVOS, TIRONEANTES a menudo ARDIENTES; más marcados de noche, antes de media noche, durante y después de reglas, siempre mejorados abrigándose bien.

b) SENSACIÓN DE FRÍO EN EL CUERPO Y DE ESCALOFRÍO : Esto pasa particularmente cuando hay erupciones cutáneas y las uñas de manos y pies están afectadas.

A pesar de esto las erupciones se agravan por calor, al calor del lecho, supurando entonces más, picando y ardiendo más fuertemente.

c) Además cuando cerebro y médula están particularmente afectados, el enfermo tiene CALOR, DEMASIADO CALOR, SIEMPRE ESTA "ASADO DE CALOR", quiere mucho aire, sólo puede dormir con ventanas abiertas. En estados de graph. cuando la médula está atacada, toda la columna vertebral es sensible al tacto, y a veces la cara está muy roja en lugar de pálida.

Modalidades

Lateralidad

IZQUIERDA.

Agravación

Por calor.

Por tiempo húmedo y frío; sensible al frío exterior, no puede tolerar estar encerrado en cuarto caliente ni soportar el calor del verano.

Gordo y friolento, necesita mucho aire, pero le gusta abrigarse bien.

De noche, estando acostado sobre el lado derecho.

Durante y después de las reglas.

Mejoría

En la oscuridad; abrigándose bien (sin embargo las lesiones cutáneas mejoran por frío).

Al aire libre.

Síntomas mentales

El enfermo de graph. tiene GRAN TIMIDEZ al mismo tiempo que GRAN VACILACIÓN; irresoluto, incapaz de tomar una decisión.

También es muy TRISTE, MELANCOLÍCO, desesperado y esta tristeza es una gran característica del remedio.

Es de una sensibilidad excesiva a todas las impresiones, demasiado impresionable, a veces irascible, tiene tendencia a estremecerse por nada.

Esta extrema impresionabilidad lo hace llorar por nada; una pequeñez de lo triste hasta la desesperación (para esta tristeza y necesidad de llorar comparar nat. mur.).

Ansioso, a veces agitado, con sensación de opresión al corazón y APRENSIÓN como si fuese a morir, o COMO SI ESTUVIERA AMENAZADO POR UNA GRAN DESGRACIA, a menudo con dolor de cabeza, náuseas y sudor. Agitación e inquietud a la mañana, agitación ansiosa de noche, con necesidad de salir de la cama, o al trabajar sentado; no puede estar quieto.

Tendencia a asustarse.

Horror al trabajo; no tiene ninguna disposición para el trabajo; distraído.

Se equivoca al hablar o escribir.

LA MÚSICA LO HACE LLORAR.

Se puede comparar aquí a acon. que se entristece por la música que se le hace insostenible.

Ambr. gris., que está desesperado, asqueado de la vida, al que la música hace llorar; sabina para quien la música es intolerable y lo enerva; thuya, a quien la música hace llorar o causa temblores.

Cabeza

Dolor de cabeza a la mañana, al despertar, lo más a menudo unilateral, particularmente izquierdo, con tendencia a náuseas y vómitos.

Cefalea localizada en el occipucio, con sensación de presión, constricción, que se extiende primero al cuello, y más tarde a espalda y pecho, dolor muy intenso con sensación de rotura, si el enfermo desea mirar arriba.

Dolor reumático unilateral, que se extiende a cuello y dientes.

Ardor en el vértice.

SENSACIÓN COMO DE UNA TELA DE ARAÑA EN LA FRENTE. (alum., bar. carb., petrol.).

Erupción húmeda, pruriginosa en cuero cabelludo, con olor fétido.

Cara

Tez amarillo pálida, con ojeras azules.

Puede tener a veces llamaradas de calor.

La piel tiene a menudo cicatrices purpúreas de antiguas erupciones; si hay en la cara una cicatriz, una antigua lesión cicatrizada, pero todavía un poco inflamada, será en general punto de partida de nuevos trastornos: vesículas que supuran se forman a menudo sobre viejas escaras y una erisipela tendrá como punto de partida una cicatriz inflamada. (Kent).

Párpados a menudo rojos y tumefactos; labios secos, agrietados, ulcerados en las comisuras.

Sobre todo hay ERUPCIONES HÚMEDAS ALREDEDOR DE NARIZ, BOCA Y MENTÓN.

SENSACIÓN COMO SI TUVIERA UNA TELA DE ARAÑA EN LA CARA. (bromium, bar. carb., alumina, borax).

Ojos

El ojo de graph. da muchos trastornos asociados a erupciones pero los síntomas de los ojos de graph. se pueden ver sin erupciones también.

Se puede encontrar INFLAMACIÓN PUSTULOSA DE CONJUNTIVA, CORNEA, PÁRPADOS; MUCOSA ROJA, GRUESA, HIPERTROFIADA, TODO PROVOCA EL DARSE VUELTA DE PÁRPADOS CON ENROJECIMIENTO CRÓNICO Y DILATACIÓN DE VASOS SANGUÍNEOS; LA CORNEA SE ULCERA; se forman pequeñas pústulas que cuando revientan forman una ulceración que si no se detiene a tiempo con tratamiento apropiado, puede destruir la vista.

Además de este estado catarral de uno o los dos ojos hay a veces erupciones alrededor de los ojos: ECZEMA DE PÁRPADOS; BORDE DE PÁRPADOS FISURADO, CUBIERTO DE CASPA, COSTRAS (staph.).

PÁRPADOS GRUESOS E INDURADOS Y COPIOSO LAGRIMEO.

Eczema de párpados; pestañas cubiertas de mucosidades secas y cera pegajosa.

Blefaritis.

Orzuelos repetidos. (puls. = ESTADO AGUDO; graph. = ESTADO CRÓNICO).

Quistes y tumores indurados de párpados (staph.); en graph., los tumores están siempre situados en borde palpebral. CONDUCTO LAGRIMO-NASAL DESTRUIDO POR INFLAMACIÓN CATARRAL DE MUCOSA, Y LAS LAGRIMAS CORREN SOBRE LAS MEJILLAS; SON ACRES Y ARDIENTES.

Los ojos se llenan de MUCUS DE ASPECTO PURULENTO, viscoso, pegajoso; pega los párpados que se adhieren uno a otro a la mañana al despertarse.

LAS PESTAÑAS SE DAN VUELTA HACIA ADENTRO, HACIA EL GLOBO OCULAR, irritan la conjuntiva.

Trastornos de visión, sobre todo durante reglas.

Se puede en estos trastornos oculares, comparar a graph. con ars. alb., calc. ost., borax, euphr., hep., sulph. calc., merc., staph., sulph.

Oídos

Se encuentran los mismos síntomas eczematosos que en los ojos.

PIEL HÚMEDA, ERUPCIONES DETRÁS DE LA OREJA, QUE SEGREGAN UN LIQUIDO

PEGAJOSO, AMARILLENTO Y LÍMPIDO COMO MIEL; intertrigo húmedo y viscoso atrás de la oreja; cuando el niño se acuesta de noche sobre ella, se pega contra la cabeza.

Aquí se puede pensar en petrol., cuya principal diferencia con graph. es que sus lesiones cutáneas son herpéticas, mientras las de graph. son netamente eczematosas.

Se puede comparar también : psor. : erupciones costrosas detrás y alrededor de la oreja con secreción irritante, fétida y prurito intolerable; las características de conjunto permitirán elegir, como para : silic : erupciones costrosas con secreción de pus abundante, sobre todo detrás de orejas y cuello, con ardor y prurito agravados por rascado; staph. : eczema escamoso, pero seco, en mejillas, cabeza y atrás de las orejas; este eczema tiene violenta comezón, pero con este síntoma particular : que el rascado cambia la localización del prurito.

SEQUEDAD DEL OÍDO INTERNO; membranas delgadas, blancas, escamosas, que cubren el tímpano, parecidas a una exfoliación epitelial.

SORDERA, OYE MEJOR EN MEDIO DE RUIDO, RUIDO DE CRUJIDOS, ZUMBIDOS EN LOS OÍDOS, lo que indica catarro de trompa de Eustaquio.

Para estos zumbidos de oídos, se puede comparar caust., en que palabras y ruidos de pasos hacen eco dolorosamente en la cabeza; china : que tiene estos zumbidos principalmente después de pérdida demasiado abundante "de líquido humoral"; petrol., cuyos zumbidos van acompañados de dolores en la trompa de Eustaquio; sulph. : zumbido de oídos de noche, en la cama, con aflujo de sangre a la cabeza. bar. mur., kali mur., viol. odor., etc..

Aparato digestivo

BOCA :

Como alrededor de ojos y fosas nasales, hay ALREDEDOR DE LA BOCA, UNA ERUPCIÓN HÚMEDA, que forma costras que más o menos abundantemente segregan líquido espeso y amarillento como miel.

También hay, a menudo, en la boca, gusto PÚTRIDO, CUYO OLOR RECUERDA AL DE HUEVO PODRIDO y es aquí más marcado que en los otros carbones.

Boericke señala que a veces el aliento tiene olor a orina.

Puede haber lengua blancuzca, gruesa, con pequeñas vesículas ardientes en la punta; también se ha notado salivación abundante.

APETITO Y SED:

Hambre inmoderada, REPUGNANCIA POR ALIMENTOS COCIDOS o calientes; asco por bebidas calientes (bryon., phosph., puls., pyrog.).

AVERSIÓN POR CARNE, como alum., calc. ost., carb. veg., sepia., Además, LASCOSAS DULCES LE DAN ASCO, lo que lo coloca al lado de ars. alb., caust., sinap. nigra, zincum.

ESTOMAGO :

SE AGRAVA POR TODOS LOS ALIMENTOS. (Farrington). Arg. nit., ars., bryon., ipeca, lycop., puls., etc.

Náuseas y vómitos, después de cada comida; sensación de peso en el estómago.

Ardor de estómago que provoca sensación de hambre; hay dolor que le duele Y APARECE CUANDO EL

ESTOMAGO ESTÁ VACÍO Y LO OBLIGA A COMER, como lach. (Kent).

Graph. se parece en esto a petrol. que tiene gastralgia aliviada comiendo y también a chelid., pero sobre todo a anacard.

Los otros síntomas del estómago son : FLATULENCIA Y CALAMBRES.

Después de la comida, estómago distendido por gases; esta acumulación de gases puede hacer pensar en lycop., que no tiene la putridez de graph. Y sulph. etc..

Timpanismo de estómago que está dilatado; está obligado a aflojarse las ropas; eructos pútridos, dolores y calambres aliviados comiendo.

ABDOMEN Y DEPOSICIONES :

Hígado duro, hinchado, dolores; sensación de pesadez en hipocondrio derecho.

Extrema FLATULENCIA EN EL ABDOMEN QUE ESTÁ DISTENDIDO.

Plenitud y dureza del abdomen como por gases aprisionados; debe aflojar sus vestidos.

Borborismos.

Dolor producido por gases del lado opuesto al que está acostado.

Expulsión abundante de gases fétidos precedida por cólicos; Hinchazón dolorosa de ganglios inguinales.

Prolapso de recto.

Prurito anal.

ANO DOLOROSO, PRURIGINOSO, ESCOZOR, FISURA ANAL TAN DOLOROSA QUE LE MOLESTA AL SENTARSE.

HEMORROIDES ARDIENTES Y PINCHAZOS CON FISURAS EN EL ANO.

Graph. tiene muchos síntomas hemorroidarios, las hemorroides son duras, con aspecto de masas nudosas que sangran fácilmente, arden, escuecen; mucha comezón anal; claro que graph. no debe ser elegido por estos síntomas solos, debe considerarse todo el caso (Kent).

Estos síntomas del ano recuerdan otros remedios : ratan., excelente para fisura anal, cuando hay gran constricción de esfínter; las deposiciones pasan con gran esfuerzo y el ano queda doloroso y arde después durante horas.

Peonia para fisura anal, con mucha secreción que humedece el ano, cosa molesta, desagradable; asociada a gran sensibilidad y escozor.

Nitr. acid., también gran remedio para fisura anal, especialmente cuando hay sensación como de astillas clavadas en la mucosa.

Silic., para fisura anal, con constipación característica : trata de evacuar, pero no puede : la deposición sale en parte, luego vuelve a subir.

Berber. : fisura anal, con violento ardor, dolores con pinchazos y ardor antes y durante y después de la deposición.

Aescul. : sensación como si el ano estuviera en carne viva, o lleno de astillas que lo pinchan; vivo dolor en el ano, una hora después de la deposición, que continúa algún tiempo.

Graph. se distingue localmente porque todos los remedios enumerados tienen más o menos tenesmo y constricción, y graph. tiene poco o nada.

LA CONSTIPACIÓN puede ser considerada como habitual en graph.

SU DEPOSICIÓN ES ESCASA, NO SIENTE NECESIDAD DE EVACUAR Y PASA DÍAS Y DÍAS SIN HACERLO.

Cuando tiene una deposición, es dura, CONSTITUIDA POR GRUESAS MASAS SECAS, MASO MENOS RODEADAS DE MUCUS Y DIFÍCILMENTE OBTENIDA.

DEPOSICIONES NUDOSAS Y VOLUMINOSAS CUYOS PEDAZOS ESTÁN REUNIDOS POR RESIDUOS, FILAMENTOS MUCOSOS, Y A MENUDO EVACUA MUCUS DESPUÉS DE LA DEPOSICIÓN. (Nash).

Caust. : deposiciones duras, cubiertas de mucus de aspecto grasoso, expulsadas con mucho esfuerzo.

Alum. : deposiciones duras, secas, en pequeños trozos, cubiertas de mucus.

Amn. mur. : deposiciones duras, secas, que se desmigajan en cuanto salen del ano, muy difíciles de expulsar y a veces revestidas de mucus.

También se ha notado este síntoma de deposiciones duras, cubiertas de mucus encasaca, collins., hydrast., nux vom., sepia.

Paralelo a la constipación, hay que hacer notar como síntoma secundario DIARREA; deposiciones líquidas, negras, mezcladas con restos alimenticios no digeridos, muy irritantes y muy fétidos; esta diarrea es A MENUDO CAUSADA POR SUPRESIÓN DE ERUPCIÓN.

Aparato urinario

Micción poco copiosa, pero frecuente, a veces emitida gota a gota, con dolor vivo en la uretra.

Chorro de orina muy fino, como si pasara a través de un estrechamiento de uretra.

Orina turbia que deja sedimento rojizo o blanco.

Órganos genitales

MASCULINOS :

DEBILIDAD SEXUAL; pérdida absoluta de sensibilidad durante el coito; la capacidad de copulación existe, y el deseo sexual a veces aumentado, pero durante el acto no hay satisfacción, ni goce; además la eyaculación es demasiado rápida o al contrario, el coito termina sin eyaculación a pesar de todo esfuerzo.

Erupción herpética en órganos genitales; principalmente en el punto de frotamiento de testículos con muslo.

FEMENINOS :

Aversión obstinada por el coito. agnus, igant., onosmod., sepia, etc..

ERUPCIÓN VULVAR VESICULOSA Y PUSTULOSA.

PRURITO VULVAR SOBRE TODO ANTES DE REGLAS.

Dolores vivos e hinchazón de ovario izquierdo.

REGLAS ATRASADAS, POCO abundantes, DE SANGRE PÁLIDA, con violentos cólicos y precedidas por prurito vulvar; gran depresión durante reglas, con RONQUERA (ronquera durante reglas es característica de graph.).

Coriza, dolor de cabeza, sensación de magulladura en epigastrio, sobre todo a mañana.

LEUCORREA BLANCA, LÍQUIDA COMO AGUA, PROFUSA, particularmente a mañana, al salir del lecho, excoriante con gran debilidad en la espalda; a veces esta leucorrea reemplaza al flujo menstrual que ha sido muy tardío y extremadamente escaso. (puls.).

Otras veces, la leucorrea existe antes y después de reglas; (solamente antes de reglas : sepia.; solamente después de reglas kreosot.).

Sensibilidad de senos que están hinchados y duros, antes y después de reglas. (conium, calc. ost., phytol., murex, lac can.).

PEZONES EXCORIADOS Y FISURADOS.

SENSIBILIDAD y excoriación de pezones con erupción de flictenas o fisuras rezumantes.

Un remedio a recordar aquí, con graph., es CASTOR EQUI, cuyo principal empleo es contra grietas de pezón, que está agrietado : pezón doloroso, fisurado, excesivamente sensible; violento prurito en el seno, aureola roja.

CICATRICES DURAS, PERSISTENTES, DESPUÉS DE ABSCESO DE SENO.

Aparato circulatorio

Palpitaciones repentinas y por accesos, que se reproducen al más ligero esfuerzo, con ansiedad y puntadas en región precordial.

Aflujo de sangre a la cabeza con congestión de cara.

Sensación constante de vacío, de frío, alrededor del corazón y en el pecho (nat. muy., lil. tig., petrol., ruta).

Várices que sangran fácilmente.

Aparato respiratorio

FOSAS NASALES ULCERADAS, EXCORIADAS, AGRIETADAS, COSTRAS SECAS EN LA NARIZ.

Catarro nasal con sequedad extrema de nariz.

Esto alterna con secreción que contiene trozos de mucus aglutinado; a veces muy fétido y sanguinolento; borde de fosas nasales muy doloroso; se agrieta rápidamente y tiene costras; tenemos aquí una semejanza con ant. crud., arum triph., calc. ost.) (Farrington).

Epistaxis con congestión de cabeza y calor en cara.

A la más ligera provocación la mucosa inflamada sangra; la mucosa nasal sangra fácilmente de vez en cuando; también en el momento en que el flujo menstrual debe aparecer.

SENSIBILIDAD EXCESIVA DEL OLFATO; no puede soportar el perfume de las flores. (aur. met., coffea, colch., nux mosch., nux vom.).

La acción de soplar es dolorosa.

La nariz está muy sensible interiormente.

LARINGE :

Ronquera de noche, durante reglas.

BRONQUIOS Y PULMONES :

Sensación de opresión en el pecho; dolor presivo, calambroide en el pecho.

Accesos de sofocación de noche, despierta sobresaltado.

Debe comer algo.

Dolor en medio del pecho con tos, rales, dolorimiento.

Espalda y extremidades

Sensación de magulladura en espalda y miembros.

Entumecimiento de brazos y mano izquierda; que parecen adormecidos.

Excoriación entre dedos y dedo grande del pie.

Calambres y rigidez en manos y pantorrillas; sensación de acortamiento en tendón de Aquiles.

Uñas GRUESAS, NEGRAS, DURAS; MATRIZ DE LA UÑA INFLAMADA (psorin., fluor acid.).

Edema de miembros inferiores, UÑAS DAÑADAS.

Piel

Es la gran esfera de acción de la droga y donde se encuentran muchos puntos notables de graph.

En general, PIEL SECA, SIN TRANSPIRACIÓN.

Los pies pueden presentar transpiración fétida, análoga a la de silic., pero menos intensa.

Además, EXTREMA TENDENCIA A PRODUCIR ERUPCIONES DE PIEL, que se presentan bajo forma de VESÍCULAS O COSTRAS QUE SEGREGAN LÍQUIDO GLUTINOSO, VISCOSO, PEGAJOSO, FLUENTE Y ESPESO PARECIDO A MIEL.

A veces, erupciones, costras secas, son curadas por graph., pero la mayoría de las erupciones de piel son húmedas y segregan este líquido característico.

Estas erupciones SE LOCALIZAN DE PREFERENCIA EN PLIEGUES DE FLEXIÓN : de codo, axilas, hueco poplíteo, ángulos de boca y ojos, detrás de la oreja; pero pueden encontrarse también, EN CUERO CABELLUDO, por ejemplo : vemos en niños el cuero cabelludo llenarse de escamas o COSTRAS DE LECHE, que segregan líquido acuoso que parece levantar las costras debajo de las cuales la piel está en carne viva, inflamada, sangra fácilmente con sensación de escozor y ardor; el lavado lo agrava, lo mismo que el calor, mientras que la comezón mejora por frío (al contrario de petrol., cuyas manifestaciones cutáneas empeoran en invierno, como en psorinum) y la menor irritación las hace sangrar o aumenta la secreción que por eso aumenta por rascado.

A veces este líquido huele mal, como a salmuera o a arenques; es un olor muy fétido; muy acre, excoriente, pone en carne viva los lugares que toca y en esta zona los cabellos caen (Kent).

Por la localización de lesiones cutáneas en pliegues de flexión de articulaciones, hay que comparar a graph. con aeth. cynap., nat. mur., sepia, petrol., etc.

Erupción VESICULOSA COMO LA DEL ZONA, principalmente a la izquierda con dolores ardientes como ars. alb., pero que se agravan por calor, tacto; tienen tendencia a ulcerarse y dejar correr un poco de líquido glutinoso como miel.

RUGOSIDAD, DUREZA, SEQUEDAZ PERSISTENTE en regiones de piel enfermas.

Primer período DE LOS QUELOIDEOS.

HAY QUE RECORDAR EL EMPLEO DE graph. para hacer REABSORBER EL TEJIDO CICATRICAL.

Se ha notado, tiempo ha, que en obreros que trabajan con plomagina lascicantes desaparecían con facilidad extraordinaria.

El estado de mala nutrición de los tejidos que trae graph., explica su influencia sobre tejidos de reparación de la economía que se forman mal, determinando en cicatrices marcada induración.

Viejas heridas con tendencia a indurarse y hacerse queloides.

Graph. detendrá a menudo, esta induración o la disminuirá (caust.).

Graph. forma TUMORES DUROS y a menudo cura EXCRECENCIAS CORNEAS Y VERRUGAS en borde de uñas que son dolorosas a la presión.

Verrugas bajo las uñas (caust.).

Graph. y thuya son excelentes remedios para tumores duros y lobanillos que se desarrollan en la cabeza.

UÑAS FRÁGILES, QUE SE DESMENUZAN, DEFORMADAS, DOLOROSAS, GRUESAS, DAÑADAS.

LAS UÑAS ENNEGRECEN, ESPESAN Y CAEN.

Se ponen cada vez más negras, hasta llegar a ponerse completamente negras; se deforman de mil maneras y caen.

La uña así enferma puede ser muy dolorosa, graph. tiene tendencia marcada a endurecer las uñas y hacerlas muy frágiles.

LOS CABELLOS presentan también síntomas interesantes en graph. : crecen DUROS, CAEN Y SE QUIEBRAN FÁCILMENTE; jamás llegan a tener el largo normal, porque a medida que crecen, no tardan en quebrarse bajo el peine.

ERISIPELA FLEMONOSA de la cara dolor, escozor y ardor.

Las partes afectadas están tensas y duras y si es en la cara, se pone muy desfigurada.

Hay dolores ardientes y escozor punzantes, como en apis. y la erisipela ha comenzado a la derecha para ganar el lado izquierdo.

Pero esta progresión de lateralidad no es absolutamente característica.

(Graph. es particularmente útil cuando se ha abusado de la tintura de iodo.

También puede prevenir el retorno de la erisipela cuando esta enfermedad tiende a hacerse constitucional (Farrington).

Relaciones

Complementarios

Caust., ars. alb., hep. sulf., calc., lycop.

Antídotos

Acon., nux. vom., ars. alb.

HAMAMELIS VIRGINICA

Llamada también "avellano de las brujas" por la creencia popular en sus virtudes para descubrir manantiales escondidos, arbusto de la familia de las Saxifragáceas, abunda en América del Norte, México y Canadá.

Por su aspecto exterior se parece al avellano del que se diferencia por sus flores.

La corteza y las hojas tienen olor característico : sabor primero amargo, astringente, después deja gusto acre, enseguida dulzón y persistente.

Preparamos nuestra tintura haciendo macerar en alcohol a 90° raíces y ramas tiernas y hojas frescas.

Acción general del medicamento

Hamamelis actúa electivamente sobre SISTEMA VENOSO : bajo su influencia los experimentadores han notado FENÓMENOS INFLAMATORIOS DOLOROSOS EN LAS VENAS Y HEMORRAGIAS CUYA SANGRE NEGRA CORRE CON PERSISTENCIA Y SIN ESFUERZOS EXPULSIVOS.

Indicado netamente la procedencia : las venas y el mecanismo : CONGESTIÓN PASIVA.

Hay que atribuir todo esto a ALTERACIÓN DE PAREDES VENOSAS, por eso el medicamento, que necesita para ser eficaz un estado de hiperemia resultado de dilatación de venas, debe ser considerado como el verdadero remedio de la flebitis, primero, de las várices en cualquier región : piernas, escroto, recto, garganta, etc. ya sean, simples o se compliquen con úlceras; también es un precioso recurso en ciertas afecciones de útero, órgano esencialmente venoso, cuando provienen de estado de congestión pasiva de este órgano.

Hamam. actúa poderosamente sobre ÓRGANOS GENITALES de ambos sexos.

Desarrolla sobre todo, dolores de tipo neurálgico, más marcados de noche, se agravan por tiempo lluvioso, irradian a todo el abdomen y determinan náuseas y desfallecimientos.

La clínica ha demostrado que la inflamación de estos órganos de naturaleza blenorragia, es felizmente influenciada por el remedio, sobre todo cuando dolor e hinchazón son considerables.

Características

1) HEMORRAGIAS VENOSAS DE SANGRE MUY NEGRA Y COAGULADA : Se adapta bien a hemorragias venosas de tal aspecto, en cualquier orificio del cuerpo : nariz, pulmones, intestinos, recto, útero, vejiga.

2) VARICES Y VARICOSIDADES DE TODAS CLASES : Hamam. conviene a individuos propensos a várices, que sufren frío fácilmente después de exposición a humedad, especialmente en verano (Allen).

Congestión venosa pasiva de piel y mucosas; flebitis; várices; úlceras varicosas con dolores picantes, punzantes; hemorroides.

"Es el acon. del sistema capilar venoso". (puls, fluor acid.).

3) SENSIBILIDAD DOLOROSA Y DOLORIMIENTO CONTUSO de regiones afectadas, por eso conviene situarlo al lado de arnica.

Se encuentra a veces esta sensación dolorosa en reumatismo articular y muscular y hamam. cura a menudo donde amica ha fallado; pero una de las principales diferencias entre ambos es que amica actúa más sobre capilares, produciendo relajamiento y hamam. sobre venas que, bajo su influencia, están pletorizadas, hinchadas y dolorosas. (Nash).

Modalidades

Agravación

Por calor, por humedad; de noche; la acción de fumar agrava la mayor parte de los síntomas aunque el deseo esté aumentado.

Ojos

Conjuntivitis traumática; equimosis y extravasación sanguínea, sensación marcada de dolorimiento; (amica, calend., ledum).

Violenta inyección de conjuntiva; los vasos inflamados están muy inyectados.

Aparato digestivo

Venas varicosas en garganta, mucosa faríngea distendida y azulada, hemorragia faríngea.

Hemorragia intestinal profusa, de sangre negra, grumosa, provocada por ulceración intestinal (croton etc.).

Hematemesis.

HEMORROIDES que sangran abundantemente, con sensación de ardor, DOLORIMIENTO, plétora, hinchazón; pesadez; sensación en parte baja de espalda como si se quisiera romper; ano doloroso, como desollado; son de color azulado.

Después de hemorragia hemorroidaria postración desproporcionada con la sangre perdida. (hydrast.).

Órganos genitales

MASCULINOS :

Dolores, dolorimientos en cordón espermático, que desciende a testículo.

Varicocele.

Testículos hinchados, calientes, dolorosos; orquitis.

FEMENINOS :

CONGESTIÓN Y NEURALGIAS OVARICAS; sensación de dolorimiento en abdomen.

Reglas profusas de sangre negra, coagulada, con sensación de dolorimiento en abdomen; después de traumatismo en el ovario, o caída; todos los síntomas empeoran durante reglas (act. rac., puls.) Hemorragia uterina activa con dolor y pesadez en riñones; después de recibir sacudidas al viajar en coche por camino malo.

METRORRAGIAS EN MITAD DE TIEMPO ENTRE DOS PERIODOS.

Menstruaciones vicariantes; vagina muy sensible; vaginismo.

Hemorroides y pezones dolorosos después del parto.

Aparato respiratorio

Hemorragia profusa por nariz, pasiva, de sangre no coagulable (croton); que mejora el dolor de cabeza (melil.);

idiopático, traumático, vicariante, en niños.

Hemoptisis; tos con cosquilleo de tráquea y gusto a sangre en la boca; el pecho parece doloroso y contraído.

Hemoptisis venosa que sobreviene sin esfuerzo o sin ataques de tos, cada mes, durante mucho tiempo.

Espalda y extremidades

Dolores intensos en región lumbar, que irradian a miembros inferiores.

MÚSCULOS Y ARTICULACIONES TIENEN SENSACIÓN DOLOROSA DE MAGULLADURA.

Sensación de lasitud en brazos y piernas.

SE FATIGA FÁCILMENTE, VARICES; ÚLCERAS VARICOSAS; consecuencias de traumatismos.

Relaciones

Complementarios

Ferrum.

Antídotos

Amica.

HELLEBORUS NIGER

O eléboro negro, planta de la familia de las ranunculáceas, crece en algunos lugares montañosos de Europa; se cultiva en los jardines con el nombre de Rosa de Navidad, por la forma de la flor y la forma en que florece.

Se parece al eléboro oriental de los antiguos, cuyo descubrimiento atribuye la tradición al pastor Melampre y cuya acción ha sido tan elogiada en trastornos mentales.

La raíz de la planta, negra por fuera, blanco sucio en el interior, tiene sabor astringente, dulzón, amargo, nauseoso y olor desagradable.

Preparamos por maceración en alcohol a 90º de la raíz fresca, la tintura madre, con la que obtenemos, por diluciones Hahnemannianas sucesivas, las diferentes dinamizaciones.

Acción general del medicamento

Hell. nig. es un tóxico violento de acción electiva sobre EL SISTEMA NERVIOSO.

En CEREBRO actúa como estupefaciente, no solamente embota las facultades intelectuales, produciendo estado de estupidez característico, sino también las facultades sensitivo motrices.

Los músculos rehusan trabajar a menos que se les preste atención sostenida : tambalea al caminar, deja caer los objetos que tiene en la mano.

En MEDULA, excita primero el poder reflejo, ocasionando convulsiones clónicas y tónicas, a las que pronto siguen fenómenos paralíticos, pues es, ante todo, asténico.

Bajo su influencia, las funciones reguladas por EL SIMPÁTICO, se entorpecen lo que determina anemia y adelgazamiento.

Por su acción inhibitoria sobre el simpático, los capilares se dilatan, la sangre se estanca y el suero se expande lo que engendra DERRAMES SEROSOS, que son uno de los efectos más marcados de helleb. y el motivo por el cual se le emplea con éxito en el tratamiento de ciertos anasarcas.

Actúa también de manera marcada sobre EL CORAZÓN, donde su acción es bastante comparable a digit., lleva a sideración de miocardio golpeando directamente sus fibras y también aboliendo el poder excitomotor de ganglios cardíacos.

Helleb. nig. produce estado DE DEPRESIÓN SENSORIAL Y DEBILIDAD MUSCULAR GENERAL que puede llegar a parálisis completa; a esto se agregan derrames hidrópicos; es un remedio para estados de baja vitalidad y enfermedades, graves.

Características

1) CONSTITUCIÓN Y TIPO : No se ha descrito constitución muy especial en la cual helleb. parezca actuar con preferencia marcada.

Conviene hacer notar que es particularmente útil en niños débiles, delicados propensos a afecciones cerebrales (bell., calc. ost., tuberc.).

"Su tipo más característico es un niño entre 2 y 10 años, enfermo, acostado de espaldas, ojos semicerrados y mirando fijamente el vacío; a veces los labios se mueven sin emitir sonido, como si quisiera decir algo, pero al preguntarle se nota que ha olvidado lo que quería decir" (Kent).

2) DEPRESIÓN SENSORIAL, ESTUPIDEZ, DEBILIDAD MUSCULAR QUE LLEGA HASTA PARÁLISIS : Actúa sobre el sensorio, lo embota, produce sopor; también estado tífico que puede llegar hasta colapso con descenso de temperatura.

En todos sus trastornos hay más o menos estupidez; a veces, estupor completo; otras estupor parcial, pero siempre hay estupidez y lentitud (Kent).

Deprime la actividad sensorial : lento para responder preguntas, como si no comprendiese; ve perfectamente, pero parece no darse cuenta de lo que ve; el oído es imperfecto, el gusto está ausente o casi; tiene deseo de trabajar pero no tiene fuerza muscular.

Afecta lo que se llama el sentido muscular : los músculos no obedecen rápido a la voluntad, a menos que ésta esté muy lenta.

El músculo cardíaco no escapa a estos efectos paréticos y tiene acción muy lenta.

En todo el cuerpo sensación de pesadez.

Es útil en afecciones de cerebro, médula, sistema general de nervios y espíritu, particularmente en afecciones agudas inflamatorias de centros nerviosos y sus envolturas fibrosas, y en trastornos que lindan con locura.

Hay entonces estado especial de estupidez o imbecilidad de cuerpo y espíritu, el estado extremo es la pérdida de conocimiento.

Pérdida de conocimiento completa, estupor profundo en relación con estado congestivo inflamatorio de cerebro, cómex; meningitis, meningitis cerebro-espinal.

Al principio del caso, helleb. no presenta nunca el delirio violento de bell. o stramonium; el delirio es pasivo.

Si al principio ha habido delirio violento, helleb. convendrá también cuando éste haya pasado y el enfermo acostado de espaldas, ojos semicerrados, mirada apagada, fija, mueve la cabeza a derecha e izquierda; boca abierta y lengua seca; cuando le hablan mira fijo al que le habla, tarda mucho en responder y a veces ni responde.

Cuando una afección cerebral o meníngea aguda no termina bruscamente, sino que se prolonga, es el caso de intervenir con helleb.

En este remedio el caso se prolongará durante semanas en las que el enfermo permanecerá en el estado de estupor descrito con adelgazamiento progresivo : acostado de espaldas con los miembros replegados; pálido y deshecho, cuando lo interrogan responde lentamente.

El poder de espíritu y voluntad sobre el cuerpo está disminuido; los músculos no quieren obedecer; es una especie de estado paralítico; no puede formular sus ideas, fijar su atención, ni concentrar su espíritu; parece medio idiota.

No hay nunca delirio violento; se puede decir que el delirio es raro; cuando existe, se muestra en forma de "balbuceo".

Hay estado de postración estúpida; es más bien un estado en que el enfermo desea no decir, hacer, pensar en nada, más bien que delirio verdadero.

Sin embargo hay evidentemente estado de confusión de espíritu; no PUEDE PENSAR.

En muchos casos, cuando la enfermedad está avanzada si se saca al enfermo de su estupidez hablándole, sacudiéndolo, actuará como si tratara de pensar, responder, moverse, pero en realidad se contentará con mirar fijo al que lo ha interpelado, con ojos semi abiertos; expresión de estupidez en la cara, y retorciendo sus dedos. Si habla, contará que ve espíritus, diablos" (Kent).

Modalidades

Lateralidad

Izquierda inferior, derecha superior.

Agravación

De 16 a 20; del atardecer a la mañana; al aire frío.

Mejoría

Al aire caliente; cuando el espíritu está distraído.

Síntomas mentales

Tiene acción estupefactiva muy pronunciada.

Hahnemann describe así el estado que produce.

"Estupor, embotamiento de sensorio, estado en que, con buena vista, sólo ve incompletamente y no presta atención a nada; en que con oído sano, no oye claramente; en que con órganos gustativos bien constituidos, no encuentra gusto a nada; en que está siempre, o casi siempre, sin pensar; recuerda poco a nada el pasado o lo que acaba de pasar; nada lo alegra; no hace nada más que dormir ligeramente; no puede gozar de un sueño verdadero y reparador; en que se puede trabajar sin prestar atención o tener fuerza para hacerlo", tal es el cuadro de conjunto de su acción sobre el psiquismo humano.

Esto debe ser diferenciado del estado psíquico estúpido de apis, bapt., bell., kali brom., phosph. ac., etc.

TACITURNIDAD; MELANCOLÍA llevada hasta la desesperación, TRISTEZA agravada al ver personas alegres, ansiedad excesiva con agitación y espanto.

IDEAS FIJAS que no podrá hacer desaparecer; tiene idea fija de que va a morir tal día y nada se la sacará de la cabeza; esto no se parece a acon., que no tiene miedo a la muerte : tiene la idea fija de que ha cometido tal falta, a veces la nombra y la describe o sólo habla de ello vagamente, pero eso le parece muy real.

No dice nada, está de mal humor, triste, queda sentado en un rincón, estúpido, sin pensar en nada, todo ensayo de consuelo lo agrava (nat. mur.).

Si consigue reflexionar en su estado moral, éste mejora (Kent).

Estado de locura en que está persuadido de haber comprometido su salvación por sus pecados; como aur. met., imagina haber obrado mal, haber cometido faltas imperdonables.

Kent cita el caso siguiente en que helleb. obró maravillas; "una mujer vieja había sido acusada de robo por sus vecinos, tomó tan a pecho las cosas que se ahorcó.

Este suicidio produjo tal efecto en las mujeres del pueblo que una después de otra se acusaron de haber sido la causa de la muerte de la vieja".

Sueño

Sensación de calor ardiente en la cabeza; dolores punzantes, presivos, por congestión de cerebro.

Dolor de cabeza occipital violento; dolor de cabeza sordo, en occipucio; sensación de entumecimiento en occipucio.

Sensación de plétora, de congestión en cabeza.

Los dolores de cabeza, los movimientos de cabeza y el aspecto de la cara se encuentran ligados a congestión de cerebro. (Kent).

Dolor de cabeza estupefactivo con gemidos y grito encefálico; gira la cabeza a la derecha e izquierda, o la toma entre sus manos; trata de hundir la almohada con la cabeza en parte inconscientemente, en parte para aliviar la contracción de músculos de la nuca (Kent).

Vértigos con náuseas y vómitos;

Ojos

La vista no está debilitada y sin embargo, ve imperfectamente.

No mira el objeto que tiene delante, lo ve bien, pero esta visión no hace ninguna impresión en su espíritu (Kent).

Pupilas habitualmente dilatadas, a veces se nota alternancia de dilatación y contracción.

Mirada fija, ojos sensibles a la luz.

Cara

De aspecto extremadamente enfermizo, se descarna poco a poco; pálida, bañada de sudor frío, y cabeza caliente; ojos y fosas nasales bordeados de negro; frente y cejas fruncidas como lycop. pero mientras en éste se relaciona con afección pulmonar grave, en helleb. lo está con afección cerebral; músculos de la cara animados por sacudidas, ojos vidriosos, fijos; párpados entreabiertos; labios secos y agrietados (Kent).

Aparato digestivo

BOCA :

Labios secos y agrietados (bryon., nat. mur., nux mosch. sulph.).

Lengua seca y roja; salivación abundante; acet. ac., iodum, ipeca, merc., nit. ac., etc.) movimientos constantes de mandíbulas como de masticación; aliento fétido (arnica, ars. alb., bapt., chelid., kreos., merc., nit. ac., nux vom.).

ESTOMAGO :

Sed violenta y a veces hambre voraz, inusitado.

Náuseas y vómitos, pero sin signos distintivos.

Se nota también sensación de plenitud y de hinchazón en el estómago.

ABDOMEN Y DEPOSICIONES :

Al principio puede haber diarrea con deposiciones abundantes, gelatinosas, formadas casi únicamente por mucus.

Luego la constipación se instala; las deposiciones son pequeñas, duras, secas, finalmente no responde ni a enemas.

Cuando la reacción bienhechora provocada por el remedio, tiene lugar, es anunciada generalmente por diarrea, o transpiración abundante, o vómitos, o los tres a la vez (Kent).

Aparato urinario

Orina retenida y a veces suprimida; necesidad ineficaz de orinar (acon., ars. alb., eup. perf., nux vom., sarsap.) a veces la orina se emite gota a gota, pasa sin que se dé cuenta.

A veces puede ser sanguinolenta.

Espalda y extremidades

Gran debilidad, gran relajamiento muscular; el enfermo está acostado de espaldas con las piernas replegadas o se desliza al fondo de su lecho.

Disminución del sentido muscular; debe prestar mucha atención al funcionamiento de sus músculos.

Relajamiento súbito de músculos, de repente deja caer los objetos (apis, bovis., nat. mur., tarent.).

SACUDIDAS en músculos del brazo, rigidez espasmódica de dedos.

Dolores tironeantes en huesos o articulaciones de brazos.

Retracción pulgar. (cupr.).

Debilitamiento considerable de miembros inferiores; miembros pesados y dolorosos; tambalea al caminar.

Movimientos espasmódicos de un brazo o pierna.

Movimientos convulsivos a más bien automáticos, que no parecen tener ninguna relación con un acto voluntario.

Hace movimientos como el que se mueve en estado de ausencia del espíritu (Kent).

Relaciones

Antídotos

Camph., cinch.

HEPAR SULFURIS CALCAREUM

Hepar sulfuris calcareum o hígado de azufre calcáreo, es un sulfuro de calcio impuro, preparado haciendo calcinar una mezcla en partes iguales de flor de azufre muy pura y calcare ostrearum.

Se presenta en forma de masa amarilla o rojiza, porosa, quebradiza, muy poco soluble en agua.

Partiendo de ella preparamos las tres primeras dinamizaciones por trituración.

Hepar sulf. calc. por su composición, cal y azufre, ocupa un término medio entre los dos grandes antipsóricos, sulfur y calc. ost.

Acción general del medicamento

Hep. sulf. calc. tiene acción manifiesta y muy marcada sobre SISTEMA NERVIOSO.

Por una parte, determina gran HIPERESTESIA SENSORIAL a todas las impresiones exteriores y al dolor.

Por otra parte, tiene ACCIÓN DEPRIMENTE muy neta, por lo tanto, DEBILITAMIENTO NERVIOSO.

También tiene afinidad profunda con MUCOSAS en las que determina ESTADO CATARRAL MARCADO; y esta afinidad existe PARTICULARMENTE CON MUCOSAS DE APARATO RESPIRATORIO, OÍDOS, y OJOS, donde produce INFLAMACIONES CATARRALES, CRUPALES Y SECRECIÓN PROFUSA.

El enfermo de hep. sulf. calc. es propenso a corizas; en algunos casos, la nariz, muy tomada al principio, presenta secreción abundante con estornudos cada vez que el individuo sale al aire frío; la secreción, primero acuosa, luego espesa, amarillenta, de olor desagradable a queso rancio, pronto se disipa si toma el remedio; notemos que las secreciones de cualquier parte del cuerpo tienen, en hep. sulf. calc., este olor a queso rancio y también un olor agrio característico; el CUERPO DE LOS NIÑOS DE LA CONSTITUCIÓN DE hepar, A PESAR DE LA LIMPIEZA TIENE ESTE OLORES AGRIO (Kent).

El resto del canal respiratorio tiene el mismo estado catarral en su mucosa.

Garganta muy sensible al tacto, con dolores como si le clavasen espinas; dificultad para hablar y tragar; la emisión de voz es dura y ronca en el adulto, especialmente a la mañana y la noche; cada vez que se sale en tiempo frío y seco, enronquece, pierde la voz y tose con tos seca y ronca, como un ladrido; respirar aire frío también aumenta su tos; la simple acción de sacar las manos del lecho aumenta los síntomas laríngeos; sacar de la cama manos y pies causa agravación general de todos sus males; sacar accidentalmente la mano del lecho, durmiendo, provoca tos o estornudo (Kent).

Hep. sulf. calc., tiene tendencia excesiva A SUPURACIÓN.

SU TENDENCIA PIOGENICA CONSTITUYE SU ESPECIALIDAD.

Fisiológicamente, acelera la supuración y determina la formación de pus. (Hering).

Por eso lo debemos considerar como uno de los mejores medicamentos piógenos, siempre que el pus sea de formación reciente, que esté bien ligado, de color blanco o blanco amarillento y desprovisto de toda acción irritante. Hep. sulf. cacl. ataca al SISTEMA LINFÁTICO GANGLIONAR; bajo su influencia, los ganglios linfáticos están hipertrofiados y duros, o bien, a cada enfriamiento algunos ganglios se induran, o los ganglios indurados empiezan a supurar.

Hep. sulf. calc. tiene acción muy marcada, rectora SOBRE LA PIEL.

Provoca TRANSPIRACIÓN FÁCIL; bajo su influencia se vuelve MALSANA, la más pequeña excoriación supura; erupciones húmedas en todos los pliegues, comezón, sobre todo en pliegues articulares; es excesivamente SENSIBLE al aire.

Características

1) CONSTITUCIÓN Y TIPO : Hep. sulf. calc. es el verdadero remedio de los LINFÁTICOS.

Especialmente apropiado en CONSTITUCIONES ESCROFULOSAS, RUBIOS, CON MÚSCULOS FLÁCIDOS Y BLANDOS, MOVIMIENTOS LENTOS, PIEL MALSANA, y con tendencia marcada a erupciones y OBSTRUCCIONES GANGLIONARES, RUBIOS APÁTICOS, DE CARÁCTER INDOLENTE Y PEREZOSO, PERO EXCESIVAMENTE IRRITABLES, se encolerizan por nada.

Tez amarillenta; LABIO SUPERIOR HINCHADO, SOBRESALE UN POCO COMO HOCICO DE CONEJO O TAPIR, mientras que el medio del labio inferior se resquebraja y hay ulceraciones netas en las comisuras.

En lo moral, son TEMPERAMENTOS PROPENSOS A VIOLENTOS ARREBATOS; la causamás fútil los irrita y su hablar es apresurado.

O bien su expresión es triste, deprimida; sienten angustia, sobre todo al atardecer, a la noche, tienen pensamientos de suicidio.

EL FONDO DE SU NATURALEZA ES LA BLANDURA, MOLICIE, musculatura débil, cabello generalmente rubio y tez amarilla. (Mouezy-Eon).

2) HIPERSENSIBILIDAD EXTREMA DEL SISTEMA NERVIOSO, AL DOLOR, TACTO, AIRE FRÍO Y CONTRARIIDADES, ETC.

La hipersensibilidad física y moral es una de las marcas de su carácter.

El sujeto de hep. sulf., calc. es TAN SENSIBLE AL DOLOR, que se desvanece por el menor sufrimiento; si tiene una inflamación, induración, en cualquier región del cuerpo, LA SENSIBILIDAD DE LA PIEL es tal que no se le puede tocar, rozar : no soporta ni un soplo de aire, corriente de aire.

Es HIPERSENSIBLE AL FRÍO, le parece sentir aire si una puerta está abierta en la pieza vecina; debe cubrirse la cara aún en tiempo caluroso (psorin.); no puede soportar estar destapado (nux vom.); camph., sécale, al contrario, no pueden tolerar estar tapados; se enfría por la menor exposición al aire fresco. (tuberc.) (Allen).

Esta hipersensibilidad nerviosa es tanto MORAL COMO FÍSICA; la menor cosa lo irrita y hace montar en cólera, pronunciar palabras vehementes.

El sujeto de hep. sulf. es excesivamente sensible a cualquier impresión exterior.

Lo que para una persona normal no es más que una contrariedad es para él intenso sufrimiento.

Sus abscesos, forúnculos, erupciones, increíblemente dolorosos y este dolor es tan intenso, que describe a veces su mal, diciendo que cree que tiene sensación de que lo golpean, lo desgarran con puntas aceradas en sus ulceraciones, los dolores son intensos y agudos como si la piel fuera desgarrada a golpes, que lo trituran, y esta sensación de pinchazo punzante, de desgarradura, se puede encontrar en todas partes : garganta, abscesos, inflamaciones, erupciones, tiene en todas partes, esta sensación de golpes que trituran y desgarran (Kent).

La hipersensibilidad de hep. sulf. calc. se compara a chamom., coffea, acon., nux vom., valer., zincum etc.

3) PROCESOS SUPURATIVOS : Tendencia general a supuración, por eso es muy útil en el período de supuración de inflamaciones locales; si se da en dilución muy alta, antes que el pus se haya formado y si no se repite demasiado pronto, puede prevenir y detener el proceso supurativo; si el pus ya está formado apresurará la abertura del absceso, lo hará vaciar más rápido y activará la circulación; habrá que darlo entonces en dilución baja.

Hep. sulf. es precioso por su poder para provocar supuración alrededor de cuerpos extraños; por ej., un cuerpo extraño se encuentra bajo la piel en un lugar que se ignora : será una esquirla de proyectil que quedó después de haber sacado el trozo principal, un pedazo de astilla, etc.; y estos cuerpos extraños pueden ser tan pequeños que no se los ve y provocan, sin embargo, síntomas inflamatorios que se constatan sin saber dónde está el cuerpo extraño que los causa : hep. sulf., dado en este caso, y si es indicado por los síntomas generales, apresura la supuración y cura haciendo salir con el pus el cuerpo extraño que no se podía sacar.

Silic., es otro medicamento capaz de provocar inflamación supurativa y hacer salir con el pus, cuerpos extraños demasiado pequeños o disimulados para ser sacados.

Esta acción general de hep. sulf. explica que su administración provoque a veces erupción de forúnculos, porque en la piel de tales sujetos, hay en partes, pequeñas acumulaciones de materias sebáceas que forman cuerpo extraño y provocan supuración.

Sulph. produce el mismo efecto y por eso hay que actuar con prudencia y no dar silic., sulph., o hep. sulf., demasiado e menudo, ni demasiado alto, a enfermos con tuberculosis enquistados en los pulmones, que bajo la influencia de estos remedios mal empleados, empezarían a supurar (Kent).

Modalidades

Lateralidad

Derecha.

Agravación

a) PERIÓDICA, cada día, todos los meses, cada cuatro meses, cada invierno.

b) POR FRÍO, POR LA MENOR CORRIENTE DE AIRE, POR VIENTO FRÍO Y SECO, AL BEBER Y COMER COSAS FRÍAS : no solamente la piel es muy sensible al aire frío SINO QUE EL AIRE FRÍO EN GENERAL AGRAVA TODOS SUS SÍNTOMAS.

Como acon. parece particularmente eficaz en casos sobrevenidos después de exposición a aire frío; la tos, disnea, y todos los síntomas, se agravan después de exposición al aire frío. (Nash).

El sujeto de hep. sulf. es FRÍOLENTO, sensible al frío y necesita una cantidad inusitada de ropa abrigada, cuando está al aire frío.

Necesita dormitorio y cama muy calientes; desea tener en la pieza donde se encuentra una temperatura más elevada que cualquier persona normal; soporta mal el frío, que aumenta todos sus malestares.

Si tiene frío mientras duerme, sus malestares aumentan, lo mismo si se encuentra afuera con viento frío y seco.

El frío en manos y pies durante el sueño, le provoca síntomas; se tapa hasta la nariz cuando está acostado (Kent).

c) POR TACTO.

POR EL MENOR CONTACTO, EN LAS REGIONES DOLOROSAS; ESTANDO ACOSTADO SOBRE EL LADO DOLOROSO (bar. carb., iodum; kali carb., nux mosch., phosph.; etc.).

d) POR MERCURIO, por abuso de mercurio.

Mejoría

POR CALOR en general (ars. alb.); envolviéndose abrigado sobre todo la cabeza (silic., psorin.).

Por tiempo caluroso, por tiempo húmedo, lluvioso (caust., nux vom., nat. sulf., tiene lo contrario).

Síntomas mentales

El espíritu tiene su parte en la sensibilidad exagerada del remedio; se manifiesta por EXTREMADA

IRRITABILIDAD; a la menor contrariedad, se irrita y su impulso lo lleva a la grosería y a la injuria; se deja dominar por sus impulsos a tal punto que sería capaz, en el momento de cólera, de matar a su mejor amigo.

ES PENDENCIERO.

DIFÍCIL PARA CONVIVIR, JAMÁS SATISFECHO, MOLESTA A TODO EL MUNDO, SUSCEPTIBLE CON LOS QUE LO RODEAN AFECTADO EN SUMO GRADO POR LOS ACONTECIMIENTOS; DESEARÍA VER RENOVADO SIN CESAR TODO LO QUE LO RODEA, COSAS Y GENTE, Y SIN EMBARGO CADA CARA, CADA COSA NUEVA LO DISGUSTA Y LO IRRITA (Kent).

ACTÚA CON PRISA, SU HABLAR ES PRECIPITADO : Encontramos el mismo síntoma en bell. : Habla y bebe con prisa.

También lo encontramos en lach., dulcam., y sulph.

TRISTE, DEPRIMIDO, SOBRE TODO AL ATARDECER; AL PASEAR AL AIRE LIBRE, está descorazonado, trastornado por el recuerdo de sus preocupaciones pasadas.

SU MEMORIA ESTA DEBILITADA; de suerte que olvida ciertas palabras, nombres de localidades, etc.

ANSIOSO, ANGUSTIADO, DESCORAZONADO, con IDEAS DE SUICIDIO, particularmente a la tarde y a la noche.

En sujetos de hep. sulf. aparecen de vez en cuando IMPULSOS COMPLETAMENTE IRRACIONALES : un hombre tendrá de pronto deseos de matar a su amigo.

Un barbero tendrá de repente el deseo de cortar la garganta de su cliente; madres que tienen el deseo de arrojar a su hijo al fuego o de arrojarlas ellas mismas; deseo de violencia o destrucción; estos síntomas pueden llegar a locura y realización de esos deseos impulsivos incluso el de incendiar (Kent).

Sueño

Gran deseo de dormir mañana y noche.

Con bostezos convulsivos.

De noche : insomnio con gran afluencia de ideas, o sobresaltos durante el sueño, como si le faltara el aire, con llantos y grandes angustias.

También se ha notado el síntoma siguiente : de noche sufrimientos gástricos, dolor de cabeza, agitación, estremecimiento de miembros y calor seco.

A veces también sueño pesado, prolongado, con aturdimiento como en el comavigil. (Jahr).

Cabeza

CUERO CABELLUDO SENSIBLE Y DOLOROSO.

También puede haber sudores fríos en la cabeza.

Tuberosidades en la cabeza con dolor de excoiación al tacto. (Jahr).

Caída de cabellos con placas de calvicie.

Tiña húmeda pruriginosa y ardiente.

Cefalalgia con sensación como si le entrara una cuña en temporal derecho raíz de la nariz, todas las mañanas.

Vértigo al mover la cabeza o por movimiento de coche, o andando acaballo, o al atardecer con náuseas.

Ojos

Hepar es un medicamento que juega malas pasadas a los oculistas, pues cuando está bien indicado, cura rápidamente afecciones de ojos y evita, así, el recurrir a especialistas para cuidados particulares.

Bajo su influencia, los ojos tienen sensación espesa, purulenta, con mal olor característico; la inflamación va acompañada de pequeñas ulceraciones : úlcera de córnea; granulaciones, secreción sanguinolenta con olor desagradable.

Ojos rojos con párpados inflamados y bordes dados vuelta y ulcerados.

En todas las afecciones escrofulosas, los síntomas de los ojos pueden ser cubiertos por hepar sulf. si la constitución es la del remedio.

A menudo este estado del paciente es la única guía para la elección del remedio; a menudo los síntomas de los ojos tienen solamente inflamación con secreción catarral y por eso se pensará en muchos otros antipsóricos; pero si se estudia el caso a fondo, se encontrarán síntomas generales que serán una guía para descubrir el remedio necesario (Kent).

OJOS Y PÁRPADOS ROJOS E INFLAMADOS.

CONJUNTIVITIS PURULENTE CON QUEMOSIS MARCADA; ABUNDANTE SECRECIÓN DE PUS, CONGRAN SENSIBILIDAD AL TACTO Y AL AIRE.

Párpados sensibles al tacto.

Dacrioxistitis.

ULCERACIONES DE CORNEA, (calc. ph., radix nig., rhus tox, silic., sulph.).

Iritis con pus en cámara anterior; dolores en los ojos como si los tiraran hacia atrás.

FOTOFOBIA A LA LUZ DEL DÍA O ARTIFICIAL.

Oídos

Afecciones catarrales de oído.

INFLAMACIÓN SÚBITA DE OÍDO MEDIO : un absceso se forma y el tímpano se perforando sale a una secreción sanguinolenta acompañada de dolores agudos, desgarrantes de oído; primero hay sensación de tener el oído tapado, después como una presión, un estallido en el oído, y en fin ruptura de tímpano.

ESTADO INFLAMATORIO CATARRAL, que provoca secreción fétida, sanguinolenta, amarillenta, purulenta, espesa con pequeños trozos duros con olor a queso rancio (Kent).

Costras en el oído.

Secreción de pus fétido por el oído; absceso de oído, mastoiditis.

Cara

Tez amarillenta con ojeras azules alrededor de los ojos.

Cara extremadamente pálida, sobre todo durante ejercicios violentos. (Jahr).

Placas rojo vivo en mejillas a la mañana y al atardecer.

HINCHAZÓN MUY PRONUNCIADA DE LABIO SUPERIOR, COMO HOCICO DE CONEJO.

GRIETAS EN MEDIO DE LOS LABIOS, pero especialmente en medio del labio inferior.

ULCERACIONES EN COMISURAS. (am. carb., arum triph., condur., graph. nat. mur., nit. ac., silic.).

NEURALGIA FACIAL LOCALIZADA, particularmente a la derecha que irradia al oído, temporal y labio.

Está indicado en ese caso particularmente después de abuso de merc. y ensayo infructuoso de bell. que parecería indicado después de exposición a viento frío y seco.

En neuralgia y sus otros síntomas nerviosos, hep. sulf. se pondrá al lado de bell., silic., y sulf.; sigue frecuentemente a bell. y se puede distinguir de silic. y sulf. por sus grandes características diferenciales.

Aparato digestivo

BOCA :

Acumulación de agua en la boca; salivación abundante.

Hinchazón e inflamación de encías que están dolorosas al tacto y sangran fácilmente.

Punta de lengua muy sensible como desollada.

FARINGE :

HIPERTROFIA CRÓNICA DE AMÍGDALAS CON TENDENCIA A SUPURACIÓN.

Amigdalitis aguda, DOLORS COMO POR ESPINA DE PESCADO CLAVADA EN LAGARGANTA, O COMO SI TUVIESE UNA MASA EN LA GARGANTA, peor al tragar con irradiación hacia el oído.

Es de gran utilidad en amigdalitis; NO ESTÁ INDICADO AL PRINCIPIO SINO CUANDO LA SUPURACIÓN ES INMINENTE y hay muchos dolores latentes.

Lo más a menudo se da hep. sulf. cuando hay esta sensación de punzadas, latidos, pinchazos, pero hay que recordar que nit. ac., arg. nit., alum., y nat. mur., también tienen este síntoma y pueden ser tan útiles como hep. sulf. según el caso.

ESTOMAGO :

SENSACIÓN DE HAMBRE QUE CORROE, DE VACÍO, CON DESEOS DE COMER ALGO; SOBRE TODO MARCADA A LA MAÑANA.

REPUGNANCIA POR GRASAS (cycl., puls.,) DESEO DE COSAS ÁCIDAS O ALCOHOLIZADAS, fuertes; deseo de vino.

GRAN SED, pero a menudo hinchazón de vientre después de haber bebido.

GRAN DEBILIDAD DE LA DIGESTIÓN Y PERTURBACIÓN FÁCIL DEL ESTOMAGO.

Toda clase de comida, aún muy liviana y sana, provoca indigestión; hep. sulf., parece ser complementario de lachesis aquí.

No puede soportar ninguna presión, nada de ropa ajustada en epigastrio.

SENSACIÓN DE ARDOR en el estómago.

Dispepsia atónica.

Hep. sulf. es muy útil en trastornos dispépticos por uso prolongado de merc.

ABDOMEN Y DEPOSICIONES :

Abdomen distendido.

Afecciones abdominales crónicas, cólicos y pinchazos en el abdomen.

PUNTOS DOLOROSOS, PUNZADAS EN REGIÓN DEL HÍGADO, agravadas al caminar, toser, respirar profundamente y por el menor contacto (bryon., merc).

Hepatitis; ABSCEOS DE HÍGADO.

CONSTIPACIÓN HABITUAL POR ATONÍA INTESTINAL : deposiciones evacuadas con gran dificultad, aún cuando sean blandas y arcillosas, como se ven a veces en este medicamento.

Deposiciones fétidas, agrias, que contienen restos sin digerir, color de arcilla.

DIARREA DE OLOR AGRIO EN NIÑOS.

Colocado como está entre sulph. y calcar., este remedio es útil en niños que tienen gran debilidad de digestión, no pueden digerir el alimento por bien elegido que esté, están en estado marasmático.

Además tienen diarrea ordinariamente pero de día, después de comer, pero cosa importante, huelen agrio : hay que recordar siempre el olor agrio del niño de hepar, aunque esté bien lavado.

Aparato urinario

La mucosa vesical no escapa al estado catarral que desarrolla : CATARRO DE VEJIGA CON PUS Y ABUNDANTE depósito mucoso en la orina; ULCERACIONES EN PAREDES DE VEJIGA que se endurecen de tal manera que LA EMISIÓN DE ORINA SE HACE MUY DIFÍCIL, sólo sale lentamente; ARDOR EN VEJIGA CON necesidad constante, sin fuerza, cayendo VERTICALMENTE.

VEJIGA DÉBIL, ATÓNICA; sensación como si quedara siempre un poco de orina después de haber orinado; vejiga "difícil" de los viejos (phosph., sulph., copaiva).

Orina turbia y blancuzca.

Película grasosa e irisada en superficie de la orina; círculos grasos en la orina.

Órganos genitales

MASCULINOS :

ULCERACIONES HERPÉTICAS PREPUCIALES QUE SANGRAN FÁCILMENTE; ulceraciones en prepucio parecidas a chancro (nit. ac.).

LESIONES HÚMEDAS CON PRURITO EN ÓRGANOS GENITALES, principalmente entre muslos y escroto.

ESTADO CATARRAL DE MUCOSA URETRAL que se parece a gonorrea (Kent).

FEMENINOS :

Abscesos de labios con gran sensibilidad.

Excoriaciones, lesiones húmedas en vulva y entre muslos.

Prurito vulvar pero durante reglas.

Reglas atrasadas y poco abundantes.

Leucorrea irritante y fétida, con olor a queso rancio tan penetrante que se puede reconocer enseguida cuando una mujer que la padece entra en la habitación; kali phosph. hace a menudo desaparecer este olor (Kent).

Hemorragias uterinas repetidas.

Transpiraciones profusas en menopausia. (jabor., TILIA EUROPEA).

Aparato respiratorio

NARIZ :

Sensible, ulcerada.

OBSTRUCCIÓN DE FOSAS NASALES CADA VEZ QUE SALE AL AIRE LIBRE.

Coriza con nariz hinchada, dolorosa al tacto, especialmente al salir al aire libre.

Nariz obstruida en cuanto sale al aire frío y dice que le parece tomar un nuevo resfriado de cabeza, en cuanto respira aire frío.

Está mejor en pieza caliente.

LARINGE :

Ronquera con voz débil y ronca peor por la mañana.

Crup acompañado de tos, más bien gruesa, con rales y silbidos, como si el mucus desprendido por la tos, fuera a salir, pero no sale; formación de exudados membranosos que se extienden en laringe y bronquios; tos dura, perruna,

húmeda, acompañada de rales mucosos, peor a la mañana, aunque puede venir antes de medianoche, pero sobre todo tiene como carácter el ser húmeda y es tan sensible al frío, que la menor exposición al aire, descubriéndose, el sólo descubrir el antebrazo provoca un acceso.

BRONQUIOS Y PULMONES :

ESTADO CATARRAL DE TRAQUEA QUE SE HACE MUY DOLOROSA e IRRITADA POR TOS FRECUENTE; tose durante días y días, semanas, CON AGRAVACIÓN A LA MAÑANA Y TARDE; TOS RUIDOSA COMO UN LADRIDO, HACE DOLER EL PECHO Y EL SUJETO ESTA EXTREMADAMENTE SENSIBLE Y FRIOLENTO; va acompañada de ahogos y puede provocar vómitos; se agrava por aire frío, basta que saque la mano fuera del lecho; en fin tose y transpira a veces de noche sin que esta transpiración lo alivie. TRANSPIRAR TODA LA NOCHE SIN ALIVIO, ES LA CARACTERÍSTICA QUE ACOMPAÑA MUCHOS ESTADOS DE hep. sulf.; TRANSPIRA FÁCILMENTE, EL MAS PEQUEÑO ACCESO DE TOS LO HACE TRANSPIRAR (Kent).

Tos con ligera expectoración mucosa y cuya característica es QUE APARECEEN CUANTO SE DESCUBRE UNA PEQUEÑA PARTE DEL CUERPO, POR LO SENSIBLE AL FRÍO : esto se puede encontrar en crup, laringitis, bronquitis, tisis, etc.; no solamente la tos se agrava cuando se descubre, sino todos los síntomas.

Hepar ES ÚTIL EN TODAS LAS INFLAMACIONES CATARRALES DEL ÁRBOL RESPIRATORIO, PERO ESPECIALMENTE CUANDO SE LOCALIZA EN LARINGE Y TRAQUEA, Y EN ESCROFULOSAS, en particular en niños después de rubéola (Charge).

Afecciones pulmonares por supresión de erupción cutánea.

Bronquitis aguda y crónica.

Asma agravada por frío seco, mejor al aire húmedo.

Pleuresía con derrame purulento o sero purulento.

Espalda y extremidades

Tirones dolorosos en músculos con espasmo.

Hinchazón de articulaciones de dedos, con tendencia a dislocarse fácilmente.

Temblores de manos al escribir.

Piel

PIEL MUERTA, EXTREMADAMENTE SENSIBLE AL TACTO Y AL FRÍO, PIEL MALSANA; la menor desgarradura supura.

PIEL AGRIETADA EN MANOS Y PIES.

ERUPCIONES ECZEMATOSAS, con mucho prurito y secreción purulenta, fétida y agravada a la mañana; hep. sulf. está particularmente indicado si esto se deba a abuso de pomada mercurial.

ULCERACIONES MUY SENSIBLES AL TACTO, con dolor ardiente, SANGRAN FÁCILMENTE, y dejan salir PUS FÉTIDO, CON OLOR A QUESO RANCIO.

FORÚNCULOS; hep. sulf. está indicado en forúnculos en casos de constitución como la del remedio; a veces no hay otro síntoma que debilidad, extrema filiosidad y tendencia marcada a forunculosis; entonces es bien completado por silic. (KENT).

Bubones, inflamaciones ganglionares, cuando ha llegado el estado supurativo.

Hepar es gran remedio para TRANSPIRACIONES PARCIALES O GENERALES.

Puede, por ejemplo, seguir a merc. en reumatismo, en que el paciente transpira noche y día sin mejorar, cuando merc. ha producido poco efecto; Kent señala que TRANSPIRAR DE NOCHE ACOMPAÑA MUCHOS ESTADOS DEL REMEDIO Y QUE ESTA TRANSPIRACIÓN NO PRODUCE NINGÚN ALIVIO, lo que es una característica del remedio.

Relaciones

Complementarios

Caléndula en heridas de partes blandas.

Antídotos

Bell., cham., silic.

Preserva contra los efectos debilitantes del ÉTER.

Antidota malos efectos de IODO, POTASA, IODURO DE POTASIO, ACEITE DE HÍGADO DE BACALAO, Y SOBRE TODO MERCURIO : hepar es el complementario y el antídoto de Mercurio dinamizado cuando éste ha dado todos los resultados que podía dar o si actúa al margen, embrollando un poco el caso y es necesario hacerle seguir por su complemento natural o su antídoto y preparar una nueva salida de síntomas, habrá que pensar en hepar. Está reconocido que merc. sería mal completado por silic., que es contraindicado cuando merc. actúa todavía o ha actuado precedentemente : en ese momento hep. sulf. viene a ser el remedio intermedio; silic. seguirá útilmente a hep. que a su vez, es útil después de merc. : hep. es un intermediario en la serie (Kent).

HYDRASTIS CANADENSIS

O sello de oro o raíz de oro, planta de la familia de las ranunculáceas, crece en praderas de norte y oeste de E.U. y Canadá.

Su rizoma contiene, azúcar, albuminoides, materias extractivas y dos alcaloides;hydrastina y berberina, este último análogo al alcaloide extraído del Berberis Vulgaris.

Preparamos nuestra tintura por maceración de la raíz fresca en alcohol a 90°.

Acción general del medicamento

Veneno esencialmente DEPRESOR.

Hydrastis actúa por intermedio DEL SISTEMA NERVIOSO SOBRE EL APARATOCIRCULATORIO : la parálisis vulvar, fin último de este medicamento, que mata por paro respiratorio, determina lentitud y arritmia de movimientos cardíacos, al mismo tiempo vaso dilatación general que hace bajar la presión vascular y determina éstasis que puede ser causa de exudación sanguínea (hemorragias pasivas) y se encuentran como fenómenos iniciales de estados que produce este medicamento, y al principio de afecciones a las que se adapta mejor : es así, por ejemplo, que en la zona del recto, uno de sus sitios de elección, provoca experimentalmente estado congestivo y de debilitamiento cuya principal expresión es la constipación y clínicamente, sólo muestra alguna eficacia si la constipación es consecuencia de hábitos sedentarios después de una vida activa o del empleo frecuente de laxantes. Y lo mismo en el útero, en el que sólo mejora trastornos provenientes de estados netamente congestivos.

Hydrast. actúa de manera general, sobre todas LAS MUCOSAS de la economía.

La clínica que ha mostrado los felices resultados que se pueden obtener con su empleo en catarros crónicos, está de acuerdo con la experimentación que muestra que bajo su acción las mucosas presentan LESIONES INFLAMATORIAS CARACTERIZADAS POR ALTERACIÓN DE SUS SECRECIONES NATURALES, que primero aumentan, luego se hacen anormales en cantidad y calidad : primero claras, blancas, transparentes y tenaces, adherentes, SE TRANSFORMAN EN AMARILLAS, ESPESAS, VERDES Y AUN SANGUINOLENTAS, VISCOSAS, FILAMENTOSAS.

El poder del remedio sobre el revestimiento externo, de manera que en gran número de lesiones cutáneas (excoriaciones, fisuras, ulceraciones), este medicamento se ha mostrado beneficioso : necesita, para actuar, cierto grado de cronicidad.

Esta especialidad de acción en lesiones irritativas crónicas de piel y mucosas, pone en relación a hydrast., si no con la diátesis cancerosa, al menos con las lesiones que engendra.

Aunque ciertos médicos : Gutteridge, Clifton, Rodd, han obtenido en casos de cáncer auténticos éxitos notables, no se puede, en el tratamiento de esta grave enfermedad dejar de acordar a hydrast. un valor ocasional.

Sin embargo hay que reconocer que en tumores cirrosos desarrollados en tejidos glandulares, como los de las mamas, es a menudo de gran valor por su influencia sobre la glándula misma.

Características

1) CONSTITUCIÓN Y TEMPERAMENTO : Es especialmente activo en SUJETOS DELGADOS, caquécticos, debilitados, que tienen GRAN DEBILIDAD GENERAL, postración, con SENSACIÓN PENOSA DE VACÍO EN EL ESTÓMAGO, y presentan fácilmente SECRECIONES MUCOSAS ESPESAS, FIBROSAS, VISCOSAS; también en individuos de edad avanzada, fácilmente fatigados.

Discrasia caquéctica o maligna con perturbación de funciones digestivas y hepáticas; decrepitud por abuso excesivo de alcohol.

2) SECRECIONES MUCOSAS ESPESAS, VISCOSAS, FIBROSAS : Es como en kali bichr., pero los otros síntomas de estos dos remedios son muy diferentes. (Nash).

SECRECIONES ESPESAS, TENACES, AMARILLENTAS, VISCOSAS, Y FIBROSAS, QUE PUEDEN APARECER EN CUALQUIER MUCOSA; nasal, bucal, gástrica, intestinal, uretral, vaginal.

Y VAN ACOMPAÑADAS DE, IMPRESIÓN DE DEBILIDAD INTENSA, CON ADELGAZAMIENTO MARCADO.

A menudo, esta irritación va acompañada de DOLORS ARDIENTES.

Modalidades

Agravación

Por calor; al lavarse; esto especialmente para los síntomas de piel.

Los síntomas catarrales se agravan por viento seco y fuerte; fuera de casa; por movimiento.

Mejoría

Por reposo, la presión mejora muchos síntomas.

Síntomas mentales

GRAN DEPRESIÓN DE ESPÍRITU; le disgusta salir, leer, escribir, hacer sus ocupaciones habituales, distraerse.

No se interesa por nada, todo le representa esfuerzo.

Al mismo tiempo está muy irritable y de mal humor.

Cabeza

Erupción eczematosa en la frente, al borde del cuero cabelludo.

Cabeza pesada todo el día.

Cefalea con dolor frontal más marcada sobre el ojo izquierdo, que puede durar todo el día, pero, en todo caso peor de 9 a 10 de la mañana, agravada en habitación caliente, mejorada al aire libre, generalmente relacionada con coriza complicado con sinusitis, o constipación inveterada, agravada por abuso de laxantes.

Dolor occipital del lado izquierdo, con sensación de pesadez, mejorada por presión de la mano fría, aplicaciones frías o aire frío.

Neuralgia de cuero cabelludo y músculos del cuello (cimic.).

Ojos

Párpados aglutinados a la mañana, al despertar.

Secreciones espesas, amarillentas, tenaces y viscosas, ardientes, irritantes.

Inflamación, enrojecimiento y espesamiento de borde de párpados.

Blefaritis.

Oídos

Otorrea con secreción purulenta, viscosa y espesa.

Catarro con obstrucción de trompa de Eustaquio.

Zumbidos, ruidos en los oídos.

Orejas rojas; hinchadas, cubiertas de costras, fisuras detrás de las orejas con erupción que se propaga hacia el cuero cabelludo.

Aparato digestivo

En esta esfera se encuentran los síntomas más importantes del remedio.

BOCA :

Vesículas de herpes sobre el labio inferior, sobre todo marcadas en comisura derecha.

Aftas de la mucosa de cara interna del labio inferior.

Mucosa bucal inflamada y excoriada; ulceraciones de encías, cara interna de mejillas y lengua, con secreción de mucus adherente, viscoso, amarillento.

Lengua amarilla, gruesa, ancha, que conserva la impresión de los dientes; está marcada a la mañana, se agrava fumando; gusto a pimienta, aunque este síntoma pertenece sobre todo a mezer., en el cual aparece después de las comidas.

FARINGE :

Inflamación crónica de mucosa faríngea que persiste desde largo tiempo, agravada por la menor exposición al frío, acompañada de granulaciones y ulceración con dolores ardientes.

El enfermo "carraspea" constantemente para expectorar mucosidades amarillentas, viscosas, tenaces, que provienen de fondo de laringe y región retranasal.

En angina diftérica el uso de tópicos con una mezcla de glicerina e hydrast. T. M. favorece la desaparición rápida de falsas membranas.

ESTOMAGO :

No hay APETITO ni sed; asco por los alimentos, la mayoría le ocasiona trastornos de estómago, particularmente PAN y LEGUMBRES que le provocan eructos agrios y a veces pútridos.

DOLOR SORDO, OBTUSO, EN EL ESTOMAGO QUE LE CAUSA SENSACIÓN DE DEBILIDAD, DESFALLECIMIENTO, VACÍO EN EPIGASTRIO; IMPRESIÓN DE VACÍO EN HUECO DEL ESTOMAGO, CON DESFALLECIMIENTO; esta sensación de debilidad, vacío, tan característica de hydrast. no mejora al comer, y va acompañada de asco completo por los alimentos, a veces náuseas, generalmente constipación obstinada sin ninguna necesidad.

Hay que recordar a otros dos medicamentos que tienen esta sensación de vacío, desfallecimiento en el estómago y en grado casi igual : sepia e ignat.; pero en sepia sobreviene generalmente después de las comidas y acompañada casi siempre de afección uterina; en ignat. va acompañada por trastornos nerviosos característicos, (para la comparación de otros remedios que tienen este síntoma, ver sulph.).

ABDOMEN Y DEPOSICIONES :

Sufre mucho del vientre, a la mañana se queja de dolores calambroides y cortantes más marcados de 9 a 10 de la mañana y siempre mejorados por emisión de gases fétidos.

Hígado perezoso, sensible, ictericia.

Dolores agudos, intermitentes, en región del hígado; dolores que irradian a los hombros, pero no localizados en ángulo inferior de omoplato derecho como en chelid maj.

Hígado aumentado de volumen, duro, nodular; cara amarilla; gusto amargo; deposiciones claras, a veces descoloridas.

Hemorroides.

CONSTIPACIÓN CRÓNICA sin otros síntomas concomitantes, la constipación es la regla generalmente, sin ninguna necesidad durante días, si hay deposiciones son pequeñas, DURAS, EN PEDAZOS, CUBIERTAS DE MUCOSIDADES ESPESAS.

Esto se encuentra a menudo en individuos que abusan de laxantes (nux vom.) o en niños; también en el tratamiento de la constipación de embarazadas, que va acompañada de dolores de cabeza y hemorroides; conviene sobre todo en el tratamiento de la constipación de cancerígenos que presentan los signos gástricos y hepáticos descriptos. (Nebel).

Diarrea que obliga a levantarse a las 7 de la mañana (sulph.); deposiciones acuosas y amarillas; tenesmo, a veces mezcladas con sangre; deposición diarreica cuya primera parte es normal y la segunda blanda y negruzca.

Aparato urinario

Orina de olor fuerte, ya abundante, ya espesa.

Viejas cistitis en que la orina es espesa, cargada de mucosidades espesas, fibrosas.

Órganos genitales

MASCULINOS :

Secreción uretral, espesa, amarillenta, pegajosa y viscosa, indolora.

FEMENINOS :

Congestión uterina con leucorrea espesa, amarilla, viscosa, que corre del cuello en largos filamentos (kali bich.).

Leucorrea continua, peor después de reglas, abundante, amarillenta, viscosa, pegajosa, fibrosa, corrosiva, con prurito vulvar; inflamación y ulceración de cuello.

Tumores indurados de seno, con dolores vivos, ardientes, como cuchilladas.

Fisura y excoriaciones de pezones.

Aparato respiratorio

NARIZ :

Sensación de obstrucción nasal, con mucus espeso, amarillento, adherente.

Coriza más marcado al aire libre; sensación de nariz obstruida en habitación caliente.

Secreción espesa y excoriante.

Secreción de mucus espeso y adherente, por las fosas nasales posteriores en la faringe.

LARINGE, TRAQUEA, BRONQUIOS :

Catarro crónico de laringe, tráquea y bronquios, con secreción de mucosidades adherentes, viscosas, amarillentas, características del remedio.

Ronquera con sensación dolorosa en laringe, tos seca, dura, penosa, provocada por presión del dedo en fosa supra esternal (rumex) siempre seguida de expectoración amarillenta, a veces blancuzca, pero siempre adherente y viscosa.

Bronquitis crónica en sujetos de edad, enflaquecidos, agotados, con expectoración de mucus amarillento, viscoso, tenaz.

Piel

Amarillenta, terrosa, malsana, que se excoria fácil, supurando con la misma facilidad que hep. sulf.

Tendencia a transpirar abundantemente, particularmente en partes genitales, y pliegues del codo.

Ulceraciones, lupus, formaciones cancerosas.

Espalda y extremidades

Dolores reumatoides en masas musculares como por acción nociva del aire frío.

Dolores reumáticos en músculos del costado izquierdo del cuello que irradian el hombro del mismo lado.

Debilidad y rigidez de espalda que obliga a caminar doblado en dos, se alivia por movimiento.

HYOSCYAMUS NIGER

Hyoscyamus niger o beleño negro, planta herbácea de la familia de las solanáceas, crece entre escombros, en terrenos incultos, secos, al borde de caminos.

Su tallo, hojas, flores son viscosos al tacto y exhalan olor fétido y nauseabundo; su sabor también es un poco nauseoso.

Encierra un alcaloide, la hyoscyamina, que parece ser su principio activo y tiene acción parecida a la de la atropina.

Empleamos la planta entera recolectada en el momento de la floración para preparar la tintura madre, con la que obtenemos, por diluciones sucesivas, las diversas dinamizaciones.

Acción general del medicamento

Hyoscyamus actúa electivamente sobre EL CEREBRO, engendrando, como consecuencia, una sucesión de efectos que, en cada órgano, se descomponen en una serie de síntomas que se manifiestan en tres grados de intensidad; primero, excitación con espasmos; luego astenia con congestiones, resultado de estancamiento de sangre en capilares; en fin, parálisis que termina en coma.

Por eso produce en el desarrollo de su acción una serie de síntomas en apariencia opuestos : constipación e incontinencia de orina, amenorrea y menorragia, insomnio y somnolencia, convulsiones y parálisis, etc., que son el resultado de la impresión cada vez más fuerte del veneno en el organismo. (Espanet).

Características

1) CONSTITUCIÓN Y TIPO : El beleño desarrolla particularmente bien su acción en individuos de temperamento sanguíneo, nerviosos, irritables.

2) DELIRIO AGUDO CON EXCITACIÓN QUE ALTERNA CON ABATIMIENTO O QUE SE SUAVIZA, PARA DAR LUGAR A ESTADO DE INCONSCIENCIA Y POSTRACIÓN COMPLETAS : Puede haber al principio, delirio violento por accesos; pero pronto se suaviza, los ataques de violencia se hacen más espaciados y el abatimiento aumenta hasta inconsciencia total, a tal punto que se hace difícil elegir entre él y opium.

En bell. la violencia predomina, el estupor es la excepción, la cara está roja e inyectada, mientras que en hyosc., es pálida, hundida; en stram., el delirio es de violencia inaudita, y no se le puede confundir con ninguno; en hyosc.

EL DELIRIO ES ENTRECORTADO POR PERIODOS DE ABATIMIENTO.

Los síntomas tifoideos llegan pronto : lengua seca y perezosa; enfermo inconsciente, recoge las frazadas balbuceando confusamente; maxilar inferior caído y dientes cubiertos por capa pultácea, seca; incontinencia de orina y materia; pulso rápido; cuando se lo interroga responde lentamente, sus respuestas no tienen ninguna relación con las preguntas.

Con esta debilidad y postración puede haber sacudidas musculares, a veces poco acusadas, simples sacudidas fibrilares, pero que son una característica del remedio.

3) CONTRACCIONES, ESPASMOS MUSCULARES, CONVULSIONES : Cada músculo del cuerpo se contrae por sacudidas, desde los de los ojos, hasta los de los dedos de los pies; estos espasmos son más bien clónicos que tónicos, parecidos a los de nux vom., y strychn.; no son tan violentos como en cic. vir.

Sacudidas musculares, afecciones espasmódicas, generalmente acompañadas de delirio.

Hyosc. está lleno de convulsiones, contracciones, sacudidas musculares.

Convulsiones muy violentas en sujetos vigorosos; convulsiones que afectan todo el organismo, con desmayos, de noche; convulsiones en mujeres, en el momento de las reglas.

Convulsiones localizadas en un estado tífico con postración marcada, movimientos clónicos; carfología, rascado de cualquier cosa durante el delirio.

Debilidad que aumenta progresivamente, ya sea un caso de fiebre grave continua, con delirio, o un caso de locura con gran eretismo nervioso, agitación muscular.

La mezcla de sacudidas, contracciones musculares, estado convulsivo y debilidad, postración, es un rasgo marcado del remedio.

Convulsiones en niños sea o continuación de un susto, después de haber comido; después de haber comido vomita y tiene convulsiones.

Grita, se pone insensible y desvanece.

Convulsión durante el sueño.

Convulsiones puerperales, ataques de sofocación y convulsiones durante el parto.

Calambres espasmódicos en dedos grandes de los pies (Kent).

4) MANÍA CRÓNICA : La manía de hyosc. es sobre todo la que se instala después de enfermedad aguda.

Presenta grandes síntomas característicos : DESCONFIANZA, no quiere tomar remedios por miedo a que lo envenenen; CELOS, que pueden ser causa originaria o al menos determinante de su mal; LASCIVIDAD, sobre todo; hyosc. es el primero de los remedios para esta forma de locura.

El maniático de hyosc., ES GENERALMENTE DÉBIL, tanto que se adapta muy bien a las manías causadas por achaques de la edad.

Modalidades

Agravación

DE NOCHE; ESTANDO ACOSTADO.

Durante las reglas.

Después de haber comido.

Mejoría

Al inclinarse; permaneciendo inclinado hacia adelante.

Síntomas mentales

Los síntomas mentales son verdaderamente la parte más importante del remedio.

SISTEMA NERVIOSO DEBILITADO, DEPRIMIDO, NO PUEDE DIRIGIR SUSPENSAMIENTOS; FALTA DE CONTROL EN LOS GESTOS; ESPÍRITU DESORDENADO, MOVIMIENTOS DESEQUILIBRADOS.

Cuando este estado es muy marcado, la confusión mental aparece con agitación, delirio y alucinaciones, manías y vesanias; crisis convulsivas estallan y estos paroxismos nerviosos o musculares se resuelven finalmente en un estado de inconsciencia profunda.

DEBILIDAD Y FATIGA NERVIOSA DESPUÉS DE LARGOS TRABAJOS O

INQUIETUDES PROLONGADAS; viejos cuya resistencia nerviosa ha sido minada por preocupaciones por reveses de fortuna, o por trabajos penosos a que han estado sometidos en el último período de su vida para los cuales no estaban preparados.

Están "fatigados" nerviosamente, les cuesta concentrar sus ideas, encontrar sus ideas, encontrar las palabras.

AL HABLAR NO PUEDE ENCONTRAR LA PALABRA APROPIADA, EL TÉRMINO EXACTO, PARA EXPRESAR SU PENSAMIENTO, CONFUSIÓN MENTAL EN PERSONAS VIEJAS QUE SE MANIFIESTA POR EXCITACIÓN incoherente y por profunda postración alternadas.

DE CARÁCTER DESCONFIADO, CELOSO, fácilmente PENDENCIERO.

Gruñe contra todo el mundo y este estado de irritación recelosa, es mantenido por FOBIAS, en que tiene miedo de estar solo, de ser mordido, de comer o beber, o tomar remedios por miedo a ser envenenado.

DELIRIO CON EXCITACIÓN, QUE ALTERNA CON ABATIMIENTO, mientras en bell. predomina la violencia y el estupor es la excepción, pasa lo contrario con hyosc. : el estupor, con balbuceos es muy acusado, con accesos de violencia de vez en cuando.

DELIRIO PASIVO, ALUCINACIONES, CHARLA DELIRANTE; sale de su estupor parahablar en forma delirante y luego vuelve a caer en su estado de estupidez.

Durante el sueño, habla, grita, dice discursos; luego se despierta y mientras está despierto, delirio, alucinaciones e ilusiones alternan, mezclados; a veces está en estado de alucinación, y toma sus alucinaciones como cosa verdadera; otras en estado de ilusión, y se da cuenta de que sus imaginaciones son falsas.

ESTADOS ALTERNANTES DURANTE SU DELIRIO : durante un momento, delira suavemente, luego se enoja, se agita, recae en la estupidez.

El delirio que se ve en estados típicos del remedio aumenta progresivamente hacia un estado de estupor profundo, cada vez más profundo, más pasivo, hasta que se vuelve completamente insensible y cae en insensibilidad completa de la que ya no se le puede sacar; está extendido, balbucea cosas incomprensibles, araña sus sábanas; no comprende aparentemente nada de lo que pasa a su alrededor hace movimientos pasivos (sacudidas musculares, contracciones fibrilares, movimientos inconscientes), se habla a sí mismo, lanzando de vez en cuando un grito agudo; retuerce sus dedos, los mueve como para asir algo; recoge sus frazadas, estruja su camisón, araña todo lo que puede asir; o trata de asir en el aire cosas invisibles, como si atrapa moscas; este delirio pasivo continua hasta que recae en profunda estupidez.

En un loco el delirio puede a veces ser violento, pero no a menudo; es más bien un delirio pasivo durante el cual charla, habla; queda sentado en un rincón, sin hacer ninguna otra cosa que parlotear, o se acuesta, o se agita; trata en su espíritu de continuar sus ocupaciones habituales o profesionales; habla de ellas, continúa hablando de sus negocios, es un delirio "ocupado" (Kent).

Divagación, delirio, burlonería, gestos ridículos, risa y cháchara insensata.

Alucinaciones : ve toda clase de cosas indescriptibles; imagina toda clase de cosas con respecto a los que lo rodean y a sí mismo.

SE VUELVE DESCONFIADO y la desconfianza puede apoderarse de él durante una enfermedad aguda o en un ataque de desorden mental; desconfía de todo el mundo, sospecha que su mujer le es infiel; que lo quiere envenenar, rechaza los remedios que le presentan PORQUE TIENE MIEDO DE SER ENVENENADO; por este miedo de ser envenenado, se lo puede comparar a kali brom., lach., plumbum, rhus tox., se siente perseguido, que la gente conspira contra él, que ya no tiene amigos.

También MANTIENE CONVERSACIONES CON SERES IMAGINARIOS; imagina que alguien está sentado a su lado y le conversa, le habla como si realmente estuviera allí; a veces habla con personas que han muerto, pues cree que han vuelto y con las cuales conversa como si estuvieran allí (Kent).

En su delirio, no puede sacar su vista de la tapicería, no puede dejar de ordenar los dibujos.

A veces imagina, que son gusanos, insectos, ratones, gatos y que los lleva como un niño a sus juguetes (Kent).

Imagina estar en otro lugar que el que realmente está; ve personas que no están allí.

Tiene MIEDO DE ESTAR SOLO, AL AGUA, está inquieto, angustiado al oír correr el agua. (bell., canth., stram., hydroph.).

QUIERE DESNUDARSE, DESVESTIRSE.

AL PRINCIPIO ESTA NECESIDAD DE ESTAR DESNUDO, responde a hipersensibilidad de las terminaciones de los nervios sensitivos de la piel y es tal que no puede soportar la ropa.

Esto tiene lugar en locura y delirio de enfermedades febriles, no le preocupa exponerse sin ropa, no tiene idea de hacer nada inusitado e impúdico; actúa así a causa de LA HIPERESTESIA DE SU PIEL.

Pero puede hacerlo también por LASCIVIA; puede, en efecto, ser EXTREMADAMENTE LUBRICO, lascivo, tener excitación sexual extremadamente violenta y de la que cuesta, a veces, darse una idea; esta locura erótica, lasciva, recuerda a canth., lach., phosph., platina; violenta excitación sexual, erotomanía, ninfomanía, discursos obscenos, lúbricos, escatológicos.

Violento, trata de golpear, morder; habla con precipitación, canta; locura erótica, con celos violentos.

Locura lúbrica durante la cual canta canciones groseras y pornográficas; se desnuda y quiere exhibir sus órganos genitales. (Kent).

Sueños

Somnolencia como coma vigil o insomnio externo con sobreexcitación nerviosa.

El sueño es causa de grandes tribulaciones para este enfermo nervioso.

Tiene períodos de insomnio, seguidos de sueño constante; está sin sueño o tiene deseos de dormir sin cesar.

Durante el sueño, balbucea.

Largos períodos de insomnio completo y continuo sueños lúbricos; pesadillas, súbitamente despierta, se sienta bruscamente en la cama y mira a su alrededor, buscando si las cosas horribles que veía durante sus pesadillas son reales.

Pasea sus ojos por la pieza, no ve nada, vuelve a acostarse y duerme.

Hace esto varias veces en la noche.

Despierta sobresaltado, se sobresalta durante el sueño, grita, rechina los dientes, ríe durmiendo y tiembla como si estuviera asustado.

Sopor con convulsiones.

Niños que se agitan durante el sueño y gritan asustados, su cerebro está lleno de sueños que los agitan.

Cabeza

Vértigo como si estuviera intoxicado.

Plétora, congestión de cerebro, con pérdida de conocimiento; balanceo de cabeza de un lado a otro.

Sensación como si el cerebro flotase en el cráneo, sobre todo caminando.

Ojos

Rojos, fijos, convulsivos, prominentes.

Pupilas dilatadas, espasmos de músculos de los ojos Estrabismo.

Diplopia.

Los enfermos que acaban de tener una fiebre grave de forma tifoidea con los trastornos cerebrales de hyosc., convulsiones o un ataque de locura como los descriptos, tienen trastornos en la musculatura del ojo.

Tensión espasmódica de ciertos grupos de músculos y parálisis de otros.

Queda una tendencia a debilidad muscular, trastornos de vista, congestión de retina.

Oscurecimiento de vista.

Ceguera nocturna, estrabismo.

Diplopia.

Pupilas dilatadas e insensibles a la luz; a veces contraídas pero la dilatación más corriente.

Temblor de párpados; sacudidas de párpados; sacudidas espasmódicas de músculos del ojo a tal punto que el globo se mueve.

Todos estos síntomas se encuentran sea durante la fiebre, sea después; también después de convulsiones.

Los objetos que mira, parecen saltar; cuando lee, las letras se mueven (Kent).

Cara

Pálida y hundida, y no roja e hinchada como bell.

Pupilas dilatadas, fijas, mirada vaga, los rasgos tienen aspecto de estupidez.

En casos de postración profunda y gran debilidad, maxilar caído.

Aparato digestivo

BOCA Y FARINGE :

Boca extremadamente SECA, como LA LENGUA, que da la impresión de un pedazo de cuero; LENGUA SECA, MARRÓN, AGRIETADA, DURA, RESQUEBRAJADA; rígida, difícilmente se mueve, no puede sacarla sino con gran dificultad, tiembla como lach. cuando la quiere sacar.

Se pega a los dientes por su gran sequedad; maxilar inferior caído, relajado, boca muy abierta; palabra dificultosa.

Dientes cubiertos de fuliginosidades.

En ciertos casos aprieta los dientes y es muy difícil hacerle abrir la boca.

Rechina los dientes.

Músculos de lengua y faringe paralizados; músculos de deglución paralizados, no pueden ya cumplir su función; NO PUEDE TRAGAR LÍQUIDOS; le salen por la nariz; trata de tragar agua, el ruido del agua corriente, la vista del agua, provocan contracción espasmódica en faringe y esófago.

ESTÓMAGO :

SED INEXTINGUIBLE; AVERSIÓN POR EL AGUA, aunque sediento no quiere beber por las contracciones faríngeas que provocan los líquidos.

Bulimia.

HIPO, particularmente después de las comidas.

Eructos, náuseas con vértigos, vómitos con convulsiones.

Sensación de ardor en el estómago, violentos calambres en el estómago, mejorados por vómitos.

Epigastrio sensible.

Sensación de distensión de estómago.

Grandes dolores de estómago.

ABDOMEN Y DEPOSICIONES :

Distensión abdominal; cólicos como si el abdomen fuera a estallar; timpanismo; abdomen doloroso, como magullado; no se puede palpar, tocar; sólo se puede dar vuelta el enfermo muy lentamente, con muchas precauciones.

Dolores cortantes en el abdomen.

Constipación por debilidad intestinal.

Deseos frecuentes de evacuar, con deposiciones poco abundantes y escasas.

Deposiciones involuntarias por parálisis de esfínter anal, indoloras; acuosas; deposiciones involuntarias con estado de delirio triste.

Aparato urinario

Retención de orina; deseos frecuentes de orinar con escozor poco abundante.

Emisión involuntaria de orina por parálisis de esfínter vesical.

Órganos genitales

MASCULINOS :

Exaltación violenta de apetito venéreo; lascivia; y a pesar de ello, generalmente impotencia.

FEMENINOS :

También hay exaltación violenta del apetito venéreo; deseos sexuales violentos; sólo se manifiestan generalmente durante la exaltación cerebral.

Antes de reglas, espasmos histéricos.

Reglas poco abundantes, durante su curso, movimientos convulsivos, pérdida de orina y sudor, a veces amenorragia.

Aparato respiratorio

Constricción de laringe.

Abundantes mucosidades en laringe y bronquios, que producen ronquera, congestión seca e inflamada.

Palabra difícil; afonía histérica.

TOS SECA, ESPASMÓDICA, DE NOCHE; PEOR ACOSTADO, MEJOR SENTÁNDOSE; CONCOSQUILLEO EN LA GARGANTA COMO SI LA CAMPANILLA FUERA DEMASIADO LARGA.

Esta tos espasmódica nocturna es característica del remedio; pero se debe distinguir de bell., dros., trifol., prat.

Tos peor al aire libre frío.

Y DESPUÉS DE HABER COMIDO O BEBIDO.

Tos en ataques agotadores, que duran a veces hasta que se cubre de sudor; se inclina hacia adelante para tener un poco de alivio y tose hasta que no puede más.

Tos histérica.

Accesos de sofocación : respiración espasmódica, difícil, por espasmos del pecho.

Espalda y extremidades

Gran agitación de miembros; se mueve sin cesar.

Corea.

Sobresalto de tendones.

Convulsiones.

Espasmos epileptiformes.

Sacudidas musculares.

Sobresaltos frecuentes de músculos de manos y pies.

Contractura de miembros.

Calambres en pantorrillas y muslos.

Carfología.

Debilidad parálitica de miembros.

Piel

Piel seca y áspera.

Manchas marrones en el cuerpo.

Petequias.

Pústulas semejantes a viruela.

Fiebre

Fiebre adinámica, estado de estupor.

Frío en todo el cuerpo con calor en la cara.

Sudores frecuentes y abundantes.

Relaciones

Antídotos

Bell., camph.

HYPERICUM

Hypericum perforatum, "hierba de los pinchazos", hierba de SAN JUAN o Mil agujeros, así nombrada por las numerosas perforaciones que parecen ocupar toda la superficie de las hojas cuando se las mira por transparencia y que se deben a glándulas diseminadas en su interior.

Planta vivaz, crece en colinas, lugares secos, a la orilla de bosques, al borde de caminos, en campos sin cultivar.

Preparamos la tintura madre por maceración en alcohol a 90º de la planta entera, recolectada en el momento de su floración.

Acción general del medicamento

Hypericum es A LESIONES DEL SISTEMA NERVIOSO, lo que aña a lesiones de sistema muscular.

Las heridas de regiones ricas en nervios, particularmente dedos, matriz de uñas, heridas expuestas y dolorosas, con agotamiento general por gran pérdida de sangre y postración nerviosa, heridas con desgarraduras anchas, son su esfera principal.

Ocupa el mismo lugar en laceración de tejidos que aña en contusión.

Característica y Patogenesia

Cuando después de herida o traumatismo que interesa una región del organismo rica en terminaciones nerviosas sensitivas : dedos, raíz de uñas, planta de pies o palma de manos, aparecen dolores intolerables que muestran que los nervios están seriamente afectados, hyper. es el remedio.

Cuando la punta de los dedos ha sido aplastada o fuertemente golpeada, cuando una uña ha sido arrancada, o un nervio, en cualquier lugar de su trayecto, aplastado por traumatismo en plano subyacente, huesos largos por ej., cuando el dolor sigue al trayecto del nervio, que se ha inflamado; cuando se extiende en puntadas dolorosas desde la herida o traumatismo, hasta la raíz del miembro o nervio, hyper. es, por sobre todos, el remedio en que habrá que pensar (Kent).

DOLORES PUNZANTES, PUNTADAS INTOLERANTES A LO LARGO DEL TRAYECTO DE UN NERVIIO, DESPUÉS DE HERIDA QUE LO HAYA INTERESADO.

Esto se puede encontrar después de herida por instrumento punzante que ha lesionado el nervio; el diagnóstico de elección debe hacerse con led. pal.

Si un sujeto ha pisado un clavo, si se ha clavado una astilla, si ha sido mordido por rata, gato, perro, debe darse inmediatamente ledum, los dolores punzantes y la inflamación del nervio pueden ser evitados; si le queda un dolor sordo en la herida, daremos ledum; pero si el dolor punzante, si las puntadas dolorosas suben a lo largo del nervio, hypericum es el remedio. (Kent).

Los traumatismos DE MEDULA ESPINAL nos dan otra serie de afecciones que piden hyperic.

Por ej. después de caída sobre el coxis, sólo se encuentran al principio los síntomas que la contusión ha provocado en el lugar golpeado, al apretarle; pero el enfermo se queja DE DOLORES PUNZANTES A LO LARGO DE COLUMNA VERTEBRAL, o que irradian a miembros, pudiendo coincidir con convulsiones : he aquí un cuadro de hyperic.

Un hombre resbala al descender una escalera, cae hacia atrás y se golpea violentamente la columna vertebral contra un escalón : he aquí un caso en que hay que dar hyperic. y no arnica (Kent).

Otra indicación : una antigua cicatriz es traumatizada : golpeada, aplastada, los tejidos que cubre se lesionan interiormente; sobrevienen entonces dolores ardientes, punzantes, escozor, que van hacia la raíz de los miembros, siguiendo los trayectos nerviosos, de la periferia al centro; hyperic. debe ser, en este caso, el remedio elegido (Kent). Dolor de cabeza; después de caída sobre el occipucio, sensación como si estuviera elevado en el aire, y angustia de que lo dejen caer. (Allen).

Relaciones

Comparar

Arnica, staphis., calend., ruta, rhus tox.

IGNATIA

Ignatia Amara o Haba de San Ignacio, es la semilla de Strychnos ignatia, enredadera que crece en Filipinas, Cochinchina y todo el Extremo Oriente.

Tiene el grosor de una avellana, es angulosa, irregular, dura como piedra; cada fruto contiene de 20 a 24.

Su acción se debe a sus dos principales alcaloides : estricnina y brucina.

Obtenemos la tintura madre con la que preparamos las diferentes dinamizaciones homeopáticas haciendo macerar en alcohol las semillas previamente trituradas.

Acción general del medicamento

Ignatia actúa sobre conjunto de sistema nervioso, pero sobre todo SOBRE BULBO Y MEDULA ESPINAL.

Veneno tetanizante por excelencia; IRRITA LA EXCITABILIDAD DE CENTROS BULBO-MEDULARES y la exalta a tal punto que toda excitación periférica física o moral provoca por vía refleja ESPASMOS Y CONVULSIONES VIOLENTAS a los cuales sucede RESOLUCIÓN MUSCULAR, índice de extinción de excitabilidad refleja.

Su influencia sobre EL CEREBRO EXALTA dolorosamente LA IMPRESIONABILIDAD DE ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS, particularmente vista y oído.

Extendiendo su acción a SISTEMA SIMPÁTICO engendra, siempre por vía refleja, ESPASMOS EN TODOS LOS MÚSCULOS DE FIBRAS LISAS; pero éstos son menos atacados cuanto más alejadas están las terminaciones nerviosas que los animan de los nervios espinales (Espanet).

Ignat. produce HIPERESTESIA MARCADA DE TODOS LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS CON TENDENCIA NO MENOS MARCADA A ESPASMOS CRÓNICOS.

Desde el punto de vista mental, el factor EMOCIÓN es primordial.

Ignat. DESTRUYA LA ARMONÍA DE ACCIÓN ENTRE LAS DIFERENTES PARTES DEL ORGANISMO Y TRASTORNA LA COORDINACIÓN DE SUS FUNCIONES.

Características

1) CONSTITUCIÓN Y TEMPERAMENTO : Se adapta especialmente A MUJERES E INDIVIDUOS DE TIPO FEMENINO, DE CABELLO NEGRO Y COMPLEXIÓN GENERAL MOROCHA.

CARA GENERALMENTE PÁLIDA, ENFERMIZA, TRASTORNADA Y CONVULSIVA, CUANDO REFLEJA DESORDEN DE IMPRESIONES INTERNAS del sujeto, que es excesivamente NERVIOSO, SENSIBLE Y

FÁCILMENTE EXCITABLE; vivo en sus percepciones, rápido en la ejecución y DE HUMOR

EXTREMADAMENTE CAMBIANTE; carácter suave pero fácilmente irritable.

ESTE CARÁCTER COMO TODO EN ignatia ES PARADOJAL : si tiene fiebre, sólo tendrá sed en el momento del escalofrío; sus puntadas en el costado sólo calmarán por tos, etc. ...

Oscila en una inestabilidad perpetua de llanto a risa, de alegría a tristeza, sus dolores no se localizan netamente; sin estar encolerizada ni precipitada, es de una impresionabilidad y susceptibilidad sin medida; se ofende por nada, se concentra en sí misma, se aísla para llorar, para rumiar su pena a la que exagera y se complace en hacer un pequeño drama interior con grandes sollozos y suspiros.

A veces, el sistema motor es más atacado que la sensibilidad : entonces tiene manifestaciones fuera de lugar : ríe a carcajadas en un entierro, tiene cóleras súbitas o incomprensibles o se abate presa de ataque de nervios.

2) EXTREMA IRRITABILIDAD Y GRAN HIPERESTESIA : Como nux vom. a la que se parece en tantos puntos, ignat. EXALTA PROFUNDAMENTE LA EXCITABILIDAD DEL SENSORIO, LA IRRITABILIDAD DE PERCEPCIÓN DE TODOS LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS.

Como nux vom., siempre, MONTA FÁCILMENTE EN CÓLERA.

Esto explica que, como acon., cham., Y coffea, sea TAN SENSIBLE AL DOLOR.

ES EXTREMADAMENTE SENSIBLE EN LO MORAL y esto nos conduce a la siguiente característica del remedio.

3) MALOS EFECTOS DE EMOCIONES Y PENAS : Por su extrema impresionabilidad, se emociona fácilmente, cualquier cosa lo asusta.

Por eso es uno de nuestros mejores medicamentos contra malos efectos de emociones, penas, miedo, y rivaliza en malos efectos del miedo con acon., opium, y ver. alb.

Fuertemente impresionado por su pena, cualquiera sea, tiene tendencia marcada a pensar en ella sin cesar, presentando como característica síntomas morales de melancolía y tristeza.

4) HUMOR TRISTE, APENADO, MELANCOLICO : GRAN TRISTEZA Y MARCADA DISPOSICIÓN A APENARSE EN SILENCIO.

Esto es consecuencia de su hipersensibilidad moral que mientras en nux vom. se traduce en irritación y tendencia a lágrimas, el primero sintetiza mejor la reacción más enérgica, más varonil, más impetuosamente violenta del hombre; los síntomas morales de ignat. son los de un ser más sensible y propenso a lágrimas : nux vom., esquematiza en su conjunto al tipo de hombre nervioso; ignat. nos describe a la mujer nerviosa.

SUFRE POR PENA ESCONDIDA, CON GRANDES SUSPIROS Y TENDENCIA MARCADA A LAGRIMAS; MELANCOLÍA, DE HUMOR FÚNEBRE SOBRE TODO ESCONDE SU PENA, DESEA ESTAR SOLA CON SUS PENSAMIENTOS; PARECE TRISTE, FATIGADA, DESHECHA POR PREOCUPACIONES; SUSPIRA MUCHO Y PROFUNDAMENTE Y POR UNA PEQUEÑEZ, SUS OJOS SE EMPAÑAN DE LAGRIMAS; DE HUMOR EXTREMADAMENTE CAMBIANTE, PASA DEMASIADO FÁCILMENTE DE RISA A LAGRIMAS O VICEVERSA.

5) EXTREMA VARIABILIDAD DE SÍNTOMAS, QUE SON MUY CONTRADICTORIOS : En ignat., no sólo el humor es cambiante, sino que todos los síntomas están llenos de contradicciones.

Así, tanto está triste, como alegre, alternativamente; sin razones aparentes, llena de melancolía, luego alegría; su cefalea cambiará rápidamente de lugar, o sobrevendrá gradualmente para desaparecer bruscamente, o aparecerá y desaparecerá bruscamente, etc.

Muchos síntomas de ignatia son contradictorios : fiebre sin sed : dolor de garganta que se alivia al tragar; a pesar de su hipersensibilidad, los dolores se alivian por presión; la cefalea poniendo la cabeza baja; los escalofríos destapándose; los zumbidos de oídos por música; las hemorroides caminando; la sensación de vacío en el estómago no mejora comiendo.

6) SE SIENTE VACÍA, ABATIDA, DÉBIL : SIENTE LA DEBILIDAD HABITUALMENTE EN BOCA DEL ESTÓMAGO : Esta sensación de vacío, de desfallecimiento en boca del estómago, es común a muchos remedios : en ignat. NO ESTA EN CONEXIÓN CON TRASTORNOS DE DIGESTIÓN, SINO QUE ES MANIFESTACIÓN PURAMENTE NERVIOSA, A VECES LIGADA A TRASTORNOS HISTERALGICOS DE MATRIZ, que presenta entonces estado irritable como el sistema nervioso.

En Sepia, la sensación de vacío, desfallecimiento, está en conexión con estasis de órganos y postración general; phosph., tiene de manera marcada esta sensación de vacío en boca del estómago, pero se extiende a todo el abdomen y se agrava de noche : se debe levantar para comer algo; también hay que comparar aquí hydrast., iodum, china, cina, lycop., y sulph.

Citemos otros dos síntomas bastante generales como para ser considerados característicos : s) AVERSIÓN POR TABACO.

Basta con el humo de tabaco para incomodarlo o agravar sus síntomas; en esto ignat. se parece a ab. nig., coc. ind., gels., nux vom., staphi., ETC.

b) EL DOLOR SE LOCALIZA EN PEQUEÑOS LUGARES (kali bich. ox. ac., etc.).

Modalidades

Lateralidad

Principalmente derecha.

Agravación

Por penas o emociones; a la mañana.

Al aire libre, por frío.

Por olores violentos.

Después de las comidas, por café, por tabaco.

Mejoría

Por calor.

Por presión fuerte, al pasear.

Por cambio de posición.

Síntomas mentales

TRISTE, MELANCÓLICA, LLOROSA; LANZA PROFUNDOS SUSPIROS; RECONCENTRADA EN SI MISMA, RUMIANDO SUS PENSAMIENTOS Y PENAS.

CONSECUENCIAS DE PENA, EMOCIÓN, SACUDIDA MORAL.

Puls. es también de humor triste, melancólico, se apena fácilmente, pero no tiene el carácter reconcentrado de ignat.; al contrario, tímida y suave, busca la simpatía y cuenta su pena a todo el mundo para que la compadezcan.

Nat. mur. también tiene carácter melancólico, propenso a tristeza, con gran tendencia a llorar, como ignat. y puls., pero su característica es que si tratan de consolarla, las lágrimas corren más abundantemente.

En lugar de apaciguarla el consuelo la irrita.

Amb. gris. : lleno de gran melancolía, con gran debilidad y profundo deseo de estar solo; la música aumenta esta tristeza y lo hace llorar.

Caust. : lleno de gran tristeza melancólica; tiene las lágrimas fáciles, ve todo negro, tiene excesiva simpatía por los demás y teme que les suceda una desgracia.

En cuanto a trastornos provocados por choque moral, ignat. se coloca al lado de : nat. mur.; phosph. ac., etc., por mala noticia gran desilusión, violenta cólera : acon., cham., puls., nux vom., staph.; por miedo, temor : acon., gels., opium; por alegría, coffea, caust.; por celos lach., apis., hyosc., staph.

Ignat. es DE HUMOR MUY CAMBIANTE, ríe tan fácilmente como llora, pudiendo llegar a histeria.

En concordancia con ignat PARA ESTADOS HISTÉRICOS, encontramos : Platina : indicada en mujeres histéricas con manía violenta, o humor altanero arrogante; hyosc., cuando la enferma es muy celosa, muy recelosa; teme ser envenenada y rechaza remedios y alimento.

Cimic. cuyos trastornos nerviosos, a menudo de carácter histérico, van acompañados generalmente por trastornos uterinos, irregularidades menstruales.

Asa foet. : bola histérica como ignat.; gases en el abdomen que comprimen los pulmones y producen disnea; especialmente útil en convulsiones histéricas por supresión mal hecha o a destiempo de secreciones orgánicas; moschus conviene cuando la enferma desfallece fácilmente; valer., en nerviosas que tienen cefalea al menor ejercicio, sufren también de pseudo reumatismo, peor estando sentadas y mejorando al caminar.

Bell. es el remedio de los estados histéricos, cuando la enferma es violenta, tiene ataques salvajes, con cara roja; coffea, etc. ...

Precipitación ansiosa; temores imaginarios por su salud.

Sueño

Insomnio después de contrariedades, preocupaciones con muchos bostezos.

Sueño no reparador, turbado por gran agitación, por necesidad continua de cambiar de lugar; estremecimientos en miembros; pesadillas, sueños tristes o terroríficos que dejan fuerte impresión después de despertar.

Cabeza

Sensible, pesada.

Dolor de cabeza, sobre todo en nerviosos, histéricos : CEFALEA DE UN SOLO LADO DE LA CABEZA MUY LOCALIZADA, COMO SI TUVIERA UN CLAVO HUNDIDO DE ADENTRO A AFUERA, (agar, coffea, nux vom., thuya, etc.) MEJORADA ACOSTÁNDOSE DEL LADO ENFERMO, CON SENSACIÓN DE PESADEZ, DE PLENITUD EN LA CABEZA, COMO SI ESTUVIERA CONGESTIONADA; MEJORADA AL INCLINAR LA CABEZA DE ARRIBA A ABAJO; A VECES SE AGRAVA BAJÁNDOLA, LO QUE ES UN EFECTO ALTERNANTE.

Círculo histérico alrededor de la cabeza; casco de los neurasténicos.

Todo pequeño trabajo mental más intenso o fastidioso que lo habitual, todo olor fuerte, agradable o no, toda emoción aún ligera, que cualquier persona cuyo sistema nervioso sea normal, soportará fácilmente, puede traerle dolor de cabeza.

La cefalea se agrava por café, tabaco, alcohol, esfuerzo alevacuar, volver súbitamente la cabeza, cambiar de posición, correr, mirar un poco largamente arriba, mover los ojos, por ruido, luz; a veces mejora al comer, pero se agrava enseguida después.

Mejora por calor, presión suave, acostándose sobre el lado enfermo, bajando la cabeza.

A veces, con hambre igual a psor.

A veces termina en vómito, lo más a menudo en emisión de orina clara, como acon., gels., silic., ver. alb.

Cara

Puede presentar alternativas de palidez y enrojecimiento, pero sobre todo se encuentra frecuentemente agitado por TEMBLOR MUSCULAR CONVULSIVO, principalmente en párpados o labios, y también en cualquier otro grupo muscular de esta región.

Se encuentran semejantes contracciones espasmódicas de músculos de cara en agar., ars., cimic., lycop., migale, opium, etc.

Ojos

Movimientos convulsivos de ojos y párpados.

Fotofobia.

Sensación de presión en los ojos como si tuviera arena.

Oídos

Zumbido de oídos.

Sordera excepto para la voz humana.

Aparato digestivo

BOCA :

Labios secos, agrietados, sangrantes.

Contracciones espasmódicas musculares en los labios.

Se muerde fácilmente cara interna de mejillas.

Gusto agrio en la boca : mucus amargo y salivación copiosa.

Dolor de muelas, peor después de beber o fumar, peor también entre comidas, menos doloroso cuando come.

FARINGE :

Sensación como si una bola le subiera de estómago a garganta (bola histérica) sobre todo después de pena, contrariedad, especialmente si tiene deseo de llorar.

SENSACIÓN DE ESPASMO, CONSTRICCIÓN, ACOMPAÑADA DE MUCHA NERVIOSIDAD, QUE DESAPARECE AL TRAGAR SÓLIDOS.

AMÍGDALAS INFLAMADAS E HINCHADAS, CON PEQUEÑAS ULCERACIONES SUPERFICIALES, DE COLOR BLANCO AMARILLENTO.

Ignat. es útil en toda una serie de afecciones de garganta, desde amigdalitis a difteria; su síntoma más característico es que el dolor de garganta mejora al tragar (capsic.) y peor entre degluciones : también hay agravación al tragar líquidos y mejoría al tragar sólidos, (como lach., Y CONTRARIO A bapt.). (Nash).

ESTÓMAGO :

Ya hemos descrito su SENSACIÓN DE VACÍO, DESFALLECIMIENTO, EN BOCA DE ESTÓMAGO, síntoma acompañado por MARCADA DISPOSICIÓN A SUSPIRAR, HACER LARGAS INSPIRACIONES, notemos que, como en ipeca, esta sensación de debilidad es descripta a veces como de FLACIDEZ, como si el estómago colgase, relajado.

Además, puede haber gastralgia, CALAMBRES GÁSTRICOS, PEOR AL MENOR CONTACTO; SENSACIÓN DE CONSTRICCIÓN QUE MEJORA INSPIRANDO PROFUNDAMENTE.

FLATULENCIA.

HIPO agravado al comer o fumar.

REGURGITACIONES ALIVIADAS COMIENDO; hipo, cada vez que bebe o come, agravado por tabaco o café.

Como otros remedios del hipo consultar : acon., amm. mur. : hipo violento, frecuente, a menudo con puntadas al pecho; antim. : hipo particularmente al fumar; arnica, en el que, a veces, basta una dosis para detener inmediatamente el hipo que sigue en ciertos casos, a llanto de los niños.

Bell. : hipo espasmódico a veces seguido por convulsiones; bryon. : hipo aliviado cuando está inmóvil, agravado o provocado en cuanto se mueve un poco; coffea; cuprum : mejora bebiendo agua fría : cyclam : regurgitaciones con hipo sobre todo después de comidas.

Hyosc. : hipo después de la comida; lycop. : hipo violento, en accesos, sobre todo después de las comidas; magn. mur. : después de la comida hipo violento que le deja el estómago doloroso; nat. mur. : Nux vom. : hipos frecuentes y violentos; puls. : hipo frecuente al fumar, después de beber, o de noche, a veces con sofocación, sulph., staph. : hipo frecuente y violento después de comer, con náuseas y aturdimiento, agravados al fumar; stram. : verdadero hipo convulsivo; ver. alb. : hipo a la mañana, mientras fuma, o después de tomar bebidas calientes; a menudo con náuseas y sensación de desfallecimiento y sed intensa (Jahr).

Por supuesto que el hipo no basta para determinar la elección de uno de estos remedios; habrá que buscar las grandes características, "los Keynotes" de cada uno, examinando completamente al enfermo lo que nos decidirá por uno u otro.

La comida puede ser regurgitada : el enfermo vomita durante la noche alimentos que ha comido al atardecer;

TOLERA ALIMENTOS DIFÍCILMENTE SOPORTADOS POR OTROS, como repollo, por ejemplo.

Puede haber AVERSIÓN POR COMIDA SIMPLE; desea alimentos indigestos a los que soporta bien.

INTESTINOS Y DEPOSICIONES :

Cólicos, ventosos.

Borborigmos.

Como nux vom., tiene acción marcada y positiva sobre recto y ano.

HAY PROLAPSO RECTAL marcado (ruta grav.); como nux vom., tiene deseos frecuentes de evacuar, pero en lugar de material fecal, o junto con ella, el recto sale, prolapsado; el sujeto no osa hacer esfuerzos, o sentarse en el inodoro, o una vez sentado, se levanta por temor al prolapso. (Nash).

UN DOLOR ESPASMÓDICO, CONSTRICCIÓN MUY PENOSA, sobrevienen después de la deposición, y durante 1 ó 2 horas.

(Nitr. ac., tiene esto, también después de deposición blanda); DOLORES AGUDOS, PUNZANTES, EN RECTO, DE ABAJO A ARRIBA (ipec., tiene dolores semejantes en útero).

Deposiciones duras con deseos frecuentes de evacuar; la deposición pasa con dificultad y con grandes esfuerzos para ser expulsados.

Aparato urinario

ORINA MUY ABUNDANTE, ACUOSA (phosph. ac.) UNA ABUNDANTE EMISIÓN DE ORINA ES CRÍTICA y termina el dolor de cabeza.

Órganos genitales

Reglas DEMASIADO ADELANTADAS, ABUNDANTES, O AL CONTRARIO, POCO MARCADAS, CADA 10 ó 15 DÍAS, DE SANGRE NEGRA, EN COÁGULOS Y CON MAL OLOR, DURANTE REGLAS, GRAN LANGUIDEZ CON DOLORES ESPASMÓDICOS en estómago y abdomen.

Dolores calambroides en útero, principalmente durante reglas.

Reglas acompañadas por síntomas histéricos, reglas suprimidas por pena.

También, durante reglas, pesadez, calor, y dolores de cabeza, fotofobia, cólicos con dolores contráctiles, ansiedad, palpitaciones y gran fatiga hasta desfallecer (Jahr).

Dismenorrea asociada a cólicos menstruales; dolores de carácter semejante a los de parto; con mucha pesadez en región hipo gástrica; aliviados por presión, posición extendida, cambio de posición.

Leucorrea corrosiva.

Aparato respiratorio

Tos seca, espasmódica, en ataques sucesivos, provocados por sensación semejante a la que produciría una pluma que cosquillease mucosa de garganta y laringe : CUANTO MAS TOSE, MAS AUMENTA EL COSQUILLEO Y MAS DESEO TIENE DE TOSER; LA TOS SE DETIENE POR ESFUERZOS DE VOLUNTAD, aparece a la noche, una vez acostado.

Dificultad para respirar, disnea, opresión con sensación de constricción de pecho.

Espalda y extremidades

Actúa sobre médula, nervios motores, y sensitivos : de ahí su rol en ESPASMOS Y CONVULSIONES.

Es especialmente útil en AFECCIONES ESPASMÓDICAS QUE TIENEN ORIGEN EN CAUSAS MENTALES, como susto, emociones violentas, represión muy violenta en un niño muy sensible; hay CONVULSIONES, SACUDIDAS en todo el cuerpo, por lo que es uno de nuestros mejores medicamentos en COREA, especialmente si es causado por susto o pena, o si es consecuencia de estado reflejo, cuyo origen son vermes, dentición, etc. ...

Sólo hay un remedio que rivaliza con él :Zin. met.; luego vienen agar., hyosc., cuprum, ver. vir.

Ignat. es a veces recomendada en parálisis, pero sólo cuando es histérica.

Piel

Muy sensible a corrientes de aire.

Prurito que se disipa fácilmente al rascar.

Fiebre

Presenta 4 síntomas especiales que la individualizan : a) DURANTE EL ESCALOFRÍO, TIENE MUCHA SED, que desaparece durante los otros estados de la fiebre.

b) Durante el escalofrío la cara está siempre roja.

c) El escalofrío se alivia por calor, contrariamente al denux vom.

d) El calor se agrava abrigándose; nux vom. también debe abrigarse durante este estado de calor, el hecho de descubrirse ligeramente le provoca escalofríos.

Relaciones

Complementarios

Natr. mur.

Incompatibles

Coffea, nux vom., tabac.

Antídotos

Puls., chamom., coccul.

IODUM

Metales que abunda en la naturaleza donde sólo se encuentra en estado de combinación : en el agua del mar, ciertos minerales, yacimientos de nitrato del Perú, en esponjas; pero sobre todo en plantas marinas : algas, fucus. Forma parte integrante de nuestros tejidos y se acumula principalmente en el cuerpo tiroideo.

Se presenta habitualmente en partículas micáceas, de un negro azulado y metálico, brillantes, frágiles; su olor fuerte es característico y su sabor, muy amargo.

Soluble en agua, alcohol, éter, glicerina, cloroformo.

Expuesto al aire se volatiliza fácilmente.

Como el iodo se altera si se mezcla con azúcar de leche, nuestro medicamento homeopático no se prepara por trituración; se hace una tintura madre alcohólica con 20 partes de alcohol puro por 1 de iodo, que sirve de punto de partida para las dinamizaciones sucesivas.

Acción general del medicamento

Iodium tiene sobre el organismo acción muy profunda; alcanza al conjunto de funciones de la vida orgánica atacando a la larga los tejidos de manera tal que llega a DESORGANIZAR EL METABOLISMO CELULAR.

Los enfermos que presentan IODISMO CRÓNICO adelgazan, se vuelven pálidos, débiles, su apetito aumenta, tienen palpitaciones, y depresión.

En casos más serios, el enfermo se queja ya de bulimia, ya de falta de apetito.

En casos todavía más graves pone en evidencia gran adelgazamiento y atrofia marcada de órganos glandulares.

Cara pálida, tez amarillo verdosa, con expresión de ansiedad o tristeza.

Todos estos trastornos nos muestran que el remedio es capaz de ejercer profundas modificaciones sobre el metabolismo orgánico.

Otros autores han constatado además en casos de idiotismo crónico, vómitos y diarrea incesante, dolor agudo en el estómago, lengua cargada, calambres violentos y pequeñas sacudidas musculares repetidas.

Lo que domina todo el cuadro de su acción farmacodinámica es su acción sobre LAS GLÁNDULAS.

Todas las glándulas del organismo están bajo su influencia, pero para Espanet "particularmente las que están en relación por simpatías de orden sexual : testículos, ovarios, glándulas mamarias, tiroides; pueden estar hipertrofiadas, induradas e indoloras, o al contrario, atrofiadas." Lo que más se ha estudiado es la acción de iodo sobre glándula tiroidea, constatando que la sintomatología del iodismo, es un calco de la tirotoxicosis.

Oswald, ha descrito un estado llamado "Iodismo constitucional" en la región de Zurich, que se desarrolla en jóvenes, parecido en todos sus síntomas al bocio exoftálmico.

Hacemos notar que el iodo por una parte, determina la sintomatología del hipertiroidismo, y por otra, es buen medicamento en esta misma afección.

El iodo tiene acción muy marcada sobre SISTEMA LINFÁTICO, cuyos ganglios se hipertrofian e induran, sin ser dolorosos y, para Farrington, esta indolencia es característica de iodium.

Como todos los alógenos, actúa fuertemente sobre MUCOSAS, en las que produce VIVA INFLAMACIÓN; como ellos tiende a producir FORMACIONES PSEUDOMEMBRANOSAS características.

Sobre SISTEMA NERVIOSO, iodium tiene verdadera ACCIÓN CONVULSIVA que parece extenderse a los músculos de extremidades.

Al mismo tiempo que demacrados y descarnados, los enfermos, bajo la influencia de la droga, son ansiosos, deprimidos, temblorosos y la marcha es vacilante e incierta.

Resta mencionar la acción de iodium sobre la piel, en la que determina erupciones urticarias, erupciones purpúricas, con formaciones penfigoideas o bulbosas.

Características

1) CONSTITUCIÓN Y TEMPERAMENTO : Iodium realiza acción estimulante excesiva, sobreexcitación de todos los cambios que hacen del tipo iodium UN OXIGENOIDE cuyas reservas se queman sin cesar. (Dr. Movézy-Fon). Iodium está enflaquecido su cara, alargada, seca, amarillenta; cabello negro.

Sus ojos llaman inmediatamente la atención : prominentes, exoftálmicos, agitados por movimientos perpetuos, esclerótica amarilla : párpados edematizados, animados por temblores; pupilas dilatadas; iris negro u oscuro.

Hay hinchazón de ganglios y glándulas (tiroides).

Encías esponjosas, que sangran fácilmente.

Lengua marrón en el centro y blanca en los bordes.

Salivación abundante y fétida.

Hay aftas en lengua y mucosas de mejillas.

Erupción acnéica con máximo en cara, pecho y hombros. (Dr. M. L. Brissaud).

Parece convenir particularmente a PERSONAS DE COMPLEXIÓN MOROCHA, OJOS Y CABELLO NEGRO. EXACTAMENTE LO OPUESTO DE BROMIUM.

HAN ADELGAZADO, con adelgazamiento que raya en caquexia, A PESAR DE UN APETITO FERROZ, casi verdadera bulimia.

Además NERVIOSOS E IRRITABLES, ANSIOSO Y DESFALLECIDOS.

Diatesis escrofulosa; caquexia profunda con debilidad marcada y gran adelgazamiento.

2) ESTADO PARTICULAR DE ANSIEDAD, A LA VEZ ESPIRITUAL Y CORPORAL, AGRAVADO POR REPOSO : En la mentalidad de iodium domina UN SENTIMIENTO DE APRENSIÓN, DE ANSIEDAD CONSTANTE SI NO ESTA SIEMPRE OCUPADO : por eso parece perpetuamente ocupado pero sin orden en las ideas.

Muy irritable, sujeto a violentos accesos de cólera impulsiva, que pueden llegar hasta necesidad de matar.

SOLO SIENDE APACIGUAR SU TREPIDACIÓN INTERIOR EN EL MOMENTO QUE COME.

En cuanto tiene hambre, los síntomas mentales se exageran; se precipita con furia sobre los alimentos y entonces se siente mejor; pero pronto el hervidero interior que lo atormentaba, lo invade de nuevo, al mismo tiempo que su inquietud recomienza (Dr. Mouézy-Eon).

Este estado de ansiedad parece ALIVIARSE POR ESCALOFRÍO QUE ATRAVIESA TODO EL CUERPO; POR MOVIMIENTO O CAMBIO DE POSICIÓN; ESTA ANSIEDAD TAMBIÉN SOBREVIENTE SI TRATA DE QUEDARSE TRANQUILO y cuanto más trata, más aumenta; mientras duran los esfuerzos para estar tranquilo, es dimanado por impulsos violentos, deseo de matar, de desgarrar objetos, de cometer un asesinato, de dejarse llevar por actos de violencia.

No puede quedar tranquilo; tiene que caminar tanto de día como de noche.

El sujeto de kali iod., tiene igual necesidad de agitación, de movimiento, pero puede cumplir, sin fatiga largas distancias y la marcha parece apaciguar su ansiedad; en iodium, al contrario, HAY FATIGA FÁCIL : se agota por la menor marcha, transpira abundantemente por el menor ejercicio. (Kent).

3) HAMBRE VORAZ : COME A MENUDO Y MUCHO, A PESAR DE LO CUAL ADELGAZA : tiene hambre devoradora, come de buena gana y copiosamente; a pesar de lo cual continúa adelgazando, (abrot., nat. mur., sanic., tubercul.) (Allen).

Sufre de hambre, debe comer sin cesar, está ansiosa e inquieta sino come.

(Cina, sulphur); parece mejor mientras come, y después de haber comido, cuando tiene el estómago lleno (Allen).

4) DOLORS : Dolores profundos, presivos, con LATIDOS, Y AGRAVADOS POR CALOR Y REPOSO, permaneciendo tranquilo iod. es como ars. : ambos necesitan moverse, agitarse cuando sufren, pero mientras ars. presenta dolores ardientes mejorados por aplicaciones calientes, iod. busca al contrario, el fresco y tiene siempre demasiado calor; estas modalidades inversas permiten diferenciar muchos síntomas que tienen en común.

Modalidades

Lateralidad

Izquierda inferior, derecha superior.

Mejoría

a) POR LAS COMIDAS, COMIENDO : hambre profunda, aliviada por comer, a pesar de comer copiosamente adelgaza; la sensación de hambre no es lo único que se alivia comiendo, sino todos los síntomas; en general se siente mejor mientras come. (anacard).

b) AL AIRE LIBRE, HABITACIÓN FRESCA : tiene fácilmente mucho calor, y necesita alre fresco.

Como si le permitiera respirar mejor (puls.).

c) POR MOVIMIENTO, pero lo fatiga pronto.

Agravación

a) EN HABITACIÓN CALIENTE : la permanencia en habitación caliente lo agrava en general.

b) POR REPOSO, salvo los dolores de cabeza que se agravan por movimiento.

c) ACOSTÁNDOSE SOBRE EL LADO DOLOROSO (bar. carb., hep. sulf., kali carb, nux mosch., phosph.).

Síntomas mentales

SOBRE EXCITACIÓN FEBRIL.

NERVIOSO.

INQUIETO, AGITADO, SIEMPRE ATAREADO, NO PUEDE PERMANECER TRANQUILO;

ESTÁ PROFUNDAMENTE ANGUSTIADO CUANDO ESTA EN REPOSO O TIENE HAMBRE; SE AGITA, PORQUE CREE QUE LE VA A SUCEDER ALGO MALO.

El temor corre parejo con la ansiedad, lo que lo mantiene muy propenso a llorar; esto se encuentra en Iodicos muy acentuados.

El estado ansioso, puede manifestarse en una propensión a enojarse por bagatelas; no se puede cerrar una puerta muy fuerte, ni hablar muy fuerte a su alrededor, esto irrita su sensibilidad, lo mismo que una luz muy fuerte; todo esto le da dolor de cabeza, provoca flujo de sangre a la cabeza, con latidos en el cráneo, lo que termina de asustarlo provocándole verdadero terror por congestión de cerebro.

Iod. responde en casos en que les parece que algo espantoso va a suceder.

Se diría que va a perder la razón, que está amenazado de demencia o de las más graves enfermedades como las que se encuentran en las fases avanzadas de la malaria, mal suprimidas o en viejos enfriamientos que arrastran, y cuando hay amenaza de tuberculosis especialmente abdominal.

El estado mental se traduce por excitación, impulsos, ansiedad, melancolía; tiene necesidad de actuar, de apresurarse; y por momentos impulsos violentos, deseo de dejarse llevar a actos de violencia.

Aquí se parece a ars. alb. y hep. sulf. calc. : estos últimos también tienen deseo injustificado de matar, pero lo que los diferencia es la sensibilidad al calor, pues iod. es de sangre caliente, y ars. alb. y hep. sulf., son friolentos.

Los impulsos de iod. son violentos y súbitos : se ve esto en casos de locura impulsiva, en que el enfermo se siente llevado a su pesar a cometer cosas violentas y extrañas, y responde si se le pregunta por qué las ha hecho, que no sabe.

Se ha dicho en hep. sulf. calc. que un barbero puede tener deseo de cortar el cuello al cliente que está afeitando; el sujeto de nux vom., tiene impulsos que le llevarán a arrojar a su hijo al fuego, matar a su marido, etc.; el enfermo de nat. sulph., dirá : "Dr. : Ud. no sabe como debo luchar para resistir al deseo de matarme; sin cesar lo pienso"; iod. se inclina a matar, no por sentimiento de odio, sino sin ningún motivo : en medio de una conversación muy calma, o sumido en reflexiones apacibles, sentirá súbitamente un impulso violento, que se impondrá progresivamente hasta convertirse en verdadera locura impulsiva; se ve obligado a absorberse en cualquier ocupación para poder desechar sus impulsos, sus angustias, que son obsesivas y penosas cuando está inactivo.

A pesar de la laxitud de su espíritu, siente necesidad de actividad, de continuar su trabajo, aunque éste aumenta su laxitud.

Si uno dice a alguien agotado cerebralmente por exceso de trabajo mental, o por graves preocupaciones : "Ud. debe descansar", la responderá, "si me quedase quieto, me volvería loco o moriría".

Semejante estado hace pensar en iod. o ars. alb., pero mientras el sujeto de iod. tiene la sangre caliente, sólo puede permanecer, actuar o vivir en sitios frescos. el de ars tiene gran necesidad de calor, ropa abrigada y no puede soportar el frío frío (Kent).

Ideas fijas : temor constante de haber olvidado algo : se empeña en buscar analizar lo que puede llevarlo al estado escrupuloso.

PERDIDA DE MEMORIA Y REPUGNANCIA POR TODO TRABAJO INTELECTUAL.

Su espíritu se debilita tanto como su cuerpo, pierde la memoria y no puede retener las cosas más insignificantes, olvida lo que estaba diciendo y haciendo; sale de un negocio y deja los objetos que acaba de comprar; sus olvidos son innumerables (Kent).

Sueño

Insomnio o sueño agitado con sueños angustiosos.

Cabeza

CEFALEA CONGESTIVA con latidos, aflujo de sangre a la cabeza y SENSACIÓN COMO DE LIGADURA O CINTA APRETADA ALREDEDOR DE LA CABEZA, AGRAVADA POR CALOR, ruido, a cada movimiento, aunque ansioso quiere agitarse sin cesar, moveré, ir y venir, lo que aumenta su dolor de cabeza.

Iod. se puede comparar aquí a ant. tart., que tiene cefalea con sensación como si una venda le comprimiera la cabeza, cara pálida, cubierta de sudor frío; cact. grand.; carb. ac. tiene dolor de cabeza parecido que mejora por el te o fumando, gels., nit. ac., spig.

Dolor neurálgico, frontal, en raíz de nariz (ignat).

Congestión crónica de cabeza en ancianos, acompañada muchas veces de sensación curiosa, como si los brazos fueran a quedar paralizados.

Vértigo peor al agacharse, o en pieza caliente, acompañado frecuentemente por sensación de aflujo de sangre a la cabeza.

Ojos

Edema de párpados, a menudo con hinchazón de cara.

Ojos desorbitados con dolores y escozor; dolores de excoriación en los ojos.

Movimientos constantes de globos oculares.

Nistagmus.

Pupilas dilatadas.

Lagrimo, secreción lacrimal abundante e irritante.

Disminución de agudeza visual.

Oídos

Sensibilidad exagerada a al ruido.

Zumbidos en los oídos.

Sordera.

Piel

Tez pálida, amarillenta, terrosa, ojeras.

Aparato digestivo

BOCA :

Mal olor en la boca. (merc).

AFTAS Y ULCERACIONES DE MUCOSA BUCAL.

Encías dolorosas, esponjosas, blandas, sangran fácilmente.

Lengua cargada con una espesa; lengua marrón en el centro y blanca en los bordes.

Salivación abundante con mal olor en la boca. (Merc.).

Hinchazón de glándulas submaxilares.

FARINGE :

Hinchazón de campanilla.

Sensación de constricción permanente en garganta y deglución difícil.

ESTOMAGO :

Aumento de sed que puede ser excesiva.

Apetito variable; ya BULIMIA, ya ausencia de apetito.

HAMBRE CANINA; COME A MENUDO Y MUCHO, PERO ADELGAZA CONSTANTEMENTE (abrot., nat. mur., sanicula, tuberc.) ANSIOSO Y ATORMENTADO SI NO PUEDE COMER; SUFRE MENOS CUANDO TIENE EL ESTOMAGO LLENO (anacard.).

Eructos de la mañana a la noche como si cada partícula de alimentose transformara en gas.

Regurgitación generalmente ácida, con sensación de ardor.

Presión en el estómago después de cada comida.

Dolores de estómago, calambroides, que corren, ardientes.

Sensación de latidos, pulsaciones, en hueco epigástrico.

Náuseas frecuentes, vómitos violentos renovados por comer; vómitos de materias biliosas o mucosidades amarillentas.

ABDOMEN Y DEPOSICIONES :

Borborismos; hinchazón abdominal; cólicos y dolores calambroides; dolores abdominales que se renuevan después de cada comida.

Hipertrofia de ganglios mesentéricos.

Hígado y bazo hipertrofiados.

Afecciones de páncreas.

CONSTIPACIÓN CON NECESIDADES INEFICACES Y URGENTES, MEJORADA BEBIENDO LECHEFRÍA.

EN CUANTO TOMA LECHE LA CONSTIPACIÓN CEDE PASO A DIARREA.

DEPOSICIONES DIARREICAS, blandas, a veces blancuzcas, ALTERNANDO CON CONSTIPACIÓN. (ant. crud.).

Diarrea disenteriforme, acuosa, blancuzca, como leche cortada, espumosa, con tenesmo.

Diarrea grasosa de afecciones de páncreas, hemorragia a cada deposición.

Diarrea matinal crónica en niños enflaquecidos y escrofulosos.

Aparato urinario

Orina poco abundante, oscura, amarillo oscuro (bovis.). de olor amoniacal : hay a veces una película grasosa en la superficie.

Ardor y escozor en meato urinario.

Incontinencia de orina en mujeres viejas.

Organos genitales

1) MASCULINOS : TESTÍCULOS HINCHADOS, HIPERTROFIADOS Y DOLOROSOS lo que es característico de iod. : se puede decir en general, que las glándulas genitales están, bajo su acción, hipertrofiadas e hinchadas.

También se ha notado, como efecto tardío, una pérdida de poder sexual con atrofia de testículos.

2) FEMENINOS : Hinchazón edematosa de grandes labios.

REGLAS IRREGULARES : demasiado adelantadas o atrasadas, a veces excesivamente abundantes, de sangre pálida y acuosa, senos blandos y marchitos.

Gran debilidad durante reglas (alum., carb. an., coccul., hoematoxylon).

LEUCORREA crónica abundante y CORROSIVA LLEGANDO A VECES A HACER AGUJEROS Y RAER LA ROPA; a menudo más abundante en el momento de las reglas.

Hemorragia uterina profusa; HEMORRAGIA QUE SE RENUEVA A CADA DEPOSICIÓN; cuando este síntoma se encuentre en cáncer uterino, a veces iod. ha sido útil. (hydrast., lap. alb.).

Congestión, hinchazón e induración de útero y ovarios.

OVARITIS (apis, bell., lach.); dolores presivos, agudos, en ovario derecho principalmente como si le introdujeran una cuña de ovario a útero.

DISMINUCIÓN Y DOLORIMIENTO DE SENOS; induración, nudosidades en piel de senos.

SENOS BLANDOS Y MARCHITOS, DOLORIDOS O SENSIBLES, CON NÚCLEOS INDURADOS.

Aparato circulatorio

HIPERTROFIA DEL CORAZÓN, con o sin enfermedad valvular.

FRENITO (spig.) (Farrington).

FUERTE E INEXPLICABLE SENSACIÓN DE DEBILIDAD, CON PERDIDA DE RESPIRACIÓN AL SUBIR ESCALERAS.

Sensación de ansiedad pro cordial que obliga sin cesar a cambiarse de lugar.

SENSACIÓN DE COMPRESIÓN DOLOROSA COMO SI EL CORAZÓN ESTUBIERA COMPRESO POR UNA CUERDA, CON GRAN DEBILIDAD Y DESFALLECIMIENTO.

Comparar aquí con CACTUS, que tiene sensación como si el corazón estuviera apretado por una mano de hierro, que impide todo movimiento, peor de noche, estando acostado, sobre el costado izquierdo y caminando; lil. tigr., : sensación como si el corazón estuviera apretado en torno, palpitaciones, pulso irregular y sensación de frío alrededor del corazón.

Nux mosch. : sensación como si algo le apretara el corazón; opresión consensación de peso en el pecho.

Lach. : palpitaciones con sensación de constricción en el corazón; ars. alb. : sensación de constricción con opresión al caminar.

Palpitaciones violentas agravadas por el menor ejercicio.

Pulso acelerado, pequeño y algunas veces filiforme.

Aparato respiratorio

1) NARIZ : Estado catarral de la mucosa de la nariz.

Ha perdido el sentido del olfato.

Mucosa gruesa, se resfría por nada, estornuda sin cesar y tiene secreción acuosa abundante.

Ulceraciones de mucosa nasal; con costras sangrantes; no puede respirar por la nariz, porque está obstruida.

Todo esto aumenta cada vez que toma frío (Kent).

Nariz dolorosa e hinchada.

Dolor en senos frontales.

Sequedad de mucosa nasal con pérdida de olfato.

Estornudos; coriza seco en la casa y fluente fuera; secreción abundante, acuosa, no excoriante.

Ozena sifilítico o escrofulosa.

Epistaxis.

2) LARINGE : Crup membranoso con respiración ruidosa, ruido de serrucho; los seca y perruna, especialmente en niños de ojos y cabellos negros; aprieta su garganta con las manos mientras tose (Nash), por el dolor laríngeo que le provoca la tos.

Ronquera, cosquilleo y sensación de desolladura semejante a la provocada por tos seca.

Ronquera con afonía, sobre todo a la mañana, con constricción, tensión y espasmo laríngeo.

Dolores laríngeos con cosquilleo y sensación de excoiación.

Laringitis con sensación dolorosa durante la tos.

3) BRONQUIOS Y PULMONES : Enfriamiento que se manifiesta primero en mucosa nasal, luego desciende a garganta y bronquios.

Disnea, gran sensación de debilidad en el pecho con sofocación, peor durante reglas y al subir escaleras.

Tos seca a la mañana, causada por cosquilleo en laringe (alum., moschus, nat. ars., rhus tox.).

Hepatitis de pulmón derecho, sobre todo parte superior.

Irritación de pleura.

Pleuritis.

Hemoptisis.

Piel

PIEL SECA, o viscosa, húmeda y AMARILLO SUCIO.

Erupción de granitos rojos y secos.

Empeines.

Anasarca. A veces el sudor del enfermo de iod., deja en la ropa coloración azulada (los sudores de ferrum, pueden dejar coloración rojiza; y los de Ars., amarilla.).

Cuello, espalda y extremidades

Hinchazón de ganglios de cuello, nuca y axilas.

Bocio duro y voluminoso.

Sensación de constricción continua en el bocio.

Hipertrofia e induración de glándula tiroides.

El iodo produce bocio de todas clases.

En todo caso numerosos son los casos de agravación por iodo, de bocioesistentes, aumento de dureza, dificultad de respiración, pulsaciones, disnea.

En los casos tratados por médicos cuando las características del medicamento cubren la enfermedad, han mostrado bien su homeopaticidad para esta forma de bocio.

Calambres en la espalda.

Espasmos convulsivos de miembros.

Estremecimientos convulsivos y sobresaltos de tendones.

Debilidad muscular extrema, con temblores de miembros.

Dolores desgarrantes, agravados, de noche, por reposo y por el dolor, en miembros, y sobre todo en articulaciones.

Hay que hacer notar un dolor desgarrante en codo izquierdo.

Articulaciones dolorosas, hinchadas, inflamadas; reumatismo (en casos agudos pensar en apis; en crónicos sulph., escribe Farrington).

Hinchazones edematosas articulares.

DOLORES OSTEOCOPPOS NOCTURNOS.

Deformaciones óseas.

Manos y pies cubiertos de sudor frío.

Hinchazón edematosas de pies.

Fiebre

Escalofríos aún en habitación caliente.

Sensación de calor en todo el cuerpo con enrojecimiento de mejillas y gran agitación.

Transpiraciones abundantes.

Fiebre hética con sudores nocturnos.

Relaciones

Remedios que le siguen bien Hep., sulf., merc.

Complementarios

Lycop., badiaga; kali iod. en el crup.

Antídotos

Sulph., hep., sulph. : No debe ser dado mucho tiempo en diluciones bajas. (Hering).

IPECACUANA

Ipecacuana, abreviado : Ipeca o Raíz vomitiva, arbusto de la familia de las Rubiáceas, existe en tres clases :

Coephelis Ipecacuana, Psychotria emética, y Richardsonia Scabia; vive en Brasil.

Para la preparación de nuestro remedio se usa la raíz de Coephelisipecacuana, se le encuentra en droguerías en un largo de 8 a 10 cms., del grosor de una pluma de ganso, muy sinuosa, ofrece una serie de arillos irregulares, articulados, rugosos; de olor poco pronunciado, sabor acre, amargo, nauseabundo; su principio activo es un alcaloide llamado Emetina.

La tintura madre con la que preparamos las diferentes dinamizaciones homeopáticas se hace por maceración al 1/20 de la raíz pulverizada en alcohol a 70°.

Acción general del medicamento

Ipeca actúa de manera prominente SOBRE NEUMOGÁSTRICO por cuyo intermedio produce IRRITACIÓN ESPASMÓDICA DE APARATO RESPIRATORIO Y ESTÓMAGO, y se traduce : la primera en TRASTORNOS DISNEICOS. la segunda en NAUSEAS CARACTERÍSTICAS.

También influye en LAS MUCOSAS y parece tener especial afinidad con las DE TUBO DIGESTIVO Y ÁRBOL RESPIRATORIO.

Provoca, escribe Hughes, IRRITACIÓN MUCOSA INFLAMATORIA MODERADA, determinando, por excitación refleja transportada por los nervios periféricos de la región interesada, vigorosos movimientos musculares expulsivos, desproporcionados con el grado de irritación mucosa, lo que muestra que las extremidades de los nervios aferentes están comprendidas en el proceso mórbido.

El silbido del asma del heno, del asma, la violenta tos expulsiva de la coqueluche y los paroxismos espasmódicos del crup, colocan estos diversos síntomas en la definición de la acción de ipeca.

Determina y cura HEMORRAGIAS DE SANGRE ROJA, VIVA, CALIENTE, proveniente de cualquier orificio del cuerpo.

Características

1) CONSTITUCIÓN Y TIPO : Se aplica especialmente A SUJETOS QUE SE ENCOLERIZAN FÁCILMENTE, IRRITABLES POR TODO Y LLENOS DE DESEOS SIN SABER CUALES.

Si es un niño, grita, gruñe continuamente; si es un adulto es triste, jamás se contenta con nada; de mal humor, monta en cólera por el más pequeño detalle.

2) NAUSEAS PERSISTENTES Y VIOLENTAS CON VÓMITOS QUE NO ALIVIAN : NAUSEAS CONSTANTES, PENOSAS; ERUCTOS EN VACÍO; SALIVACIÓN PROFUSA, DESEO Y ESFUERZOS PARA VOMITAR QUE NO SE ALIVIAN CON NADA.

Durante las náuseas : cara generalmente pálida, ojeras, y tirones más o menos espasmódicos y más o menos acentuados en músculos de cara y labios.

Después del vómito hay a menudo gran deseo de dormir.

En fin - y esto es característico - A PESAR DE LAS NAUSEAS MUY VIOLENTAS, LA LENGUA ESTÁ LIMPIA Y ROJA.

Es el primero de los remedios para náuseas y enfermedades que van acompañadas por náuseas persistentes y en las que EL VÓMITO NO ALIVIA.

En presencia de tal síntoma hay que pensar en ipeca.

Hay muchos otros remedios que son potentes eméticos y presentan este síntoma : antim. tart., zinc., sulph., lobelia, nux vom., puls., apomorph., secale, tabac, etc., pero en ninguno las náuseas son tan persistentes y en ninguno están en relación con tantas afecciones.

Las náuseas de ipeca se relacionan a menudo con trastornos gástricos por desarreglos alimenticios y entonces se debe elegir entre él y puls.

También hay náuseas en el dolor de cabeza de ipeca; esta cefalea puede ser de origen reumático y con náuseas muy violentas cuando el remedio está indicado; también conviene en la jaqueca de origen gástrico, cuya náusea comienza antes del dolor. También se encontrarán las náuseas características de ipeca en la tos de muchas afecciones pulmonares, en muchas formas de hemorragia, en numerosos casos de fiebre.

3) HEMORRAGIAS ABUNDANTES DE SANGRE ROJO VIVO, CALIENTE POR CUALQUIER ORIFICIO DEL CUERPO; TAL HEMORRAGIA VA ACOMPAÑADA POR NAUSEAS Y DISNEA. (Nash).

En la hemoptisis, la menorragia, la metrorragia, y en la hematemesis, tiene un lugar importante, y en la hemorragia intestinal, (salvo la causada por ulceraciones), la he visto raramente fallar. (Hughes).

En esto se puede comparar a ipeca con : aconit., que tiene hemorragias activas de sangre rojo vivo, con ansiedad y miedo.

Arnica, en hemorragias semejantes a continuación de contusión, fatiga, osurmenaje físico.

Bell. : hemorragia de sangre caliente con latidos de carótidas y congestión de cabeza.

Carb. veg. : hemorragias con colapso completo, cara pálida y deseo de ser abanicado.

China : en casos de hemorragias muy abundantes, con grandes pérdidas de sangre, debilidad y zumbido de oídos.

Crocus : hemorragia con sangre coagulada en largos filamentos.

Crotalus, elaps, sulph. ac. : hemorragia de sangre negra, líquida, la primera y la tercera pueden tener esta hemorragia por todos los orificios.

Ferrum : hemorragias de sangre en parte líquida, en parte coagulada, cara muy roja o alternativamente pálida y roja.

Hyosc. : hemorragias con delirio, estremecimientos, sacudidas musculares, lach. : hemorragias de sangre descompuesta con sedimento como paja quemada.

Nitr. ac. : hemorragias de sangre viva, brillante.

Phosph. : provoca y cura hemorragias profusas y persistentes, hasta una pequeña herida que sangra.

Platina : hemorragias de sangre en parte sólida, coagulada en pequeños coágulos, en parte líquida.

Puls. : hemorragias intermitentes, variables en sus manifestaciones como todos los síntomas del remedio.

Secale : hemorragias pasivas, en mujeres débiles y caquéticas.

Sulph. : constituciones psóricas, cuando el remedio que parece indicado, no actúa.

Millef. : muy útil en hemoptisis.

4) ACCIÓN DOBLE SOBRE APARATO RESPIRATORIO : Por medio de su acción sobre NEUMOGASTRIO, ipeca, provoca y cura, una DISNEA ESPASMÓDICA, QUE LLEGA A SOFOCACIÓN.

Por medio de su acción sobre mucosa, determina ABUNDANTE ACUMULACIÓN DE MUCUS, en conductos aéreos.

Modalidades

Lateralidad

Principalmente derecha.

Agravación

PERIÓDICAMENTE; sus síntomas muestran carácter intermitente muy neto y periodicidad que lo indican en muchos estados maláricos.

En invierno.

En tiempo seco; por vientos calientes y húmedos (euphr.).

Por el menor movimiento.

Mejoría

Por reposo.

Por presión.

Síntomas mentales

Irritable y gruñón, impaciente.

Desdeñoso.

Lleno de desprecio por todo.

Tiene deseos de una porción de cosas sin saber exactamente cuáles.

Lentitud de pensamiento.

Cabeza

CEFALALGIA CON SENSACIÓN DOLOROSA COMO SI LOS HUESOS DE LA CABEZA FUERAN APLASTADOS, TRITURADOS, DOLOR DE CONTUSIÓN.

El dolor se extiende hasta dientes y raíz de lengua.

NEURALGIA NAUSEOSA, UNILATERAL ARRIBA DE UNO DE LOS OJOS, CON NAUSEAS MORTALES Y CARA MUY PÁLIDA; BOCA ESTIRADA CON EXPRESIÓN NAUSEOSA, este último síntoma no es tan

marcado en el adulto como en el niño, éste tiene los ángulos de la boca tirantes, con un pliegue, una arruga, que se extiende desde fosas nasales a ángulos de la boca y dan al pequeño rostro expresión de asco intenso, de náusea violenta, lo que sugiere remedios tales como ipeca, antim. tart., aethusa, cynap.

Vértigo al caminar, con vacilación, tambaleo y náuseas.

Ojos

CONJUNTIVA INFLAMADA, ROJA; LAGRIMEO PROFUSO.

En ciertos casos, escribe Farrington, aquellos que manipulan ipeca, son atacados por violenta inflamación de conjuntiva.

Córnea opaca; ulceraciones de córnea.

Temblor de párpados; dolores tirantes en y alrededor de ojos.

Dolores que atraviesan el globo ocular.

Neuralgias orbitarias periódicas con lagrimeo.

Fotofobia y escozor en párpados.

Cara

Pálida, terrosa, amarillenta e hinchada; ojeras azules.

También puede haber estremecimientos musculares convulsivos, sobre todo en labios.

Aparato digestivo

BOCA :

Boca húmeda, con mucha saliva.

Puede haber gusto insípido, pastoso, o amargo, sobre todo a la mañana; obien, dulzón, como a sangre.

La lengua puede estar un poco cargada, PERO GENERALMENTE ESTA LIMPIA, NORMAL.

Esta limpieza de la lengua a pesar de los síntomas gástricos es un síntoma muy característico, en cambio, en antim. crud., que tiene síntomas gástricos la lengua está cubierta por una capa blanca muy espesa.

FARINGE :

Deglución difícil como si tuviera una hinchazón o espasmo en faringe.

ESTOMAGO :

Ausencia de sed.

ASCO POR TODOS LOS ALIMENTOS con apetencia solamente por golosinas y dulces.

El tabaco, al fumar, le da un gusto nauseabundo, produciéndole náuseas y vómitos.

NAUSEAS PERSISTENTES Y VIOLENTAS CON VÓMITOS de alimentos mezclados con bilis, mucus y a veces sangre; los vómitos NO ALIVIAN LAS NAUSEAS.

SENSACIÓN DE ANGUSTIA EN EL ESTOMAGO, QUE PARECE RELAJADO FLOJO, COMO COLGANDO (sepia., tabac., staph., lobel., ignat.) Los síntomas gástricos de ipeca son tales que requieren el remedio después de excesos de comida rica como pastelería, etc.; la náusea es constante en todos estos malestares : NAUSEAS Y VÓMITOS INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE HABER COMIDO (ars.); vómitos de bilis, VÓMITOS Y NAUSEAS DESPUÉS DE HABER COMIDO ALGO MUY PESADO E INDIGESTO; mareos a la mañana.

Lengua ordinariamente limpia, lo que lo diferencia de nux vom., de antim. crud., que, como ipeca, es útil en indigestión por absorción de comida muy rica, pero aquí la lengua está cargada, cubierta por capa blanca excesivamente espesa.

Puls. también presenta trastornos gástricos agudos, por comida anormalmente rica, grasa, pero los trastornos se manifiestan cuando los alimentos están aún en el estómago mientras que en ipeca pueden aparecer náuseas o continuar aunque el estómago está ya vacío; puls. : lengua cargada.

Ars., sigue o suple a ipeca después de comida indigesta, cuando el estómago se ha enfriado súbitamente por agua o crema helada : hay vómitos, dolores ardientes, diarrea, agitación, etc. (Farrington).

INTestino Y DEPOSICIONES :

Sensación de hinchazón excesiva del vientre.

CÓLICOS CORTANTES, COMO CALAMBRES SOBRE TODO ALREDEDOR DEL OMBLIGO, CÓLICOS CON RIGIDEZ DEL CUERPO QUE ESTA COMO ESTIRADO.

DEPOSICIONES DISENTERICAS Y VISCOSAS CON MAS O MENOS SANGRE

DEPOSICIONES MUCOSAS O ACUOSAS, VERDES COMO HIERBA (acon., cham., elaterium, magn. carb., secale, etc.) DEPOSICIONES FERMENTADAS, ESPUMOSAS, COMO LEVADURA.

Estas deposiciones se observan a menudo; en niños, sobre todo en verano después de alimentación muy abundante o inapropiada. (Nash).

Cólera infantil : cara pálida, ojeras azules puede tener frecuentes epistaxis, está adormecido, con sacudidas y sobresalto musculares durante el sueño; en fin náuseas violentas y vómitos; come y bebe pero vomita casi inmediatamente lo que ha tomado; ipeca está particularmente indicado antes de ars., que es su complementario, en muchas afecciones gastrointestinales. (Farrington).

DIARREA CON DEPOSICIONES DISENTERICAS Y MUCHO TENESMO.

Aparato urinario

Orina sanguinolenta; deseo frecuente de orinar con sensación de ardor en uretra, tenesmo.

Organos genitales

Reglas demasiado precoces y abundantes, seguidas por gran debilidad.

Hemorragias uterinas profundas, de sangre arterial, rojo vivo, que corre con fuerza y náuseas y vómitos.

Náuseas y vómitos durante el embarazo (ant. tart., arg. nit., nux vom., tabac., sepia, sulphur.).

Aparato respiratorio

1) NARIZ : CORIZA CON OBSTRUCCIÓN DE FOSAS NASALES : a menudo epistaxis, pérdida de olfato, náuseas y catarro de mucosa naso-faríngea y brónquica (allium cepa, euphr., ars., que sigue a ipeca en catarros de los niños gordos mofletudos).

2) LARINGE : Ronquera, particularmente al fin de un resfrío.

Afonía inflamatoria.

3) BRONQUIOS Y PULMONES : DISNEA; CONSTRICCIÓN CONSTANTE DE PECHO; ASMA; GRANDES ATAQUES CON DIFICULTAD PARA RESPIRAR QUE SOBREVIENTEN PERIÓDICAMENTE, CADA AÑO. Dolor en parte de adelante del tórax; opresión y respiración corta como cuando uno está sofocado; respiración estertorosa, ruidosa.

Ataques de asma en ataques periódicos, nocturnos, a menudo largos, intensos, tenaces, más violentos que los que sobrevienen naturalmente en otros sujetos; a veces son tan violentos, que está obligado a estar junto a la ventana abierta, con la cara pálida, piel fría, pulso apenas sensible, y gran peligro de sofocación. Muy parecido a ipeca es el asma de ars., que a menudo sigue bien, sea en asma nerviosa, o catarral.

Cuprum, está indicado cuando el elemento espasmódico domina; en el momento del ataque, la cara se pone azul, hay constricción de garganta y casi convulsiones.

Lob. infl., se parece en esto a ipeca; en el momento del ataque de asma hay sensación de debilidad en epigastrio que irradia hacia arriba, en el pecho, náuseas, salivación profusa y sensación como si tuviera una masa molesta en el estómago.

GRAN ACUMULACIÓN DE MUCUS QUE OBSTRUYE ALVÉOLOS Y BRONQUIOS HASTA PRODUCIR AMENAZA DE SOFOCACIÓN, GRANDES RALES EN EL PECHO CON VIOLENTOS ATAQUES DE TOS, NAUSEAS.

EXCESIVA ACUMULACIÓN DE MUCUS EN CONDUCTOS AÉREOS Y QUE PARECE EXCITARAL ESPASMO, COMO SI TUVIERA UN CUERPO EXTRAÑO; DE ELLO RESULTA DISNEA O TOS ESPASMÓDICA O AMBAS.

Ant. tart.; tiene un síntoma parecido : gran acumulación de mucosidades que obstruyen el árbol respiratorio, pero es incapaz de expectorar.

Ipeca es uno de nuestros mejores remedios en bronquitis capilar de los niños, particularmente si sobreviene en tiempo húmedo y caluroso; hay gran acumulación de mucus en el pecho; a la auscultación se oyen gran des rales generalizados; tos espasmódica, acompañada por náuseas y expectoración mas o menos abundante de flema, fiebre más o menos elevada; puede haber dificultad más o menos acentuada para respirar, por gran acumulación de mucus en el pecho; después de dar ipeca, se notará que éste se adhiere menos a las paredes brónquicas y expectora más fácilmente.

Cuando la tos disminuye de frecuencia lo indicado es ant. tart. : la cantidad de mucus no ha disminuido en el pecho, que está tan obstruido, que no puede toser y esta ausencia de tos no es buen síntoma y el sopor aumenta.

Cuando los síntomas inflamatorios aumentan y el estado de hepatización sobreviene, ipeca cede el lugar a phosph. sulphur está indicado cuando el medicamento aparentemente bien elegido no actúa : hay rales ruidosos en todo el pecho, especialmente en pulmón izquierdo.

Otro buen remedio es thereb., cuando además de los síntomas pulmonares, el niño tiene orina oscura, escasa más o menos mezclada con sangre; hay que dar el remedio de manera más o menos repetida.

En fin también hay que pensar en lycop., que afecta sobre todo el pulmón derecho. (Farrington).

TOS INCESANTE, VIOLENTA, SOFOCANTE, A CADA INSPIRACIÓN, (bell., hyos., cham., rumex, squilla).

EL PECHO PARECE LLENO DE MUCOSIDADES QUE SOLO EXPECTORA CON ESFUERZO NAUSEOSO. TOS ESPASMÓDICA, SECA, CON ATAQUES DE SOFOCACIÓN, COLORACIÓN AZULADA DE CARA, verdadera rigidez espasmódica del cuerpo.

TOS CON ESPUTOS DE SANGRE al menor esfuerzo, hemoptisis de sangre roja viva, abundante. (millef.).

COQUELUCHE CON TOS ESPASMÓDICA, SANGRE POR NARIZ (indigo), ESPUTOS DE SANGRE, NAUSEAS, VÓMITOS, LA RESPIRACIÓN SE DETIENE, LA CARA SE PONE PÁLIDA O AZUL, EL NIÑO SE PONE RÍGIDO por espasmo tónico de extensores, finalmente todo se relaja y vomita abundantemente mucus que alivia.

Cuprum es el complementario de ipeca en coqueluche; en éste predomina el espasmo de flexores.

Cina, es útil en coqueluche con la misma rigidez de ipeca durante los ataques pero tiene además una especie de cloqueo en esófago, en ese momento; hay también rechinar de dientes con frecuencia.

Aparato circulatorio

Lentitud de corazón y pulso.

HEMORRAGIAS DE SANGRE ROJO VIVO, en los diferentes aparatos.

Fiebre

ESCALOFRÍO CORTO; con horripilación y frío glacial con sudores fríos en manos y pies; sólo tiene sed durante el escalofrío.

Calor casi ardiente por todo el cuerpo salvo en extremidades que están frías; este estado de calor es a veces muy largo.

Sudores casi siempre parciales.

Ipeca es muy útil en fiebres de tipo intermitente, especialmente después de abuso de quinina.

Relaciones

Complementarios

Arnica, ars., cupr.

Antídotos

China, nux vom., tabac., y a veces ars.

KALI BICHROMICUM

O Bicarbonato de Potasio, sal tóxica, se obtiene tratando una solución de cromato de potasio neutro, por ácido azoico.

Se presenta en forma de cristales rojo oscuro, inalterables en el aire y solubles en agua.

Preparamos nuestro remedio según los métodos comunes de dinamización de Hahnemann.

Acción general del medicamento

Sus puntos de afinidad son especialmente MUCOSAS, luego TEJIDOS FIBROSO Y PIEL; y ciertos órganos, como HÍGADO Y RIÑÓN.

Inflama muy violentamente LAS MUCOSAS, determinando enrojecimiento e hinchazón marcados, síntomas acompañados por HIPERSECRECIÓN DE MUCUS ADHERENTE, VISCOSO, FILAMENTOSO, QUE PUEDE ESTIRARSE EN LARGOS FILAMENTOS; esta inflamación puede llegar a formación de FALSAS MEMBRANAS Y ULCERACIÓN; esta última, PROFUNDA, DE BORDES REGULARES COMO HECHA CON MOLDE.

Kali bichr. manifiesta especialmente su acción en mucosas de aparato digestivo y respiratorio.

Bajo su acción, TEJIDO FIBROSO muy irritado, como lo muestran dolores muy vivos sentidos por experimentadores en articulaciones.

Es también manifiesta su acción sobre PERIOSTIO, donde, no solamente se localizan dolores en ciertos lugares, sino también hinchazón dura y característica.

Estos síntomas se observan más particularmente en parietales, maxilares y tibias.

En PIEL, provoca pápulas, pústulas, erupciones rubeoliformes, ulceraciones de base ancha, con bordes tallados a pico, como se encuentran en mucosas; son profundas y generalmente secas.

EL HÍGADO Y LOS RIÑONES, son inflamados por el remedio y presentan diferentes síntomas de degeneración inflamatoria más o menos neta.

Para terminar diremos que no tiene acción apreciable sobre SISTEMA NERVIOSO.

La excepción de la neuralgia supra orbitaria que frecuentemente cura, probablemente no depende del sistema, nervioso, sino de fenómenos gástricos.

Característica

1) CONSTITUCIÓN Y TIPO : Kali bichr. se adapta especialmente a PERSONAS GORDAS, CON BUENOS COLORES, CABELLOS RUBIOS.

En niños, actúa más especialmente en GORDOS, MOFLETUDOS, PREDISPUESTOS A CATARROS, al crup y sufren TRASTORNOS DE ORIGEN ESCROFULOSO O SIFILÍTICO.

2) INFLAMACIÓN DE TODAS LAS MUCOSAS, CON SECRECIÓN ABUNDANTE DE MUCUS ADHERENTE, VISCOSO, FILAMENTOSO; MUCUS COMO GELATINA : Ningún otro remedio tiene este síntoma tan desarrollado; esta inflamación mucosa puede llegar hasta : a) PRODUCCIÓN DE FALSAS MEMBRANAS GRUESAS.

b) FORMACIÓN DE ULCERACIONES PROFUNDAS, DE BORDES REGULARES; COMO HECHAS CON MOLDE : 3) DOLORS CARACTERÍSTICOS POR LAS MANIFESTACIONES SIGUIENTES : a)

APARECEN EN PEQUEÑAS ZONAS que podrían cubrirse con la punta del dedo. (Ignat., ox. ac., etc.).

b) APARECEN Y DESAPARECEN BRUSCAMENTE (bell., cactus. carb. ac., eupat., ignat., magn. phosph., nitr. ac., petrol., strych.) (ver esquema comparativo en platina).

c) SON ERRÁTICOS, Y PUEDEN CORRER RÁPIDAMENTE DE UN PUNTO A OTRO (puls., kali sulf., mangan., lac. can.) Esta indicación ha sido muy valiosa para cura de dolores reumáticos que saltan de una articulación a otra.

d) Pueden presentarse en DIAGONAL : SENO DERECHO, RODILLA IZQUIERDA; rodilla derecha, hombro izquierdo, etc. ...

A veces estos dolores de kali bichr. son muy violentos; pueden ser punzantes, otras veces picantes, otros sordos, ardientes; EL ARDOR ES SÍNTOMA MUY SALIENTE DEL REMEDIO (Kent).

Otro trazo muy marcado es SENSACIÓN DE GRAN DEBILIDAD Y FATIGA; CUANDO EL DOLOR HA PASADO, SI ERA EN MIEMBROS, ESTOS QUEDAN MUY FATIGADOS; GRAN POSTRACIÓN CON SUDOR FRÍO; gran postración con deseos de acostarse. (KENT).

4) SENSACIÓN DE PULSACIÓN, LATIDOS EN TODO EL CUERPO (Kent). esta sensación, bastante general, recuerda a amyl. nitr., bell., glonoin., sang., ver. vir., etc., que tienen un síntoma similar pero mucho más marcado, y más importante que en kali bichr. donde ocupa un lugar de segundo plano.

Modalidades

Lateralidad

DERECHA.

Alternancia de síntomas

Por ejemplo, disentería alternada con reumatismo, (abrot., platina) en que los síntomas de la espalda, alternan con los de otros del cuerpo.

Periodicidad

La presencia de neuralgias, todos los días a la misma hora, muestra la posibilidad de periodicidad de sus síntomas (Kent).

Agravación

a) POR FRÍO, AL AIRE LIBRE, AL AIRE FRESCO DE LA MAÑANA, AL FRÍO SECO, O AL DESVESTIRSE.

Muy sensible al frío; le falta calor vital; quiere estar muy abrigado y muchos de sus síntomas mejoran cuando tiene mucho calor en el lecho : todos sus dolores, la tos, se alivian por el calor del lecho (aunque muchos estados reumáticos, sobrevienen en tiempo caluroso); los síntomas catarrales de vías respiratorias se agravan en invierno, sobre todo en tiempo frío y húmedo como calc. phosph., cuando la nieve se derrite.

Sensible a vientos fríos y secos, como caust. (Kent).

b) ENTRE LAS 2 Y 3 DE LA MAÑANA O DURANTE LA MAÑANA.

c) POR MOVIMIENTO; los síntomas en general, y sobre todo los dolores, se agravan por movimiento.

EXCEPTO LA CIÁTICA Y ALGUNOS DOLORES DE MIEMBROS INFERIORES QUE MEJORAN AL CAMINAR; los síntomas del pecho al contrario, se agravan al caminar. (KENT).

d) POR LA CERVEZA : el remedio es muy útil para náuseas y vómitos de grandes bebedores de cerveza; cuando un bebedor de cerveza ha llegado al punto de no poder soportar esta bebida sin vomitarla, kali bichr. es eficaz (Kent).

Mejoría

a) AL CAMINAR : por lo menos la ciática y algunos dolores de miembros inferiores solamente, pues en general se agravan por movimiento.

b) POR CALOR, SALVO AFECCIONES CUTÁNEAS que mejoran por tiempo frío, alum. y PETROL lo contrario.

Cabeza

Eczema de cuero cabelludo, con costras gruesas con secreción amarilla, espesa y pegajosa.

Sensibilidad de huesos del cráneo y cuero cabelludo.

DOLOR DE CABEZA LOCALIZADO SOBRE CEJAS Y PRECEDIDO POR TRASTORNOS DE VISTA : sensación de manchas o niebla delante de ojos; esto aparece antes de cefalea y desaparece a medida que la jaqueca aumenta (iris vers, natr. mur, gels.).

DOLOR DE CABEZA LOCALIZADO EN UN PEQUEÑO PUNTO, GENERALMENTE SUPRA ORBITARIO; DOLOR FRONTAL GENERALMENTE ARRIBA DE UN OJO; ligado CON TRASTORNOS DIGESTIVOS; GRAN AVERSIÓN POR LUZ, RUIDO Y ESTA OBLIGADO A ACOSTARSE.

Dolor de cabeza violento relacionado con estado catarral de mucosa nasal; si se expone al frío, tendrá un estado de sequedad de mucosa y dolor de cabeza violento; en coriza, si la secreción disminuye un poco, también tendrá dolor de cabeza violento (Kent).

Los dolores de cabeza mejoran con el calor del lecho, por bebidas calientes, por presión; se agravan al agacharse, moverse, caminar, de noche o a la mañana. (Kent).

Vértigos con náuseas y sensación como si todo girara que se produce sobre todo CUANDO SE LEVANTA DE SU ASIENTO.

Ojos

Está indicado en CIERTAS INFLAMACIONES DE OJOS; cuando hay falta de poder de reacción de manera que se forman ÚLCERAS QUE PROGRESAN LENTAMENTE.

Párpados ardientes, hinchados, edematosos; secreción viscosa, fluente y amarillenta, conjuntivitis crupal.

Inflamaciones o ulceraciones serias, con muy poco dolor.

(Conium, lo contrario).

Iritis indolente con poco o nada de fotofobia y enrojecimiento poco marcado en relación con la inflamación.

Oídos

Erupción eczema tosa en oído externo con prurito.

Secreción espesa, amarilla, filamentosa, fétida con dolores punzantes y sensación de pulsación, de latidos; superación crónica del oído medio con perforación de tímpano.

Cara

Pálida o roja, acné.

Sensibilidad dolorosa de huesos de la cara, sobre todo arriba de las órbitas.

Dolores punzantes en huesos maxilares, agravados al toser; catarro nasal, con dolor en huesos maxilares. (Merc.).

Aparato digestivo

BOCA :

Gran sequedad de boca.

Inflamación y ulceraciones de mucosa bucal; placas aftosas; ulceraciones profundas, con bordes netos como hechos con molde.

Secreción de saliva filamentosa, viscosa.

Aliento fétido.

La lengua puede presentar diferentes aspectos : seca, roja, negra como barnizada, a veces agrietada, otras con erección visible de papilas, lo que le da aspecto de lengua afrutillada, sobre todo en casos de disenteria, que cura kali bichr., o cubierta por espesa capa amarilla en la base, ancha, extendida, conserva la impresión de los dientes (merc., protoiod., nat. phosph.); o cubierta por espesa capa oscura.

Tiene también SENSACIÓN COMO SI TUVIERA UN CABELLO SOBRE LA PARTE POSTERIOR DE LA LENGUA, hacia la raíz.

FARINGE :

Sequedad y enrojecimiento de faringe.

CAMPANILLA EDEMATOSA QUE CUELGA COMO UNA BOLSA; aspecto edematoso de la campanilla que parece una pequeña vejiga muy inflada, pero sin enrojecimiento (apis, kali iodat., lach.); aparición, del lado derecho de la campanilla, de ulceración rodeada por aureola roja que contiene secreción amarilla, adherente.

Ulceraciones como hechas con molde, en pilares de velo del paladar.

DEPÓSITOS PSEUDO MEMBRANOSOS, FALSAS MEMBRANAS EXTENDIDAS SOBRE AMÍGDALAS Y VELO DEL PALADAR, que tienden a extenderse hacia laringe y tráquea; con secreción por boca de saliva espesa y fluente; difteria con postración profunda y pulso débil.

Estos síntomas, escribe Farrington, son de un valor clínico suficiente para distinguir a kali bichr. de los IODUROS de MERCURIO : si doy merc.

protoiod. en difteria, en cuanto la saliva se vuelve fluente, suspendo el remedio para dar kali bichr.

Un remedio que sigue bien a kali bichr. en afecciones de garganta, es lach., indicado cuando la tos espasmódica se hace bastante violenta como para causar ataques de sofocación, sobre todo en el momento en que el enfermo se duerme; en este caso kali bichr. ha modificado bien la inflamación, sin llegar o modificar el espasmo de garganta que lach.

aliviará entonces; si los síntomas crupales vuelven a tomar gran intensidad, hay que volver a kali bichr.

Otro remedio en el que hay que pensar en difteria, al lado de kali bichr. es merc. cian.; Kaolin es muy útil cuando las membranas descienden hacia laringe y tráquea y hay este síntoma : dolor intenso en tráquea y parte superior del pecho.

Sensación de ardor en la faringe, que se extiende hasta el abdomen.

ESTÓMAGO :

SED INEXTINGUIBLE; deseo de cerveza, aunque provoca a menudo vómitos y diarrea; y de ácidos y bebidas aciduladas; REPUGNANCIA POR AGUA, a la que encuentra gusto desagradable.

APETITO NULO, sobre todo a la mañana.

NO PUEDE SOPORTAR CARNE. (alum., arnica, calc. carb., carb. veg., puls., sepia.).

No puede digerir té, que provoca dolores.

La digestión parece como detenida; AUN DESPUÉS DE COMIDAS TOMADAS CON MUCHO GUSTO, SENSACIÓN COMO SI LA DIGESTIÓN FUESE NULA; los alimentos quedan en el estómago como un peso; dolores de estómago aún después de comidas livianas; le parece no poder digerir los alimentos; SENSACIÓN DE PESADEZ, PLENITUD, EN HUECO EPIGÁSTRICO DESPUÉS DE HABER COMIDO; malestar gástrico, sensación de peso en el estómago inmediatamente después de comer, como nux mosch., y no 1 o 2 horas después como nux vom., o anacard., en que el dolor continúa hasta que come de nuevo, lo que lo alivia; estos trastornos dispepticos se encuentran a menudo en bebedores de cerveza y también en bebedores en general (Nash).

Kali bichr. tiene abundantes vómitos de mucus viscoso, fluente; estos vómitos pueden determinar gusto amargo en la boca por presencia de bilis que se puede encontrar mezclada al mucus; estos vómitos son renovados cada vez que trata de comer y beber o van acompañados por mucha angustia y dolores ardientes en el estómago. (Farrington).

Náuseas frecuentes a continuas; particularmente al caminar, de noche o a la mañana, con sensación de peso en cabeza y ojos; NAUSEAS CON VÓMITOS, generalmente mucosos o biliosos, amarillentos y amargos; vómito de alimentos ingeridos; durante los vómitos, ardor de estómago, vértigo y sudor de angustia; vómitos de mucosidad y sangre.

Pirosis.

VIOLENTOS DOLORES A TRAVÉS DEL TÓRAX QUE VAN DE LA PARED ANTERIOR DE LA REGIÓN GÁSTRICA, A COLUMNA VERTEBRAL.

Inflamación de mucosa gástrica con placas rojo-marrón; ULCERA REDONDA DE ESTÓMAGO : los principales remedios a comparar aquí con kali bichr. son : Arg. nit., ars. alb., que para Hughes Pope, está especialmente indicado cuando la ulceración se localiza en orificio pilórico, mientras kali bichr. lo es cuando la úlcera asienta en extremidad cardíaca del estómago; atropa, bismuth, cuando el dolor se alivia cuando el enfermo se vuelca hacia atrás.

Canth, cuyos dolores se localizan sobretodo en píloro; geran., que disminuye los vómitos; hydrast., omnitog., cuyos dolores se agravan cuando los alimentos atraviesan el píloro, síntoma que también se encuentra en uranium, phosph.

ALTERNANCIA DE SINTOMAS GÁSTRICOS CON REUMÁTICOS, éstos parecen atenuarse y desaparecer en el período cálido del año, para dar lugar a trastornos digestivos, tales como gástricos, diarreas, etc., y recrudecen en invierno y por tiempo frío (abrot. TIENE DIARREA ALTERNANDO CON REUMATISMO).

ABDOMEN Y DEPOSICIONES :

Ventre hinchado, tenso.

Retracción dolorosa de abdomen con dolores ardientes.

Dolores punzantes, cortantes o calambroides en el abdomen, con náuseas, después de comer, luego vómitos o diarrea. (Kent).

Ulceraciones intestinales crónicas (merc. corr.) duodenitis crónica. (ars. alb.).

Dolores en hipocondrio derecho, sobre todo si se limita a zona muy pequeña, y deposiciones descoloridas (merc.) sensación de presión, y puntadas en región hepática; dolores sordos en hígado; dolores provocados o agravados por movimiento; es útil en afecciones hepáticas ligadas a formación de cálculos; corrige las funciones del órgano para que produzca bilis sana; puede ayudar en disolución de cálculos (Kent).

Puntadas en región del bazo, agravadas por movimiento.

Sensación como de clavija, de tapón en el ano.

Constipación periódica con dolor a través de los riñones y orina oscura; constipación rebelde con cólicos; deposiciones escasas, duras, nudosas.

Deposiciones pálidas, color arcilla, con dolores hepáticos.

Diarrea con deposiciones como gelatina, peor a la mañana; diarrea matinal crónica (sulph., bryon., aloes, nat. sulph., rhus venen., etc.).

Deposiciones disentericas marrones, espumosas, sanguinolentas, con muchotenesmo y lengua seca, roja, lisa, agrietada.

Disenteria periódica en primavera o al principio de verano; ALTERNANCIA DE DIARREA CON SINTOMAS REUMÁTICOS, (dulcam.); cuando los reumatismos desaparecen sobreviene diarrea.

Aparato urinario

Dolores punzantes en riñones, o dolor sordo.

Congestión renal; nefritis aguda con orina escasa, albuminosa.

Pielitis, con mucus, pus y sangre en la orina.

Dolor en coxis antes de orinar y aliviado después de la micción.

Sensación de ardor en fosa navicular durante la micción.

Después de la micción, sensación de que queda en el canal una gota de orina que no puede expulsar. (Thuya).

Organos genitales

1) MASCULINOS : Vemos síntomas parecidos a los de las psicosis como en thuya, puls., sarsap.

Tiene por uretra secreción espesa, fluente como todas las de kali bichr.

Ulceraciones de aspecto chancriforme, tendientes a corroer profundamente los tejidos más bien que a extenderse en superficie, en glande o prepucio; ulceraciones con pinchazos, sobre todo de noche.

Sensación de constricción en raíz de verga, de noche, al despertar.

Ausencia de deseo sexual en personas gordas, con la constitución del remedio.

2) FEMENINOS : Prurito vulvar, con gran sensación de ardor y excitación.

Prolapso uterino, peor en tiempo caluroso, en verano.

Reglas adelantadas con vértigo, náuseas y dolor de cabeza; a veces la sangre es irritante, lastima los labios, los hace hinchar y provoca mucho prurito.

Dismenorrea membranosa.

Leucorrea amarilla, tenaz, filamentosa como gelatina.

Aparato circulatorio

Palpitaciones violentas y penosas.

Sensación de frío alrededor del corazón.

Aparato respiratorio

1) NARIZ : Catarro nasal; sequedad de mucosa nasal con cosquilleo en nariz y estornudos, sobre todo al aire libre.

Coriza con violentos estornudos y sensación de obstrucción enariz; secreción acuosa, abundante; sinusitis con sensación de presión dolorosa en raíz de la nariz.

Secreciones nasales viscosas, fluentes, que se acumulan a menudo en rino-faríngeo y pueden ser fétidas o no.

Coriza crónica con secreción espesa, fluente, amarillo verdoso; formación de tapones, de masas elásticas y duras, verdosas, como gelatina seca, que dejan la mucosa en carne viva cuando son expulsados.

Ulceración tendiente a perforar las partes sobre las que descansan.

Olor fétido de la nariz.

Ocena.

2) LARINGE :Ronquera; dolores de excoiación en laringe.

Sensación de calor en la garganta, con excitación a la tos.

Tos metálica, seca, con cosquilleo insoportable en laringe no bien bebe o come.

Falsas membranas en laringe y tráquea.

3) BRONQUIOS Y PULMONES :Tos violenta, que raspa, con dolor atrás del esternón y molestia producida por mucus en garganta agravada al desvestirse (rumex) y mejorada al calor del lecho.

Expectoración amarillenta profusa, muy pegajosa que sale en largos filamentos, muy tenaces o en masas viscosas, muy tenaces, adherentes.

Kali bichr. es muy marcado en bronquitis crónica cuando los esputos son tenaces, adherentes, muy difíciles de arrancar y expulsados en largos filamentos o más bien en masas. (Hughes).

Disnea; dolores en lado derecho del pecho al inspirar.

Sensación de pesadez y constricción en el pecho.

Espalda y extremidades

Sensación de frío en la espalda sobre todo en la nuca.

Sensación de desgarramiento y tirones en un lado del cuello, que parecenacer en la cabeza.

Rigidez de nuca.

Dolores punzantes en nuca y región dorsal.

Dolores violentos en región lumbar y coxis, o sacro, aumentados por tos, respiración profunda y movimiento.

Dolores cortantes a través de los riñones que se extienden a ingles e impiden caminar.

Muchos de estos dolores de espalda, son de carácter reumático y pasan de aquí a allá.

DOLORES EN MIEMBROS QUE SALTAN RÁPIDAMENTE DE UN PUNTO A OTRO (puls., kali sulf.);

dolores reumáticos alternando con síntomas GÁSTRICOS O DIARREA.

Crujidos en articulaciones : dolores reumáticos en articulaciones, particularmente, muñecas y dedos.

Rigidez de articulación del hombro.

Dolores vagabundos a lo largo de los huesos, agravados por frío; los huesos parecen dolorosos y magullados; dolores desgarrantes en tibias (mezer.).

LOS DOLORES OSTEÓCOPOS ALTERNAN CON SÍNTOMAS DE GARGANTA.

Ciática izquiera, mejorada por movimiento y flexión del miembro agravada, permaneciendo de pie, o estando acostado en el lecho, extendido o también sentado; dolores que sobrevienen y desaparecen bruscamente y se desplazan a lo largo de toda la pierna.

Planta de pies dolorosa al caminar, sobre todo el talón. (Oxal. ac., bar. carb., ant. crud., puls., led. pal., medorr., lycop.).

Piel

Roja, seca, caliente.

Prurito ardiente en piel.

Erupción exantemática parecida a sarampión; kali bichr. conviene en esta enfermedad después de puls. cuyos síntomas se asemejan, pero peores.

Erupción papulosa tendiente a hacerse pustulosa; las pústulas tienden a ulcerarse; erupción pustulosa parecida al "small-pox".

Ulceraciones de bordes regulares como cortadas con molde, profundas con exudación de serosidad viscosa, tenaz, fluente o al contrario seca, sobre todo de origen sifilítico.

Eczema impetigoso con úlceras varicosas.

Relaciones

Antídotos

Ars., lach., puls.

KALI CARBONICUM

Kali carbonicum o carbonato de potasio, sal incolora pulverulenta, cáustica, deliquescente, que cristaliza en pequeños prismas romboidales oblicuos.

Soluble en su peso de agua; insoluble en alcohol y éter.

Sabor alcalino, agrio.

Se encuentra en las cenizas de todos los vegetales, con excepción de los que crecen al borde del mar.

Se lo obtiene sea quemando el tártaro, o por deflagración del nitro con el carbón.

Las tres primeras dinamizaciones se hacen por trituración según los procedimientos Hahnemannianos.

Acción general del medicamento

Kali carbonicum actúa SOBRE SISTEMA NERVIOSO al que ataca muy profundamente, LO DEPRIME y provoca debilidad marcada que se encontrará más o menos en toda su patogenesia.

Afecta también con intensidad LAS MUCOSAS en las que determina irritación excesiva, particularmente las del árbol respiratorio, aparato digestivo y órganos genitales femeninos.

Esta irritación va acompañada de EXTREMA SEQUEDAD, que produce DOLORES PUNZANTES característicos. TIENE ACCIÓN HEMATOPOYÉTICA incontestable; ejerce verdadera influencia sobre la producción de la sangre tanto cualitativa como cuantitativamente.

Esto se manifiesta por LA ANEMIA que determina y se traduce en los síntomas siguientes : escalofríos frecuentes, cada vez que sale tiene escalofríos aunque el aire sea muy poco frío; pues no tiene vitalidad suficiente para resistir esta pequeña baja de temperatura ambiente; en todo el cuerpo, latidos en vasos sanguíneos, que no están en relación con una plétora verdadera, sino aparente; asociada a congestiones locales de origen anémico, la congestión de cabeza, va acompañada de martilleo en los oídos; vértigos al volver la cabeza rápidamente, o cuando va en coche, o todo lo que sea que disminuye o perturba la llegada normal de sangre al cerebro; después de excesos sexuales.

Esto nos muestra que es útil después de enfermedades graves o prolongadas : por eso lo encontramos útil contra la debilidad consecutiva a ciertos partos difíciles o a ciertos abortos agotadores cuando tenemos los síntomas siguientes : dolor de riñones muy penoso, sensación de debilidad, de fatiga debajo de los riñones que dificulta la marcha, tose y tiene frecuentes transpiraciones de noche, secreción de sangre más o menos neta, por el útero, orina cargada de uratos, lo que muestra mal metabolismo alimenticio y hace evidente la profunda depresión vital que amenaza y que EL REMEDIO CURA.

Características

1) CONSTITUCIÓN Y TEMPERAMENTO : TEMPERAMENTO "LEUCOFLEMÁTICO", PERSONAS LAXAS, SIEMPRE FATIGADAS, tez blanco amarillento, rasgos tirantes, ojos hundidos; CARA HINCHADA, Y PÁRPADOS SUPERIORES A MENUDO EDEMATOSOS, SOBRE TODO EN ÁNGULO INTERNO.

Cabellos negros, TEJIDOS FLOJOS, LAXOS, CON TENDENCIA MARCADA A OBESIDAD.

Sujetos perpetuamente fatigados, sólo se encuentran bien acostados, de vientre flácido, músculos blandos.

Más bien hinchados que gordos; de piel gruesa, infiltrada de edema blanco; su actitud preferida es la posición sentada; busto inclinado hacia adelante; rasgos de la cara tirantes; adelgazados pero con hinchazón neta, como una minúscula vejiga de agua en ángulo interno de párpados, sobre todo superiores; tez muy pálida o amarillo marrón, labios descoloridos. (Mouëzy-Eon).

Mentalidad MUY DÉBIL., con hipersensibilidad, tanto FÍSICA COMO MORAL, se envenena la vida por una bagatela, exagera el menor suceso; un ruido ligero, le produce verdadero espanto, con temblores; el menor roce sobre todo en extremidades, provoca sobresalto.

Su debilidad miento intelectual, lo volverá indiferente a todo lo que pasa inclusive su propio mal, que no se tomará el trabajo de explicar a su médico. (Dr. Mouëzy-Eon).

Lleno de conflictos, mental, emocional, físicamente jamás tranquilo y contento; se fatiga a fondo a fuerza de irritabilidad; lleno de ansiedad y temores; obstinado pero sensible; hipersensible al dolor, contacto y ruido; débil, postrado, propenso a enfermedades orgánicas; roto en su vitalidad; lleno de temblor y pulsaciones, dolores ardientes y pinchazos, tal es el enfermo de kali carb. con su humor y estado de agitación.

No es de extrañar que el remedio convenga a muchas situaciones y es raro que no sea empleado tan a menudo como debiera.

Tenemos enfermos de kali carb. a nuestro alrededor : los encontraremos todos los días en la vida. (Green).

2) GRAN DEBILIDAD Y GRAN HIPERSENSIBILIDAD : La gran debilidad tan profundamente marcada en su patogenesia y su extrema hipersensibilidad son las dos manifestaciones más típicas del debilitamiento general del sistema nervioso provocado por kali carb. y el debilitamiento de su inteligencia se asocia al agotamiento físico que lo postra.

3) DOLORES PUNZANTES, LANCINANTES : Está lleno de dolores punzantes, penetrantes, ardientes, desgarrantes Y ESTOS DOLORES SALTAN DE UN LUGAR A OTRO; pueden en ciertos casos, quedar en el mismo lugar, pero en general cambian de sitio, corriendo en todas direcciones; dolores punzantes, cortantes, como producidos por una cuchilla, dolores como los que harían agujas calientes, penetrantes, punzantes, agudas, y ardientes, SENSACIÓN DE ARDOR como con fuego; la sensación de ardor de kali carb. es igual a la de ars. (Kent).

Estos dolores son INDEPENDIENTES DE LOS MOVIMIENTOS contrariamente a los dolores punzantes de bryon.; además, contrariamente a los dolores de bryon. que se localizan en serosas, los de kali carb. se encuentran en cualquier TEJIDO, aún los dientes.

Una de las localizaciones favoritas de su dolor punzante, es el lado derecho del pecho donde da a veces sensación de transfixión como si lo atravesara de lado a lado.

Pero no hay que dar importancia desmesurada a esta localización : el carácter punzante del dolor de kali carb. es mucho más importante y más característico que el lugar.

4) TENDENCIA HIDRÓPICA : Se verifica por el sistema siguiente : HINCHAZÓN EDEMA TOSA, SEMEJANTE A PEQUEÑA VEJIGA DE AGUA, EN PÁRPADO SUPERIOR, SOBRE TODO MARCADO EN ÁNGULO INTERNO DE ESTE PÁRPADO SUPERIOR.

(Apis : párpado inferior).

Modalidades

Agravación

a) POR FRÍO : esto es una característica del remedio; así como es exageradamente sensible a todo, es sensible a cada cambio atmosférico; no encuentra su pieza a la temperatura deseada; sensible a la más leve corriente de aire, al menor soplo que circule en la pieza donde se encuentra; no puede soportar ventanas abiertas, aún en otra pieza de la casa; si es de noche, se incorporará bruscamente en su lecho para ver dónde viene la corriente de aire que lo enfría; sus malestares se agravan por tiempo frío y húmedo; está siempre lleno de escalofríos; sus nervios perciben el frío con hiperagudeza; está dolorido cuando hace frío, cuando tiene frío, tiene dolores punzantes que corren de un sitio a otro; cuando tiene frío y un dolor lancinante aparece, si se calienta el lugar dolorido, se corre a una región del cuerpo que esté frío; si se abriga una parte del cuerpo, los dolores que asentaban en ella, corren hacia otra parte descubierta (Kent).

b) ENTRE LAS 2, 3 o 5 DE LA MAÑANA.

c) DESPUÉS DEL COITO.

d) ESTANDO ACOSTADO SOBRE EL LADO IZQUIERDO Y SOBRE EL COSTADO DOLOROSO. (Bar. carb.).

e) Por café o después de haber comido.

Mejoría

a) Por calor, tiempo caluroso, aunque húmedo.

b) Durante el día.

c) Al inclinarse hacia adelante.

Síntomas mentales

HUMOR VARIABLE; ya contento, ya triste.

La más mínima causa puede cambiar su espíritu.

MUY SUSCEPTIBLE E IRRITABLE, lo que no es asombroso dada su extrema hipersensibilidad : monta fácilmente en cólera violenta.

DESCORAZONADO, MUY DEPRIMIDO, GRUÑÓN Y NERVIOSO; fácilmente abatido, ansioso, lleno de aprensiones, inquieto, particularmente por su salud : Se asusta por nada, al menor ruido, no puede soportar estar solo.

Esto se encuentra a menudo en mujeres : se asustan por alucinaciones, se figuran que hay alguien en la pieza donde se encuentran y que alguna cara se presenta a su espíritu y las atormenta.

Esta ansiedad se manifiesta particularmente a todos los ruidos, particularmente al más ligero golpe de puerta o ventana, sobre todo si es inesperado : entonces se sobresaltan, se aterrorizan y tienen un verdadero ataque de temblores.

Se asusta fácilmente y grita por visiones imaginarias; no soporta que lo toquen, se estremece violentamente si se roza ligeramente y especialmente en los pies.

A veces se encontrará la inteligencia seriamente afectada : el enfermo parece no prestar atención a nada y esta indiferencia va asociada a gran depresión corporal; cuando se lo interroga - generalmente a una mujer - parece no saber exactamente qué decir y qué quiere.

Este estado se parece al de phosph. ac., pero la apatía de ambos no es exactamente la misma : kali carb. no tiene apatía sensorial, sino depresión general muy grande para construir una respuesta; se encontrarán frecuentemente estos síntomas en la manía o en la fiebre puerperal.

Sensación como si la cama en que está acostado se hundiera.

Cabeza

Gran sequedad de cuero cabelludo con caída de cabellos. (Fluor. ac.).

Sensación de plenitud en cabeza como si estuviera intoxicado.

Sensación como de cuerpo móvil que se paseara en el cráneo.

Cefalalgia con dolor presivo en occipucio y frente.

Aparato respiratorio

FARINGE :

SINTAMOS CATARRALES con sensación desagradable en garganta, COMO SI TUVIESE, CADA VEZ QUE TRAGA, UN CUERPO EXTRAÑO, PUNTIAGUDO : UNA ESPINA DE PESCADO, UNA ESPINA QUE PINCHA LA GARGANTA (hep. sulf., calc., nitr. ac., arg. nit.); dolor de garganta punzante al tragar.

GRAN ACUMULACIÓN DE MUCOSIDADES EN GARGANTA; carraspea ruidosamente y escupe para desembarazarse de mucosidades sobre todo a la mañana; esto se encuentra más o menos marcado en todos los "kali", pero ningún otro tiene esta sensación de espina de pescado en la garganta en cuanto toma frío.

Aparato digestivo

ESTOMAGO :

SENSACIÓN DE ANGUSTIA, MIEDO ESTOMACAL, ANSIEDAD SENTIDA EN EL ESTOMAGO; esto es muy característico de kali carb.

Kent ilustra este síntoma con la anécdota siguiente : "Una de las primeras enfermas que atendí, explicó esto de una manera mejor que la que se hace en los libros : Dr., no siento el miedo como las otras personas, porque lo siento en el estómago; cada vez que me asusto, me sorprende por el golpe de una puerta, siento sensación de choque doloroso en mi estómago.

Y bien, esto es manifiesto, característico".

Y el célebre homeópata americano agrega "poco después desarrollé en mi enferma, otro síntoma de kali carb.; por una ligera torpeza de mi parte, mi rodilla golpeó el pie de la enferma que sobresalía un poco del borde de la cama y a pesar de que fue extremadamente ligero, exclamó : "¡Oh!", como si le hubiera hecho mucho daño : era, decididamente, una enferma de kali carb.

DESEO INTENSO DE AZÚCAR.

(Arg. nit.) y también de ácido.

La leche no le conviene, ni el pan negro, que le pesa en el estómago después de comerlo.

Después de las comidas, gran deseo de dormir, palidez de cara, escalofríos, DOLOR DE CABEZA, mal humor, NAUSEAS, eructos agrios, ácidos, cólicos, hinchazón de vientre y flatulencia.

GRAN FLATULENCIA EN EL ESTOMAGO, TODO LO QUE BEBE O COME parece transformarse en gas.

(Nux mosch., iodo, etc.).

El estómago parece constantemente lleno de agua.

Puntadas, dolores punzantes, ardientes, latidos dolorosos en estómago, agravados por tacto o al caminar.

CALAMBRES.

NAUSEAS ANSIOSAS CON DESEO DE VOMITAR sobre todo después de las comidas DE EMOCIÓN MORAL (Jahr).

VÓMITOS ÁCIDOS, a veces alimenticios, con postración.

Entre muchas otras indicaciones, kali carb. es útil en trastornos digestivos en personas que han perdido muchos "Fluidos vitales", cuando hay sensación de vacío, debilidad en el estómago antes de comer, y mucha hinchazón, después de la comida, especialmente después de haber tomado sopa o bebido café; eructos agrios, pirosis y sensación nerviosa de malestar vago, cuando tiene hambre. (Farrington).

ABDOMEN, RECTO Y DEPOSICIONES :

Plenitud, calor y GRAN DISTENSIÓN DE ABDOMEN después de la comida; fuerte hinchazón de vientre y FLATULENCIA EXTREMADAMENTE MARCADA : producción abundante de gases, emisión de flatosidades a veces inmoderadas o precedidas por dolor en recto.

SENSACIÓN DE FRÍO en abdomen, después de la comida o durante cólicos.

Cólicos lancinantes, punzantes en el vientre, que lo hacen doblar en dos.

Sensación de presión en bajo vientre sobre todo al agacharse.

DOLORES AGUDOS, LANCINANTES, PRESIÓN, PUNTADAS EN EL HÍGADO, con irradiación a espalda y omoplato derecho.

Antiguos trastornos crónicos de hígado, con dolores lancinantes en el órgano, y vómitos de bilis y trastornos gástricos; mucha distensión, flatulencia, sensación de plenitud después de comer, y opresión; al mismo tiempo, diarrea alternada con constipación, que dura varios días con grandes esfuerzos en el momento de la deposición; no puede permanecer acostado de noche, respiración difícil, disnea, principalmente a las 3 de la mañana, especialmente si es sensible al tiempo frío, húmedo y quiere estar siempre al lado del fuego.

Hidropesía consecutiva a enfermedad del hígado; derrame peritoneal con vientre grande.

HEMORROIDES PROCIDENTES, DOLOROSAS, LANCINANTES, INFLAMADAS, SANGRANABUNDANTEMENTE.

Hemorroides que salen después de la deposición que es dura, nudosa, difícil y exige gran esfuerzo para ser expulsada, sangran copiosamente, son muy dolorosas y deben ser introducidas.

Puntadas y ardor en recto y ano, temporariamente aliviadas por baño de asiento frío; prurito.

PROLAPSO FÁCIL DE RECTO (graph., podoph.).

CONSTIPACIÓN OBSTINADA; DEPOSICIONES VOLUMINOSAS, DIFÍCILES DE EXPULSAR, con ansiedad antes de evacuar.

Inactividad de recto, evacuación difícil de deposiciones muy voluminosas.

Después de la deposición, dolores desgarrantes, lancinantes, incisivos y ardientes en ano y recto.

Diarrea sobre todo al atardecer y a la noche, con dolores cortantes y gran sensación de fatiga, gran agotamiento; diarrea crónica o alternada con constipación.

Aparato urinario

Orina pálida y turbia con abundante sedimento; GRAN CANTIDAD DE URATOS EN ORINA.

Para Farrington kali carb. causa gran agotamiento de sistema muscular, y por eso encontramos uratos en cantidad excesiva en orina.

Esta eliminación exagerada de uratos por agotamiento también se encuentra en otros remedios y el mejor entre ellos es caust. : si tenemos un enfermo con depósito excesivo de urato en orina, sin otro síntoma marcado, este último remedio bastará a menudo para solucionar el caso.

Micciones muy frecuentes, en pequeña cantidad, y que sólo salen después de grandes esfuerzos.

Micciones frecuentes día y noche; debe levantarse a menudo de noche para orinar.

Necesidad imperiosa de orinar, pero debe esperar un instante antes que el chorro aparezca; micción lenta y una vez terminada, pierde algunas gotas de orina (arg. nit., brom., cann. ind., conium, selen.).

Orina involuntaria al toser o estornudar (caust., ferr., phosph., puls., squilla, etc.).

Sensación ardiente en uretra, principalmente al orinar; ardor en uretra durante y después de la micción; la orina sale lentamente y quema.

Trastornos de naturaleza catarral vesico uretral con secreción purulenta de mucus espeso, abundante, que se deposita en la orina.

Kali carb. está en estrecha relación con nat. mur. en numerosos casos de "gota militar" y trastornos urinarios de larga data que siguen a gonorrea, cuando hay secreción blancuzca, poco abundante, que persiste; la micción es siempre dolorosa, ardiente, pero si este dolor ardiente sólo sobreviene después de la micción y el sujeto es excesivamente nervioso e impaciente hay que dar nat. mur.; si el dolor ardiente aparece durante y después de la micción, y estamos frente a la constitución debilitada de kali carb., debemos prescribir este último (Kent).

Los dolores lancinantes con dolor de espalda, también han sugerido kali carb. en nefritis.

Organos genitales

1) MASCULINOS : Aumento excesivo o, al contrario, disminución de apetito venéreo.

Emisión excesiva de esperma, seguida por debilidad, pero sobre todo, GRAN DEBILIDAD DESPUÉS DEL COITO (china, kali phosph.), a pesar de ello, erectismo sexual.

Sensación molesta de comezón y escozor en escroto; irritación constante que lleva sin cesar su atención a los órganos genitales, provocada por abusos, excesos, vicios, impotencia (Kent).

2) FEMENINOS : Gran sensibilidad de vagina; dolores picantes, puntadas y sensación de herida durante el coito, que tienen las mismas consecuencias agotadoras; que en el hombre.

ESTABLECIMIENTO DIFÍCIL DE LAS PRIMERAS REGLAS EN JÓVENES, atraso en su aparición en niñas con síntomas en el pecho o ascitis, con debilidad característica.

REGLAS IRREGULARES : precoces, profusas (calc. carb.) de sangrares, de olor fétido, que excoria tegumentos; o tardías, poco abundantes, de sangre pálida.

Sensación voluptuosa antes de reglas y dolores en riñones antes y durante reglas.

HEMORRAGIAS UTERINAS CON PERDIDAS CONSTANTES DESPUÉS DE PERDIDA ABUNDANTE, con dolor de cabeza, aliviado sentándose o por presión.

Leucorrea mucosa, amarillenta, con prurito vulvar.

DOLORES DE PARTO INSUFICIENTES CON VIOLENTO LUMBAGO, y deseo de detener los riñones comprimidos; dolores de expulsión muy débiles con DOLORES EN LOS RIÑONES COMO SI FUERAN A ROMPERSE, dolores que se extienden hacia abajo, hacia nalgas y piernas y no se localizan netamente en región uterina; o comienzan en riñones, parecen ir hacia el útero, luego vuelven a riñones (gels.); cuando los dolores son tan penosos que parecen impedir en lugar de ayudar las contracciones uterinas, cuando las constricciones cesan, cuando la mujer grita pidiendo que le friccionen las caderas y tiene violentos dolores de cada lado del abdomen más bien que en el medio, actúa regularizando la marcha del parto; cuando una vez terminada la dilatación, hay verdadera inercia, ausencia de dolores, puls.

será generalmente útil (Kent).

VÓMITOS DE EMBARAZO; a menudo ipeca alivia el estado nauseoso ya veces basta para detenerlos; pero en general habrá que recurrir a un remedio de acción profunda, constitucional; la mayoría de las veces es sulph., sepia o kali carb., a veces ars. alb.; cuando no hay síntomas constitucionales, y al examinar el caso sólo se encuentran náuseas terribles, agotadoras con vómitos continuos noche y día.

Symphor. rac. será útil.

Dolores punzantes en senos.

Aparato respiratorio

1) NARIZ : Enrojecimiento e hinchazón de nariz.

Alas excoriadas y ulceradas (ant. crud., calc. ost., graph., petrol.).

Catarro nasal crónico; sensación de obstrucción, se alivia al aire libre, pero vuelve cuando entra en habitación caliente.

(Esta modalidad es una excepción entre los síntomas del remedio); hay secreción de líquido amarillo, verdoso, espeso, fétido; o hinchazón de mucosa con secreción, sanguinolenta.

Al menor enfriamiento, este catarro se hace agudo con sensación como de espina en garganta.

EPISTAXIS al lavarse la cara a la mañana.

2) LARINGE :Ronquera y afonía relacionadas con coriza, tos seca, por ataques, peor hacia las 3 de la mañana (amon. carb., hyosc., opium, rumex crisp., zingiber.).

Tos espasmódica con esfuerzos de vómitos o vómitos alimenticios.

Tos gruesa con mucus que no puede ser expulsado, ni debe sertragado.

3) BRONQUIOS Y PULMONES :Asma con ataques, peor de 2 a 4 de la mañana, aliviados levantándose O INCLINÁNDOSE HACIA ADELANTE.

Dolores PUNZANTES EN EL PECHO, PEOR DEL LADO DERECHO, PUNTADAS DOLOROSAS EN BASE DE PULMÓN DERECHO, que irradian a través del pulmón hasta la espalda.

LOCALIZACIÓN DE AFECCIONES PULMONARES EN BASE DE PULMÓN DERECHO.

Kali carb. está indicado en bronquitis, neumonía, tuberculosis pulmonar, cuando se encuentra el esquema patognomónico en que dominan sus dolores característicos, PUNZANTES, LOCALIZADOS DE MANERA PREDOMINANTE EN PAREDES DEL PECHO; SE AGRAVAN POR TODO MOVIMIENTO PERO, CONTRARIAMENTE A BRYON, APARACEN INDEPENDIENTEMENTE DE ESTA AGRAVACIÓN; SE LOCALIZAN DE PREFERENCIA EN 1/3 INFERIOR DE PULMÓN DERECHO.

Sensación de frío en el pecho (Kent).

Cuando la neumonía ha desaparecido, si enseguida, cada vez que se enfría, su resfrío se instala en el pecho, hay que pensar en kali carb.; gran sensibilidad a cambios de tiempo, aire frío, humedad, tos seca continua con sacudidas, sofocación o disnea continua, con agravación de 3 a 5 de la mañana; y dolores neurálgicos fugitivos; estos síntomas aumentan gradualmente y el enfermo los relaciona con neumonía; dice : "Dr. no he estado bien, desde que tuve neumonía".

Estado catarral localizado en el pecho, con tendencia marcada a enfriamientos.

Todo amenaza terminar en tisis.

Kali carb. será muy útil en tales casos.

Por esta tendencia de los estados catarrales a localizarse en el pecho, hay que tener en cuenta, con kali carb., a phosph., lycop. y sulph. (Kent).

Espalda y extremidades

GRAN DEBILIDAD DE LA ESPALDA, como si no pudiera estar parado.

Deseo de dejarse caer en una silla o acostarse.

SENSACIÓN DE DEBILIDAD Y PARÁLISIS O ENTUMECIMIENTO EN BASE DE RIÑONES, sensación de que los riñones fuesen a fallar.

Dolores punzantes, punzantes, particularmente en riñones y ombligo derecho.

Rigidez, fatiga, agravada por trabajo, al pasear o comer.

Sensación de ardor en columna vertebral (guaco).

LA MEDULA SUFRE INTENSAMENTE (Farrington).

Severa algia dorsal durante embarazo o después de aborto; irritación espinal conjuntamente con síntomas uterinos; presión hacia base de riñones como si tuviera un peso muy pesado que lo empujara hacia abajo; pesadez uterina durante reglas, con ardor a lo largo de columna vertebral.

Dolor de riñones, latente y tirante, aliviado cuando está acostado. (nat. mur.).

Los miembros tienen la misma sensación de debilidad, de gran agotamiento que la espalda.

Debilidad y temblores sobre todo después de un paseo.

Sensibilidad dolorosa de miembros en cualquier posición.

Dolores tironeantes y desgarrantes en miembros, sobre todo durante el reposo, con hinchazón de partes afectadas, gran debilidad y escalofríos después del ataque.

Rigidez de músculos; disposición de los miembros a entumecerse cuando está acostado encima.

Estremecimiento, convulsiones, ataques de espasmos y tirones convulsivos de miembros y músculos.

Paresias, parálisis pasajera.

Paresia de la punta de los dedos que están sensibles.

Temblor de manos al escribir.

Dolores punzantes de cadera a rodilla; dolores lancinantes en rodilla con hinchazón pálida.

Hinchazón dolorosa de articulación del hombro.

Dolor en dedo grande del pie como si la uña estuviera encarnada.

Piel

Cuerpo frío.

Desea estar muy abrigado; pero a pesar de estar frío TRANSPIRA ABUNDANTEMENTE; ABUNDANTE SUDOR FRÍO EN EL CUERPO; transpira al menor esfuerzo.

Sudor en el lugar del dolor.

Sudor en la frente.

Sudor frío en la frente con dolor de cabeza (Kent).

Puede haber el síntoma contrario :PIEL SECA CON IMPOSIBILIDAD DE TRANSPIRAR. (Jahr).

Sensación de ardor, o prurito ardiente y lancinante en piel.

Piel seca y ardiente como después de sinapismo.

Erupción de granitos rojos, principalmente en abdomen y senos, concomezón y ardor.

Hinchazón de color rojo azulado, sabañones de un rojo azulado.

Relaciones

Complementarios

Farrington en sus "Lecciones de Materia Médica Clínica" abre así su capítulo sobre kali carb.

"Hoy estudiaré con Uds. el carbonato de potasio, conocido por kali carb.

en nuestra nomenclatura.

Es complementario de carb. veg. y se le parece en muchas formas de enfermedades, particularmente en inflamaciones de pulmones.

A veces cuando el uno fracasa, el otro completa la curación; de ahí sus relaciones complementarias.

Hay también relaciones complementarias entre kali carb. y phosph.

La mayoría de los formularios homeopáticos ponen como complementarios de kali carb. y phosph., nat. mur.

En cuanto a la relación de kali carb. y carb. veg. señalada por Farrington, es normal, porque carb. veg. es complementario de phosph.

El potasio y el fósforo, que son oxidantes químicos y tan activos, parecen ser, en la vida, catalizadores de oxígenos de primer orden y es normal que tengan relaciones múltiples CON EL AC. CARBONICO y EL CARBONO.

Antídotos

Camphora, coffea.

KALI HYDRIODICUM O KALI IODATUM

O Yoduro de Potasio, sal mineral que nos llega en forma de cristales blancos, cúbicos, anhidros, que se alteran ligeramente al aire, de sabor amargo y salado, perfectamente solubles en agua y alcohol.

Preparamos las tres primeras dinamizaciones, por trituración Hahnemanniana y obtenemos por diluciones sucesivas las dinamizaciones más elevadas.

Acción general del medicamento

Kali hydriodicum ES UN ANTISIFILITICO Y ANTIPSORICO de acción profunda.

Actúa como merc., influenciando profundamente TEJIDO LINFÁTICO Y GLÁNDULOS; en MUCOSAS determina como merc. inflamación catarral profunda que puede llegar a ulceración.

Actúa también sobre PERIOSTIO como merc. y sobre TEJIDOS CONJUNTIVO Y FIBROSO.

Es similar en su acción y antídoto de merc.; hep. sulf. comparte con kali hidr. la propiedad de antidotar la mercurialización profunda y sus malos efectos.

Los individuos que, en este caso, se han vuelto friolentos y con escalofríos, que están siempre cerca del fuego, necesitan hep. sulf. calc.

Los que, al contrario, siempre desean desabrigarse, se agitan por movimiento, están fatigados en reposo, necesitan kali hydr.

Modalidades

Agravación

a) POR CALOR, en pieza caliente.

Por viento húmedo y caliente; el coriza, sin embargo, mejora por calor.

b) DE NOCHE.

Mejoría

a) POR FRESCO, al aire frío, al aire libre; sin embargo, tomar cosas frías lo agrava, el frío agrava también el coriza.

b) POR MOVIMIENTO.

Síntomas mentales

Se pone DE MAL CARÁCTER, HASTA CRUEL, EXTREMADAMENTE IRRITABLE.

Áspero con sus hijos y familia; injuria fácilmente a los que lo contrarían.

Se pone TRISTE Y LLOROSO.

Extremadamente nervioso, NECESITA CAMINAR Y AGITARSE.

Si permanece en habitación caliente, se pone laxo; le parece que no tiene fuerza para moverse, no tiene deseo de moverse, no sabe por qué está tan débil; está menos bien al calor en el interior de la casa.

Pero no bien vuelve al aire libre se siente mejor y puede hacer grandes caminatas sin fatiga.

Cuando vuelve a la casa, se siente de nuevo débil, laxo, agotado.

Cuando está descansando, está agotado física y mentalmente (Kent).

Cabeza

Cuero cabelludo doloroso, al rascarse, como si estuviera ulcerado.

Gran tendencia del cabello a encanecer antes de tiempo y caer.

La caja craneana se hace dolorosa y presenta nódulos sensibles.

Congestión, sensación de calor en la cabeza.

Dolores parietales a través de los lados de la cabeza, como si estuviera apretada por un torniquete; dolores terribles, machacantes, latentes, de ruptura, que aprietan, desgarrantes de los lados de la cabeza.

Dolores como cuchilladas a través de la cabeza como si le clavaran clavos.

Dolores lancinantes, cortantes en piel de cráneo temporales y supraorbitaria.

Los dolores se agravan por calor, en la casa; mejoran caminando al aire libre.

Ojos

Conjuntivas rojas, inyectadas con lagrimeo profuso.

Conjuntivitis con secreción catarral verdosa y espesa.

Iritis sifilítica; en esto compete con : staph., hep. sulf., nit. ac. merc., ETC.

Queratitis pustulosa y quemosis, quemosis con secreción purulenta.

Edema de párpados más o menos acusado.

Cara

Neuralgia facial; dolores lancinantes en maxilar superior.

Aparato digestivo

Dolor terrible en base de lengua de noche.

Inflamación de mucosa bucal y faringea que puede llegar a ulceración.

Hinchazón inflamatoria de amígdalas.

Sialorrea.

Los síntomas del cuerpo se alivian por frío, pero los del estómago, al contrario, se agravan por frío.

La leche fría, helados, agua helada, bebidas frías, alimentos fríos, todas las cosas frías en el estómago agravan todos los síntomas.

Aunque tiene mucha sed y bebe grandes cantidades de agua para saciarse, si es fría, provocará vómitos.

Tiene flatulencias y eructos como carb. veg., y lycop.

DOLORES y sensación de ardor en la boca del estómago.

Organos genitales

1) MASCULINOS : Inflamación crónica de uretra en casos antiguos de blenorragia, con secreción espesa y amarillo verdosa e indolora.

Inflamación de testículos de naturaleza sifilítica.

2) FEMENINOS : Reglas atrasadas y profusas; durante ellas el útero parece comprimido.

Leucorrea amarillo verdosa, corrosiva, con estado inflamatorio subagudo de senos en jóvenes casadas. (Boericke).

Aparato respiratorio

Nariz roja, hinchada; mucosa inflamada, con abundante secreción de líquido claro, límpido, estremadamente irritante, excoriante.

Coriza; cada cambio de tiempo trae coriza; se resfría constantemente por nariz, que provoca sensación de ardor en mucosas nasales y orificios de nariz.

Esta coriza aumenta al aire libre, mientras que el aire libre lo mejora en general; por eso fastidia, pues no sabe dónde ponerse para estar bien : en habitación caliente su coriza disminuye pero está mal en general; al aire libre se siente mejor en general, pero su coriza se agrava.

Con el coriza hay también gran dolor a través de la frente en senos óseos de cara.

Antiguo catarro sifilítico de nariz con secreción espesa, amarilloverdosa, y fétida, caire de huesos de la nariz, ozena.

Dolores violentos en raíz de nariz.

Sensación de dolor, crudeza, desolladura en laringe con ronquera; de noche despierta a causa de una sensación de constricción dolorosa en laringe.

Edema laríngeo.

Tos provocada por irritación constante de laringe.

Tos peor a la mañana.

Tos seca sacudida; tos ronca, con abundante expectoración verdosa.

Disnea al subir escaleras con dolores en región del corazón.

Dolores lancinantes en pulmones.

Neumonía, cuando la hepatización comienza.

Efusión pleural; hidrotórax (merc., sulph).

Edema de pulmón.

Aparato circulatorio

Palpitaciones; palpitaciones por ligero esfuerzo al caminar.

Espalda y extremidades

Todos los huesos parecen doler.

Espesamiento de periosteo, sensible al tacto, particularmente en tibia.

(Asa fet., kali bichr.).

Ciática, peor acostado o parado de noche, cuando está acostado sobre el lado enfermo, mejorada caminando.

Reumatismo con dolores agravados de noche o por viento húmedo y caliente.

Reumatismo de rodillas con derrame.

Dolores reumáticos en coxis.

Dolores en cadera que hacen requebrar.

Kali hydr. hace maravillas en viejos gotosos que están obligados a moverse sin cesar, desean estar al aire libre, tienen siempre demasiado calor, no pueden soportar estar en habitación caliente, sufren de su gota cuando están tranquilos, se fatigan estando tranquilos, pueden andar fácilmente y caminar mucho al aire libre sin fatiga, sobre todo cuando hace frío.

Las articulaciones están hinchadas, dolorosas y esto va acompañado de agitación, inquietud, nerviosidad, mal carácter, y gran irritabilidad, alternando con lágrimas; se alivian mucho por movimiento y esto podría incitar a dar rhus tox., pero hay que recordar que este es friolento, dese a estar cerca del fuego se alivia por calor y se fatiga por movimiento prolongado, mientras kali hydr., no se fatiga por movimiento continuo.

Piel

Puntos rojos en la piel, sobre todo en piernas.

Hidroacné; acné rosado.

Ganglios hipertrofiados, indurados.

Relaciones

Hepar., sulf. calc.

KALI MURIATICUM

Es cloruro de potasio al que se le da este nombre, después de haberlo dinamizado, según procedimientos Hahnemannianos.

Su fórmula química es ClK y no debe confundirse con clorato de potasio ClO_3K .

Acción general del medicamento

Esta sal se encuentra en glóbulos sanguíneos, músculos, nervios, células cerebrales, que sin él no pueden regenerarse, y en humores intercelulares.

Según Schüssler, está en relación química estrecha con la fibrina y una perturbación en el equilibrio orgánico de kali mur., determina, donde se produce, exudado fibrinoso.

Sus características fisiológicas están en relación estrecha con el cloruro de sodio, muchas de cuyas propiedades comparte; si las células epidérmicas, por cualquier irritación, se desmineralizan de cierto número de moléculas de kali mur., gana los tejidos que lo rodean, se forma eliminación anormal de fibrina y un exudado seroso tal, que la piel se levanta para formar ampollas a las que llena, si esto pasa en la vecindad de la piel, pero el mismo proceso podrá producir en cualquier epitelio.

Si la integridad del tejido afectado es restaurada por absorción de nuevas moléculas de kali mur., este exudado será reabsorbido o eliminado, lo que se realiza, probablemente, por producción de ácido clorhídrico, formado por la reunión de Cl , de ClK e hidrógeno pues este ácido clorhídrico disuelve a la fibrina en su estado inicial.

Sus principales síntomas característicos son: CAPA BLANCA O GRIS EN BASE DE LENGUA: PRODUCCIÓN EN MUCOSAS DE FLEMA BLANCA, ESPESA COMO BABA; SECUNDARIAMENTE, DESCAMACIÓN FURFURACEA.

Responde AL SEGUNDO PERIODO DE INFLAMACIONES SEROSAS, cuando el exudado tiene carácter plástico; tiene gran valor en afecciones catarrales, en estados de inflamación subaguda, CUANDO HAY EXUDACIÓN INTERSTICIAL; EN EL SEGUNDO ESTADO DE LAS INFLAMACIONES, ES DECIR, ESTADO DE EXUDACIÓN INTERSTICIAL, se ha visto articulaciones inflamadas por reumatismo articular agudo volver a su estado normal bajo su acción después de resistir largo tiempo a otros remedios. (Nash).

Cabeza

Dolor de cabeza con vómitos de mucus blando y espeso como baba.

Dolor de cabeza punzante con lengua cargada de blanco, en la base, vómitos de flema blanca, espesa, viscosa, ligados a pereza hepática con pérdida de apetito.

Segundo período de la meningitis (Boericke y Dewey).

Ojos

Secreción de mucus blanco, espeso, viscoso o líquido verdoso amarillento, purulento.

Catarata, después calc. fluor., (Boericke y Dewey).

Oídos

Es uno de los remedios más útiles EN EL SEGUNDO PERIODO DE ESTADO CATARRALES DE OÍDO Y AUN DESPUÉS, ESTADO CATARRAL CRÓNICO DE OÍDO MEDIO; sordera con dolor de oído por congestión de mucosa de oído medio o trompa de Eustaquio, con adenitis y CRUJIDOS EN OÍDOS AL SOPLAR POR NARIZ O TRAGAR.

Sordera, ligada a trastornos de garganta con lengua blanca, etc.

Sordera por hinchazón inflamatoria de oído externo.

Exfoliación epitelial húmeda de tímpano.

Granulaciones de tímpano y meato externo.

Inflamaciones de oído medio con sensación de estar tapado, de nasofaríngeo obstruido, todo con sordera.
TROMPA DE EUSTAQUIO OBSTRUIDA; si no se puede destapar con lopera de Politzer, hay que dar algunas dosis de kali mur., y después se logrará fácilmente; parece actuar mejor sobre trompa de EUSTAQUIO derecha, (Boericke y Dewey).

Aparato digestivo

BOCA Y GARGANTA :

Aftas, ulceraciones blanco gris en la boca de niños.

Lengua seca o viscosa, BASE CUBIERTA DE ESPESA CAPA BLANCA O GRIS.

Faringitis; garganta inflamada y edematizada, con pústulas grisáceas(FARINGITIS FOLICULAR).

AMÍGDALAS INFLAMADAS, hinchadas al punto de respirar difícilmente.

Es el segundo remedio en amigdalitis en cuanto la hinchazón aparece,amígdalas manchadas de gris o blanco; es el único remedio en muchos casos de difteria con ferr. phosph., (Boericke y Dewey).

ESTOMAGO :

Pérdida de apetito.

Trastornos GASTRO BILIARES CON LENGUA CARGADA DE BLANCO O GRIS EN SU BASE.

Dispepsia, mala digestión con lengua cubierta por espesa capa blanca o gris en su base; náuseas después de comer; dolores y sensación de peso abajo de las costillas a la derecha.

NO PUEDE SOPORTAR ALIMENTOS GRASOS; todos los síntomas de estómago o abdomen se agravan si come alimentos grasos o ricos, pastas.

Indigestión con VÓMITOS DE FLEMA BLANCA, ESPESA, VISCOSA COMO BABA.

Dolores de estómago con vómitos de coágulos de sangre.

Gusto amargo que viene del estómago.

Ictericia con estos síntomas. (Boericke y Dewey).

ABDOMEN Y DEPOSICIONES :

Ictericia determinada por enfriamiento por catarro de duodeno; deposiciones claras.

Insuficiencia o pereza completa de hígado, dolores del lado derecho,deposiciones amarillo pálido, constipación, lengua cargada.

Deposiciones muy claras por falta de bilis; acción insuficiente del hígado, primitiva, alimentos muy grasos y pesados.

Flatulencia, hinchazón abdominal; vientre hinchado y doloroso.

Segundo período de tiflitis o peritiflitis o peritonitis.

Diarrea por alimentación demasiado grasosa o pesada, con deposiciones pálidas ocre claro; deposiciones blancas o viscosas.

Disenteria con deposiciones viscosas.

Hemorroides que sangran fácilmente, sangre oscura, fibrinosa, coagulada.

Pequeños vermes blancos, que causan comezón en el ano (nat. phosph.).

Órganos genitales femeninos

Casos agudos de inflamación de vejiga, en el segundo período, cuando hay secreción de mucus blanco espeso.

Es excelente en CISTITIS CRÓNICA.

Inflamación de riñones.

Orina oscura, con depósito de ácido úrico.

Gran remedio en gonorrea y orquitis por tratamiento desafortunado.

Menstruación demasiado tardía o suprimida, detenida; o muy precoz; secreción menstrual excesiva, coágulos oscuros o sangre negra coagulada, como alquitrán.

Amenorrea; reglas suprimidas.

Reglas demasiado frecuentes.

Leucorrea de mucus blanco, como leche, espeso, no irritante, dulce.

Ulceración en el hocico de tenca con secreción de mucus blanco, espeso, viscoso, no irritante.

Congestión crónica de útero que está hipertrofiado, en el segundo período(calc. fluor). (Boericke y Dewey).

Aparato respiratorio

1) NARIZ : Catarro con secreción de flemas blancas, espesas.

Resfrío de cabeza con obstrucción nasal y lengua característica.

2) PECHO :Asma con trastornos gástricos y expectoración de mucus blanco, espeso, al toser.

Asma brónquica, en segundo período de bronquitis, cuando se forma flema espesa y blanca.

Silbidos asmáticos al respirar, con grandes rales producidos por el aireal pasar a través del mucus espeso, tenaz, difícil de expectorar y que tapa los bronquios; tos difícil; el niño aprieta su garganta mientras tose.

Tos gástrica, ruidosa, fuerte; tos corta, agria y espasmódica como que luce; expectoración espesa y blanca; tos crupal difícil, peruna, durante el acceso, los ojos parecen salir de las órbitas; lengua blanca, sobre todo la base.

Neumonía en el segundo período, con expectoración espesa, viscosa, blanca.

Pleuresía en el segundo período, con exudado plástico y adherencias. (Boericke y Dewey).

Aparato circulatorio

La sangre tiene tendencia a formar coágulos que obliteran arterias; embolias.

Segundo período de la pericarditis, con exudado plástico, adherencias, etc. ...

Palpitaciones por aflujo excesivo de sangre al corazón, cuando está hipertrofiado. (Boericke y Dewey).

Cuello, espalda y extremidades

Reumatismo con hinchazón periarticular.

Dolores reumáticos peor durante el movimiento (ferr. ph.) o solamente mientras se mueve, con lengua blanca.

Dolores reumáticos nocturnos, peor al calor del lecho; dolores como relámpago en coxis hasta los pies, que obligan a levantarse del lecho.

Manos rígidas al escribir.

Reumatismo crónico con hinchazón; todos los - movimientos causan dolor.

Segundo período de coxalgia.

Tenalgia crepitante; los tendones del dorso de las manos crepitan al moverse.

Úlceras en extremidades con secreción fibrinosa.

Sabañones en manos y pies.

Juanetes. (Boericke y Dewey).

Piel

Abscesos, forúnculos, ántrax, etc. en el segundo período, cuando aparece exudación intersticial e hinchazón.

Acné, eritema, eczema y otras erupciones cutáneas con VESÍCULAS QUE CONTIENEN LIQUIDO BLANCO, ESPESO.

Eczema por supresión de reglas o trastorno en su curso.

DESCAMACIÓN FURFURACEA, SECA, DE PIEL.

Se ha empleado con éxito en eczemas tenaces.

Ardor con ampollas.

En erisipela vesiculosa, es gran remedio.

Herpes.

Zona.

Gran remedio de la sicosis.

Verrugas, uña encarnada.

Útil contra edema por traumatismo.

Edema en enfermedades de corazón, hígado o riñones.

Exudación tifoidea y fibrinosa en tejido conjuntivo intersticial.

Infiltración folicular.

Hinchazón glandular escrofulosa. (Boericke y Dewey).

Fiebre

Gran remedio en fiebres inflamatorias, segundo período.

Fiebre intermitente, con los síntomas característicos del remedio.

Fiebre catarral con gran escalofrío, la menor corriente de aire le da escalofríos; debe estar al calor, cerca del fuego, en cuarto bien cerrado; está mejor al calor, en su lecho (Boericke y Dewey).

Relaciones

Responde al segundo período de todos los trastornos inflamatorios, en cuanto aparece la exudación.

Sus concordantes más próximos son : Bryon., merc., apis, thuya, spong., iod., puls., rhus tox., sulf.

El análisis de phyt., sang., still., pin. can., asclep., ailant., anis stell., hamam., cimicif., Y berb., han mostrado que encierran en cantidad notable - para la posología homeopática - kali mur.

La mayoría posee muchos síntomas comunes con esta sal.

En trastornos de trompa de Eustaquio, comparar a merc. dulc.

En sífilis es seguido por kali sulf. Y silic, en lupus, por calc. phosph.

Schüssler le asegura un rol parecido a sulf. en la terapéutica homeopática ordinaria; se utiliza como remedio de acción profunda, para combatir trastornos muy arraigados; se emplea como sulf. para preparar el camino a otros medicamentos.

Kali mur., es frecuentemente seguido por calc. sulf., que completa su acción.

Sigue a ferr. phosph., en casos de exudación fibrinosa por inflamación llegada a esta faz.

Reemplaza a nat. mur., cuando las capas profundas del epitelio, las que tocan el tejido conjuntivo subyacente, están interesadas, y hay lengua cubierta por capa blancuzca, sobre todo en su base, y secreción más o menos abundante de flema blanca, espesa. (Boericke y Dewey).

KALI PHOSPHORICUM

O fosfato de potasa, se presenta en forma de pasta delicuescente blanca, soluble en 4 partes de agua; obtenemos las diversas dinamizaciones partiendo de una solución madre del producto en agua o por trituración de las tres primeras potencias : luego se obtienen las sucesivas por diluciones hahnemannianas.

Acción general del medicamento

Kali phosph. está en la constitución de todos los líquidos y tejidos animales, principalmente cerebro, nervios, músculos y glóbulos sanguíneos.

Todas las sustancias que ayudan a la formación de tejidos conservan estasal con gran obstinación; todos los líquidos nutritivos orgánicos, la contienen : por eso kali. phosph.

ES NECESARIO A LA FORMACIÓN DE TEJIDOS.

El proceso de oxidación de la sangre por cambios respiratorios; todas las otras transformaciones químicas de la sangre y la saponificación de grasas alimenticias y su oxidación consecutiva se producen necesariamente en presencia de álcalis y entre ellos sobre todo kali phosph.; esta reacción alcalina es indispensable a gran número de procesos vitales intraorgánicos, y se encuentran álcalis en todos los líquidos humorales, sea circulando, sea contenidos en diversas cavidades del cuerpo.

Los nervios conservan mucho tiempo sus propiedades vitales si se conservan en solución de kali phosph.; esta sal es antiséptica e impide el deterioro de tejidos; LA ADINAMIA Y EL ANIQUILAMIENTO DE LA FUERZA VITAL SON ESTADOS CARACTERÍSTICOS DE ESTE REMEDIO.

El importante descubrimiento de Liebig de que el fosfato de potasa predomina en músculos, como el cloruro de sodio en sangre, nos ha sido de gran utilidad, particularmente para saber cómo proceder para la nutrición más íntima de uno u otro tejido.

Una perturbación en el equilibrio molecular intraorgánico de kali phosph., tiene las consecuencias siguientes : a) EN ESFERA MENTAL, determina, estados sintomáticos tales, como gran timidez, ansiedad, miedo, humor triste, desconfianza exagerada, nostalgia, gran debilidad de memoria, depresión, etc.

b) EN NERVIOS VASO MOTORES, influencia tal que el pulso, primeramente pequeño y frecuente, se hace enseguida muy lento; IGUALMENTE LOS ÓRGANOS SANGUÍNEOS.

c) EN NERVIOS SENSITIVOS; dolores con sensación de parálisis.

d) EN NERVIOS MOTORES, postración muscular y nerviosa que puede llegar a parálisis.

e) EN FILETES TRÓFICOS DEL SIMPÁTICO, y por su intermedio atrasa de la nutrición general que puede llegar a cesación completa de esta nutrición en una región celular circunscripta; de ahí degeneración de nervios de esta región.

ESTADOS CONSECUTIVOS A DISMINUCIÓN DE FUERZA NERVIOSA : POSTRACIÓN, FATIGA, PERDIDA DE VIGOR MENTAL, DEPRESIÓN.

Espíritu apático, con necesidad de ser excitado para actuar; agotamiento intelectual después de trabajo mental penoso o gran tensión mental; corresponde a una serie de síntomas NEURASTÉNICOS y ha conquistado contra esta enfermedad numerosos laureles.

En caso de DEBILIDAD MUSCULAR POR ENFERMEDAD AGUDA, es un potente restaurador.

ATROFIA MUSCULAR EN VIEJOS.

Consecuencias de alteración rápida de glóbulos sanguíneos y "jugo muscular", hemorragias sépticas, escorbuto, estomatitis, anginas gangrenosas, chancro fagedénico, diarrea con olor a carroña, estados adinámicos o tíficos. (Boericke y Dewey).

Características

CONSTITUCIÓN Y TIPO : Muy útil en personas hipersensibles, nerviosas, delicadas, agotadas por largos sufrimientos, penas, disgustos o trabajo prolongado; víctimas de excesos sexuales.

Personas pálidas, sensitivas, con falta de auto control; mujeres agotadas por preocupaciones de familia o lactancia; hombres de negocios agotados, intelectuales fatigados.

Presentan depresión nerviosa general, funcional y nutritiva, estado de debilidad que raya en parálisis, dolores con sensación de parálisis; dolores en nuca y occipicio, con irritabilidad general, desesperación, agitación; mente embotada pero puede reaccionar si lo despiertan; sujetos tristes, irritables, no les gusta que les hablen, se estremecen al menor ruido o cuando los tocan; presentan a menudo trastornos dispepticos, análogos a los de anacard., pero con recaída al menor desorden nervioso, orina cargada de fosfatos.

Neurastenia; restaurador de la debilidad muscular consecutiva a enfermedad grave.

Modalidades

Agravación

a) Por frío : estado general del enfermo, sus dolores y la mayoría de sus síntomas se agravan por aire frío, después de haber tomado frío, o teniendo frío, al entrar en lugar frío, por tiempo frío y húmedo; tiene mucha aversión por el aire libre y siente fácilmente frío; una corriente de aire, el aire libre, agravan su estado; sus malestares son peores en invierno.

b) POR MOVIMIENTO, EJERCICIO : muchos síntomas se agravan al levantarse de la posición sentada, por ejercicio y continuación de ejercicio después de reposo; la laxitud se agrava por todo esfuerzo físico, al subir una escalera; pero si los movimientos muy activos, el ejercicio violento o penoso son factores netos de agravación, el reposo tampoco es una fuente de alivio general : la mayoría de los malestares ESTÁN PEOR DURANTE EL REPOSO Y SE ALIVIAN POR MOVIMIENTO SUAVE, AGRADABLE, PASEO LENTO.

c) Dolores y prurito están peor de 2 A 5 DE LA MAÑANA.

Para Kent. los síntomas están peor a LA MAÑANA, AL ATARDECER Y DURANTE LANOCHÉ; muchos síntomas sobrevienen durante y después DEL SUEÑO.

d) POR TRABAJO MENTAL EXCESIVO.

e) Por ruido.

f) Cuando está solo.

f) Los síntomas son a menudo unilaterales.

Mejoría

a) POR MOVIMIENTO MODERADO, AGRADABLE, PASEO LENTO.

b) POR EXCITACIÓN ALEGRE Y COMPAÑÍA, o comiendo.

Síntomas mentales

ANSIEDAD, MIEDO NERVIOSO SIN CAUSA ESPECIAL, DISPOSICIÓN A TRISTEZA, ve todo negro, presentimientos sombríos.

GRAN DESALIENTO por su trabajo y negocios.

NO LE GUSTA MEZCLARSE CON LA MULTITUD, hablar, conversar.

FATIGA CEREBRAL POR SURMENAGE, DEPRESIÓN MENTAL; IRRITABILIDAD GENERAL, GRAN IMPACIENCIA, PERDIDA DE MEMORIA; olvida palabras o letras al escribir, o emplea términos impropios; confusión en las ideas.

TEME AL RUIDO, al que es hipersensible.

TRISTE, SIN ENERGÍA.

EL MAS PEQUEÑO TRABAJO LE PARECE SOBREPASAR SUS FUERZAS; indeciso, embrollón, cambiante.

Divaga al hablar aunque esté bien despierto (nat. mur.).

Consecuencias de una pena, susto.

Alucinaciones e ilusiones de los sentidos; nostalgia, obsesionado por visiones del pasado aunque haya transcurrido mucho tiempo.

Histeria por emoción súbita, gritos, ataques de risa, falsas impresiones.

Manía y otros desórdenes mentales.

Profunda hipocondría y melancolía.

Manía puerperal.

Suspiros y depresión.

Timidez, enrojecimiento excesivo de cara por hipersensibilidad muy marcada a la menor emoción.

Estupor y delirio suave.

Llorón y triste, de mal humor.

Bostezos histéricos.

Delirium tremens, terrores, insomnio, agitación, sospecha, divagación.

Se esfuerza para asir objetos imaginarios; aberración mental.

Reblandecimiento cerebral en el primer período, estremecimiento en cuanto lo tocan, aún muy ligeramente. Síntomas mentales en niños; gruñones, de mal humor, tristes, gritan, lloriquean, tienen terrores nocturnos; sonambulismo; muy nerviosos, se estremecen al menor ruido; hablan durmiendo; despiertan fácilmente y cuando están despiertos, quieren ser paseados de una pieza a otra.

Sueño

Insomnio después de fatiga o excitación nerviosa.

Niños que hablan durmiendo, sonambulismo.

Pesadillas, sueño sin cesar con fuego, ladrones, fantasmas, sueña que se cae, etc., terrores nocturnos; despierta de un profundo sueño, dando gritos de terror.

Sueños lascivos.

No desea levantarse a la mañana.

Bostezos histéricos; bostezo, se estira y se siente débil; sensación de vacío en boca del estómago.

Sacudidas, espasmos musculares cuando se duerme. (Boericke y Dewey).

Síntomas nerviosos

Es la principal sal constitutiva del sistema nervioso.

Sus síntomas más notables en el desequilibrio molecular son : DOLORS NEURÁLGICOS EN CUALQUIER REGIÓN, CON DEPRESIÓN, FALTA DE FUERZAS.

HIPERSENSIBILIDAD A RUIDO Y LUZ, MEJORÍA POR EXCITACIÓN ALEGRE O MOVIMIENTO MODERADO AGRADABLE, SE SIENTE MEJOR CUANDO ESTÁ EN REPOSO O SOLO : ciática, tirones dolorosos a lo largo de cara posterior de muslo, hasta rodilla, entumecimiento, gran agitación con el dolor, fatiga nerviosa.

AGOTAMIENTO NERVIOSO SIN CAUSA PLAUSIBLE, DEJA CORRER SUS LAGRIMAS, Y HACE MONTAÑAS DE UN GRANO DE ARENA.

PARÁLISIS de cualquier parte del cuerpo; parálisis PARCIAL, paraplegia, hemiplegia, parálisis facial, de vejiga, de párpado superior; parálisis PROGRESIVA, O SÚBITA; atrofia paralítica, parálisis locomotriz; pérdida de fuerza

motriz o poder estimulante motor; parálisis que PROGRESA LENTAMENTE, de desarrollo lento, con tendencia a agotamiento corporal y pérdida de sensibilidad al tacto.

Epilepsia, debilita miento, sensación de frío y palpitaciones después del ataque; ataque después de susto.

Histeria, gritos por emoción súbita, sensación de bola que sube y baja en la garganta, nerviosismo, agitación, sensación de inquietud, de temblor.

DEBILIDAD GENERAL CON AGITACIÓN NERVIOSA E IRRITABILIDAD.

Los dolores físicos parecen muy agudos, intolerables, se estrema fácilmente; temor exagerado a ladrones.

Neurastenia, especialmente después de excesos sexuales, caracterizada por GRAN IRRITACIÓN ESPINAL.

DOLORES CON ATAQUES PAROXISTICOS Y GRAN AGOTAMIENTO.

Anemia espinal por enfermedades agotadoras con dolores que hacen requebrar; peor en reposo pero también cuando comienza a moverse. (Boericke y Dewey).

Cabeza

Prurito de cuero cabelludo.

Sensación dolorosa en occipucio como si allí le tiraran los cabellos.

ANEMIA CEREBRAL, conmoción cerebral.

Estados asténicos.

DOLOR DE CABEZA NERVIOSO, CON HIPERSENSIBILIDAD A RUIDO Y CONFUSIÓN.

DOLOR DE CABEZA EN ESCOLARES, Y GENTE MUY FATIGADA; que mejora por movimiento lento.

DOLOR Y SENSACIÓN DE PESO EN REGIÓN OCCIPITAL Y ALREDEDOR DE OJOS, MEJORADA CUANDO COME, CON SENSACIÓN DE FATIGA Y LAXITUD, INCAPAZ DE REFLEXIONAR, ESTO CON LOS SÍNTOMAS MENTALES CARACTERÍSTICOS.

Dolor de cabeza con sensación de vacío en el estómago y gran laxitud.

Dolor de cabeza durante reglas con hambre.

Dolor de cabeza neurálgico; zumbidos de oídos, sensación de incapacidad para quedar de pie, con mejoría por excitación alegre; tendencia a lloriquear; mejora por comer.

Vértigo al levantarse o ponerse de pie o levantar la cabeza para mirar arriba, VÉRTIGO Y ATURDIMIENTO POR DEBILITA MIENTO NERVIOSO Y DEBILIDAD.

Severo dolor en región mastoide a izquierda, peor por movimiento y al aire libre.

Ojos

Muy abiertos, de aspecto excitados.

Vista débil; pérdida de poder perceptivo visual por debilidad, después de difteria.

Estrabismo con pérdida de acomodación de músculos oculares y para los objetos próximos.

Sensación de arena o pequeños cuerpos extraños en el ojo.

Dolores de globo ocular; dolores en bordes de párpados y sensación de ardor como por humo de tabaco.

Espasmos de párpados, aspecto deformado, desfigurado de abertura parpebral.

Manchas negras ante los ojos. (Boericke y Dewey).

Oídos

Disminución o pérdida de percepción auditiva con debilidad y agotamiento nervioso.

Zumbidos por debilidad nerviosa y que cesan cuando duerme.

Secreción de pus icoroso, fétido; ulceraciones de tímpano y supuración icorosa, saniosa, fétida, de oído medio.

Estado atrófico, en viejos, tendencia de los tejidos a apergaminarse y cubrirse de escamas.

Zumbidos y ruidos. (Mag. phosph.).

Comezón en canal auditivo.

Hipersensibilidad al ruido. (Boericke y Dewey).

Cara

Lívida, rasgos y ojos hundidos.

O cara y frente rojas, calientes, ardientes; en otros momentos pálida, demacrada.

Neuralgia facial derecha aliviada por aplicaciones frías; puntadas neurálgicas de dientes de maxilar superior a oído izquierdo; dolores en maxilares que mejoran al comer, hablar o tocar.

Pérdida de tonicidad de ciertos músculos faciales, con contorsiones.

Parálisis facial por trabajar en el agua o la humedad.

Comezón en piel, debajo de la barba; granos.

Aparato digestivo

BOCA :

HIDROA, "barritos".

Granos y costras dolorosas en labios.

Pequeñas peladuras, descamación en finas escamas en boca.

Olor ofensivo.

Saliva profusa, espesa, salada.

Disposición a sangrar las encías; enrojecimiento de borde de encías.

Encías esponjosas, se retraen.
 Estomatitis, aliento fétido, ofensivo.
 Noma, cancrum oris, ulceraciones gris ceniza.
 Fuertes dolores en dientes cariados o emplomados.
 Dolor de dientes alternado con dolor de cabeza frontal.
 Dolor de dientes nervioso en sujetos nerviosos, delicados, pálidos, emotivos, con encías que sangran fácilmente y aureola rojo vivo en su borde.
 Dentera.
 Encías esponjosas y retraídas.
 Los dientes parecen dolorosos.
 Rechinar de dientes.
 Lengua excesivamente seca a la mañana, sensación como si estuviera pegada al velo del paladar.
 Lengua blanca, cargada o cubierta por capa marrón como mostaza.
 Inflamación de lengua, con sequedad excesiva o gran agotamiento funcional de músculos; punta de lengua roja y dolorosa.
 Habla mal y de manera inarticulada.
GARGANTA Y FARINGE :
 Amígdalas grandes y dolorosas, con depósito blando, sólido, como membrana diftérica.
 Garganta muy seca, necesidad de tragar todo el tiempo saliva.
 Mucus salado, que viene de garganta.
 Gangrena en garganta.
 Crup, en el primer período, con síncope y postración nerviosa.
 Secuelas de difteria : habla por nariz, por parálisis de velo de paladar. debilidad de la vista, a parálisis de cualquier grupo muscular. (Caust).
 Estado de gangrena meligna, postración, etc. ...
ESTOMAGO :
 Muy sediento.
 Hambre excesiva, poco después de comer.
 Sensación nerviosa de vacío en boca del estómago; sensación de vacío, dolores corrosivos aliviados comiendo.
 Dolor constante en epigastrio, en un pequeño punto muy localizado.
 Puede ser útil en úlcera de estómago por los trastornos que provoca en nervios tróficos.
 Eructos de gas.
 Gastritis, cuando el tratamiento se atrasa por estado asténico.
 Indigestión, mala digestión con depresión nerviosa.
 Dolor de estómago por susto o excitación.
 Náuseas y vómitos de alimentos agrios, amargos o sangre.
 Eructos de gas, con gusto amargo y agrio.
 Vómitos verde oscuro, o violáceo con trastornos del cerebro.
ABDOMEN :
 Distendido por gases.
 Dolor de ptosis en órganos abdominales.
 Cólicos de epigastrio con necesidad ineficaz de evacuar, mejorados doblando en dos.
 Colapso con cara azulada, lívida, pulso pequeño.
 Fiebre tifoidea con gran debilidad y los otros síntomas característicos, particularmente en convalecencia.
 Sensación de debilidad en lado izquierdo de abdomen, bajo el corazón.
 Trastornos esplénicos, flatulencia con sensación de angustia en corazón y lado izquierdo de estómago.
 Abdomen hinchado, lengua seca; etc.
ANO Y DEPOSICIONES :
 Hemorroides sensibles, dolorosas, con prurito.
 Recto ardiente; sensación dolorosa después del movimiento, prolapso.
 Paresia de recto y colon, constipación.
 Deposiciones marrón oscuro, estriadas de mucus amarillo verdoso.
 Deposiciones profusas, indoloras, ofensivas e imperativas cuando come, seguidas por sensación de necesidad no satisfecha.
 Vientos ofensivos y ruidosos.
 Diarrea; deposiciones indoloras, acuosas después de susto u otra causa de depresión, con gran postración : deposiciones pútridas, como agua de arroz, sanguinolentas, con olor a carroña.
 Disentería tifoidea y pútrida.
 Síntomas coléricos.
 Aparato urinario

Incontinencia en niños un poco grandes.

Estado parético de vejiga.

Incontinencia por debilidad nerviosa.

Micciones frecuentes; emisión de orina acuosa, abundante, a menudo escozor.

Incontinencia por parálisis de esfínter de vejiga Orina amarilla comoazafrán.

Cistitis, en estado asténicos, con postración.

Hemorragias por uretra.

Comezón, en uretra; puntadas dolorosas en vejiga y uretra.

Gonorrrea con secreción de sangre.

Mal de Bright.

Diabetes con debilidad nerviosa, apetito voraz, etc.

Órganos genitales

1) MASCULINOS : DESEOS SEXUALES INTENSOS; PRIAPISMO MATUTINO o al contrario, IMPOTENCIA CON EMISIONES DOLOROSAS DE NOCHE; INSTINTO SEXUAL DEPRIMIDO, durante largo tiempo completamente dormido.

EXTREMA POSTRACIÓN Y DEBILIDAD DE LA VISTA DESPUÉS DEL COITO.

2) FEMENINOS :Reglas prematuras y profusas en mujeres jóvenes nerviosas.

También reglas irregulares; poco abundantes, de sangre muy oscura casinegra, de olor ofensivo.

AMINORA CON DEPRESIÓN MENTAL, LAXITUD Y DEBILIDAD NERVIOSA GENERAL.

Dolor de cabeza congestivo durante reglas con fatiga y somnolencia, dolores en muslos, puntadas en pelvis y senos.

Dolores en ovarios y lado izquierdo del abdomen.

Intenso dolor de sacro.

INTENSO DESEO SEXUAL DESPUÉS DE REGLAS.

Cólicos menstruales en mujeres y niñas nerviosas, lloronas; HISTERIA; sensación de bola que sube y baja en garganta; nerviosismo.

Leucorrea amarillenta, ardiente, acre, que irrita la piel, hasta formarse ampollas color naranja.

Amenaza de aborto en mujeres nerviosas.

Manía puerperal.

Fiebre durante el parto, fiebre puerperal.

Dolores de parto débiles e ineficaces; falsos dolores de parto.

Parto demasiado lento, en mujeres de constitución débil.

Mastitis, cuando el pus es marrón, de apariencia sucia y hay estado adinámico marcado (Boericke y Dewey).

Aparato respiratorio

1) NARIZ : Epistaxis en sujetos débiles, de constitución delicada, predispuestos a sangrar fácilmente por nariz.

Ozena, costras amarillas, ofensivas, ulceraciones.

Secreción espesa y amarilla.

Estornudos a la menor exposición al frío.

Costras amarillas que caen de mucosa nasal, cuando se suena y producen epistaxis.

Mucus espeso que cae en faringe.

2) LARINGE :Ronquera, pérdida de voz; parálisis de cuerdas vocales, Crup, en el primer período cuando hay gran postración nerviosa, o en el último cuando hay extrema debilidad, palidez o lividez de cara.

Coqueluche en sujetos muy nerviosos con extrema fatiga.

3) PECHO :Asma, después de comer, por poco que sea.

Asma (dar fuertes dosis y a menudo repetidas, a la 3a. X), con depresión marcada de sistema nervioso.

Asma primaveral.

Tos por irritación de tráquea que parece dolorosa.

Expectoración espesa, amarilla, salada, fétida.

Pecho muy doloroso.

Edema agudo de pulmón, tos espasmódica con esputos espumosos, gran cantidad de líquido seroso se produce en exceso y provoca sofocación marcada.

Respiración corta al subir escaleras, al menor ejercicio.

Aparato circulatorio

Sensación de debilidad en personas nerviosas; o vértigo por debilidad del corazón.

Desfallecimiento cardíaco por susto, fatiga, etc. ...

Acción intermitente del corazón con hipersensibilidad nerviosa, por emociones, contrariedades, preocupaciones, con palpitaciones.

Trastornos funcionales del corazón con debilidad, ansiedad, estado nervioso.

Palpitaciones por pequeña emoción o al subir escaleras.

Pulso intermitente, irregular o más débil que el normal.

Palpitaciones después de fiebre reumática, con agotamiento.

Circulación perezosa.

Anemia, pobreza de sangre, palpitaciones, insomnio y agitación.

Espalda y extremidades

Anemia espinal.

Reblandecimiento idiopático de cuerda espinal; trastornos en la marcha; pérdida del poder de movimientos, de tonicidad, tiembla, tropieza.

Debilidad reumática o paralítica con entumecimiento, rigidez después del reposo pero mejora después de ejercicio moderado.

Dolor de espalda y extremidades aliviado por movimiento; dolor entre los hombros.

Puntas de dedos como dormidas.

Comezón en palma de manos y planta de pies.

Comezón en piernas de noche con entumecimiento y debilidad.

Ardor en pies que no quedan quietos, sensación de inquietud en pies.

Dolor peor al levantarse o por ejercicio violento.

Sensación de magulladura y de dolor en partes enfermas; de dislocamiento.

Reumatismo agudo, los dolores desaparecen por movimiento; son peores mañana, después de reposo o al dar los primeros pasos; las partes dolorosas parecen rígidas; ejercicio y fatiga agravan.

Rigidez, tendencia a parálisis.

Dolores en caderas.

Dolores de parálisis, tirones en planta de pies.

Sabañones en dedos grandes.

Debilidad muscular después de enfermedad grave.

Piel y tejidos

Hipersensible.

Eczema con debilidad nerviosa.

Panadizos, abscesos, forúnculos cuando el pus se hace fétido.

Pénfigo maligno, ampollas, pústulas en todo el cuerpo, con agua, piel arrugada, marchita.

Costras grasas, de olor ofensivo.

ALOPEZIA EN AREAS.

Secreciones irritantes de piel.

PRURITO EN INTERIOR DE MANOS Y PLANTA DE PIES, cuando la piel está muy gruesa.

COMEZÓN, con sensación de carne de gallina, una fricción suave desagradable, pero una fuerte causa dolor e irritación.

Granos de viruela, pútridos.

Sabañones en dedos grandes, manos y orejas.

Pinchazos y prurito doloroso.

Pústulas malignas.

Boericke y Dewey enumeran bajo el título :Tejidos, una serie de síntomas de mucho valor característico, son los siguientes : Estado anémico de tejidos : ADELGAZA SIEMPRE; ATROFIA, enfermedades agotadoras con DEPOSICIONES PÚTRIDAS.

Hemorragias, sangre oscura, fluida, no se coagula fácilmente, pútrida.

DEBILIDAD GENERAL Y AGOTAMIENTO.

PERSONAS QUE SUFREN POR SUPRESIÓN DE NECESIDADES SEXUALES O ABUSOS.

EXUDACIONES SEROSAS, ICOROSAS, SANIOSAS, SUCIAS Y OFENSIVAS,

CORROSIVAS, IRRITANTES.

ESTADO GANGRENOSO.

Mortificación, en el primer período, cáncer; es útil para apaciguar dolores, disminuir secreciones ofensivas y en caquexia.

Raquitismo con deposiciones pútridas.

Escorbuto con estado gangrenoso.

Hemorragias sépticas.

SUPURACION CON SECRECIÓN DE PUS SUCIO, FÉTIDO, DE OLORES OFENSIVOS, ICOROSO.

Leucemia esplénica, tifus, estados pútridos.

ESTADO ATROFICO DE LOS VIEJOS, TEJIDOS SECOS, ARRUGADOS CON FALTA DE VITALIDAD.

SECRECIONES, DESCARGAS CON OLORES A CARROÑA.

Fiebre

Fiebre intermitente; TRANSPIRACIÓN FÉTIDA, profusa, debilitante.

Tifus, fiebre maligna, cerebral, nerviosa, pútrida, o calambres.

Excelente en fiebre tifoidea, fiebres gástricas o enteríticas, cuando hay lengua seca, marrón, petequias, insomnio, estupor, delirio, etc.; mejora todos los síntomas tifoideos y malignos.

Temperatura elevada, fiebre alta.

Fiebre escarlatina, ESTADO PÚTRIDO DE GARGANTA, AGOTAMIENTO, ESTUPOR, etc. ...

TRANSPIRACIÓN EXCESIVA, AGOTADORA, FÉTIDA, TRANSPIRACIÓN CUANDO COME

CONSENSACIÓN DE DEBILIDAD EN ESTOMAGO.

Es útil en "hay-fewer" para irritabilidad nerviosa. (Boericke y Dewey).

Relaciones

Los remedios que más se le parecen son : Rhus tox., y phosph.

Los síntomas nerviosos de puls., parecen depender de la presencia de kaliphosph., entre las partes constituyentes de esta planta; el estado mental de puls. se encuentra también en kali phosph., (phytol., tiene muchos síntomas comunes con kali phosph., (compararlos en ciática).

Ignat. : contiene probablemente cantidades apreciables de kali phosph., tiene síntomas histéricos, muy parecidos.

Kali phosph., tiene sobre nervios acción sedante en relación con la deignat., coffea, hyosc., cham.

En dolores de cabeza menstruales, comparar con zincum, cimicif., gels., cycl., etc.

En trastornos de vejiga, kali phosph., encuentra a menudo un complementario en magn. phosph., éste se aplica más a síntomas espasmódicos, y kali phosph., a paralíticos.

Al principio de la parálisis de cerebro, cuando hay un poco de irritación renal, comparar zincum ph.

En hemorragias, sean de sangre brillante o rojo oscuro, pero líquida, que coagula mal, es bien seguido por natr. mur., y nit. ac.

Después de enfermedades agotadoras, las diversas variedades de hongos comestibles, que contienen grandes cantidades de kali ph., devuelven pronto la fuerza muscular.

En desórdenes mentales, comparar cycl., que a menudo los corrige.

Comparar kali mur., en fiebre puerperal.

En trastornos post disentericos, comparar lach. y caust.; en estados gangrenosos, kali bichr.

Con kali phosph., habrá que estudiar los grupos siguientes muy relacionados con él : PARA SISTEMA

NERVIOSO : cimicif., hyosc., stram., zinc., silic., ignat., anac., conium, staph., para "DEGENERACIÓN"

SANGUÍNEA, bapt., mur. ac., lach., crotal., ars., carbo, china. (Boericke y Dewey).

KALI SULPHURICUM

O Sulfato neutro de potasa, (SO₄ K₂) se presenta en forma de cristales rómbicos, exagonales, duros, brillantes, transparentes, de sabor amargo; soluble en 10 partes de agua.

Preparamos las diversas dinamizaciones, partiendo de una solución madre 1/10, por trituración de las tres primeras, según procedimiento Hahnemanniano.

Acción general del medicamento

Medicamento de acción muy profunda.

Schüssler, primero- describió sus propiedades curativas y Boericke y Dewey, después en "LOS DOCE REMEDIOS DE LOS TEJIDOS", lo estudian perfectamente desde el punto de vista bioquímico.

Describen los síntomas de casos curados durante años y justificado por el estudio patogenético de los remedios, sulph., y caust., que entran en la constitución de kali sulph.

Muchos de esos síntomas aparecen en forma de agravaciones y algunas de éstas no son otra cosa que síntomas curados.

Por supuesto que esto merecería ser estudiado en numerosas experimentaciones.

Pero, si el lector sabe servirse del remedio con atención, según las indicaciones que siguen, se asombrará de su profundidad de acción y si emplea diluciones altas le sorprenderá el largo efecto de cada dosis (Kent).

Según Schüssler, se aplica a FUNCIONES DE PIEL Y EPIDERMIS.

Una perturbación en el equilibrio molecular de kali sulf., marcada por deficiencia de esta sal, determina : DEPOSITO VISCOSO Y AMARILLENTO SOBRE LENGUA; SECRECIÓN VISCOSA, CLARA O NETAMENTE AMARILLA O VERDOSA, O ACUOSA EN CUALQUIER MUCOSA; DESCAMACIÓN EPITELIAL O EPIDERMICA.

La coloración amarilla se debe probablemente a transformación regresiva, es decir, degeneración grasosa, de productos inflamatorios y detritus, de un epitelio gastado, etc...

Los sulfatos y el óxido de hierro, sirven en la naturaleza al transporte del oxígeno y si uno de ellos entra en contacto con una sustancia orgánica agotada, le da su oxígeno y se forma sulfato de hierro.

Este sulfato de hierro se descompondrá por el oxígeno del aire en ácido sulfúrico y óxido de hierro, que colocado en condiciones favorables, transportará de nuevo el oxígeno adonde sea útil.

Entre estos sulfatos, kali sulf. juega probablemente un rol de primer orden porque se lo encuentra en células y líquido intercelular de músculos, nervios, epitelio y glóbulos sanguíneos.

Es el gran vehículo transportador de oxígeno.

El oxígeno tomado por el hierro contenido en glóbulos sanguíneos, es transportado al contacto de todas las células del organismo, por la acción recíproca de kali sulph. y ferrum.

Cada célula saca los elementos necesarios para su desarrollo de la influencia vital del oxígeno.

Pero la acción continua del oxígeno actúa sobre las bases orgánicas de la célula; de ahí la desintegración de sus elementos constitutivos.

Una deficiencia de kali sulph. según su extensión y el sitio donde tenga lugar, determinará : sensación de fatiga y desfallecimiento, vértigo, frío, escalofríos, palpitaciones, timidez, temor, melancolía, odontalgia, cefalea, dolor de riñones, intermitente y que cambia de sitio; estos dolores se agravan en habitación cerrada, por calor, de noche; mejoran al fresco, al aire libre rico en oxígeno.

"Cuando las células epiteliales o epidérmicas no se nutren bastante de oxígeno, mueren y forman descamaciones".

Si kali sulph. les aporta suficiente oxígeno, se formarán nuevas células que precipitan por su actividad la caída de las viejas y la restauración de ese tejido.

Es aplicable a la tercera faz de inflamaciones en período regresivo.

Puesto que los sulfatos son producto característico de la oxidación de tejidos y el potasio tiene su esfera de acción en sus partes sólidas, que la sal resultante es una de las principales partes que constituyen esos tejidos, de ahí podemos deducir su homeopaticidad.

Trastornos con descamación masiva de epidermis; secreciones mucosas amarillas.

Aumento de temperatura de noche, con agravación al atardecer.

Otra indicación característica es mejoría por frío, al aire libre; enfermedades por erupción mal suprimida.

Trae transpiración si ferr. phosph. no lo consigue. (Boericke y Dewey).

Características

1) SECRECIÓN AMARILLA O VERDOSA EN MUCOSAS : Es útil en afecciones catarrales con secreción purulenta espesa, amarilla o verdosa, secreción viscosa, o amarilla, acuosa, fluida (Kent).

Tos gruesa, con rales mucosos.

2) DOLORS NEURALGICOS EN CUALQUIER PARTE DEL CUERPO, TENDENCIA A CAMBIAR DE LUGAR : DOLORS INESTABLES, ERRATICOS : Dolores ERRANTES, ardientes, CORTANTES, constrictivos, EN PUNTOS, DESGARRANTES, DOLORS ULCERATIVOS; dolores desgarrantes de arriba a abajo, en miembros; dolores desgarrantes en músculos y glándulas.

Mejoran por movimiento, caminando, al aire libre; se agravan en cuartos calientes, sentándose, o acostándose, en reposo, de cualquier clase (Kent).

3) SENSACION DE PULSACIONES : en cualquier parte del cuerpo. (KENT).

4) LOS REMEDIOS, AUN BIEN ELEGIDOS, NO TIENEN EL EFECTO SUFICIENTE que se puede esperar en ellos (Kent).

Modalidades

Agravación

a) POR CALOR, en habitación caliente; si está sofocado toma muy fácilmente frío, si tiene calor, no puede desabrigarse sin enfriarse; por cobijas, lecho y baño calientes y ropa abrigada.

b) AL ATARDECER Y LA NOCHE.

c) Por esfuerzo físico y sofocándose.

d) POR REPOSO; quiere acostarse pero el lecho lo agrava, necesítamoverse.

e) Por tacto.

f) Muchos síntomas aparecen al despertar.

Mejoría

a) AL AIRE LIBRE, AL AIRE FRESCO, y hasta frío.

b) POR MOVIMIENTO, CAMINANDO; pasear mejora muchos síntomas.

c) Por ayuno, que mejora muchos síntomas.

Síntomas mentales

Si el conjunto de sus modalidades recuerda a puls., contrariamente a éste, kali sulph., ES MUY IRRITABLE, fácil de encolerizar, obstinado.

Parece sin cesar, pensar en algo lejano.

ANGUSTIADO de noche, en el lecho, durante la noche, al despertar.

Aversión por trabajo, negocios, sociedad (como puls.).

Se concentra difícilmente y le falta confianza en sí mismo.

Confusión mental, de noche y de mañana, en cuarto caliente, mejorada al aire libre.

LENTITUD MENTAL, desanimado y descontento.

MUY EXCITABLE Y EL ESFUERZO MENTAL AGRAVA esta excitabilidad.

Terrores nocturnos, miedo de morir, de caer, a la gente; se asusta por bagatelas y olvida lo que iba a hacer o decir.

Siempre apurado, como enervado; impaciente e impetuoso.

Tendencia a ataques de nervios y excitación al atardecer, mente activa.

No se resuelve a actuar.

Muy irritable a la mañana al despertar, al atardecer y durante reglas.

Invierte palabras al escribir.

Humor cambiante.

Inquietud durante reglas.
 Abatido mañana y noche.
 HIPERSENSIBILIDAD al ruido.
 Síntomas mentales provocados por excesos sexuales.
 TIMIDEZ GENERAL, LLANTOS. (KENT).
 Sueño
 Sonambulismo.
 Se asusta fácilmente, propenso a miedo al dormirse, y durante el sueño.
 Habla dormido.
 Gritos; propenso a sueños que le impresionan fuertemente. (KENT).
 Cabeza
 Descamación abundante de cuero cabelludo, húmeda, pegajosa.
 Caspa.
 Erupciones en piel de cráneo, costras, eczema, granos húmedos, pegajosos, escamas.
 Sensación de plétora en cabeza, los cabellos caen.
 Calor en cabeza si está en cuarto caliente; calor EN FRENTE; tufaradas de calor; sensación de pesadez de cabeza, de mañana, en frente y occipucio.
 Numerosos dolores de cabeza.
 Dolores de cabeza a la MAÑANA al despertar, AL ANOCHECER Y LA NOCHE, agravado por corriente de aire, durante enfriamiento, tomando frío, durante coriza, tosiendo, después de comer, cuando tiene calor, en HABITACION CALIENTE, por sacudidas, durante reglas, por movimientos de cabeza, por presión; mejora al aire libre, al aire frío, acostado.
 Dolor de cabeza reumático de noche, agravado en cuarto caliente, almover la cabeza lateralmente o hacia atrás, dolores de cabeza catarrales, gástricos.
 La agravación del dolor de cabeza por movimiento es una excepción, y será interesante saber que aportará a ese sujeto una experimentación más completa y profunda.
 Dolores latentes, agravados al mover la cabeza, después de dormir, estornudando, estando de pie, inclinándose, haciendo esfuerzo con los ojos, en cuarto caliente; son violentos, caminar al aire libre los mejora.
 El dolor se extiende a ojos y frente, dolor en la frente mañana y noche, agravando después de comer.
 DOLOR ARRIBA DE LOS OJOS.
 Dolor en OCCIPUCIO, A LOS LADOS DE LA CABEZA, y temporales.
 Los dolores son PROFUNDOS, ardientes, estallantes, tirantes, en sacudidas, punzantes, en cabeza y lados de la cabeza, temporales, vértice.
 Latidos en cabeza, y lados de la cabeza, principalmente DERECHO.
 ATURDIMIENTOS.
 El vértigo es un rasgo notable de noche, en cuarto caliente, se agrava después de comer durante el dolor de cabeza, y mirando arriba; náuseas.
 Está obligado a acostarse; los objetos giran alrededor; se agrava sentado, al levantarse y estando de pie; mejora al aire libre; sensación de caer hacia adelante; tambalea (Kent).
 Ojos
 Costras amarillas en párpados.
 Secreción purulenta amarillenta o verdosa.
 Conjuntivitis, oftalmia en recién nacidos.
 Abscesos de córnea.
 Hipopion.
 Opacidad de cristalino; catarata.
 Oídos
 Sordera por congestión, carie de tímpano, o con catarro e hinchazón de mucosa de trompa de Eustaquio, agravación en cuarto caliente; al mismo tiempo, capa amarilla pegajosa, sobre lengua.
 Dolor de oídos con secreción acuosa o de materia amarilla.
 Secreción de líquido claro, amarillo brillante o verdoso, después de inflamación (espesa como pus : calc. sulph.).
 Dolor de oído, bajo la oreja; puntadas, dolores lancinantes, sensación de tensión y dolores agudos en mastoides.
 Otorrea de olor fétido.
 Excrescencias polipoideas cerrando el meato.
 Cara
 Pálida o roja, rasgos descompuestos.
 Neuralgia facial, agravada en cuarto caliente o a la mañana, aliviada al frío o al aire libre.
 Aparato digestivo
 BOCA :
 Hinchazón de labio inferior.

Sequedad y descamación en anchas escamas del labio inferior.
 Calor ardiente en la boca.
 Gusto insípido, dulzón.
 Labios, lengua y encías blancas.
 Ha perdido el gusto.
LENGUA CUBIERTA POR CAPA AMARILLA VISCOSA, a veces con punta blancuzca.
 Dolor de dientes, pero en la mañana y por calor, mejorado al frío o al aire libre.
 Dolores crónicos de encías.
ESTOMAGO :
 Calor ardiente en el estómago; sed, náuseas y vómitos.
 Catarro crónico de estómago, con lengua cargada, cubierta por capa amarilla.
 Indigestión con sensación de presión, peso y plenitud en boca del estómago; Dolores y regurgitaciones acuosas en la boca.
 Sensación de desfallecimiento en estómago.
 Dolores como cólicos, de estómago, dolores como calambres.
 Cuando mag. phosph. no ha producido su efecto.
 Dolor profundo de estómago.
 Fiebre gástrica con elevación de temperatura a la mañana y caída de temperatura a la tarde; no hay sed.
 Teme beber.
 Ictericia después de catarro gastro duodenal.
ABDOMEN Y DEPOSICIONES :
 El abdomen parece frío al tacto.
 Timpanismo, calambres con signos inminentes de peritonitis.
 Abdomen tenso.
 Dolores como cólicos; dolores como cólicos flatulentos, por gran calor, excitación, ejercicio violento, seguido de enfriamiento.
 Los gases que escapan del intestino tienen olor sulfuroso.
 Hemorroides internas y externas con lengua y secreción característica.
 Diarrea amarilla, viscosa, acuosa, purulenta, con lengua característica.
 Fiebre tifoidea o enterítica con aumento de temperatura de noche y disminución de día.
 Síntomas coléricos; deposiciones líquidas, negras, ofensivas.
Organos genitales
 1) **MASCULINOS :** Gonorrea con secreción pegajosa, amarilla o verdosa.
 Balanitis, metritis crónica.
 Orquitis, después de supuración brusca y mal hecha de secreción blenorragica.
 2) **FEMENINOS :** Leucorrea, secreción amarilla o verdosa, viscosa o acuosa.
 Menstruación muy tardía y poco abundante, con sensación de pesadez y plenitud en abdomen, dolor de cabeza y lengua cargada amarillenta.
 Metrorragia.
Aparato respiratorio
 1) **NARIZ :** Resfrío con secreción amarilla, viscosa o acuosa, generalmente peor de mañana o en cuarto caliente; secreción por nariz muy amarilla o amarillo verdoso; sigue bien a ferr. phosph., en resfrío, si éste no facilita la respiración y la mucosa permanece seca.
 Viejos catarros con secreción amarillenta, viscosa.
 Obstrucción nasal con secreción amarilla por nariz.
 Pérdida de olfato.
 Ozena.
 2) **PULMONES :** Asma brónquica con expectoración amarilla, agravada en estación cálida; o atmósfera caliente.
 Bronquitis, expectoración verdaderamente amarilla o verdosa, viscosa o acuosa y profusa.
 Tos peor de mañana, con sensación de calor.
 Neumonía.
 Grandes rales pero no puede expectorar mucus; esputos acuosos.
 Cuando tose el mucus desciende y generalmente lo traga, tos dura, ronca, como en crup.
GRANDES RALES EN PECHO, RALES MUCOSOS CON TOS.
 Tercer período de la tos catarral con expectoración amarilla, fácil.
 Neumonía con respiración sibilante; tos con expectoración de flema amarilla, que se desprende con ruidos, o de materia acuosa.
 Sensación de sofocación en atmósfera caliente.
 Deseo de aire frío.
 Sensación de fatiga en laringe.

Ronquera crupal, hablar lo fatiga; Ronquera después de estar al frío.
 Coqueluche con expectoración amarilla, viscosa.
 Aparato circulatorio
 Pulso rápido con palpitaciones.
 Pulso apenas perceptible.
 Espalda y extremidades
 Neuralgias o dolores reumáticos en espalda, nuca, o miembros, periódicos, peor de mañana o en cuarto caliente y netamente mejorados al aire frío.
 Dolores reumáticos en cualquier articulación, cambiantes, vagabundos, que desaparecen bruscamente, van de una articulación a otra y con las modalidades características.
 Erupción de escamas húmedas en manos, mejorada por agua fría.
 Piel
 Sensación de ardor, después de rascarse.
 Piel a menudo fría.
 DESCAMACIÓN; la piel descama fácilmente y PONE AL DESCUBIERTO UNA SUPERFICIE PEGAJOSA.
 Erupciones, ampollas, sensación de ardor, sequedad, HUMEDAD; eczema, secreción amarillo verdosa, acuosa, herpética.
 Erupciones con escozor y comezón.
 Erupciones escamosas con base húmeda.
 Eczema, cuando la secreción es amarilla o verdosa acuosa, o ha sido suprimida bruscamente.
 Retroceso brusco de rash por enfriamiento u otra causa, cuando la piel está seca.
 Granos erisipelatosos; favorece la caída de costras.
 Erupción papulosa, ardiente, pruriginosa.
 Consecuencias cutáneas de intoxicación de rhus tox., urticaria.
 En viruela, favorece la caída de costras y formación de piel sana.
 Erupciones escamosas en palma de manos, irritación de piel en niños; viejos empeines.
 Ulceraciones tuberculosas con secreción continua de pus amarillento.
 Ulceras sangrantes, ardientes, secreción sanguinolenta, amarillenta; ulceraciones indolentes, o con puntadas, pulsaciones.
 Estado enfermizo de uñas, mal crecimiento. (Silic.).
 Piel inactiva, sin ninguna tendencia a transpirar.
 Fiebre
 La temperatura aumenta al anochecer; hasta media noche y cae enseguida.
 Kali sulph., favorece la transpiración, de ahí la necesidad de darlo frecuentemente, con bebida caliente, y abrigar al enfermo.
 Fiebre intermitente con lengua cargada de capa amarilla viscosa.
 Fiebre por envenenamiento toxémico de sangre, fiebre gástrica, enteritis tifoidea; fiebre escarlatina en el período de descamación, transpiración fría.
 Relaciones
 El remedio más parecido a kali sulph., es puls. su análisis químico revela entre sus constituyentes kali phosph., kali sulph., Y calc. phosph.; los síntomas mucosos de puls. se deberían a kali sulph. y sus síntomas mentales y nerviosos a kali phosph., pero esto es una hipótesis.
 Sea como sea, se parece mucho a puls. y como tiene acción más profunda, a veces se emplea como complementario.
 Kali sulph., actúa a menudo después de kali mur.
 Para prurito y enrojecimiento de piel comparar a acet. ac., ars., calc. carb., dolich., hep. sulf., puls., rhus tox., sepia, sílicea, sulph., urtica. En sordera, dolores gástricos, rales, y exudaciones mucosas comparar a nat. mur., pero en este las exudaciones son más acuosas.

KALMIA LATIFOLIA

Planta de hojas largas, llamada también laurel de las montañas, originaria de Carolina y Virginia.
 Hacemos con las hojas recién recolectadas en el momento de la floración, una tintura madre con la que obtenemos las otras dinamizaciones por diluciones Hahnemannianas sucesivas.
 Acción general del medicamento
 Es uno de los grandes remedios DEL REUMATISMO, dolores que cambian rápidamente de lugar, van de arriba a abajo, y se agravan por movimiento, a veces son fulgurantes.
 Tiene acción marcada sobre EL CORAZÓN, disminuyendo la fuerza y frecuencia de latidos.
 Características
 1) DOLORES REUMÁTICOS : gotosos o neurálgicos, internos QUE CAMBIAN RÁPIDAMENTE DE LUGAR, van de una articulación a otra; articulaciones calientes, rojas, hinchadas, estos dolores VAN DE ARRIBA A ABAJO, del centro a extremidades; descienden a lo largo de brazos, espalda, piernas, desde hombros hasta dedos, de caderas hasta dedo grande.

Son LANCINANTES, A VECES COMO RELÁMPAGOS, fulgurantes; a veces acompañados o seguidos de ENTUMECIMIENTO.

Los dolores que cambian rápidamente de sitio lo relacionan con bryon., colch., kali bichr., kali sulph., lac. can., mang. acet., sulph., puls.

Por sensación de entumecimiento comparar con aconit.

2) SÍNTOMAS CARDIACOS POR ATAQUE DE REUMATISMO, ALTERNANDO AMENUDO CON DOLORES ARTICULARES : Es un medicamento de valor para reumatismo, cuando afecta el corazón.

Los dolores cardíacos son agudos, cortan la respiración; son tan intensos que sofocan; irradian hacia abajo, hasta estómago o abdomen; pulso lento, casi tan lento como digit., kalmia es especialmente útil cuando la gota o el reumatismo dan una metástasis en el corazón, en particular después de aplicaciones externas intempestivas de un medicamento que no sea homeopático al caso, sobre la articulación enferma.

Modalidades

Agravación

a) POR MOVIMIENTO; el movimiento provoca o agrava el dolor; el menor movimiento provoca vértigo; incapaz del menor trabajo mental cuando se mueve; pero acostado de espaldas, sin moverse, perfectamente tranquilo, la mente trabaja bien y con claridad; con el menor movimiento, aún de la mano, vértigo y confusión mental sobrevienen.

b) LOS DOLORES SOBREVIENTEN CON EL SOL; DE MAÑANA, AL LEVANTARSE AUMENTAN HASTA MEDIO DÍA LUEGO DISMINUYEN POCO A POCO Y DESAPARECEN AL ACOSTARSE (glonoin., nat. mur., nat. calc., sang., spig. tabac.).

c) DURANTE LA PRIMERA PARTE DE LA NOCHE : los dolores son peores en ese momento.

d) ACOSTÁNDOSE DEL LADO IZQUIERDO, las palpitaciones se agravan al aire libre.

e) Mirando abajo; inclinándose hacia adelante.

Kali carb., tiene lo contrario.

Cabeza

Dolores en frente y temporales, después hasta nuca y dientes; confusión de cerebro; cefalalgias asociadas a trastornos cardíacos.

Dolor de cabeza que sobreviene todos los días si hay sol brillante, pero no si el día es brumoso o nublado (Kent).

Vértigo por el menor esfuerzo, el menor movimiento que perturba la circulación cerebral por gran susceptibilidad del corazón enfermo al menor esfuerzo.

Acostado, facultades mentales y memoria son perfectas, pero al tratar de moverse tiene vértigo; si se obstina en moverse tendrá náuseas, vómitos, palpitaciones violentas (Kent).

Vértigo al inclinarse o mirar abajo (spig.) - (Allen).

Expresión inquieta de la cara con metástasis del reumatismo al corazón; cara hinchada, congestionada, con vértigo (Kent).

Ojos

Puntadas dolorosas en ojo y órbita derechos, (izquierdos spig.); entumecimiento, rigidez de músculos en esa zona; el dolor empeora al mover los ojos (spig); los dolores empiezan al alba, están en el paroxismo a medio día y cesan a la puesta del sol. (Nat. mur.) (Allen).

Trastornos de visión con nefritis, dolores lancinantes, desgarrantes, en ojos, durante ataque de nefritis en embarazo.

Conviene a neuralgias de ojo, cara, con dolores violentos, desgarrantes en cara; a veces con agravación nocturna y otras al anochecer; otras aparecen y desaparecen con el sol (Kent).

Aparato digestivo

Dolores en boca del estómago, agravados inclinándose adelante, mejorados estando de pie.

Náuseas, vómitos.

Aparato urinario

Deseo frecuente de orinar, con puntadas dolorosas en región lumbar.

Albuminuria, trastornos renales ligados a afección cardíaca.

Aparato circulatorio

Corazón agitado con ansiedad; latidos tumultuosos, rápidos y visibles, angustia cardíaca.

Taquicardia dolorosa; puntadas dolorosas a través del pecho, un poco arriba del corazón, hasta el omoplato.

Corazón tabáquico.

METÁSTASIS DEL REUMATISMO AL CORAZÓN; los síntomas del reumatismo alternan con los cardíacos.

DOLORES REUMÁTICOS CON TRASTORNOS CARDIACOS.

Pulso débil, apenas perceptible, LENTO (digit., apocyn. can.) sólo 30 a 40 latidos por minuto.

Palpitaciones muy marcadas cuando está acostado del lado izquierdo, disminuidas si se acuesta de espaldas, y a veces sentándose; aumentadas si se inclina hacia adelante.

Espalda y extremidades

Sus síntomas se muestran sobre todo en músculos, tendones; a lo largo de nervios donde hay numerosos dolores reumáticos.

Estos dolores son agudos, van del centro a extremidades, varían desitio y se agravan por movimiento. A veces son fulgurantes, pasan como un relámpago; otras desgarrantes, siguiendo un trayecto nervioso, el crural o ciático por ejemplo.

Dolores sordos, desgarrantes, opresivos, se agravan por movimiento, VAN DEMIEMBROS SUPERIORES A INFERIORES, en reumáticos; a veces se agravan en la primera parte de la noche (Kent).

Dolores nocturnos en huesos, tibias particularmente como si le arrancaran el periosteo.

Esta agravación nocturna es compartida por kalmia con los otros medicamentos de la diatesis sifilítica (Kent).

Dolores lumbares; reumáticos en deltoides, particularmente derecho (sang. : izquierdo : ferr. met., sticta pulm.).

Fatiga, debilidad de todos los miembros; la fatiga es a veces con el dolor neurálgico reumático el único síntoma general; al mismo tiempo, amenaza de complicaciones cardíacas; está completamente agotado, continuamente fatigado (Kent).

Hormigueo en dedos de mano izquierda con sensación de entumecimiento y síntomas cardíacos (aconit.; puls; phytol.) que afecta la mano derecha; actea rac., que tiene sensación como si el brazo estuviera pegado al cuerpo; (rhus tox.).

Piel

Cuando una erupción cualquiera ha desaparecido bruscamente por tratamiento erróneo, o por tomar frío, pueden aparecer dolores violentos a lo largo de los nervios que inervan la región de la erupción, y continúan hasta que la erupción vuelve; estos dolores intolerables que parecen pellizcar los nervios, aparecen y desaparecen bruscamente, kalmia es útil en estos casos, si los otros síntomas concuerdan (Kent).

Relaciones

Complementarios

Benz. acid.

Sigue bien a spig. en enfermedades del corazón.

KREOSOTUM

Producto de destilación del alquitrán, descubierto en 1830 por Reichenbach, se presenta con aspecto de líquido aceitoso, incoloro, inflamable, de densidad algo superior al agua destilada.

Casi insoluble en agua, muy soluble en éter, alcohol y sulfuro de carbono.

Preparamos las diferentes dinamizaciones, partiendo de una primera dilución decimal o centesimal, según método Hahnemanniano, con la substancia bien purificada y alcohol a 95°.

Acción general del medicamento

Debe su nombre "Kreas" carne y "oxo" salvo, a la propiedad que comparte CON EL ARSÉNICO Y EL SUBLIMADO, de preservar las materias animales de la putrefacción.

Es suficiente bañar en agua muy ligeramente Kreosotada, carne o pescado que empiezan a corromperse para quitarles inmediatamente el olor pútrido y darles el sabor a carne o pescado ahumado.

El uso diario y prolongado de este género de alimentos, puede traer inconvenientes para la salud; una especie de escorbuto, carie de dientes, aliento pútrido, constipación, malestar general y a la larga verdadera alteración de los humores.

No es raro constatar violentas intoxicaciones, en ciertos casos seguidas de muerte, por ingestión de carnes ahumadas (Teste).

Es un tóxico potente que así como posee poder antiséptico manifiesto, puede matar a dosis relativamente débil.

Orfila, cuenta que un niño de 2 años, que había absorbido 20 gotas de Creosota, murió en 17 horas.

Su acción, que Teste relaciona a la de merc., se extiende también a todo el organismo sobre el que ejerce un poder desorganizador casi tan potente como merc.

Parece actuar de manera preponderante SOBRE MUCOSAS que, bajo su influencia, se inflaman, se hinchan; sus secreciones normales toman mal olor y se cubren de muco-pus blanco, amarillento, abundante, fétido, a veces sanguinolento, siempre excoriente y ardiente, y dolores ardientes.

Las mucosas de órganos genitales femeninos y tubo digestivo, son las más afectadas y particularmente las de la boca que parece ser lugar de elección para este veneno que tiene acción tan especial en aparato dentario que es capaz de curar los más diversos accidentes relacionados con trastornos de dentición; por eso influencia favorablemente la evolución dentaria y cura todos los accidentes que puede provocar como tos, convulsiones, etc.

Siempre que el niño presente sus características generales.

Bajo su acción, LA EPIDERMIS presenta lesiones papulosas pustulosas o ulcerosas tenaces, con secreción icorosa y fétida, excoriente y ardiente, parecidas a las de diatesis escrofulosas y sifilíticas.

EL TEJIDO LINFÁTICO está también bajo la esfera de acción de la CREOSOTA por eso los sujetos de temperamento leucoflemático sienten mejor su influencia bienhechora en dosis homeopáticas.

LAS VÍSCERAS sufren también su acción irritante, particularmente LOS RIÑONES : experimentalmente se han visto lesiones transformadas por aparición de albuminuria.

Aún atenuada, altera la constitución de la sangre y una consecuencia de su acción ES LA TENDENCIA A HEMORRAGIAS.

Su poder disolvente afecta LA NUTRICIÓN, atrasándola como merc.

aunque menos profundamente produciendo disminución de ácido úrico enorina; y AL SISTEMA NERVIOSO, en el cual actúa como veneno paralizante; la consecuencia probable de estos dos hechos sería GRAN DEBILIDAD que se ve en su patogenesia.

Características

1) CONSTITUCIÓN Y TEMPERAMENTO : Aunque puede ser útil a toda clase de enfermos, kreosot. parece convenir especialmente a : niño con aspecto de viejo, arrugado, friolento, adelgaza rápidamente, con tendencia a constipación; niñas rubias, delicadas, de altura mayor que la propia a su edad.

Sujetos - sobre todo mujeres - de tez pálida, verdosa, flacas, mal desarrolladas; ojos rojos y húmedos, como anegados en lágrimas; labios secos; mejillas frecuentemente calientes y rojas; aspecto enfermizo.

2) SECRECIONES : OFENSIVAS, PÚTRIDAS, EXCORIANTES Y ARDIENTES; DESCOMPOSICIÓN RÁPIDA DE LÍQUIDOS HUMORALES Y SECRECIONES, SECRECIONES TAN EXCORIANTES, QUE LAS PARTES DEL CUERPO EN CONTACTO CON ELLAS, ARDEN, ESCUECEN Y PICAN, Y EL RASCADO AUMENTA LA IRRITACIÓN.

Secreciones mucosas muy fétidas, a veces, verdaderamente pútridas; irritantes, excoriantes; las lágrimas son tan irritantes que al correr desuellan bordes de párpados y mejillas, comisuras labiales en carne viva por saliva ardiente e irritante; el mucus segregado por excoriaciones es irritante y ardiente; la leucorrea de olor pútrido, es extremadamente acre e irrita tanto las partes de las vías genitales, que se ponen en carne viva, inflamadas, con dolor ardiente en vagina durante coito y la mucosa del pene en contacto con el mucus vaginal durante ese coito, arderá y escuecerá enseguida; orina ardiente, excoriante.

Esta tendencia a excoiación provocada por secreciones es aplicable a todos los tejidos.

3) TENDENCIA GENERAL A HEMORRAGIAS : Tendencia a sangrar con facilidad y en gran abundancia, que no estará en relación con la importancia de la herida; la menor erosión de piel, tiene tendencia a sangrar más de lo normal (phosph., lach.); una pinchadura de alfiler dejará correr mucha sangre roja vivo; la menor presión en mucosas las hará sangrar.

Si un enfermo de kreos. tiene dolor de garganta, la simple presión de la lengua al examinarlo, traerá algunas gotas de sangre a la mucosa; si tiene coriza, sangra por nariz; si tiene ojos y párpados inflamados, sangran fácilmente; hemorragias después del coito, hemorragias renales; los tumores sangran fácilmente (Kent).

4) PULSACIÓN EN TODO EL CUERPO : Una emoción o circunstancia que agite el sistema nervioso, será acompañada de pulsaciones en todo el cuerpo, hasta la punta de los dedos; la música que puede emocionar, provoca lágrimas ardientes, palpitaciones y pulsaciones que pueden ser sentidas hasta en extremidades (Kent).

SECRECIONES EXCORIANTES, SANGRÍAS ABUNDANTES POR LA MÁS PEQUEÑA HERIDA Y PULSACIONES EN TODO EL CUERPO son, para Kent, las tres grandes características de kreos.

Modalidades

Lateralidad

Izquierda.

Agravación

Al aire libre, al frío; Estando acostado, en reposo, los dolores parecen más fuertes; Durante o después de reglas.

Mejoría

Por calor.

Por comida caliente.

Por movimiento.

Síntomas mentales

Mentalmente ES TAN IRRITANTE QUE NADA LE SATISFACE; tiene tantos deseos que nada lo contenta.

Quiere todo no se contenta con nada.

Quiere algo, cuando lo tiene ya no lo quiere; el niño quiere un juguete : cuando lo tiene lo tira (cham.).

Síntoma de depresión, emotiva; inquietud, tristeza, disposición a lágrimas, abatimiento, mal humor, melancolía.

Debilidad de memoria.

Cabeza

Dolor de cuero cabelludo.

Caída de cabellos.

Acné en frente.

Cefalea con dolores pulsátiles, latentes, sobre todo en frente.

Peor durante reglas.

Puede haber cefalea, con sensación de pesadez, plenitud, en occipucio.

(Gels., zincum, picr. ac.).

Ojos

Constantemente inundados de lágrimas ardientes y corrosivas que desuellan borde de párpados; sensación de ardor y escozor.

Aglutinación de párpados de noche.

Cara

Pálida, grisácea, terrosa; aspecto de sufrimiento.

Placas rojas en mejillas, granos pustulosos en frente, mentón y mejillas; cara "enfermiza".

Aparato digestivo

BOCA :

Labios secos : comisuras excoriadas, irritadas, escozor.

ENCÍAS MUY DOLOROSAS, INFLAMADAS, ROJO OSCURO O AZUL, ULCERADAS, SANGRAN FÁCILMENTE.

LOS DIENTES SE DAÑAN FÁCILMENTE.

NEGROS, CARIADOS, SE CAEN A PEDAZOS (staph., ant. crud.). con dolores tractivos que se extienden a temporales y lateralidad izquierda marcada.

CARIES TEMPRANAS, APENAS HAN SALIDO LOS DIENTES; dentición difícil, dolorosa, el niño no puede dormir.

Sus dientes se deterioran apenas han salido.

Niños con boca llena de caries, encías inflamadas y dolorosas. (Nash).

Lengua pálida, floja; acumulación de saliva.

Aliento fétido, mal olor en la boca.

ESTOMAGO :

Gusto amargo al tragar.

Pérdida de apetito.

Sensación de frío, como producida por agua helada, al tragar.

Náuseas, deseo de vomitar, vómitos mucosos, sobre todo en ayunas, como en embarazo; por eso es útil en casos de vómito de embarazo.

Comparar con aletr. far., ars. alb, coccul., nux vom., sepia, symphoric. etc.

Sensibilidad del hueso del epigastrio que parece indurado; náuseas y vómitos alimenticios, varias horas después de comer.

Después de comer, dolor ardiente en el estómago, luego sensación deplétora, náuseas, que terminan en vomitar el alimento sin digerir, aún 1 hora o 2 después; esos vómitos son extremadamente agrios, ardientes (Kent).

Hematemesis; dolores que mejoran por comer; gran analogía entre fenómenos patogenéticos de kreos. y cáncer de estómago y dan lugar a aplicaciones terapéuticas buenas en la medida que el caso permite.

ABDOMEN Y DEPOSICIONES :

Hinchazón y tensión de abdomen.

Cólicos; sensación dolorosa de excoriación en el vientre.

Dolores lancinantes y presivos en el hígado.

Constipación con deposiciones duras, secas, difíciles, alternando con diarrea acuosa, marrón oscuro, y de una fetidez extrema.

Cólera infantil, por dentición difícil, con deposiciones verdes, fétidas, piel seca, carácter irritable, depresión.

Se puede ver, al fin de fiebre tifoidea, deposiciones sangrantes y hemorragias intestinales o de cualquier mucosa; ulceraciones que segregan líquido extremadamente excoriante que ulcera aún más la mucosa; vómitos de líquido tan acre que parece desollar toda la mucosa bucal y labios, y daña los dientes (Kent).

Aparato urinario

NECESIDAD TAN URGENTE DE ORINAR que si no se apura la orina escapa.

(Petrosel.).

Sólo puede orinar acostado; zincum, sólo sentado o inclinado hacia atrás.

INCONTINENCIA NOCTURNA; el niño se orina durante el primer sueño, del que sólo sale penosamente. (Sepia).

ORINA FÉTIDA, ARDIENTE, CORROSIVA.

Disminución o aumento excesivo de secreción urinaria.

Orina marrón o turbia.

Órganos genitales

ARDORES Y COMEZÓN EN VULVA Y VAGINA, peor al orinar.

ULCERACIÓN DE CUELLO DE MATRIZ que sangra fácilmente con sensación de ardor y secreción muy irritante y fétida, a veces ha aliviado ciertos cánceres de cuello cuando hay atroces dolores ardientes, como producidos por carbones ardiendo o irradiante hasta la pelvis.

HEMORRAGIAS DESPUÉS DEL COITO.

REGLAS DEMASIADO ABUNDANTES, ADELANTADAS, QUE DURAN DEMASIADO; DESANGRE YA CLARA, YA COAGULADA PERO SIEMPRE MUY FÉTIDA E IRRITANTE.

Durante reglas oye mal, zumbidos y silbidos de oídos.

Dolores durante reglas, pero sobre todo después.

FLUJO MENSTRUAL INTERMITENTE (puls), que sólo aparece cuando está acostada; lil. trig., lo contrario, las reglas corren solamente cuando se mueve; mag. carb., zincum, coca, bovista, ammon. mur., tienen como kreos. reglas más abundantes, estando acostadas.

Metrorragia de sangre negra, con coágulos fétidos y sensación de ardor y prurito en vagina y vulva.

LEUCORREA AMARILLA QUE ALMIDONA COMO APRESTO Y MANCHA LA ROPA DE AMARILLO, EXTREMADAMENTE FÉTIDA Y CORROSIVA, OLOR VERDADERAMENTE PÚTRIDO.

Las partes en contacto con la secreción son sede de violento escozor, ardor, y prurito; el rascado no alivia; sino que irrita.

Hemorragias con leucorrea : intermitentes, paran durante algunas horas, para volver enseguida; como en loquios, después del parto, se puede elegir entre kreos., rhus tox, sulphur. etc. (Nash).

Kreos. se parece a sepia : ambos tienen flujo menstrual intermitente; tirones en riñones, y sensación de presión hacia abajo en órganos genitales; coito doloroso; vómitos durante embarazo; orina turbia y fétida, con sedimento rojo; pero en kreosot las reglas son generalmente copiosas y van acompañadas por síntomas reflejos diferentes a sepia : kreos. tiene trastornos de oído y sepia no; los tirones en riñones se alivian por movimiento, y en sepia, se agravan.

En fin, la leucorrea, marca también la diferencia entre kreos. y mur. purp.

Ello conduce al empleo del remedio en cáncer y otras ulceraciones de cuello uterino si hay dolores ardientes, sensibilidad dolorosa y tumefacción en el cuello, secreción icorosa, sanguinolenta y sobre todo putrida que no tienen los otros dos (Farrington).

Excitación sexual en mujeres con tirones y puntadas en mamas.

Aparato respiratorio

1) NARIZ : Secreción mucosa de olor fétido, por nariz, que excoria las alas, con sensibilidad dolorosa en fosas nasales.

Mucosa en carne viva.

Lupus (ars. alb.).

Catarro crónico de olor pútrido en viejos.

2) LARINGE Y PULMONES : Picazón y cosquilleo en garganta y bronquios, con voz ronca.

Tos seca, espasmódica, fiebre a la mañana, en cama, con esfuerzos para vomitar; tos continuada, ronca, y hueca por acumulación de mucosidades en garganta con expectoración fácil, de mucus amarillento, a veces dulzón.

Emisión involuntaria de orina al toser (caust.) y sacudidas en el vientre.

Tos después de influenza; tos invernal de los viejos, con sensación de depresión, detrás del esternón.

Aliento corto a veces con sensación de pesadez en el pecho y necesidad de respirar profundamente, o dolor de magulladura al respirar.

Terrible ardor en el pecho, como por carbones ardientes.

Puntadas violentas en pecho y región del corazón y músculos intercostales, durante la noche.

Hemoptisis.

Gangrena pulmonar : después de cada ataque de tos, expectoración copiosa y purulenta, extremadamente fétida.

Piel

Prurito violento en todo el cuerpo, tan violento a la noche que lo pone casi furioso; acompañado a veces por sensación ardiente en brazos y piernas, después del rascado.

Erupciones papulosas con prurito violento sobre todo de noche.

Empeines harinosos o pustulosos, secos o húmedos, con prurito violento en casi todo el cuerpo.

Eczema seco o húmedo en orejas, párpados, labios, manos, con escozor y prurito intenso.

Erupciones urticarianas.

Relaciones

Antídotos

Aconit., nux vom.

Incompatibles

Carbo veg.

Complementarias

Ars. alb., sulphur, phosph.

LACHESIS TRIGONOCEPHALUS

Precioso medicamento preparado con veneno de "lachesis trigonocephalus", gran serpiente extremadamente venenosa de América del Sud.

Fue experimentado por primera vez por el Dr. Hering, de Filadelfia, quien cabe el honor de haberlo incorporado a nuestra materia médica.

Acción general del medicamento

Los venenos de serpiente fueron introducidos en nuestra terapéutica por Constantino Hering, quien experimentó, sobre todo, lachesis, después, otros autores publicaron patogenias de venenos de otras especies de ofidios : naja, vípera, crotalus, etc.

Como no parece haber gran diferencia en las diversas patogenias, puede bastar con una descripción común, al menos en grandes líneas.

Todos actúan con gran potencia sobre SISTEMA NERVIOSO, en cierta forma, como ESTUPEFACIENTES.

Su acción ES PRIMERO EXCITANTE : producen fenómenos asténicos, que en ciertos casos predominan lo suficiente para dar al síndrome el nombre de "variedad convulsiva".

Pero esta faz sólo es inicial; pronto cede el lugar A FENÓMENOS PARALÍTICOS; verdadero fin de estos venenos terribles. (Espanet).

En casos sobreagudos determinan muerte fulminante; en casos muy benignos sólo producen accidentes locales; en general actúan PRIMITIVA Y ELECTIVAMENTE SOBRE BULBO RAQUÍDEO.

Por lo tanto atacan : a) EL CORAZÓN : primero lo aceleran, luego se hace más lento hasta parar en diástole; esta acción cardíaca puede ser tan rápida como para determinar muerte inmediata; es siempre profunda; uno de los efectos característicos de la mordedura de serpiente es la repetición de síncope.

b) CENTROS VASO-MOTORES, a los que también ataca inmediatamente; después de una faz de excitación tan corta que enseguida se registra una baja de tensión arterial, se produce astenia; de ahí, éstasis viscerales múltiples que dan lugar a congestiones pulmonares, hepáticas o renales, transudaciones serosas; de ahí, edemas más o menos generalizados y extravasaciones sanguíneas en meninges; piel, vísceras, mucosas, en cuya superficie se producen hemorragias por fluidez y poca coagulación de la sangre que sólo forma coágulos que en nada se parecen a la clásica jalea de grosellas, de la sangre normal coagulada.

c) RESPIRACIÓN; acelerada al principio, pronto irregular, y cadavez más difícil, hasta que se detiene.

d) FARINGE : después de presentar espasmos convulsivos y constrictivos, se paraliza.

e) Sin duda, la acción bulbar de los venenos de serpiente explica LA GLYCOSURIA TÓXICA observada por los griegos después de mordedura de víbora.

Su ACCIÓN CEREBRAL se traduce en obnubilación, abatimiento, somnolencia, coma, parálisis general y progresiva.

EN MEDULA, comienzan por exaltar el poder reflejo, a tal punto que el menor roce provoca convulsiones, y pronto lo anulan completamente.

Lo mismo pasa en SIMPÁTICO, en cuyo dominio los espasmos dolorosos, casi atroces al principio, pronto ceden el lugar a una inercia tal que la constipación es uno de los efectos más netos de su acción crónica (Espanet).

Ya sea el veneno inoculado por el reptil al morder o ingerido dinamizado para la experimentación patogenética se ven aparecer EN EL REVESTIMIENTO EXTERNO, lesiones que muestran su enorme poder destructivo.

a) En el primer caso, "la piel, primero pálida, se pone rojilvívida en la zona de la mordedura y otros sitios, en placas; al mismo tiempo todo el miembro se hincha y toma proporciones enormes hasta invadir en ciertos casos, el tronco y la cara; se ven numerosos flictenas, principalmente en proximidad de la herida, luego trazos de linfangitis considerable, y placas gangrenosas; frecuentemente se producen abscesos, flemón difuso del miembro herido con despegamientos muy vastos que disecan músculos y huesos (Piedevache).

b) En el segundo caso, aparecen en piel manchas equimóticas, vesículas amarillentas o negro azuladas con hinchazón y dolor, erupciones vesiculosas, lesiones erisipelatosas sobre todo en la cara; ulceraciones superficiales de fondo sucio, con aureola rojo violácea.

Estas heridas y úlceras, sangran fácilmente y en abundancia y son propensas a fenómenos gangrenosos.

Si queremos resumir en un rápido esquema su acción patogenética, diremos que desarrolla fenómenos constitucionales dependientes DEL ENVENENAMIENTO DE LA SANGRE Y DE LA PERTURBACIÓN DE LOS CENTROS NERVIOSOS (Hughes).

La acción del veneno es principalmente denunciada por los nervios neumogástricos : por eso encontramos sensación de constricción y sofocación en garganta, disfagia y disnea espasmódicas y disminución, casi paro, en la acción del corazón.

Por eso es muy útil en casos que se pueden llamar : "garganta irritable", especialmente cuando la tos es excitada por sensaciones mórbidas; tiene gran potencia para aliviar la tos simpática en afecciones cardíacas; es útil en : bola histérica, estrechamiento espasmódico de esófago y palpitaciones nerviosas (Hughes).

Determina envenenamiento de la sangre, que se descompone rápidamente, se hace muy oscura, como sangre mal oxigenada, pierde la propiedad de coagularse y corre por todos los orificios y tejidos del cuerpo; de ahí, hemorragias, equimosis, petequias, etc.

La alteración de la sangre trae trastornos febriles de tipo adinámico, agravados por los accidentes locales de la parte mordida y el paciente puede sucumbir a sus progresos en períodos más largos.

La infección local es formidable.

Por absorción del virus en la sangre y posterior difusión en la economía, el principio vital es aniquilado.

Los mismos fenómenos tienen lugar localmente por inhibición del veneno en la región herida.

Bajo la influencia de la herida, la parte se inflama, y los accidentes aumentan por falta de resistencia vital haciendo presa de todo el individuo y pronto adquieren localmente el estado más grave : gangrena con infiltración difusa, y sanies pútrida. (Miller).

Todos estos fenómenos dan lugar necesariamente a fiebre secundaria de tipo tifoideo. (Hughes).

Características

1) CONSTITUCIÓN Y TIPO : El Dr. G.H. Martin escribe : Lach. SE ADAPTA MEJOR A TEMPERAMENTOS BILIOSOS, ESPÍRITU VULGAR, PROPENSO A INDOLENCIA.

ESTA NATURALEZA ES MUY DIFERENTE A LA DE phosph., ELEGANTES Y FINAS, VIVAS Y EXCITABLES; Y NASH DICE : "HE ENCONTRADO A lach.

EFICAZ EN TODAS LAS EDADES Y TEMPERAMENTOS.

PERO TAL VEZ SEA MAS INDICADO EN SUJETOS GORDOS QUE EN FLACOS".

DESARROLLA PARTICULARMENTE SUS SÍNTOMAS EN LA MUJER EN LA MENOPAUSIA; la enferma llega agotada, se deja caer en un sillón en medio de grandes suspiros (lach., medicamento de los suspiros); habla con volubilidad extraordinaria; ha tenido todas las desgracias y las cuenta en una oleada de palabras que no se puede parar (necesidad de hablar que no se puede parar).

"El tipo clásico es una mujer que ha pasado la cuarentena; la cara abigarrada, púrpura, sobre fondo a veces amarillento, mejillas iluminadas por enrojecimientos más claros; colas de cejas comidas, con puntos rojos; párpados hinchados o con aspecto tumefacto; nariz aframbuesada, que no conserva la marca del dedo, rodeada de pliegues varicosos.

Labios muy violáceos con reborde interno, rojo vivo, y cubiertos por delgada película barnizada y brillante.

Hipersensible y cambiante; ya esté abatida o excitada, todo le es insostenible; su locuacidad es un verdadero torbellino de palabras; salta sin cesar de un tema a otro, no termina sus frases o palabras, gime continuamente, pretende que se la escuche y compadezca, sin dar un sólo instante para consolarla.

Si su estado mental se agrava, tiene alucinaciones auditivas, escuchavoces que la persiguen, cree en influencias misteriosas que la dirigen; se pierde en la desolación de sus pecados y ansias de manía religiosa; o en los celos y desconfianza; sospecha sobre todo de quienes la rodean; sus amigos, pensando que se burlan de ella.

Sus sueños presentan a menudo carácter horrible : cadáveres, entierros.

Si la intoxicación se agudiza, el sopor es irremediable, la inteligencia se pierde en un murmullo jadeante, la lengua tropieza a cada palabra con los dientes, aunque el maxilar inferior cae sobre el pecho, floja y sin fuerza.

"También es utilizado a menudo EN VIEJOS BEBEDORES, ALCOHOLISTAS Y VIEJOS SIFILÍTICOS.

Entre ellos se encontrará el mismo tipo : coléricos, nerviosos de carahinchada, barrosa sobre fondo plomizo terroso.

Párpados tumefactos, esclerótica de un blanco sucio o amarillento, nariz roja violeta, labios violáceos.

Tienen constantemente el cuello descubierto : no toleran nada ajustado alrededor de cuello o talle.

Son de una locuacidad fatigante, hablan con precipitación y pasan rápidamente de un tema a otro.

Si bien, es poco usado en la infancia, puede estar indicado en enfermedades graves, en enfermedades infecciosas agudas muy serias que pueden desarrollar muchos de estos síntomas.

2) ACCIÓN ALTERNANTE DE EXCITACIÓN Y DEPRESIÓN : EN LA EXCITACIÓN tiene los síntomas siguientes : comprensión rápida, actividad mental con percepción casi profética, éxtasis, especie de arrobamiento; LOCUCIDAD CON CAMBIO RÁPIDO DE TEMA Y SALTO BRUSCO DE UNA IDEA A OTRA; locuacidad excepcional, muy marcada; muy animada, habla continuamente, sin fin.

Mujer en el momento de la menopausia : habla sin cesar, rápido, con animación; no concluye sus frases, porque una palabra que pronuncia le hace pensar en otra y cambia de repente de tema; sus ideas se suceden tan rápidamente que no puede escribirlas, ERRORES AL ESCRIBIR.

En cuanto a la DEPRESIÓN, se nota debilidad de memoria, faltas al escribir, confusión sobre el tiempo, delirio de noche, balbuceo, sopor, cara roja, palabra lenta, indiferente, difícil y maxilar caído; se siente extremadamente triste, deprimido, infeliz, angustiado y este estado, agravado en la mañana, puede también agravarse cada vez que duerme, de día o de noche.

Enfermedades crónicas por causas deprimentes, como tristeza o pena moral, que duran mucho tiempo; después de un dolor físico, crónico y deprimente.

Este lado depresivo, puede, como su acción excitante, encontrarse en enfermedades agudas o crónicas.

Estas condiciones opuestas de excitación y depresión, pueden alternar en la misma persona; entonces, las alternancias son a menudo extremas.

Las causas de este estado de espíritu son variadas, pero se las ve en viejos borrachos, en sujetos de constitución profundamente afectada, antiguos sifilíticos o mujeres en la menopausia.

Tales individuos están sujetos a ataques de pérdida de fuerza, desfallecimiento, vértigo por aflujo de sangre a la cabeza, que pueden causar verdadero estado apoplético o síntomas opuestos causados por súbita anemia cerebral. La circulación de lach. es muy incierta, siendo por eso muy útil en "tufaradas de calor" de la edad crítica.

3) EXTREMA SENSIBILIDAD A TODA CONSTRUCCIÓN, AL MENOR CONTACTO : Una de sus grandes características es extrema hipersensibilidad.

"El exceso de sensibilidad en cuanto a los síntomas de la cabeza, espíritu y sentidos en general, es notable" (Kent).

La vista, el oído se hacen intensos; el tacto se exagera, todos los sentidos se vuelven extremadamente sensibles, hipersensible al ruido, a los menores movimientos en la pieza, a la conversación de los que lo rodean, todo esto aumenta sus dolores.

El contacto de la ropa, aún las sábanas, le es muy doloroso y este exceso de sensibilidad al tacto parece residir en la piel, pues la presión fuerte lo alivia; sensible al contacto de la ropa, pero una presión fuerte puede serle agradable; piel del cráneo tan sensible que el tocar con la mano le provoca sensación dolorosa, pero la presión de un vendaje le resulta agradable.

En enfermos que sufren de peritonitis o inflamación de órganos abdominales, la piel es tan sensible que a veces no tolera el contacto de las sábanas; y el peso de la mano al palpar le hará sentir en la profundidad del abdomen, un dolor sordo, completamente distinto de la sensación penosa que provocará el contacto de las sábanas al estimular el exceso de la sensibilidad de la piel.

Hueco del estómago doloroso al tacto o simple presión de la ropa; no puede soportar la menor constricción en hipocondrios.

Distensión dolorosa de abdomen; flatulencia muy desagradable; no puede soportar la menor presión en el vientre.

Los nervios periféricos están tan sensibles que debe llevar la ropa muy floja alrededor del talle.

En la cama debe aflojar su ropa y acostado de espaldas, no puede apoyarse sus brazos sobre el abdomen por el peso.

La laringe no puede soportar el menor contacto; el menor contacto provoca sofocación.

Está obligado a aflojar su ropa alrededor del cuello, sobre todo cuando hace calor.

Sensación de sofocación y como si la ropa dificultara la circulación en el cuello.

Intolerancia por cintas y otras cosas que ciñan el cuello.

4) SENSACIÓN DE LATIDOS, DE PULSACIONES : Este es un síntoma general.

Latidos y sensación de pulsaciones en arterias y regiones inflamadas; cefaleas con pulsaciones dolorosas; el ovario inflamado late; a veces, sensación de martilleo en la parte inflamada, a cada pulsación arterial.

A menudo ha curado fístula anal cuando había esta sensación de martilleo en el interior del trayecto fistuloso; ha curado viejas fisuras, cuando había este síntoma, igualmente, hemorroides (Kent).

Modalidades

Una de sus características generales es que sus SÍNTOMAS LLEGAN AL PUNTO MAS AGUDO INFLUIDOS POR EL CLIMA, LA TEMPERATURA, ES ESTADO ATMOSFÉRICO.

Está peor al aire frío, por cambios de temperatura, cuando el tiempo se pone cálido; las temperaturas extremas : gran calor o gran frío le provocan malestares.

Lateralidad

IZQUIERDA.

Predisposición por el lado izquierdo como lycop. por el derecho.

Si la parálisis, los síntomas de la cabeza, garganta, pulmones, abdomen, etc., se localizan a la izquierda, hay que pensar en lach.

"Una cosa singular es su tendencia a afectar el lado izquierdo; pueden después, ganar el derecho : la parálisis, por ej. aparece lentamente a la izquierda para ganar después el lado derecho; lach. está en relación estrecha con ovarios, pero el ovario izquierdo es afectado primero; la inflamación comienza a la izquierda de la garganta y pasa poco a poco, la derecha; el lado izquierdo de la cabeza es generalmente el más afectado; el ojo izquierdo se hace doloroso, luego el dolor se extiende a la derecha, el lado izquierdo, detrás de la cabeza, en cefalea occipital, será más afectado que el derecho.

Esto no pasa siempre y si sucede lo contrario, no es una contradicción para lach., pero es más raro.

A veces se ha notado lateralidad izquierda superior y derecha inferior" (Kent).

Principales medicamentos de lateralidad izquierda muy marcada : arg. met., arg. nit., asa foet., asterias, bellis, cimicif., colch., cupr., lach., lil. tig., ox. ac., rumex, sepia, thuya.

Agravación

a) POR SUEÑO.

En cuanto se duerme, la respiración se detiene; no puede dormirse porque en ese momento la respiración se detiene y despierta bruscamente tratando de regularizarla : esto se encuentra frecuentemente en enfermedades funcionales del corazón.

Dolor de cabeza después del sueño.

Esta agravación por el sueño responde AL ESTADO GENERAL DE lach. QUE REPRESENTA EN SU CONJUNTO, INTOXICACIÓN POR ÓXIDO DE CARBONO : ESTE SE ELIMINA MUY MAL DURANTE EL SUEÑO, EN QUE LOS CAMBIOS SE HACEN MUY LENTOS; HAY AGRAVACIÓN DE SÍNTOMAS EN ESE MOMENTO, AGRAVACIÓN QUE PUEDE SER MARCADA Y NO CONSTATARSE HASTA EL DESPERTAR (Nebel).

Además sueño agitado, despierta muchas veces sobresaltado; tiene accesos de tos, opresión, etc.

b) A LA MAÑANA, AL DESPERTAR, modalidad que es consecuencia de la precedente.

Un largo sueño agravará todo su estado, al despertar lamentará haberse dormido.

Al despertar de un sueño largo, tendrá dolores de cabeza terribles, palpitaciones, melancolía, tristeza, dolores desde los pies hasta la cabeza y mente oscura (Kent).

c) POR SOL : En general se agrava por el sol.

d) EN PRIMAVERA : sus síntomas se agravan en primavera cuando cesael frío y el tiempo se suaviza, sobre todo si hace calor húmedo, tiempo lluvioso o tormentoso (Kent).

e) LOS VIENTOS CALIENTES excitan sus síntomas (Kent).

f) POR AGUA CALIENTE Y BEBIDAS CALIENTES, cuando toma un baño caliente o aplica agua caliente en un lugar inflamado los síntomas mentales : tristeza, melancolía, ideas locas, celos, sospecha, aumentan; o después de

baño caliente o por sofocarse al entrar en habitación calurosa después de estar al frío, aparecen los síntomas mentales (Kent).

Al entrar en baño caliente, o por sofocarse aparecen palpitaciones, le parece que la cabeza va a estallar, los pies se enfrían, o falla el corazón : se desvanece en baño caliente (Kent).

Puede tener frío o escalofríos y sin embargo el estar en habitación caliente aumenta o hace aparecer los síntomas (Kent).

Mejoría

a) POR TEMPERATURA MODERADA, ni demasiado caliente ni demasiado fría.

b) POR APARICIÓN DE SECRECIÓN.

Síntomas mentales

POSTRACIÓN MENTAL Y FÍSICA CON HIPERSENSIBILIDAD NERVIOSA EXAGERADA.

Todo lo fatiga, lo irrita.

Se estremece al menor ruido, no soporta al menor contacto.

Le cuesta mucho trabajar cerebralmente, a causa de gran fatiga intelectual y gran rapidez para registrar impresiones.

ALTERNATIVAS DE EXCITACIÓN Y DEPRESIÓN.

AGITADO E INQUIETO, no le gusta ocuparse de sus negocios; tiene siempre deseos de pasear.

TRISTE DE MAÑANA, no le gusta mezclarse con otros individuos.

LA ACTIVIDAD MENTAL AUMENTA DE MANERA DESACOSTUMBRADA A LA NOCHE, en que el trabajo mental es más fructífero; por eso se acuesta tarde.

Lo más notable de su estado mental es la conciencia exagerada que tiene de su personalidad.

Vanidad, odio, envidia, venganza, crueldad determinados por orgullo, y por amor de sí mismo exagerado (Kent).

ORGULLOSO, CELOSO, EXTREMADAMENTE SUSCEPTIBLE, CELOS SIN RAZÓN; como hyosc., lach.

eses un gran remedio de los celos.

A menudo lach. ha curado LA DESCONFIANZA en jóvenes que desconfían sinceramente de sus mejores amigos : si cuchichean piensan que hablan mal de ellos, sospechan que los quieren mal y emplearán todos los medios para saber si han hablado mal de ellos.

La mujer imagina que su esposo, hijos, amigos, la quieren dañar, ponerla en un asilo; tiene aprensión por el porvenir; piensa que va a tener una enfermedad al corazón, que se vuelve loca y quieren internarla, o que la quieren envenenar y rehusa comer.

A veces cree que todo esto sólo es un sueño y le cuesta darse cuenta si lo ha soñado o lo piensa realmente.

Cree que está muerta y en sueños se prepara para el ataúd, o cree que va a morir (Kent).

MELANCOLÍA ANSIOSA Y TEMOR A UNA MUERTE PRÓXIMA.

SUSCEPTIBLE, DESCONFIADA, se cree menospreciada por todo el mundo.

Debilidad de memoria; PIERDE LA NOCIÓN DEL TIEMPO : se equivoca sobre días y horas.

Cerebro fatigado.

Apariencia de chochera de borracho, lengua espesa, balbucea, no termina sus palabras, cara violeta y cabeza caliente.

Se ahoga y el cuello le molesta y cuanto más molestia siente alrededor del cuello, más se ahoga, habla menos fácilmente, tiene más confusión mental y más apariencia de ebrio.

Se tendrá la misma impresión al hablar con alguien que ha bebido demasiado whisky : balbucea, comprende a medias lo que dice, no termina frases, ni palabras, titubea al hablar, se equivoca, musita, contando primero una cosa, luego otra.

Estos síntomas aumentan en primavera, en tiempo cálido, después de un período de frío, en tiempo lluvioso, después de baño caliente, después del sueño (Kent).

GRAN LOCUCIDAD (stram.), LOCUCIDAD EXTRAORDINARIA; HACE GRANDES DISCURSOS, EN FRASES REBUSCADAS, PERO PASA DE UN TEMA A OTRO; UNA PALABRA LLEVA A VECES A OTRO TEMA.

ESTO PUEDE SUCEDER EN ENFERMEDADES AGUDAS COMO TIFOIDEA, DIFTERIA

O EN VENENAMIENTO, EN QUE PUEDE SER UN ESTADO CRÓNICO O TENER FORMA DE LOCURA (Kent).

LOCUCIDAD MÁS MARCADA AL ANOCHECER.

LOCURA RELIGIOSA (stram.) : está llena de espíritu del MAL; ha cometido pecados imperdonables; está persuadida de no poder aplicar a sí misma las promesas de la PALABRA DE DIOS, que sólo corresponden a los otros.

Necesita contar esas cosas, dice que va a morir e ir al infierno.

A veces el estado de melancolía religiosa va acompañado por locucidad característica.

Esto se encuentra generalmente en mujeres, y rara vez en hombres.

Necesita contar a todo el mundo, aburrirá a sus amigas íntimas noche y día, con la historia de la condena de su alma, de sus pecados, de todas sus faltas; a pesar de ser buena y bien educada dirá que ha cometido todos los crímenes.

Lach. tiene otra forma de locuacidad : necesita hablar sin cesar; éstose ve cuando está en estado de apresuramiento, quiere que los demás se apuren; entonces es extremadamente locuaz, con locuacidad extremadamente rápida y cambiante; sus frases quedan en la mitad, da por sentado que ha sido comprendida y continúa. Entonces está muy despierta, excitada, noche y día y muestra tal hipersensibilidad que uno creería, por las cosas que oye y por la gran perturbación que le provoca el menor ruido, que puede oír caminar las moscas por las paredes, o el sonido de una campana muy lejana (Kent).

ilusiones; se cree bajo la dependencia de potencias superiores; se cree muerto.

Sueño

Somnolencia de día principalmente después de las comidas, muy despierto a la noche.

Esta SOMNOLENCIA DESPUÉS DE LAS COMIDAS, es diferente de agar., que tiene sueño después de las comidas, con presión en estómago y abdomen, y sensación de plenitud.

Calc. carb. : somnolencia después de las comidas acompañada por eructos sin mejoría, hinchazón abdominal; no puede tener la ropa apretada alrededor del talle.

China : gran deseo de dormir de día, sobre todo después de las comidas con gran flatulencia.

Graph. : somnoliento de -día, principalmente después de comer.

Kali carb. : somnoliento de día después de las comidas con sensación como si el estómago estuviera lleno de agua.

Nux vom. : somnoliento después de las comidas con hinchazón en hipoepigástrico y sensación de presión como de piedra en boca del estómago.

Phosph. : somnoliento, amodorramiento, durante el día, pero principalmente después de la cena : bostezo, tiene sueño, pero si se acuesta no puede dormir.

Rhus tox. : gran deseo de dormir de día, sobre todo después de comer.

Sulf. : somnoliento día y noche.

INSOMNIO ANTES DE MEDIA NOCHE con gran agitación, tiene sueño y no puede dormir. (Opium, bell.).

Tirones súbitos, sobresaltos, cuando va a dormirse.

Sueño ligero con despertares frecuentes, agitación; gritos, gemidos.

Sueños angustiosos con cosas terribles, espectros, entierros, muertos.

EL PACIENTE SE DUERME EN UNA AGRAVACIÓN; AGRAVACIÓN POR EL SUEÑO.

Cabeza

Es uno de nuestros mejores medicamentos para LOS DOLORS DE CABEZA POR CALOR SOLAR.

ESTA INDISPUESTO, TIENE DOLOR DE CABEZA CADA VEZ QUE SE EXPONE AL SOL.

Si bien no se puede comparar a glonoine en efectos inmediatos de insolaración puede ser aplicado cuando los primeros efectos han sido suprimidos por glon.

Tiene gran variedad de síntomas en dolores de cabeza, pero Nash indicados, que para él tienen gran valor : DOLOR DE CABEZA CON CARA PÁLIDA; SE DUERME PERO TEME DORMIRSE PORQUE DESPERTARA CON UN TERRIBLE DOLOR DE CABEZA.

El dolor de cabeza comienza a la mañana al despertar.

Los dolores de cabeza poco graves de lach. comienzan a la mañana al despertar y paran cuando se ha movido un poco (Kent).

DOLOR DE CABEZA QUE SE EXTIENDE A LA NARIZ, SOBRE TODO EN CASOS DE CATARRO NASAL AGUDO ESPECIALMENTE CUANDO LA SECRECIÓN HA SIDO SUPRIMIDA o si detiene después del sueño.

Esto se ve en catarro de heno y va acompañado por violentos estornudos.

DOLOR DE CABEZA PULSATIL; ORDINARIAMENTE EN SIEN IZQUIERDA Y SOBRE LOS OJOS, CON CONFUSIÓN MENTAL ANTES DEL DESARROLLO DE UN CORIZA Y CESA EN CUANTO APARECE : se siente mejor en cuanto se establece una secreción.

Este dolor de cabeza se agrava también por aire frío.

DOLOR DE ESTALLIDO EN LA CABEZA, DOLORS CONGESTIVOS, sensación penosa de que toda la sangre del organismo está en la cabeza; extremidades muy frías y DOLORS DE CABEZA MARTILLANTES, LATENTES.

Este dolor de cabeza con pulsaciones dolorosas no es un síntoma especial sino general, forma parte de la característica : presenta pulsaciones, latidos, en cualquier parte del cuerpo (Kent).

DOLOR DE CABEZA CON SENSACIÓN DOLOROSA DE OLEAJE, COMO SI UNA OLA SUBIESE POR LA NUCA PARA ATRAVESAR LA CABEZA, que no siempre es sincronizada con el pulso o forzosamente relacionada con los movimientos de la sangre.

Se agrava por movimiento, pero no tanto durante el movimiento, más bien después.

A veces se la siente después de haber caminado o cambiado de sitio, o al sentarse de nuevo, es decir, algunos segundos después de cesar el movimiento, el dolor comienza y llega inmediatamente a su punto culminante para decrecer gradualmente hasta una sensación de latidos en ondas sucesivas.

En la cama, dolor de cabeza continuo que se puede agravar y dar sensación de fuerte oleaje formado por ondas dolorosas tan violentas que le parece que va a morir (Kent).

SENSACIÓN COMO SI TUVIERA PLOMO EN EL OCCIPUCIO; SENSACIÓN DE PESO EN EL VERTEX. (Cactus, glon., menyant.); que se ve a menudo en la mujer, en la menopausia, asociada a SENSACIÓN DE ARDOR EN EL VERTEX : Sulph. tiene también este síntoma, pero si es en la menopausia corresponderá lach., excepto si hay alguna complicación psórica marcada; sulph. buscará aire fresco, corriente de aire; lach. lo evita.

La sensación de peso, presión, en la cabeza, es un síntoma saliente en lach. (Kent).

Vértigo con desfallecimiento, náuseas y vómitos, principalmente a la mañana o al atardecer.

Se nota en lach. toda clase de vértigos : vértigo con náuseas, y vómitos; el vértigo tiene tendencia a hacer caer al enfermo más bien a la izquierda (Kent).

Los síntomas de la cabeza, se relacionan a menudo con los cardíacos : es raro ver el dolor de cabeza lach. sin trastornos cardíacos : pulso débil a la palpación o sensación de pulsación general en cualquier lugar del cuerpo, se relacionan más o menos con los violentos dolores de cabeza (Kent).

Hipersensibilidad del cuero cabelludo al tacto (Kent).

Ojos

Hay muchos estados inflamatorios y congestivos en ojos, en general, hipersensibles al tacto y a la luz y sus síntomas se agravan por el sueño.

Dolores de cabeza con dolores en los ojos como si tiraran hacia la raíz de la nariz; sensación como si los ojos fueran tirados por cordones que se anudan en la raíz de la nariz.

PARPADOS HINCHADOS, TUMEFACCIÓN.

Inflamación de conjuntivas.

Sensación de sequedad de mucosas, como si los ojos estuvieran llenos de tierra.

Visión disminuida; moscas volantes, puntos oscuros delante de los ojos; la vista parece desaparecer súbitamente al mismo tiempo que tiene palpitaciones del corazón, sensación de desfallecimiento y temblor nervioso (Farrington).

APOPLEJÍA RETINEANA; ayuda a la reabsorción de la sangre (crotal., phosph., arnica) (Farrington).

Visión defectuosa después de difteria por mal funcionamiento de músculos extrínsecos del ojo.

PARÁLISIS DE MÚSCULOS DEL OJO.

Glaucoma.

Los otros principales remedios del glaucoma son : atrop., sulph., cuyos síntomas son : pupilas dilatadas, córnea insensible, fosfenos, sensación de tensión ocular; agitación peor a la tarde, mejor por reposo; particularmente útil si se trata del ojo derecho.

Bell., es precioso para aliviar los violentos dolores del glaucoma, especialmente si hay mucha congestión inflamatoria local.

Cocainum., tiene pupilas dilatadas, ojos fijos y sin expresión, tensión elevada y córnea insensible; sensación de cuerpo extraño que rueda bajo la piel.

Caust. : ojo duro como bola de mármol, visión oscurecida; ve como una bola coloreada alrededor de las llamas que mira; paresia ciliar y atrofia pupilar.

Glonoina, gran hipertensión ocular con aparición de pulso venoso y arterias filiformes; latidos arteriales, tufaradas de calor y vértigo, sobre todo ojo derecho.

Phosph. al leer las letras parecen rojas y hay un halo verde alrededor de las luces que mira.

Ars., coloc., spig., dados según las indicaciones sintomatológicas, han aliviado dolores neurálgicos atroces de la enfermedad y coccul. y sulph., lo han combatido últimamente en períodos más avanzados.

Oídos

Hipersensibilidad del meato auditivo externo; si se introduce algo en el canal del oído externo esto provoca tos violenta, espasmódica y cosquilleo de garganta; mucosa del oído tan sensible que el solo tocarla ligeramente puede provocar un ataque de tos excesivamente violenta, como de coqueluche (Kent).

Hipersensibilidad del oído.

Tintineos, silbidos, mejorados al poner el índice en el oído y sacudirlo.

(DEWEY, FARRINGTON).

Catarro y obstrucción de trompa de Eustaquio.

Sequedad de conducto auditivo y falta de cerumen.

Cerumen de olor ofensivo.

Cara

Facies amarillenta, VASCULARIZACIÓN MUY MARCADA, principalmente los pómulos a veces de un rojo violáceo y aún violeta; nariz roja violeta y a veces hinchada, como "NARIZ TOMATE".

LABIOS VIOLÁCEOS en su totalidad, como si la sangre circulase mal, excepto, a veces, el borde interno que puede estar rojo vivo; caust. solo tiene borde y comisuras de este tinte violeta.

En conjunto, ESTA FACIES DA LA IMPRESIÓN DEL INDIVIDUO INTOXICADO POR MALA OXIGENACIÓN.

COLA DE CEJAS ENROJECIDA, CARA PÚRPURA, MARMÓREA; HINCHADA, ABOTAGADA, ICTÉRICA, CLOROTICA.

NEURALGIA FACIAL IZQUIERDA CON flujo de calor que sube a la cabeza(phosph.).
DOLORES DESGARRANTES EN MAXILARES (phosph.) (amphisbana) (Boericke).
Neuralgia facial, principalmente izquierda, con dolores profundos en huesos y sensibilidad exquisita de piel al tacto.
ERISPELA DE LA CARA, principalmente, izquierda, con coloración violeta de piel y otros síntomas característicos.

Aparato digestivo

BOCA :

Mal olor en la boca que puede estar muy seca o tener abundante acumulación de mucosidades tenaces. (Merc.).
ENCÍAS BLANDAS, ESPONJOSAS, SANGRAN FÁCILMENTE; en esto a menudo lach.
sigue bien a merc.; si las encías se ponen púrpuras, lach. estará muy indicado. (Nash).
ENCÍAS TUMEFECTAS FUNGOSAS, SANGRANTES.

Odontalgia con dolores que se propagan a oídos, agravados por bebidas calientes y frías.
La lengua presenta un síntoma muy característico, sobre todo en afecciones de forma tifoidea : SACA LA LENGUA CON GRAN DIFICULTAD, ESTA MUY SECA, TIEMBLA, SE ENGANCHAN EN LOS DIENTES DEL MAXILAR INFERIOR : también en gels. la lengua tiembla y es sacada con dificultad, pero no está tan seca; se produce en gels, al principio de la fiebre, en lach., más tarde. (Nash).
LENGUA ROJA, BRILLANTE, SECA, AGRIETADA.

Aftas, ulceraciones con ardor y escozor. (Boericke).
Es uno de nuestros mejores remedios para ulceraciones de boca en el último período de la tisis. (Nash).

GARGANTA :

Garganta y cuello sensibles al menor contacto, a la menor presión exterior (sepia), no tolera nada alrededor de garganta, cuello, ni el peso de las frazadas.
Es uno de nuestros principales remedios PARA TODAS LAS ENFERMEDADES QUE PARECEN LLEVAR SU PRINCIPAL ACCIÓN A LA GARGANTA; escarlatina, etc.; no solamente para trastornos de garganta relacionados con afecciones agudas, sino también para los que dependen de enfermedades crónicas, por ej. : de naturaleza sífilítica. (Nash).

FARINGE Y AMÍGDALAS PÚRPURAS, LÍVIDAS.

Amigdalitis que comienza A LA IZQUIERDA Y PUEDE EXTENDERSE ENSEGUIDA A LA DERECHA.
Amigdalitis y difteria cuando la hinchazón de amígdalas COMIENZA A LA IZQUIERDA Y SE EXTIENDE ENSEGUIDA A LA DERECHA (sabad).

A veces la garganta toma ASPECTO GANGRENOSO, indicación que se agrega a los otros síntomas característicos.
Si la mucosa se torna púrpura violeta, no tiene igual.

LOS DOLORES DE GARGANTA IRRADIAN AL OÍDO.
DEGLUCIÓN EXTREMADAMENTE PENOSA.
TRAGAR EN VACÍO O LÍQUIDOS, ES MAS DOLOROSO QUE TRAGAR SÓLIDOS, SOBRE TODO BEBIDAS CALIENTES.

Tragar líquidos calientes provocará a menudo ahogo; un sorbo de té caliente le agrava la garganta, le parece ahogarse.

Espasmo y angustia de garganta aumentan bebiendo caliente.
Los dolores de garganta de lycop., al contrario, a menudo se alivian con calor, en algunos casos pide bebidas frías y el frío da sensación de bienestar (Kent).

SENSACIÓN DE CUERPO EXTRAÑO en la faringe con necesidad continua de tragar.
MUCHAS MUCOSIDADES EN GARGANTA, CON EXPECTORACIÓN DOLOROSA, peor después del sueño.
Mucosidades, saliva blanca, filamentosas, parecidas a kali bichr. (KENT).
Carraspera con mucosidad escasa viscosa que no puede ser expulsada.
Parálisis de velo del paladar.

ESTÓMAGO :

INAPETENCIA, ALTERNANDO A VECES CON BULIMIA.
FALTA DE APETITO Y DE HAMBRE, o al contrario HAMBRE ENFERMIZA, con náuseas, bostezos convulsivos o accesos de desfallecimiento si no come enseguida, o con presión corrosiva en el estómago que se renueva poco después de comer; a veces APETITO IRREGULAR : anorexia o bulimia, alternados.

REPUGNANCIA POR PAN.
DESEO DE OTRAS.

Todos los alimentos tienen gusto agrio.
Sed inextinguible.

EN LOS SÍNTOMAS MAS AGUDOS DE lach. UNA BEBIDA CALIENTE EN EL ESTÓMAGO ES NOCIVA, causa náuseas, sofocación y aumenta la sensación de ahogo, palpitaciones y sensación de plétora en la cabeza; EN CASOS CRÓNICOS, HAY SENSACIÓN DE NAUSEAS, TENDENCIA A VOMITAR SI BEBE AGUA HELADA y se acuestan después; la náusea comienza después que se ha acostado (Kent).

DESEO DE ALCOHOL; también se puede citar : ars. alb., en personas malas, vengativas, inexorables, celosas a veces, dispuestas a convertirse en criminales, inclinadas al suicidio con puñal, veneno u horca; tienen siempre sed y necesidad de beber cualquier cosa, aún agua, vomitan fácilmente y tienen tendencia a diarrea.

Predisuestas a perseguir al prójimo.

Asar. europ. : gran deseo de alcohol con pirosis, pérdida de apetito, flatulencia, náuseas.

Calc. ost. : al mismo tiempo que le gustan las cosas saladas, y golosinas, tiene gran deseo de vino.

Caust. : deseo marcado de cerveza, de cosas condimentadas; aguardiente, rum; antes, durante y después de la embriaguez, predispuesto a enternecerse, al llanto y antes, gran sobreexcitación genital, no puede soportar la continencia.

Carbol. ac.; gran deseo de estimulantes y tabaco.

Coca : gran deseo de bebidas alcohólicas y tabaco : pérdida de apetito para alimentos sólidos principalmente; sensación de pimienta en la boca.

Con mac. : bebe porque se aburre, frío como hielo; no puede soportar la continencia, indiferente, con inteligencia no muy desarrollada.

Hep. sulf. calc., puede tener gran deseo de vino; necesita vino para cumplir un trabajo cerebral, kali bichr. gran deseo de cerveza y bebidas aciduladas.

Luesinum : deseo muy marcado de alcohol.

Magn. carb. : gran deseo de sidra; es útil en personas que gustan de licores dulces y comen muchos dulces y golosinas.

Merc. : deseo de alcohol, con las grandes características del remedio; les gusta el vino y el aguardiente.

Nux vom. : gran deseo de bebidas alcohólicas y asco marcado por agua y leche; tienen los síntomas mentales característicos : nada de apetito, pirosis y constipación.

Opium, útil en bebedores de aguardiente, alcoholes de cereales, sidra y cerveza.

Petrol. : en ebrios sin energía, sin voluntad que no pueden rehusar un vaso de vino, vomitan por el menor exceso de bebida, hablan mucho cuando están ebrios.

Phosph. : ha curado el deseo de alcohol en ebrios (Kent).

Puls. : en los que creen que fortifica el estómago y cuyas fuerzas digestivas están sin energía; gran tristeza durante la embriaguez; apetencia particular por sidra, bebidas picantes, ácidas.

Selen. deseo muy marcado de alcohol, con hígado hipertrofiado.

Sulph. : gran deseo de alcohol y estimulantes; es un débil que bebe escondidas, suave antes de la embriaguez; brutal durante ella; sulph. ac. : gran deseo de alcohol, dice : "que el agua le enfría el estómago".

Staph. : bebedores que han abusado de placeres venéreos; creen levantarse su organismo agotado por abuso de espirituosos, más bien licores dulces que fuertes; tristes antes, durante y después de la embriaguez.

Lach. es útil para debilidad de la digestión, por hábito de alcoholismo, o abuso de merc. o quinina, cuando el estómago está tan deprimido que los alimentos más simples producen mala digestión : SI BIEN EL ALIMENTO MAS LIGERO ES MAL SOPORTADO, LOS ÁCIDOS NO FATIGAN.

A veces, dolor corrosivo en el estómago, aliviado por ingestión de alimentos pero pronto aparece sensación de pesadez, de tirón y otros trastornos de gastralgia.

Hipos, náuseas, vómitos.

DOLORES CALAMBROIDES EN EPIGASTRIO CON SENSIBILIDAD EXCESIVA AL MENOR CONTACTO.

Sensación en el estómago, de presión, corrosión aliviada al comer para reaparecer después. (Anacard.).

ABDOMEN :

VIENTRE DURO, HINCHADO, EXTREMADAMENTE SENSIBLE AL TACTO, NO SOPORTA NADA AJUSTADO ALREDEDOR DEL TALLE.

Abdomen timpanizado, sensible, doloroso; (bell.), en inflamaciones intestinales como tiflitis, inflamación con supuración o amenaza de supuración, cuando los síntomas muestran la inminencia de un estado tifoideo : el enfermo sólo puede estar acostado de espaldas, con las rodillas elevadas y presenta las grandes características del remedio.

HEMORRAGIAS INTESITNALES, durante el curso de enfermedades agudas, agotadoras como fiebre tifoidea, por ej. : DEPOSICIONES CON RESTOS DE SANGRE DESCOMPUESTA PARECIDOS A TROZOS DE PAJA CARBONIZADA.

Dolores en hígado y bazo.

No puede soportar nada alrededor del talle.

Como todos los venenos de serpiente, afecta seriamente el hígado, pudiendo provocar ictericia y toda una serie de trastornos graves de este órgano.

Especialmente apropiado para viejos ebrios. (Boericke).

ANO Y DEPOSICIONES :

Dolor lancinante en recto cuando tose o estornuda.

SENSACIÓN DE CONSTRICCIÓN DEL RECTO : NECESIDAD URGENTE O MAS BIEN, SENSACIÓN DE PRESIÓN DE ARRIBA A ABAJO EN RECTO, PEOR CUANDO TRATA DE EVACUAR; es tal el sufrimiento que le impide evacuar : como si el ano estuviera cerrado.

Es parecido a la frecuente e ineficaz necesidad de evacuar de nux vom. o la constricción dolorosa de lycop., que impide a la deposición salir, o tiene deposición incompleta. (Nash).

HEMORROIDES procidentes, muy voluminosas, púrpura, violeta, que sangran abundantemente y con sensación DE LATIDOS, PULSACIONES, como martilleo en recto.

DEPOSICIONES FÉTIDAS, MUY OFENSIVAS, formadas o no.

La fetidez de las materias fecales es muy característica, tanto en diarrea como en constipación.

Se puede aquí comparar con ars. alb. que tiene diarrea con evacuación de materia sin digerir, olor cadavérico, sobre todo después de absorción de alimentos averiados, con postración y otras grandes características.

Carbo veg. : diarrea frecuente, involuntaria, amarilla, viscosa, de olor pútrido, seguida de ardor en el ano.

Kali phosph. : diarrea abundante, acuosa, mezclada con restos de alimentos no digeridos, irritante, olor cadavérico, peor después de las comidas.

Arnica : deposiciones ofensivas, marrones, sanguinolentas e involuntarias.

Graph. : generalmente constipado, pero puede tener diarrea de deposiciones líquidas, marrones mezcladas con restos de alimentos no digeridos, extremadamente fétidas.

Asa foet. : diarrea muy fétida con meteorismo.

Ptelea : diarrea de deposiciones oscuras, olor cadavérico con cólicos, borborismos y retracción abdominal.

Baptis. : todas las emanaciones, secreciones, principalmente en fiebre tifóidea y enfermedades agudas, son fétidas : deposiciones, orina, sudor, etc.

También tienen este síntoma psor; pirog., benz. ac., borax, bismuth., cham., kreos., sulph., secale, scilla, rheum, merc. c., leptandra, phosph.

Diarrea con cólicos violentos sobre todo de noche y después de las comidas, deposiciones horriblemente fétidas, de olor cadavérico, irritantes, mucosas, sanguinolentas.

Constipación obstinada con deposiciones duras, difíciles, insuficientes, fétidas.

Aparato urinario

Dolores presivos en riñones.

Nefritis aguda.

Tenesmo violento de cuello de vejiga y SENSACIÓN DE BOLA QUE RUEDA EN INTERIOR DE VEJIGA.

Deseos de orinar urgentes y frecuentes.

Orina a veces abundante, otras escasa, turbia, oscura, marrón.

Hematuria.

Órganos genitales

1) MASCULINOS : Lascivia aumentada con disminución de potencia genital física.

Espíritu propenso a toda clase de atracciones voluptuosas, pero las erecciones son difíciles y las eyaculaciones imperfectas.

2) FEMENINOS : Lach., ES UN MEDICAMENTO EMINENTEMENTE OVÁRICO Y PARECE AFECTAR ESPECIALMENTE EL OVARIO IZQUIERDO.

Es útil desde la simple neuralgia ovárica hasta los tumores de ovario.

Aunque afecta principalmente al ovario izquierdo, esto no es exclusivo : en realidad se extiende a los dos : a sus neuralgias, hinchazones, induraciones, supuraciones, tumores.

DOLORES DEL OVARIO IZQUIERDO, ALIVIADOS POR SECRECIÓN UTERINA; NOSOPORTA NADA PESADO SOBRE ESTA REGIÓN.

Muchos remedios pueden compararse aquí con lach. : apis, muy parecido, pero actúa más sobre ovario derecho; y tiene sensación dolorosa de rotura, picadura, o ardor; a veces los dolores van del ovario izquierdo al derecho, pero con apis, se sienten al acostarse; sensación de estiramiento muy característica en la región ovárica; mentalmente apis y lach., son muy parecidos : ambos tienen celos con locuacidad, aumento de deseos sexuales con inquietudes y formas ruidosas.

Arg. met. : sensación dolorosa del ovario izquierdo, que parece muy hinchado y agravado por el menor contacto.

Prolapso uterino con dolores presivos en bajo vientre, que se extiende a espalda y muslo izquierdo, leucorrea amarilla verdosa, mal oliente y que excoria las partes; hemorragia de la menopausia; cefalalgias paroxísticas, peor a la izquierda, que vienen progresivamente y decrecen bruscamente, constitución arruinada, enflaquecimiento.

Ars. alb. : afecta los ovarios, particularmente el derecho, con dolores ardientes, marcados, tensivos y agitación que se alivia algo por continuo movimiento de pies.

Capsic. : sensación de puñaladas en el ovario izquierdo, que mejora por calor; hemorragias uterinas en la menopausia con náuseas, personas gordas, indolentes, débiles, incapaces de todo ejercicio físico.

Carbol ac. : dolores en ovario izquierdo, más caminando al aire libre; leucorrea abundante, verdosa, fétida, irritante sensación de tirones violentos a través de riñones y pelvis que llegan y desaparecen bruscamente; depresión física y mental.

Cimicif. : dolores neurálgicos en ovario izquierdo con gran sensibilidad, peor durante reglas, siempre irregulares, abundantes, de sangre negra con coágulos; dolores de seno izquierdo; dolores dorsales que se extienden a caderas y muslos; neuralgia supra orbitaria derecha; gran nerviosidad; temor de volverse loca.

Coloc. : dolores violentos, calambroideos en ovarios, particularmente izquierdo : sensación como si el ovario estuviera apretado con un tornillo; dolores desgarrantes que obligan a doblarse en dos; mejoría por presión fuerte y calor.

Graph. : afecta tanto el ovario izquierdo como el derecho y alivian cuando los dolores son seguidos por pérdida vaginal, pero difiere tanto de la constitución de lach. y los otros que el diagnóstico es fácil.

Lil. tigr. : dolores en los ovarios, principalmente izquierdo con irradiación hacia el muslo, sensación de pesadez hacia abajo, (bearing down), a vulva, con gran deseo de evacuar; congestión de útero, prolapso, anteversión, constante deseo de sujetar las partes genitales, por presión exterior; reglas adelantadas, escasas, oscuras; leucorrea marrón, irritante, ardiente; desesperación.

Lycop. : actúa especialmente sobre ovario derecho; dolores de derecha a izquierda; los síntomas gastrointestinales están siempre presentes.

Naja, puede tener neuralgia en el ovario izquierdo como si fuera tirado hacia el corazón; trastornos cardíacos concomitantes; cefalalgia con dolores de temporal y ojo izquierdo, que se extienden al occipicio, con náuseas y vómitos; gran sensibilidad al frío.

Depresión.

Pallad. : ha curado induración e hinchazón de ovario derecho; mentalmente muy diferente de lach. : desarrolla un egoísmo que se manifiesta por la preocupación por conocer la opinión de los demás; por eso se siente a menudo lastimada en su orgullo; las emociones mentales agravan los dolores craneales y si la paciente de lach. es excitable por el menor choque, una historia la hace llorar, la de pall., es fácilmente agitada en sociedad : una conversación viva, una entrevista animada, de noche, aumentan sus dolores y la fatiga física y moralmente.

Platina, ha curado afecciones ováricas en que lach. había fracasado : supuración de ovario; los dolores son ardientes, con violenta sensación de pesadez.

Thuya : violentos dolores en ovario y región inguinal izquierda que se extienden a veces a todo el miembro inferior izquierdo; agravación durante reglas, que son irregulares y a menudo precedidas por dolores de seno izquierdo; gran sensibilidad de vagina; leucorrea abundante, espesa, verdosa, que dura de una época menstrual a otra; cara de piel lustrosa, etc.

Zinc. met. : dolores agudos en ovario izquierdo que obligan a comprimir continuamente la parte enferma, y mejoran durante el período menstrual, reglas más abundantes de noche; sensibilidad dolorosa de senos; leucorrea espesa, irritante, sanguinolenta, con ulceración de cuello, más abundante durante la deposición.

A estos síntomas se asocian : inquietud, depresión, gran sensibilidad al frío; sensibilidad espinal y continua agitación de pies; consecuencias de masturbación.

Volviendo a los síntomas de los órganos genitales de lach., en mujeres, diremos QUE EL ÚTERO ES INTOLERABLEMENTE DOLOROSO A LA MENOR PRESIÓN; no puede soportar ningún contacto y debe ser librada de toda presión en esa región; afloja sus ropas, pues le causan gran molestia en el abdomen, aún sin tener ninguna afección; SENSACIÓN COMO SI EL CUELLO DEL ÚTERO ESTUVIERA CONSTANTEMENTE ABIERTO.

Los dolores de la región uterina, aumentan de vez en cuando y cada vez más, hasta que se ALIVIAN POR SECRECIÓN DE SANGRE POR VAGINA, después de algunas horas o días, la crisis dolorosa recomienza.

También tiene alivio por aparición de reglas : ammon., mur., Y platina, cuyos dolores uterinos cesan durante el flujo menstrual (Farrington); magn. phosph. : cólicos uterinos preceden a reglas y cesan cuando aparecen.

Moschus : tirones, desgarramientos, al principio de la menstruación, que cesan cuando la sangre corre.

Zincum : violentos dolores en ovarios, aliviados por reglas, pero este alivio es definitivo; en lach., cuando las reglas han cesado, el dolor no tarda en volver.

Lach. TIENE REGLAS POCO ABUNDANTES DE SANGRE ESPESA, NEGRA, FÉTIDA; DOLORS EN CADERAS QUE IRRADIAN A OVARIOS, SOBRE TODO, IZQUIERDO; MEJORA CUANDO EL FLUJO MENSTRUAL ESTA BIEN ESTABLECIDO.

Espasmos abdominales, durante reglas.

Antes, dolores y latidos en la cabeza, vértigos, epistaxis, sensación de depresión en el estómago, eructos, dolores cortantes en hipogastrio, secreción mucosa por uretra y calambres en el pecho (Jahr).

Al aparecer las reglas, dolor de riñones con dolores de rotura en caderas y pecho; alivio cuando las reglas corren abundantemente.

Durante reglas, dolor de riñones como de parto, dolores de cabeza, latentes, cortantes.

Antes y después, diarrea con fuertes cólicos (Jahr).

HEMORRAGIAS UTERINAS REBELDES CON TUFARADAS DE CALOR; vértice caliente, cara pálida, desfallecimientos, trastornos de circulación capilar, comunes a la MENOPAUSIA; los medicamentos más indicados en esta edad son : lach., sulf., crotal. y kreosot.

LEUCORREA VERDOSA, ABUNDANTE, ÁCIDA, IRRITANTE, COMO APRESTO.

Puede ser comparado aquí a : bovista : leucorrea verdosa, ácida, espesa, a continuación de reglas; no puede soportar ropa ajustada alrededor del talle.

Puls. : leucorrea espesa, amarillo verdosa, pero no irritante.

Merc. : leucorrea verdosa, excoriante, con sensación de llaga en vagina, comezón y ardor, todo peor después de orinar y mejor lavándose con agua fría.

Nat. sulph. : leucorrea amarillo verdosa irritante, corrosiva, con hinchazón de partes y dolores ardiente; blenorragia.

Sepia : leucorrea verdosa, fétida, corrosiva, con comezón y latidos envagina; violento prurito vulvar.

PROLAPSO DE MATRIZ, QUE ESTA CONGESTIONADA (sepia), granutilidad en cáncer de útero y seno, en ambos casos el tumor reviste una apariencia azul púrpura y está ulcerado, deja correr sangre oscura y descompuesta. Enrojecimiento e hinchazón de vulva.

Excitación sexual que llega hasta ninfomanía.

Aparato circulatorio

Es uno de nuestros medicamentos más útiles en TRASTORNOS AGUDOS, O CRÓNICOS DE CORAZÓN : sofocación y tos característicos y agravación por toda constricción son los grandes síntomas.

PALPITACIONES ANSIOSAS CON SENSACIÓN DE CONSTRICCIÓN EN REGIÓN DEL CORAZÓN (cactus, iodium, ars., lilium).

SINCOPEs frecuentes.

TUFARADAS DE CALOR : circulación muy perturbada : tufaradas de calor como en la menopausia, flujo de sangre en la cabeza con frío en los pies, palpitaciones con sensación de constricción alrededor del corazón como si estuviera apretado por una cuerda.

Con respecto a las tufaradas de calor, hay que pensar en amyl nitr., que tiene tufaradas de calor, a veces seguidas por sensación de frío en todo el cuerpo y sudores abundantes con angustias y palpitaciones.

Glonoïn. : aflujo de calor particularmente interno en cabeza y cerebro.

Mang. acet. : tufaradas de calor en cara, pecho, y espalda : transpiración abundante con respiración corta; sangui. : aflujo de sangre a cabeza y pecho con mejillas rojas y ardientes; sensación de ardor en todo el cuerpo como por agua caliente.

Sepia : tufaradas de calor que parecen necer en órganos pelvianos, donde se ve la sensación de pesadez característica.

Sulph. ac. : tufaradas de calor constantes con escalofríos y temblor en todo el cuerpo y gran debilidad.

Sulph. : tufaradas de calor con manos y pies calientes, y gran sensación de vacío en hueco del estómago, sobre todo hacia las 11 de la mañana.

Bajo su acción LA SANGRE SE DESCOMPONE, se hace INCOAGULABLE, con TENDENCIA A HEMORRAGIAS.

HEMORRAGIAS DE SANGRE OSCURA CON SEDIMENTOS COMO DESECHOS DE PAJACARBONIZADA.

Hemorragias por todas las mucosas; la más pequeña herida sangra abundantemente, sangre oscura que no coagula.

Aparato respiratorio

1) NARIZ : Secreción catarral acuosa, A MENUDO PRECEDIDA O ACOMPAÑADA AL PRINCIPIO POR DOLOR DE CABEZA, con latidos, más asentado en temporal izquierdo y frente.

Y QUE CURA CUANDO EL CORIZA ESTA BIEN ESTABLECIDO.

ACOMPAÑANDO el coriza, hay a menudo vesículas en la nariz, enrojecimiento o hinchazón de cara y párpados, escalofríos en todo el cuerpo, palpitaciones y gran relajamiento de toda la economía.

Muy útil en resfrios por cambios de tiempo, en primavera.

Coriza precedido por dolor de cabeza, con enrojecimiento y sensibilidad de nariz y secreción acuosa y abundante; estornudos, CATARRO DE HENO.

EPISTAXIS ABUNDANTES.

Lach. puede también ser útil EN OZENA de origen mercurial o sífilítico.

Se puede comparar aquí kali bichr., que le sucede bien y nitri. ac., merc. y lac. can. : curan bien la ozena y la angina de origen sífilítico cuando bordes de boca y nariz están agrietados.

2) LARINGE : SENSIBLE AL MENOR TACTO; ESPASMO DE GLOTIS : sensación como si algo descendiese de garganta a laringe, deteniendo la respiración; sensación de sofocación y estrangulación estando acostado, particularmente teniendo algo ajustado alrededor del cuello.

Ronquera continua con SENSACIÓN, EN GARGANTA, DE ALGO QUE NO PUEDE DESPEGAR.

Parálisis en cuerdas vocales.

3) PULMONES : La menor cosa cerca de boca o nariz, molesta la respiración; arranca y tira lejos todo lo que rodea su cuello, garganta, pecho, porque se sofoca.

RESPIRACIÓN CORTA AL MENOR ESFUERZO; disnea muy penosa, respiración corta al caminar, sobre todo EN VIEJOS BORRACHOS Y AFECCIONES DEL CORAZÓN.

LA RESPIRACIÓN SE DETIENE CUANDO VA A DORMIRSE (Grindel).

Ataques de asma nocturnos o después de comer.

Sensación de peso considerable sobre el pecho.

TOS SECA, RUIDOSA, AGRAVADA POR EL MAS PEQUEÑO TOQUE DE GARGANTA Y LARINGE.

TOS DURANTE EL SUEÑO QUE NO DESPIERTA AL ENFERMO, que no se da cuenta de que tose.

Lach. cura a menudo estos accesos de tos rebelde, después que cham., que también tiene este síntoma, ha fallado.

Para LA TOS SECA, BREVE, SIMPÁTICA, CON TRASTORNOS CARDIACOS, lach. esa menudo el remedio.
 Tos con dolores en el ano y puntadas en hemorroides.
 Expectoración de esputos mucosos y sanguinolentos con gustodesagradable.
 Hemoptisis, con hemorragias características.
 Es uno de nuestros mejores remedios en neumo tifus y complicaciones pulmonares de tifoidea; miremos siempre la lengua en estos casos (Nash).
 Espalda y extremidades
 Provoca temblor, no por susto o excitación, sino POR EXTREMA DEBILIDAD.
 En esto se parece a gels. : en ambos, el cuerpo entero tiembla, pero conlach. el enfermo se siente desfallecer como si fuera a caer muerto.
 POSTRACIÓN FÍSICA QUE PUEDE LLEGAR A SER TAN GRANDE COMO LAMENTAL Y QUE NO MEJORA POR REPOSO O SUEÑO; AL CONTRARIO, ES PEOR A LA MAÑANA, DESPUÉS DE DORMIR.
 Sensación de ardor en la espalda.
 Dolores de dislocación en riñones después de ejercicio violento.
 Dolores de coxis; le parece estar sentado sobre algo puntiagudo.
 Parálisis izquierda consecuencia de ataque de apoplejía o agotamiento cerebral.
 Sensación de fatiga en brazos.
 Dolores agudos y tirones en piernas; dolores de noche, en muslos y rodillas.
 Frío glacial en manos y pies que están como entumecidos, muertos.
 Piel
 COLORACIÓN PÚRPURA, OSCURA, AZULADA.
 Hinchazón en cualquier parte del cuerpo con coloración azulada característica, que llega a veces al negro. (Anthrax, tarent.).
 ULCERACIONES, ESCARAS, ÁNTRAX, FORÚNCULOS, ABSCESOS, ETC.
 Cuando hay GRAN HIPERSENSIBILIDAD AL TACTO, y tienen COLORACIÓN AZULADA, violácea, púrpura oscura y SUS SECRECIONES SON EXTREMADAMENTE FÉTIDAS.
 Tendencia a malignidad.
 ULCERACIONES QUE SANGRAN FÁCIL y abundantemente, como las más pequeñas heridas de lach. : sangran mucho más de lo que la importancia de la lesión haría suponer.
 PÚRPURA HEMORRÁGICA.
 ERISPELA más marcada a la izquierda, la piel, primero francamente roja, toma pronto coloración azul oscuro; hay infiltración considerable del tejido celular; pulso pequeño y acelerado; el enfermo está débil, adormecido, con delirio, balbuceo o predisposición marcada a locuacidad.
 Comparar aquí bell., apis., rhus tox., euphorb.
 Fiebre
 Principalmente al atardecer y la noche con calor seco, sed inextinguible, agitación y angustia.
 Escalofríos intensos con frío glacial y cara pálida.
 Escalofríos en la espalda.
 Pies fríos como hielo.
 Calor con tufaradas de calor en la cara; aflujo de calor y transpiración caliente.
 Sudores abundantes a la mañana, enfriamiento fácil durante el sudor.
 Fiebre tifoidea; en general indicado en la 2a. y 3a. semana (bapt.).
 Fiebre intermitente en primavera, a pesar del uso de la quinina; escalofrío a las 13 ó 14 hs., y durante el escalofrío apila sobre sí frazadas y ropas, no tanto para calentarse sino por peso, para impedir el temblor (gels.).
 Relaciones
 Complementarios
 Lycop., hep. sulf. calc., salamandra.
 Incompatibles
 Acet. ac., carbo ac., dulcam., am. carb., psor.
 Antídotos
 EL ALCOHOL, EL CALOR, LA SAL; ars., merc., alum., bell. calc., coffea, cham., coccul., carb. veg., hep. sulf., ledum, nux vom.

LEDUM PALUSTRE

Ledum palustre o romero silvestre, pequeño arbusto que crece en terrenos de turba y pantanos del norte de Europa, Francia, los Vosgos, Asia y América; se cultiva también en jardines.
 Planta siempre verde, alto 6 a 10 cm.; sus flores en estado fresco tienen olor resinoso, fuerte y sabor amargo astringente, nauseoso.

Se recoge la planta entera en el momento de la floración, para hacer tintura madre con la que se obtienen por diluciones Hahnemannianas sucesivas las diferentes dinamizaciones.

Acción general del medicamento

Ledum actúa electivamente sobre RED CAPILAR SANGUÍNEA de todo el cuerpo, pero particularmente donde el tejido celular es poco abundante.

Por eso su influencia se ejerce particularmente en extremidades de miembros cuya textura es ordinariamente más resistente y seca.

Factor potente de depresión.

Al privar al sistema capilar de su tono normal, provoca la mayoría de sus efectos siendo los principales sufusiones sanguíneas violáceas bajo la piel, hemorragias capilares de parénquima de vísceras, particularmente pulmones y útero; inflamaciones articulares, sobre todo pequeñas articulaciones, y particularmente del dedo grande, como en la gota y que van acompañadas por enrojecimiento violáceo circunscripto, hinchazón edematosa y sensación de frío al tacto (Espanet).

Características

1) CONSTITUCIÓN Y TIPO : Se adapta particularmente A CONSTITUCIONES REUMÁTICAS Y GOTOSAS; también en individuos QUE HAN ABUSADO DEL ALCOHOL (colch.); "contrario o quita el efecto del whisky; es al whisky lo que cala. al hábito de fumar; se puede con este último quitar el hábito al tabaco, al punto de que pasa de un extremo al otro, pudiendo llegar a aversión" (Kent).

Individuos pletóricos, sanguíneos, entrados en carne, fuertes, denaturaleza-robusta, cara roja, hinchada, soplada, piel marmórea, SANGRAN FÁCILMENTE : donde hay inflamación, ledum tiene tendencia a sangrar, y la sangre es negra; a veces las hemorragias tienen lugar en cámara anterior del ojo, nariz o cavidades viscerales, en cualquier parte (Kent).

El sujeto de ledum a menudo ESTA FRÍO : cuerpo frío al tacto; frío en extremidades y cabeza caliente, o a la inversa, acalorado, cuerpo y cabeza demasiado calientes; de noche retira sus frazadas.

Sensación de latidos y pulsaciones en todo el cuerpo y piel violeta fuertemente colorada (Kent).

2) EQUIMOSIS POR CAÍDA O TRAUMATISMO : Termina a menudo muy bien una cura de arnica, excelente remedio para contusiones y sus consecuencias.

Termina curas que arnica ha comenzado bien pero no pudo terminar; es excelente para acabar de limpiar las manchas equimóticas; sulph. ac., también es muy empleado contra equimosis de origen traumático, sobre todo en individuos debilitados y caquéticos, con tendencia a púrpura y derrames sanguíneos.

Es específico para : "ojo en compota".

Para equimosis de conjuntiva o esclerótica, nux vom., es el mejor, pero para "el ojo en compota" por un puñetazo, ledum es inigualable. (Symph.).

3) Buen remedio PARA HERIDAS POR INSTRUMENTOS PUNZANTES y PICADURAS DE MOSQUITOS U OTROS INSECTOS; es el antídoto de los venenos de : abeja, insectos, ciertos reptiles (Kent).

Especialmente, si en la zona de la picadura la piel se pone fría, después pálida, marmórea, paralizada.

Según Teste, ledum ES A HERIDAS POR PICADURA LO QUE ARNICA ACONTUSIONES.

Pero hay que tener en cuenta el tejido atacado : si el lesionado es un nervio : hyperic. será el mejor, si es el periosteo : TUTA; si es un hueso, calc. phosph., o symph.

4) DOLORES REUMÁTICOS QUE COMIENZAN EN PIES Y VAN DE ABAJO A ARRIBA, CON ARTICULACIONES HINCHADAS PERO PÁLIDAS; LOS DOLORES SE AGRAVAN DE NOCHE, POR CALOR DEL LECHO Y FRAZADAS; SE ALIVIAN POR FRÍO, DE TAL MANERA QUE A VECES, PARA OBTENERLO, PONE LOS PIES EN AGUA FRÍA.

Remedio de naturaleza netamente reumática y gotosa.

Tiene los síntomas de las personas que sufren de gota y tienen tofos en articulaciones; con aparición de abajo a arriba, las articulaciones gotosas se inflaman de repente y se alivian por frío.

Ledum PARECE ELEGIR PARTICULARMENTE LA RODILLA, y conviene a casos antiguos y prolongados de inflamación reumática de rodilla; se verá a tales enfermos, sentados con la articulación enferma expuesta al frío, abanicarla o cubriéndola con lociones de éter o cloroformo que, al evaporar la refrescan.

Reumatismo de extremidades, con hinchazón y dolores aumentados por movimiento, de noche, por calor de la cama y aliviados por aplicaciones frías; al mismo tiempo, orina abundante y pálida, cargada de uratos (Kent).

Modalidades

Agravación

a) POR MOVIMIENTO.

b) DE NOCHE.

c) POR CALOR, POR EL CALOR DEL LECHO, DE LAS FRAZADAS; otros remedios también tienen esta agravación : apis, cuyas cefaleas con dolores presivos en frente y temporales, empeoran de noche al calor de la cama; cham. : odontalgia con dolores insoportables agravados de noche al calor de la cama; drosera : tos seca, espasmódica, coqueluchoidea, agravada de noche al calor de la cama; merc. que es tal vez el que tiene más marcada

esta agravación por el calor del lecho; puls. : agravada por el calor del lecho y por calor en general; sulph. : en que muchos de los síntomas, entre otros el prurito cutáneo, se agrava de noche al calor del lecho.

Mejoría

a) POR REPOSO b) POR FRÍO, PONIENDO LOS PIES EN AGUA FRÍA (puls.).

Cabeza

No le gusta tener la cabeza cubierta.

Cabeza pesada con sacudida dolorosa de cerebro al dar un paso en falso.

Dolor de cabeza presivo como si tuviera un peso que deprimiera todo el cerebro.

Violentos dolores pulsátiles en cabeza.

El dolor de cabeza se alivia por frío, por eso no quiere cubrirse la cabeza, al contrario, se pone en la ventana para tener la cabeza al aire frío o le gusta bañarla en agua fría.

Vértigo que lo aturde; sensación de embriaguez agravada al agacharse.

Ojos

Inflamación dolorosa y comezón; lagrimeo ardiente.

EXTRAVASACIÓN SANGUÍNEA (CONTUSIÓN DE ÓRBITA) EQUIMOSIS DE PÁRPADOS, DE CONJUNTIVA.

Symph. es buen remedio para traumatismo de ojos por instrumentos contundentes.

Cara

Hinchada, inflada, como lach., ya roja, ya pálida; puede tener aspecto estúpido, como la de un viejo borracho.

Enrojecimiento con erupción tuberosa en cara y frente, como en borrachos, con dolores lancinantes al tacto.

Granitos en cara, frente y mejillas.

Aparato urinario

Deseo frecuente de orinar con emisión poco abundante o al contrario, emisiones frecuentes y abundantes.

Ardor en uretra después de micción.

Depósito de arena roja, tan abundante como lycop.

Cuando tiene tal depósito, se siente bien; pero si disminuye o desaparece, los dolores articulares aumentan o vuelven.

Órganos genitales

Reglas demasiado tempranas y abundantes, rojo vivo, con ausencia de calor vital : gran frío en el cuerpo, y sin embargo, quiere aire frío.

Mujeres gotosas desde hace mucho tiempo, con cara marmórea, hinchazón que no se debe a edema sino a estasis venoso, con flujo menstrual demasiado precoz y abundante, y grandes dolores durante reglas.

Útero y órganos pelvianos extremadamente sensibles al tacto a tal punto que todo examen profundo es imposible (Kent).

Espalda y extremidades

Rigidez dolorosa en espalda y región lumbar después de estar mucho sentado.

REUMATISMO QUE COMIENZA EN PIES, Y VA DE ABAJO A ARRIBA (kalmia) lo contrario; ledum está indicado TANTO EN CASOS AGUDOS COMO EN CRÓNICOS.

En agudos : articulación hinchada, caliente, PERO NO ROJA; LA HINCHAZÓN PÁLIDA; LOS DOLORES ESTÁN PEOR DE NOCHE Y AL CALOR DEL LECHO : desea descubrir la articulación enferma como merc., pero en éste los sudores que no alivian, y sobre todo los síntomas característicos de boca y lengua, ayudarán en la elección.

En casos crónicos : articulaciones hinchadas y con dolores netamente agravados al calor de la cama; concreciones calcáreas se forman en la zona, en pie primero, cuyas articulaciones son las primeras atacadas, luego mareos; periosteo de falanges y planta de pies sensible, no se puede apoyar encima (ant. crud., silic.).

En el reumatismo de ledum, el sujeto está normalmente frío; le falta calor animal : en esto se parece a silic., pero éste no se agrava por el calor de la cama; al contrario le gusta estar muy abrigado; en ledum, el alivio por frío es tal que la única forma de calmar los dolores reumáticos, es mojar las partes dolorosas con agua fría.

Dolores reumáticos en personas ancianas que tienen siempre frío y pies helados; les falta calor (sepia, silic.); articulaciones frías al tacto aunque no tenga subjetivamente semejante sensación.

REUMATISMO Y GOTA, QUE COMIENZAN EN PIES Y SUBEN A LAS OTRAS ARTICULACIONES, especialmente si el abuso de colch. lo ha llevado a estado de gran debilidad y astenia; nudosidades y tofus gotosos en articulaciones que están dolorosas; artritis aguda y crónica (Allen).

Ledum afecta fácilmente hombro izquierdo (ferr. met.) y cadera derecha, con crujidos y aflojamientos al caminar.

Hinchazón dura y tensa de rodilla con puntadas y dolores nocturnos, presivos y desgarrantes.

Hinchazón inflamatoria de parte carnosa del dedo grande con dolor al apoyar el pie.

HINCHAZÓN GOTOSA DEL DEDO grande como amm. carb., que ha mostrado dolores en talones al estar parado; bothrops : hinchazón del dedo grande derecho, con dolores intolerables; colch., rhodod. : dedo grande hinchado y doloroso sobre todo de noche, y mejorado por calor; sulph. : PLANTA DE PIES MUY SENSIBLE; no puede apoyarse sobre ella, como ant. crud., lycop., y silic.

Hinchazón hidrópica de extremidades, hinchazón violácea de manos, pies y piernas; hinchazón tan fuerte como la piel lo permita, marmórea, violácea y dolores atroces.

El único alivio es bañar las partes hinchadas en agua fría.

Adelgazamiento de miembros dolorosos.

Piel

Manchas azuladas como petequias.

Comezón con sensación de ardor después de rascarse; empeines secos, furfuráceos, excesivamente pruriginosos.

Viejas úlceras dolorosas a cuyo alrededor la piel es marmórea, que el enfermo quiere siempre al frío, y se alivia por frío (Kent).

Relaciones

Antídoto de lach., apis, venenos de serpiente o insectos.

LILIUM TIGRINUM

O lirio de China, planta ornamental vivaz de la familia de las liliáceas, originaria de China y Japón.

Preparamos con el tallo, hojas y flores recién recogidas, en el momento de la floración, la tintura madre con la que obtenemos por diluciones Hahnemannianas sucesivas las diferentes dinamizaciones.

Acción general del medicamento

Manifiesta su acción principal sobre órganos de la pelvis; se parece a la de sepia, y se adapta a muchos síntomas reflejos, que dependen de trastornos patológicos DE ÚTERO Y OVARIOS.

Por eso tiene, indirectamente, marcada acción sobre el CORAZÓN.

Características

1) CONSTITUCIÓN Y TIPO : Lilium tig., desarrolla particularmente bien sus síntomas en mujeres nerviosas que sufren trastornos uterinos con diversos síntomas cardíacos y manifestaciones histeriformes.

Muy irritables, llenas de ideas locas, melancolía religiosa con prolapso uterino y trastornos cardíacos; a menudo estos diversos estados son alternantes y cuando los más marcados son los síntomas mentales, los físicos mejoran y viceversa.

Son mujeres de circulación venosa obstruida, apariencia pletórica, sanguíneas, entradas en carnes, fuertes, muy nerviosas; a menudo manifiestan el estado de lil. tig. al máximo en la edad crítica.

Recuerda a puls. por el deseo de fresco y de movimiento que, al favorecer la circulación venosa, mejora los síntomas : les gusta el aire libre y caminar al aire libre, excepto si el prolapso es muy marcado porque la marcha lo agrava.

Todos estos estados se manifiestan particularmente en mujeres solteras.

Moralmente, son desagradables, incapaces de decir una palabra amable a nadie; responden de mal humor, aunque se las interroga con bondad; son tan irritables que ni sus amigos las pueden apaciguar; tal consuelo las excita; es imposible complacerlas.

Irrazonables, ilógicas, fantásticas, tienen ideas falsas de todo; sienten impresiones falsas, ajenas a la realidad, y pervierten todo.

Atormentadas de noche por ideas religiosas exageradas que las obsesionan y mantienen despiertas.

Les gusta la soledad para rumiar preocupaciones imaginarias.

Sus ideas no son claras y esta oscuridad aumenta si se esfuerzan para aclararlas; cometen errores al hablar, escribir; no pueden mantener su atención.

Todo esto se asocia a menudo con irritación de órganos sexuales, violenta excitación general, ninformanía con espasmos, palpitaciones, sudores y períodos de agotamiento.

2) SENSACIÓN DE PESADEZ EN BAJO VIENTRE COMO SI EL CONTENIDO DE LA PELVIS FUESE A SALIR POR LA VAGINA, SI NO SE TUVIERA PRECAUCIÓN DE CONTENERLO POR PRESIÓN DE LA MANO, O AL SENTARSE : SENSACIÓN DE CONSTANTE PESADEZ ABAJO, EN REGIÓN UTERINA, CON SENSACIÓN COMO LAS VÍSCERAS PELVIANAS Y TODO EL CONTENIDO ABDOMINAL FUESEN TIRADOS HACIA ABAJO, HASTA LA VAGINA; ESTA SENSACIÓN DE TIRÓN HACIA ABAJO SE SIENTE TAMBIÉN EN PECHO Y HOMBROS.

Modalidades

Lateralidad

IZQUIERDA.

Agravación

a) EN CUARTO CALIENTE; los dolores de cabeza, disnea y mayoría de síntomas se agravan en cuarto caliente; se sofoca en pieza llena de gente, teatro, iglesia, como apis, iod., kali hydr., lycop., puls.

b) POR CONSUELO (nat. mur.).

c) Acostada sobre EL LADO DERECHO.

Mejoría

a) AL AIRE LIBRE, POR CAMINAR AL AIRE LIBRE; quiere estar en cuarto fresco; el dolor de cabeza y mayoría de síntomas se alivian por fresco, en cuarto fresco, caminando lentamente al aire libre.

b) ACOSTADO SOBRE EL LADO IZQUIERDO.

Síntomas mentales

ESPÍRITU DEPRIMIDO : le cuesta pensar y reflexionar; irritable, desagradable, colérica.

Además tímida : a menudo tiene necesidad de llorar y le cuesta impedirlo; como nat. mur., AGRAVACIÓN POR EL CONSUELO.

Sensación difícil de describir, como si estuviera "tocada" tiene la impresión de que desvaría y que cuanto más trata de razonar, más desvaría : cuanto más trata de pensar en algo, menos lo recuerda, debe pensar en otra cosa para recordarlo.

SENSACIÓN COMO SI SE FUERA A VOLVER LOCA.

Esta sensación es como una especie de confusión mental, como incapacidad para concentrarse, reflexionar.

A veces se parece a vértigo, como si todo girara y fuera a enloquecer.

También puede parecer un tremendo dolor de cabeza, desgarrante, terrible sobre todo en la frente y que va a volverla loca; dolor de cabeza con confusión mental como si fuera a enloquecer.

DESATENTA, NO PUEDE QUEDARSE TRANQUILA : DEBE ESTAR OCUPADA.

AGITACIÓN CONSTANTE, HACE TODO CON PRISA Y PRECIPITACIÓN (arg. nit., aurum, alum., merc., nat. mur., nux vom., medorr., sulph. ac., etc.).

Apática, inerte, pero no puede estar tranquila.

Está sentada, rumiando sus ideas, pensando en cosas pasadas, pero cuando se le habla se levanta bruscamente, camina con agitación, golpea la puerta sin razón; si un familiar o amigo le dirige la palabra con bondad, parece enloquecer.

Una enferma con la agravación de este remedio decía : "un amigo me habló hoy en el tranvía, pero esto me puso tan furiosa que tenía ganas de tirarle algo a la cabeza.

Estaba pensando en algo y no deseaba ser molestada".

Esto responde a estado de violenta irritabilidad, pérdida de equilibrio mental, estado de cólera fácil.

Desearía huir cuando le hablan, o la molestan; al encontrarse con amigos tiene esta sensación; su contacto parece sacudir la de su estado de laxitud y sopor pero demasiado violentamente (Kent).

Tendencia a ideas oscuras.

Tiene toda clase de síntomas provocados por excesos sexuales, en mujeres nerviosas y agitadas, en que la excitación sexual causa confusión mental y palpitaciones.

MANÍA RELIGIOSA; se atormenta por su salvación.

(Cyclam., puls., sulf., ver. alb.).

Teme padecer una enfermedad incurable.

Sueño

Agitado, interrumpido, lleno de sueños desagradables.

Cabeza

Cefalalgia, con calor y dolor frontal; sensación de plenitud, pesadez, calor.

Dolor de cabeza ligado a desordenes uterinos.

Sensación de pinchazos extremadamente desagradables, que enloquece a la enferma, subiendo del occipucio al vértice.

El dolor de cabeza mejora al aire libre, por fresco y se agrava en cuarto caliente.

Dolor de cabeza frontal, supraorbitario relacionado con grandes trastornos visuales : el cuarto parece oscuro, dificultad de acomodación y aún pérdida de vista.

Muy a menudo, con los dolores de cabeza hay estrabismo convergente o amenaza de síncope; esto nos muestra cuán nerviosa e hipersensible es la enferma de lil. tig.

También van asociados con latidos del corazón, dolor a lo largo de columna vertebral y prolapso uterino más o menos marcado con gran sensación de ptosis en pelvis y todo el abdomen.

Si bien todos estos síntomas se pueden encontrar a la vez, pueden también alternar : cuando uno está presente, el otro está ausente (Kent).

Ojos

Conjuntivitis.

Fotofobia.

Trastornos nerviosos de la vista.

Espasmos de párpados; movimiento sacudidos de glóbulos oculares, estrabismo.

Aparato digestivo

ESTOMAGO :

Gran sed, bebe a menudo y mucho a la vez. (Nat. mur.) Gran deseo de carne (abies can., calc. phosph., magn. carb., menyantes).

Distensión de estómago por gases.

Náuseas por tabaco.

ABDOMEN Y DEPOSICIONES :

Abdomen sensible y distendido.

Borborismos; emisión de gases.

Sensación de temblor en abdomen.

Relajamiento de paredes abdominales.

Todas las vísceras abdominales parecen tiradas de arriba a abajo desde el estómago; sensación en el vientre de órganos caídos, ptosis que desea sostener; quiere apretar su vientre con las manos para sostener los órganos.

Sensación de vacío, peso en estómago, vientre y pelvis, como si todos los órganos fueran a caer por vagina.

Diarrea matutina con necesidad urgente, que hace saltar de la cama; se podría confundir con sulphur, porque lil. tig., también tiene gran sensación de calor en cabeza, de vacío en estómago y ardor en planta de pies y palma de manos.

Sus grandes características permitirán diferenciarlos.

Diarrea con deposiciones mucosas, sanguinolentas y tenesmo a veces marcado.

No se debe confundir con merc. corr. liliun conviene sobre todo a disenterías que sobrevienen de vez en cuando, como manifestación crónica, en mujeres con las características generales; ataques de disentería por cada enfriamiento en mujeres que sufren de ptosis uterina, con sensación de relajamiento de pelvis y abdomen; gran irritabilidad nerviosa, palpitaciones, etc.

Aparato urinario

Frecuentes deseos de orinar; tenesmo e irritación vesical con ardor de uretra.

Orina espesa y rojiza, o límpida y blanca.

Órganos genitales

SENSACIÓN DE PESADEZ EN ABDOMEN COMO SI MATRIZ Y TODOS LOS ÓRGANOS TENDIERAN A ESCAPAR POR VULVA; MEJORÍA APRETANDO LA VULVA CON LAS MANOS (bell., mosch., murex, sepia).

Congestión uterina con PROLAPSO.

Dolor de ovarios; dolores lancinantes, tirones sobre todo a la izquierda con irradiaciones a muslos.

REGLAS adelantadas, escasas, POCO ABUNDANTES, de sangre oscura, en coágulos irritantes.

A veces CORREN SOLAMENTE CUANDO SE MUEVE; todo esto recuerda a puls.

Leucorrea amarillo marrón (sepia, ars., hydrastis., cham.) quemacha la ropa, irritante, excoriante.

Aparato circulatorio

Palpitaciones de corazón; eretismo cardíaco.

Sensación como si el corazón estuviera apretado o como si estuviera a punto de estallar; sensación de frío alrededor del corazón.

Pulsaciones en todo el cuerpo.

Pulso irregular rápido.

Sensación de sofocación en cuarto caliente.

Espalda y extremidades

Dolores de espalda y a lo largo de columna vertebral.

Columna vertebral sensible, irritable, temblores.

Dolor localizado en un solo punto fijo del cuerpo; poco extendido.

Sensación de ardor en palma de manos y planta de manos y planta de pies.

Dolores desgarrantes en cadera derecha.

Debilidad al caminar; sólo puede caminar en suelo plano.

Relaciones

Antídotos

HELONIAS.

LYCOPodium CLAVATUM

Lycopodium clavatum o lycopodium, o pie de lobo, crece en Europa sobre todo en Finlandia, Rusia, Suiza, los Alpes y Pirineos, en terrenos pedregosos y montuosos entre matorrales, o a la sombra de abetos; es un gran musgo de donde se elevan pedúnculos redondos terminados en dos pequeñas espigas cilíndricas, pares, compuestas de cápsulas reniformes con dos valvas; los esporos de estas cápsulas forman el polvo de lycopodium, amarillo, pálido, fino, muy liviano y extremadamente inflamable.

De ahí el nombre de azufre vegetal.

Cada uno de estos esporos está cubierto por una caparazón muy gruesa y dura que la materia médica oficial considera inerte.

En realidad, encierra una pequeña cantidad de substancia aceitosa, activa, que se pone en libertad por trituración.

Se considera uno de los más útiles y preciosos medicamentos experimentados por Hahnemann.

Acción general del medicamento

Así como sus patogenias dan el cuadro de una afección que se desarrolla gradualmente y va hacia una evolución crónica, lycopodium SE ADAPTA ESPECIALMENTE A ENFERMEDADES QUE CRECEN PROGRESIVAMENTE. Determina DEBILITAMIENTO GENERAL DE LA ECONOMÍA, repercutiendo de

manera más marcada sobre APARATO DIGESTIVO Y ANEXOS, YA QUE LA ATONÍA GASTRO INTESTINAL Y HEPÁTICA son muy marcadas en casi todos sus casos.

Ese carácter general de la influencia de lycop. en su acción más profunda : SU ACCIÓN DEPRIMENTE, se traduce en ABATIMIENTO, DEBILIDAD MENTAL Y FÍSICA MARCADA, el enfermo tiene aspecto enfermizo, extremidades frías, anorexia, digestión lenta e irregular, estado flatulento característico, constipación, catarro pasivo de vías aéreas, estado de languidez típico de la envoltura cutánea (Hughes).

Lycop. actúa muy profundamente sobre el organismo; hace sentir muy íntimamente su influencia en tejidos blandos, vasos sanguíneos, huesos, hígado, conviniendo a la debilidad real de la célula hepática (Mouëzy-Eon), corazón, articulaciones, no hay nada en el hombre que lycop. no pueda alcanzar; los cambios de los tejidos son sorprendentes; tendencia a necrosis, úlceras, adelgazamiento (Kent).

Características

1) CONSTITUCIÓN Y TEMPERAMENTO : INDIVIDUO DE INTELIGENCIA VIVA, ESPÍRITU PENETRANTE, PERO DE DÉBIL DESARROLLO MUSCULAR; FLACO CON TENDENCIA MARCADA A AFECCIONES DEL HÍGADO (Nash).

Piel de cara descolorida, pálida o amarilla, malsana, mejillas hundidas con ARRUGAS PREMATURAS Y MARCADAS, índice de enfermedad crónica profunda.

Sobre este fondo terroso los pómulos se destacan un poco coloreados con varicosidades venosas más o menos acentuadas; las mejillas tienen flujo de sangre fácil, sobre todo después de las comidas.

Cabello generalmente escaso; ojos hundidos y rodeados de un tinte azul ya veces ojeras negras; pero BRILLAN INTELIGENTES Y VIVOS EN MEDIO DE ESTA CARA QUE PARECE PRECOZMENTE DETERIORADA.

Alas de la nariz nerviosas, móviles; en disneas graves de lycop. laten con movimiento concordante con los movimientos respiratorios.

Músculos de cabeza y particularmente cara agitados por tics nerviosos.

ESTA CARA DE lycop. ESTA DE ACUERDO CON SUS SENSACIONES : (Kent); individuo supersensible, cuyos rasgos de la cara se contraen al menor ruido; si lo molestan se ve la expresión contrariada de su cara; cuando sufre sus cejas se fruncen, su frente se arruga y se lee su sufrimiento en su cara.

Puede haber en piel de cara, manchas cobrizas como en viejos casos desífilis. Si se lo hace desnudar, se ve en medio de un cuerpo de musculatura pobre, bajo un tórax deprimido, UN VIENTRE PROMINENTE, VOLUMINOSO, QUE DA LA IMPRESIÓN DE SER EL CENTRO VITAL DEL ORGANISMO.

De ahí parte la mayoría de sus males; ese vientre que, bajo ese tórax delgado, hundido, encogido en su parte superior y ancho en la inferior, parece sucederle sin transición alguna, manifiesta por sus proporciones exageradas su importancia en la vida de tal individuo.

Su aspecto varía, según el momento del día en que se le examine; en ayunas puede estar caído, flojo, blando al tacto; pero en cuanto come, se hincha, se hace prominente; manifiesta DEBILIDAD IRRITABLE QUE LE HACE OSCILAR, SEGÚN EL GRADO DE LAS EXCITACIONES DIGESTIVAS, DE LA FLACCIDEZ A TENSIÓN.

Las extremidades inferiores tienen la musculatura mal desarrollada; surcadas por venas varicosas, más o menos voluminosas; a menudo infiltradas, particularmente extremidad inferior de piernas.

La parte superior del cuerpo es delgada, pero la inferior es casi hidrópica (Nash).

Mentalmente en general, presenta, contrastando con su pequeña naturaleza muscular, gran actividad interior de la inteligencia, pero ha perdido la confianza en sí mismo a causa de su salud que se desmorona; por eso la voluntad se pierde fácilmente en la irresolución, oscila en lo mental como su cuerpo en lo físico; tiene miedo a la responsabilidad, a la novedad; incidentes insignificantes lo atormentan, lo desconciertan.

Triste, melancólico, deprimido por su impotencia y por la atmósfera de malestar orgánico interior en que late su vida, es minucioso, se detiene en pequeños detalles.

Muy sensible, fácilmente ofendido; sufre cóleras reconcentradas que estallan bruscamente, lo alivian; entonces está triste, áspero, durante períodos enteros, lo mismo que tiene períodos de actividad sin beneficio; no puede soportar la menor oposición, expresa con vehemencia las cosas más simples.

Adormecido durante el día, de noche sueña con accidentes, sueño cortado por sobresaltos y a menudo despierta con sensación de hambre.

Si el tipo se agudiza, se hace avaro, ávido, malicioso, a veces impotente genitalmente; su actividad intelectual se pierde, sobre todo en el hombre viejo; ligera confusión mental, la memoria se debilita, toma una palabra por otra, olvida las palabras al hablar, sílabas al escribir, no puede leer lo que ha escrito.

Este estado de decadencia es siempre atravesado por violentas cóleras, últimas chispas de una actividad que se extingue.

Aunque el remedio es útil en toda edad, lo es particularmente en adultos y niños (Nash).

El niño de lycop. tiene una cabeza bien desarrollada, inteligencia precoz, pero es enclenque y débil, enfermizo, fácilmente de mal humor y colérico.

Conviene citar aquí, el notable artículo del Dr. E. Gailhard sobre tipo del remedio en esta edad : "se ha escrito que lycop. forma con calc. carb.

y sulph. un trío de medicamentos anti escrofulosos.

La escrófula, que los antiguos autores describían con los rasgos del niño rubio, ojos azules, carnes blandas, pálidas, vientre grande, ganglios hipertrofiados, etc. exigirá a menudo calc. carb., sulph., silicea, merc., calc. phosph., pero jamás lycop.

"Puedo decir, que jamás encontré el tipo de lycop., en niños pequeños.

Parece que su tipo fuera creado por los años, modelado por la vida.

Un día llegará a vuestra consulta, traído por sus padres, un niño cuyos rasgos trataré de grabar en vuestro espíritu.

"Los padres os contarán historias de asma, eczema, trastornos hepáticos, cólicos nefríticos y esto os indicará que se trata de un hijo de artríticos.

Mirad ahora al pequeño : morochito, de ojos negros, cabeza bien conformada, pero cuerpo débil, miembros delgados, vientre grande, y ha adelgazado, os dirán, de arriba a abajo (nat. mur., abrot., sanic.).

Aspecto triste, concentrado, su cara enflaquecida, en lugar de reflejar alegría y despreocupación de la plenitud, parece marcada por las preocupaciones de la edad madura.

"No notaréis aún manchas oscuras en sienes, ni arrugas frontales que se desarrollan con los años, pero su piel es seca, oscura y en labios, alas de nariz, atrás de las orejas, veréis a veces erupciones secas, furfuráceas o supurantes o a veces pecas.

Esto es lo que observáis al primer vistazo.

"Si dejáis hablar a los padres, dirán que les ha costado mucho traerlo.

Es un niño que tiene fobia a caras extrañas y sin embargo teme la soledad, por lo que siempre está pegado a sus padres.

Es llorón.

"Vivamos ahora un día con él y al cabo de las horas nos va a demostrar los defectos de su carácter y los padecimientos de su organismo.

A la hora de despertar, la mamá se acerca al lecho y jamás es acogida por una sonrisa.

Es lo habitual.

A esta hora, el niño siempre está gruñón, irritable, descontento, rechaza a los que se le aproximan y esta irritabilidad, que es la marca de lycop.

en todas las edades, es siempre más marcada al despertar.

En nuestro pequeño parece ser, además, la expresión de sufrimiento físico, pues su sueño rara vez es bueno.

Su nariz tapada dificulta su respiración, sus párpados están pegados, suboca seca y amarga y tiene vagas náuseas.

Después de algunas exhortaciones se consigue que vaya al baño.

Allí comienza un pequeño drama.

Tiene necesidad de evacuar, hace los esfuerzos necesarios, sólo despiden algunos gases que abundan en su vientre.

Dice que siente como un tapón, que su ano está como cerrado; a veces la constipación será reemplazada por diarrea, sin gran característica, y se puede decir que si lycop. es constipado, la diarrea no constituye una contraindicación.

Lo que importa en la elección, como dice Kent, son los síntomas constitucionales.

Orina típicamente clara, a veces con depósito de arena color ladrillo, que puede dar al pasar, aún en niños pequeños, síntomas de cólico nefrítico.

Después preparamos el baño, pero el agua jamás estará suficientemente caliente.

Este niño que es friolento, ama el calor en el cuerpo pero quiere que su cara sea lavada con agua fresca.

El frío en cara y cabeza, alivia en cierta medida la cefalea que es uno de sus sufrimientos habituales. Este dolor de cabeza, del que se queja siempre más o menos, es prolongado, pulsátil, congestivo, aparece en toda ocasión; si toma frío, si tiene demasiado calor, si no come a horas regulares : se agrava de 16 a 20 horas como la mayoría de sus síntomas.

Una vez terminado el aseo se le sirve el desayuno; el niño lo reclamaba desde hace un momento, pero es muy raro verlo contento con lo que le ofrecen.

Tiene horror a la sopa caliente, la leche le da diarrea, desea todo lo que no tiene, no cesa de reclamar masas, dulces, pues sólo le gustan los alimentos dulces.

Come bastante poco, pues se sacia enseguida.

La hora del estudio ha llegado; esto no lo entusiasma mucho, sin embargo su profesor dirá que es muy inteligente, pues sabemos que la inteligencia es el consuelo del artrítico; pero se muestra disidente, razonador, jamás satisfecho con las explicaciones que le dan.

Estas pequeñas sesiones de trabajo no pueden ser prolongadas; su nerviosidad, su agitación física le impiden fijar largo tiempo su atención en un tema.

Pronto hay que darle permiso para ir a divertirse y el juego será ocasión de constatar una vez más, su carácter difícil.

El niño de calc. se muestra siempre satisfecho, amable, risueño, acogedor con sus camaradas, nuestro lycop. queda en su rincón, enfadado, tosco, pide sin cesar juguetes que no posee; jamás se mezcla a las distracciones de sus amigos, pelea con ellos, rehusa prestarles sus juguetes, manifiesta desde ya el carácter huraño que lo individualizará más tarde.

La hora del almuerzo; con la misma impaciencia de la mañana va a la mesa.

Declara tener mucho hambre y parece que va a devorar todo, pero, qué darle? Tiene horror por la sopa caliente, repugnancia por alimentos cocidos y calientes, la carne le disgusta, ningún plato está bastante condimentado. Apenas consiente en comer algunas legumbres dulces, como zanahorias, arvejas y reclamará el postre al principio de la comida.

"Su apetito que parecía magnífico se apacigua pronto, algunos bocados bastan y además empiezan los malestares digestivos que duran la mayor parte de la tarde.

Se queja de hinchazón de estómago y sobre todo de vientre; latidos del corazón, laxitud, dolor en boca del estómago si se toca, debe aflojar su cinturón, y sólo algunos eructos, a menudo ácidos, le traerán algún alivio".

Para ayudar su penosa digestión, decide hacer un poco de ejercicio y sale a caminar pues no soporta el coche que le da náuseas.

Pero pronto aparecen nuevos lamentos : si el aire es fresco, será demasiado fresco, si es caliente, demasiado caliente.

Algunos pasos bastan para fatigarlo y provocarle sudores, sensación de ardor en palmas de las manos y en pies.

Se queja del ruido, olores, revelando la agudeza enfermiza de su oído y olfato.

Habrà que volver a casa, donde esperará fatigado y somnoliento la hora de la comida y de acostarse.

Generalmente pasa mala noche.

A pesar de su sopor, le cuesta dormirse; dormirá agitado, lleno de sueños que lo asusten, gritos, despertares, sobresaltos.

Sorbe, porque la nariz tapada por mucosidades purulentas dificulta la respiración y obliga a dormir con la boca abierta.

La cefalea que lo exaspera de noche, pone su espíritu en tal estado de confusión que despierta asustado, no reconoce a nadie y necesita unos instantes para recuperarse y volver a dormirse.

A la mañana estará deprimido, fatigado y el ciclo del día penoso recomenzará a menos que intervengamos con algunas dosis bien elegidas de lycop.

Lycop. es uno de los remedios que me han parecido tener mayor duración de acción.

Chargé habló de 30 a 40 días, he encontrado que actúa a menudo mucho más tiempo sobre todo en altas diluciones.

Su acción a veces tarda en manifestarse, habrá que esperar 8 a 15 días para constatar los primeros signos.

No hay que apurarse a cambiar de remedio.

Para la modificación de síntomas mórbidos constitucionales, las altas diluciones : M, DM, CM, darán resultados más satisfactorios y durables que las bajas.

En el adulto o en el hombre hecho conviene : a trastornos variados de tubo digestivo y nutrición profunda por insuficiencia de la célula hepática.

En todas las intoxicaciones progresivas con sufrimientos gradualmente desarrollados repercuten en funciones hepáticas, trastornos que se traducen en dispepsia flatulenta, acidez gástrica, cálculos, irregularidades con tendencia a dilatación de vasos, neoformaciones vasculares.

Trastornos glandulares y catarrales, sobre todo en constituciones linfáticas o temperamento suave (Mouëzy-Eon).

Modalidades

Lateralidad

DERECHA : DE DERECHA A IZQUIERDA.

Afecta particularmente lado derecho, o al menos los trastornos comienzan generalmente por la derecha.

Todos los síntomas : dolores, inflamaciones, etc., comienzan a la derecha y pasan enseguida y secundariamente a la izquierda.

Esto es tan marcado que puede ser considerado característico del remedio.

PRINCIPALES MEDICAMENTOS CON LATERALIDAD DERECHA : apis, ars., bell., bryon., caust., chelid., conium, croton, equisetum, ferrum, iod., kali carb., lycop., magn ph., merc., phytol., podoph., rhus tos., sanguin., tarent. hisp.

Agravación

a) De 16 a 20.

Esta agravación característica es general.

Hay que pensar en lycop. cuando hay agravación neta de 16 a 20 (Kent).

b) POR CALOR; POR CALOR EXTERIOR : Es sensible al calor exterior, que lo agrava en general.

Lo mismo si se acalora haciendo ejercicio.

Exteriormente, tiene marcada sensibilidad a la atmósfera caliente.

Los síntomas de la cabeza se agravan por el calor del lecho.

Los cardíacos y la disnea, aumentan al acalorarse, el ejercicio lo agrava en general, salvo sus dolores reumáticos que mejoran por movimiento (Kent).

Sin embargo a veces las inflamaciones del remedio se alivian por aplicaciones calientes y los dolores de estómago mejoran bebiendo caliente o poniendo algo caliente sobre el estómago (Kent).

c) POR LAS OSTRAS : No puede comer ostras porque le hacen mal.

Las ostras son para él un veneno como la cebolla para el sujeto de thuyao frutillas para opal. ac. bromium tampoco digiere ostras.

Mejoría

a) POR MOVIMIENTO : En dolores reumáticos y otros de lycop., mejora por movimiento (rhus tox).

Tenemos agravación por calor de habitación donde se encuentra, y alivio por movimiento y aire fresco del que tiene necesidad.

Es verdad que el dolor de cabeza se agrava por movimiento, pero sólo cuando es bastante fuerte como para acalorarlo y no por el movimiento en sí, que al principio alivia (Kent).

b) SALIENDO AL AIRE, AL FRÍO O DESCUBRIÉNDOSE.

c) POR ALIMENTOS Y BEBIDAS CALIENTES.

Si el calor exterior o producido por ejercicio violento agrava, los trastornos dispépticos a menudo se alivian por bebidas calientes.

d) DESPUÉS DE MEDIA NOCHE.

Síntomas mentales

LYCOP. AFECTA PROFUNDAMENTE EL SENSORIO DEPRIMIÉNDOLO, especialmente en enfermedades agudas, como fiebre tifoidea, en que el enfermo queda extendido estúpido, los ojos no reaccionan a la luz, mandíbula caída, la parálisis de cerebro parece inminente; también en ciertas formas de neumonía, meningitis cerebro espinal, etc.; si además hay agravación de 16 a 20, el remedio está indicado.

Esta profunda depresión del sensorio, se encuentra también en ciertas afecciones crónicas : en impotencia, particularmente en viejos : la memoria falla, emplea unas palabras por otras, mezcla las cosas y las sílabas al escribir o deletrear; incapaz de hacer un trabajo mental por debilitamiento cerebral.

Actuando como depresor general del sistema nervioso, lycop. lo hará extremadamente EMOTIVO, MIEDOSO, SENSIBLE Y FÁCILMENTE IRRITABLE.

Tiene un estado de DEBILIDAD DE ESPÍRITU, FATIGA MENTAL CON DEBILIDAD DE MEMORIA,

AVERSIÓN PARA EMPRENDER ALGO NUEVO, REPULSIÓN POR EL TRABAJO HABITUAL.

ANGUSTIADO SIEMPRE CON MIEDO DE QUE ALGO LE PASE, tiene siempre miedo de olvidar algo, MIEDO DE APARECER EN PÚBLICO, SIN EMBARGO TIENE HORROR A LA SOLEDAD : oradores o abogados que deben hablar en público, tienen antes un sentimiento angustioso de incompetencia, incapacidad de iniciar el discurso, aunque estén acostumbrados.

Un abogado que posterga su alegato lo más posible por miedo de no ser capaz de estar a la altura de su tarea : pero una vez comenzado continuará fácilmente.

Esto es también un rasgo marcado de silic. (Kent).

CARÁCTER IMPERIOSO Y DOMINADOR, ARTÍSTICO Y MELANCÓLICO.

TEME ESTAR SOLO, LA SOLEDAD LO ASUSTA, PERO TEME A SUS SEMEJANTES.

Desea estar solo con los que lo rodean habitualmente : no desea estar completamente solo, le gusta sentir que hay alguien en la casa, que no está aislado, pero no desea estar en sociedad; teme la presencia de extraños, las visitas o amigos nuevos.

No le gusta que le hablen que lo fuercen a conversar, pensar, no quiere hacer ningún esfuerzo, pero cuando debe hacerlo, esto lo alivia (Kent).

TACITURNIDAD; TACITURNO PORQUE NO LE GUSTA HABLAR.

Silencioso, pero contento de sentir alguien en la casa; se queda con gusto solo en una pieza pero está muy contento si hay alguien en la pieza de al lado (Kent).

TRISTEZA Y DESALIENTO; despierta a la mañana con la impresión de que nada bueno le sucederá durante el día, el porvenir le parece sombrío.

Después de moverse un poco, se le pasa; a veces esto precede a un estado de locura que provoca profundo asco por la vida con gran deseo de suicidio (Kent).

TRISTEZA Y DEPRESIÓN MENTAL; llora fácilmente, gime durante el sueño, antes de reglar.

Especialmente deprimido o irritable al anochecer.

MUJERES SENSIBLES LLORAN FÁCILMENTE, POR LA MENOR EMOCIÓN, ALEGRE O TRISTE; los niños gritan por la menor contrariedad : esto recuerda mucho a puls.; al principio del tratamiento de un caso crónico de lycop., muchas veces es útil prescribir puls. en primer lugar : esto alivia la irritabilidad nerviosa y regula los síntomas con más orden, o fortifica nervios y voluntad, preparando el camino para la acción constitucional profunda de lycop., así se descubre mejor el punto débil y se mejora de manera permanente el estado general : puls., lycop. y kali carb. forman un trío que se sigue y muchas veces una combinación de gran poder y acción profunda para casos crónicos (Dr. Hayes).

ROMPE EN LLANTO al recibir o encontrar en la calle a un amigo, se emociona hasta las lágrimas al recibir un regalo : A LA MENOR ALEGRÍA LLORA : ES UN NERVIOSO HIPERSENSIBLE, MUY EMOCIONABLE llora cuando le agradecen un favor (Kent).

La sensibilidad es una gran marca de lycop.; parece debida a falta de confianza, a que conoce su falta de vitalidad.

Es tan sensible que teme la compañía, huye de los miembros de su propia familia; no tiene aversión por afectos como sepiá, sino sensibilidad anormal por el contacto intelectual de los otros; huye de reuniones por timidez, sensibilidad y

una especie de miedo; sepiá, tiene varios puntos de similitud con él y es su complementario tan a menudo como kali carb.

La sensibilidad nerviosa de lycop. se manifiesta también por miedo a la oscuridad.

Sus sueños participan de este estado mental; HIPERSENSIBILIDAD MENTAL Y FÍSICA a impresiones mentales, ruido, olores, calor, frío, al tacto, a la presión, etc.

Estado de confusión por hipersensibilidad o debilidad irritable.

Se expresa con dificultad; VACILANTE, TÍMIDO, ELIGE MAL SUS PALABRAS; pone palabras o sílabas de más al escribir : memoria débil, miedo de trabajar porque tiene miedo a todo y teme ser incapaz de hacer ese trabajo, pero, pasado ese momento de miedo, trabaja con gusto.

Es buen remedio para mujeres agotadas o nerviosas que han trabajado demasiado (Dr. Hayes).

LOCURA RELIGIOSA, al principio suave y simple, melancólica; melancolía religiosa progresiva, hasta locura religiosa (Kent) (aur. met., aur. mur., stram., sulph., ver. alb.).

DELIRIO INCONSCIENTE EN FORMAS GRAVES DE FIEBRE, trata de atrapar en el aire cosas imaginarias; ve moscas y toda clase de cosas, volando en el aire, a su alrededor.

Sueño

Bostezos frecuentes, somnolencia durante el día; particularmente después de las comidas.

De noche, sueño frecuentemente interrumpido con sueños espantosos y terroríficos; sobresaltos, palabras en alta voz, gritos, risas, llantos; mal humor al despertar.

Cabeza

CAÍDA ABUNDANTE DE CABELLOS; ALOPECIAS EN ÁREAS; ECZEMA DE CUERO CABELLUDO CON SECRECIÓN DETRÁS DE OREJAS.

Eczema parecido en niños flacos, mucha hambre con dolor de cabeza o síntomas de congestión de cabeza; grita durante su sueño o despierta sobresaltado, asustado, no reconoce a padre, madre ni nurse, luego se serena, reconoce donde y con quien está y se vuelve a dormir calmado; esto se puede repetir varias veces en la noche.

Arenas rojizas en la orina; cara delgada, arrugada, tos seca, irritante; un pie caliente y el otro frío, apetito caprichoso a veces come mucho con gran hambre y sed.

Está sujeto a DOLOR DE CABEZA PERIÓDICOS RELACIONADOS CONTRASTORNOS GÁSTRICOS : SI PASA LA HORA DE SU COMIDA TENDRÁ DOLOR DE CABEZA.

Debe comer a horas regulares, si no tendrá dolor de cabeza.

Es un poco como cactus que tiene dolor de cabeza congestivo si no come regularmente, pero en lycop. si come el dolor de cabeza está peor, y en cactus mejora comiendo (Kent).

Lycop., como phosph. y psor., TIENEN DOLOR DE CABEZA CON MUCHA HAMBRE.

El dolor de cabeza de lycop.

EMPEORA POR CALOR, POR EL CALOR DEL LECHO, POR POSICIÓN ACOSTADA; MEJORA POR FRÍO Y CUANDO LAS VENTANAS ESTÁN ABIERTAS.

Se agrava por movimiento, pero sólo cuando es demasiado vivo o prolongado y lo acalora y no por el movimiento en sí, que al principio alivia.

DOLOR DE CABEZA CONGESTIVO, PROLONGADO EN SUJETOS JÓVENES Y ADELGAZADOS; cada vez que toman frío, tienen este dolor de cabeza y adelgazan progresivamente, particularmente en cara y cuello; dolor como si la cabeza fuese a estallar; pero esto no es tan importante como las modalidades, tales como : mejoría por frío, peor por calor y conversación de 16 a 20, y el hecho de que adelgazan de arriba a abajo (Kent).

DOLOR DE CABEZA EN VIEJOS GOTOSOS : en este caso, los dolores de extremidades mejoran pero si reaparecen en miembros, el dolor de cabeza cesa; si hay descarga abundante de arena roja en orina, cabeza y extremidades mejoran (Kent).

Los sujetos de lycop. sufren a menudo de catarro espeso y crónico denariz; si toman frío, esta secreción espesa puede cesar para dar lugar a secreción acuosa con sensación de hambre; cuando la sensación acuosa cesa, el catarro espeso reaparece y el dolor de cabeza desaparece (Kent).

Cefalalgia con dolor presivo en vértex, agravada de 16 a 20, alagacharse o estando acostado.

Cefalalgia frontal, congestiva, principalmente de mañana con pesadez en los ojos.

Zumbidos y tintineo en los oídos y náuseas.

Vértigo particular, especialmente en habitación caliente : al beber, si mira objetos que se mueven, esto le da sensación de vahído en el cuerpo.

Vértigo espontáneo en mujeres durante reglas, con flujo de sangre a la cabeza, más molesto al levantarse a la mañana (Dr. Hayes).

Ojos

Ulceraciones y enrojecimiento de párpados, orzuelos; conjuntivitis parpebral; enrojecimiento e inflamación de párpados y secreción puriforme.

HEMIOPIA VERTICAL (lith. carb.).

Sólo ve la mitad izquierda de los objetos, principalmente con el ojo derecho; aur. met. : hemiopia horizontal, sólo ve la mitad inferior de los objetos.

(Digit.); hay muchos otros síntomas en los ojos, pero los trastornos catarrales son los más salientes, ellos no tienen nada de característico, por lo que se puede determinar por los síntomas de los ojos únicamente (Kent).

Oídos

También aquí el examen del caso completo permitirá la elección.

Eczema húmedo alrededor y detrás de orejas (graph.).

Otorrea purulenta, amarillenta, icorosa, irritante.

Tintineos, zumbidos, crujidos.

Cara

Tez amarillo grisácea.

Cara cubierta de arrugas que dan aspecto de vejez prematura, pero en la que brillan dos ojos de mirada viva, inteligente y joven y orejas negras; en temporales hay a menudo placas amarillas.

Sensación dolorosa de frío en cara; dolores desgarrantes en huesos de cara.

Estremecimientos y movimientos convulsivos en músculos de cara.

Aparato digestivo

BOCA :

Herpes costroso y pruriginoso en comisuras labiales.

Mal aliento, a la mañana principalmente.

SEQUEDAZ DE BOCA Y LENGUA SIN SED (puls.), pero no tan neta como en puls.

Jahr y otros autores señalan : sed nocturna, ausencia de sed o al contrario sed ardiente; este síntoma de la sed es secundario y la sequedad de la boca está en primer plano.

Saliva salada.

Lengua seca, negruzca, agrietada, dolorosa.

Pequeñas ampollas, aftas en lengua.

Lengua cargada con gusto agrio, excepcionalmente pútrido, a la mañana, al despertar.

Lengua oscilante, la lengua oscila y se mueve de un lado al otro.

Cupr. tiene el mismo síntoma : lo he observado hace poco en un caso de convulsiones histéricas por pesares, precedidas por este movimiento curioso de lengua; el síntoma diagnóstico en favor de cupr. era : cierre convulsivo de pulgares en palmas de manos (Dr. Hayes).

Dientes amarillentos, sensibles al tacto, dolor de muelas con hinchazón de mejilla, aliviado por aplicaciones calientes.

FARINGE :

Excelente remedio para todas las inflamaciones de faringe, desde simple faringitis hasta difteria.

ENROJECIMIENTO PERSISTENTE de amígdalas, velo de paladar, faringe; sequedad de garganta, sin sed.

INFLAMACIÓN de amígdalas, SOBRE TODO DERECHA, QUE SE EXTIENDE HACIA LA IZQUIERDA, AGRAVACIÓN DESPUÉS DEL SUEÑO O POR BEBIDAS FRÍAS : DEGLUCIÓN DIFÍCIL.

Lycop. tiene toda clase de dolor de garganta, pero la gran característica es que localiza o comienza a la derecha, antes de ganar el lado izquierdo de la faringe; mejora bebiendo caliente, como los trastornos dispépticos, contrariamente a la mayoría de sus otros síntomas, por ej. los dolores de cabeza que el calor agrava.

Ulceraciones de amígdalas que comienzan o se localizan en la derecha, y mejoran bebiendo caliente; difteria, la membrana se extiende de derecha a izquierda, y hay agravación bebiendo frío; tiene también otras características que los trastornos patogenésicos van de arriba a abajo; ha curado casos de difteria en que la membrana comenzaba en parte superior de faringe, para descender hacia laringe (Kent).

Si esta predilección por lateralidad derecha distingue a lycop. de lach., otro gran remedio de la garganta, su mejoría bebiendo caliente es otra cosa que los diferencia : lach. mejora por frío y puede tener espasmos de garganta si bebe caliente : además, cuando duerme, lycop. no tiene la sensación de constricción, espasmo y sofocación que tiene lach. en dolores de garganta.

ESTÓMAGO :

HAMBRE CANINA PERO PRONTO SE SACIA; sensación de saciedad alternando con sensación de hambre muy particular : va a la mesa hambriento pero a los primeros bocados siente el estómago lleno; después de haber comido algunos bocados, sensación de hinchazón y plenitud, a veces dolorosa; esta alternancia de hambre y saciedad, no es tan marcada en ningún otro remedio.

Sensación de hambre de noche, cuando despierta.

Muchos remedios tienen sensación de hambre canina : cina, iod., oleand., phosph., psor., etc., pero ninguno de manera tan acentuada el síntoma : hambre canina, saciada por dos bocados.

ASCO POR PAN (nat. mur.) CARNE (alum., arnica, calc. carb., carb. veg., cyclam., graph., mur. ac., nit. ac., puls., sepia) y en general, TODOS LOS ALIMENTOS CALIENTES (puls., silic., ignat., ver. alb., petro., calc. carb.).

DESEO ARDIENTE DE AZÚCAR Y DULCES (arg. nit., calc. carb., kali carb., medorr., sulph.).

Hipo (ignat., sepia, staph., ver. alb.) eructos ardientes e incompletos que suben hasta faringe con sensación de ardor en esófago durante varias horas.

PIROSIS.

DEBILIDAD de la digestión; sueño invencible después de las comidas (agar., calc. carb., kali carb., nux vom., rhus tox.).

DISPEPSIA FLATULENTE, FLATULENCIA; lycop. ES CON china y carb. veg., uno de los tres grandes remedios de la flatulencia; DESPUÉS DE HABER COMIDO, ESTA MUY HINCHADO POR GASES, Y NO SE ALIVIA POR ERUCTOS Y GASES; tiene numerosos y abundantes eructos pero queda con el estómago distendido.

NO PUEDE SOPORTAR LA PRESIÓN DE LA ROPA ALREDEDOR DEL TALLE, un pococomo lach., pero lach. tiene esta sensibilidad siempre; lycop. sólo después de las comidas.

Trastornos y malestares de estómago ENSEGUIDA DE HABER COMIDO, y no algo después como nux vom.

Después de comer, sensación de presión en el estómago con gusto amargo; boca del estómago hinchada, sensible; náuseas y vómitos biliosos y ácidos; tirones en estómago; dolores ardientes después de comer, ardor en casos de cáncer o úlcera, vómitos de bilis o negros como café (Kent).

LOS SÍNTOMAS GÁSTRICOS, SE ALIVIAN POR BEBIDAS CALIENTES.

ABDOMEN :

GRAN DISTENSIÓN ABDOMINAL, FLATULENCIA EXCESIVA, por comer pequeñas cantidades;

fermentaciones borborigmos, gases, FLATULENCIA PARTICULARMENTE EN PARTE DEL ABDOMEN, o ángulo esplénico del colon, que recuerda a china y carb. veg. la parte superior y lycop. la inferior.

Ruido de líquidos y borborigmos sobre todo del lado izquierdo; encarceración de flatuosidades; falta de expulsión de flatuosidades.

Dolores calambroides en vientre que está tenso; cortantes, sobre todo arriba del ombligo; puntadas desgarrantes, pulsación y presión en anillo inguinal como si fuera a hacer una hernia.

DOLORES EN REGIÓN DEL HÍGADO, CRISIS BILIOSAS FRECUENTES CON VÓMITOS DEBILIS; PROPENSO A CÁLCULOS BILIARES.

REGIÓN DEL HÍGADO SENSIBLE AL TACTO; PRESENTA SENSACIÓN SUBJETIVA DETENSIÓN, PLENITUD característica.

En cirrosis de hígado, lycop. parece útil sobre todo en la forma atrofíca si hay ASCITIS; en la forma hipertrofica, china parece mejor indicado.

ANO Y DEPOSICIONES :

Constricción espasmódica de ano.

Prolapso de recto.

Hemorroides sangrantes, que se presentan como masas duras, azuladas, repletas de sangre, con dolores ardientes y picantes, agravadas al menor toque o sentado; hemorroides relacionadas con trastornos gastro-intestinales : hemorroides muy molestas, pero sin particularidades.

Lycop. puede curar toda clase de hemorroides si hay flatulencia, síntomas gástricos y característicos de lycop (Kent).

LA CONSTIPACIÓN DOMINA en lycop.; como nux vom., tiene DESEOS FRECUENTES PERO INEFICACES DE EVACUAR : en nux vom., consecuencia de mal funcionamiento de movimientos peristálticos de intestino, en lycop por constricción espasmódica de ano, que impide salir la deposición y provoca vivo dolor durante la defecación.

SENSACIÓN DE QUE LA DEPOSICIÓN HA SIDO INCOMPLETA Y QUE QUEDA UNA PARTE EN LA AMPOLLA RECTAL.

Lycop. puede pasar días sin tener necesidad de evacuar y aunque el recto esté lleno, no experimenta NINGÚN DESEO.

Deposiciones duras, difíciles, pequeñas, incompletas (Kent).

Deposiciones fragmentadas, mezcladas o seguidas de materias líquidas.

Puede haber síntomas diarreicos pero sin características.

Aparato urinario

Las vías urinarias, escribe Kent, reúnen muchos síntomas que pueden ser característicos.

Enorme cantidad de orina muy CLARA Y DE PESO ESPECÍFICO LIVIANO (Kent).

O bien, ORINA BARROSA, CON DEPÓSITO DE POLVO O ARENA ROJA, COMO POLVO DE LADRILLO; O QUE DEJA SEDIMENTO PARECIDO AL DE LA SIDRA EN FERMENTACIÓN (Kent).

Lycop. es el principal remedio para la arena roja; no es sedimento como polvo de ladrillo como se encuentra en otros remedios, sino verdadero sedimento arenoso, formado por minúsculos granos de arena, que se depositan en el fondo de una orina perfectamente clara, principio de ataque de cálculos de riñón (Nash).

Podemos también verlo en estados febriles y otros de lycop. y es un síntoma saliente.

En estado crónicos, cuando se siente mejor, la arena reaparece en la orina.

(Alternancia entre cefalea, dolores gotosos y descarga urética).

En niños, se encuentra a veces esta arena en el pañal, después de ataques de gritos intensos y en el adulto después de grandes dolores en región renal y lumbar.

Se calma después de descarga de orina (Nash).

Otros remedios que tienen este síntoma son : Arnica : sedimento rojo ladrillo oscuro en orina con sensación de magulladura, de dolor en región renal; bar. mur. : sedimento blancuzco en orina, en cuyo análisis se nota aumento de

ácido úrico y disminución de cloruros; benz. ac. la orina deja sedimento en el que se encuentran fosfatos mezclados con especie de grumos mucosos (Clarke).

Es muy oscura y de olor muy fuerte.

Nitr. ac. : orina muy oscura con olor que recuerda a orina de caballo; sepiá : orina de olor fétido, acidulado; con exceso de ácido úrico y reacción netamente ácida.

Berb. vulg. : orina que deja sedimento blancuzco pero que más tarde se pone rojo y harinoso; con dolores renales, que descienden a lo largo de espalda, hasta pelvis, siguiendo el trayecto de los uréteres, pero sin pasar de las caderas, no desciende a muslos como par. brava; caust. : cuya orina es cargada de ácido úrico y uratos que se depositan en espeso sedimento que varía del oscuro al claro; si tenemos un enfermo con depósito excesivo de uratos en orina, sin otros síntomas predominantes, caust. solucionará el caso.

Colch. : cuyos dolores gotosos van acompañados de depósito blancuzco en orina; kali carb. : cantidad de uratos en orina; causa gran agotamiento del sistema muscular con eliminación exagerada de uratos.

Lithium carb. y lithium benz. : abundante depósito urático en orina con dolores renales más o menos agudos.

Nat. mur. : orina abundante, clara con sedimento rojizo, parecido a polvo de ladrillo.

Par. brava : orina emitida difícilmente con gran tenesmo, y copioso sedimento de uratos; dolores que descienden de riñones hacia pelvis, pero no se detienen en el tronco como berberis, descienden a lo largo de muslos y a veces de piernas.

Sarsap. : útil en arenilla en niños : gritan, dan alaridos, cuando la orina pasa y después se encuentra arena grisácea en el pañal.

Sepia : tiene arena roja, adhesiva, en orina, de olor fétido, acidulado.

Solid. : deja sedimento espeso en orina, lo mismo que thapsi bursa past., cuyo sedimento rojo ladrillo recuerda a lycop.

Parece tener en VEJIGA, la misma inactividad que en recto : HACEMUCHOS ESFUERZOS Y DEBE ESPERAR MUCHO ANTES QUE LA ORINA SALGA; es lenta y el chorro pequeño.

RETENCIÓN DE ORINA, NIÑOS QUE MOJAN EL LECHO DE NOCHE; MICCIÓN INVOLUNTARIA DURANTE EL SUEÑO; MICCIÓN INVOLUNTARIA EN UN TÍFICO O un enfermo atacado de fiebre grave. Otro rasgo marcado de lycop. es POLIURIA NOCTURNA; se debe levantarse menudo de noche aunque de día la cantidad de orina emitida sea normal.

Necesidad frecuente de orinar; micción dolorosa y tenesmo vesical.

Dolores frecuentes en vejiga.

Hematuria.

Incontinencia de orina muy obstinada, después de susto o durante coito (Jahr).

Arenillas, cálculos renales, cólicos nefríticos particularmente del lado derecho.

Órganos genitales

1) MASCULINOS : Es uno de nuestros mejores remedios para LA IMPOTENCIA; por excesos sexuales u onanismo, hombres jóvenes se vuelven impotentes; el pene es pequeño frío, blando, tienen tantos deseos como antes pero no pueden satisfacerlos; lycop. es excelente cuando ha abusado del onanismo fatigando su espina dorsal, cerebro y órganos genitales (Kent).

Pene pequeño, frío, blando a pesar de deseos violentos; estudiar también para impotencia; agnus cast., que tiene ausencia de deseos.

Calad., conium, selen.

Emisión prematura o demasiado tardía durante el coito.

Gran laxitud después del coito.

(Kali carb., kali ph., china, etc).

Excoriaciones entre escroto y muslos (crot. tig).

Inflamación de mucosa uretral con secreción.

Lycop. es antisicótico y tiene verrugas fastidiosas en partes genitales; condilomas húmedos en pene (Kent).

Hipertrofia de próstata (Kent).

2) FEMENINOS : Produce y cura un estado DE SEQUEDAD DE VAGINA que hace el coito muy penoso; ardor y escozor en vagina, durante y después del coito.

Ninfomanía.

Várices de vulva.

Fisometría. (Brom., sang., phosph. ac.).

Reglas generalmente atrasadas, muy abundantes y de larga duración, coágulos oscuros mezclados con sangre rojo vivo.

Antes de reglas, escalofríos, tristeza, melancolía; durante reglas delirio con llanto, dolor de cabeza, acidez en boca, dolor de riñones, hinchazón de ** pies, desvanecimientos, vómitos de materias agrias, cólicos y dolor de cintura y espalda (Jahr).

SUPRESIÓN DE REGLAS POR SUSTO.

Metrorragia en la menopausia.

Ausencia de reglas durante varios meses.

Enferma agotada, pálida y cada día más débil; parece no tener fuerzas para tener reglas.

Lycop. es apropiado en niñas en el momento de la pubertad, cuando el período de la menstruación ha llegado, pero el flujo no aparece; llegan a 15, 16, 17 o aún 18 años, sin desarrollarse, los pechos no se desarrollan, los ovarios no llenan su función; lycop. establece una reacción contra este estado cuando los otros síntomas convienen: el pecho se forma, las formas femeninas se desarrollan, las reglas se regularizan; lycop.

tiene como calc. ph. poder admirable para hacer florecer a tales sujetos; leucorrea lechosa, amarillenta, a veces sanguinolenta, corrosiva.

Gran amigo de la mujer, en INFLAMACIÓN Y NEURALGIAS OVARICAS; la neuralgia afecta SOBRE TODO OVARIO DERECHO, con tendencia a ganar el izquierdo; inflamación de ovarios cuando el lado derecho está más atacado que el izquierdo; También ha curado tumores quísticos de ovario derecho.

Aparato respiratorio

1) NARIZ : CATARRO CON SECRECIÓN CRÓNICA POR NARIZ CUANDO RESPIRA CON LA BOCA ABIERTA, SOBRE TODO DE NOCHE.

Sequedad y obstrucción nasal.

COSTRAS Y OBSTRUCCIÓN DE NARIZ QUE OBLIGAN A DORMIR CON LA BOCA ABIERTA.

Todo esto puede comenzar desde la infancia; el bebé duerme al principio, con respiración difícil pero todavía por la nariz, luego se obstruye y respira solamente por la boca.

Cuando llora, su voz tiene un son semejante al QUE TOMA CUANDO LA NARIZ ESTÁ TAPADA; si se mira entonces el interior de la nariz, se ve que está lleno de mucus purulento que desciende al rino farinx.

La obstrucción nasal es un estado crónico de lycop.

Catarro mucoso de nariz asociado a dolores de cabeza en sujetos que tienen la cara arrugada, prematuramente envejecida, cuello delgado, así como la parte de arriba del cuerpo, pero esta delgadez no existe en abdomen, ni extremidades inferiores.

Catarro crónico en adultos que se deben sonar constantemente, no pueden respirar por la nariz, en cuyas mucosas se forman costras; narices costrosas con erupciones húmedas en nariz y cara; la secreción mucosa es casi tan espesa y tenaz como la de kali carb (Kent).

LATIDOS DE ALAS DE LA NARIZ, movimientos rápidos, como fuelle, precipitados, que no son sincrónicos con los movimientos respiratorios; esto se ve en afecciones pulmonares, asma, neumonía generalmente de base derecha, en afecciones cerebrales y abdominales (antim. crud., chelid., phosph. pyrog.).

Hipersensibilidad del olfato.

2) LARINGE : Sequedad de laringe, ronquera, sobre todo al atardecer.

Ulceración de cuerdas vocales.

Tos seca, hueca, dura, aún durante el sueño y la noche.

Es provocada por respiración profunda, deglución en vacío, estiramiento del cuello; principia por cosquilleo en cuello, laringe y tráquea, como por vapores de azufre; debilitamiento profundo después del ataque.

3) PULMONES : RESPIRACIÓN CORTA, ASMÁTICA, DISNEA, en afecciones catarrales del pecho.

Los resfriados se instalan en nariz, pero casi siempre descienden en seguida al pecho con rales y fuerte disnea agravada al caminar rápido; subir una cuesta o por fatiga.

VIOLENTA DISNEA CON ALETEOS DE ALAS DE LA NARIZ; vemos algo parecido en ant. tart., en que la fosas están muy abiertas y latentes, los rales mucosos del pecho se oyen en la habitación, facies muy angustiada; pero si el enfermo está yacente, la frente arrugada, las narices aletean muy rápido, como fuelle, rales en el pecho, y tos seca sacudida, sin expectoración, las particularidades confirmarán que es un caso de lycop (Kent).

TOS RUIDOSA CON DISNEA, ACUMULACIÓN DE MUCUS EN EL PECHO; TOS PEOR DE 16 A 20; TOS SECA, AGOTADORA en muchachos enflaquecidos; después de neumonía persiste a menudo tos seca, agotadora, con disnea; extremidades frías cuando la cabeza y pecho están calientes, con tos y síntomas pulmonares; reacción débil, no hay tendencia a restablecerse y la historia del caso se remonta a neumonía anterior.

Lycop. es útil en neumonía en el período de hepatización; tiene cara y frente dolorosamente arrugados, alas de nariz latentes, respiración difícil, expectoración escasa; hay estrecha relación con phosph. y sulph.

Puede ser útil en neumonías mal tratadas o imperfectamente curadas, que evolucionan hacia la consunción o en el último período del ataque agudo, sobre todo de pulmón derecho o si hay complicación de hígado (Kent).

Estado en que la lesión pulmonar va acompañada de ABUNDANTE EXPECTORACIÓN MUCO PURULENTA ESPESA, AMARILLA O VERDE, FILAMENTOSA; sudores nocturnos, con fiebre a la tarde de 4 a 9 (Kent).

Expectoración purulenta salada, gris (ars., phosph., puls.).

Dolor violento en pecho, particularmente a la derecha.

Aparato circulatorio

Palpitaciones de corazón durante digestión y la noche, estando acostado sobre el costado izquierdo.

Pulso pequeño, débil y más acelerado estando parado que sentado.

A veces ha sido útil en ciertos casos de ANEURISMA ARTERIAL.

VENAS VARICOSAS; várices en piernas, particularmente derecha.

Várices en órganos genitales y particularmente en vulva.

Piel

Seca, ARRUGADA; LOS CABELLOS SE PONEN PREMATURAMENTE GRISES.

TRANSPIRACIÓN VISCOSA Y DE MAL OLOR, ofensiva.

SECRECIÓN OFENSIVA DE PIEL.

MANCHAS COBRIZAS.

Toda clase de lesiones de piel, pero sin nada característico :prurito violento, más marcado de noche.

Impétigo de cuero cabelludo, con secreción espesa, de mal olor.

Eczema impetiginoso detrás de las orejas.

Ectima de miembros.

Acné; forúnculos, ulceraciones agravadas por aplicaciones calientes.

Tumores eréctiles, nevis; varicosidades.

Espalda y extremidades

SENSACIÓN DE ARDOR ENTRE HOMBROS. (Ars. alb.).

Gran debilidad de miembros.

Tirones espasmódicos, contractura muscular.

Calambres de pantorrillas.

Temblo general o parcial.

Dolores tirantes, desgarrantes en articulaciones de codo y hombro.

Rigidez artrítica de codo y muñeca.

GOTA CRÓNICA, CON DEPÓSITOS CALCÁREOS EN ARTICULACIONES.

Dolor tirante a todo lo largo del CIÁTICO; dolores ardientes y picantes, en accesos periódicos, con remisión absoluta en los intervalos; miembro enfermo débil y rígido, dificultad para enderezarlo; los dolores mejoran por movimiento, se agravan por reposo, acostándose sobre el costado doloroso, o estando parado; no hay que olvidar la lateralidad derecha del remedio.

UN PIE CALIENTE Y EL OTRO FRÍO.

Síntoma bastante especial y característico.

Sudores fríos y abundantes de pies que excorían la piel.

EDEMA DE MIEMBROS INFERIORES; várices, sobre todo a la derecha.

Fiebre

Particularmente indicado por ESCALOFRÍO QUE SOBREVIENE ENTRE LAS 16 y 18, TODOS CADA 2 DÍAS; VA SEGUIDO POR SUDORES ABUNDANTES, SIN FASE DE CALOR INTERMEDIARIO; o bien escalofrío acompañado de VÓMITO AGRIO Y SEGUIDO, O NO, DE ESTADO DE CALOR; pulso poco modificado, salvo que es más frecuente.

Frío como hielo.

Sudores profusos después del menor ejercicio. (Calc. carb., silic., hep. sulf. calc.).

En fiebre tifoidea, es útil, cuando a pesar de los esfuerzos del médico, la enfermedad se hace alarmante : estamos al fin de la segunda semana, no hay manchas rosadas y el enfermo se hunde cada vez más en estado de inconsciencia, con delirio musitante, carfología, timpanismo, borborismos ruidosos y constipación; por momentos, movimientos espasmódicos de piernas, e incontinencia o retención de orina, que deja depósito de arena roja.

Cuando el estado se agrava más y la parálisis de cerebro amenaza, lycop. se impone : enfermo en estado de real estupor, pupilas que no reaccionan, ojo vidrioso, maxilar caído dejando correr saliva (opium y mur. ac.); respiración estertorosa, incontinencia de orina, pulso intermitente y rápido, lengua hinchada, no la puede sacar o la mueve de un lado a otro, está seca : si un medicamento puede salvar tal enfermo, es lycop.

En fiebre escarlatina, en casos en que la enfermedad no sigue su curso normal, y llega a estado muy grave.

Los síntomas tifoideos lo indican : sabemos que lycop. afecta profundamente el sensorio al que deprime grandemente; el enfermo está acostado, estúpido, las pupilas no reaccionan a la luz; mandíbula caída, la parálisis de cerebro parece inminente.

Esto se ve no sólo en fiebre tifoidea verdadera, sino también en escarlatina, neumonía, meningitis cerebro espinal, etc.

Si tiene la agravación clásica de 16 a 20, el remedio está seguramente indicado (Nash).

Hay un síntoma que al aparecer puede hacer prever la probabilidad de agravación y aparición de este estado tifoideo en diferentes enfermedades y permite dar lycop. a tiempo : es cuando después del sueño, el joven enfermo,

DESPIERTA DE MAL HUMOR, irritable se destapa, enviando a pasear a quien lo cuida.

Relaciones

Complementarias

Chel., iodium, graph., lach.

Antídotos

Camph., caust., chamom., coffea, nux vom., puls.

Sulphur lo sigue bien, pero lycop. no sigue bien a sulph.

MAGNESIA CARBONICA

O Carbonato de magnesia o magnesia blanca, es una sal que se encuentra en la naturaleza generalmente en forma de masa blanca y terrosa.

Se prepara artificialmente descomponiendo sulfato de magnesia disuelto en agua por medio de una solución de carbonato de potasa o de soda.

Se presenta en grandes panes rectangulares, muy blancos y livianos, insípidos e inodoros, casi insolubles en agua fría, pero solubles con efervescencia en ácidos diluidos.

Las tres primeras dinamizaciones se hacen por trituración; a partir de la tercera se pueden obtener dinamizaciones más elevadas por procedimientos habituales de dilución Hahnemanniana.

Esta sal sólo ha ocupado un lugar importante en la medicina oficial, escribe Nash, por su acción sobre el tubo digestivo, conocida desde hace mucho y usada contra acidez de estómago y constipación.

Pertenece a Hahnemann el mérito de haber hecho conocer sus preciosas propiedades.

Acción general del medicamento

Las diversas sales de magnesia, escribe Espanet, provocan efectos iguales, variables solamente en algunas de sus formas.

Los efectos más constantes en cada una de sus sales son : AUMENTO DE SENSIBILIDAD DE TODO EL CUERPO; DOLORES TIRONEANTES, DESGARRANTES, SACUDIDAS MUSCULARES, ESPASMOS, CALAMBRES; DEBILIDAD PARALÍTICA; VÉRTIGO CON CAÍDAS SÚBITAS Y EPILEPTOIDEIS, PERO SIN PERDIDA DE CONOCIMIENTO, ETC.

Mag. carb. actúa electivamente sobre SISTEMA VENOSO : la circulación venosa se hace mal : SE HACE LENTA, y esta lentitud ocasiona sobre todo en abdomen ESTASIS que repercuten desfavorablemente en LA NUTRICIÓN; a la larga determina CAQUEXIA PARECIDA A LA DE LA CONVALESCENCIA DE LARGAS ENFERMEDADES que han empobrecido al organismo o A LA DE CIERTOS NIÑOS MAL NUTRIDOS O CON MALA NUTRICIÓN.

Por eso mag. carb. es muy indicada en casos de congestión hepática uterina que dificultan la circulación venosa; y en el período de gestación, en la mujer en que hay plétora abdominal marcada.

Por eso desarrolla sus mejores efectos en la época de las reglas cuando el flujo catamenial se hace difícil (Espanet). Produce VIOLENTO CATARRO GASTRO INTESTINAL CON ACIDEZ MARCADA.

Determina estados catarrales, no solamente en mucosas digestivas, sino general : son CATARROS SECOS, SIN MUCHA SECRECIÓN; una vieja úlcera secará, se hará brillante y con poca serosidad; nariz seca, globos oculares tan secos que los párpados se pegan y es difícil abrirlos; piel seca, pica y arde; TENDENCIA A SEQUEDAD DE MUCOSAS Y PIEL : LA SEQUEDAD ES UN RASGO MARCADO (Kent).

En cuanto a sus síntomas comunes, la experimentación no deja de repercutir sobre EL SISTEMA NERVIOSO; entre sus resultados se encuentra entumecimiento con sensación de distensión en varias regiones, postración nerviosa, hipersensibilidad al menor ruido, al menor contacto, etc.

A menudo se emplea con éxito en ENFERMEDADES EN SUJETOS QUE LO HAN TOMADO ANTES EN ALTAS DOSIS PARA CALMAR DOLORES DE ESTÓMAGO.

Características

1) CONSTITUCIÓN Y TIPO : Conviene particularmente a personas flacas, de fibra laxa, cara pálida, ojeras, de rasgos tirantes; OLOR AGRIO EN TODO EL CUERPO, ASPECTO AGOTADO.

Niños cuyo cuerpo tiene olor agrio y tendencia marcada a tener granos, erupciones variadas, erupciones secas, escamosas como caspa; uñas y cabellos enfermos y sin vida.

Mujeres decrepitas con trastornos uterinos en la menopausia.

PRODUCE UN ESTADO PARECIDO AL DE LA TUBERCULOSIS.

EL SUJETO NO SE RECUPERA, ADELGAZA Y LOS MÚSCULOS SE PONEN FLOJOS, COMO SI ALGUNA ENFERMEDAD SERIA ESTUVIERA INVADIENDO SORDAMENTE EL ORGANISMO.

En NIÑOS DE PADRES TUBERCULOSOS, hay tendencia a caer en talmarismo.

Los músculos se ablandan, sin tonicidad, no prosperan a pesar de alimentación muy vigilada y remedios que se puedan prescribir; parece que se establecieran en él los cimientos de un serio desorden.

El pequeño ADELGAZA, y se constata una especie de debilitamiento óseo en región occipital; AUMENTA EL APETITO POR LECHE, CARNE, y sin embargo no los digiere; cuando toma leche, tiene deposición desteñida como arcilla, blanda, pastosa; HUELE A AGRIO como el niño de hep. sulf.; su respiración huele a agrio; TODO EL HUELE A AGRIO.

En el adulto en casos crónicos hay cara pálida, cerosa, enfermiza, y uno se pregunta por qué no prospera; tiene aspecto enfermizo, ES DELGADO, sus músculos no tienen tonicidad, está SIEMPRE FATIGADO Y TRANSPIRA AL MENOS ESFUERZO, ESTA BIEN A CADA CAMBIO DE TIEMPO y su estado empeora AL PRINCIPIO DE LA MENSTRUACIÓN; parece RESFRIARSE CADA VEZ QUE LA MENSTRUACIÓN ESTÁ POR APARECER, y dice "yo sé que mis reglas van a venir porque tengo un resfrío de cabeza".

Toma el aspecto de alguien que está declinando, y sin embargo semantendrá así durante años, incapaz de hacer nada, ni cuidar su casa, tiene VIOLENTO DESEO DE CARNE, Y AVERSIÓN POR ALIMENTACIÓN VEGETAL; sin embargo continúa adelgazando, músculos y tejidos se hacen cada vez más flojos, con tendencia marcada al prolapso, la pared abdominal tiende a relajarse y tendrá fácilmente hernias; nervios dolorosos y músculos fatigados; los órganos amenazarán alterarse; riñones, corazón, pulmones o cerebro estarán a punto de sufrir alteraciones orgánicas. SE ADORMECEN DURANTE EL DÍA Y NO DUERMEN DE NOCHE : si duermende noche, a la mañana están como si no hubieran reposado.

Son FRIOLENTOS; dicen "que no tienen mucha sangre" (Kent).

2) HIPERACIDEZ DE SECRECIONES :OLOR AGRIO DE TODO EL CUERPO EN NIÑOS; se puede encontrar en otros medicamentos : Calc. ost., cuyo temperamento "leucoflemático" es muy distinto al de mag. carb.; que si se examina todo el caso no se confundirá con los otros.

Sulph. acid., rheum.

Modalidades

Agravación

Por el reposo; cada 3 semanas; por leche; antes y durante reglas; por cambios de temperatura; por el calor del lecho; sin embargo quiere estar abrigado durante la fiebre; sensación de calor y sudor, después de comer cosas calientes.

Mejoría

Por movimiento; caminando al aire libre, gran deseo de aire libre pero muy sensible al aire frío.

Por aire caliente, aunque se agrava por el calor de la cama.

(Merc., ledum; mejor por el calor de la cama : ars.).

Síntomas mentales

Mal humor, triste, taciturno; disposición a irritabilidad, temperamento nervioso, hipersensibilidad nerviosa. (Cham.).

Inquietud y miedo, con temblor.

Sueño

SOPOR DE DÍA E INSOMNIO DE NOCHE.

Si duerme, su sueño no es reparador.

Sueños ansiosos, con palabras, gritos, sobresaltos.

Cabeza

Pinchazos en el lado de la cabeza sobre el que está acostado, como si allí le tiraran el pelo; agravación por trabajo mental.

Dolores neurálgicos muy violentos, sobre todo a la izquierda de la cara; neuralgia nocturna; neuralgias tan agudas que no puede estar tranquilo pues se alivia por el movimiento, le obligan a salir de la cama, lo mantienen en perpetuo movimiento; no bien cesa de moverse el dolor se hace muy fuerte, lancinante, desgarrante (Kent).

Cefalalgia sorda con pesadez, dificultad para pensar, tufaradasde calor en la cabeza o desgarrante y lancinante, a veces con náuseas.

Prurito de cuero cabelludo con costras y caída de cabello, peoren tiempo húmedo.

Ojos

Dolor al borde de la órbita derecha.

Dolores desgarrantes en el globo del ojo.

Oídos

Disminución del oído con zumbidos y ruidos variados.

Sordera.

Viene súbitamente y varía.

Oído externo entumecido.

Sensación de distensión del oído medio.

Cara

Tez oscura pálida, terrosa.

Dolores desgarrantes de un lado de la cara, en los pómulos; peor de nochey durante el reposo, lo que lo obliga a moverse sin cesar.

Hinchazón de pómulos con dolores pulsátiles.

Aparato digestivo

BOCA :

Sequedad sobre todo de noche.

Aftas.

GUSTO ÁCIDO EN LA BOCA.

Sensación de alargamiento de dientes.

DOLORES DESGARRANTES, LANCINANTES, EN LOS DIENTES, PEOR DE NOCHE Y PORREPOSO.

Odontalgia en un diente cariado, ESPECIALMENTE DURANTE EMBARAZO; peordurante el reposo; debe caminar sin cesar para sufrir menos; peor de noche y por frío; los dientes parecen muy largos.

Accidente en la muela del juicio.

Mag. carb., afecta particularmente los dientes sobre todo las raíces; acada cambio de tiempo y en las raíces de los dientes, violentos dolores ardientes, lancinantes y constantes.

Dolor de dientes antes o durante reglas.

Durante embarazo, sufre constantemente de dolores de muelas, dolores desgarrantes en lado izquierdo de la cara aunque los dientes están sanos.

Dientes cariados muy sensibles y dolorosos, a tal punto que no pueden ser arreglados : esto se parece a ant. crud., pero mag. carb., afecta especialmente las raíces, ant. crud. la dentina de la corona.

Sensibilidad de dientes al punto que no puede masticar los alimentos; los dientes le parecen muy largos; mag. carb. y china, cuando no hay otros síntomas son los indicados para dolores de dientes durante embarazo (Kent).

ESTOMAGO :

GRAN DESEO DE CARNE (calc. phosph., abies. can., lil. tig., kreosot., menyanthes).

No le gustan LAS LEGUMBRES.

LA LECHE no le conviene.

Aethusa, calc. carb., carb. veg., magn. mur., sulph., etc.

Le gusta y desea FRUTA (alum., ant. tart., phosph. ac., ver. alb).

ERUCTOS AGRIOS, VÓMITOS ÁCIDOS Y AMARGOS.

Siempre se queja DE ARDOR DE ESTOMAGO : la comida le repite agria; dolores de estómago después de comer en cantidad normal; sensación de hinchazón después de comer; mucha flatulencia en ese momento.

El estómago digiere muy lentamente la comida que pronto se le hace agria (Kent).

ABDOMEN Y DEPOSICIONES :

Hinchazón de vientre, con sensación de pesadez; borborignos y gorgoteo; emisión de gases excesivamente abundantes y fétidos.

Dolores contráctiles, pellizcos en fosa ilíaca derecha.

Cólicos violentos, crispantes, que obligan a doblarse en dos.

(Coloc., china, mag. ph., rhus tox., stann.).

CONSTIPACIÓN CON DEPOSICIONES MUY DURAS, EXPULSADAS DESPUÉS DE VIOLENTOS ESFUERZOS; DEPOSICIONES DURAS DE OLOR AGRIO.

Inactividad, pereza de recto y ano; deposición voluminosa y dura que exige gran esfuerzo para ser expulsada; es dura, se desmigaja, será expulsada parcialmente y se romperá en pedazos (Kent).

Constipación después de shock mental.

Tensión nerviosa muy profunda.

O DIARREA ACUOSA, VERDE, ESPUMOSA, PARECIDA A ESPUMA DE CHARCO DE RANAS.

(Acon., cham., elater., sepia, sécale).

La leche pasa sin digerir en los lactantes.

Deposiciones mucosas, sanguinolentas, AGRIAS, con tenesmo.

Órganos genitales

FEMENINOS : CORIZA O GARGANTA DOLOROSA ANTES DE APARICIÓN DE REGLAS CADA MES.

Reglas tardías, poco abundantes, de sangre espesa, oscura, parecida a pez; CORREN SOLO DE NOCHE, O SON MAS ABUNDANTES ESTANDO ACOSTADA DE NOCHE (am. mur., bovista, zincum, coca) Y CESAN CUANDO CAMINA (kreos.).

Muchos dolores durante reglas, de cabeza, riñones, palidez de cara, dolores calambroides en el vientre que paran el flujo menstrual (Jahr).

Aparato respiratorio

Tos espasmódica de noche después de cosquilleo de laringe (Kent).

Tos con cosquilleo con expectoración serosa y salada.

Espustos de sangre.

Dolor constrictivo en el pecho con disnea.

Es muy útil, en pretuberculosis : adelgazamiento con violento deseo de carne en tuberculosos, pretuberculosos, o descendientes de tuberculosos; sujetos que tienen una pequeña tos seca; tos seca antes de escalofrío en la tarde, como rhus tox.

Sujetos con tendencia a volverse tuberculosos y que están durante años en ese estado, con tos entrecortada e inoportuna, sin gran intensidad.

Finalmente bajo la influencia de una circunstancia fortuita, una tuberculosis se declara y evoluciona rápidamente después de estar mucho tiempo latente.

También pueden ser útiles en esta faz de pretuberculosis ars., calc. carb., lycop. y tubercul. (Kent).

Espalda y extremidades

Rigidez de nuca.

Dolor de rotura en riñones y espalda, peor de noche.

Dolores desgarrantes en hombros; hombro derecho dolorido, no le puede mover, dolor desgarrante en deltoides derecho. (sang.).

Todo el cuerpo doloroso, especialmente las piernas.

Lasitud en los pies, cuando está sentado.

Calambre de pantorrillas de noche.

Fiebre

Escalofrío al atardecer, a menudo precedido de pequeña tos seca, cosquillosa; fiebre nocturna con sudor graso y ácido.

Durante todo el acceso quiere estar muy abrigado.

Relaciones

Complementarios

Cham.

Antídotos

Ars. alb., merc.

La magnesia es muy empleada por la escuela oficial como purgante.

Cuando se abusa pueden resultar diversas consecuencias : puede hacersenocivo por su tendencia a acumularse en los intestinos en forma de PHOSPHATO AMONIACO de magnesia y pos sus efectos sobre el sistema nervioso; la constipación para la que se prescribió puede empeorar; entonces habrá que dar nux vom. rheum, está indicado en diarrea con deposiciones agrias, y tenesmo por abuso de magn. puls. puede ser útil para ciertos síntomas.

Coloc., cuando hay dolores abdominales crispantes, que obligan a doblarse en dos, por abuso de magnesia; cham. cuando la magn. causa neuralgia (Farrington).

MAGNESIA MURIATICA

O Cloruro de magnesia es una sal que se encuentra en el agua del mar 3,50 partes sobre 30, y en varias aguas minerales purgantes.

Muy fácilmente delicuescente, de sabor muy amargo, hace efervescencia con los ácidos; se descompone por el calor, y es difícilmente cristalizable.

Las tres primeras dinamizaciones se hacen por trituración.

Acción general del medicamento

Como el carbonato, el cloruro de magnesia tiene acción muy marcada sobre TUBO DIGESTIVO, sobre todo en hígado.

ES GRAN REMEDIO DEL HÍGADO, escribe Boericke, y su acción sobre él va acompañada de constipación característica.

Parece ejercer acción excitante SOBRE LA CONTRACTIBILIDAD.

Características

1) CONSTITUCIÓN Y TIPO : Es un antipsórico de acción profunda, apropiado a sujetos nerviosos, con desordenes de hígado o estómago.

Glándulas aumentadas de volumen y real irritación de centros nerviosos; sensibles al frío, pero buscan el aire libre, fresco; son extremadamente agitados y difícilmente pueden quedar tranquilos; si se quedan tranquilos, se llenan de angustia, de ansiedad (Kent).

Actúa particularmente bien en mujeres histéricas o niños escrofulosos; niños que no pueden digerir leche; tiene muy buenos resultados en mujeres con viejos trastornos digestivos o uterinos.

2) ACCIÓN MARCADA EN TUBO DIGESTIVO E HÍGADO : Hígado grande con dolores agravados por tacto o posición acostada sobre la derecha; lengua revestida con capa amarilla, gruesa como merc., conserva la impresión de los dientes.

Presenta gran número de desordenes de hígado : aumento de volumen con piel icterica, induración; lóbulo derecho del hígado dolorido, doloroso cuando se acuesta encima, cuando se da vuelta en su lecho para acostarse sobre la izquierda, está incómodo : siente como si le tiraran el hígado hacia la izquierda; agravación acostándose sobre la derecha, es decir, apoyando sobre el hígado (Kent).

Esto va acompañado de CONSTIPACIÓN CON DEPOSICIONES DURAS, DIFÍCILES, INSUFICIENTES, FORMADAS POR PEQUEÑAS BOLAS SECAS.

Modalidades

Agravación

a) Inmediatamente después de comer. b) POR COSAS SALADAS; baños salados, por respirar aire salino al borde del mar.

Bromium es el remedio de los marinos cuando desembarcan; mag. mur. de los trastornos que surgen cuando uno se embarca, cuando un individuo tiene urticaria al borde del mar; ars. curará si es un caso de ars., pero en todo caso mejorará si es el único síntoma (Kent).

c) Acostándose sobre la derecha o la izquierda.

Mejoría

a) Por presión.

b) Por movimiento.

c) Al aire libre : aunque el cuerpo sea sensible al frío, y tengagran disposición a enfriamientos mejora por aire fresco, si no es demasiado frío, salvo la cabeza que es muy sensible al aire libre (Kent).

Síntomas mentales

LA ANSIEDAD es un rasgo marcado; AGITACIÓN, IMPACIENCIA, ASOCIADOS CON ANSIEDAD, en todo momento, pero sobre todo de noche en la cama, o al cerrar los ojos para dormirse : se pone ansioso, agitado, tan impaciente, que tira sus frazadas o hace una larga inspiración, u otra cosa con tal de agitarse.

De noche la ansiedad lo mantiene despierto.

Ansioso cuando está en habitación cerrada, mejor al aire libre donde laangustia se apacigua.

Al leer, sensación de que alguien lee después que él, por lo que lee cadavez más rápido; esto se ve en personas fatigadas por demasiado trabajo, tienen sensación de que van a romperse en pedazos.

Todo pensamiento que penetra en la mente tiende a repetirse (Kent).

Cabeza

Dolor de cabeza nervioso, aliviado por fuerte presión (puls.), o abrigándose la cabeza (silic.); a menudo es histérico.

Vértigo mejorado paseando al aire libre.

Vértigo a la mañana al levantarse.

Aparato digestivo

BOCA :

Lengua cubierta por capa amarilla, gruesa como merc., conserva la impresión de los dientes (Dewey).

Lengua de aspecto como si hubiera sido quemada, excoriada, agrietada, fisuras que arden como fuego.

ESTOMAGO :

Intolerancia por leche (aeth. cyn., calc. carb., mag. carb., sulph., etc.); el niño no puede digerir la leche durante la dentición (sepia).

No puede tolerar sal, NI ALIMENTOS SALADOS que lo agravan.

Sed frecuente.

GRAN HAMBRE PERO SIN SABER CON PRECISIÓN LO QUE DESEA.

Bulimia, sensación de hambre devoradora, seguida de náuseas.

Eructos con olor a huevo podrido; como si hubiera comido cebolla (sinap.).

Estómago fácilmente descompuesto; pirosis; sensibilidad dolorosa en regiónepigástrica.

Tensión y dolores de ulceración y magulladura en estómago con sensibilidadexcesiva al contacto.

Crisis gastrálgica al atardecer.

Estómago cada vez menos capaz de digerir, al final un solo bocado lo hacesufrir (Kent).

Náuseas continuas con color terroso de la cara, sobreexcitabilidad nerviosay llanto fácil.

ABDOMEN Y DEPOSICIONES :

Cólicos, calambres, dolores intolerables, gran flatulencia.

El intestino de mag. mur. es campo propicio para la lombriz solitaria (Kent).

HIPERTROFIA DE HÍGADO :DOLOR AL TACTO Y SI SE ACUESTA SOBRE LA DERECHA; lengua gruesa, cubierta por capa amarilla, ancha, conserva la impresión de los dientes y la diferencia con merc. está en las deposiciones : merc. conviene más a afecciones agudas de hígado, mag. mur. a afecciones crónicas.

(Ptlea : los síntomas de hígado se agravan acostándose sobre la izquierda;mag. mur. tiene un síntoma parecido.

CONSTIPACIÓN CON DEPOSICIONES DURAS, DIFÍCILES, LENTAS, INSUFICIENTES, NUDOSAS, como excremento de oveja; a veces sólo pueden SER EXPULSADAS COMPRIMIENDO LOS MÚSCULOS

ABDOMINALES. (Nat. mur., amm. mur.) (Nash).

Órganos genitales

Reglas de sangre muy oscura, dolorosas, con calambres terribles y que pueden provocar convulsiones histéricas, de todo el cuerpo (actea rac., cauloph.).

Metrorragia con dolor de riñones, mejorada por presión fuertesobre los riñones, sea acostándose sobre un almohadón duro, sea apoyándose fuertemente contra el respaldo de la silla (Kent).

Aparato urinario

No puede orinar SI NO HACE PRESIÓN SOBRE LA PARED ABDOMINAL.

FALTA DE SENSACIÓN EN VEJIGA, POR LO QUE NO SABE SI NECESITAORINAR O NO; FALTA DE SENSACIÓN EN URETRA POR LO QUE NO SABE EN LA OSCURIDAD, SI ORINA O NO.

Aparato circulatorio

Palpitaciones cuando está en reposo aliviadas cuando hace un poco de ejercicio. (Gels.).

Espalda y extremidades

Conmociones parecidas a sacudidas eléctricas.

Entumecimiento de extremidades.

Dolores desgarrantes en miembros superiores y agitación marcada eninferiores.

Calambres en pantorrillas, de noche.

Tirones y desgarramiento paralítico, en todos los miembros.

Ardor en planta de pies de noche, en cama. (Sulph.).

Transpiración marcada en pies, como silic.
Brazos entumecidos al despertar (Kent).
Relaciones
Antídotos
Cham.; camph.

MAGNESIA PHOSPHORICA

O fosfato de magnesia, es una sal que se obtiene saturando ácido fosfórico líquido por magnesia.
Se presenta como polvo cristalino, poco soluble en agua, soluble en ácidos diluidos.
Las tres primeras dinamizaciones se hacen por los procedimientos de trituración habitual.
Acción general del medicamento
Después de los trabajos de Schüssler, mag. ph., tomó un lugar importante entre los medicamentos a los que llamó : remedios de los tejidos.
Es un importante constituyente de músculos, nervios, cerebro, glóbulos sanguíneos y dientes.
Una perturbación en su equilibrio molecular determina donde se produce, dolores calambroides y parálisis.
Schüssler dice que su acción, es contraria a la de ferrum : una perturbación molecular de éste produce relajamiento de fibras musculares, y mag. phosph., contracción de las mismas : de ahí su utilidad terapéutica en calambres, convulsiones y otros fenómenos nerviosos.
Enfermedades localizadas en células nerviosas o ganglios terminales de nervios o tejido muscular.
Dolores punzantes de carácter espasmódico : pasan como un relámpago y sensación de constricción; cambian a menudo de lugar y se alivian por calor y presión.
Remedio puramente espasmódico; por eso es curativo de calambres, espasmos de glotis, tétano, epilepsia, retención espasmódica de orina, parálisis agitante, etc.
Se adapta mejor a personas delgadas, de temperamento muy nervioso; prefiere los rubios y el lado derecho del cuerpo.
El frío favorece mucho su acción, y calor y presión la contrarían.
Estos síntomas van a menudo acompañados por gran postración y sudor profuso; magn. phosph. es lánguido, postrado, laxo, incapaz de mantenerse en pie, tanto en enfermedad aguda como crónica (Boericke y Dewey).
Características
1) CONSTITUCIÓN Y TIPO : Se adapta sobre todo a individuos delgados, de temperamento muy nervioso, rubios. Su temperamento se parece a mag. carb., pero este tiene fibras laxas, y mag. phosph. rígidas.
2) DOLORES AGUDOS, NEURALGIAS PUNZANTES, CUYOS DOLORES LANCINANTES, VIENEN Y SE VAN CON LA RAPIDEZ DEL RELÁMPAGO, SIENDO INTOLERABLES EN EL MOMENTO DE PAROXISMO, CAMBIAN A MENUDO DE LUGAR PERO SOBRE TODO VAN ACOMPAÑADOS DE SENSACIÓN DE CALAMBRE (cupr., coloc.).
Se ALIVIAN POR APLICACIONES CALIENTES, como ars., pero JAMAS SON ARDIENTES, como ars. (Nash).
Dolores muy violentos que pueden afectar cualquier nervio.
Pueden sentirse en todas partes : en intestinos, enteralgia, calambres de estómago, dolores en médula espinal, que cuando en ella se localiza un gran dolor, puede estar dolorida como cualquier nervio.
Una característica importante, es que mejora por calor y presión : siente mejor en lugar caliente, y sus neuralgias mejoran entonces; sus dolores aumentan cuando tiene frío, en lugar frío, en tiempo frío.
Convulsiones de miembros en adultos, con extrema sensibilidad al tacto, viento, ruido, excitación a la menor cosa.
Un rasgo especial es que provoca IRRITACIÓN DE NERVIOS Y MÚSCULOS : CALAMBRES POR ESFUERZOS PROLONGADOS; RIGIDEZ, ENTUMECIMIENTO, TORPEZA E INSENSIBILIDAD DE UN NERVIPO POR ESFUERZOS PROLONGADOS.
Útil después de largo ejercicio de manos y dedos para escribir y es un bello ejemplo en el calambre de los escritores; en casos de calambres de dedos por haber escrito mucho, tocando el piano o un instrumento musical, por haber trabajado varias horas por día durante años, un pianista es presa un buen día de calambres en cuanto empieza a tocar, los dedos se ponen rígidos, pierde la agilidad habitual.
Lo mismo sucede con sujetos que trabajan mucho manualmente.
Calambres violentos en disentería y cólera que arrancarán gritos al enfermo; sacudidas de músculos de todo el cuerpo como en el cólera.
Es el principal remedio de Schüssler en la corea (Kent).
Modalidades
Agravación
Del lado derecho.
Por frío.
Mejoría
Por calor; presión, fricciones; doblándose en dos. (Coloc.).
Síntomas mentales

Gran DEPRESIÓN MENTAL; olvidadizo, triste, incapaz de pensar claramente, hacer un esfuerzo mental.

Llora y se lamenta; solloza mientras sufre, y su llanto es entrecortado por hipo.

Habla continuamente de sí mismo o se sienta tranquilo, en profundo silencio.

Ilusiones de los sentidos.

Manía de cambiar constantemente los objetos de lugar.

Cabeza

Trastornos cerebrales en niños con inconsciencia y síntomas convulsivos.

Dolor de cabeza con dolores punzantes, cambiantes, intermitentes, espasmódicos, paroxísticos y neurálgicos, siempre aliviado POR CALOR, POR APLICACIONES CALIENTES.

Cefaleas nerviosas con chispas delante de los ojos.

Dolores muy agudos de cabeza, sobre todo en jóvenes vigorosos, mientras trabajan en la escuela, O DESPUÉS DE ESFUERZO MENTAL, o después de estimulante nocivo.

Dolor en casco y detrás de la cabeza, que se extiende a lo largo de la columna vertebral, sobre todo entre hombros.

Dolor de cabeza en occipucio, que se extiende a toda la cabeza, con náuseas, Y ESCALOFRÍOS.

Ojos

Visión afectada; cree ver colores delante de los ojos (CROMATOPSIA); chispas delante de los ojos; ojos sensibles a la luz, fotofobia; diplopia; puntos negros parecen flotar delante de los ojos.

Contracción pupilar.

Trastornos de visión por lesiones de nervio óptico o retina.

Retinitis pigmentaria.

Nistagmus; movimientos espasmódicos de párpados, ptosis o debilidad de párpados.

Prurito de párpados.

NEURALGIA ORBITARIA Y PERI ORBITARIA, PEOR A LA DERECHA, ALIVIADA POR CALOR EN APLICACIONES EXTERNAS, CON EXTREMA SENSIBILIDAD AL TACTO, y lagrimeo abundante.

Oídos

Debilidad de fibras nerviosas auditivas que trae sordera.

Otalgia de carácter puramente nervioso, mejorada por calor.

Dolor neurálgico peor atrás de la oreja derecha, agravado de manera intolerable saliendo AL AIRE FRÍO, LAVÁNDOSE CARA Y NUCA CON AGUA FRÍA.

Es útil en todas las afecciones del oído interno (Dr. Copeland).

Cara

Neuralgia orbitaria, supra o infra orbitaria.

Prosopalgia, dolores fulgurantes, intermitentes, siempre aliviados por calor, agravados por presión, tacto, frío, a las 14 hs., en el lecho y peor a la derecha.

Dolores neurálgicos a la derecha, desde orificio infra orbitario hasta incisivos, que irradian poco a poco a todo el lado derecho de la cara, agravados por tacto, abriendo la boca, por aire frío y cuando el cuerpo tiene frío, después de haberse mojado, o lavado con agua fría, o de haber estado expuesto a violento viento frío (pampero).

Aparato digestivo

BOCA :

Sacudidas convulsivas en ángulos de la boca.

Sensación de contracción dolorosa en articulaciones maxilares, con sacudidas de adelante hacia atrás.

Tartamudeo espasmódico, trismus, constricción de mandíbulas.

Lengua generalmente limpia con los dolores de estómago, cargada con la diarrea.

Lengua rojo brillante con sensación de aspereza en la boca, dolorimiento del lado izquierdo, escozor como de herida en carne viva, el comer es tan doloroso como si tuviera la lengua quemada.

Dientes muy sensibles al tacto, al frío, agua y aire fríos; no pueden tocar sus dientes con agua fría.

Odontalgia peor después de acostarse, que cambia de lugar rápidamente.

AGRAVADA POR COSAS FRÍAS, BEBIENDO FRÍO, MEJORADO POR CALOR Y LÍQUIDOS CALIENTES; VIOLENTOS DOLORS EN UN DIENTE CARIADO O EMPLOMADO; para neuralgias dentarias comparar a coffea, bryon., ferr. phosph.

Se alivia bebiendo frío : cham., que se agrava por bebidas calientes; bell., mang. acet., kreosot., etc.

Lesión dentaria con hinchazón de ganglios de cara, cuello o hinchazón de lengua.

Trastornos de la dentición en niños, espasmos convulsivos sin síntomas febriles.

GARGANTA :

Dolores y puntadas particularmente a la derecha; la región enferma parece hinchada; hay escalofríos y sufrimiento general; hinchazón dolorosa con dolores detrás de la cabeza cuando traga.

Garganta roja y estornudos con catarro rino faríngeo.

Espasmos de glotis.

Constricción espasmódica de garganta cuando trata de tragar líquidos, con sensación de sofocación.

ESTOMAGO :

Los ácidos le hacen mal y tiene aversión por café.

Deseo de azúcar y dulces.

Hipo con esfuerzos para vomitar día y noche.

Hipo obstinado y a la larga doloroso.

Regurgitación alimenticia.

Sensación de ardor, eructos insulsos, insípidos, mejorados bebiendo caliente.

Cardialgia.

Gastralgia con lengua limpia, aliviada por calor y doblándose en dos.

Dolores peor por tacto en epigastrio y despertados bebiendo agua fría.

Espasmos o calambres de estómago, dolor como si tuviera una cuerda fuertemente apretada alrededor del cuerpo.

Distensión flatulenta de estómago con dolor constrictivo.

Disnea flatulenta.

Náuseas y vómitos.

INTESTINO Y DEPOSICIONES :

ENTERALGIA.

CÓLICOS FLATULENTOS QUE OBLIGAN A DOBLARSE EN DOS, ALIVIADOS POR FRICCIONES, CALOR, PRESIÓN, ACOMPAÑADOS DE GASES QUE NO ALIVIAN.

Para estos cólicos que obligan a doblarse se puede relacionar con coloc., que tiene esta modalidad muy marcada, pero cuyo cólico no mejora netamente por calor, sino por presión; china; rhus tox.; stann.

Gases acumulados, borborigmos y vientos.

CÓLICOS FLATULENTOS EN NIÑOS Y RECIÉN NACIDOS.

Dolores abdominales que causan gran agitación, irradian a región umbilical, a menudo con diarrea acuosa.

No puede estar acostado de espaldas, sino de costado, encogido.

SENSACIÓN DE PLENITUD, DE HINCHAZÓN EN ABDOMEN : DEBE APRETAR SU CINTURA, PASEAR Y EXPULSAR GASES.

Diarrea acuosa con vómitos y calambres, escalofríos y dolores de estómago.

Deposición expulsada con fuerza.

Disentería con dolores calambroides y retención espasmódica de orina; dolores lancinantes, agudos en hemorroides, tan violentos, que causan desfallecimiento; dolores muy violentos en abdomen y recto.

Dolores de recto a cada deposición.

Dolores con espasmos prolongados en músculos abdominales.

Constipación en niños, con dolores espasmódicos cada vez que debe evacuar manifestados por gritos agudos y penetrantes; muchos gases, borborigmos y cólicos flatulentos.

Aparato urinario

Constante necesidad de orinar cuando camina o está parado.

Espasmo de vejiga; retención espasmódica, espasmo de cuello de vejiga; necesidad dolorosa de orinar.

Incontinencia nocturna por irritación nerviosa.

Neuralgia vesical después de cateterismo.

Deficiencia o exceso de fosfatos.

Litiasis.

Órganos genitales

FEMENINOS : Deseos sexuales aumentados.

CÓLICOS MENSTRUALES : violentos dolores PRECEDEN LA HEMORRAGIA; dolores intermitentes.

PEOR A LA DERECHA, MUY ALIVIADOS POR CALOR; sensación de rotura a través del abdomen; apenas puede estar parada; también tienen este síntoma : cauloph.; cimicif., en que cuanto más abundante es la pérdida más vivos son los dolores; gels., lach., viburnum, etc.

Reglas demasiado precoces, de sangre negra, fibrinosa, en filamentos.

Dismenorrea membranosa (ars., borax, bromium, sulph., viburnum).

NEURALGIA ovárica, peor a la derecha, con dolores cortantes, calambroides, muy mejorados por calor.

Vaginismo.

Dolores de parto espasmódicos, con calambres en piernas, dolores calambroides y esfuerzos excesivos de expulsión; afloja la contracción espasmódica del útero.

Retención placentaria.

Convulsiones puerperales intermitentes.

Aparato circulatorio

Síntomas DE ANGOR PECTORIS, espasmos neurálgicos en región del corazón, mejorados bebiendo agua caliente.

Palpitaciones nerviosas, cuando son espasmódicas.

Espalda y extremidades

Dolores en parte baja de espalda, base de riñones y nuca.

Dolores neurálgicos agudos, lancinantes en espalda.

Dolores cambiantes, neuralgia intercostal.

Espina dorsal sensible y dolorosa al tacto.

Aparato respiratorio

1) NARIZ : Pérdida o perversión de olfato, cuando tiene trastornos catarrales.

Alternativamente, nariz tapada o deja correr abundante líquido mucoso.

Escozor peor a la izquierda.

2) PULMONES :Asma, cuando tiene flatulencia marcada.

Obstrucción espasmódica de tráquea con repentino timbre agudo en la voz y sensación de obstrucción en el pecho.

Tos persistente, semicrónica, pseudo catarral, de carácter nervioso.

Verdadera tos espasmódica por paroxismos, sin expectoración.

Accesos convulsivos de tos nerviosa, que terminan en un grito; coqueluche; tos espasmódica de noche, con respiración difícil estando acostado.

Opresión.

Sensación de constricción en pecho y garganta, con tos seca, espasmódica.

Dolores lancinantes en el pecho, peor a la derecha, que irradian a los intestinos.

Dolores lancinantes en hombros y brazos, peor a la derecha.

Articulaciones dolorosas.

Sacudidas espasmódicas, involuntarias de manos.

Parálisis agitante.

Sensación de estremecimiento espasmódico.

Neuralgia en miembros inferiores, de noche sobre todo, contracción muscular espasmódica; las piernas le duelen después de acostarse.

Sensación en miembros como de sacudida eléctrica, seguida de dolor muscular.

Violentos dolores en reumatismo articular agudo, intercurrentes durante fiebres reumáticas.

Deficiencia de poder locomotor.

Pies muy sensibles.

Los dolores se agravan al menor contacto.

Hay, en el ciático derecho, dolores agudos, cortantes, picantes, que llegan y desaparecen con la rapidez del relámpago; intolerables, dan sensación de calambres dolorosos; se alivian por calor; impiden estar acostado, debe estar siempre de pie.

Espasmos en afecciones del sistema nervioso motor.

Sacudidas espasmódicas durante el día.

Convulsiones con rigidez de miembros o todo el cuerpo, dedos cerrados sobre el pulgar metido contra palma de la mano.

Corea, movimientos involuntarios y contorsiones de miembros.

Epilepsia, por costumbres viciosas, espasmos, rigidez de miembros, puños y mandíbulas apretados.

Espasmos tetánicos, contracción de mandíbulas.

Calambres de violinistas, pianistas o escritores. (Arg. met., caust., gels., sulph. ac.).

Piel

Dolores ardientes y picantes en juanetes y callos.

Erupciones herpéticas, con escamas blancas, granos, rash como depicadura de insectos, peor en rodillas, codos y hombros.

Fiebre

Intermitente con calambres.

Escalofríos después de comer, hacia las 19 hs.; escalofríos de arriba a abajo a lo largo de la espalda; seguidos por sensación de sofocación; severos escalofríos a las 9 de la mañana.

Transpiración profusa.

Relaciones

Mag. phosph., ha tenido sus más hermosos éxitos en el tratamiento de afecciones nerviosas, especialmente neurálgicas, lo comparte en esta esfera con muchos otros remedios de los tejidos : Kali phosph., nutritivo del cerebro, que corresponde clínicamente a afecciones paréticas, mientras mag. phosph., responde más a afecciones espasmódicas; difieren en que kali ph. mejora por aplicaciones calientes.

Sus cólicos y sus otros síntomas neurálgicos tienen mucho parecido con colocy., probablemente porque este encierra un 3% de mag. phosph.

Los cólicos flatulentos, recuerdan a dioscorea.

Gels. se parece a mag. phosph.

Las experimentaciones muestran una correspondencia estrecha en la mezcla de sus síntomas paréticos y espasmódicos, de ahí su empleo sucesivo en histeria, hipocondría e irritación espinal.

El escalofrío de arriba a abajo de la espalda es común a ambos.

Ignat. y nux vom., también se parecen.

Hay que compararlos por los síntomas flatulentos y a ignat. más especialmente por sus síntomas espasmódicos. En los espasmos mag. phosph., es como bell., y le sigue a menudo, y si yano actúa y el enfermo presenta siempre dilatación pupilar, mirada brillante y se estremece al menor ruido. En el estrabismo producido por vermes intestinales comparar con natr. phosph. En trastornos de secreciones acuosas, diarrea, etc. comparar anat. mur., en epilepsia, kali mur., calc. phosph., silic.; por su predominancia derecha bell., bryon., chelid., kali carb., lycop., podoph... Los dolores violentos recuerdan a bell., stram.; carácter errático apuls., kali sulph., lac. can. La sensación de constricción a cactus, calc. iod., sulph. Los dolores durante reglas y de parto recuerdan a viburn. y puls., pero contrariamente a este último, mejora por calor. Cimicif. tiene muchos puntos de similitud con mag. ph. pero sus dolores son más persistentes, y los de magn. phosph. más espasmódicos; parecen localizarse de preferencia en órganos de estructura compleja como ovarios, etc., los de cimicif. en ligamentos. En dismenorrea membranosa recordar a borax y viburn. Entre las plantas en cuya composición hay mag. phosph. hay que mencionar lobelia, symph., stram., y viburn., lo que explica probablemente la similitud de ciertos síntomas. En dolores neurálgicos nocturnos, aliviados por calor, hay que comparar a ars. alb.; su acción general sobre sistema nervioso puede compararse a zincum (Boericke y Dewey).

Relaciones
Antídotos
Bell., gels., lach.

MANGANUM

O Manganese, metal gris blanco, duro quebradizo, inalterable al aire; a temperatura normal se conserva bajo una capa de petróleo. Calentado al aire se cubre rápidamente de una capa de óxido. Descompone lentamente al agua en frío, más rápidamente en ebullición; cuando es pulverulento, esta descomposición es muy rápida, aún a temperatura normal. Se encuentra en muchos minerales en estado de óxido; silicato, fosfatos, sulfuros; a veces en cenizas de plantas, en huesos y también en la sangre. Para el uso homeopático se emplea Manganese Metálico pulverizado, obtenido por el procedimiento de Giles; con él preparamos las tres primeras dinamizaciones, por trituración Hahnemanniana.

Acción general del medicamento

"Cuanto más se profundizan los mecanismos de la vía coloidal y celular, más se ve que los átomos minerales descubiertos por análisis químicos de los tejidos no empolvan las enormes moléculas orgánicas como impurezas indiferentes, sino constituyen como el alma crónica de su protoplasma. El Calcium, el Magnesium inseparables de todo funcionamiento celular, serían la base de la asimilación; el Potassium; presente donde vibra materia orgánica viva, por su radioactividad escondida abastecería el impulso de sus mutaciones energéticas; el Sodium sería indispensable a los cambios de sales a través de mucosas y líquidos de medios interiores. Cuál es el rol esencial del Manganese en esta división del trabajo en acciones y reacciones tan prodigiosamente relacionadas?" "El secreto de su acción esencial parece residir en sus AFINIDADES CON EL OXIGENO". "Su química, cuya naturaleza viva en sus infinitas complicaciones moleculares nos muestra preciosas indicaciones, nos enseña que el manganese se combina con oxígeno formando una serie de óxidos: protóxido MnO; óxido salino Mn₃O₄; sexquíóxido Mn₂O₃; bióxido MnO₂; óxido mangánico MnO₃; anhídrido permangánico Mn₂O₇; todos cada vez más ricamente asociados al gas vital de manera que se encuentra toda la gama de combinaciones posibles del metal con oxígeno; las primeras absorben tan fácilmente el oxígeno como las últimas lo restituyen. La célula se ha apropiado de estas propiedades en provecho de su vitalidad y es probable que el Manganese exista en cantidad infinitesimal en todos los tejidos fisiológicamente activos. La prueba es que el Manganese es indispensable al crecimiento de un extremo al otro de la escala de los seres vivos; es el mineralizador de los seres vivos; es el mineralizador esencial del líquido de Raulin en su famoso experimento; si se lo elimina totalmente del medio de cultivo el moho vegeta, si se agrega en impalpables cantidades, se vuelve lujurante. En cuanto a los animales superiores ha sido reconocido por los autores americanos Osborne y Mendel, Mac Callum y Davis, en sus estudios sobre factores de crecimiento de los organismos, como constituyente necesario de la ración mineral de los animales; está en forma de sulfato de Manganese, en dosis de 0,266. Esto se debe a que el oxígeno es uno de los factores esenciales del crecimiento; el consumo de este gas por los tejidos, la ventilación pulmonar, siguen exactamente el esfuerzo de desarrollo orgánico. Por eso el Manganese predomina en ciertos tejidos en que los cambios son muy intensivos. La sangre humana, dice Lambling, contiene 2 centésimas de miligramo por litro; según Gaube du Gers existe en cantidades apreciables en el músculo, en la parte activa, en el jugo muscular más bien que en la fibra.

La cantidad está en relación con la masa muscular : menos considerable en la mujer que en el hombre que, físicamente, consume más.

Se lo encuentra fácilmente en músculos de animales desarrollados y potentes, como el buey, cerdo y carnero que gastan sobre todo fuerza; difícilmente en aves : gallina, canarios o, en general, peces, cuyo organismo se adapta a la rapidez del movimiento.

Existe en cantidad notable, en ciertas glándulas de circulación intensa, como las salivares.

La bioquímica moderna ha puesto en evidencia ciertos fermentos cuyo activador, el catalizador indispensable, es el átomo de manganeso.

Lo considera como tipo de las oxidasas, diastasas, esparcidas en toda la economía.

El profesor Bertram descubrió que el jugo extraído del árbol de laca, extendido al aire húmedo se transforma en barniz negro, por absorción del oxígeno del aire por un polifelo, el lacol, y bajo la influencia de un elemento especial, la lacosa.

Esta es absolutamente inactiva cuando no hay traza de manganeso y la relación es estrechamente específica : ningún otro metal, hierro, aluminio, calcio, etc., lo puede reemplazar.

Según Gaube, hay 2 ó 5% de Manganeso en las cenizas de lacosa, y su poder oxidante varía exactamente como el tenor del metal.

En ciertos experimentos se ha visto en vivo la formación del fermento y su funcionamiento.

Al contacto con el aire, ciertos gases de Manganeso absorben el oxígeno, pero en seguida pueden devolverlo lentamente oxidando ciertos fenólos, como la hidroquinona.

Si se agrega a la mezcla de núcleos orgánicos, como parcelas de albúmina, gelatina, dextrina, la oxidación es reforzada de manera notable; se produce en seguida una asociación molecular comparable a la diastasa pues el calor, con seguridad y quizá la acción de los anestésicos, la paraliza.

Según Gaude du Gers : en las sales de Manganeso, en que la afinidad del ácido por el metal es la más débil, las que actúan más rápidamente sobre la hidroquinona; la albúmina viva de nuestro protoplasma es comparable a uno de esos complejos ácidos, pero infinitamente más complicada, rica en un número infinito de posibilidades químicas, en combinaciones y cambios moleculares inestables, que es como la materia intensamente plástica de la que la vida saca sus energías tan variadas y sutiles.

En la más expandida de las oxidasas, el Manganeso complementa la albúmina y en ciertos casos, orienta y determina su potencialidad química en la dirección de una oxidación.

Pero en otros más especializados, el hierro puede reemplazarlo : es lo que pasa en la hemoglobina de la sangre, mientras que en la sangre incolora de ciertos moluscos, como la pinna-escamosa que oscurece en cuanto se expone al aire, el rol del hierro es representado por el Manganeso.

Los metales se asocian frecuentemente en la naturaleza.

En las oxidasas de orden más general que la hemoglobina, el hierro, para ser verdaderamente activo, debe asociarse a complejos definidos de otras sales minerales; el Manganeso, en ciertas lacosas, tales como la de la alfalfa, debe ayudarse con las sales de calcio de ciertos ácidos orgánicos.

La fijación, la especificación de los fermentos es algo relativo; la clasificación de los fermentos en diastasas oxidantes, hidratantes, peptasas, catalasas, sólo responde a la predominancia mineral y funcional de las células, sea a una división que tiene su realidad en la naturaleza.

Todo fermento tiene, en potencia, todas las facultades bioquímicas y biofísicas del protoplasma en general.

Toda oxidadasa puede ser en ciertas condiciones, óxido reductora como la serie de sales mangánicas, que la química considera absorben y devuelven el oxígeno con el cual está ligada según las necesidades del momento y hace compartir la misma función al átomo mineral que la complementa.

Toda nuestra nutrición es sólo el desarrollo y la especificación por la división del trabajo de ese fermento complejo elemental, cuyos diversos mecanismos son ordenados y regulados unos con otros por la armonía de las glándulas internas y las sinergías del sistema nervioso.

El átomo de manganeso puede tener en nuestro organismo una función sensiblemente diferente según el lugar que ocupe en el ciclo de la nutrición.

Hasta ahora lo hemos visto ACTUAR COMO "OXIGENOIDE" EN LA SANGRE, MÚSCULOS, GLÁNDULAS Y OXIDASAS; FUNCIONA COMO AMORTIGUADOR, GRACIAS AL OXIGENO AL QUE FIJA Y A LAS REACCIONES QUE PRODUCEN LAS ENERGÍAS VITALES : también es importante en LA FAZ DE DESASIMILACION DE LOS TEJIDOS COMO QUEMADOR, SE PODRÍA DECIR, DE SUS DESECHOS, POR EL OXIGENO QUE DEVUELVE.

Hay un hecho manifiesto que justifica esta manera de ver : es la relación constante que señala Gaube du Gers entre el peso del manganeso orgánico y el azoe de la urea.

En el caballo vivo 0,00384 de manganeso muscular corresponde a 0,12 de ázoe ureico en 24 horas; en el hombre, 0,0098 de manganeso a 0,41 de ázoe.

En el reino vegetal, las hojas verdes muy pobres en manganeso en primavera, se enriquecen progresivamente de esta substancia hasta el otoño; por eso sería el agente de todas las oxidaciones in-extremis de los pigmentos vegetales por las cuales para morir el verde de las selvas toma magníficos y cambiantes vestidos de colores.

También sería el Manganese el que al fijarse en pelo y cabello, los haría emblanquecer.

La lacosa oxida muy rápidamente la adrenalina; se conoce la influencia de la suprarenal sobre la evolución de los pigmentos.

La tirosinasa, fermento muy parecida a la lacosa, condensa la tirosina en pigmentos negros, produce el color del pan moreno, ennegrecimiento del jugo de remolacha la tinta de sepia, la degeneración melánica de los tumores.

Es muy posible que el radical mangánico presida la elaboración y transformación de muchos pigmentos; su formación se debería a una especie de eliminación por oxidación, de rechazo a la piel por el organismo, de los desechos de los núcleos celulares.

Esto sería análogo a lo que pasa en los glóbulos rojos, desintegrados por el hígado en forma de pigmentos biliares.

El Manganese podría considerarse como modificador en la producción del ácido úrico, y la Materia Médica parece justificar este punto de vista.

ESTE PODER ELIMINADOR, "CARBONITROGENOIDE" DEL MANGANESO, MUCHO

MENOS CONOCIDO QUE SU ROL "OXIGENOIDE", debería ser mejor aclarado y confirmado por observaciones y experimentos precisos. En organismos gastados que han puesto al desnudo el metal por oxidaciones renovadas e incesantes, que han quemado sus desechos, su acción propia se hace entonces sentir más distintamente, y parece tener sobre sistema nervioso, huesos, tejidos de sostén, una acción análoga a la de cuerpos de átomos más pesados, como el Mercurio, Plata, Oro y Plomo.

Con ayuda de estos datos biológicos se puede clasificar racionalmente los principales síntomas de Manganese, orientándolos según las dos direcciones de su acción bioquímica.

Si la clasificación es artificial, permitirá, al menos, organizar mejor la memoria, los experimentos reales de la patogenesia y la práctica pondrá poco a poco las cosas a punto.

1) POR SUS SÍNTOMAS CIRCULATORIOS, el Manganese se parece al hierro.

Como todas las oxidaciones del organismo son deficientes, parece que su reacción se traduce en el mismo género de esfuerzos de compensación que en ferrum, a saber : eretismo, en la debilidad; dilatación venosa, en la anemia.

La mala circulación venosa, cierto grado de variabilidad de síntomas y modalidades lo hacen igualmente sujeto a jurisdicción de puls., como drenador.

Pero contrariamente a manganum en el individuo de ferrum, la revuelta orgánica prosigue en el tubo digestivo (eructos, náuseas, vómitos, diarrea) como si los desechos de ferrum, mal oxidados, se eliminaran por las mucosas digestivas irritándolas.

La Materia Médica nos da para manganum : en cabeza, aflujos de sangre con latidos, tirones, pinchazos, sensación de que la cabeza es tan ancha y pesada, que no la puede levantar, mejoría al aire libre (puls.) y acostándose o vice versa; cara habitualmente pálida, ojoso, expresión de sufrimiento.

En región de corazón choques súbitos y repetidos, pulso irregular, yalento, ya rápido, siempre débil y blando.

En la mujer, reglas demasiado frecuentes y poco abundantes, en el hombre, sensación de debilidad en partes genitales con ardores y tirones del corazón (puls.).

POR LA ACCIÓN OXIDANTE INTENSA, que la bioquímica nos revela, manganum no puede dejar de interesar el trabajo DE MUCOSAS Y GLÁNDULAS del organismo.

En esto se parece a nat. mur., y presenta como él, si no alternancia neta, mezcla de sequedad y abundancia de secreciones mucosas y glandulares; sensación de calor y sequedad de conjuntivas al mover los párpados y mirar la luz; coriza seca con inflamación de piel de labio superior y mucosa nasal que están rojas y dolorosas, netamente opuesto a los síntomas de catarro que se encuentra más abajo a todo lo largo del árbol respiratorio.

Mang. difiere de nat. mur., en que lleva más su acción a vías respiratorias y nat. mur. al aparato digestivo, aunque mang. desarrolla como nat. mur.

constipación intensa, con deposiciones secas, nudosas, de evacuación muy difícil.

Su centro de acción principal es la laringe y se compara a arg. met.

Parece que la influencia propia del átomo metálico sobrepasa aquí a la del óxido : la laringe es un órgano tan importante por sus cartílagos y su juego articular, como por sus mucosas, pues son precisamente los cuerpos de afinidades particulares u óseas predominantes, como arg. met., arg. nit., phosph., caust., etc., los que lesionan preferentemente la laringe.

Parece que la mente debe colocarlo en la serie de medicamentos oxigenoideos, entre nat. mur., por una parte y sodium, phosph. por otra.

También se relaciona con ferr. met. y kali. bichr.; parece que éstos últimos son más hidrogenoideos con tendencia a edema y adelgazan menos fácilmente que mang.

2) Si consideramos el segundo aspecto de mang., vemos que toca sobre todo LOS ÓRGANOS NEURO MOTORES DEPENDIENTES DE LA MEDULA (CÉLULAS DE LOS CUERPOS ANTERIORES DE LA MEDULA, MÚSCULOS, ÓRGANOS MECÁNICOS DE ARTICULACIÓN Y DE SOSTÉN) Y LA PIEL. los desechos celulares mal *il* oxidados irritan todos esos tejidos en que el metal predomina normalmente, y encontramos en el dominio de la sensibilidad nerviosa, el mismo eretismo que en el de la circulación.

Por eso conviene a ataques de autointoxicación aguda, como la gota, aparálisis profundas de origen tóxico y que afectan el tipo de paraplegias.

Bar. carb., arnica, tocan sobre todo la zona de los vasos cerebrales, plumb., con sus tendencias esclerosantes, merc., lesionan los fascículos medulares y nerviosos en su continuidad, mang. como phosph., parece interesar las células motrices de los cuernos anteriores, determinando atrofia muscular progresiva y rápida.

A veces la degeneración es mucho más lenta; hay una especie de excitación difusa que se traduce en gran número de grupos musculares en semi contractura, espasmos, temblores; cuando camina, el enfermo, doblado, parece correr detrás de su centro de gravedad que huye sin cesar delante de él y sus caracteres hacen de mang. un buen remedio para combatir la enfermedad de Parkinson.

Muy a menudo, en el enfermo de mang., todos los planos del miembro enfermo parecen atacados : los huesos, con periosteo hiperestesiado, sufren dolores taladrantes; articulaciones tensas dolorosas; piel rojo brillante y con sensibilidad exquisita.

Estos síntomas son frecuentes en tobillos durante el crecimiento, sobre todo en niños y jóvenes "anémicos", que les impiden caminar.

A veces hay dolores erráticos, que siguen una dirección en diagonal, de un lado a otro del cuerpo : rodilla izquierda, codo derecho; codo izquierdo, rodilla derecha, etc.

Extrema sensibilidad de piel; está a menudo salpicada de zonas rojas, abultadas, con comezón, sobre todo en hueso de rodilla o cresta de tibia y como en sulph., voluptuosidad intensa al rascarse.

A veces, la piel, más profundamente atacada, presenta piriasis, psoriasis, grietas sangrantes en coyunturas, úlceras ardientes en proximidad de articulaciones.

Piel y mucosas cicatrizan a veces difícilmente; úlceras de aspecto canceroso pueden aparecer sobre todo en bóveda palatina donde son a menudo precedidas por nudosidades azules.

Visceras, hígado, riñones pueden padecer degeneración grasosa.

Como phosph., aunque por acción más lenta, mang. puede determinar cambios celulares profundos.

Por eso se podría estudiar en ciertos carcinomas.

En cuanto a la influencia del radical asociado al átomo de Manganeso en las diversas sales de este metal, parece bastante secundaria.

EN mang. acet. cuya patogenesia es la más rica en nuestra Materia Médica, el radical acetato entra poco en juego en las características obtenidas.

Mang. oxid., presenta más síntomas de catarro (diarrea con cólicos, dismenorrea) que mang. perox. en que la parálisis domina.

En mang. sulph. la presencia de azufre parece intensificar y localizar la acción de Manganeso sobre el hígado (exceso de secreción biliar, enfermedades hepáticas crónicas etc.).

Si consideramos la acción patogenética pura, resumiremos la acción de mang. de la manera siguiente : el genio del remedio es ASTENICO, es un VENENO PARALIZANTE pero cuya acción recae solamente SOBRE EL EJE CEREBRO ESPINAL; Nottinagel y Rossbach han constatado experimentalmente parálisis de sensibilidad, de excitabilidad refleja y de movimientos voluntarios, sin alcanzar nervios motores ni músculos.

EL CORAZÓN se hace lento; su ritmo irregular, su energía cada vez menos fuerte y pronto se paraliza, deteniéndose en diástole.

Su influencia sobre LA NUTRICIÓN GENERAL no es menos funesta : los fenómenos de desasimilación son activados, lo que se traduce por aumento de tasa de úrea, pero como no parece que las facultades de asimilación puedan reparar las pérdidas cada vez más grandes, una caquexia especial no tarda en establecerse, lo que presenta más de un punto de semejanza con la que determina ferrum.

Estos trastornos nutritivos, lentos y progresivos, concluyen por determinar lesiones viscerales muy probablemente múltiples, una de las cuales, la degeneración grasosa del hígado ha sido verificada en la autopsia.

Las lesiones DE PIEL que determina pueden explicarse por un trastorno de nutrición.

Cremona y Jousset las asimilan a la psoriasis.

Hahnemann consideraba a este metal dotado de gran poder terapéutico y lo estimaba indispensable en algunas de las más molestas enfermedades crónicas.

Sobre todo lo recomendaba contra "algunos" dolores insoportables en periosteo y articulaciones, debilitamiento de sentidos y enfermedades de laringe y traquea arterial".

Por sus acciones múltiples sobre sangre, piel, mucosas, vísceras, merece el rango de nuestros grandes policrestos, siempre que su patogenesia sea completada por la aplicación clínica y la experimentación (Mouézy-Eon).

Características

CONSTITUCIÓN Y SÍNTOMAS GENERALES : Mang. provoca una especie de CLOROSIS y conviene a jóvenes cloróticas de naturaleza debilitada, anémicas, con tez cerosa, pálidas, enfermizas, amenazadas por tisis, con caries óseas, y otras afecciones orgánicas.

Antes han presentado un largo período de trastornos menstruales, sea con reglas extremadamente poco abundantes, sea con reglas que no aparecen hasta los 19 a 20 años.

Como rasgos salientes, GRANDES DOLORES PERIOSTEOS, sobre todo en tibia; la piel tiene tendencia a ulcerarse y cubrirse de erupciones crónicas e inveteradas, como psoriasis; alrededor de estas lesiones cutáneas, piel infiltrada, gruesa.

Su acción es profunda, altera glóbulos sanguíneos y PREPARA EL TERRENO PARA TUBERCULOSIS, SOBRE TODO DE LARINGE; laringitis repetidas, a cada nuevo ataque, con mayor fuerza que la vez anterior.

Tuberculosis que comienza en laringe.

El sujeto de mang., se resfría constantemente y el menor resfrío le repercute en el pecho.

Este agente terapéutico puede ser muy útil en pretuberculosis, entuberculosos anémicos, con ronquera y laringitis frecuentes, pérdida de apetito completa.

Puede estar más indicado todavía cuando se declara en el tuberculoso tisislaríngea. (Dr. Mouezy-Eon).

Se parece a arg. met., arg. nit., phosph., graph., y dulph., por estatendencia a tuberculosis.

GRAN AVERSIÓN POR LOS ALIMENTOS; ninguno lo tienta.

GRAN SENSACIÓN GENERALIZADA DE MAGULLADURA; en todo el cuerpo, sensibilidad al tacto y a sacudidas que puede recibir; los huesos duelen después de haber caminado; arnica y baptisia sólo alivian un día o dos, pues los síntomas a los cuales se dirige mang. son más profundos (Kent).

Modalidades

Agravación

a) POR HUMEDAD Y FRÍO; sin embargo los síntomas que se manifiestan en la casa, mejoran AL AIRE LIBRE Y VICEVERSA.

b) ANTES DE TORMENTA; muchos síntomas se agravan o alivian según el cambio de tiempo a malo o bueno.

c) DURANTE LA NOCHE Y LA MAÑANA.

d) En la posición sentado.

Mejoría

La tos mejora ACOSTÁNDOSE así como el estado general.

Síntomas mentales

ANGUSTIADO, AGITADO, INQUIETO, LLENO DE APRENSIÓN; le parece que algo terrible va a suceder, se pasea y cuanto MAS PASEA MAS INQUIETO SE PONE; trata de ocuparse mentalmente, de ocupar su espíritu, pero cuanto más lo hace más inquieto se pone; está laxo, cansado, no puede pensar, reflexionar convenientemente. La cosa más extraña, es la manera como obtiene su alivio :SE ACUESTA Y TODO PASA, ya no tiene inquietud, ni angustia, ni agitación.

Cuando se levanta la angustia y la agitación vuelven.

Esto es muy diferente de rhus tox., que se alivia moviéndose; DE ars. alb., que no puede quedar tranquilo, ni acostado, ni sentado, porque su angustia aumenta.

Sustos que lo atormentan, angustia de día, al moverse, aliviada acostándose, sólo se apacigua y reconforta acostándose.

Mang. es excelente en mujeres que adoran estar tranquilas en cama; sedice que les agrada haraganear en cama (Kent).

IRRITABILIDAD Y DEPRESIÓN COMO sulph. y graph; Excitación nerviosa por pequeñeces.

Cabeza

Cráneo sensible al tacto y presión.

Manchas rojas diseminadas en cuero cabelludo, como si allí fuese a declararse erisipela.

Dolores de cabeza como en anemia.

La cabeza parece pesada; puntos dolorosos; dolores pulsivos.

Dolores de cabeza terribles; agravación caminando o por sacudidas.

Sensación de contusión en cráneo y cerebro.

Dolor de cabeza tensivo, ardiente al aire libre, mejorado en la casa; otros dolores de cabeza, al contrario, mejoran al aire libre; agravación por cambio de tiempo o tiempo frío y húmedo.

Ojos

Aglutinación de párpados que están hinchados, rojos, inflamados.

Dolor en los ojos al mirar objetos de cerca, sobre todo mirando una luz de cerca, dolores en los ojos cansados por costura, lectura de caracteres muy pequeños, y toda otra cosa que concentre la vista (ruta).

Oídos

Secreción maloliente por oído.

Sordera mejorada sonándose.

Sensación de oído obstruido, mejorada sonándose.

Catarro de trompa de Eustaquio.

Oído externo doloroso al tacto.

Sensación de obstrucción de oídos.

Los síntomas del oído son numerosos; y tiene sobre todo esto de particular : LE PARECE QUE SUS DOLORES SE FIJAN EN SUS OÍDOS; todos los dolores, los síntomas de la cabeza, parecen encontrarse en sus oídos; los dolores de dientes van al oído; dolores en los ojos que parecen tener el centro en los oídos; el oído parece el centro de muchos síntomas (Kent).

Estado catarral de oído con sordera progresiva; agravado por humedad y frío; sordo cuando sobrevienen las lluvias frías de otoño; tiene entonces sensación de ardor en canal auditivo con mucho prurito.

TOS ESPASMÓDICA PROVOCADA POR RASCARSE EL CANAL AUDITIVO (kali. carb. ysilicea).

Comezón de oídos al hablar, tragar, reír, y hacer cualquier cosa que haga funcionar la laringe.

Cara

Enfermiza, de palidez de cera, como en clorosis y anemia perniciosa (picri ac. y ferrum).

Tufaradas de calor (psor., lach., sulph., graph.) en mujeres anémicas.

Aparato digestivo

BOCA :

Odontalgia por todo lo que es frío (coffea lo contrario) violenta, que pasa rápidamente a otras partes.

La bioquímica ha encontrado rastros de manganeso en glándulas salivares; por eso no es sorprendente que sea un remedio de la parotiditis (Mouzey-Eon).

ESTOMAGO :

REPUGNANCIA POR LOS ALIMENTOS POR SENSACIÓN DE SACIEDAD.

AUSENCIA DE SED.

Sensación de ardor, de agrio y ardiente; tirones de estómago; digestión difícil.

ABDOMEN Y DEPOSICIONES :

Cólicos cortantes, particularmente en tiempo frío y húmedo, o por comer helados.

Dolores y sensación de retracción en el ombligo, como plumb.

Borborismos, gases, hinchazón.

Hígado congestionado e hipertrofiado; barro biliar, cálculos.

La absorción de alimentos helados provoca dolores de hígado.

Calambres en el ano cuando está acostado; mejorados cuando está sentado.

Emite muchos gases con las deposiciones; funcionamiento irregular de intestino; períodos de constipación, cortados por crisis de diarrea, que concuerdan generalmente con trastornos gástricos.

Órganos genitales

Trastornos de la menstruación; amenorrea o reglas muy precoces, y poco abundantes en anémicas.

Menopausia con flujo de calor (lach., sulph.).

Prolapso uterino con sensación de tirón de arriba a abajo.

Aparato respiratorio

Ronquera obstinada, sobre todo a la mañana al aire libre, como provocada por inflamación crónica de laringe.

Sensación como si la laringe estuviera obstruida.

Catarro de laringe con coriza y ronquera; Cada resfrío provoca laringitis siempre más grave; cada vez que el tiempo se pone húmedo sufre de la laringe con gravedad progresiva; y finalmente sobreviene tuberculosis de laringe (Kent).

Acumulación constante de mucosidades en laringe y tráquea, sedesembaraza de ellas pero se forman otras.

Carraspea sin cesar desprendiendo mucosidades que se vuelven a formar.

Mang. ant., tiene esto como arg. met., sulph., phosph.; con arg. met., es muy útil para cantores y oradores.

Tos con ronquera.

Tos seca provocada por lectura en alta voz, o palabra sostenida, consecuencia penosa y sensación de sequedad de laringe.

La tos es peor hablando, riendo, caminando, respirando profundamente y en tiempo húmedo y frío.

LA TOS MEJORA ACOSTÁNDOSE.

Los remedios que tienen esta mejoría de la tos acostándose son raros : euphr. : tos causada por coriza y mejorada acostándose; arg. met. : tos que mejora acostándose (Kent).

Hyosc. y conium se agravan rápidamente acostándose.

Hemoptisis.

Cada enfriamiento despierta una bronquitis.

Espalda y extremidades

Sensación de desgarro y tirones en miembros.

Dolores articulares con puntadas, tirones, sensación de hormigueo agravada al anochecer, a menudo hemilaterales o EN CRUZ.

Hinchazón roja y brillante de las articulaciones, a veces por enfriamiento.

Inflamación de huesos con dolores insoportables, de noche.

Periosteo doloroso.

Inflamación e hinchazón de articulaciones, que llega hasta supuración y carie de huesos.

No hay hinchazón reumática aguda de articulaciones, como en puls.

o bell., sino sensibilidad dolorosa de articulaciones, con agravación por tiempo húmedo como rhus tox, rhodod., dulcam.

Costras sobre la tibia, con dolores de excoiación.

Sensación de ardor, sequedad y puntadas, en planta de pies.

Dolores tensivos en articulaciones de brazos y manos.

Gota; ha sido preconizado por Heischell en esta afección : gota errática, las articulaciones son atacadas, una después de otra, generalmente en diagonal.

Piel

Malsana; toda lesión tiende a ulcerarse.

EMPEINES SECOS, PRURIGINOSOS.

EXCORIACIONES Y GRIETAS SOBRE TODO EN PLIEGUES ARTICULARES.

Manganum es sobre todo indicado en psoriasis y eczema seco de pliegues articulares; el prurito ardiente es un excelente guía de su empleo y el rascado que lo alivia a veces, agrava mucho la erupción.

Relaciones

Antídotos

Coffea, merc.

MERCURIUS : SUS PRINCIPALES SALES

MERCURIUS CORROSIVUS

Mercurius corrosivus o sublimado corrosivo, sal de mercurio, se presenta en forma de pequeñas masas cristalinas incoloras, translúcidas, de sabor metálico muy desagradable; se disuelve en 15 partes de agua fría y 3 de alcohol a 90º. Preparamos las tres primeras dinamizaciones por trituración.

Acción general y característica

El Mercurio forma la figura central del notable trío : iodium, MERCURIO y ars. alb; sus preparaciones más suaves, se parecen más bien a iod. y el sublimado corrosivo es el análogo más cercano de ars. (Hughes).

Merc. corr. tiene tendencia muy marcada a **ULCERACIONES QUE SE EXTIENDEN MUY RÁPIDAMENTE Y VAN ACOMPAÑADAS DE DOLORS EXCESIVAMENTE ARDIENTES Y AGUDOS.**

Domina todas las otras sales de Mercurio y al Mercurio mismo **PORTENESMO : TENESMO DE RECTO INCESANTE Y QUE NO SE ALIVIA POR DEPOSICIÓN; TENESMO DE VEJIGA.**

Tiene acción profunda en zona renal : **DESTRUYE EL TEJIDO SECRETOR DEL ÓRGANO.**

Ojos

PÁRPADOS EDEMATOSOS, ROJOS, EXCORIADOS.

Merc. corr. es buen remedio DEL ORZUELO, si hay : exacerbación nocturna de dolores, gran sensibilidad a aire y luz y tendencia a formación de pus; párpados rojos, edematosos como excoriados, a veces ulceración de bordes ciliares.

DOLORS ARDIENTES, AGUDOS, INTENSA FOTOFobia Y LAGRIMEO EXCORIANTE, A TAL PUNTO QUE PRODUCE EN MEJILLAS A LAS QUE IRRITA, DOLOR MUY AGUDO; LAS PONE COMO CARNE VIVA.

ULCERACIÓN DE CORNEA CON TENDENCIA A PERFORACIÓN.

IRITIS.

Es casi específico para iritis sífilítica.

Aparato digestivo

GARGANTA :

MUCOSA HINCHADA, DOLOROSA, INFLAMADA; DOLOR PEOR POR EL MENOR TOQUE EXTERNO; TRAGAR ES DOLOROSO; CONSTRUCCIÓN DE GARGANTA, LA DEGOLLACIÓN CAUSA ESPASMOS. ULCERACIONES QUE ARDEN, ESCUECEN COMO TIZONES ARDIENTES Y DE EXTENSIÓN MUY RÁPIDA.

Campanilla roja e hinchada.

Ganglios del cuello hipertrofiados.

RECTO Y DEPOSICIONES :

DISENTERÍA CON TENESMO VIOLENTO INCESANTE QUE NO SE ALIVIA POR DEPOSICIÓN; DEPOSICIÓN PEQUEÑA ARDIENTE, SANGUINOLENTA, VISCOSA, CON DESECHOS MUCOSOS Y CÓLICOS CORTANTES; dolorimiento en región cecal de colon transversal.

DISENTERÍA Y TRASTORNOS INTESTINALES PARTICULARMENTE EN VERANO (Allen).

Aparato urinario

ORINA CALIENTE, ARDIENTE, ESCOZOR, ESCASA O SUPRIMIDA.

ORINA ALBUMINOSA (ars. alb., helon., tereb., man. n., aurum benz.); es más marcado en merc. corr. que en merc. v. o cualquier otra sal de mercurio.

Orina gota a gota, con grandes dolores.

TENESMO VESICAL CON INTENSO ARDOR DE URETRA.

Órganos genitales

ULCERACIONES CHANCROSAS QUE TOMAN RÁPIDAMENTE ASPECTO FAGEDÉMICO.

Gonorrrea con secreción verdosa, peor de noche; meato rojo oscuro, la orina arde muy vivamente al pasar y hay violento tenesmo de vejiga.

Relaciones

Calcium SULPHIDE es el antídoto de bicloruro de mercurio.

CINNABARIS

Cinnabaris o sulfuro rojo de mercurio, o bisulfuro de mercurio es un polvo rojo, insoluble, con el que preparamos un medicamento homeopático, cuyas tres primeras dinamizaciones se hacen por trituración.

Acción general y característica

En él se encuentran mezclados el genio de sulph. y el de merc., pero este último domina.

Muchos rasgos de sulph. y de merc. no se desarrollan en él, pero también tiene algunos muy particulares a cinnab. y que sólo se desarrollan en él (Kent).

Como merc. y sulph., produce ulceraciones de diversas formas, endiferentes tejidos, granulaciones fungosas, supuración.

Tiene como sulph., tendencia a producir alrededor de ano y órganos genitales verrugas en forma de higo; es más vasto que merc. o sulph. para verrugas sicóticas y como thuya, volverá a producir la secreción gonorréica mal suprimida; tendrá la misma sensación dolorosa de uretra, que será suprimida por retorno de secreción.

Como merc., tiene transpiración que no alivia; es como él muy sensible al frío o calor, con necesidad de temperatura media; también está peor de noche, al calor del lecho, como merc. y sulph.

Síntomas mentales

Como merc. y sulph., quiere que lo dejen tranquilo, se va a sentar solo en un rincón, es triste con momentos de falsa hilaridad; falsa hilaridad en sujetos débiles, sífilíticos o gotosos.

No tiene ninguna inclinación por el trabajo intelectual, nada de memoria, olvida todo, el nombre de sus propios hijos, inclusive el suyo.

La mente parece agotada y puede llegar hasta un estado que raya en imbecilidad.

Cabeza

Lleno de dolores de cabeza, como merc., sensación de tener una cinta apretada alrededor de la cabeza, o como si el cuero cabelludo fuese demasiado estrecho o las meninges se retrajesen en el cerebro.

Sensación de ser tocado por un cuerpo frío en la raíz de nariz, a través de senos frontales, con cefalea.

Profundo dolor en la frente que está fría, aliviado por calor.

El dolor profundo con sensación de frío es más manifiesto en mujeres, con el coriza, y peor antes o durante reglas. (Coriza durante reglas : Graph.; coriza y dolor de garganta antes de reglas : magn. cab.).

Dolor en frente y vértice de la cabeza, peor acostado sobre la izquierda, o la espalda, mejor sobre la derecha o después de levantarse y moverse.

Dolor de cabeza catarral en viejos sífilíticos, con dolores óseos, cuando los huesos de cabeza y nariz están enfermos; exostosis sífilíticas y transpiración que no alivia.

Sensación de congestión de cabeza, sobre todo en la frente; peor después de comer.

Ojos

Párpados granulados, ángulos y párpados rojos.

DOLORES QUE PROGRESAN ALREDEDOR DEL OJO, LO RODEAN Y VUELVEN AL PUNTO DE PARTIDA.

DOLOR QUE PARTE DEL CONDUCTO LAGRIMAL, GANA EL CONTORNO DEL OJO Y VA HASTA EL TEMPORAL, DESDE EL ÁNGULO INTERNO, LUEGO DETRÁS DE LA CEJA HASTA LA OREJA.

SEVERO DOLOR LANCINANTE EN HUESOS DE LA ÓRBITA QUE SE DESARROLLA DESDE EL ÁNGULO INTERNO HASTA EL EXTERNO A TRAVÉS DEL HUESO.

ENROJECIMIENTO DE TODO EL OJO.

Neuralgia ciliar.

Pupila irregular, como mellada, se contrae irregularmente.

Dolores agudos a través del ojo, en la iritis.

Oídos

Zumbidos de oídos.

Secreción espesa, amarillo verdoso.

Aparato digestivo

BOCA Y GARGANTA :

Inflamación con ulceraciones en boca, garganta y lengua; sequedad e irritación de boca y garganta; se debe enjuagar a menudo la boca; peor de noche.

Catarro que se extiende a garganta, nariz y pecho.

ABDOMEN Y DEPOSICIONES :

Diarrea de mucus verde y disentería con placas cobrizas sobre la piel (Kent).

Diarrea nocturna dolorosa.

Prolapso rectal durante deposición.

Órganos genitales

Prepucio hinchado; fimosis de carácter inflamatorio (Kent).

Fimosis por una especie de contracción, induración de tejidos, después de inflamación; cinnab. curará esta infiltración y después el enfermo podrá correr el prepucio como antes.

Sensación dolorosa de constricción de uretra, después de gonorrea alorinar; ayudará a la reabsorción de infiltración, consecuencia de inflamación gonorreica y desaparición de constricción de canal.

Verrugas que sangran fácilmente.

Extremidades

Dolores de antebrazos, desde el codo hacia abajo, comprendidas las manos.

Dolores en huesos largos cuando el barómetro baja; sensación de frío en articulaciones.

Nudosidades en tibias.

Cuando un enfermo llega, atosigado de merc. y IODURO de POTASIO, con sus tibias dolorosas, exostosis, trastornos oculares de toda clase y garganta llena de ulceraciones, conviene emplear cinnab.

Relaciones

Antídotos

Hep. sulf. calc., sulphur.

MERCURIUS CYANATUS

Mercurius cyanatus o Cianuro de Mercurio, se presenta en forma de cristales incoloros, de sabor metálico y nauseoso; solubles en 8 partes de agua y en alcohol.

Las tres primeras dinamizaciones se preparan por procedimientos habituales de trituración Hahnemanniana.

Acción general y características

Su acción se parece a la de LA INFECCIÓN CAUSADA POR TOXINAS DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS; postración grande y rápida, tendencia a hemorragias por los diferentes orificios del cuerpo, de sangre fluida y negra.

Cianosis, respiración rápida, acción rápida del corazón, albuminuria y sacudidas musculares.

Afecta de manera prominente LA MUCOSA BUCAL Y FARINGEA en las que determina muy numerosas ulceraciones cubiertas por una membrana gris.

Faringitis con ulceraciones cubiertas por membranas gris.

Indicado en difteria cuando es de carácter maligno; la enfermedad se puede extender a todo el rinofarinx y ganar fosas nasales; hay primero membranas blancas, luego marrones y gangrenosas; aliento fétido y lengua característica; epistaxis; gran postración.

Destrucción de partes blandas de velo de paladar y fosas nasales, destrucciones necróticas.

MERCURIUS DULCIS

Mercurius dulcis o calomel, se presenta en forma de polvo blanco muy fino, pesado, inodoro, insípido, completamente insoluble en agua y alcohol.

Las tres primeras dinamizaciones se hacen por trituración.

Acción general y características

Produce VIOLENTA INFLAMACIÓN MUCOSA CATARRAL, SOBRE TODO MARCADA EN OJOS Y OÍDOS.

Produce EN SEROSAS INFLAMACIÓN CON EXUDACIÓN FLÁSTICA que lo indica en ciertos casos DE PERITONITIS O MENINGITIS.

Tiene acción más marcada que muchas sales de mercurio, sobrehigado y secreción biliar y desarrolla síntomas que lo indican en crisis biliosas remitentes, en fiebre biliosa remitente.

Oídos

INFLAMACIÓN CATARRAL DE OÍDO MEDIO; OBSTRUCCIÓN DE TROMPA DE EUSTAQUIO.

Sordera catarral y otorrea en niños psóricos.

Retracción de membrana de tímpano que está gruesa e inmóvil.

Sordera en viejos (kali mur.).

Aparato digestivo

ANO Y DEPOSICIONES :

Deposición mucosa, poco abundante, sanguinolenta, con bilis y sensación CONSTANTE DE NECESIDAD PERO SIN TENESMO.

Deposiciones acuosas, gris oscuro, con cólicos.

Ano doloroso y ardiente.

Disenteria; deposición poco abundante, mucosa, con sangre y cubierta debilis.

Aparato urinario

Próstata; afección aguda de próstata después de estrechamiento mal cuidado.

MERCURIUS VIVUS

La patogenesia de mercurius está hecha según experimentaciones practicadas con merc. vivus y merc. solubilis, que son dos preparaciones ligeramente diferentes pero no lo bastante como para hacer una distinción en la práctica.

Merc. vivus o merc. met. es un metal blanco plateado, muy brillante, líquido a temperatura ordinaria y extremadamente móvil, de ahí su nombre popular de plata viva.

En la naturaleza se lo encuentra raramente en estado natural, más bien se halla en estado de sulfuro de MERCURIO o cinabrio.

Este mineral que se presenta en masas cristalinas de un rojo vivo, se encuentra y es explotado en España y California. Para obtenerlo se tuesta el cinabrio en horno especial : se forma entonces ácido sulfuroso y mercurio que se condensa en compartimientos dispuestos entre horno y chimenea, y por ésta escapa el ácido sulfuroso.

Las tres primeras dinamizaciones se preparan por trituración Hahnemanniana.

Las dinamizaciones más elevadas se obtienen por nuevas trituraciones, o por procedimientos de trituración habitual.

Acción general del medicamento

Antes de definir su acción de conjunto según la experimentación Hahnemanniana, queremos dar una útil de conjunto de su toxicología : Tardieu describe tres formas de envenenamiento mercurial : a) FORMA SOBREGUDA : es rápida y la muerte sobreviene entre 24 y 30 hs.

Al principio, vómitos biliosos o mucosos, evacuaciones albas; vientre tenso y doloroso, facies con aspecto de sufrimiento y muy pálida; cuerpo cubierto de sudor profuso.

Deposiciones más frecuentes, sanguinolentas y la orina disminuye hasta llegar a anuria; pulso pequeño y huido, respiración ansiosa, aliento fétido, salivación abundante; mejillas hinchadas y rojo brillante; faringe tumefacta y deja pasar difícilmente el aire de la respiración; piel fría y viscosa.

Después, reacción incompleta pasajera y engañosa, enfriamiento y colapso aumentan y muerte por síncope con pleno conocimiento.

En la autopsia se encuentra inflamación pultácea y violenta de primeras vías digestivas, hasta el estómago, éste está inyectado, contraído, con numerosas equimosis de cara externa; en el interior, mucosa reblandecida y con numerosas placas de gangrena; las mismas lesiones en intestino; riñones inyectados y epitelio deformado, descama; mucosas respiratorias (laringe, tráquea y pulmones) congestionados; músculo cardíaco con equimosis subpericárdicas y subendocárdicas; lleno de sangre negra y fluida.

b) FORMA SUB AGUDA : de violencia menor que la precedente, marcha menos rápidamente y presenta a veces, síntomas especiales.

Se notan pinchazos en laringe, tos convulsiva, expectoración de mucos sanguinolenta, sofocación marcada.

Encías y faringe extremadamente tumefactas y cubiertas de falsas membranas con obstrucción de ganglios submaxilares.

El 50. o el 60. día, remisión de los accidentes, pero la palidez, estupor, postración general, persisten; orina albuminosa, a veces hemorrágica; a veces hematesis y petequias; la circulación se altera más, la caquexia aumenta, hay hipo y exaltación de sensibilidad.

La muerte sobreviene después de 8 a 15 días, sin convulsiones, sin agonía.

En la autopsia se ven ulceraciones intestinales, sobre todo en yeyuno y lesiones renales análogas a las de mal de Bright; coloración más oscura de substancia gris y blanca de centros nerviosos.

c) INTOXICACIÓN LENTA A FORMA CRÓNICA : el primer síntoma es aliento desagradable, luego náuseas y vómitos; el enfermo languidece, está pálido, con grandes ojeras negras; se queja de calor en la cabeza, particularmente frente y raíz de nariz, no puede soportar, de noche, el calor del lecho.

La influencia de la droga continúa; mucosa bucal edematizada, encías dolorosas, esponjosas, blanco amarillento; se ulceran a la larga, dejan salir secreción fétida; dientes mal fijados y encías bordeadas de una orla roja; caen uno por uno; salivación abundante, parótidas hinchadas así como los ganglios cervicales, abertura del canal de Tenon roja y ulcerada a menudo.

Aliento cada vez más fétido y lengua hinchada que conserva la impresión de los dientes; hígado y páncreas inflamados el primero hasta presentar a menudo abscesos; catarro duodenal, diarrea, etc.

Poco a poco, la sangre se empobrece y el cuerpo adelgaza, la piel toma un color marrón, se ulcera fácilmente y particularmente la zona de las tibias.

Fiebre hética con escalofríos a flor de piel característicos; el periosteose inflama y produce esas algias especiales, conocidas por el nombre de dolores mercuriales, peor en cambios de tiempo y al calor del lecho, lo que impide dormir, insomnio : el enfermo está ansioso, ardiente, agitado, nervioso, se sofoca y tiene abundante transpiración que no mejora su agitación febril; no puede quedarse tranquilo, tiene angustia precordial.

Esta agitación continúa de día.

Sacudidas en miembros, parecidas al baile de San Vito, pero sobre todo temblor de manos (temblor mercurial) que puede ganar todo el cuerpo y se parece a parálisis gigante.

En un período más avanzado se paraliza, no puede mover las piernas, el espíritu se extravía, está sucio, y termina por presentar el cuadro exacto de la imbecilidad más completa, en la que no tardará en morir.

Si estudiamos exclusivamente su acción patogenética, vemos que actúa electivamente SOBRE SISTEMA LINFÁTICO.

Aquí se encuentra su centro de acción y por eso es un polícresto notable, ya que todos los órganos poseen, sea como parte integrante, sea como parte de relación, algún elemento del sistema linfático.

Es capaz de afectar a todos los órganos más o menos profundamente según la importancia que presente el desarrollo del tejido linfático : actúa muy poderosamente sobre GANGLIOS Y VASOS LINFÁTICOS, SEROSAS Y SINOVIALES, PERIOSTEO Y HUESOS, TEJIDO CELULAR Y GLÁNDULAS, MUCOSAS EN GENERAL Y PARTICULARMENTE TUVO DIGESTIVO, CON PREDILECCIÓN MARCADA POR SUS EXTREMOS : BOCA Y FARINGE POR UN LADO, COLÓN Y RECTO POR OTRO; SOBRE PIEL Y ANEXOS (Espanet.) EL SISTEMA VENOSO, sin duda por sus conexiones íntimas con el aparato linfático, sufre también, sobre todo en el dominio de LA VENA PORTA, la influencia del mercurio, que actúa indirectamente sobre los órganos ricamente vascularizados por ella, como HÍGADO Y ÚTERO (Espanet). Si examinamos de más cerca esta acción de merc., sobre piel, sobre mucosas y órganos vemos que provoca en sus criptas, tales como folículos, ganglios o vasos linfáticos, y en los capilares venosos, FLOGOSIS EXUDATIVAS que tienden a inflamación o ulceración y pueden rodearse de hinchazón subinflamatoria o edematosa, pero no llegan jamás a gangrena.

En cavidades linfáticas, sinoviales, serosas articulares o viscerales, espacios intercelulares, provoca exudaciones serosas o pseudo membranas que no llegan jamás a supuración.

Más tarde su acción recae SOBRE SISTEMA NERVIOSO (centros y nervios) donde desarrolla sintomatología que recuerda a esclerosis en placas o la parálisis agitante.

Actuando sobre LÍQUIDOS ORGÁNICOS A LOS QUE FLUIDIFICA O DESCOMPONE, ataca pronto profundamente "la fuerza plástica" y determina CAQUEXIS QUE SE CARACTERIZA POR DESGLOBULACIÓN DE LA SANGRE, REBLANDECIMIENTO E INFILTRACIÓN DE TEJIDOS (Espanet). Medicamento LINFÁTICO-VENOSO de primer plano, merc. goza de PODERESPECÍFICO SOBRE EL VIRUS ESPECÍFICO e interviene a menudo con éxito en la cura de numerosas AFECCIONES DE NATURALEZA HERPÉTICAS O ESCROFULOSAS (Espanet).

Características

1) CONSTITUCIÓN Y TEMPERAMENTO : El sujeto de merc. ES LA IMAGEN DE LA PLÉTORA, con ansiedad, agitación, movimiento constante; no se puede quedar quieto.

De aspecto escrofuloso y sea o no sífilítico, de sistema linfático muy activo.

Puede ser muy delgado, con mal estado de asimilación nutritiva (Espanet).

Personas linfáticas, de cabello rubio o castaño claro, cara hinchada principalmente alrededor de los ojos, tez pálida y terrosa; párpados tumefactos y rojos; labios secos, fisurados, ulcerados en comisuras; manos húmedas, músculos blandos, piel floja.

Aliento generalmente fuerte, fétido, todo el cuerpo exhala olor nauseabundo.

Niños escrofulosos, con cabeza anormalmente grande, fontanelas abiertas mucho tiempo, especialmente la anterior.

Tardan en aprender a caminar, dentición difícil, tardía, incompleta.

Piel en miembros sobre todo, fría, húmeda, viscosa.

Tendencia a transpirar la cabeza y esta transpiración es fétida, aceitosa.

Tales niños parecen a nuestro gran trío : sulphur., calc. ostr., sílicea.

2) OLOR MERCURIAL FÉTIDO, PARTICULAR : Es mal oliente y este olor fétido cubre todo el remedio.

Aliento muy fétido y a menudo se huele al entrar en la pieza del enfermo, transpiración muy ofensiva, de olor fuerte y penetrante; orina y deposiciones nauseabundas.

Cuando el mercurio ha sido dado a altas dosis, a dosis alopáticas y llega a intensificar su acción hasta la producción de sialorrea el sujeto así tratado exhala este olor nauseabundo característico y quien una vez lo ha oído lo reconocerá siempre (Kent).

3) ALIENTO FÉTIDO, DE OLOR MERCURIAL; LENGUA HINCHADA BLANDA, QUE CONSERVA LA IMPRESIÓN DE LOS DIENTES; MUCOSA BUCAL INFLAMADA, SALIVACIÓN ABUNDANTE.

Como en ant. crud., la principal característica de merc. v. se encuentra en la boca.

ENCÍAS HINCHADAS, ESPONJOSAS, A VECES SANGRANTES.

LENGUA HINCHADA, BLANDA, CONSERVA LA IMPRESIÓN DE LOS DIENTES (ars. alb., podoph., rhus. tox., stram.); GENERALMENTE HÚMEDA.

SALIVACIÓN ABUNDANTE, SALIVA GLEROSA.

(Euphorbium, iris vers., cupr. met., trifol., prat., tienen también sialorrea); pero A PESAR DE LA BOCA HÚMEDA, SALIVA ABUNDANTE, TIENE MUCHA SED.

EL OLOR DE LA BOCA, EL ALIENTO, ES EXTREMADAMENTE FÉTIDO, y esta fetidez puede ser tal que se sentirá en toda la habitación.

4) SECRECIONES MUCOSAS PRIMERO FLUENTES Y EXCORIANTES, LUEGO ESPESAS Y SUAVES COMO puls.

Las mucosas son todas afectadas por merc. escribe Nash; sus secreciones, primero fluentes e irritantes, desde catarro nasal hasta secreciones disintéricas después se hacen más espesas y suaves.

PEOR DE NOCHE, lo mismo la leucorrea.

5) ULCERACIONES SUPERFICIALES QUE SE EXTIENDEN RÁPIDAMENTE Y NOTIENEN NINGUNA TENDENCIA A CICATRIZACIÓN : La gran tendencia de estas ulceraciones mercuriales que pueden aparecer en

todo el sujeto tienen por gran característica, que no se extienden en profundidad sino en superficie, aunque tengan tendencia a hacerse fagedénicas.

Son tórpidas, muestran poca inflamación.

No tiene tendencia a curar espontáneamente.

6) **INDURACIÓN** :Tendencia característica a producir induraciones sea de partes inflamadas, o ulceradas (Kent).

7) **FORMACIÓN DE PUS** :He aquí otra tendencia característica de merc. v. : con la inflamación tiene sensación de ardor, de pinchazos y a menudo formación de pus, generalmente verde amarillento.

Un rasgo curioso de merc. v., es la aparición de hinchazón acompañada de abscesos sin calor; por ej., un absceso, hinchazón, en una articulación; transpira de la cabeza a los pies, se agrava de noche.

Adelgaza y está débil; puede tener temblor, pero no hay calor mientras este absceso evoluciona (Kent).

8) **TEMBLORES** :Este síntoma atraviesa toda su patogenesia; por eso es empleado con éxito en parálisis agitante (Kent); temblor generalizado; temblor de extremidades especialmente manos.

Modalidades

Hipersensibilidad a temperaturas extremas, sobre todo al aire frío

Así como el Mercurio es empleado para indicar la temperatura, a cuyos cambios es muy sensible, su constitución es tan sensible al calor como al frío.

Se agrava por temperaturas extremas; sus síntomas están peor tanto en atmósfera caliente como al frío o al aire libre, necesita temperatura media.

Agravación

a) **POR TEMPERATURAS EXTREMAS, GRAN CALOR O GRAN FRÍO**; b) **DE NOCHE; POR EL CALOR DEL LECHO**; hay una larga lista de remedios que tienen agravación nocturna, pero ninguno que tenga agravación tan marcada al calor del lecho (Kent).

c) **ACOSTÁNDOSE SOBRE LA DERECHA, DEL LADO DERECHO.**

d) **POR HUMEDAD, LLUVIA.**

e) **POR TRANSPIRACIÓN.**

Mejoría

POR EL REPOSO EN EL LECHO.

Síntomas mentales

MAL HUMOR; CARÁCTER HURAÑO, DESCONFIADO, PELEADOR, al mismo tiempo : abatido, **DESCORAZONADO, SIN VOLUNTAD NINGUNA; SU MENTE NO TRABAJA**, lento, olvidadizo, perezoso, responde lentamente a las preguntas que se le hacen; memoria débil, inestabilidad en sus ideas, salta de una a otra constantemente distraído.

Otro síntoma muy marcado es : **APRESURADO, SIEMPRE APURADO, AGITADO, ANSIOSO** (Kent).

En esto se parece a arg. nit., alum., aur. met., lil. tig., medorr., nit.

mur., nux vom., sulph. ac., etc.

ANGUSTIADO, ANSIOSO, como si una desgracia le fuera a pasar; **MIEDO DE PERDER LA RAZÓN** (arg. nit., calc. carb., alum., cimicif., lil. tig., mancin., medorr.) No le gusta estar solo, quiere salir siempre de casa.

Tendencia a ideas impulsivas : cóleras súbitas con impulsos violentos, deseo impulsivo de suicidio, de matar, etc.

El debilitamiento de la inteligencia puede llegar a **IMBECILIDAD**, con gran laxitud, postración y reblandecimiento del cerebro.

Sueño

De día, somnoliento; tiene sueño en cuanto se sienta.

De noche, el sueño viene tarde, con sudores al dormirse, insomnio.

Cuando logra dormirse, sueño agitado, sobresaltos continuos con necesidad de cambiar sin cesar los miembros de lugar; sueño poblado de sueños, muy a menudo terroríficos; cortado por despertares frecuentes, como por violenta cólera, gritos; sonambulismo.

Cabeza

TRANSPIRACIÓN GRASA DE LA CABEZA, SUDOR ACEITOSO, FÉTIDO, de cuero cabelludo.

En niños, eczema húmedo, erupción excoriante, maloliente, de la cabeza.

EXOSTOSIS, en antiguos sifilíticos; **DOLORES LANCINANTES, DESGARRANTES, DE PERIOSTEO.**

Toda la cabeza extremadamente sensible al tacto.

SENSACIÓN DE TENSIÓN DOLOROSA, EN EL CRÁNEO, de cinta dolorosa alrededor de la cabeza; tensión dolorosa alrededor del cuero cabelludo como si estuviera rodeado, comprimido por una cinta.

Merc. conviene a algias de cabeza y trastornos cerebrales cuando hay **DOLORES ARDIENTES, PICANTES, QUE DEPENDEN DEL TIEMPO**, o cuando hay **SÍNTOMAS CEREBRALES EN CORRELACIÓN CON LA REGRESIÓN DE UNA SECRECIÓN**, por ej. otorrea después de escarlatina.

Dolores ardientes en temporales, mejorados levantándose, moviéndose, peor de noche.

DOLORES PERIOSTICOS, PEOR CON TIEMPO FRÍO Y HÚMEDO EN REUMÁTICOS Y GOTOSOS, con sensibilidad dolorosa en ojos y oídos, dolor de garganta y ganglios hinchados.

DOLORES DE CABEZA EN ANTIGUOS SIFILÍTICOS MERCURIALIZADOS Y QUE SON TANSENSIBLES A CAMBIOS DE TEMPERATURA QUE PARECEN VERDADEROS BARÓMETROS.

Dolor de cabeza catarral, con intensa sensación de calor en la cabeza.

Dolor de cabeza en sujetos que sufren de catarro crónico, con secreción espesa; si se hace acuoso, el dolor en frente, cara y oídos es muy angustioso.

DOLOR DE CABEZA CRÓNICO REUMÁTICO, POR SUPRESIÓN DE SECRECIÓN O SUPRESIÓN BRUSCA DE TRANSPIRACIÓN HABITUAL DE LOS PIES, ALTERNANCIA ENTRE TRANSPIRACIÓN DE PIES Y DOLOR DE CABEZA; cuando la transpiración de los pies desaparece, sobreviene rigidez y dolor de articulaciones; silicea es así también; merc. y sil. no se siguen bien, pero si merc., ha sido tomado largo tiempo, silic. como nit. ac. pueden eliminarlo cuando los síntomas lo indican (Kent).

Con todos los dolores de cabeza, mucho CALOR EN ESTA REGIÓN.

Dolores de cabeza estallantes; SENSACIÓN DE PLENITUD CON CONSTRICCIÓN, como por cinta alrededor de la cabeza.

MUY SENSIBLE AL FRÍO CUANDO TIENE DOLOR DE CABEZA, SE ALIVIA CUANDO ESTÁ EN UNA PIEZA, PERO A CONDICIÓN QUE TENGA TEMPERATURA MEDIA, ni mucho calor ni mucho frío; se agrava violentamente por corriente de aire; desea estar abrigado, pero está peor por el calor.

La SENSIBILIDAD DOLOROSA DEL CEREBRO ES PEOR DE NOCHE.

CEFALALGIAS CON SENSACIÓN DE PLENITUD Y PRESIÓN EN LA CABEZA, COMO SI LA FRENTE ESTUVIERA APRETADA POR UNA CINTA Y EL CRÁNEO FUERA A ESTALLAR, AGRAVADAS DE NOCHE, POR RUIDO, FRÍO O CALOR, MEJORADAS TENIENDO LA CABEZA APOYADA.

VÉRTIGOS; estando acostado de espaldas o enderezándose a menudo con náuseas.

Ojos

Enfriamiento en los ojos; como dulcam.; catarro a frigori AGRAVADO POR MIRAR EL FUEGO O MAS BIEN POR ESTAR CERCA DEL FUEGO, PUES EL CALOR QUE IRRADIA CAUSA ESCOZOR EN LOS OJOS (Kent).

BLEFARITIS CON PÁRPADOS ROJOS, HINCHADOS, INFLAMADOS Y SECRECIONES ABUNDANTES; IRRITANTES, ARDIENTES; aglutinación de párpados de noche; costra alrededor de los ojos.

Lagrimo abundante al aire libre.

Sensibilidad de los ojos a la luz, al fuego, al calor irradiante.

ENROJECIMIENTO DE CONJUNTIVA, OFTALMÍA PURULENTO, QUERATITIS PARENQUIMOSA de origen sifilítico, con dolor ardiente.

Iritis sifilítica o reumática; iritis con hipopión.

Oídos

Secreción espesa, purulenta, fétida.

Otalgia peor de noche, al calor del lecho; dolores lancinantes de los oídos, pinchazo (apis).

Forúnculos de conducto auditivo externo.

Cara

Pálida, terrosa, hinchada; labios secos, fisurados, partidos, ulceración de comisuras; alrededor del mentón, erupciones más o menos netas.

Puede tener neuralgias más o menos ligadas a lesiones periosticas de huesos de la cara.

Sensación de contractura de maxilares.

Sensación como si insectos u hormigas corriesen por mejillas o frente.

Aparato digestivo

BOCA :

OLOR NAUSEABUNDO, FÉTIDO CARACTERÍSTICO, "MERCURIAL", SE EXPANDE EN TODA LA HABITACIÓN.

ESTADO INFLAMATORIO, MALSANO, Y ULCERACIONES DE TODA LA MUCOSA BUCAL, mucosa de la boca y del istmo de las fauces cubierta de ulceraciones que tienden a hacerse profundas, fondo grisáceo, secreción serosa y sucia; otras veces, se cubren de falsas membranas diseminadas como muguet (borax, kali chlor.) o análogos a la difteria.

GUSTO PERVERTIDO; ningún alimento o bebida tiene su verdadero gusto; GUSTO DULZÓN, o amargo, METÁLICO.

ENCÍAS ESPONJOSAS, RETRAÍDAS, SANGRAN FÁCILMENTE, ESCORPÚTICAS, DOLOROSAS AL TACTO, FUNGOSAS, BORDEADAS POR UNA ORLA AZUL-ROJO O PURPÚREA, A LO LARGO DEL LIMITE DENTARIO; SE RETRAEN Y LOS DIENTES PARECEN MAS LARGOS, ABSCESOS EN ENCÍAS, EN RAÍZ DE DIENTES, dolorosos, que no pueden masticar; parecen demasiado largos.

DIENTES NEGROS, QUE CAEN PREMATURAMENTE, EN NIÑOS SIFILÍTICOS (STAPHIS.).

DIENTES MÓVILES EN SUS ALVÉOLOS, PARECEN DEMASIADO LARGOS; CORONAS CARIADAS Y RAÍCES INTACTAS.

LENGUA BLANDA, CARGADA, CUBIERTA POR CAPA AMARILLA ESPESA MUY HÚMEDA, ANCHA, CONSERVA LA IMPRESIÓN DE LOS DIENTES, Dificultad de palabra por TEMBLOR DE LENGUA que se entorpece.

AUMENTO DE SECRECIÓN SALIVAR; SALIVACIÓN MUY ABUNDANTE VISCOSA, JABONOSA, DE GUSTO METÁLICO, QUE ESCAPA DE LA BOCA Y MOJA LA ALMOHADA DURANTE LA NOCHE. OLA COPIOSA DE SALIVA FÉTIDA.

BOCA HÚMEDA Y A PESAR DE ELLO, SED INTENSA.

FARINGE :

Merc. tiene gran afinidad para esta región y es gran remedio para su inflamación : SE EXTIENDE DE ARRIBA A ABAJO Y LA MUCOSA ESTA MUY ROJA, PÚRPURA.

Faringe muy sensible y disposición marcada y crónica a dolores de garganta.

INFLAMACIÓN DE GARGANTA AL MENOR CAMBIO DE TEMPERATURA.

Sensación de sequedad y de gran calor en garganta, ardor, punzadas, con constante deseo de tragar saliva.

Deglución difícil y penosa, con DOLORS HASTA EL OÍDO y los líquidos vuelven a salir por la nariz cuando traga.

Amígdalas inflamadas, hinchadas, rojo azuladas, sobre todo a la derecha.

Absceso de amígdala; merc. es útil en angina cuando el pus está formado.

Campanilla inflamada, alargada.

PSEUDO MEMBRANAS ESPESAS, CON GIRONES DE BORDES ADHERENTES O LIBRES.

ESTOMAGO :

HAMBRE CANINA O FALTA DE APETITO; REPUGNANCIA A LA CARNE : (Alum., arnica, calc. carb., carb. veg., puls., sepia, etc.).

POR GRASAS (puls., calc. carb., carb. an., carb. veg., hep. sulf., petrol).

POR CAFÉ (cham., flúor. ac., lycop., nux vom., phosph., ac.).

POR AGUARDIENTE Y VINO (ignat., mancin., rhus., sabad., zincum).

LA LECHE NO LES CAE BIEN Y SE AGRIA EN EL ESTOMAGO.

(Carb. veg., guaiac., puls., sepia, silic., sulph.).

LOS DULCES NO LE CONVIENEN (graph., sinap.).

SED ARDIENTE DE BEBIDAS FRÍAS, DE AGUA FRÍA (acon., ars., bell., bryon., china, nat. mur., etc.).

Digestión débil, difícil, a pesar de lo cual tiene buen apetito.

Estómago sensible al tacto, sensación de estar lleno y contraído; de piedra en el estómago; hipo durante y después de las comidas, regurgitaciones de líquido rancio; náuseas y deseos de vomitar; ardor, "hierro al rojo" en el estómago, dolor ardiente en el hueco epigástrico.

ABDOMEN :

Distensión flatulenta, vientre duro e hinchado con sensibilidad al tacto, principalmente en región umbilical.

Sensación de frío en el vientre.

Cólicos violentos, cortantes como por cuchilladas.

En el hígado, muchos síntomas; merc. lo afecta profundamente.

HÍGADO HIPERTROFIADO, DURO Y SENSIBLE AL TACTO, INDURADO.

SECRECIÓN INSUFICIENTE DE BILIS.

INFLAMACIÓN DE VÍAS BILIARES.

Cálculos biliares, SENSIBILIDAD DOLOROSA EN REGIÓN HEPÁTICA CON DOLORS LANZANTES; NO SE PUEDE ACOSTAR SOBRE EL LADO DERECHO.

RECTO, ANO Y DEPOSICIONES;

Prolapso de recto.

Comezón, latidos y excoriaciones de ano.

Hemorroides procidentes, sangran fácilmente.

Necesidad frecuente, súbita, imperiosa de evacuar, con muchos cólicos, tenesmo y esfuerzos.

DEPOSICIONES VERDOSAS, SANGUINOLIENTAS, VISCOSAS, PEORES DE NOCHE, CONDOLORS, TENESMO Y SENSACIÓN DE NO HABER TERMINADO.

Deposiciones espumosas con sangre y evacuadas con mucho esfuerzo.

En disentería es opuesto a nux vom., rhus tox., que se alivian con una pequeña deposición; merc. y sulph., continuarán haciendo esfuerzos.

Merc., ipeca y acon., están indicados frecuentemente en epidemias disentéricas en tiempo caliente; merc., ipeca y dulcam., en disenterías en tiempo frío (Kent).

Constipación crónica con estado bilioso y trastornos gástricos, sensación de plenitud en el estómago, por momentos, peor por frío, calor o humedad, en primavera ictericia, trastornos disépticos, agravación de noche y peor por el calor del lecho, un poco de fiebre de noche, boca malsana; este conjunto de síntomas requiere merc. (Kent).

Aparato urinario

Micciones frecuentes : DESEO FRECUENTE DE ORINAR.

Ardor de uretra al comenzar a orinar.

ORINA OSCURA, ESCASA, SANGUINOLENTA, ALBUMINOSA.

Hematuria; algunas gotas de sangre después de violentos esfuerzos.

Emisión nocturna de orina mezclada con sangre.

Los riñones son muy afectados por el mercurio; LA SUPRESIÓN DE ORINA es fenómeno muy común; muchas autopsias han mostrado su coincidencia con la congestión e inflamación de esos órganos.

Orina albuminosa; los enfermos mueren con todos los síntomas de la uremia (Hughes).

Órganos genitales

1) MASCULINOS : Frigidez genital, pérdida de poder sexual o al contrario exaltación del apetito venéreo con gran lascivia.

Erecciones nocturnas dolorosas y a veces poluciones sanguinolentas.

Verga pequeña, fría y blanda.

Hinchazón inflamatoria de prepucio con sensación de puntadas en el glande.

Secreción purulenta entre prepucio y glande.

Balanitis con pus nauseabundo, fétido, prepucio irritado, comezón.

Ulceraciones en prepucio y glande.

Secreción verdosa por uretra; sensación de ardor de uretra al comenzar a orinar.

Gonorrrea que dura desde hace un tiempo, con secreción espesa amarilloverdosa y fétida.

Escozor y ardor de uretra al orinar (Kent).

Bubón, orquitis (clematis, hamam., puls.).

Dolores tirantes en testículos y cordón espermático.

2) FEMENINOS : INFLAMACIÓN DE PARTES GENITALES EXTERNAS E INTERNAS.

Sensación en vulva y vagina como si estuvieran en carne viva; comezón y ardor en partes genitales que hacen insoportable el contacto de la orina; mejoradas lavándose con agua fría, ulceraciones en partes genitales.

ULCERACIONES DE CUELLO UTERINO en diversos grados desde simple erosión hasta ulceración profunda, con bordes desgarrados, que sangran fácilmente.

Dolores picantes, comezón, en útero y ovarios durante reglas.

Dolores picantes en ovarios (apis).

REGLAS DEMASIADO ABUNDANTES DE SANGRE NEGRA, CON COÁGULOS VOLUMINOSOS, CÓLICOS Y GRAN ANSIEDAD.

A veces la secreción menstrual, es poco abundante o también suprimida.

Reglas precedidas de tufaradas de calor en la cabeza y pequeña secreción serosa que dura 3 o 4 días.

Durante el período menstrual, gran agitación.

LEUCORREA EXCORIANTE, VERDOSA O SANGUINOLENTA.

LEUCORREA ABUNDANTE, EXCORIANTE, QUE PONE EN CARNE VIVA LA PARTE DE PIEL QUE

TOCA Y PRODUCE INFLAMACIÓN Y COMEZÓN VIOLENTA; tal leucorrea corrosiva, ardiente, ácida, se encuentra también en amm. carb., ars. alb., hydrast., iodium, creosot., nit. ac.

SENOS dolorosos, como si estuvieran ulcerados, en cada período menstrual.

Leche en los senos en el momento de las reglas.

Náuseas matutinas con salivación profusa durante embarazo.

Aparato respiratorio

1) NARIZ : Secreción fétida, purulenta, verde amarilla en viejos sifilíticos QUE TIENEN LOS HUESOS DE LA NARIZ ENFERMOS.

Dolor, hinchazón, carie de HUESOS DE LA NARIZ, CON SECRECIÓN VERDOSA Y FÉTIDA.

Epistaxis y secreción fétida, sanguinolenta.

Epistaxis sobre todo de noche y principalmente izquierda.

Coriza, secreción excoriente pero demasiado espesa para correr sobre el labio superior.

PEOR EN HABITACIÓN CALIENTE, CORIZA CON MUCHOS ESTORNUDOS Y SECRECIÓN ACUOSA Y CORROSIVA CONSIDERABLE, que escapa por gotas y estado más o menos febricitante.

Secreción a veces viscosa, de olor fétido, a viejo catarro y cabeza poco tomada.

Además inflamación catarral de garganta, laringe, tráquea, bronquios, ojos, etc.

Exacerbación de noche; escalofríos de día; de noche, sudor abundante que huele agrio, pero después de esta abundante transpiración nocturna, no está mejor a la mañana; agravación por calor pero soporta mal el frío; sed.

Todo esto se parece a ars., en coriza; ars. sigue bien a merc si éste no alivia en forma.

Merc. no tiene bastante acción profunda como para atacar toda la constitución en diatesis psóricas que toman frío continuamente; cura bien el resfrío, pero implanta su genio propio y el sujeto toma frío más fácilmente.

No debe darse a menudo, no más de 2 veces por invierno; kali iod., es mejor en semejantes casos de coriza y curará en una vez, cuando merc. estaba indicado aparentemente; es antídoto de merc.

No hay que dar frecuentes dosis de merc. en estado psóricos, sino buscar un remedio de acción más profunda (Kent).

Muchos estornudos; estornudos por el sol.

Fosas nasales ulceradas, excoriadas.

2) LARINGE :Sensible, con sensación de ardor, de puntadas, laringitis a frigori.

Voz ronca.

Afonía.

Coqueluche con pérdida de sangre por nariz.

Tos corta, seca, ronca, fatigante, provocada por cosquilleo supra esternal, laríngeo traqueal, peor de noche, al calor de la cama.

3) BRONQUIOS Y PULMONES :Dolor como si el pecho estuviera atravesado hasta la espalda por un puñal, durante un movimiento, al hablar, estornudar.

Puntos dolorosos en lóbulo inferior de pulmón derecho.

No se puede acostar sobre la derecha.

Tos gruesa, con expectoración muco purulenta.

Respiración corta, anhelante, sobre todo al caminar o hablar.

Enfisema pulmonar, supuración de pulmón.

Hemoptisis abundante y persistente.

Aparato circulatorio

Disminución muy neta del número de hematíes en la sangre.

Palpitaciones al menor movimiento.

Hemorragias por nariz, bronquios, uretra, útero, intestino.

Espalda y extremidades

Dolores ardientes y lancinantes en espalda y nuca.

Sensación de fatiga en espalda, agravada al caminar.

Dolor como de contusión en región renal, principalmente sentado.

Dolor tirante o desgarrante en coxis, mejorado por presión sobre el vientre;debilidad de miembros.

Dolores osteóscopos; dolores de miembros. lancinantes, tironeantes,desgarrantes, picantes, agravados de noche, por el calor del lecho, la transpiración; mejorados por cambio de posición.

Reumatismo articular inflamatorio, dolores desgarrantes, lancinantes,con hinchazón; agravación por calor, pero también si no está bien abrigado : es difícil acertar con la cantidad de frazadas (Kent).

Ataca sobre todo miembros superiores, pero puede ser útil en inferiores.

Dolores agudos en hombros y brazos, agravados de noche y por movimiento.

Entumecimiento de todo el miembro superior que el movimiento disipa.

Rigidez de muñecas, contractura de manos y dedos.

TEMBLORES DE EXTREMIDADES, PRINCIPALMENTE MANOS.

PARÁLISIS AGITANTE.

Merc., arg. nit., phosph., stram., y secale, tienen SACUDIDAS DE MÚSCULOS DE MIEMBROS

PARALIZADOS.

Dolores agudos, lancinantes, en articulación coxofemoral, muslos,rodillas, peor de noche o por movimiento, con sensación de frío. Sensación de debilidad, de pesadez en muslos y piernas.

DOLORES ARDIENTES EN TIBIAS.

Sudor frío, viscoso en las piernas de noche.

Dolores tirantes a lo largo del ciático, sobre todo en muslos, consensación de gran calor, aunque exteriormente la piel esté fría; se agravan al atardecer y la noche, y por movimiento : el reposo y sobre todo la mañana y el aire libre, alivian.

Calambres en pantorrillas y dedos grandes, edema de piernas y pies.

Piel.

Hay muchos síntomas de piel : ESTE CASI CONSTANTEMENTE HÚMEDA.

TRANSPIRACIÓN ABUNDANTE DE OLORES FUERTES, "VISCOSA", PEOR DE NOCHE.

TENDENCIA GENERAL A TRANSPIRAR, PERO ESTA TRANSPIRACIÓN NO ALIVIA : ésto constituye una característica de merc.

Gran irritabilidad de piel; el frío y el calor la hacen poner rojay sensible.

Escoror, enrojecimiento, COMEZÓN; COMEZÓN PEOR CON EL CALOR DELLECHO; mucha comezón muy violenta en cualquier parte del cuerpo, como de picadura de pulgas, peor de noche (Kent).

Erupciones vesiculosas y pustulosas; piel en carne viva entre muslos yescroto con erupciones (Kent).

Costras amarillo marrón, con supuración.

Manchas color cobre como de sífilis.

ULCERACIONES DE FORMA IRREGULAR, DE BORDES MAL TRAZADOS MALLIMITADOS,

INDURADOS, CON PUS ARDIENTE, CORROSIVO.

ULCERACIONES EN LUGARES POCO CARNUDOS, donde la piel cubre casi directamente los huesos, en cresta tibial, por ej.

Tumefacción, enrojecimiento e inflamación aguda de ganglios linfáticos en diversas regiones, con tendencia a supuración.

Ganglios hipertrofiados cada vez que toma frío.

Fiebre

EL ESCALOFRÍO de merc. es especial, particular; puede ser considerado como característico.

No es un gran escalofrío que sacude, sino UN ESTREMECIMIENTO A FLOR DE PIEL; es a menudo el primer síntoma de enfriamiento, y si se descuida un coriza, angina, bronquitis y hasta neumonía pueden sobrevenir; merc. dado a tiempo puede impedirlos.

Este escalofrío se SIENTE GENERALMENTE AL ANOCHECER Y AUMENTA DE NOCHE, sino se corta con merc. ALTERNA CON TUFARADAS DE CALOR.

Primero calor, luego escalofrío, luego calor etc., como ars. alb.

A menudo SE LOCALIZA EN PARTES ÚNICAS.

Este escalofrío puede aparecer durante una inflamación, y es PRECURSOR DE LA FORMACIÓN DE PUS.

Si el pus está ya formado y sobre todo en gran cantidad, merc. apresurarásu secreción; si sólo hay poco o nada de pus una alta dosis de merc.

impedirá su formación y un sudor profuso seguirá con reabsorción dehinchazón y curación rápida.

Además de este escalofrío, merc. tiene aquí otra característica muy marcada : SUDORES MUY ABUNDANTES, PROFUSOS, PERO QUE NO ALIVIAN, contrariamente a lo que se ve habitualmente en enfermedades inflamatorias; AL CONTRARIO, LOS DOLORES AUMENTAN CON LA TRANSPIRACIÓN : en cualquier caso de transpiración que no alivia, merc. será el primer remedio en que habrá que pensar (Nash).

Partes aisladas del cuerpo alternativamente y súbitamente calientes.

Relaciones

Mezereum, es un análogo vegetal.

Complementarios

Badiaga, bastante parecido a merc., pero con modalidades opuestas.

Incompatibles

Silicea.

Antídotos

Hep. sulph., el más importante de sus antídotos, como también de otros metales.

Útil para síntomas mentales para cura de merc. y también para dolores dehuesos, síntomas gástricos, úlceras etc.

Nit. acid. : útil cuando los tejidos inferiores son atacados(perioseo, hueso, tejido fibroso) y cuando la sífilis complique el envenenamiento mercurial.

Cinch : antidota el ptialismo mercurial.

Dulcam. : antidota también el ptialismo sobre todo si se agravada vez que el tiempo se pone húmedo.

Kali hydr. : como nitr. ac., indicado cuando sífilis y merc. se combinan y los tejidos inferiores son atacados.

Antidota la hipersensibilidad al frío de merc.

Kali chlor. : antidota especialmente malos efectos de merc. en mucosa bucal.

Aur. met. : útil contra manía suicida de merc. y caries óseas, particularmente de cara.

Asa fet. : en afecciones óseas desarrolladas por merc.

Lo que lo distingue es extrema sensibilidad alrededor de la parte enferma.

Es útil en iritis por mercurialización demasiado intensiva; lo que lo indica es extrema sensibilidad alrededor del ojo.

Staphis. : útil en casos de mercurialización profunda, cuando la economía entera está atacada, debilitada.

Lachesis : útil para ciertos síntomas.

Iodium : indicado cuando el sistema glandular está en juego.

Mezer. : útil cuando la mercurialización ha atacado el sistema nervioso.

Stillingia.

MEZEREUM

O maderita gentil, arbusto de la familia de la timeleáceas, crece en bosques y cercos de regiones montañosas de Europa y Asia septentrional.

No servimos del Daphne mezereum, que no debe ser confundido con el Daphnognidium, muy parecido.

Se prepara la tintura madre con corteza del arbusto recolectada en primavera, antes de la floración.

Acción general del medicamento

La patogenesia de mezereum, confirma su antigua reputación como remedio de afecciones DEL PERIOSEO.

Afecta ese tejido de manera especial y tiene indicaciones muy preciosas en periostitis, reumatismo periosteal y exostosis (Hughes).

Actúa electivamente sobre MUCOSAS en que provoca dolores de excoiación, más bien que excoiaciones verdaderas; existe siempre en puntos inflamados ligera hinchazón con participación de tejido celular profundo (Espanet).

En su acción sobre PIEL, determina prurito muy intenso, característico, e irritación que llega hasta erupciones pruriginosas, como erupciones miliares, pápulas, vesículas, que pueden dar lugar a escamas, costras secas o escamas blancas o se pueden ulcerar, pero en este caso no dan pus sañoso.

Su acción es enérgica, pero los síntomas que desarrolla tienen carácter subagudo o crónico; recuerdan la diatesis herpética o escrofulosa o el éstasis venoso (Espanet).

Características

1) CONSTITUCIÓN Y TIPO : Mezer. parece actuar mejor EN SUJETOS QUE SUFREN DE ERUPCIONES CRÓNICAS QUE REAPARECEN REGULARMENTE TODOS LOS VERANOS; EN DEBILITADOS POR ESTRAGOS PERSEVERANTES DE TARA REBELDE; HERPETISMO, ESCROFULA O SÍFILIS.

2) PRURITO, COMEZÓN INTENSA : Superficie del cuerpo en estado de constante irritación; sensación de hormigueo, picaduras, comezón, que cambia de lugar después del rascado, aunque no haya nada aparente sobre piel, ninguna erupción, lesión, hay violento prurito y el paciente se frota y rasca hasta que la zona se lastima y tiene sensación de ardor; la comezón cambia de lugar; después del rascado, sensación de frío.

Todo esto recuerda a petrol.

COMEZÓN QUE CAMBIA DE LUGAR, DESPUÉS DEL RASCADO, ESPECIALMENTE CUANDO NO HAY TRAZO VISIBLE.

En cuanto se calienta en su lecho o en ambiente caliente, la comezón comienza; es tan enervante que lo obliga a moverse, cambiar de lugar.

Erupciones con mucha comezón (Kent).

3) CUANDO LAS MANIFESTACIONES EXTERIORES SON PRONUNCIADAS, LAS INTERNAS SON ESCASAS O DESAPARECEN : Mezer. lleva a la piel las enfermedades internas, por consiguiente el sujeto de Mezer. se siente bien cuando su erupción ha brotado; si brota mal o no brota o es suprimida, las afecciones catarrales, enfermedades óseas, desórdenes nerviosos, constipación, reumatismo articular, síntomas mentales, aparecen (Kent).

Modalidades

Agravación

a) POR AIRE CALIENTE : sensible al aire caliente, según el grado de las erupciones, pero sensible al tiempo frío y húmedo en lo que concierne a neuralgias (Kent).

b) POR EL CALOR DEL LECHO : comezón, reumatismo inflamatorio, por el calor del lecho, de noche.

c) POR BAÑOS Y LAVADOS : las erupciones se agravan después de lavarse, la comezón por baños calientes.

d) POR CAMBIOS DE TIEMPO, POR TIEMPO TORMENTOSO : después que las erupciones ceden el lugar a manifestaciones internas, es friolento, sensible a cambios de tiempo, peor por tiempo tormentoso, después del baño, porque toma frío, que agrava manifestaciones internas (Kent).

Mejoría

a) POR AGUA FRÍA : cuando la erupción no ha salido, piel caliente y quiere refrescarla, por ej. con agua fría, que alivia.

En el momento, enrojecimiento de piel y prurito que el agua caliente agrava.

b) AL AIRE LIBRE.

Síntomas mentales

Estado melancólico que se refleja en el trabajo, y preocupaciones habituales; melancolía religiosa o financiera; indiferencia por todo.

Irritable, pensamiento difícil, memoria débil, distraído.

No tiene descanso cuando está solo pero no le gusta la conversación.

Alienación con melancolía, tristeza; historia de erupción cutánea de Mezer. (Kent).

Cabeza

Erupciones de cuero cabelludo.

Escamas de aspecto de tiza con líquido purulento debajo; costras gruesas, como cuero bajo las cuales hay pus blanco, espeso, que pega los cabellos; tienen un aspecto de tiza y se extienden a nuca o cejas (Kent).

Violento dolor de cabeza.

Dolores de arrancamiento, de desgarramiento, profundos; cabeza dolorosa al tacto.

Cefalea de un lado al otro de la cabeza, como situada en el hueso como si la cabeza fuera molida (en relación estrecha con merc. y kali iod).

Dolor de cabeza que se extiende de raíz de nariz a frente (merc., hep.

sulph. calc.) Los dolores de cabeza provocan desfallecimiento (hep. sulf. calc).

Dolores en huesos del cráneo agravados por tacto; los huesos parecen como raspados (Kent).

No le gusta hablar : el dolor de cabeza aumenta cuando habla (Boericke).

Ojos

Dolores que irradian hacia abajo, de arriba a abajo, con sensación de frío y entumecimiento en huesos de la órbita.

Neuralgia ciliar después de intervención en el ojo, principalmente en globo ocular.

Oídos

Trastornos del oído por supresión intempestiva de erupción.

Espesamiento de mucosas del oído : degeneración de tímpano, sordera.

Cara

Pálida, enfermiza, llena de erupciones, viejas cicatrices, granos, etc., puede enrojecer a veces, habitualmente pálida, serosa, traduce el estado caquético de afecciones óseas de mezer.

Neuralgia facial : sensación de presión calambroidea aturdidora en huesos de mejillas, a veces de un lado, dientes, cuello y hombro; a menudo ligada a supresión indebida de erupción por intoxicación mercurial.

Mezer. es excelente antídoto cuando una intoxicación mercurial ha invadido el sistema nervioso, han aparecido neuralgias en cara, ojos, o cualquier parte del cuerpo (Farrington).

Aparato digestivo

BOCA :

Sensación de ardor continua.

Tendencia escrofulosa de encías, que se retraen alrededor de los dientes.

Dientes arruinados; raíces cariadas, dolor en dientes cariados, puntadas, ardores y hasta en huesos de mejillas y temporales sensación como si los dientes fuesen muy largos; agravación comiendo, por tacto, movimiento, mejoría cerca de una estufa.

Odontalgia que consiste en puntadas ardientes, desgarramientos, que se extienden hasta pómulos y orejas.

Los dientes parecen demasiado largos, el dolor aumenta si se los toca, o por contacto de alimentos.

Los dolores se agravan de noche y no se localizan tanto en dientes cariados, como en los que la membrana alveolar está enferma, inflamada; a veces, encías cubiertas de vesículas ardientes.

En todos estos casos, se observan erupciones que reaparecen todos los veranos (Espanet).

FARINGE :

Sensación de ardor de garganta y esófago.

Espesamiento de mucosa, enrojecimiento crónico, tumefacción, comezón, dolor al tragar, granulaciones y ulceraciones.

Úlceras perforantes en velo de paladar.

Mezer. producirá erupción abundante en el lugar original, si no no habrá alivio (Kent).

ESTOMAGO :

Sensación de agotamiento, miedo, aprensión, desfallecimiento en estómago, como si algo fuera a pasar; cada dolor conmovión, anuncio de mala noticia, provoca en hueco del estómago, aprensión, impresión de hambre, desfallecimiento, debilidad, agotamiento, sobreviene cuando llaman a la puerta si espera al cartero; en la estación esperando la llegada de un amigo o tren; cuando le presentan a alguien tiene escalofrío en el estómago; ESTÁ ASUSTADO, TIENE ESCALOFRÍO DE ESTOMAGO : calc., kali carb., phosph., mezer. presenta esto y los individuos de "PLEXO SOLAR" tienen A MENUDO LENGUA PROFUNDAMENTE AGRIETADA Y SON DIFÍCILES DE CURAR (Kent).

Espalda y extremidades

Dolor de nuca y espalda, peor por movimiento y de noche; intolerancia al menor toque.

DOLOR Y ARDOR EN TIBIAS Y HUESOS LARGOS; los dolores descienden a lo largo de los huesos, sensación de estallido; parecen aumentados de volumen, DOLORS DESGARRANTES EN PERIOSTEO.

Mezer. merece ser empleado más frecuentemente en dolores profundos y osteócopos, agravados por tacto y movimiento, con alguna intermitencia y que resisten a la acción de medicamentos mejor adaptados al dolor (Espanet); NECROSIS, CARIE, TRAYECTO FISTULOSO.

Neuralgia ciática, dolor en columna vertebral, plexo-braquial y brazos.

Piel

PRURITO VIOLENTO QUE CAMBIA DE LUGAR DESPUÉS DEL RASCADO; AGRAVADO POR CALOR DE LA CAMA; NO ES FORZOSO QUE HAYA LESIÓN CUTÁNEA en lugar de la comezón.

ERUPCIONES VESICULOSAS QUE RECORREN CIERTO CICLO : PICA Y ARDE como fuego, después SECAN Y SE CUBREN DE COSTRA GRUESA, luego desaparecen; pronto aparece nueva erupción en el mismo lugar o alrededor.

Las vesículas forman costra bajo la cual hay ulceración.

Las costras se hacen blancas como tiza, son gruesas, duras, parecidas a cuero; son a menudo altas y si se aprietan dejan filtrar pus espeso blanco, a veces amarillo-blanco, acompañadas de comezón agravada por calor.

ERUPCIONES CON MUCHA COMEZÓN : ERUPCIONES OSCURAS, ROJAS, ACOMPAÑADAS DE VIOLENTO COMEZÓN, HORMIGUEOS, PINCHAZOS, QUE CAMBIAN DE LUGAR AL FROTAR O RASCAR.

Casos con historia DE ERUPCIÓN INDEBIDAMENTE SUPRIMIDA.

Erupciones en brazos o piernas, o lugares de débil circulación como orejas, muñecas, dorso de manos.

ERUPCIONES CUTÁNEAS, SEGUIDAS DE ULCERACIÓN, que dejan correr pus espeso, blancuzco, de olor desagradable.

Erupción en cara, ojos, orejas, cuero cabelludo, en niños o adultos, suprimida por empleo de pomadas, y provocan al desaparecer catarro inveterado o síntomas oculares : hinchazón crónica de conjuntivas como carne de vaca cruda; cicatrices rojas en ojos, donde había erupciones; manchas y venas dilatadas en ojos y nariz; la piel parece indurada; desórdenes de oído, etc.

Las enfermedades cutáneas que entran en la terapéutica de mezer.

en esta esfera, se caracterizan menos por sus síntomas que por su etiología :escrófula sífilis rebelde, abuso de merc. y sulph., y ciertas características : obstinación, metástasis; éso permite elegir mezer para descamación repetida de epidermis con algunos puntos ulcerados, en tiña de los niños cuando es de origen hereditario, en ulceraciones psoriasiformes y papuliformes, en enrojecimiento de bordes libres de párpados, en que digit. y nat. mur., tienen fuerte analogía; en herpes escamosas con costras que renacen siempre y comienzan por un grupo de vesículas, sea sobre la nariz, labio superior, cara o miembros (Espanet).

Relaciones

Antídotos

Kali hydrio., mercurius.

MILLEPHOLIUM

O hierba de los carpinteros, planta vivaz de la familia de las compuestas, crece al borde de caminos, en prados secos, lugares incultos, en toda Europa, Asia septentrional y América del Norte.

Preparamos la tintura madre con que obtenemos las diferentes dinamizaciones, por maceración en alcohol de toda la planta recolectada en el momento de su floración.

Características

Actúa electivamente sobre aparato circulatorio; su especialidad es provocar movimientos congestivos que terminan en hemorragia.

Por eso conviene particularmente a hemofílicos, cuyas fluxiones sanguíneas terminan habitualmente de esa manera. Puede producir homeopáticamente la hemorragia : cuando se ha opuesto a trastornos congestivos ocasionados por metástasis por supresión de flujo sanguíneo habitual, catarral o hemorroidario, puede curar, pues la extinción de esos trastornos coincidirá siempre con la reaparición de la secreción sanguínea.

Su principal y gran característica es : HEMORRAGIA DE SANGRE ROJO VIVO, COMO acon. (pero sin la ansiedad de este último) SIN DOLORES, SIN FIEBRE DE ORIGEN PULMONAR, BRONQUICO, LARINGEO, BUCAL, NASAL, ESTOMACAL, VISCERAL, RECTAL, UTERINO; DE ORIGEN TRAUMÁTICO (arnica) O DESPUÉS DE HERIDA (hamam.).

Su estudio patogenético, desgraciadamente, no ha ido muy lejos; por eso, a pesar de su aplicación neta y de su efecto cierto, sólo tiene una esfera de acción muy limitada.

Cabeza

Produce pocos dolores de cabeza mal caracterizados; determina solamente de manera precisa aflujo de sangre abundante a la cabeza.

A menudo, dos gotas de tintura han determinado vértigo con tendencia a caer, a veces con náuseas y esta particularidad : sólo se manifiesta caminando lentamente, desaparece caminando rápido o acostándose.

Aparato digestivo

Sus patogenesias contienen pocos síntomas gastrointestinales, ningún síntoma característico : ardor de estómago y diarrea con desarrollo de gases.

Más importantes son las HEMORRAGIAS HEMORROIDARIAS, características del remedio y para las que es un precioso recurso.

Útil en ciertos casos de HEMORRAGIA INTESTINAL.

Aparato urinario

Ha curado a menudo LA HEMATURIA con dolores en región renal.

Órganos genitales

AUMENTA LAS REGLAS; es excelente en casos de METRORRAGIA de sangre rojo brillante líquida.

Se puede comparar aquí a TRILLUM PENDULUM que tiene hemorragia de sangre rojo vivo, por útero; reglas que aparecen cada dos semanas, muy abundantes, durante ocho días (calc. ost; nux. v.); Hemorragia con sensación de relajamiento en región pelviana, como si caderas, articulaciones sacro-iliacas y región lumbar quisieran separarse; la enferma desea ser vendada fuertemente para mantener todo esto (hemorragia post partum y menopausia) (Nash); erigeron : hemorragia de sangre rojo vivo, disminuida por reposo, de noche, aumentada por movimiento; hemorragia de órganos pelvianos con violenta irritación de recto y vejiga (canth., lil. tig., nux. v.).

Aparato respiratorio

1) NARIZ : Epistaxis de sangre rojo vivo después de traumatismo. (Arnica). 2) BRONQUIOS Y PULMONES : TOS CON HEMOPTISIS DE SANGRE ROJO VIVO; CON OPRESIÓN Y PALPITACIONES, DESPUÉS DE SUPRESIÓN INTEMPESTIVA DE FLUJO HEMORROIDARIO O MENSTRUAL; DESPUÉS DE UNA CAÍDA (arnica); DESPUÉS DE EJERCICIO VIOLENTO, COTIDIANO, DESPUÉS DE LAS 16 HS. (Lycop.) (Allen).

Es muy útil en HEMOPTISIS TUBERCULOSAS; la sangre es rojo vivo y espumosa, expectorada sin gran esfuerzo : es una de las grandes indicaciones del remedio, según todos los autores; el que más se le parece en esto es ipeca, que también tiene hemorragias abundantes de sangre rojo vivo, caliente, por cualquier orificio de cuerpo; esta hemorragia va acompañada generalmente de náuseas y disnea.

Relaciones

Actúa bien después de aconit. y arnica en hemorragias.

MOSCHUS

La substancia olorosa conocida con el nombre de moschus proviene de un mamífero rumiante del género de la cabra; vive en montañas de Oriente y Siberia, China, Tibet.

La parte que lo contiene es una bolsa peluda, larga de 9 a 10 cm, situada bajo el vientre del macho, cerca de las partes sexuales, alrededor del ombligo; el producto que contiene es un humor graso, negro, de sabor un poco amargo o, olor sui generis fuerte y penetrante.

Las bolsas de moschus llegan a Europa encerradas en capa de plomo; hay tres clases : moschus de China, de Tonkín y Oriente, proveniente de Tibet; de Siberia y Kabardin; y de Bengala.

Empleamos el primero que es el mejor; se lo recibe en bolsas del grosor de un huevo de paloma, más o menos redondas, cubiertas de pelos; contienen cada una de 15 a 20 gramos.

Tiene el aspecto de sangre coagulada y consiste en pequeños grumos marrón oscuro, suaves y untuosos al tacto, ligeramente húmedos.

Hacemos las tres primeras dinamizaciones por trituración Hahnemanniana, las más elevadas por diluciones sucesivas de 1 parte de moschus en 20 de alcohol a 90°; luego se preparan las diferentes dinamizaciones exclusivamente por diluciones.

Acción general del medicamento

Actúa de manera prominente SOBRE SISTEMA NERVIOSO : inyectado en venas de animales produce narcosis con espasmo, deposiciones sangrantes y finalmente muerte.

Introducido en dosis de 0,50 centigramos en saco linfático de ranas, determina sacudidas convulsivas histeriformes.

Experimentado en el hombre, da lugar a una serie de síntomas nerviosos que Farrington describe así : "Sujeto excitado como por alcohol; pulso lleno y más frecuente, temperatura ligeramente elevada; ligero grado de congestión de cerebro; divaga, habla con precipitación y confusión; se enoja hasta tener los labios azules, cara pálida y cae en verdadera crisis de violenta cólera nerviosa; hay ansiedad, se estremece al menor ruido, tiene miedo de morir; verdaderos ataques de desfallecimiento con enfriamiento de piel, cara pálida, inconsciencia completa y espasmos musculares y convulsiones más tónicas que clónicas.

Todos los efectos de moschus tienen acción exclusivamente electiva sobre sistema cerebro espinal y hacen de él un medicamento especial de la histeria cuyos síntomas son confusos, con sensación de constricción en pecho, epigastrio o abdomen; gran variedad de síntomas congestivos vasomotores; con gran irregularidad en los fenómenos de la calofiración; cortados por momentos de calma, moschus es uso de nuestro más poderosos antihistéricos y uno de nuestros mejores remedios en neuróticos y mujeres nerviosas (Espanet).

Características

1) NERVIOSISMO, HISTERIA, EXCITACIÓN NERVIOSA : Cura a niñas que han llegado a la edad adulta sin haber aprendido o obedecer.

Son voluntariosas, obstinadas, egoístas.

Acostumbradas a emplear la astucia para cumplir todos sus caprichos desde la más tierna infancia hasta los 18 años, se convierten en dignos sujetos de moschus, asa fét. y valer.

Presentan no solamente una mezcla de síntomas verdaderos o imaginarios, sino también se hacen hábiles para producir a voluntad una colección Kaleidoscópica de síntomas más o menos imaginarios cuyo número e intensidad aumentan hasta obtener lo que querían y el espectador, sea enfermera, doctor o madre queda consternado, vencido y se bate en retirada.

Por eso aunque pretendan ser verídicas y dignas de ser creídas, las sensaciones que describen son falsas, engañosas.

Han abusado tanto tiempo de sensaciones e imaginación que aunque hagan un esfuerzo para decir la verdad, no lo consiguen.

Tienen siempre los síntomas más neuropáticos, más inesperados, más cambiantes; y sólo se puede dar el calificativo de : histeria.

A menudo indicado en tales sujetos, ha curado muchos de sus síntomas mórbidos, cuando los individuales concuerdan.

Cuando una de estas niñas enferma después de haber tomado frío, describelos síntomas agudos que siente y agrega una serie de sensaciones imaginarias : bola histerica, hiperestesia de piel, temblores musculares, espasmos, palpitaciones, agitación, insomnio, desvanecimientos fáciles, "dolores terribles" en el cuerpo, flujo de sangre a la cabeza, calambres en manos y pies, convulsiones.

Olvidamos que las sensaciones y estados mórbidos corresponden al estado mental; cuando las funciones orgánicas y los síntomas tienen esta forma cambiante e inesperada, el estado mental será el mismo.

Moschus tiene un síntoma especial : una mejilla roja y fría, la otra pálida y caliente, hay perversión histérica del estado mental.

A menudo es fácil llegar a la morbilidad de un estado mental, partiendo de síntomas físicos mórbidos.

Volviendo a nuestra niña además de numerosos síntomas mentales histéricos tiene violentas crisis de cólera, de rabia; grita hasta que su cara se pone violeta y se desmaya; humor áspero, peleadora, siempre apresurada, deja caer los objetos que tiene en la mano; gestos ridículos y quejas continuas; aprensiones, palpitaciones, temblores; angustiada; tiene miedo de morir, sólo habla de la muerte, aunque no tiene ninguna enfermedad seria; miedo de acostarse a la noche, por miedo a la muerte (Kent).

ENFERMEDADES EN QUE LOS SÍNTOMAS NERVIOSOS PREDOMINAN.

La enfermedad no sigue UN CURSO NORMAL; no cura y muestra síntomas graves que indican profunda depresión nerviosa.

SÍNTOMAS HISTÉRICOS E HIPOCONDRIACOS DE ORIGEN GENITAL.

ANSIEDAD HIPOCONDRIACA CON PALPITACIONES DE CORAZÓN (Lippe).

DEBILIDAD MAS ACENTUADA DURANTE EL REPOSO QUE DURANTE EL MOVIMIENTO (Lippe).

2) ESPASMOS HISTÉRICOS EN EL PECHO; BOLA HISTÉRICA; CONSTRICCIÓN NERVIOSA, SOFOCACIONES, SOBRE TODO DESPUÉS DE ENFRIAMIENTO.

PALPITACIONES NERVIOSAS CON DISNEA, POSTRACIÓN, DESFALLECIMIENTO y exclamaciones : "voy a morir".

MUY GRANDE EXCITACIÓN; Ríe DE MANERA INMODERADA, O CANTA, GRITA, RIÑE HASTA QUE SUS LABIOS SE PONEN AZULES, SUS OJOS INYECTADOS, CAE EN DESFALLECIMIENTO Y PIERDE EL CONOCIMIENTO (Nash).

Modalidades

Agravación

POR FRÍO, sensible al frío; los malestares sobrevienen cuando tiene frío.

Mejoría

Por el aire libre.

Por fricciones.

Síntomas mentales

HILARIDAD IRRESISTIBLE.

Gran distracción y ausencia de espíritu, a veces con palabras confusas.

Estado de preocupación durante el cual se habla a sí mismo y gesticula como si hubiera perdido la cabeza.

ÁSPERO, HUMOR EXCESIVAMENTE PELEADOR Y GRAN IRASCIBILIDAD, CON CRISIS DE ARREBATO QUE LLEGAN AL FUROR.

Ansiedad, angustia, palpitaciones; gemidos y lamentos por supuestos sufrimientos excesivos, sin que pueda decir donde está su mal; si se le pregunta se queja más violentamente, pero sin poder decir dónde le duele.

Temor de morir y miedo excesivo a la muerte.

Gran actividad con sensación de debilidad que hace que deje caer todo de las manos.

Sueño

GRAN DESEO DE DORMIR DE DÍA, con bostezos frecuentes y profundos.

DE NOCHE, INSOMNIO POR SOBREEXCITACIÓN DE SISTEMA NERVIOSO.

No puede estar mucho acostada en la misma posición, la parte sobre la cual reposa se pone rápidamente dolorosa, como si estuviese rota.

Cabeza

DOLORES DE CABEZA CON NAUSEAS Y VÓMITOS que obligan a acostarse; dolor de cabeza compresivo y aturdimiento, con dolor de presión, particularmente en raíz de nariz; sensación dolorosa como por cuerda anudada alrededor de la cabeza; dolor presivo y taladrante en la cabeza, COMO DE CLAVO, EN EL CEREBRO; dolor de cabeza histérico con abundante orina incolora, como agua.

Los dolores de cabeza mejoran abrigándose, pero en ciertos casos al aire libre.

Sensación de aturdimiento, como por embriaguez; vértigo y movimiento delante de los ojos, al menor movimiento de cabeza, mejorado al aire libre.

Vértigo con náuseas, vómitos y desvanecimientos.

Ojos

Fijos, brillantes, con una especie de aturdimiento y ausencia del espíritu.

Oscurecimiento súbito de la vista; vuelve bruscamente y luego súbitamente desaparece.

Oídos

Crujidos como causados por viento.

Sordera nerviosa por paroxismo o crisis de locura.

Cara

UNA MEJILLA ROJA Y FRÍA, LA OTRA PÁLIDA Y CALIENTE.

Calor en la cara a veces sin enrojecimiento y con mirada tierna.

Cara pálida con transpiración, tez terrosa.

Sensación de tensión en músculos de la cara como si fueran muy cortos.

Movimiento de mandíbula inferior como si masticara.

Aparato digestivo

BOCA Y GARGANTA :

Boca y garganta calientes y secas.

Gusto amargo, pútrido.

ESTOMAGO :

Deseo de café negro y estimulantes, aguardiente.

Aversión por los alimentos; al verlos náuseas.

Todo lo que come tiene mal gusto.

Hipos histéricos; hipo nervioso y espasmódico (HYDRYOC., ignat., sulph. ac., y cajaputum.).

Desfallecimiento mientras come; desmayos durante la comida.

Distensión de estómago.

Sensación de plenitud y molestia de estómago y región epigástrica, a veces con malestar, aumentada comiendo moderadamente.

Náuseas súbitas; náuseas que suben del epigastrio, con sensación de retracción de ombligo, y dolores calambroides.

Vómitos violentos sobre todo a la mañana y a menudo con dolores de estómago y pecho, con hinchazón de epigastrio.

Vómitos alimenticios prolongados.

Estómago fácilmente descompuesto.

Sensación de excoiación, de ardor de estómago después de comer.

ABDOMEN Y DEPOSICIONES :

Contracciones dolorosas espasmódicas en región umbilical, con paro de respiración.

Sensación de tensión en el vientre, como si la ropa le ajustara, con ansiedad que impide hacer todo trabajo o permanecer tranquila, le obliga a moverse sin cesar de un lado a otro.

Hinchazón; timpanismo; acumulación de flatuosidades.

CONSTIPACIÓN, SOBRE TODO DESPUÉS DE TOMAR CAFÉ.

DIARREA SOBRE TODO DE NOCHE; deposiciones involuntarias durmiendo; abundantes deposiciones líquidas durante la noche.

Aparato urinario

Abundantes emisiones de orina acuosa, límpida como agua, incolora.

La orina emitida de noche es maloliente y llena de mucosidades.

Órganos genitales

1) MASCULINOS : VIOLENTA EXCITACIÓN SEXUAL a veces con cosquilleos insoportables en las partes o dolores tensivos en el pene.

Emisiones de esperma, poluciones, sin erección.

2) FEMENINOS : En mujeres, la misma exaltación sexual violenta.

Reglas demasiado abundantes y precoces, con dolores tironeantes, pinchazos en órganos genitales y desmayos.

Sensación de tironeamiento hacia abajo en órganos genitales, durante reglas.

Fenómenos nerviosos, extremadamente cambiantes durante el embarazo.

Aparato respiratorio

1) NARIZ : Epistaxis.

Ilusiones de olfato.

2) LARINGE, BRONQUIOS Y PULMONES : Constricción espasmódica de laringe; verdaderas crisis de laringitis estridulosa en niñas de carácter fuerte, si se las contraría.

Espasmos de laringe por frío.

Constricción calambroidea y sofocación, en el pecho, sobre todo cuando toma frío.

Disnea y dolores presivos en el pecho, que llegan a parar la respiración.

Puntadas dolorosas en el pecho.

Espasmos en pecho y diafragma, en histéricas.

Parálisis amenazante de pulmones con rales mucosos e imposibilidad de expectorar.

Aparato circulatorio

Palpitaciones nerviosas; palpitaciones con opresión, agitación, desvanecimiento, y emisión abundante de orina clara como agua, absolutamente incolora.

El corazón parece temblar, pulso normal.

Espalda y extremidades

Dolores en miembros.
Inquietud en piernas que obliga a moverlas constantemente.
Movimientos convulsivos en manos y dedos.
Una mano pálida y ardiente, la otra, roja y fría.

Relaciones

Comparar

Nux mosch., asa fet., valer., ignat., castor.

Incompatibles

Ambra.

Antídotos

Camphora, coffea.

MURIATIS ACIDUM

O ácido muriático, o ácido clorhídrico, HCl, gas incoloro, esfumante al aire, de olor vivo y muy picante.

El agua disuelve 450 veces su volumen a 15º.

Ácido clorhídrico es una solución de este gas en proporción de 30 a 33 %.

Incoloro esfumante al aire, muy cáustico.

En contacto con sustancias orgánicas, las destruye y, unido al alcohol, forma una especie de éter; por eso las tres primeras dinamizaciones no se hacen con azúcar de leche ni alcohol.

Se prepara hasta la 3a., en agua destilada, y sólo a partir de la 4a. se usa alcohol común.

Acción general del medicamento

Actúa sobre EL SISTEMA NERVIOSO en que produce primero excitación considerable : enfermo irritable, mal humor, y sentidos muy agudos.

Luego, ESTADO DE DEPRESIÓN profunda que constituye la manifestación característica.

Tiene afinidad electiva con LA SANGRE cuya coagulación aumenta y tiende a desorganizarse, produciendo un estado parecido al de estados infecciosos graves, con temperatura elevada y gran postración.

DESCOMPOSICIÓN DE LÍQUIDOS HUMORALES.

Actúa sobre MUCOSA DE TUBO DIGESTIVO, particularmente BOCA Y ANO.

Características

1) GRAN DEBILIDAD, es generalmente tan grande, que el enfermo, extendido inconsciente e inerte, se desliza al fondo de su lecho : maxilar inferior caído; deposiciones involuntarias durante la micción; es el retrato de un estado tífico desesperado.

Al tratar una forma grave de fiebre infecciosa debemos pensar en ars. alb., phosph. ac., mur. ac.; con ars. alb., hay postración mental que precede a la física, con mur. ac., la postración física sobreviene primero y antes, estado de excitación física.

Se piensa en este último cuando hay gran debilidad muscular, con mandíbula caída, el enfermo se desliza en su lecho y hay deposiciones y micciones involuntarias : verdadera debilidad paralítica.

Lengua y esfínteres no tardan en paralizarse.

Ya no tiene conocimiento.

Antes, ha tenido un poco de agitación, pero mucho menos marcada que en ars. alb., o rhus tox.; no respondía a las preguntas, mientras que phosph.

ac., es lento en responder por agotamiento cerebral que le impide pensar (Kent).

2) SECRECIONES OFENSIVAS :Deposiciones y orina de olor pútrido (Kent).

Modalidades

Agravación

Por tiempo húmedo.

Síntomas mentales

Irritable, áspero, de mal humor.

Cabeza

Dolores de cabeza, como si el cerebro fuera triturado.

Dolor de cabeza agravado al mover los ojos o levantándose de su cama;mejora caminando lentamente.

Sensación de peso en región occipital.

Dolor de cabeza occipital con vista turbia, agravado haciendo esfuerzos para ver.

Dolor sordo en occipucio.

Entumecimiento en la frente.

Sensación como si los cabellos se le pusieran de punta.

Vértigo al cerrar los ojos, y acostándose del lado derecho; a veces asociado a enfermedad de hígado (Kent).

Ojos

Hemiopía vertical (aurum met.).

Escozor pruriginoso en ángulos de los ojos.

Puntadas dolorosas a través de los ojos.

Hinchazón y enrojecimiento de párpados.

Oídos

Sordera.

Fuertes ruidos de crujidos en la noche.

Tintineos, silbidos.

Agudeza de oído; el ruido de la voz humana le es insoportable.

Aparato digestivo

BOCA :

Labios secos, fisurados; pueden estar hinchados, rasgados, sangrantes.

MUCOSA BUCAL ULCERADA; AFTAS EN LA BOCA.

GRAN SEQUEDAD DE LA BOCA, aliento fétido.

LENGUA SECA, como cuero seco; parece disminuida en su dimensión normal; parece paralizada, pastosa.

PROFUNDAS ULCERACIONES DE LENGUA, de aspecto epiteliomatoso.

GARGANTA :

Inflamación violenta de garganta.

Sequedad.

Garganta ROJA OSCURA, CON ULCERACIONES DE MUCOSA.

Ulceraciones con falsas membranas.

Exudados BLANCOS GRISÁCEOS o blancos parecidos a falsas membranas de difteria.

Expectora mucosidades fétidas que vienen de la garganta.

Tratar de tragar provoca espasmos.

ESTÓMAGO :

Gran sed : gran sed durante los escalofríos, la fiebre, luego durante los otros estados no tiene sed.

No puede soportar la vista y aún el sólo pensar en carne.

(Arnica, alum., calc. carb., carb. veg., puls., sepia).

Desea estimulantes.

De vez en cuando apetito furioso y constante deseo de beber.

Espasmo de esófago (alum.).

Eructos amargos y pútridos.

Sensación de vacío de estómago, no mejora comiendo.

Sensación de vacío en estómago y vientre sin deseo de comer.

Sensación de vacío de estómago desde las 10 hasta la noche.

Vómitos agrios; debilidad de digestión.

ABDOMEN, RECTO Y DEPOSICIONES :

Sensación de vacío en el vientre, a la mañana, después de deposición normal, habitual.

Borborismo y sensación de plétora en el vientre.

Sensación de presión en el hígado que está doloroso e hipertrofiado.

PROLAPSO FÁCIL DE RECTO, (ignat., ruta, etc.); no puede orinar, eliminar gas o evacuar sin que se produzca.

HEMORROIDES HINCHADAS Y AZULES, EXTREMADAMENTE SENSIBLES AL TACTO, a tal punto que no puede soportar el papel más fino para asearse, ni el simple roce de su camisa.

Deposiciones oscuras, líquidas; o hemorrágicas, con sangre negra líquida; deposiciones involuntarias.

Aparato urinario

Vejiga débil; la orina pasa lentamente y está obligado a hacer tal esfuerzo que el recto sale; esto se relaciona con la debilidad muscular general del remedio.

No puede orinar sin evacuar al mismo tiempo.

Ardor y escozor en uretra al orinar, seguido por tenesmo.

Órganos genitales

1) MASCULINOS : Impotencia : deseo débil, casi ausente.

Escroto azulado; comezón de escroto, no mejorada por rascado.

Ulceraciones de prepucio.

Secreción acuosa, sanguinolenta, por uretra.

2) FEMENINOS : No puede soportar el menor contacto, ni el de las sábanas sobre órganos genitales (murex purp.).

Ulceración de órganos genitales con secreción pútrida.

Sensación de presión en órganos genitales, como si las reglas fuesen a venir.

Reglas prematuras y demasiado abundantes; durante las reglas, ano doloroso.

Leucorrea con dolor de espaldas.

Aparato respiratorio

Hemorragia nasal con coqueluche y fiebres infecciosas.

Sangre oscura y de olor pútrido, que corre por la nariz.

Disnea; respiración rápida con rales en el pecho, después de beber, o aumentada después de beber.

Aparato circulatorio

Pulso rápido, débil, pequeño; intermitencia cada 3a. pulsación.

Espalda y extremidades

Sensación de ardor en columna vertebral.

Sensación de presión, tirón, fatiga, abajo de la espalda.

Sensación de tirones en miembros, mejorados por movimiento.

Sensación de pesadez en brazos.

Entumecimiento y sensación de frío en dedos, de noche.

Sensación de ardor en palma de manos y planta de pies.

Debilidad y pesadez de miembros inferiores.

Dolores en tendón de Aquiles (actea rac.).

Marcha vacilante.

Piel

Erupciones papulosas y vesiculosas, con gran comezón (rhus tox).

Forúnculos; ulceraciones de olor ofensivo y rebordes ardientes, en piel de miembros inferiores.

Piel lívida, petequias, erupción escarlatiniforme poco marcada; con estado infeccioso grave.

Fiebre

De tipo tifoideo grave, con gran debilidad; extremidades frías; estado de calor sin sed, pero sed durante el escalofrío; pulso rápido y débil; postración extrema.

Transpiración durante el primer sueño; durante la transpiración, los síntomas se agravan.

Relaciones

Antídoto

Bryonia.

Cura la debilidad muscular por abuso de OPIO o tabaco.

Viene bien después de bryonia, merc., rhus tox.

NAJA TRIPUDIAN

O serpiente con anteojos, o Cobra Capello, reptil ofidio colubriforme que se encuentra entre los más venenosos.

A veces de talla considerable, se lo encuentre en regiones cálidas de África, Asia, Ceylán, Malasia.

Utilizamos su veneno, retirando directamente de las bolsas especiales que lo encierran.

Acción general del medicamento

La acción de naja es idéntica a la de los venenos de serpiente en general, pero con la diferencia que los síntomas nerviosos son más marcados que los hemorrágicos o infecciosos; predomina la acción sobre NEUMOGÁSTRICOS.

Por su intermedio, y probablemente por su acción sobre los nervios del corazón, provoca síntomas en este órgano que constituyen su principal característica.

Características

TRASTORNOS CARDIACOS CON PALPITACIONES Y SENSACIÓN PENOSA EN REGIÓN DEL CORAZÓN : TOS CARDIACA seca, irritante, sacudida, agravada por el menor esfuerzo, durante afección cardíaca aguda de origen reumático o durante afección crónica de corazón.

Modalidades

Lateralidad

Los síntomas van de IZQUIERDA A DERECHA, como la.

Agravación

a) Después del sueño.

b) Por tiempo húmedo.

c) Acostado sobre la izquierda; caminando.

d) Por uso de estimulantes.

Mejoría

Caminando suavemente al aire libre.

Síntomas mentales

PEREZA EXTREMA MENTAL.

Muy afectado por su estado, se atormenta en exceso por la impotencia de su voluntad para salir adelante; medita constantemente en males imaginarios.

Locura suicida (aur. met.).

Fácilmente excitable.

Sueño

Profundo, con respiración ruidosa, como en otros venenos de serpiente.

Cabeza

Dolor en sien y región orbitaria izquierda, que se extiende al occipucio, con náuseas y vómitos.

Dolores de cabeza congestivos, sobre todo, en occipucio, con pulso rápido y nervioso.

Despierta con dolor de cabeza.
 Aparato digestivo
 Inflamación pronunciada de amígdalas.
 Disfagia espasmódica o paralítica.
 Sensación de cuerpo extraño, como tapón en esófago.
 Aparato circulatorio
 Esta es su gran esfera de acción.
 Sus síntomas cardíacos se parecen mucho a lach., pero corresponden de manera más marcada a los EFECTOS LEJANOS DE ANTIGUA LESIÓN VULVAR, mientras lach. conviene más a síntomas de enfermedad de corazón que comienza, por ej., ataque de reumatismo articular agudo.
 Debilidad cardíaca (sensación de debilidad de corazón : Nux vom.) con amenaza de síncope o desfallecimiento de corazón.
 PALPITACIÓN DE CORAZÓN; palpitaciones nerviosas crónicas; palpitaciones después de cualquier esfuerzo; palpitaciones nerviosas con imposibilidad de hablar porque se sofoca.
 LAS PALPITACIONES SE AGRAVAN SI SE ACUESTA SOBRE LA IZQUIERDA O CUANDO CAMINA.
 Dolor sordo, continuo, de espalda, entre los hombros, asociado a afecciones cardíacas; a veces no hay otros síntomas, fuera de este dolor, sensación de calor entre los hombros.
 Dolor punzante en región del corazón que irradia al brazo; angina de pecho.
 Pulso de fuerza irregular.
 Con los síntomas cardíacos, dolor de cabeza en frente y occipucio.
 ES EL REMEDIO MÁS ÚTIL EN ENFERMEDADES DE CORAZÓN CON POCOS SÍNTOMAS CARACTERÍSTICOS.
 Aparato respiratorio
 Muchos estornudos con secreción abundante de líquido acuoso por nariz.
 Gran sequedad de mucosa nasal; no puede respirar de noche.
 Sensación de desolladura en laringe y tráquea; vías respiratorias en carne viva, como desolladas.
 Congestión de pecho; no puede acostarse del lado izquierdo.
 Tos seca, irritante, relacionada con afección de corazón. (Spong., laurocerasus).
 Asma cardíaca.
 Asma que comienza en coriza; "hay-fewer".
 Asma que comienza a la mañana.
 Disnea cardíaca.
 Despierta sobresaltado y sofocado; disnea al dormirse.
 Órganos genitales
 Neuralgia de ovario izquierdo; dolor vivo en región de ovario izquierdo.
 Cuello, espalda y extremidades
 Extremidades frías y azuladas, cabeza caliente.
 Sudor abundante de manos y pies, sin mal olor.
 Sensación de plétora en manos y piel, que muestra lentitud de circulación.

NATRUM CARBONICUM

Carbonato de soda, una de cuyas variedades es bicarbonato de soda.
 Se presenta con aspecto de cristales incoloros, transparentes, solubles en agua, insolubles en alcohol y cáusticos en grado muy débil.
 Se encuentra en la naturaleza, particularmente en Egipto, donde abunda, en un valle llamado "Lagos de Natron"; cristaliza en el agua de esos lagos por evaporación natural del agua.
 Se encuentra también en vegetales de costas marítimas de Francia donde se prepara por incineración de esos vegetales cuyas cenizas se venden con el nombre de soda artificial.
 Preparamos las tres primeras dinamizaciones por trituración Hahnemanniana, las más elevadas, por diluciones sucesivas.
 Acción general del medicamento
 Actúa de manera muy neta sobre SISTEMA NERVIOSO al que deprime.
 Como kali carb., a dosis no tóxicas pero muy continuadas, empobrece LA SANGRE que toma aspecto parecido a jugo de cerezas, cuyo coágulo pierde firmeza y elasticidad normal, el número de glóbulos rojos disminuye, los leucocitos y el suero aumentan.
 ORINA menos ácida y si la dosis es suficiente, se hace alcalina y en ese caso, más abundante; el contenido *desuero* disminuye progresivamente.
 Pero ejerce su mayor influencia sobre MUCOSAS.
 Determina violenta inflamación catarral que puede llegar a formación de pequeñas ulceraciones.

Esta acción puede atacar todas las mucosas, pero en realidad, su lugar electivo de acción está en las DE TUBO DIGESTIVO.

Características

CONSTITUCIÓN Y TIPO : Desarrolla particularmente su acción en sujetos rubios de "temperamento leucoflemático", con hombros caídos, que tienen horror por todo esfuerzo físico o mental, friolentos, pero no soportan más el calor que el frío : deben vivir en clima medio.

Viejos dispépticos, que eructan sin cesar, ardores de estómago, reumatismo; cuanto más bicarbonato de soda toman, más flatulentos son, más penosas son sus digestiones : al cabo de cierto tiempo no pueden soportar leche que los asquea y provoca diarrea.

Antiguos dispépticos que eructan continuamente, tienen ardor de estómago, con trastornos reumáticos; agobiados, pálidos, friolentos, agravados por la menor corriente de aire; necesitan estar muy abrigados; incapaces de resistir el frío, lo mismo que el calor, necesitan clima templado, el cambio de tiempo los agrava : sus trastornos digestivos, dolores reumáticos, empeoran siempre por cambio de tiempo.

El menor ruido los sobresalta; tienen excitación nerviosa con palpitaciones por la menor cosa y gran postración.

El menor ruido, una puerta que se golpea, simple roce de papel, provoca irritación, palpitaciones, melancolía.

Se aleja de familia y amigos; tiene real aversión por la especie humana (Kent).

Modalidades

Mejoría

Por movimiento.

Agravación

a) POR TRABAJO MENTAL : incapaz de pensar o hacer el menor trabajo cerebral sin tener dolor de cabeza (arg. nit., sabad.), sin tener vértigos, o real sensación de estupor.

b) POR CALOR.

Sobre todo EL DEL VERANO, DEL SOL; PERO TAMBIÉN POR FRÍO : los remedios de insolación aguda son sobre todo bell., lach., glon., o acon.; nat. carb., es sobre todo crónico, apropiado en insolación o dolores de cabeza crónicos con sensación de plenitud y vértigo que contraen ciertos niños en la escuela al trabajar con luz de gas.

Muy sensible al calor sobre todo después de insolación aún unos años después; está obligado a cuidarse del sol; en verano busca los sitios con sombra o frescos; generalmente no ha recibido el remedio conveniente en el momento de la insolación.

Los malestares de cabeza, agravados por calor, no lo son por frío, pero los del resto del cuerpo lo son en invierno y por frío; tiene frío como si no tuviera ya sangre en el cuerpo; extremidades heladas hasta codos y rodillas y no puede calentarlas.

CUERPO Y EXTREMIDADES SON FUENTE DE MALESTARES EN INVIERNO, LA CABEZA EN VERANO (Kent).

c) Estando sentado.

d) Por tormentas.

e) POR LA MÚSICA; provoca melancolía, llanto, temblores (Kent); después de tocar el piano está tan agotado que debe acostarse; la música provoca gran tristeza que aumenta hasta llegar a locura religiosa o determinar verdadera tendencia suicida.

Síntomas mentales

Como todas las sales de soda DEPRESIÓN Y DEBILIDAD CEREBRAL.

GRAN DISGUSTO POR TRABAJO CEREBRAL, que es incapaz de cumplir; debilidad de memoria extrema : antes de terminar una frase ha olvidado el principio; si hace una suma no puede terminarla.

Es un salvaje, no quiere ver a nadie, aversión por sociedad, parientes (sepia).

No se controla, no puede dominar sus impresiones.

En general, sentidos trastornados e hiperestesiados; el menor ruido los hace sobresaltar y temblar; el simple roce de un papel (asarum); la música provoca melancolía, llanto, descorazonamiento que puede llegar a deseo de suicidio; no soporta luz brillante; el menor ruido le parece enorme; cosas que antes le eran agradables se le hacen penosas.

En un estado parecido a nux vom. pero en éste, esta hiperestesia resulta de gran sobreexcitación nerviosa, en nat. carb. la sensación parece demasiado violenta porque no la puede soportar a causa de su gran debilidad.

Cabeza

Cefalea por el menor ejercicio mental, el sol, o trabajo a la luz de gas.

Un lavado con agua caliente despierta o aumenta los dolores.

Sensación como si su cabeza fuese demasiado grande.

Cara

Pálida, HINCHADA, ojeras pálidas y manchas amarillas en la frente.

La hinchazón es síntoma general en manos y pies, en éstos es muy neta, los dedos dejan la marca después de la presión.

Este síntoma muestra su indicación en ciertas afecciones renales o cardíacas que producen tal edema.

Aparato digestivo

BOCA :

Encontramos aquí buena parte de las características de borax (Biborato de soda).

Desde el punto de vista nervioso, los dos remedios se parecen bastante : niños nerviosos, delgados, friolentos, todo lo sobresalta, al dormirse tiemblan, gritan y se aferran a la madre.

En la boca de nat. carb., erupción vesiculosa en borde de lengua y sobretodo bajo la lengua, en el frenillo que es sitio de predilección del remedio; la vesícula deja, una vez reventada, pequeña ulceración parecida a afta de borax.

Lengua seca, saburral, a veces gruesa, pesada, hablar difícil (lach., mur. ac.).

Gusto amargo, (puls., nux v., ars.) y metálico (merc., sulph.).

GARGANTA :

Catarro crónico de nariz; se extiende hasta fosas posteriores, naso faringe y garganta.

Violento gorgajeo y expulsa mucus espeso que se forma sin cesar (coralium).

Acumulación de mucus amarillo espeso, viscoso en garganta y rino farinx; nat. mur., síntoma parecido, pero mucus blanco.

ESTOMAGO :

SED INTENSA DE BEBIDAS FRÍAS, ALGUNAS HORAS DESPUÉS DE LAS COMIDAS, CON MALESTAR DESPUÉS DE BEBER.

Malestar y trastornos después de beber agua fría cuando tenía calor.

HAMBRE VORAZ, SOBRE TODO A LAS 11 Y A 17, CON SENSACIÓN DE VACÍO EN HUECO DEL ESTOMAGO, ALIVIADA COMIENDO.

Si la comida puede producir síntomas gástricos dolorosos, alivia la mayoría de síntomas generales, de tal suerte que Kent indica ESTA MEJORÍA POR COMIDAS como modalidad general : cefalea, friolidad, palpitaciones, dolores fulgurantes que simulan los del Tabes, mejoran por comidas (anac.).

Está obligado a LEVANTARSE A LAS 5 PARA COMER (phosph., psor. mujeres encintas que no se pueden volver a dormir de noche sino después de comer algunos bocados).

AVERSIÓN POR LECHE; el niño de nat. carb., no puede soportar ninguna clase de leche : provoca vómitos y diarrea, prospera comiendo cereales.

Su acción, a la vez irritante y paralizante, se manifiesta en el estómago y a todo lo largo del tubo digestivo.

DEBILIDAD DE DIGESTIÓN evidente : Pesadez, malestar, pesadez en epigastrio después de comer, náuseas constantes, pirosis : todos los síntomas banales de digestión lenta por insuficiencia secretoria y motriz del estómago.

Muy deprimido después de comer.

ABDOMEN Y DEPOSICIONES :

Como el estómago, abdomen doloroso y perezoso.

Es zona de toda clase de dolores, sin grandes características, la mayoría causados por gases, y que hace de nat. carb. un remedio FLATULENTO como lycop. o carb. veg., etc.

La tristeza o hipocondría agravadas por comidas mejoran a medida que la digestión avanza y los alimentos franquean el duodeno.

LA CONSTIPACIÓN, es característica : DEPOSICIONES DURAS, MARRONES, COMO DEPOSICIÓN DE OVEJA, SE DESHACEN EN PEQUEÑOS PEDAZOS Y SON MUY DIFÍCILES DE EXPULSAR : siente necesidad pero no puede hacer esfuerzos.

DIARREA particular CON NECESIDAD IMPERIOSA, A VECES DEPOSICIONES INVOLUNTARIAS (aloe) EXPULSADAS EN UN SOLO CHORRO, CON GRAN ESTRÉPITO, lo que provoca a veces violenta conmoción de abdomen.

En ciertas mujeres, en la menopausia deposiciones con desechos amarillos parecidos a trozos de cáscara de naranja; la diarrea se agrava o es provocada por leche.

Aparato urinario

Necesidad de orinar frecuente e imperiosa, a veces sin aumento de cantidad; otras, orina abundante y clara.

Poliuria nocturna (lycop.) Incontinencia en niños.

Orina de olor agrio (sepia) fétida como la de caballo, este último síntoma es a veces menos marcado que en (nit. acid.).

Órganos genitales

Hay poco de notable en cuanto a síntomas orgánicos : algunos dolores a la presión, tirones en testículos y cordón, inflamación de prepucio y glánde, hipersecreción particular de esperma, excoriación de mucosa entre glánde y prepucio.

La función genital es más netamente alterada : EXCITACIÓN AL PRINCIPIO y probablemente como efecto primitivo, A CONTINUACIÓN PARÁLISIS.

AL principio apetito sexual muy exaltado; erecciones continuas sobre todo al despertar con gran deseo de coito.

Luego síntomas de debilidad sexual muy acentuados : poluciones nocturnas que dejan debilidad e irritabilidad; erecciones fugaces; eyaculaciones muy rápidas; transpiración después del coito.

Secreción de líquido prostático al fin de la micción o al expulsar deposición difícil.

Clarke dice que en la esfera genital interna de la mujer, el vecino más próximo a nat. carb. es sepia.

Tiene muchos síntomas comunes : en estómago, por ej., el mismo asco por leche que da diarrea; sensación de vacío y desfallecimiento con deseo de comer a las 11.

Ambos agravados por la música.

Pero ambos tienen en bajo vientre SENSACIÓN DE PRESIÓN COMO SI LOS ÓRGANOS DE LA PELVIS PRESIONASEN HACIA ABAJO, SOBRE PARTES GENITALES EXTERNAS, COMO SI ESTUVIERAN PESADOS, CONGESTIONADOS Y LAS REGLAS QUISIERAN VENIR.

Movimiento como de feto en útero.

ESTERILIDAD.

Parece facilitar la concepción escribe Clarke, sea constitucional o debida a un síntoma del que hablaremos más abajo.

Kent hace un buen cuadro de la mujer de nat. carb. : nerviosa, con frío en rodillas y codos; cuerpo frío en invierno y cabeza caliente en verano; siempre fatigada, inquieta, excitable, delgada, dispéptica, no histérica sin embargo.

Un fenómeno que se encuentra en ella, y favorece la esterilidad es : espasmos o al contrario, atonía de esfínter vaginal, que hace que después del coito un coágulo de sangre o una ola de mucus salga de la vagina con ruido.

Leucorrea profusa, espesa, amarillenta, fétida, peor orinando o después de micción.

Reglas adelantadas o atrasadas, precedidas de dolor de cabeza o epigastrio; con cefalea latente, dolor de riñones de día solamente, abatimiento con náuseas y asco.

Aparato circulatorio

Varias veces en el día, sensación de "ruidos" en el corazón.

Palpitaciones violentas con angustia, ansiedad, particularmente subiendo escaleras, o de noche, acostándose sobre la izquierda.

Aparato respiratorio

1) NARIZ : Sin cesar resfriado; el período agudo de coriza dura poco; enseguida secreción de mucus purulento, amarillo, viscoso, que obstruye la nariz y obliga a dormir con boca abierta.

Luego costras amarillas se forman en la nariz y son expulsadas con dolor y a menudo hemorragia nasal.

A cada enfriamiento el coriza crónico se agrava y llega a ozena.

EL COLOR AMARILLO Y LA VISCOSIDAD DEL MUCUS constituyen una característica de sus secreciones; habrá que diferenciar aquí puls. y kali sulph., cuyo color de secreción mucosa tira más al verde, y kali bichr.

La naturaleza de esas secreciones mucosas se encuentra no solamente en la nariz, sino en ojos, vagina, uretra, etc.

2) BRONQUIOS Y PULMONES : Catarro continuo que el más ligero enfriamiento agrava y no mejora cuando transpira.

Tos seca, peor yendo del frío al calor, como bryon., que también tiene ronquera, dolor de pecho, y tos dolorosa.

Esp tos espesas, verdosas, purulentas, de gusto salado (lycop.).

Disnea provocada por sensación de tensión en el pecho.

Asma matutina, asma con viva excitación de apetito venéreo.

Espalda y extremidades

Rigidez de cuello, con crujidos de articulaciones, de vértebras cervicales cuando gira la cabeza.

Hinchazón de ganglios de cuello.

Bocio doloroso con sensación de presión.

Muchos dolores de espalda, de arriba a abajo.

Violento lumbago después del paseo.

Dolores reumáticos en miembros que parecen como en rhus tox., peor por reposo y mejorados por movimiento.

Pero la característica de nat. carb. aquí es SENSACIÓN DE DEBILIDAD, RETRACCIÓN, CONTRACCIONES SACUDIDAS CON ACORTAMIENTO DE TENDONES (caust., nat. mur.).

Debilidad de tobillos que se tuercen fácilmente en niños (sulph.

ac., caust., nat. mur., sulph.).

Edema de manos y pies.

Relaciones

Antídotos

Ars. alb., camph.

Complementarios

Viene bien después de sepia, en sensación de "bearing down".

NATRUM MURIATICUM

O Cloruro de Sodio (Na.Cl.) es la vulgar sal de cocina.

Abunda en la naturaleza.

Es un medicamento muy potente cuando, por los procedimientos de dinamización se ponen en libertad sus propiedades.

Se presenta en forma de cristales cúbicos, transparentes, generalmente incoloros; muy solubles en agua y en glicerina, insoluble en alcohol absoluto y muy poco soluble en alcohol a 95°.

Las 3 primeras dinamizaciones se hacen por trituración y las siguientes por dilución hahnemanniana.

Acción general del medicamento

Nat. mur. forma parte integrante de nuestro organismo donde juega un rol preponderante MANTENIENDO EL EQUILIBRIO OSMÓTICO DE LOS LÍQUIDOS ORGÁNICOS.

Es la SAL VITAL POR EXCELENCIA, LA QUE REGULA LA IMBIBICION EN AGUA DEL PROTOPLASMA Y LOS NÚCLEOS CELULARES Y LE PERMITE ASIMILAR O CONSERVAR TODAS LAS OTRAS SALES (Dr. Mouezy-Eon).

Interesa profundamente la NUTRICIÓN GENERAL alcanzado al organismo al punto de dificultar la ASIMILACIÓN y aumentar la DESASIMILACION; corresponde de manera neta a desnutrición, adelgazamiento, anemia, clorosis, escorbuto.

Un trastorno en el equilibrio molecular intracelular de nat. mur. determina empobrecimiento de sangre, el cloruro de sodio regula la cantidad de agua contenida normalmente en el suero sanguíneo y sobre todo los glóbulos cuya forma y consistencia mantiene; si la cantidad de moléculas de esta sal es deficiente hay alteración de sangre y todos los líquidos humorales, alteración escorbútica que produce discrasia particular.

Una perturbación de este equilibrio molecular de nat. mur. en el organismo explica su acción sobre MUCOSAS, en las que se encuentra en el desarrollo de los síntomas de su patogenesia.

Puede también provocar ESTADO CATARRAL secundario caracterizado por FLUJO EXCESIVO DE MUCUS DE CONSTITUCIÓN NORMAL.

Cada vez que encontremos secreción abundante de mucus normal, claro, nat. mur. estará indicado : "CATARRO MUCOSO CON SECRECIÓN MUCOSA ANORMAL POR SU CANTIDAD MAS QUE POR SU CALIDAD" (Nash).

LA PIEL es lugar de elección donde se encontrarán consecuencias patogenéticas de perturbación intra orgánica del desequilibrio molecular del cloruro de sodio.

Particularmente las GLÁNDULAS SEBÁCEAS que sufren estimulación de podersecretor, como todas las glándulas en general.

La piel toma entonces apariencia especial : se hace GRASOSA y por esta hiperactividad de glándulas sebáceas que la predisponen a diversas causas de infección que vienen del exterior, hay formación de ACNÉ particularmente en la cara, alas de nariz, línea de implantación de cabellos, frente, es decir donde las glándulas sebáceas son más numerosas.

EL SISTEMA NERVIOSO no escapa a perturbaciones provocadas por trastorno de la acción necesaria del cloruro de sodio en el organismo; se puede decir de manera general que está DEPRIMIDO : Nat. m. PRESENTA ESTADO DE DEPRESIÓN MUSCULAR, FÍSICA y MENTAL.

Características

1) CONSTITUCIÓN Y TIPO : Desarrolla particularmente bien su acción EN INDIVIDUOS FLACOS, ADELGAZAN AUNQUE COMEN BIEN.

ESTE ADELGAZAMIENTO ES MAS MARCADO EN EL CUELLO.

SE AGOTAN POR EL MENOR EJERCICIO FÍSICO O MENTAL Y PARECEN COMPLETAMENTE ABATIDOS SOBRE TODO A LA MAÑANA : esta debilidad al principio de la mañana puede ser muy marcada, y es característica.

REPRESENTA EL TIPO MUSCULAR DÉBIL, RETRAÍDO, LINFÁTICO BILIOSO :al mismo tiempo que músculos, pueden tener proporciones corporales bastante armoniosas, pero con alteraciones patológicas más o menos disfrazadas (Dr. D'Espiney).

Tipo muscular debilitado en quien trazados de células linfáticas por aquí y por allá, se organizan poco a poco en depósitos fibrosos que cubren los tejidos y dificultan su desarrollo y funcionamiento, acribillándolos de puntos dolorosos, sensibles al tacto (Mouezy-Eon).

Personas caquéticas o muy delgadas cuyo adelgazamiento es más marcado en el cuerpo, especialmente en el cuello que en la cara.

Piel amarillenta, pálida, terrosa, llena de granitos de cabeza negra, de aspecto sucio que no desaparece con ningún lavado; grasosa, como aceitosa, sobre todo la frente, alrededor del cuero cabelludo, donde se desprende como caspa, se cubre de costras.

Cabello seco, blando, frágil, tiende a caer sobre todo en frente y temporales.

Ojos débiles, enrojecidos, irritados, principalmente ángulo externo, guiñan a la luz y lagrimosos.

La nariz segrega fácilmente, alas hinchadas, excoriadas, labios secos, agrietados, fisurados, ulcerados, costrosos, a menudo hinchados, pálidos, con granos de herpes; acné salpicado en mentón, y alrededor de labios; grieta muy marcada sobre labio superior.

Cuello adelgazado, costillas muy visibles, omoplatos salientes, con agobiamiento y curvatura hacia adelante de columna vertebral.

Vientre poco voluminoso, retraído, globuloso en región hipogástrica donde el intestino tiene tendencia a caer.

Latidos aórticos fácilmente perceptibles.

En las manos, pequeñas pieles secas se levantan alrededor de las uñas, piel seca y agrietada.

Brazos y piernas de proporciones bastante armoniosas, llaman la atención por flacos, por aflojamiento de masas musculares; miembros inferiores fácilmente varicosos, edematosos en tobillos que se tuercen fácilmente; además son agitados con inquietudes.

Pies secos, sin transpiración, sufren de callos e hinchazón roja de dedo grande.

La actitud de nat. m. es de malestar, sufrimiento; se ve que sufre de tirones, rigidez de tendones, puntos dolorosos en todas partes, por crisis sanguínea defectuosa; se han formado en los músculos a lo largo de trayectos nerviosos, depósitos de células linfáticas que se organizan poco a poco en tejido fibroso y llegan a constituir numerosos nódulos de celulitis.

Nat. m. sufre sobre todo en sus aparatos de transmisión y conducción (Dr. d'Espiney).

AGOTAMIENTO CIRCULATORIO muy marcado; se traduce en HIPERESTESIA CARDIACA marcada, con PALPITACIONES violentas y DESAGRADABLE SENSACIÓN DE LATIDOS en todo el cuerpo, que aparecen espontáneamente por la más pequeña emoción o el mínimo esfuerzo.

2) ESTADO MENTAL :Torpe, apresurado, IRRITABLE, SE APASIONA SIN RAZÓN.

El estado de PROFUNDA DEPRESIÓN MORAL Y FÍSICA es su sello distintivo.

LLORA SIN CESAR Y EL CONSUELO AGRAVA SU PENA.

Busca LA SOLEDAD para solazarse en su dolor.

No duerme de noche por no dejar de pensar.

FALTA DE CONTINUIDAD MENTAL; olvida las palabras, a causa de su obsesión latente.

Sus acciones son contradictorias y en desacuerdo con sus pensamientos.

Es así en una JOVEN VÍCTIMA DE UN AMOR QUE NO PUEDE CONTROLAR por una persona indigna de ella (Dr. Mouezy-Eon).

Nat. m. llora sin cesar, como puls., la única diferencia es que puls. se reconforta por el consuelo, y lo busca, a nat. m. lo agrava y le huye; triste, lloroso, hipocondríaco, pero sobre todo se agrava por el consuelo que lo pone furioso.

Eso no debe sorprender pues, además de su melancolía, es excesivamente irritable y monta en cólera por una bagatela.

Sepia se parece más a nat. m. que puls. en el sentido que sepia y nat. m.

tienen gran depresión mental combinada con tendencia fácil a montar en cólera y ser vehementes : ambos tienen "odio de indio" contra lo que los contrarían, son complementarios uno de otro y un síntoma mental para diferenciarlos es la indiferencia marcada de sepia por las cosas de su interior (Farrington).

Modalidades

Lateralidad

Indiferente.

Agravación

a) POR CONSUELO b) POR TRABAJO MENTAL y hablando c) Por calor; por el calor del sol o estufa d) A LAS 10 DE LA MAÑANA e) Al borde del mar.

f) POR QUININA, nat. m. produce y cura caquexia como por largo abuso de quinina.

Mejoría

a) AL AIRE LIBRE b) LAVÁNDOSE CON AGUA FRÍA Y POR BAÑOS FRÍOS c) Acostándose sobre la derecha d) Durante las comidas regulares

Síntomas mentales

Nat. m. presenta GRAN DEPRESIÓN MENTAL, que lo hace TRISTE Y MELANCÓLICO, SENSACIÓN MARCADA DE DESESPERACIÓN cuando piensa en el porvenir y todo que le concierne.

GRAN ABATIMIENTO DE ESPÍRITU.

GRAN TENDENCIA A LLORAR. (Puls.).

Llora sin razón y MAS TODAVÍA SI SE TRATA DE CONSOLARLO; TRISTEZA, MELANCOLÍA, LAGRIMAS SE AGRAVAN POR CONSUELO.

Deprimido, moroso, taciturno, hipocondríaco, apático, indiferente , BUSCA LA SOLEDAD por temor, para huir del consuelo y poder pensar sin que nadie distraiga su tristeza.

LA DEPRESIÓN, EL CARÁCTER TRISTE Y DESANIMADO Y LA DEBILIDAD INTELECTUAL, falta de atención, distracción, dificultad para pensar, pérdida de memoria, son SOBRE TODO MARCADAS EN ENFERMEDADES CRÓNICAS a las que conviene el remedio.

MELANCOLÍA DE LA PUBERTAD.

IRRITABILIDAD EXTREMA QUE LO HACE MONTAR EN CÓLERA POR NADA, por una bagatela; NO PUEDE SOPORTAR LA CONTRADICCIÓN. (Sepia).

Sueño

Constante Y EXCESIVA NECESIDAD DE DORMIR DURANTE EL DÍA, SOMNOLIENTO, SOBRE TODO A LA TARDE.

A LA NOCHE SE DUERME TARDE : sus preocupaciones y penas le impiden dormirse temprano. (Ignat., phosph. ac.).

Este sueño tardío es AGITADO.

LLENO DE SUEÑOS Y PESADILLAS ANGUSTIOSAS que lo hacen LLORAR DURMIENDO.

Sueña que hay ladrones; en la casa, etc., con fuego, asesinos, ladrones; sonambulismo.

SI DESPIERTA, NO PUEDE VOLVERSE A DORMIR, queda despierto horas enteras.

INSOMNIO CON AGITACIÓN INUSITADA.

SACUDIDAS NERVIOSAS mientras duerme.

Sed, de noche; dolores en la espalda, dolores nerviosos, micciones frecuentes casi todas las horas.

A LA MAÑANA, AL DESPERTAR, FATIGADO, a pesar de haber dormido bien su sueño no ha sido reparador.

Cabeza

DOLOR DE CABEZA LATENTE.

Nat. mur. es uno de NUESTROS MEJORES REMEDIOS PARA DOLORES DE CABEZA CRÓNICOS.

Vienen por crisis y causan VIOLENTOS DOLORES LATENTES; se podría pensar en bell., pero nat. m. afecta más a sujetos anémicos, de cara pálida o poco coloreada.

Para tal dolor de cabeza latente con cara roja y ardiente, ojos muy inyectados en sangre, bell., mel. alba o nux vom., los otros síntomas concomitantes, deberá ayudar a decidir entre los tres.

CEFALEA CON DOLORES COMO SI MIL MARTILLOS PEQUEÑOS LE GOLPEASEN EL CEREBRO O EL CRÁNEO, EMPIEZA A LA MAÑANA AL DESPERTAR Y PERSISTE DURANTE EL DÍA; SOBRE TODO ENTRE SALIDA Y PUESTA DE SOL; PRINCIPALMENTE DURANTE REGLAS, COMO SI FUESE RESULTADO DE LA PERDIDA DE SANGRE.

China en circunstancias semejantes tiene dolor de cabeza latente, pero está indicado cuando la pérdida menstrual ha sido extremadamente abundante, casi hemorrágica; en nat. m. el dolor de cabeza sobreviene haya o no sido abundante la pérdida menstrual.

Por la cefalea latente de nat. m. que se caracteriza por MANIFESTARSE PARTICULARMENTE DE LA SALIDA A LA PUESTA DEL SOL Y DESAPARECE con esta última, comparar a gels., glonoine, sang. y spig.

CEFALEA DE LOS ESTUDIANTES : la elección puede ser difícil entre nat. m. y calc. phos., que tienen dolor de cabeza parecido con gran anemia.

Los dolores de cabeza de nat. m., son a menudo causados por FATIGA DE LOS OJOS, por largas horas de estudio, fino trabajo de aguja, etc.

Va acompañado de astenopia y se puede comparar a nat. mur. con arg. nit.

y ruta grav.

DOLOR DE CABEZA ENCEGUECEDOR (kali bichr., silic., gels.) Dolor de cabeza con constipación por pereza y sequedad de mucosa intestinal; con lengua limpia o cubierta de saliva espumosa.

Dolor de cabeza de escolares durante reglas con ardor en la coronilla.

La jaqueca con vómitos encuentra a veces su simillimum en nat. mur.; dolor de cabeza con vómitos de mucus claro, acuoso, SIENTE SU CABEZA MUY GRANDE, FRÍA (calc., lauroc., podoph).

VÉRTIGOS CON TRASTORNOS DE VISTA, peor por movimiento y levantándose de la posición acostada.

ERUPCIÓN PRURIGINOSA EN BORDE DE CUERO CABELLUDO, en límite de implantación de cabellos, en frente y nuca.

Caspa, pequeñas escamas secas en cuero cabelludo, a veces con hipersecreción de mucus normal, por boca, nariz u ojos.

Abundante caída de cabello.

Cara

Los síntomas de la cara son muy importantes porque muchos forman un conjunto característico muy útil para la elección.

TERROSA, PÁLIDA O AMARILLENTA, SALPICADA DE GRANOS DE ACNÉ.

PIEL DE ASPECTO GRASOSO Y SUCIO QUE NO DESAPARECE CON NINGÚN LAVADO; parece brillante como si hubiera sido engrasada.

Thuya también tiene piel de cara aceitosa y grasosa, particularmente en surcos nasogéminos; labios blancos, como si no los hubiese limpiado después de tomar leche, cosa que no tiene nat. mur.

Otros remedios con piel aceitosa y grasa : plumb., selenium, y psor.

En nat. mur. (como en psor. solamente) ES LA PIEL DE LA FRENTE LA QUE LLAMA LA ATENCIÓN POR SU ASPECTO PARTICULARMENTE GRASO; HAY MUCHA ABUNDANCIA DE GRANOS, CASPA, ERUPCIONES VARIADAS, SOBRE TODO EN LÍMITE DE IMPLANTACIÓN DE CABELLO que es débil, frágil y tiende a caer en frente y temporales.

OJOS FÁCILMENTE ROJOS, IRRITADOS, los frota a menudo para "aclarar la vista".

Las lágrimas aparecen fácilmente sobre todo cuando ríe.

LA NARIZ SEGREGA FÁCILMENTE, LAS ALAS ESTÁN A MENUDO HINCHADAS,

EXCORIADAS, PUSTULOSAS, COSTROSAS, sobre todo borde de fosas y a lo largo de surco nasolabial.

Se queja de ARDOR DE LABIOS, se pasa la lengua.

Labios generalmente secos, resquebrajados, fisurados, hinchados y pálidos; CON GRIETA PROFUNDA EN MEDIO DE LABIO SUPERIOR Y EN EL MISMO LUGAR DEL INFERIOR.

(Grieta en medio de labio inferior : am. carb., graph., hep. sulf. calc., nit. ac.).

Al menor enfriamiento aparece HERPES LABIAL que puede ser frecuente pues nat. mur.

TIENE GRAN FACILIDAD PARA RESFRIARSE (rhus tox. también tiene herpes labial a frigore).

Al menor enfriamiento aparece HERPES LABIAL que puede ser frecuente pues nat. mur.

TIENE GRAN FACILIDAD PARA RESFRIARSE (rhus tox. también tiene herpeslabial a frigore).

Ojos

Debilidad muscular en todo el cuerpo.

Los músculos de la órbita no escapan a esta acción.

Son DÉBILES Y PARECEN RÍGIDOS cuando mueve párpados y ojos.

Astenopia por insuficiencia de tono de MUSCULO DERECHO INTERNO (gels., cuprum, act., si es el músculo derecho externo).

TRASTORNOS DE ACOMODACIÓN, vista turbia al leer o escribir, como si mirara a través de un velo.

Al leer las letras se confunden y embarullan.

Esta sensación al leer o escribir puede ser también consecuencia de defecto de acomodación o catarata.

A propósito de importancia de nat. mur. en el tratamiento de la CATARATA, bien conocida por los alópatas, el Dr.

Rouy escribe : "la esclerosis de envolturas de ojo y cristalino es uno de los síntomas más importantes de nat. mur. en los órganos de la visión, y es en casos crónicos cuando mejor ejerce su acción.

La acción de la sal marina sobre el organismo se conoce desde hace mucho; la agravación medicamentosa por saturación se observa en costas e islas azotadas por vientos violentos, en pescadores en que la catarata se observa más a menudo que en el interior de las tierras.

Los fenómenos de debilidad, trastornos y obnubilación de vista, aparición de fosfenos, rigidez de músculos orbitarios son frecuentes.

Es principalmente en mujeres y muy particularmente en la menopausia, cuando la acción de nat. mur. es más manifiesta; su acción terapéutica es más eficaz cuanto peor es la catarata cercana a su aparición.

Boericke señala cataratas incipientes.

La acción de reabsorción se hace sentir en la forma típica de catarata, de iniciación periférica llamada subcapsular; las agujas están dispuestas en sector radiadas y de contornos limpios; sin rebarbas ni espesamientos en la base; pero a menudo dispuestas irregularmente.

Sensación como si los globos oculares fueran demasiado voluminosos y comprimidos.

Párpados tumefactos, rojos y ulcerados; aglutinación de párpados de noche y a la mañana al despertar.

DACRIOCLISTITIS.

Pústulas de córnea, con manchas; ulceraciones escrofulosas de córnea con fotofobia, especialmente en escrofulosos y tuberculosos.

LAGRIMEO ARDIENTE Y ACRE, BLEFARITIS con lagrimeo que escuece.

Secreción muco purulenta al apretar los sacos lagrimales.

Lagrimeo abundante cuando tose. (Eufrasia).

Neuralgia ciliar que aparece y desaparece con el sol, (sang., spig., nat. carb.).

Oídos

Sordera e hinchazón de cavidad timpánica con lengua característica; catarro de cavidad timpánica y trompa de Eustaquio (kali sulph.).

Ruido de los oídos; crujidos al comer.

Secreción purulenta por oídos.

Prurito, ardor; puntadas dolores lancinantes en oídos.

Aparato digestivo

BOCA :

GRAN SENSACIÓN DE SEQUEDAD CON BOCA HÚMEDA, CON SED.

Puls., que tiene síntomas mentales similares, tiene boca seca sin sed.

Merc. húmeda con sed, pero con lengua y aliento característicos.

Puede haber como acción secundaria SALIVACIÓN PROFUSA, ACUOSA Y SALADA, pero esto es más raro, en general se encuentra mucosa húmeda, normal o apenas disminuida, pero con sensación de sequedad.

Inflamación, hinchazón y encías que sangran.

ENCÍAS ESCORBUTICAS (merc., carb. veg., y mur. ac.). Odontalgia marcada por frío; SALIVA

ESPUMOSA, QUE DEJA en comisuras como un ROSARIO DE BURBUJAS; PASTOSA.

LENGUA CARGADA EN ISLOTES COMO "MAPA".

(Ars. alb., lach., kali bichr., nit. ac., phytol, rhus tox., taraxacum).

Sensación de escozor en la lengua.

SENSACIÓN DE TENER UN CABELLO SOBRE LA LENGUA (kali bichr., silicea).

Entumecimiento con pinchazos, comezón en lengua, labios, nariz.

Gusto amargo y pastoso.

GARGANTA Y FARINGE :

GARGANTA SECA, ROJA, ARDIENTE; SENSACIÓN COMO SI UNA ESPINA LO PINCHASE CUANDO TRAGA.

NO PUEDE TRAGAR SI NO AYUDA A LOS ALIMENTOS A BAJAR BEBIENDO UN POCO.

Dolores punzantes a lo largo del esófago (Kent).

Generalmente se prescribe hep. sulf. calc. cuando hay esta sensación de pinchazo como por espina en la garganta : es una mala rutina : Nit. ac., arg. nit., tienen este síntoma y pueden ser tan útiles como hep.

sulph. calc. según el caso.

En hep. sulph. calc., hay amígdalas hinchadas, púrpuras, como en angina; enfermo tan sensible al aire frío, a la menor corriente de aire, que tiene frío, dolor de garganta por sacar las manos de debajo de las frazadas cuando está en cama, transpira mucho de noche, pero sin alivio; hipersensible a la menor impresión exagera todo.

En nit. ac., el mismo dolor con puntos amarillos en garganta, ulceraciones de bordes irregulares o garganta inflamada, coloración púrpura; orina de olor característico.

Arg. nit., presenta con este dolor picante, mucha ronquera; cuerdas vocales atacadas por inflamación de farinx : pide cosas frías : agua fría, aire frío, etc..

Nat. mur. : extrema sequedad de mucosa en garganta a tal punto que se diría que se va a resquebrajar; sequedad crónica de mucosa de garganta con ulceración, secreción catarral abundante que parece clara de huevo, con gran sequedad de mucosa cuando no está cubierta de mucus.

Es extremadamente sensible a cambios de temperatura (Kent).

ESTOMAGO :

Ningún medicamento es más HAMBRIENTO que nat. mur., pero A PESAR DE SU GRAN APETITO, AUNQUE COME MUCHO, ADELGAZA : (acet. ac., abrot., iodum, sanic., tuberc.).

Deseo ANORMAL DE SAL, como caust. con aversión AL PAN.

Como phosph. ac., hydrast., etc.

Phosph. y conium tienen también deseo anormal de sal.

SED Y HAMBRE INEXTINGUIBLES.

Acet. ac. también tiene sed ardiente aunque la bebida fría le hace mal.

Acon. : sed inextinguible pero el cuadro clínico lo distingue netamente de nat. mur. ant. crud. : mucha sed a la tarde y de noche.

Ant. tart. cuya sed intensa pide agua fría, poca y seguido, como ars., bell. con dos síntomas en apariencia contradictorios : sed con gran deseo de agua fría y aversión por el agua.

Cantharis : mucha sed pero los líquidos lo agravan.

Caps. : gran sed con escalofríos al beber.

Eup. perf. : gran deseo de bebidas frías, con los síntomas característicos de la boca.

Phosph. : tiene sed que Kent resume así : la sed es uno de los rasgos más constantes de phosph. en enfermedades agudas y crónicas, sed intensa con gran deseo de bebidas frías, heladas, que dan alivio momentáneo, pero cuando se calientan en el estómago vomita.

Rhus tox. : sed inextinguible, con falta total de apetito, al contrario de nat. mur. que tiene mucha hambre y sed.

Ver. alb. : muy sediento y cuando bebe agua fría la vomita, como phosph.

Vinagrera, DESPUÉS DE LAS COMIDAS SE SIENTE PESADO; SENSACIÓN DE PESADEZ, PLENITUD, MALESTAR EN ESTOMAGO E HÍGADO, QUE CALMA A MEDIDA QUE LA DIGESTIÓN AVANZA.

Iodum : gran apetito, hambre canina pero con gran adelgazamiento, se siente mejor después de comer con el estómago lleno.

Anacard. : dolor de estómago que irradia a la espalda, aliviado por la comida, pero vuelve una hora después.

Chelid. : gran hambre con síntomas hepáticos que no tiene nat. mur., petrol., china y lycop. : hambrientos y sensación de plenitud después de comer, pesadez de estómago, con flatulencia; sólo se calma, como nat. mur., cuando el proceso de digestión está avanzado.

FATIGADO Y SOMNOLIENTO DESPUÉS DE COMER.

(Agaric., calc. carb., kali carb., nux vom., lach., phosph., sulph., graph., china).

TRANSPIRA MIENTRAS COME.

Regurgitaciones con gusto a alimentos.

Náuseas particularmente a la mañana en ayunas o después de comer; vómitos.

Latidos en hueco epigástrico.

ABDOMEN :

Distensión frecuente con flatulencia y gorgoteo.

Dolores presivos, punzantes, en región hepática.

RECTO Y DEPOSICIONES :

Sequedad y escozor en recto y ano, con TENDENCIA A EROSIÓN DE MUCOSA (Farrington).

CONSTRICCIÓN DE RECTO Y ANO, DESGARRADO, SANGRANTE; DOLORES PICANTES, ARDIENTES, DESPUÉS DE DEPOSICIÓN.

Ignat. : Constricción dolorosa de ano después de deposición; es dura y con deseos frecuentes; pasa con dificultad.

Nitr. ac. : contracción dolorosa de ano con gran constipación; el anoparece desgarrado; dolor muy vivo una hora o dos después de evacuar.

Alumina : violenta e ineficaz necesidad de evacuar con espasmos de ano como nux. vom., que tiene constricción espasmódica de ano y recto con sensación de malestar constante en recto.

El ano de lach. parece cerrado como si nada pudiese pasar a través; hemorroides procidentes y mucha constipación.

Plumb. : muy constipado; expulsa con dificultad deposiciones duras, oscuras, con deseo urgente y constricción espasmódica de ano.

CONSTIPACIÓN; RETENCIÓN OBSTINADA DE MATERIA FECAL, DEPOSICIONES IRREGULARES, DURAS, QUE NO SATISFACEN.

CONSTIPACIÓN DURANTE REGLAS.

CONSTIPACIÓN CON MATERIA COMO EXCREMENTO DE CARNERO. (Aur. mur. y magn. mur.).

CONSTIPACIÓN POR INACTIVIDAD DE RECTO (alum., ver. alb., silic.).

CONSTIPACIÓN CON ANO CONTRAÍDO, DESGARRADO, SANGRANTE, ESCOZOR O QUEMADURA, DESPUÉS DE DEPOSICIÓN.

CONSTIPACIÓN CON SENSACIÓN DE PINCHAZOS EN RECTO, QUE CAUSAN HIPOCONDRIA Y MAL HUMOR.

CONSTIPACIÓN POR FALTA DE SECRECIÓN Y SEQUEDAD DE MUCOSA INTESTINAL, pero que no impide secreciones acuosas en otras partes (opium, bryon.).

CONSTIPACIÓN CON EXPULSIÓN DIFÍCIL, FISURA DE ANO Y SECRECIÓN ABUNDANTE DE SANGRE DESPUÉS DE EXPULSIÓN DE BOLO FECAL, QUE DEJA GRAN DOLOR.

CONSTIPACIÓN CON HEMORROIDES.

CONSTIPACIÓN CON DESVIACIÓN UTERINA.

AUNQUE la diarrea es síntoma predominante natrum puede tener DIARREA ACUOSA con deposiciones involuntarias.

Puede ser muy útil en diarrea crónica, cólera infantil y otros estados en que predominen deposiciones diarreicas, si las otras características existen e indican su fisonomía general, como : adelgazamiento, sobre todo de cuello (aur. mur., arg. nit., y abrot. tienen adelgazamiento sobre todo en piernas), a pesar de hambre violenta y sed especial de nat. mur.

(ADELGAZAMIENTO : iod., sarsap.).

Aparato urinario

DETERMINA AUMENTO DE SECRECIÓN URINARIA.

Orina abundante, clara, con SEDIMENTO ROJO, parecido a polvo de ladrillo.

(Lycop., caust., etc.).

Necesidad frecuente y urgente de orinar.

LE ES IMPOSIBLE ORINAR SI OTRAS PERSONAS ESTÁN PRESENTES. (Hep. mur. ac.).

Incontinencia nocturna. (ver sepia).

MICCIÓNES INVOLUNTARIAS AL CAMINAR, TOSER O ESTORNUDAR. (Caust., puls., zinc.).

DOLORES INCISIVOS Y ARDIENTES DE URETRA, JUSTO DESPUÉS DE LA MICCIÓN.

(Sarsap.).

En casos crónicos de blenorragia, pero la secreción es casi siempre acuosa y clara, como todas las secreciones clásicas de nat. mur.

Órganos genitales

1) MASCULINOS : Impotencia con eyaculación tardía; impotencia después de excesos sexuales; pérdidas seminales después del coito con deseos sexuales aumentados.

Secreción acuosa o ligeramente amarilla por uretra, con dolores ardientes.

Comezón de glánde.

Fimosis.

2) FEMENINOS : Dolores de pesadez en bajo vientre, peor a la mañana; deseo de sentarse para impedir el prolapso. (Sepia).

Estos síntomas uterinos de nat. mur. van a menudo acompañados de dolor de riñones aliviado acostándose de espaldas. (Rhus tox.).

SEQUEDAD de mucosa vaginal que puede llegar a coito doloroso.

Inflamación de vulva con prurito.

Reglas irregulares ordinariamente profusas o reglas suprimidas (kali carb. le sigue).

Reglas abundantes que se adelantan o escasas y atrasadas.

Amenorrea con hemoptisis en reemplazo de reglas.

Dolor de cabeza durante o después de reglas.

Constipación con reglas.

Dificultad de aparición de las primeras reglas.

Leucorrea acre, abundante, espesa, transparente.

Aparato circulatorio

Actúa fuertemente sobre CORAZÓN Y CIRCULACIÓN.

Presenta VIOLENTAS PALPITACIONES DE CORAZÓN CON SENSACIÓN DE DESFALLECIMIENTO A CADA MOVIMIENTO, A CADA ESFUERZO, AUNQUE SEA POCO IMPORTANTE; PUEDEN sobrevenir, CUANDO ESTA ACOSTADO Y PRINCIPALMENTE SI SE ACUESTA SOBRE LA IZQUIERDA.

Puede haber ARRITMIA SI SE ACUESTA SOBRE LA IZQUIERDA.

VIOLENTAS PALPITACIONES QUE SACUDEN TODO EL CUERPO. (Spigelia).

SENSACIÓN DE FRÍO ALREDEDOR DEL CORAZÓN, este extraño síntoma puede encontrarse en otros medicamentos : Graph., kali chlor.; lil. tig. petrol, tiene sensación como si tuviera un trozo de hielo sobre el corazón; presenta palpitations peor por tormenta; ruta. : sensación de frío o calor en el pecho agravada por presión en esternón.

En nat. mur. la sensación de frío sobreviene a menudo DESPUÉS DE TRABAJO MENTAL CONTINUO; deprimido, triste.

Este estado mental se agrava por consuelo, todo empeora a las 10 de la mañana.

Es uno de nuestros mejores remedios para ANEMIA.

Parece no haber gran diferencia entre anemia por pérdida abundante de líquido humoral (china y kali carb.) o por reglas irregulares (puls.) o por emisiones exageradas de líquido seminal.

(China, phosph. ac.) o consecuencia de gran disgusto u otro desorden mental (Nash).

Cualquiera sea su origen todas las veces que se encuentre un caso de anemia con los trastornos siguientes : palidez general y adelgazamiento muy marcado sobre todo en el cuello, a pesar de su buen apetito, crisis grave de cefalea latente, disnea por esfuerzo, menstruación débil, constipación más o menos marcada y gran depresión mental, nat. mur. es el remedio indicado.

Aparato respiratorio

1) NARIZ : VIOLENTA CORIZA FLUENTE con secreción acuosa y clara o como clara de huevo, con violentos estornudos, pérdida de gusto y olfato y sensibilidad dolorosa en la nariz, durante dos o tres días, LUEGO REEMPLAZADO POR SENSACIÓN DE OBSTRUCCIÓN DE FOSAS NASALES CON RESPIRACIÓN DIFÍCIL.

Obstrucción y sequedad de mucosa nasal.

Costras en nariz.

Sensación de hormigueo en ORIFICIOS DE LA NARIZ, como por pequeño gusano, después de haberse expuesto ahí sol o en verano por calor intenso.

2) LARINGE : Ronquera con calor y sequedad de mucosas.

Tos seca incesante, día y noche, con cosquilleo de garganta.

Tos laríngea espasmódica, sofocante en cama, de noche.

3) BRONQUIOS Y PULMONES : TOS VIOLENTA CON SENSACIÓN DOLOROSA EN CABEZA como si fuera a estallar a cada acceso.

TOS POR COSQUILLEO EN HUECO EPIGÁSTRICO CON RAUDAL DE LAGRIMAS, cefalea y generalmente DOLORS LANCINANTES de hígado; con pérdida de olfato y extrema sensibilidad al frío; además, CADA VEZ QUE TOSE PIERDE ORINA (caust., puls., scilla, zincum).

Disnea con dolores lancinantes en el pecho que le impiden la respiración.

Hemoptisis.

Espalda y extremidades

DOLOR DE ESPALDA, MEJORADO APOYÁNDOSE FUERTEMENTE SOBRE CUALQUIER COSA DURA (rhus tox., sepia).

ESPINA DORSAL SENSIBLE AL MENOR TOQUE (agar., cinch., chin., sulf., tar.

hisp., therid., zincum.). aliviado por presión fuerte, con debilidad de piernas, palpitations de corazón y semi parálisis de extremidades inferiores.

Esta debilidad espinal, se puede asociar a debilidad general tal que la fuerza de espíritu y cuerpo está igualmente deprimida, el trabajo físico lo fatiga tanto como el mental.

Esto puede progresar hasta parálisis, después de accesos de fiebre intermitente mal tratados o después de excesos sexuales o difteria o emociones diferentes o cualquier otra causa de surmenaje nervioso.

BRAZOS Y PIERNAS DÉBILES, "SE TUERCEN" FÁCILMENTE, sobre todas las rodillas.

TENSIÓN DOLOROSA DE PLIEGUES DE FLEXIÓN DE ARTICULACIONES COMO SI LOS TENDONES FUEREN MUY CORTOS, esto puede llegar a VERDADERA INVALIDEZ por deformación. (Caust. guaiac., cimex.).

Crujidos en articulaciones cuando se mueve.

(Nat. mur. favorece el aumento de eliminación de uratos).

Entumecimiento y pinchazos en dedos y dedo grande de pie, labios, lengua.

Palma de manos caliente con abundante transpiración.

Inflamación de matriz de uñas; pequeñas escamas se separan o levantan alrededor de las uñas.

Dolores tirantes en muslos, rodillas y pies.
 Debilidad y temblor en extremidades inferiores.
 Calambres en pantorrillas.
 Pies fríos, uñas encarnadas.
 Torpe, deja caer objetos con gran facilidad.
 Hace todo con mucha prisa, con gran precipitación, lo que lo hace torpe.
 A veces, porque tiene los dedos entumecidos, pero sobre todo porque es muy apurado deja caer todo lo que toma.
 Apis, también es torpe, pero deja caer los objetos por trastornos de coordinación de movimientos.
 Bovista : falta de fuerza en las manos : deja caer los objetos más livianos.
 Helleb. : relajamiento súbito de músculos : deja entonces caer lo que toca.
 Tar. hisp. : torpe deja caer lo que toca por movimientos coreiformes.
 Síntomas nerviosos
 SENSACIÓN DE ENTUMECIMIENTO en partes dolorosas.
 DEBILIDAD PARETICA en grupos musculares de miembros y tronco.
 HIPERSENSIBILIDAD DE COLUMNA VERTEBRAL al menor contacto, pero mejorada por presión fuerte;
 HIPERESTESIA GENERAL.
 Dolores contusivos y lancinantes agravados por movimiento.
 Dolores paralíticos en región renal.
 Debilidad histérica, peor a la mañana; espasmos histéricos, espasmos musculares; temblor en músculos, calambres, temblor de manos.
 Dolores lancinantes a lo largo de trayectos nerviosos, con erupción de ampollas con líquido claro como agua.
 Hipo (ignat).
 Se fatiga y enfría fácilmente (hipersensibilidad nerviosa).
 Piel
 ERUPCIÓN ACNEIFORME LOCALIZADA SOBRE TODO EN LA FRENTE, BORDE DE IMPLANTACIÓN DE CABELLOS, detrás de orejas, en nuca, o PLIEGUES DE FLEXIÓN DE ARTICULACIONES (kreos., al contrario). Eczema húmedo, impétigo, forúnculos.
 Prurito de piel.
 URTICARIA (apis, calc. carb., hep. sulf. calc., urtica) en todo el cuerpo sobre todo después de ejercicio violento.
 Enfermedades crónicas de piel; erupciones miliares y urticarias; ERUPCIONES HERPÉTICAS durante enfermedad; granos, ampollas.
 VESÍCULAS, REPLETAS DE LÍQUIDO ACUOSO CLARO.
 PEQUEÑAS VESÍCULAS AL BORDE DE LOS LABIOS EN TODOS LOS CASOS ACENTUADOS CON ESCALOFRÍOS Y FIEBRE, ESPECIALMENTE **PALUDISMO** (rhus tox., hep. sulf. calc., ars).
 VERRUGAS EN LAS MANOS, sobre todo en la palma.
 Fiebre
 APARICIÓN DE ESCALOFRÍO ENTRE 10 y 11 HS., GRAN CALOR Y SED ARDIENTE QUE AUMENTA CON LA FIEBRE, CON GRANOS CARACTERÍSTICOS EN LABIOS.
 La hora de aparición del escalofrío es característica en cualquier pirexia.
 El dolor de cabeza y otros síntomas SE ALIVIAN POR TRANSPIRACIÓN QUE TAMBIÉN MEJORA EL ATAQUE (ars.).
 Con respecto a esta hora de aparición del escalofrío, Nash nos da la tabla comparativa siguiente :
 Escalofrío que aparece alrededor de las 7 hs : eupat.
 Escalofrío que aparece de 10 a 11 hs : ars. alb..
 Escalofrío que aparece a las 13 o a las 24 hs. ars. alb Escalofrío que aparece a las 15 hs : apis.
 Escalofrío que aparece a las 16 hs : lycop.
 Natrum es muy útil en FIEBRE INTERMITENTE, cuando se encuentran las características descriptas, sobre todo de casos que no curan con quinina.
 También en FIEBRE ESCARLATINA con sopor, temblores en miembros y vómitos acuosos y las otras características; profusa transpiración nocturna.
 FIEBRE DE HENO en individuos tipo nat. mur. con secreción acuosa por nariz etc.
 EN todos los estados de fiebre o en las fiebres de nat. mur.
 LA HORA DE APARICIÓN DEL ESCALOFRÍO ES UN SÍNTOMA CARDINAL.
 Relaciones
 Complementarios
 Sepia, apis, en fiebres y afecciones cutáneas.
 Nat. m. se usa para antidotar efectos tóxicos de picadura de abeja; ignat.; arg. nit., al que antidota en ciertos casos, actúa química o dinámicamente según la cantidad de sustancia tomada.
 Después de cauterización de mucosa con nitrato de plata nat. mur. es el antídoto.
 Lycop.

Antídotos

Cuando se ha abusado de nat. m.

EL ESPÍRITU SUAVE DE nitr., puede ser empleado como antídoto.

Ciertos efectos de nat. m. son antidotados por ars. alb., entre otras cosas indicados en consecuencias de baños de mar, tomados fuera de época con abuso; otros son antidotados por phosph. según los síntomas, cuando se ha abusado de la sal.

Para Farrington no hay ningún remedio incompatible con nat. mur.

Comparaciones

Kali sulph. y kali mur. en catarro de trompa de Eustaquio y tímpano.

En estados gástricos e intestinales, kali sulph.

En dolor de cabeza en jóvenes durante reglas kali ph. y ferr. ph. y kalisulph. cuando la metrorragia es el síntoma predominante.

Para reglas poco abundantes kali carb.

En picaduras de insectos ledum es el gran remedio.

Ferr. ph. y kali ph. han sido empleados con éxito.

Nat. mur. tiene analogías con lycop., que a menudo completará su acción.

Nat. m. regulariza el equilibrio osmótico acuoso del sistema arterial; para el venoso nat. sulph.

Para sequedad de mucosas, graph., alum., bryon.

En la ránula, ambra.

Hay otros medicamentos para comparar.

Los vemos al estudiar los síntomas de su patogenesia.

NATRUM SULPHURICO

Natrum sulph. o Sulfato de Soda se presenta en forma de cristales prismáticos incoloros, de sabor fresco, salado, menos amargo que el sulfato de magnesia, con el que tiene alguna semejanza.

Muy soluble en agua, insoluble en alcohol.

Se encuentra bastante frecuentemente en la naturaleza, en estado de eflorescencia, en superficie de rocas, terrenos de sales marinas, en estado de disolución en el agua de mar, en ciertos lagos o fuentes minerales, como la de Carlsbad, de donde se puede extraer.

Se prepara también por descomposición de cloruro de sodio por ácido sulfúrico.

Para su uso homeopático se preparan las tres primeras dinamizaciones con sulfato de soda purificado, por trituración Hahnemanniana.

Las más elevadas por diluciones sucesivas.

Acción general del medicamento

La oxidación de sustancias albuminoideas provoca entre otras cosas, en el organismo, formación de ácido sulfúrico, que se une en estado naciente a carbonatos alcalinos -entre otros, carbonato de soda - determinando a su vez ácido carbónico y sulfato de soda.

Esta no está en el interior de las células sino en el líquido intercelular donde preside su eliminación, cuando hay exceso : un trastorno en el equilibrio molecular intraorgánico de esta sal impide la eliminación normal de excedente de líquido intercelular.

Nat. sulph. preside como nat. mur. el equilibrio osmótico de tejidos, pero mientras nat. mur. ayuda a la célula a absorber la cantidad de agua necesaria, nat. sulph. ayuda al tejido celular a desembarazarse del excedente que resulta del metabolismo eliminador del organismo.

Arrastra el agua, consecuencia de destrucción leucocitaria y contribuye a la destrucción de leucocitos.

Nat. sulph. irrita células epiteliales y terminaciones nerviosas.

Por su acción sobre células epiteliales de tubos uriníferos, el excedente acuoso que encierra en suspensión o en solución los productos del metabolismo alimenticio que deben ser eliminados, es expulsado de las células epiteliales renales y abandona el organismo por los uréteres de la vejiga en forma de orina.

Estimulando las células epiteliales del tractus intestinal o hepáticas o pancreáticas, nat. sulph. contribuye a la secreción eliminadora de estos órganos.

Tiene acción estimuladora sobre los nervios de estas regiones : si los nervios sensitivos de la vejiga, por deficiencia de moléculas de esta sal en sus terminaciones, no son estimulados, excitados por él, la necesidad de orinar no está ya bajo la dependencia de la voluntad y la pérdida voluntaria de orina es suprimida, de ahí la incontinencia; si esta falta de excitación nerviosa recae sobre los nervios motores, resulta supresión de expulsión de orina, retención.

Como consecuencia de la acción insuficiente de nat. sulph. sobre nervios del aparato biliar, tenemos aumento o disminución de secreción de bilis.

Si la diabetes es consecuencia de trastorno de secreción pancreática, nat. mur. restableciendo su equilibrio, será el remedio indicado.

Si los nervios motores del colon no son suficientemente excitados por nat. sulph. resultará constipación o cólicos flatulentos.

Estos datos bioquímicos nos ayudarán a comprender su acción patogénica sobre SISTEMA VASCULAR, donde la circulación se ha hecho lenta; SOBRE SANGRE Y LINFA, que pueden tener trastornos en su composición normal; sobre TUBO DIGESTIVO, principalmente ciego Y GLÁNDULAS ANEXAS; sobre RIÑONES; PIEL Y TEJIDO CONJUNTIVO que, repletos de agua o productos hidratados presentan fácilmente edemas.

Características

CONSTITUCIÓN Y TEMPERAMENTO : Sujetos generalmente corpulentos, pesados, indolentes, lentos de movimientos.

Cara hinchada, tez pálida, sucia, a veces amarillenta; ojos lagrimosos, párpados guiñadores, labios secos.

Piel salpicada de pequeñas excrescencias verrugosas (Dr. Chiron).

Grauvogl da un sitio importante a nat. sulph. por su CONSTITUCIÓN HIDROGENOIDEA, es decir por la tendencia marcada a impregnarse exageradamente de agua o productos hidratados; todos sus tejidos están hinchados, a menudo sobrecargados de grasa; hay edemas al menor malestar; circulación lenta.

Temen el frío brumoso y húmedo, cerca de lagos y ríos, a veces el borde del mar les es desfavorable, las plantas o legumbres que crecen cerca del agua o son muy acuosas le son desfavorables.

Sólo están bien en tiempo seco.

Grauvogl considera que en tal constitución el gonococo encuentra terreno muy rico para desarrollarse, con todo su cortejo de trastornos, y que por eso, si una gonorrea se desarrolla en tal individuo, es necesario transformar su constitución con el remedio de fondo apropiado, no solamente para curar la secreción, sino también los males efectos de la enfermedad, lo que se consigue con nat. sulph. y thuya.

La constitución hidrogenoidea de Grauvogl corresponde aproximadamente a la sicótica de Hahnemann; en ambas las glándulas se desarrollan fácilmente en adenomas bajo la influencia de la retención acuosa y de los productos tóxicos que encierra : por eso la exageración de este tipo bioquímico acompaña frecuentemente la faz de irritación celular sorda y constante que favorece la aparición de cáncer.

Nat. sulph. responde bien a "diatesis de ácido úrico y estados gastro biliosos".

Tal individuo puede presentar diversos estados generales que se pueden considerar como característicos : ante todo, es HIPERSENSIBLE FÍSICA Y MENTALMENTE; muy sensible a dolor, tacto y presión; extremadamente sensible al aire de la noche y al frío, y necesita abrigarse.

Sufre de ESTADO CATARRAL GENERAL Y LAS SECRECIONES SON GENERALMENTE VERDOSAS.

Presenta SENSACIÓN GENERAL DE CONTUSIÓN, PLÉTORA, o HINCHAZÓN, en cualquier parte : cabeza, oído, vientre, venas en general.

Mucha AGITACIÓN FÍSICA, y SENSACIÓN DE INQUIETUD GENERAL A VECES MARCADA.

Modalidades

Lateralidad

De preferencia izquierda.

Agravación

a) POR HUMEDAD EN TODAS FORMAS; peor por tiempo lluvioso, por el agua en cualquier forma; es desagradablemente impresionado por todo cambio de tiempo, de seco a húmedo; no puede comer pescado, legumbres o frutas procedentes del agua o muy acuosas.

Útil en dolores consecuencia de vivir en casas húmedas o planta baja húmeda y malsana.

Por esta agravación por agua y humedad comparar a aran. diad. : se agrava por baños, tiempo húmedo, habitación húmeda; calc. ost. : por aire y tiempo húmedo; calc. phosph. : muy sensible al frío húmedo, particularmente cuando la nieve derrite; dulc. : es al frío húmedo lo que acon. al frío seco.

Nux. mosch. : se agrava por tiempo y locales húmedos.

Rhod., rhus tox. : otros grandes remedios de tiempo húmedo.

b) A LA MAÑANA; AL ATARDECER, DURANTE LA NOCHE, SOBRE TODO ANTES DE MEDIANOCHE.

c) EN PRIMAVERA Y POR TIEMPO CALIENTE HÚMEDO.

d) POR REPOSO.

e) PERIÓDICAMENTE : buen remedio en ciertos casos de malaria.

Mejoría

a) POR TIEMPO SECO, calor seco : sensación de estar mejor con calor seco, tiempo seco.

b) Muchos síntomas están MEJOR DESPUÉS DEL ALMUERZO, DURANTE EL DÍA Y DESPUÉS DE MEDIANOCHE, salvo la transpiración.

c) POR MOVIMIENTO.

d) ESTANDO ACOSTADO DE ESPALDAS; se agrava acostándose del lado izquierdo.

Síntomas mentales

Como todas las sales de soda, ES DEPRIMIDO; tiene DIFICULTAD PARA PENSAR; NO LE AGRADA HABLAR O QUE LE HABLEN.

Todo esfuerzo mental provoca trastornos mentales.

Triste, melancólico, lloroso.

La música le entristece, lo hace llorar.

Miedo a multitudes, enfermedades, a sus semejantes.

Muy sensible, desconfiado.

Está de buen humor después de la deposición.

INQUIETUD A LA MAÑANA QUE PASA DESPUÉS DEL ALMUERZO; O DE NOCHE, EN CAMA, ANTES DE MEDIANOCHE.

ASCO POR LA VIDA, a tal punto que desea suicidarse : debe dominarse mucho para no matarse.

TIENE DEPRESIÓN, EMBOTAMIENTO MENTAL, ES MUY IRRITABLE SOBRE TODO A LA MAÑANA.

Trastornos mentales después de caída o traumatismo en la cabeza.

Melancolía con ataques periódicos de manía.

Sueño

Somnolencia a la mañana, o a la tarde, al leer o escribir.

De noche duerme mal, con pesadillas, sueños fantásticos, despertares frecuentes.

Cabeza

No tiene nada de particular entre los trastornos patogenéticos de esta región.

Hay que tener en cuenta los síntomas siguientes : Hipersensibilidad de cuero cabelludo, dolor cuando se peina, en raíz de cabellos (bell).

Cefalea con sensación de presión en la frente, como si la cabeza fuera a estallar, principalmente después de comer.

Dolor de cabeza con sensación como si un taladro perforase el temporal, con ardor de estómago.

Dolor de cabeza periódico con vómitos de bilis; peor cuando piensa en ellos, mejor por presión, al aire libre, o acostado.

Sensación de pulsación en temporales al caminar.

Dolor latente en vértex.

Sensación de calor en vértex.

Dolor de cabeza a la mañana, al despertar.

El trabajo y esfuerzo mental provocan dolor de cabeza.

Sensación como si el cerebro cayese del lado sobre el cual se acuesta.

Dolores de cabeza como fiebre intermitente.

Dolor de cabeza occipital, violento, con dolor de nuca.

Vértigo después de cenar como si estuviera ebrio.

Mejorado cuando el sudor cubre la frente.

Ojos

Sensación de pesadez de párpados que parecen como de plomo.

Comezón de reborde ciliar de párpados, principalmente a la mañana.

Conjuntivas inflamadas con párpados rojos, hinchados, ardientes y pegados a la mañana.

Inflamación escrofulosa de párpados.

Ojos lagrimosos.

Fotofobia intensa con dolor de cabeza al mirar la luz.

Oídos

Sensación de campaneos o batir de alas o trinos, en los oídos.

Otalgia como si algo quisiera salir por el oído.

Pinchazos como un relámpago en el oído, en tiempo húmedo.

Catarro de oído, principalmente a la derecha.

Cara

Hinchada, tez pálida, a veces amarillenta.

Expresión enfermiza.

Labios secos, con vesículas herpéticas; en el mentón, granitos que dan sensación de ardor cuando se tocan.

Aparato digestivo

BOCA :

Llena de mucus espeso, tenaz, viscoso, gusto amargo.

Sequedad ardiente como por pimienta.

Las encías arden como fuego.

Odontalgia lancinante, agravada por bebidas calientes, mejorada por bebidas frías y aire fresco.

Los dientes se aflojan y caen fácilmente.

Lengua cubierta de CAPA GRIS VERDOSA O VERDE MARRÓN, SOBRE TODO EN SU RAÍZ, o lengua "como mapa".

(Ars. alb., kali bichr., nat. mur., phytol., tarax.).

Vesículas aftosas en el paladar que es sensible al tacto.

FARINGE :

Ulceración de amígdalas.

Gran sequedad de garganta.

Sensación de contracción al tragar saliva.
 Sensación de atoramiento al caminar.
 Sensación dolorosa de garganta al hablar o tragar sólidos.
ESTOMAGO :
 Pérdida de apetito y GRAN SED.
 Gran deseo de helados o agua helada.
 Aversión por carne y pan.
 Náuseas después de comer farináceos; hipo después de comer pan de noche.
 Mucha FLATULENCIA, eructos después de comer, sin gusto o agrios.
 Estómago hinchado y pesado.
 Regurgitación ÁCIDA continua.
NAUSEAS Y VÓMITOS ÁCIDOS BILIOSOS.
 Extrema dificultad de digestión con acidez, sólo puede digerir alimentos livianos.
 Sensación en el estómago como si estuviera perforado.
ABDOMEN :
 Mucha FLATULENCIA, cólicos ventosos, muchos borborismos, principalmente a la derecha, EN COLON ASCENDENTE.
 DOLOR SUBAGUDO EN REGIÓN ILEO CECAL, punto de elección de acción del remedio, en tracto intestinal; la experimentación ha revelado lesiones anatómicas patológicas interesantes : en pared interna de ciego, folículos hinchados y con aureola roja, brillante; mucosa pálida, o apenas coloreada : en parte terminal de íleon, mucosa inyectada, rojo brillante.
 Sensación de malestar en el vientre aliviada emitiendo gases. (Raphanus).
 Dolor y sensibilidad en todo el vientre.
 Sensación de pesadez dolorosa en el vientre que irradia a la espalda.
 Ardor de vientre.
 Sensación como si fuera a tener una deposición diarreica : pero sólo emite gases.
 Malestar continuo en intestinos que lo obliga a evacuar sin cesar.
 Calambres en vientre antes de almorzar.
 Dolores abdominales entre 16 y 20 hs.
 Sensación de plétora, hinchazón y borborismos con o sin diarrea.
 Dolores en colon ascendente cuando está acostado sobre la derecha.
 Dolorimiento de pared abdominal.
HÍGADO DOLOROSO AL TACTO, CON PUNTADAS AGUDAS, TEZ AMARILLA, ICTERICA, MAS O MENOS ACUSADA EN CONJUNTIVAS; AGRAVACIÓN DE DOLORES ACOSTÁNDOSE SOBRE LA IZQUIERDA; NO SOPORTA VESTIDOS APRETADOS ALREDEDOR DEL TALLE.
 Dolor de hígado al caminar, respirar profundamente.
 El hígado parece fabricar exceso de bilis. **BILIS ESPESA COMO LODO QUE SE CONDENSA FÁCILMENTE EN CÁLCULOS.**
 Favorece la secreción de bilis sana, que es disolvente natural de cálculos biliares.
ANO Y DEPOSICIONES :
 Sensación de ardor en ano.
 Excoriaciones verrugosas en ano y entre muslos.
 Deposición involuntaria cuando un gas escapa.
 Masa fecal voluminosa.
 Cólicos con necesidad urgente de evacuar.
 Forma parte de nuestro arsenal terapéutico contra diarrea aguda o crónica.
DIARREA AGRAVADA A LA MAÑANA, no como podoph., rumex, sulph., que obligan a salir del lecho, sino como bryon., después de levantarse y moverse un poco.
AGRAVADO POR HUMEDAD, como todas sus manifestaciones.
 Deposiciones con emisión abundante de gas, como china, arg. nit., calc. phosph., agar. y aloe.
 Diarrea después de absorción de farináceas, legumbres, frutas acuosas, pastelería, helados o bebidas heladas.
 Alternativa de diarrea y constipación.
 Diarrea crónica con trastornos de hígado.
Aparato urinario
 Orina biliosa, oscura.
 Muy abundante, con sedimento blancuzco o rojizo como polvo de ladrillo. (Lycop.).
 Secreción excesiva de orina : polakiuria; poliuria.
 Fosfaturia con abundante sedimento mucoso parecido a gelatina (Kent).
 Ardor de uretra al orinar y después de orinar.

Órganos genitales

1) MASCULINOS : Aumento de apetito venéreo con erecciones penosas.

Secreción espesa, amarillo verdosa, con poco dolor por uretra.

Condilomas.

Comezón de pene y escroto con sensación de ardor después del rascado.

2) FEMENINOS :Herpes vulvar.

Reglas atrasadas; sangre en coágulos, irritante, inflama piel de vulva y muslos hasta excoiación.

Durante reglas epistaxis y cefalea.

Leucorrea amarillo verdosa, corrosiva.

Aparato respiratorio

1) NARIZ : Catarro nasal con secreción amarillo verdosa.

Obstrucción de nariz, principalmente de noche, por mucosidades.

Sensación de sequedad y ardor de nariz.

Estornudos con coriza fluente e influenza.

Epistaxis antes y durante reglas, a la tarde y noche.

2) LARINGE, BRONQUIOS Y PULMONES :Muchas mucosidades espesas, viscosas, en laringe y tráquea.

TOS FRECUENTE, GRASA, con expectoración viscosa, verdosa; a cada acceso, hay TAL DOLOR DE TÓRAX QUE DEBE SENTARSE PRECIPITADAMENTE Y APRETAR EL PECHO CON LAS MANOS (arnica, borax, bryon, dros.).

Bryon también tiene sensibilidad dolorosa de pecho al toser, pero la tos es seca.

Tos con sensibilidad dolorosa Y DOLORES A TRAVÉS DE BASE DE PULMÓN IZQUIERDO : este síntoma es característico de nat. sulfh., como el dolor en base de pulmón derecho es de kali carb.

Disnea en tiempo húmedo.

Opresión por el aire húmedo de la tarde y a la mañana, al despertar.

Asma con crisis entre las 4 ó 5.

Asma al borde del mar.

Catarro crónico de bronquios.

Aparato circulatorio

Como en todas las sales de soda, palpitaciones; peor cuando se acuesta sobre la izquierda, por ruido de puerta cerrada con violencia.

Sensación como si el corazón llenase el pecho.

Sensación de pulsaciones en vasos sanguíneos.

Espalda y extremidades

Violentos dolores de nuca.

Sensibilidad de columna vertebral.

Dolores tironeantes a lo largo de columna vertebral.

Dolores picantes como cuchilladas entre omoplatos a la noche, cuando está sentado.

Dolor de sacro, no puede estar acostado de espaldas, ni de costado :dolores sordos de riñones y sacro, principalmente de noche, que obligan a acostarse sobre la derecha; pasan a la mañana cuando se levanta (Kent).

Temblores, sacudidas de miembros; sacudidas en manos y pies, durmiendo.

Gran debilidad con temblor de extremidades.

Debilidad en manos; flexores dolorosos al asir algo.

Temblores de manos, de mañana al despertar, escribiendo (Kent).

Dolores reumáticos en articulaciones por tiempo húmedo agravados por reposo.

Crujido de articulaciones.

Dolor en articulación coxo femoral derecha al moverse.

Rigidez de rodillas.

Neuralgia ciática aliviada al moverse.

Debilidad en piernas.

Dolores tironeantes en pantorrillas y tendón de AQUILES.

Edema de pies; ardor en planta de pies.

Comezón entre dedos grandes.

Dolores tironeantes en huesos y músculos de brazo y antebrazo.

INFLAMACIÓN ALREDEDOR DE UÑAS : la tendencia a supuración alrededor de uñas es rasgo saliente.

Palma de manos desollada y dolorosa, con secreción acuosa; eczema húmedo.

Piel

PRURITO AL DESNUDARSE (coccul., dros., olean., rumex); piel icterica con prurito al desvestirse.

Eczema húmedo con secreción abundante; erupción vesiculosa con secreción amarillenta y escamas amarillentas.

Pénfigo, vesículas o pequeñas ampollas con líquido acuoso amarillento.

Costras amarillentas que cubren granos o vesículas cuando se rompen.

Excrecencias verrugosas. (Thuya).

Relaciones

Es útil para antidotar el abuso de quinina.

NITRI ACIDUM

Ácido Nítrico, Ácido Azótico o Espíritu de Nitro, agua fuerte, líquido incoloro, oloroso, esfumante al aire, colorea la piel de amarillo y la destruye.

No se encuentra en estado libre, se obtiene descomponiendo nitrato, generalmente de potasio, por ácido sulfúrico.

Las tres primeras dinamizaciones se hacen por diluciones Hahnemannianas de ácido en agua; a partir de la cuarta, en alcohol.

Acción general del medicamento

Nitri ac. produce ESTADO DE DESNUTRICIÓN, análoga al DE SÍFILIS O CIERTOS ESTADOS DE ESCROFULA O INTOXICACIÓN MERCURIAL. Actúa sobre MUCOSAS, particularmente EN ORIFICIOS NATURALES DEL CUERPO, DONDE SE UNEN A LA PIEL : boca, ano, etc. produce IRRITACIÓN, ULCERACIÓN con SECRECIÓN IRRITANTE, EXCORIANTE y QUE SANGRA FÁCILMENTE.

Son ulceraciones de olor fétido y forma característica, irregulares en su configuración, tienden a extenderse en superficie, aunque más profundas que en merc. cuya ulceración es muy superficial.

A menudo están llenas de granulaciones profusas, exuberantes, de brotes, y sangran al menor contacto; una curación que se aplique las hace sangrar.

Con dolores de carácter perforante, como si una astilla de madera, una espina hubiese penetrado; a menudo de carácter ardiente, pero, contrariamente a apis, se agravan por aplicaciones de agua fría.

Nitri ac. está indicado en ulceraciones sífilíticas después de abuso de merc. y en las de carácter escrofuloso después que calc. ha fracasado (Farrington).

Actúa sobre GLÁNDULAS, HUESOS y PIEL, pero siempre particularmente en orificios del cuerpo, en puntos de transición entre mucosa y piel.

Características

1) CONSTITUCIÓN Y TEMPERAMENTO : Conviene a personas "de fibras rígidas", tez morocha, cabello y ojos negros, temperamento nervioso, el opuesto de merc., y próximo a sepia (Dr. J.H. Martin).

Pero no hay que dar mucha importancia a ese temperamento de morocho; nitri ac. curará a rubios y morenos, si los síntomas concuerdan (Kent).

Desarrolla muy bien su acción en sujetos atacados por enfermedad crónica, que se enfrían fácilmente; gran debilidad general, reacción débil, gran sensibilidad con temblores nerviosos son sus rasgos salientes.

"Son grandes deprimidos, irritables en lo moral y físico, sobre todo porruído; su ansiedad se concentra en su enfermedad; quieren que les expliquen todos los fenómenos; cuentan con lujo de detalles sus miserias pasadas y temen nuevos males por venir; desde largo tiempo han perdido el sueño; desde la mañana, debilidad extrema y dolores articulares frecuentes, a la noche cansancio profundo con temblores incoercibles". (Dr. Mouzey-Eon).

Están destrozados por una larga enfermedad, por dolores antiguos; sufrimientos son más bien físicos, que mentales, caquexia marcada (Kent).

Caquexia por sífilis, escrofula, etc.

Litiasis; artrismo (Boericke).

2) ANTÍDOTO DE INTOXICACIÓN MERCURIAL : Cuando se ha abusado de merc., hep. sulf. calc., es probablemente el mejor antídoto para combatir la intoxicación.

CUANDO LA MERCURIALIZACIÓN SE AGREGA A SÍFILIS, nitri ac., ES PREFERIBLE.

3) DOLORES PICANTES, COMO CAUSADOS POR ASTILLAS DE MADERA PUNTIAGUDAS, ESPINAS, ESQUIRLAS, INTRODUCIDAS EN LA PARTE ENFERMA; APARECEN Y DESAPARECEN BRUSCAMENTE.

Esto se ve en toda su sintomatología : en ulceraciones en recto con fisuras y hemorroides; en garganta, etc.

Esta propiedad de aparecer y desaparecer bruscamente, recuerda a : kalibichr., bell., cactus, carb. ac., eupat., ignat., magn. phosph., petrol., srych.

4) AFINIDAD PARTICULAR POR ORIFICIOS DEL CUERPO O LUGARES DONDE MUCOSAS Y PIEL SE UNEN : BOCA, ANO, NARIZ, ETC.

El borde de los orificios sangra y se llena de brotes verrugosos (Kent).

5) SECRECIONES EXCORIANTE Y OFENSIVAS : EL ENFERMO TIENE COMO SÍNTOMA AFIANZADO Y FÁCILMENTE NOTADO EL MAL OLOR, a veces pútrido.

Orina de olor como de caballo; leucorrea maloliente; catarro y aliento fétidos; transpiración fétida de pies, olor fuerte del cuerpo (Kent).

6) HEMORRAGIAS POR TODOS LOS ORIFICIOS DE SANGRE GENERALMENTE BRILLANTE : Paredes de vasos sanguíneos relajadas y que dejan fácilmente correr sangre.

Modalidades

Agravación

a) POR FRÍO : sensible al frío; friolento : se enfría continuamente; los síntomas se agravan por aire frío; o cuando toma frío.
 Parece que el cuerpo no tiene suficiente calor vital; quiere mucho abrigo; estado de escalofrío constante; muy sensible a cambios de tiempo, particularmente al tiempo húmedo (Kent).

b) POR TIEMPO MUY CALUROSO TAMBIÉN.

c) AL ATARDECER Y DE NOCHE.

d) AL DESPERTAR.

e) POR CAMBIOS DE TIEMPO.

f) POR EL CONTACTO.

g) POR SACUDIDA, RUIDO; Los ruidos de la calle lo agravan; le parece que todos los ruidos repercuten en su cuerpo (Kent).
 Particularmente DEL LADO IZQUIERDO.
 Mejoría
 Paseando en coche (coccul. lo contrario).
 Síntomas mentales
 GRAN POSTRACIÓN MENTAL; todo esfuerzo para reflexionar en algo pone en fuga sus ideas.
 Indiferente a todo, cansado de la vida, no encuentra placer en nada; profunda depresión mental agravada a la noche, o antes de reglar.
 No comprende lo que le dicen.
 Está ENERVADO Y LLORA, pero se obstina en su pena y rechaza el consuelo.
 LLENO DE INQUIETUD POR SU PROPIA SALUD; aunque cansado de la vida, teme la muerte; piensa sin cesar en sus males pasados y teme otros en el futuro; tiene miedo mórbido al cólera. (Ars. alb.) (Allen).
 IRRITABLE, COLÉRICO, VENGATIVO, TESTARUDO; monta en cólera por sus propios errores; cólera con temblores.
 Fácilmente se sobresalta, se asusta; se estremece de miedo al dormirse.
 Rencoroso, tiene enemistades inveteradas, no se deja conmover.
 Después de falta continua de sueño, de inquietud prolongada, cansancio de espíritu y cuerpo; después de cuidados prolongados a un enfermo (coccul), después de pena por pérdida de un amigo muy querido (Allen).
 Los síntomas mentales mejoran cuando pasea en coche (Kent).
 Sueño
 Somnolencia de día (amm. carb., ant. tart., agar., bapt., cann. sat., china, lycop., phosph., nat. carb., zinc. met., etc.).
 Dificultad para dormir de noche; sacudidas al dormirse, (agar., arg. met., ars. alb., nat. mur., etc.).
 Sueño angustiado, sin reposo, con sueños espantosos, turbado por dolores vagos.
 El dolor sobreviene durante el sueño.
 Estremecimientos durmiendo.
 Tos durante el sueño.
 Agravación al soñar, de noche.
 Como coccul., se enferma por vigilia nocturna prolongada.
 Confusión mental por traspasar (Kent).
 Cabeza
 Sensibilidad extrema de cuero cabelludo y cráneo, cuando se peina o se pone sombrero.
 Caída abundante de cabello como en sífilis.
 Erupciones en cuero cabelludo, con dolores agudos, lancinantes, como causados por astillas; erupciones húmedas, malolientes, con prurito.
 Exostosis; caries de huesos del cráneo.
 Sensación de plenitud dolorosa agravada por presión del sombrero o ruidos de la calle.
 Cefaléa por simple presión del sombrero.
 CEFALÉA CON SENSACIÓN DE VENDA COMPRIMIENDO ALREDEDOR DE LA CABEZA COMO SI LA CABEZA ESTUVIERA APRETADA EN UN TORNO. (Ant. tart., cactus, carb. ac., merc., platina, stann., sulph; etc.) Sensación de estar apretado por un torno de un temporal a otro.
 Dolor de cabeza violento, agravado por ruido de coches sobre el pavimento, pero que a menudo mejora por paseo en coche, en ruta lisa; agravado por ruidos y sacudidas (Kent).
 Dolor biparietal, de origen sífilítico (Kent).
 Tironeos dolorosos en la cabeza, que se extienden a ojos, con náuseas.
 Dolor con sensación de martilleo en cabeza.
 Dolor a la mañana, en la cabeza, mejorado después de levantarse, agravado por sacudidas, movimiento, ruido, mejorado paseando en coche.
 El calor atenúa a veces el dolor de cabeza y el frío agrava; mejoría cubriéndose la cabeza.
 Ojos
 Párpados hinchados, duros y ardientes.

Ptosis de párpados.

Pequeñas verrugas en párpados superiores; pequeñas verrugas que sangran fácilmente con sensación de pinchazos (Kent).

Los ojos han perdido el brillo, pupilas dilatadas, diplopia.

Inflamación de conjuntiva con lagrimeo acre.

Ulceraciones de córnea con dolores picantes.

Iritis, con dolores ardientes, punzantes, agravados de noche y al pasar de pieza caliente a fría o al aire frío.

Manchas en córnea.

Fotofobia intensa, ardor, presión y sensación como si tuviera arena en los ojos (Kent).

Oídos

Sordera mejorada paseando en coche o tren (graph).

Hipersensibilidad al ruido.

Catarro de trompas de Eustaquio.

Pulsación, latidos de oídos.

Otorrea fétida, marrón, icorosa, purulenta, particularmente después de escarlatina.

Carie de mastoides (Kent).

Cara

Generalmente pálida; frente llena de granitos acuminados que sangran fácilmente cuando se los toca; ángulos de boca agrietados, fisurados (Dr. Mouezy-Eon).

Su cara se caracteriza por arrugas profundas, marca de sufrimiento; pálida, amarilla, lívida, rasgos hundidos, a menudo hinchada, particularmente alrededor de ojos, sobre todo cuando se levanta temprano; hay ojeras oscuras alrededor de los ojos que están hundidos.

La piel parece estirada, con manchas marrones o pigmentadas y verrugas en la frente o pústulas y costras.

Expresión enfermiza, angustiada (Kent).

Aparato digestivo

BOCA :

ÁNGULOS DE BOCA FISURADOS, AGRIETADOS, (arum. triph., amm. carb., conduc., graph., hep. sulf. calc., nat. mur.).

Crujido de mandíbulas al comer.

Lengua roja, limpia y húmeda, con surco en el centro.

O lengua roja, blanca, o blanco amarillento y seca, con ulceraciones, grietas; ulceraciones en placas en lengua con mucosidades viscosas en boca; inflamación de lengua (Kent).

Dientes amarillos.

Caries dentarias.

Dolores desgarrantes de muelas agravados por frío o calor; dolores pulsátiles de muelas al atardecer o de noche, después de mer.

Las encías sangran fácilmente, se hinchan, escorbúticas, ulceradas.

Mal estado de mucosa bucal; con ulceraciones, aftas, estado escorbútico; dolores lancinantes en ulceraciones y como provocados por esquirlas, astillas.

Tialismo con saliva tan acre que irrita labios y ulcera comisuras.

Extrema fetidez de aliento.

Si mer. ha fracasado, nitr. ac. le sigue bien y a menudo cura.

Si estas lesiones de mucosa, que pueden extenderse a garganta, son resultado de sífilis combinada con mercurialización de la antigua escuela, nitr. ac. será el primer remedio a elegir (Nash).

Gusto dulzón, como :China, que tiene gusto azucarado; los alimentos parecen siempre muy salados; flatulencia marcada.

Kali carb. : al mismo tiempo que gusto dulce, gran deseo de azúcar.

Merc. : al mismo tiempo que gusto dulce, salivación abundante, boca húmeda con gran sed y mal aliento.

Puls. : al mismo tiempo que gusto dulce, boca muy seca, pero sin sed.

FARINGE :

Desorden en la acción de musculatura de faringe que detiene el alimento en la garganta y provoca sofocación.

Dificultad en tragar (Kent).

Inflamación de faringe que está seca, ulcerada; ulceraciones que pueden tener secreción de olor ofensivo.

DOLORES AGUDOS COMO PROVOCADOS POR ASTILLA EN GARGANTA.

AL TRAGAR (hep. sulf. calc., nat. mur., arg. nit.).

Amígdalas hipertrofiadas con ulceraciones; inflamación de garganta, amígdalas, campanilla, velo de paladar, amígdalas y campanilla edematizadas (apis, rhus tox.).

Inflamación de esófago.

El estrechamiento de esófago por ulceración sifilítica se alivia con nitr. ac. (Hughes, Cartier).

ESTOMAGO :

Desea PICANTES Y GRASA QUE NO DIGIERE, ARENQUES Y COSAS INVEROSÍMILES como tiza, tierra, granos de café; repollo; AVERSIÓN POR CARNE, PAN Y DULCES.

DIGIERE DIFÍCILMENTE LECHE, SIN APETITO la mayoría del tiempo.

Generalmente SIN SED (Kent), aunque Clarke anota : gran sed a la mañana, al levantarse, y Jahr : gran hambre y sed intensa.

REGURGITACIONES AGRIAS.

PIROSIS.

Náuseas frecuentes y deseo de vomitar, con sensación de angustia, temblores, escalofríos.

Vómitos amargos, agrios, con regurgitaciones frecuentes después de comer.

Ardor o al contrario, sensación de frío en estómago.

Calambres de estómago.

Dolores lancinantes en epigastrio.

Sudor durante y después de comer.

Después de comer, sensación de plenitud, de peso en el estómago; laxitud con calor, sudor y latidos de corazón al menor movimiento; o náuseas, regurgitaciones, flatos, dolor de cabeza con vómitos, sueño, sensación de angustia (Jahr).

Después de beber, durante la comida, dolor como por excoiación engarganta, esófago, estómago, o cólicos.

Dolor de cardias al pasar los alimentos al estómago (Clarke).

ABDOMEN :

Cólicos mejorados teniendo el abdomen comprimido.

Calambres en abdomen.

Dolor violento en región ileo cecal, con sensación de golpes, desolladura, con agravación por movimiento.

Despierta a media noche, con calambres en abdomen y escalofríos y el dolor se agrava por movimiento.

Abdomen distendido y sensible; gran sensibilidad de abdomen.

Borborignos.

Hinchazón sin emisión de gases; acumulación de flatuosidades, sobre todo, mañana y noche.

Estado de relajamiento en niños débiles, lo que da lugar a menudo a hernia inguinal; nit. ac. ayuda su curación. (Lycop., nit. ac.) (Kent).

Inflamación crónica de hígado.

Enorme hipertrofia de hígado.

Dolores en región hepática con ictericia; hipertrofia de bazo.

ANO Y DEPOSICIONES :

Ningún remedio tiene acción más positiva sobre ano, y he aquí un síntoma muy característico : GRAN DOLOR DESPUÉS DE LA DEPOSICIÓN, AUNQUE SEA BLANDA; VA Y VIENE, PRESA DE DOLORES ESPANTOSOS DURANTE 1 HORA O 2 DESPUÉS DE LA DEPOSICIÓN (ratanhia).

En disentería, este síntoma lo distingue de nux vom. que se alivia después de evacuar, y merc. que tiene tenesmo todo el tiempo : antes; durante y después de la deposición (Nash).

Humedad irritante, constante de ano; prurito y sensación de ardor de ano, grietas en el ano.

Prolapso doloroso de recto.

Muy útil en fistulas, grietas, fisuras, condilomas, hemorroides y aún cáncer de ano, cuando los síntomas concuerdan.

Ha curado hemorroides tan dolorosas y sensibles que el enfermo gritaba al rozarlas.

Hemorroides extremadamente sensibles y dolorosas al tacto o al paso de la deposición; hemorroides sangrantes con ardor y puntadas durante deposición; cuando las hemorroides son tan sensibles que transpira, tiene pulsaciones en todas partes, verdadera angustia cuando se toca, o durante deposición, nit. ac. es muy útil. (Peonia, staph.) (Kent).

Deseo de evacuar sin resultado; sensación de recto lleno sin poderlo vaciar.

Durante deposición, tenesmo, cólicos, contracción espasmódica de ano, esfuerzos sin resultado; sensación como si tuviera una astilla de madera en el recto.

Después de la deposición el deseo continúa (merc.), agotado, dolores ardientes, cortantes, en recto y ano, constricción de ano; gran exaltación nerviosa, palpitaciones.

El dolor lo tiene en el lecho durante horas después de cada deposición.

Sujetos debilitados con tendencia a sufrir de diarrea frecuente, o constipación alternando con diarrea, necesitan a menudo este remedio, cuando su orina huele fuerte como la de caballo, están pálidos, adelgazan, debilitados, enfermizos, con tendencia a tener los orificios naturales del cuerpo excoiados, ulceraciones, inflamaciones mucosas excoiadas.

Deposición sanguinolenta, PÚTRIDA, mal digerida, verde, viscosa, EXCORIANTE, agria como leche cuajada; el cambio del tiempo al frío provoca diarrea.

Puede haber membranas en deposiciones (Kent).

Puede haber sangre en las deposiciones, a veces verdadera hemorragia, abundante, de sangre rojo vivo, como la fiebre tifoidea.

Deposiciones con materia como arcilla con trastornos de hígado.

Constipación con deposiciones duras, secas, dolorosas, difíciles; hace grandes esfuerzos sin resultado, como si la deposición no pudiera ser expulsada. (Nux vom.).

Aparato urinario

Es uno de los tres remedios que tienen olor muy ofensivo en orina : ORINA OSCURA DE OLORES MUY FUERTES QUE RECUERDA LA DE CABALLO; benz. ac. : orina muy oscura con violento olor amoniacal; sepia : orina de olor fétido acidulado.

Órganos genitales

1) MASCULINOS : SENSIBILIDAD Y ARDOR DE GLANDE, BAJO EL PREPUCIO.

HERPES PREPUCIAL, vesículas, granos; ulceraciones que dejan salir líquido maloliente, fétido, sanguinolento; fimosis y parafimosis; úlcera fagedénica (ars., aur., nat. mur., caust., merc. corr.), ulceraciones que destruyen el frenillo; ulceraciones de bordes irregulares con granulaciones exuberantes que sangran fácilmente.

Partes inflamadas y ulceradas con sensación de astilla clavada.

CONDILOMA en partes genitales y ano que sangran fácilmente, extremadamente sensibles al tacto y con dolores lancinantes como de astilla clavada.

ÓRGANOS GENITALES MASCULINOS EN ESTADO DE CONSTANTE IRRITABILIDAD : deseo sexual aumentado y erecciones dolorosas, espasmódicas, penosas, sobre todo de noche; puntadas dolorosas en uretra; corditis.

Útil en gonorrea, cuando la secreción es líquida y sanguinolenta, más tarde cuando es verdosa o amarillenta; hay ardores y puntadas al orinar y uretra hinchada y dolorosa.

Cura antiguos casos de gonorrea, cuando hay en uretra sensación dolorosa como si hubiera una astilla cuando lo tocan o cuando orina.

Inflamación dura y nudosa como cuerda de látigo anudada (arg. nit.).

Ulceraciones de uretra con sensación de astilla y pus sanguinolento.

Comezón en uretra después de gonorrea (Kent).

Inflamación de próstata en gonorrea, sobre todo cuando la secreción disminuye; porque ha tomado frío o por lavajes muy fuertes e intempestivos (Kent).

2) FEMENINOS : Muy atormentada por comezón constante en vulva, ardor y violentos deseos sexuales (Kent).

Comezón peor por frío (Kent).

Desolladura, ulceraciones de vulva por leucorrea o secreción deregla. Partes genitales fisuradas, irritadas y sangran fácilmente.

Vagina desollada, con condilomas de labios.

Carnúculas en orificio de uretra, extremadamente sensibles al tacto.

Ulceraciones en cuello uterino.

Prolapso uterino.

Cada esfuerzo provoca hemorragias uterinas. (Calcárea).

Reglas adelantadas, abundantes, parecidas a agua sanguinolenta, o secreción oscura, espesa.

Muchos malestares llegan al punto culminante durante reglas.

O muchos síntomas nerviosos aparecen durante reglas : flatulencia, dolores de contusión en miembros, a lo largo de muslos, sensación como de pinchazos de astilla bajo uñas de manos y pies.

Palpitaciones, angustia, temblores, dolores neurálgicos en cualquier parte.

Después de reglas secreción acuosa, sucia, que dura días y lastima violentamente partes genitales (Kent).

Leucorrea acuosa o filamentosa, sanguinolenta, excoriantes, quedada todo el tiempo o aparece en cualquier momento.

Hemorragias uterinas; tendencia a aborto por debilidad general.

Nudosidades en senos.

Muchos síntomas llegan al punto culminante durante lactancia o reglas.

Pezones agrietados desollados y con puntadas dolorosas, como por astillas.

Atrofia de senos.

Aparato respiratorio

1) NARIZ : Propenso a coriza cada invierno; apenas termina un resfrío tiene otro; nariz obstruida de noche; ni bien está al aire frío o corriente de aire, estornuda; está obligado a quedar en habitación caliente.

Mal olor en nariz, catarro maloliente para los otros.

Hemorragia nasal. mañana y noche.

Catarro nasal acre, acuoso de noche, amarillo, maloliente, sanguinolento, marrón, irritante, después de escarlatina o en neuro sifilíticos.

Sensación de astillas en nariz.

Anchas costras en parte superior de la nariz y a la mañana arroja anchas costras verdes.

Ulceraciones de mucosa en parte superior de nariz.

Alas de nariz agrietadas; ulceradas, cubiertas de costras.

Punta de nariz roja y escamosa; verrugas en y alrededor de la nariz (Kent).

2) LARINGE : Ronquera con ulceración de laringe.

Pérdida de voz o ronquera, Laringitis en antiguos sífilíticos.

3) BRONQUIOS Y PULMONES :Opresión mejorada por expectoración; sofocación al subir escalera.

Enfisema.

Tos seca, perruna, peor de noche, antes de medianoche, agravada estando acostado; sobreviene durante el sueño.

Por esto se puede comparar a acon., arnic., cham., lach., etc.

Tos agravada en invierno; en pieza caliente cuando se acalora.

Tos por paroxismos, con esfuerzos para vomitar, como coqueluche; tos violenta, con sacudidas.

Accesos de tos dura, prolongados, con expectoración difícil.

Irritación provocada por cosquilleo de laringe.

Tos floja de día, seca de noche.

Tos en sujetos debilitados, durante afección crónica de hígado o pulmones, o tuberculosos.

Enfermo cubierto de sudor durante los esfuerzos para expectorar y cuando puede expectorar el esputo es marrón y sanguinolento.

Expectoración verdosa, viscosa, o líquida, sucia, formada por mucosidad sanguinolenta o sangre negra en coágulos.

Espustos de gusto amargo, agrio o salado; con mal olor, pútrido.

Reglas de día, sin expectoración.

Puntadas en el pecho.

Tos con fiebre hética y sudores nocturnos, es útil en tisis con el cuadro clínico siguiente : impresión de flujo de sangre en el pecho y fiebre hética marcada.

Pecho extremadamente doloroso al tacto.

Frecuentes hemoptisis de sangre roja, brillante, profusas.

Violenta disnea con fatiga al hablar.

Ronquera matinal, diarrea agotadora, peor de mañana, y puntadas agudas a través del pecho, particularmente, lado derecho, hacia el hombro.

Pulso intermitente, al menor movimiento palpitaciones y disnea.

Transpiración fácil de noche y hacia la mañana que lo agota mucho.

La piel tiene tendencia a estar fría a la mañana.

Escalofríos al acostarse; el calor viene por aflujos y se localiza en manos y pies.

Tos provocada por cosquilleo de laringe que le molesta toda la noche.

Grandes rales en el pecho; expectoración fétida, sanguinolenta, purulenta, de color verde sucio y no de pus como puls. o lycop.; a veces tos floja y ruidosa.

Enfermo ordinariamente delgado, de cabello y ojos oscuros.

Útil en tisis, después de kali. carb., calc. ost. (Farrington).

En neumonía de forma tifoidea con rales en el pecho e imposibilidad de expectorar, o si expectora, expectoración marrón, sanguinolenta, orina con fuerte olor a caballo (Kent).

Aparato circulatorio

Violentas palpitaciones del corazón, causadas o agravadas por excitación, por movimiento, o al subir escaleras.

Sensación de temblor de corazón; pulso rápido irregular.

* * falta cada 4 latidos.

Espalda y extremidades

Rigidez de cuello.

Hipertrofia de ganglios de cuello y axilas.

Dolores ardientes en columna vertebral.

Dolores agudos de espalda, al toser.

Lumbago de noche, que obliga a acostarse sobre el vientre; agravación por movimiento.

Adelgazamiento de brazos (arriba) y músculos (Kent).

Dolores reumáticos en miembros.

Dolores lancinantes en miembros por tiempo frío.

Dolores en hombro derecho con sensación de ruptura en brazos.

Entumecimiento de brazos y manos, sobre todo de mañana.

Debilidad en miembros.

Sudor irritante en axilas de noche.

Manos frías, húmedas; sudor en manos.

Numerosas verrugas muy anchas en dorso de manos.

Sabañones.

Vesículas en punta de pulgar que se abren y ulceran.

Uñas arruinadas; amarillas, curvadas, con sensación dolorosa como si tuviera una astilla debajo.

Dolor de luxación en articulación coxo femoral como de fisura.

Sensación de tirones en huesos largos de miembro inferior de noche.

Nudosidades de origen sifilítico en tibia, con dolores nocturnos.

Piernas laxas, como magulladas.

Puntadas en talones al apoyar el pie al levantarse.

Ampollas fagedénicas en dedos de pies. (Graph.).

Sabañones en pies y dedos grandes.

Abundante transpiración maloliente de pies.

Edema de extremidades.

Piel

Anchas verrugas dentadas, peliculadas, que sangran fácilmente al lavarse. (Thuya, staph.).

Ulceraciones irregulares, profundas, llenas de brotes exuberantes sobre fondo lardáceo, sangran fácilmente al más pequeño contacto, con dolores ardientes, que escuecen y sensación dolorosa como si una astilla lo pinchase.

Grietas ulceradas en unión de mucosas y piel de orificios naturales; sangran fácilmente; verrugas en esa zona.

Eczema impetiginoso en cara, detrás de orejas, manos, entre dedos.

Acné inflamatorio y supurado.

Dolor en viejas cicatrices cuando hace frío; dolores como por esquivarlas.

Inflamación de ganglios después de mercurialización intensiva, en sifilíticos.

Supuración prolongada de ganglios sin tendencia a curación cuando hay dolores picantes como pinchazos, secreción acuosa, sanguinolenta, excoriante, fétida, a veces, amarillo verde sucio; supuración sin tendencia a curación; en caso de enfermo sifilítico que ha tomado demasiado mercurio.

En supuración y ulceración cancerosa, con secreción sanguinolenta, acuosa, fétida y dolores picantes (Kent).

Fiebre

Tiene siempre frío, extremadamente friolento; sobre todo manos y pies.

A la tarde, pequeño acceso de fiebre con calor y sequedad de piel.

Ausencia de sed durante todas las fases del acceso.

Fiebre hética con sudores nocturnos parciales o generales.

Actúa bien en fiebres crónicas intermitentes en sujetos caquéticos, con abundante transpiración nocturna, debilidad extrema, olor característico de orina y hemorragias de cualquier parte, de sangre oscura.

Relaciones

Incompatibles

Lachesis

Complementarios

Ars., calad.

Antídotos

Hep. sulph. calc., merc., mez.

NUX MOSCHATA

Nuez Moscada, es la almendra del fruto de *Myristica moschata*, árbol de la familia de las miristecáceas.

Bastante análogo al peral.

Después de lavar cuidadosamente con agua la nuez moscada se preparan por procedimientos de trituración hahnemanniana las tres primeras dinamizaciones; las más elevadas por diluciones sucesivas.

Acción general del medicamento

"No es un gran remedio; no tiene radio de acción muy extenso, pero a menudo se lo olvida cuando es necesario.

Antiguamente, las ancianas acostumbraban darla a mujeres histéricas y éstas se encontraban bien" (Kent).

Actúa sobre EL CONJUNTO DEL SISTEMA NERVIOSO AL QUE ASTENIZA.

Su acción sobre cerebro, produce SOPOR Y ESTUPIDEZ PARECIDA A opium, pero es muy diferente en su mecanismo; los efectos de opium se deben a congestión, tensión, plenitud de vasos del cerebro, los de nux m. dependen de ENTUMECIMIENTO DE LA SUBSTANCIA NERVIOSA MISMA (Nash).

Este entorpecimiento asténico, una de sus grandes características, se hace también sentir en ÓRGANOS EXCRETORES (EXTREMA SEQUEDAD DE MUCOSAS se ve en toda la patogenesia así como EXTREMA SEQUEDAD DE PIEL), SOBRE APARATO CIRCULATORIO (Tendencia a síncope, desvanecimiento, con debilidad cardíaca), SOBRE ÓRGANOS DIGESTIVOS.

Este carácter fundamental de atonía no excluye espasmos y síntomas de irritación espinal que sólo se muestran pasajera y momentáneamente, pues son efectos alternantes accesorios (Espanet).

Características

1) CONSTITUCIÓN Y TIPO : MUJERES HISTÉRICAS Y NIÑOS DE TEMPERAMENTO NERVIOSO, HIPERSENSIBLES a impresiones exteriores, luz, tacto, palabra, tienen PIEL SECA que transpira fácilmente y DISPOSICIÓN MARCADA A DESVANECERSE, con debilidad cardíaca; EXTRAÑA SENSACIÓN DE ENTUMECIMIENTO IRRESISTIBLE.

2) CONSTANTE SOMNOLENCIA Y FRECUENTES ATAQUES DE DESFALLECIMIENTO : "La enferma parece estúpida; ha perdido completamente la memoria, parece actuar automáticamente.

Circula por la casa cumpliendo sus tareas habituales, pero si la interrumpen olvida lo que estaba haciendo, olvida haber hablado todo el día con su hijo; no recuerda ningún acontecimiento del pasado.

A veces tan olvidadiza que es difícil saber cuál es su estado mental.

Permanece acostada, ojos cerrados, se da cuenta de todo lo que pasa, pero no recuerda nada.

Habla con inteligencia de temas del momento pero nada sabe del pasado.

Cumple todos sus deberes, pero como en sueños parece no conocer a sus amigos.

Siempre lista para dormirse, sólo permanece despierta con gran esfuerzo; se duerme a la menor ocasión que se le presenta.

Párpados pesados, se duerme profundamente, a veces con sueño comatoso.

Debilidad y desvanecimiento por estar mucho parada; esto pasa a veces en mujeres nerviosas al probar un vestido (Kent).

ESTUPOR E INTENSIDAD; SUEÑO INVENCIBLE; GRAN SOPOR; TODOS LOS SÍNTOMAS VAN ACOMPAÑADOS DE SOMNOLENCIA.

También tienen sopor : opium, tart. em., apis : opium y tart. em. convienen en neumonía con profundo sopor, pero los síntomas concomitantes son muy diferentes; opium y nux m., en fiebre tifoidea, pero a pesar del estupor común, los otros síntomas facilitan la elección.

Nux m., opium y tart. em. en enfermedades de los niños por este síntoma común : estupor; pero las otras características los diferencian; apis tiene el mismo sueño soporífero, pero ninguno de los otros tiene su grito característico (Nash).

Especie de estado de postración comatosa; al despertar no recuerda nada, tiene aspecto estúpido, mira alrededor, quiere saber quiénes son los que la rodean y qué hacen; en este estado, cuando se la interroga, hace esperar largo rato su respuesta, responde lentamente, luego recae en su sopor; puede responder correctamente o dar una respuesta que no se relaciona con la pregunta.

Esto se ve en histeria, después de sacudida moral, susto, decepción amorosa, pérdida de un amigo, etc. y en fiebre tifoidea cuando la enferma está tan débil que se desliza al fondo de la cama, tiene temblores nerviosos, phosph. ac. conviene más (Kent).

3) EXTREMA SEQUEDAD DE MUCOSA Y PIEL : Esta característica cuya acción general hemos visto en la explicación patogenética, aproxima a nux m. a : Acon. : gran sequedad de mucosa y piel, con dolores ardientes y extrema agitación física y mental : Aesc. hip. : gran sequedad de las mucosas que están hinchadas y con congestión marcada del sistema portal y sensación de plenitud en diversas partes del cuerpo; alum. : gran sequedad de mucosas y piel con pereza de todas las funciones; Bryon. : gran sequedad de mucosas con sed excesiva y característica.

Modalidades

Agravación

a) A veces, menos bien a la mañana, al atardecer o al despertar (Kent).

b) Por frío, si tiene los pies fríos, al lavárselos con agua fría; sensible al viento; también enronquece.

c) Por viento tormentoso (rhod.); por cambio de tiempo.

d) Por movimiento y ruido.

e) Acostándose sobre el lado doloroso (bar. carb., etc.).

Mejoría

Por tiempo seco y caluroso, en cuarto caliente, abrigándose.

Síntomas mentales

Ejerce sobre la mente influencia tan marcada como particular y sus más grandes características se encuentran en sus síntomas mentales.

Su fisonomía mental varía entre estado de extravío, en que lo que lo rodea parece extraño, fantástico, y estado de ausencia mental, somnolencia y profundo estupor con pérdida de movimientos y sensibilidad.

Los estados mentales pueden alternar; por momentos, ríe como si lo que lo rodea tuviera algo cómico, bromea sobre los temas más serios; de repente se pone triste, con tristeza acompañada por llantos y gritos; la expresión de su cara se vuelve estúpida; parece abrumada de sueño.

Tiene errores de percepción; un lapso corto de inconsciencia le parece haber durado mucho; sus manos le parecen demasiado grandes, o al mirarlos fijamente, le parece que los objetos han disminuido de tamaño.

Las funciones corporales caen bajo la misma influencia : gran debilidad y sensación de fatiga en espalda y piernas; sensación como se experimenta en rodillas después de larga marcha, postración, tendencia a desfallecer, respiración oprimida, flujo de sangre orgásmos sanguíneos de corazón, piel fría y seca; astenia orgánica tal que apenas se puede sentir el pulso y contar las respiraciones; la cabeza cae hacia adelante, el mentón reposa sobre el pecho, o rueda como una masa de un lado a otro; intestinos muy distendidos por gases como si la digestión fuera muy perezosa; hasta las deposiciones blandas son evacuadas con dificultad.

Nux m. ha hecho excelentes curas, no solamente en casos de debilidad nerviosa, tomando como guía esta atonía mental y física sino también en ciertos casos de cólera infantil y fiebre tifoidea (Farrington).

Los síntomas mentales se pueden esquematizar de la manera siguiente :HUMOR CAMBIANTE; CARÁCTER IRREGULAR, QUE PASA DE LA mayor tristeza A LA ALEGRÍA MAS LOCA; RÍE, LLORA; DE SERIA, SE VUELVE ALEGRE; DE VIVA, CALMA.

(Alum., ignat., plat., crocus, zincum).

Debilidad o pérdida de memoria; olvida fácilmente lo que quiere decir; olvida lo que está haciendo; SU MENTE SE VA MIENTRAS HABLA O ESCRIBE (anac., bar. carb., camph., can. ind., lach., nat. mur., merc., sulf.).

Ausencia MENTAL, DE INTELIGENCIA (anacard., kreos., lach., nat.

mur., merc.); falto de ideas, no puede pensar, debe esforzarse para poder responder a una pregunta.

GRAN INDIFERENCIA, ESTUPOR, parece perdido, como en sueños.

Alucinaciones; le parece tener dos cabezas; que su cabeza es demasiado ancha, pesada para su cuerpo y debe sostenerla con las manos.

Cabeza

Cefalea como si el cerebro se bamboleara en la cabeza.

Sensación de cabeza aumentada de volumen, como si quisiera estallar.

Dolor de cabeza sobre todo después de almorzar.

Vértigo con aturdimiento cuando camina al aire libre, como si estuviera ebria.

Aparato digestivo

BOCA :

EXTREMA SEQUEDAD DE BOCA, TAL QUE LA LENGUA SE PEGA AL PALADAR, PERO SIN SED; conserva un buche de agua, un bocado de fruta fresca y succulenta en la boca, para tratar de hacer desaparecer la sensación de sequedad, pero no lo traga pues no tiene sed (Kent).

También tienen sensación de sequedad en boca : apis., bryon., puls., lach., etc.

Pero nux m. es el primero (Nash).

Saliva que parece algodón (berb.).

ESTOMAGO :

FLATULENCIA EXTREMA : TODO LO QUE COME PARECE CONVERTIRSE EN GAS (kali carb., iod) QUE LLENA ESTOMAGO E INTESTINO HASTA CAUSAR PRESIÓN MOLESTA SOBRE OTROS ÓRGANOS DEL TRONCO; hinchazón de estómago por gases que llegan a molestar la respiración mientras come o inmediatamente después. (Hipo).

ABDOMEN Y DEPOSICIONES :

GRAN DISTENSIÓN ABDOMINAL POR GASES; flatulencia extrema; intestino muy distendido por gases, sobre todo después de comer.

DEBILIDAD PARALÍTICA DE INTESTINOS que provoca gran constipación; deposiciones blandas que sólo pueden ser expulsadas con gran esfuerzo (alum.).

Desfallecimiento durante la evacuación.

Diarrea; cólera infantil con síntomas mentales del remedio (Nash).

Órganos genitales

Reglas irregulares; en cada período, boca, lengua y garganta extremadamente secas, especialmente cuando duerme (Allen).

A veces, reglas demasiado largas, de sangre oscura, espesa.

Leucorrea en lugar de reglas (coc.).

Fisometría (lycop., sang., phosph. ac., bromium).

Aparato respiratorio

Hiperesmia que corresponde a hipersensibilidad de todos los sentidos.

Ronquera brusca al caminar contra el viento (hep. sulf. calc.).

Tos seca al calor de la cama; tos por demasiado calor, durante embarazo(con.). al bañarse, por exponerse al frío o humedad (nat. sulf); tos cargada después de comer, tos seca después de beber (Allen).

Aparato circulatorio

Palpitaciones de corazón, a veces con desvanecimiento; sensación de temblor de corazón; sensación como si el corazón estuviera apretado (cactus); opresión con sensación de peso en pecho (iod. etc.).

Opresión que va de corazón a garganta.

Pulso acelerado.

Espalda y extremidades

Dolor como si la columna vertebral estuviera rota en región lumbar.

Dolor de riñones yendo en coche.

Dolores reumáticos después de mojarse los pies, de exponerse a corriente de aire estando acalorado (acon., bryon.); se agravan por frío, humedad, o por llevar ropas mojadas (rhus tox.); peor en hombro derecho (ferr. met.) (Allen).

Piel

Sequedad extrema de piel que no transpira.

Relaciones

Nux m. antidota inhalaciones de merc., cólico de plomo, aceite de trementina, licores espirituosos, y particularmente cerveza mala (Allen).
Es antidotado por gels., camph., valer.

NUX VOMICA

Nuez vómica es la semilla de *Strychnos nux vómica*, árbol de la familia de las Logoniáceas que crece en India, Cochinchina, Siam, Norte de Australia, Ceylán, Malabar, Coromandel.

Su fruto tiene la dimensión de una naranja; contiene en medio de una pulpa acuosa, una quincena de semillas, redondas, muy chatas, ligeramente deprimidas hacia el centro, parecidas a un botón de ropa; color gris-verdoso, brillante, sedoso, gracias a numerosas pelos.

Ningún olor; sabor extremadamente amargo, acre, nauseoso.

Contienen tres alcaloides : estricnina, el principal y más conocido, brucina e iga-surina; un glicósido; loganina; y ácido iga-súrico combinado con los alcaloides.

Las diferentes dinamizaciones se preparan partiendo de la tintura madre obtenida por maceración en alcohol de la semilla seca y bien rallada; también se pueden preparar las tres primeras dinamizaciones por trituración.

Acción general del medicamento

Nux vómica, uno de los primeros policrestos, ha sido experimentado por numerosos autores homeopáticos como Hahnemann, Pereyra, Teste, Hartmann etc. y ha sido descrito de manera muy detallada no sólo en su larga sintomatología patogenética sino también en su acción fisiológica que han confirmado los trabajos de los médicos alópatas, sobre todo su principal alcaloide la estricnina.

En general irrita VIOLENTAMENTE CENTROS NERVIOSOS Y PRINCIPALMENTE BULBOMEDULAR, AUMENTANDO SU IRRITABILIDAD REFLEJA.

PRODUCE IMPRESIONABILIDAD EN TODA SU SINTOMATOLOGÍA, Y LA HIPERSENSIBILIDAD FÍSICA Y MORAL ES UNA DE SUS PRIMERAS CARACTERÍSTICAS.

Manquet escribe que la estricnina exalta penosamente la impresionabilidad de los órganos de los sentidos, principalmente vista y oído y provoca estado marcado de ansiedad.

Como consecuencia de la exaltación de excitabilidad de centros cerebro espinales, ataca LOS MÚSCULOS DE LA VIDA VOLUNTARIA en los cuales produce ESPASMOS Y CONVULSIONES, consecuencia de exaltación del poder reflejo de esos centros nerviosos y excitación anormal de contractilidad muscular.

Un sujeto que ha tomado estricnina a dosis suficientemente elevadas y durante bastante tiempo como para que sus efectos se acumulen, experimenta al principio cierta tensión involuntaria de músculos luego al más ligero contacto, estremecimientos rápidos como relámpagos que empiezan en extensores para extenderse a gran número de músculos y terminar en verdaderas contracciones tetánicas.

También tiene hormigueos y sensación de comezón desagradable.

Si se aumenta la dosis de veneno, experimenta verdaderos accesos paroxísticos convulsivos parecidos a los del tétano (trismos, Ophisthotonos, etc.).

Estos accesos son separados por períodos de reposo y basta la menor excitación sensorial para hacerlos estallar de nuevo.

Luego sobreviene muerte por asfixia, los músculos del pecho inmovilizados no permiten la respiración.

Si la acción esténica de nux v. es inmediata, dice Espanet, lleva finalmente A ATONÍA DE FIBRA MUSCULAR, resultado de su irritabilidad exagerada de modo que en casos de inercia real de esta fibra, sólo será útil si va precedida de período irritativo de faz esténica.

Su acción es idéntica para los músculos de la vida orgánica, y para los de fibra lisa.

LOS ESPASMOS CONVULSIVOS, LAS MANIFESTACIONES DE BRUSCAS IRREGULARIDADES DEL INFLUJO NERVIOSO, bajo la acción de nux v., o de estricnina parecen debidos a acción del veneno sobre columna bulbo medular, sobre todo EN LA SUBSTANCIA GRIS CUYA EXCITABILIDAD EXALTA DE TAL SUERTE QUE LAS MENORES EXCITACIONES TRANSMITIDAS A ESOS CENTROS PROVOCAN REACCIONES MOTRICES VIOLENTAS; ESTOS FENÓMENOS ESPASMÓDICOS SON DE NATURALEZA REFLEJA; nux v. y la estricnina con poderosos excitantes reflejos.

Nux v. ejerce sobre GRAN SIMPÁTICO excitación especial que determina en vísceras trastornos irritativos, congestivos, y dice Espanet, sólo exalta por este medio su vitalidad para desordenarla o aniquilarla agotándola. En cuanto a la estricnina su acción sobre el simpático, dice Manquet, es demostrada por fenómenos óculo pupilares (propulsión de globos oculares, dilatación de pupilas) y vasomotores en sujetos a los que intoxica; determinando aumento marcado de presión arterial por constricción de la mayoría de vasos provistos de túnica contráctil, constricción determinada por acción del veneno sobre centros vasomotores de bulbo y simpático.

Los estados más diversos : intoxicación de sistema porta (sepia), insuficiencia hepática (lycop); autointoxicación congestiva y venosa (sulph); pueden provocar la hiperexcitabilidad nerviosa de nux v.

Puede completar afortunadamente la acción medicamentosa de gran número de remedios.

Por su acción general, nux v. es uno de nuestros más grandes policrestos porque el conjunto de sus síntomas corresponde en similitud a los más conocidos y frecuentes síntomas de la mayoría de las enfermedades.

El surmenaje de cerebro y aparato digestivo tan íntimamente ligados uno a otro y producidos por exceso de trabajo intelectual o consumo cada vez mayor de tóxicos corrientes : alcohol, tabaco, etc. excesos sexuales o tratamientos médicos mal conducidos : o a dosis demasiado fuertes (purgantes, saturantes etc.). son tal vez los excitantes más comunes del sistema bulbo medular, determinando en él influencia parecida a la de nux v. y haciendo de este remedio el modificador más precioso de trastornos comunes en la civilización actual, sobre todo de clases superiores que llevan generalmente vida muy sedentaria.

Es un medicamento de primer orden en nuestra Materia Médica y laterapéutica homeopática ha sabido hacer fecundas sus indicaciones por la descripción de su patogenesia y potente su acción por la dinamización.

Características

1) CONSTITUCIÓN Y TIPO : Conviene más a hombres y mujeres DE TIPO MASCULINO.

Los más sensibles a su acción son los individuos que Nash describe bajo el calificativo "NERVIOSOS BILIOSOS". DELGADOS, ojos Y CABELLOS GENERALMENTE NEGROS Y TEZ TERROSA O AMARILLENTO QUE PUEDE COLOREARSE BRUSCAMENTE POR FALSA PLÉTORA.

IRRITABLE, IRASCIBLE, PRONTO Y VIVO EN SUS MOVIMIENTOS, TIENE GRAN

IMPRESIONABILIDAD A IMPRESIONES EXTERIORES, MORALES Y FÍSICAS : siente vivamente penas y decepciones; la menor luz lo deslumbra, el más ligero ruido lo sobresalta; un vaho de olor lo asquea, el menor dolor lo tortura; su irritabilidad cae fácilmente en irascibilidad : pendenciero, impulsivo, hace reproches, es malo con los que lo rodean; el resto del tiempo, ansioso, preocupado, melancólico, lleno de temor por sus negocios, hasta pensar en suicidio, pero le teme.

EXTREMADAMENTE ACTIVO, SE AGOTA POR TRABAJO INTENSIVO que realiza con frenesí, POR SUS PREOCCUPACIONES E INQUIETUDES PROFESIONALES; SU ACTIVIDAD NO LO DEJA JAMÁS SATISFECHO.

Su cerebro trabaja todo el tiempo; si no maquina ideas negras, las asociaciones precipitadas de sus pensamientos le dan impresión de actividad, de fecundidad intelectual, de realización psíquica que lo satisface.

O llena su imaginación de proyectos para el porvenir; desearía espolpear el tiempo, que para su gusto pasa muy lentamente.

Su sueño se resiente por gran actividad mental; de noche sólo logra dormirse muy tarde; no antes de medianoche; pero descansa mal : hacia las 3 de la mañana despierta, queda largo tiempo rumiando preocupaciones cuyo alcance agravan, o sus proyectos; al alba se vuelve a dormir para despertar a la mañana nauseoso y cansado.

Esta fuerte dosis de trabajo mental que lo sujeta a VIDA SEDENTARIA, este perpetuo hervidero nervioso, exigen extrema tensión mental, que lo llevará, al cabo de cierto tiempo, para sostenerse, a tomar EXCITANTES : café, licor, vino generoso, condimentos, especias, de los que terminará por abusar; trata de calmar su excitación cerebral y nerviosa fumando mucho o tomando hipnóticos; comerá alimentos muy condimentados y de noche pedirá al vino, al tabaco, a la distracción de largas tertulias o en el teatro, el olvido pasajero de trabajos y preocupaciones; se hace noctámbulo, duerme mal, tiene higiene deplorable; de donde trastornos digestivos : calambres de estómago, constipación, despertar nauseoso; eretismo nervioso cada vez mayor, insomnio cada vez más fatigante.

Toma drásticos u otras drogas para tratar de mejorar su estado gastrointestinal, cosa que aumenta la indicación de nux v. cuyo conjunto de sintomatología clínica acabará por manifestarse en todos sus detalles, y sólo podrá ser calmado y curado por éste remedio.

2) POR AROMÁTICOS EMPLEADOS COMO CONDIMENTO O REMEDIO, particularmente pimienta, jengibre, etc.

Y DESPUÉS DE LO QUE SE LLAMA "MEDICINAS IRRITANTES" (DRÁSTICAS); personas que han sido drogadas con mixturas, amargos, hierbas farmacéuticas presentadas con nombre de píldoras vegetales (Hering); es un hecho que todo esto desarrolla los efectos de nux v.

Una de las razones para que existan tantos sujetos de tipo nux v., es que muchos nos llegan "super drogados" por la medicina corriente; han absorbido con exageración insensata tónicos y estimulantes para reanimarlos; fortificantes de toda clase, arsénico, hierro, etc., para tratar de reconstruir su sistema nervioso en grado tal que es imposible tener sintomatología clara, neta y precisa para la elección del remedio; pues son casos confusos por manifestaciones contradictorias, por esta masa de medicamentos absorbidos anteriormente; la primera cosa que hay que hacer es dar nux v. como antídoto.

Es útil en sujetos anteriormente intoxicados por gran uso de té, vino, licores, etc.; sus síntomas también son fugaces, confusos; al principio hay también que dar nux v. para esclarecer el caso; los síntomas agregados por café, té o alcohol desaparecerán y podrá entonces hacerse el diagnóstico con precisión.

En todos estos casos nux v. es el primer remedio indicado pues devuelve el equilibrio de fuerzas vitales y antidota los síntomas agravados a los de la enfermedad verdadera (Nash).

3) HIPERSENSIBILIDAD MORAL Y FÍSICA : Excesivamente irritable, HIPERSENSIBLE A TODAS LAS IMPRESIONES EXTERIORES, aplicación clínica de la característica muy marcada desarrollada por el remedio o su alcaloide, estricnina : IMPRESIONABILIDAD EXTREMA DE TODO EL SUJETO QUE DESARROLLA HIPERSENSIBILIDAD FÍSICA Y MORAL.

Irritabilidad enfermiza, hipersensible a ruido, luz, a la menor corriente de aire, a manifestaciones de lo que lo rodea; extremadamente difícil para comer, muchos alimentos lo cansan; piel hipersensible al tacto; tiene siempre frío; se resfría por nada, por su sensibilidad a cambios atmosféricos.

Hipersensible a remedios como bell., zincum y cuprum.

4) ACCIÓN MUSCULAR PERISTÁLTICA EN SENTIDO INVERSO A LA NECESIDAD DEL ÓRGANO : Esta importante característica se hace sentir de manera marcada en muchos sitios y explica muchos de sus síntomas, entre otros el que Nash da por "oro puro" : CONSTIPACIÓN CON DESEOS FRECUENTES DE EVACUAR, PERO INEFICACES, O CONSTIPACIÓN CON DEPOSICIONES INSUFICIENTES, SOLO EVACUA PEQUEÑA CANTIDAD DE MATERIA EN CADA DEPOSICIÓN.

Si hace esfuerzos para vomitar, tiene contracciones peristálticas de estómago y esófago, en sentido inverso al necesario.

Para desembarazarse de lo que quiere expulsar por la boca.

Lo mismo pasa en vejiga; orina con dificultad, cuando hace fuerza, se produce en cuello espasmo en sentido inverso. Esto muestra la naturaleza espasmódica de ciertas influencias del medicamento (Kent).

Modalidades

Lateralidad

DERECHA.

Agravación

a) A LA MAÑANA, AL DESPERTAR : abatido, fatigado, sin valor.

A LA MAÑANA.

AL LEVANTARSE, O ENTRE 20 y 21.

DESPUÉS DE CENAR, se encuentra menos bien y muchos sufrimientos aparecen periódicamente en uno u otro de estos momentos.

b) POR EJERCICIO MENTAL.

c) DESPUÉS DE LAS COMIDAS : fatigado, somnoliento, inapto al trabajo.

d) CAFÉ, VINO, HUMO DE TABACO, MEDICACIÓN Y TRASNOCHANDO, provocan agravar muchos de sus males.

e) POR TIEMPO SECO Y VENTOSO; AL AIRE FRÍO : la menor corriente de aire lo agrava; en general, se agrava por aire frío al que es muy sensible.

Después de exposición a frío seco puede haber fiebre, catarro mucoso, dolores neurálgicos o reumáticos.

Conviene citar una anomalía del remedio : si en general se agrava por frío, el coriza se agrava en pieza caliente y mejora al aire libre.

Mejoría

a) POR REPOSO, siempre mejor después de sueño ininterrumpido.

Pesadez de cuerpo, pereza y horror por todo movimiento con gran necesidad de estar acostado o sentado, posiciones en que casi todos los dolores se alivian.

b) POR TIEMPO HÚMEDO.

Síntomas mentales

Sus síntomas mentales son variados, pero manifiestan en todas sus formas hipersensibilidad característica.

EXTREMADAMENTE SUSCEPTIBLE; jamás está contento con nada y por una bagatela entra en VIOLENTA CÓLERA, a veces con ganas de romper algo.

Estado de IRRITABILIDAD EXTREMA, INVENCIBLE, con gran debilidad mental y física; es un hombre de negocios agotado por el trabajo cuya mente se preocupa sin cesar hasta la obsesión por una cosa u otra, pero no tanto por cosas importantes sino por pequeños detalles; ni después de salir de su escritorio se olvida de ellas, permanece despierto de noche, la mente en un torbellino de pensamientos (Kent).

HIPOCONDRIACO, TRISTE, SOMBRÍO, PERO UNA BAGATELA LO SACA DE SUMUTISMO Y LO HACE ENTRAR EN VIOLENTA CÓLERA.

VIVO, AGITADO, IMPACIENTE, EL TIEMPO LE PASA MUY LENTAMENTE (alum., arg. nit., etc.).

TRASTORNOS DE MEMORIA, CON GRAN DIFICULTAD, CASI INCAPACIDAD PARA TRABAJAR; omite sílabas o palabras enteras al escribir.

LA MENOR ENFERMEDAD LE AFECTA MUCHO.

IMPULSOS QUE LO CONDUCEN A COMETER ACTOS QUE INCLINAN A LA LOCURA; puede tener

TENDENCIA A SUICIDIO, PERO TIENE MIEDO A LA MUERTE; DESEA DESTRUIR A LOS OTROS, matar a los que ama.

(Nat. sulph. : impulso muy fuerte a destruirse; arg. nit. : también, pero arrojándose de lo alto y evita encontrarse en situación que se lo permita).

Sueño

GRAN DESEO DE DORMIR PRINCIPALMENTE A LA MAÑANA, AL LEVANTARSE, O DESPUÉS DE CENAR, O A LA NOCHE TEMPRANO, pero a pesar de esto, DE NOCHE TIENE INSOMNIO, su sueño es malo. MIENTRAS DUERME, SUEÑA, HABLA, SE AGITA; PESADILLAS terroríficas o sueña con sus negocios.

AUNQUE SOLO CONSIGUE DORMIRSE A LA NOCHE TARDE, no antes de medianoche, notarda en despertar; A LAS 3 o 4 DE LA MAÑANA YA NO DUERME y preocupado, atormentado por preocupaciones y negocios da vueltas y vueltas y no puede conciliar el sueño que sólo VUELVE UN POCO A LAS 6, EN QUE SE VUELVE A DORMIR DESTROZADO DE FATIGA Y CON NECESIDAD DE DORMIR HASTA TARDE A LA MAÑANA.

Por éso cuando tiene que levantarse, está fatigado, CON SENSACIÓN DE QUESU SUEÑO NO HA SIDO REPARADOR.

Cabeza

Sensación de frío en cuero cabelludo, muy sensible al tacto.

Sensación de pesadez dolorosa en cabeza; confusión, pesadez en región frontal y supraorbitaria, A LA MAÑANA AL DESPERTAR, ASOCIADOS CASI SIEMPRE A NAUSEAS Y DESEOS DE VOMITAR.

DOLOR DE CABEZA EN LOS QUE ABUSAN DE PLACERES ASOCIADOS AHEMORROIDES Y CONSTIPACIÓN.

DOLOR DE CABEZA LOCALIZADO en cualquier parte, PERO PUEDE SERGENERALIZADO; en este caso dirá : NO ME DUELE UN PUNTO DE LA CABEZA, ESPECIALMENTE; me duele toda la cabeza.

Cefalea occipital, presiva, a menudo frontal y que se extienda raíz de nariz y sobre los ojos.

Violento dolor en la coronilla como si le clavasen un clavo.

Hemicrania sobre todo parietal, a veces temporal.

La mejoría de sus cefaleas está EN RELACIÓN CON TRASTORNOSGÁSTRICOS, HEPÁTICOS, ABDOMINALES O CON HEMORROIDES.

LAS MODALIDADES, MAS QUE LA CALIDAD DEL DOLOR, DEBEN AQUÍDETERMINAR LA ELECCIÓN DEL REMEDIO.

Su dolor de cabeza se AGRAVA POR EJERCICIO MENTAL, PENAS, CÓLERA, ALAIRE LIBRE (puls., lo contrario); A LA MAÑANA AL LEVANTARSE; DESPUÉS DE COMER, POR ABUSO DE CAFÉ, LICORES, AL SOL; AL AGACHARSE, POR LUZ, RUIDO, MOVIÉNDOSE, HASTA AL ABRIR LOS OJOS. (Bryon.) AL TOSER, POR TIEMPO TORMENTOSO; ABUSO DE REMEDIOS ALOPATICOS, ONANISMO, CONSTIPACIÓN O CRISIS HEMORROIDARIA.

Puede haber VÉRTIGOS con náuseas y vómitos a la mañana aldespertar, al levantar la cabeza de la almohada; la cama parece girar; vértigo con mareos después de las comidas. (Tabac., bryon., cocc.).

Cara

PÁLIDA, TERROSA O AMARILLENTA O AL CONTRARIO MUY ROJA; calor y ENROJECIMIENTO DE CARA y mejillas o una sola mejilla, alternando a veces con palidez.

Hormigueos pruriginosos de cara; sensación como si hormigas lecorriesen por la cara.

NEURALGIAS FACIALES CON DOLORES DESGARRANTES que se extiendena interior de oreja con enrojecimiento y a veces hinchazón de mejilla y espasmos musculares, agravados por trabajo intelectual, uso de café o vino.

NEURALGIA SUPRAORBITARIA MATINAL.

Ojos

FOTOFOBIA, LAGRIMEO.

Pestañeo de párpados; escozor en ojos, sobre todo ángulo externo, comosi hubiera entrado sal.

Paresia de nervio óptico por uso habitual de tóxicos.

Ojos inflamados, con enrojecimiento e hinchazón de conjuntivao esclerótica.

Equimosis de esclerótica. y derrame sanguinolento subconjuntival.

KENT DICE QUE nux v. ES EL MEJOR REMEDIO PARA EQUIMOSIS DE CONJUNTIVA OESCLEROTICA, y el del "OJO EN COMPOTA" es led. pal.

Color amarillo de esclerótica, particularmente ángulo internodel ojo.

Ángulos de ojos rojos y lleno de lagañas con aglutinación nocturna.

Oídos

HIPERESTESIA DE NERVIO AUDITIVO; los ruidos son percibidos con dolor y lo hacen montar en cólera.

Por su hipersensibilidad al ruido se parece a asar. eur. para el que esdesagradable simplemente oír frotar seda o papel; borax; muy sensible al menor ruido; therid. : hipersensible al menor ruido que parece penetrarle todo el cuerpo, sobre todo los dientes; zinc. cuya hipersensibilidad al ruido es la marca de su estado nervioso.

Puntadas y dolores en oído interno.

Tintineos y silbidos,

Aparato digestivo

BOCA :

Sequedad y escozor de parte anterior de boca y lengua.

LENGUA CARGADA CON CAPA ESPESA, BLANCO AMARILLENTA EN PARTE POSTERIOR,MITAD ANTERIOR LIMPIA Y BORDES ROJOS.

Hinchazón, inflamación de encías; los dientes parecen muy largos.

Odontalgia agravada a la mañana, o por agua fría; odontalgia peor al tomar café frío (Boericke).
Estomatitis de origen gástrico, pequeñas ulceraciones aftosas con SALIVACIÓN SANGUINOLENTA (Boericke)
AFLUJO DE SALIVA A LA BOCA.

MAL OLOR EN BOCA PRINCIPALMENTE A LA MAÑANA EN AYUNAS Y DESPUÉS DE COMIDAS.

Gusto amargo, ácido y pútrido.

FARINGE :

Faringe y velo de paladar ligeramente enrojecidos, sensación de aspereza y tensión en garganta.

Dolores picantes disminuidos por deglución.

Sensación de aspereza, raspadura, constricción en garganta; carraspera a la mañana al despertar.

Garganta irritada seca, con sensación de desolladura; irritada si inhala aire frío.

Sensación de carne viva en paladar.

Comezón en trompa de Eustaquio que provoca frecuentes deseos de tragar.

AFECCIONES DE GARGANTA EN FUMADORES, BEBEDORES, ORADORES, CARACTERIZADAS POR IRRITACIÓN FOLICULAR POR SURMENAGE DE VOZ.

ESTOMAGO :

FALTA DE APETITO; REPUGNANCIA POR PAN, que le parece amargo.

GRAN DESEO DE ALCOHOL como lach. sulph., asar., eur., coca, ars. alb., selen., phosph, etc.; Jahr anota :

DESEO DE AGUARDIENTE Y TIZA, por esto último se parece a alum., calc. ost., nit. ac., y cic. vir.

ES UN VIEJO DISPEPTICO, debilitado, delgado, marchito, prematuramente envejecido.

DIFÍCIL PARA SUS COMIDAS que digiere mal; GRAN AVERSIÓN POR MUCHOS ALIMENTOS, entre otros, CARNE Y SOBRE TODO PAN que lo fatiga, pero DESEA CONDIMENTOS, AMARGOS, para ayudar su digestión, difícil, pues DESPUÉS DE LAS COMIDAS SE SIENTE MAL; siente que digiere mal; tiene gusto ácido, sensación dolorosa de PESADEZ EN HUECO DE ESTOMAGO (bryon., pul.) UNA HORA O DOS DESPUÉS DE COMER Y NO INMEDIATAMENTE como nux mosch., kali bich.; debe aflojar el cinturón (lach., lycop., calcárea) también tiene CONFUSIÓN MENTAL Y NO PUEDE HACER NINGÚN TRABAJO MENTAL.

Nux vom., gran medicamento gástrico, no presenta síntomas excesivamente particulares en estomago salvo

AGRAVACIÓN CARACTERÍSTICA 1 HORA o 2 DESPUÉS DE COMER.

LAS CAUSAS DE ESTOS TRASTORNOS GÁSTRICOS Y LOS DE ABDOMEN E HÍGADO tienen gran valor para la elección del remedio : por ej., ABUSO DE CAFÉ, BEBIDAS ALCOHÓLICAS, LIBERTINAJE, CIERTOS REMEDIOS ALOPATICOS (drásticos etc.); PREOCUPACIONES DE NEGOCIOS, VIDA SEDENTARIA; FATIGA POR TRASNOCAR CON FRECUENCIA (cocc., cupr. met., nitr. ac.) EXCESO DE BUENA VIDA etc. (Nash).

Eructos ácidos o amargos.

Náuseas constantes a la mañana, después de comer, fumar, con sensación de que sería aliviado si pudiera vomitar.

Pesadez, dolores, calambres de estómago PEOR ALGO DESPUÉS DE COMER; Hinchazón en región epigástrica con sensación de peso, pesadez, presión como de piedra VARIAS HORAS DESPUÉS DE COMER.

Vómitos generalmente ácidos; PIROSIS (carb. veg., conium, lycop., robiniapseudo-acacia, bismut., capsic.).

Región epigástrica muy sensible a presión. (Bryon., ars.).

SOMNOLENCIA, SOPOR, INCAPACIDAD PARA TRABAJAR DESPUÉS DE COMER, con sensación de hinchazón, pesadez en hueco epigástrico.

Por esta somnolencia después de comer comparar con : Kali carb., agar, calc. ost lach., china, graph., phosph., sulph.).

En general, falta el apetito, pero presenta por momentos crisis de hambre voraz, principalmente algo después de crisis de dispepsia.

ABDOMEN :

Sensibilidad, pared abdominal dolorosa (apis, sulph).

Distensión FLATULENTE CON CÓLICOS ESPASMÓDICOS.

Producción abundante de gases; timpanismo y borborigmos.

SENSACIÓN DE PRESIÓN EN ANILLOS INGUINALES O CRURALES como de HERNIA INMINENTE, DEBILIDAD EN REGIÓN DE ANILLOS INGUINALES O CRURALES, hernia estrangulada (opium).

HÍGADO OBSTRUÍDO, HIPERTROFIADO, DURO, SENSIBLE A PRESIÓN, AUN DE LAROPA, CON DOLORS PULSAILES, PUNZADAS, PINCHAZOS; TRASTORNOS HEPÁTICOS POR EMPLEO MUY PROLONGADO O A DOSIS MUY FUERTES DE DRÁSTICOS O EXCESOS, ALCOHÓLICOS; HÍGADO GRANDE DE LOS BEBEDORES (sulph., lach., fluor. ac., ars., amm. mur.) ESTASIS DE SISTEMA PORTA CON REPERCUSIÓN EN VENAS HEMORROIDARIAS.

ANO Y DEPOSICIONES :

Nunca tiene DEPOSICIONES COPIOSAS Y FRECUENTES; en esta esfera su gran característica ES CONSTIPACIÓN CON DESEOS INEFICACES, DESEO FRECUENTE PERO INEFICAZ DE EVACUAR O SOLO EVACUA PEQUEÑA CANTIDAD DE MATERIA POR VEZ (Nash).

CONSTIPACIÓN CON FRECUENTES DESEOS INEFICACES; DEPOSICIONES INCOMPLETAS :NO SATISFACEN; SENSACIÓN COMO SI UNA PARTE QUEDASE EN RECTO.

Este síntoma es tan característico que tenga diarrea o constipación : encuan to se presenta, nux v. es el remedio (Nash).

Kent agrega : este importante síntoma llave está ligado a su característica :ACCIÓN PERISTÁLTICA MUSCULAR EN SENTIDO INVERSO A LA NECESIDAD DEL ÓRGANO : cuanto más esfuerzos hace, más dificultad para obtener la deposición.

Nux v. y bryon., dos medicamentos buenos para constipación, difieren y no pueden ser empleados uno por otro : la constipación de nux v., resulta de irregularidad de acción peristáltica de intestino; la de bryon. de falta de secreción de mucosa intestinal; no tiene ninguna necesidad y su materia es seca, dura, como quemada (Dunham).

LA DIARREA DE nux v. tiene los mismos síntomas : sentado en forma pasiva,emite un chorrito de materia, pero sobreviene un poco de tenesmo y HACE ESFUERZOS, enseguida se produce ESPASMO EN SENTIDO INVERSO, ESPECIE DE ANTIPERISTALTISMO y la deposición parece subir (Kent).

DIARREA DESPUÉS DE JUERGA, peor a la mañana; pequeñas evacuacionesfrecuentes; DEPOSICIÓN POCO ABUNDANTE DESPUÉS DE GRANDES ESFUERZOS.

DIARREA CON ICTERICIA.

Diarrea con deposiciones pequeñas que no satisfacen; DESPUÉS, LOS DOLORESSE ALIVIAN UN INSTANTE (no es el caso de merc. cuyo dolor y tenesmo continúan después de la deposición, con sensación de no haber terminado).

Constricción de recto y ano con hormigueos y prurito.

HEMORROIDES PRURIGINOSAS QUE IMPIDEN DORMIR Y TAN MOLESTAS QUE OBLIGANA TOMAR BAÑO DE ASIENTO FRÍO; SECRECIÓN SANGUINOLENTA DE HEMORROIDES QUE SANGRAN, ESCUECEN, DOLOROSAS, CON DESEOS INEFICACES DE EVACUAR, SOBRE TODO DESPUÉS DE ABUSO DE DRÁSTICOS, CONDIMENTOS, COMIDAS CONDIMENTADAS, ALCOHOL; MEJORAN POR FRÍO.

SE PUEDE COMPARAR AQUÍ CON CIERTOS REMEDIOS :Aesc. hip. : acción muy marcada en parte terminal de intestino grueso; determina congestión de venas hemorroidarias con dolor de riñones característico, todo en conexión con plétora y congestión de sistema porta e hígado y constipación.

Hemorroides con sensación de pesadez dolorosa en espalda, sacro y caderas;se agrava al caminar o agacharse; sensación de plenitud, sequedad y pinchazos como de recto lleno de agujas, la sensación de plenitud en pelvis es característica; sensación de pulsación, latidos.

Hemorroides con dolores punzantes, pinchazos, agudos, hacia la espalda,de e color oscuro, sanguinolentas, peor durante reglas.

Aloe : grandes hemorroides con sensación dolorosa de ardor, comezón; muysensibles salen como pequeño racimo y sus dolores ardientes mejoran por aplicaciones frías (apis).

Apis : hemorroides con pinchazos ardientes, escozor, principalmente despuésde deposición, extremadamente sensibles al tacto y netamente aliviadas por aplicaciones FRÍAS; TODO LO QUE ES CALIENTE AGRAVA DE MANERA CARACTERÍSTICA.

Hemorroides con dolores picantes después de parto.

Ars. alb. : hemorroides con dolores excesivamente ardientes, sensaciónmuy dolorosa de pinchazos ardientes, como producidos por agujas enrojadas al fuego; especialmente mejoradas POR CALOR Y APLICACIONES CALIENTES (POR FRÍO MEJORAN LAS DE nux v. Y SOBRE TODO aloe Y apis).

Caust. : grandes hemorroides hinchadas que impiden la deposición, consensación de pinchazos, escozor, comezón, ardor, humedad de ano : sensación de dolorimiento en ano como si la mucosa estuviera en carne viva; todo agravado pensando en ello, sonándose, al hablar, elevar la voz, gritar (Nash).

Collins. : hemorroides QUE SANGRAN FÁCILMENTE con sensación como de agujasen recto pero SIN LA SENSACIÓN PLÉTORA, PLENITUD, de aesc., las de collins, SANGRAN de manera persistente, las de aesc. no, apenas tienen a veces pequeña pérdida de sangre; collins, ES EXTREMADAMENTE CONSTIPADA, esta constipación causa cólicos, aesc. lo es de manera menos constante y menos profunda.

Graph. : hemorroides ardientes, pruriginosas; sangran fácilmente pero conRAJADURAS, FISURAS de ano con secreción viscosa y pegajosa, COLOR MIEL característico; no tiene constricción anal.

Lach. : hemorroides en individuos con sus características tipológicas;mucha constricción anal y sensación de latidos o pulsaciones como PEQUEÑO MARTILLO EN RECTO.

Lycop. : hemorroides muy desagradables pero sin otras características engeneral.

Mur. ac. : hemorroides hinchadas y AZULES, extremadamente SENSIBLES ALTACTO; aloe tiene un poco este síntoma, bell. sobre todo, pero en mur. ac.

NO HAY EL ESTADO CONGESTIVO INFLAMATORIO ROJO DE bell. :Su sensibilidad al tacto es al que no puede soportar ser tocado con el papel más fino, ni con su ropa interior.

Bell. : hemorroides que NO SE PUEDE TOCAR, porque son tan SENSIBLES quedebe tener las piernas separadas; MUY ROJAS E INFLAMADAS con dolores ardientes y latentes, estado congestivo que no tiene mur. ac.

Nitr. ac. : hemorroides salientes CON PIEL FISURADA, RESQUEBRAJADA, sangran fácilmente y extremadamente dolorosas, ano agrietado, fisurado, Y DOLORS ESPANTOSOS, 1 HORA o 2 DESPUÉS DE EVACUAR, DOLORS que no ceden en nada en violencia a nitr. ac., pero este último tiene dolor como si tuviera en el ano espinas que le pinchasen.

Retanhia : hemorroides con fisura de ano, con gran constricción de esfínter; las deposiciones sólo pueden pasar después de gran esfuerzo y el ano queda doloroso y arde durante horas.

Sepia : hemorroides que sangran al evacuar con SENSACIÓN DE PLENITUD EN RECTO, COMO SI ESTUVIERA DISTENDIDO POR ALGÚN CUERPO EXTRAÑO QUE EXCITARA LA NECESIDAD DE EVACUAR.

Sulph. : hemorroides con ano MUY ROJO, comezón y sensación de pinchazos, ARDOR, reptación, presión hacia abajo.

Aparato urinario

VEJIGA IRRITABLE POR ESPASMO DE ESFÍNTER.

Este síntoma tiene la misma explicación que la constipación : una vez llena la vejiga produce violenta necesidad de orinar, pero cuanto hace esfuerzo, la orina deja de correr.

Esfuerzos dolorosos e inútiles para hacer pasar la orina; finalmente, micción insuficiente, poco abundante, de orina ardiente.

ESTRANGURIA CON NECESIDAD URGENTE DE ORINAR SEGUIDA DE ESFUERZOS

DOLOROSOS PARA TRATAR DE EXPULSAR LA ORINA DE LA QUE SOLO LLEGA A EMITIR

ALGUNAS GOTAS QUE ESCUECEN, ARDEN, O DAN OTRAS SENSACIONES DESAGRADABLES.

Dolor en región renal como si tuviera un cuerpo extraño que se extiende hacia la pelvis, con orina que sólo corre gota a gota.

Cólicos nefríticos con dolor que irradia a órganos genitales y emite orina gota a gota.

Orina generalmente pálida.

Hematuria (ipec., therb.).

Órganos genitales

1) MASCULINOS : APETITO VENÉREO EXALTADO CON ERECCIONES Y POLUCIONES frecuentes, sobre todo a la mañana, al despertar.

ESPERMATORREA NOCTURNA, sobre todo a la mañana, sueños lascivos y provocan durante el día, raquialgia, con dolores ardientes en columna vertebral, a veces cefaléa, debilidad e irritabilidad.

MALOS EFECTOS DE EXCESOS SEXUALES Y SOBRE TODO DE ONANISMO PRECOZ; (anac., calad., calc. ost. calc. phos., china, conium, gels., kali bich., lycop., phosph. ac., picr. ac., salix mig., staph., sulph. ETC.).

Hinchazón inflamatoria de testículos, muy dolorosos al tacto.

2) FEMENINOS : Hinchazón y ardor en vagina con excitación sexual.

Prolapso de útero, congestión uterina; cuello uterino hipertrofiado y duro.

REGLAS IRREGULARES, sin período fijo.

GENERALMENTE MUY PRECOCES, VIENEN ALGUNOS DÍAS ANTES, MUY ABUNDANTES ODURAN DEMASIADO, VAN ACOMPAÑADAS CON VIVOS DOLORS DE PRINCIPIO A FIN; ESTO SE COMPLETA POR EL CUADRO MENTAL CARACTERÍSTICO DE nux v. : HIPERSENSIBILIDAD, IRRITABILIDAD.

Otros remedios tienen reglas muy abundantes y precoces : Ammon. carb., bell., borax, bryon., calc. ost., cauloph., cham., coc., cact., cyclamen, ferr. met., platina, ver. alb., etc.) pero ninguno tiene el temperamento y las grandes características de nux v.; los casos de este último se ven generalmente en jóvenes o mujeres en la menopausia.

Dismenorrea con dolores en sacro y constante deseo de evacuar.

Durante reglas, cólicos espasmódicos, náuseas y accesos de desvanecimiento a la mañana.

Gran fatiga, cefalalgia (sang.) con escalofríos y dolores reumáticos en miembros.

Metrorragia con sensación como si los intestinos estuviesen en movimiento.

Leucorrea amarillenta que irrita mucosas particularmente después de reglas.

DURANTE EMBARAZO, útil para náuseas a la mañana, sobre todo cuando hay regurgitaciones.

Aquí debe compararse con ALERT. FAR. : náuseas y vómitos de embarazo PERSISTENTES; con asco por alimentos, constipación y gran debilidad.

Ars. alb. : asco por alimentos, a la simple vista u olor, extremadamente marcado; vomita en cuanto bebe o come; DOLORS ARDIENTES DE ESTOMAGO, GRAN DEBILIDAD Y AGITACIÓN PASIVA.

Coccul. : náuseas y vómitos sobre todo matutinos con desfallecimiento agravados POR ANDAR EN COCHE.

Sepia; facies y síntomas mentales característicos.

Symphoric. : náuseas y vómitos continuos; no solamente la vista y olor de alimentos lo agravan, SINO EL SOLO HECHO DE PENSAR; SE ENCUENTRA MEJOR ACOSTADA DE ESPALDAS.

DURANTE EL PARTO, nux v. es útil para DOLORS DE PARTO INEFICACES; SE EXTIENDEN AL RECTO y tienen deseos frecuentes de evacuar y orinar (lilium).

Aparato respiratorio

1) NARIZ : CORIZA EN SU PRIMERA FAZ, por humedad o tiempo frío.

Estornudos con SENSACIÓN DE OBSTRUCCIÓN NASAL, DE PESADEZ EN REGIÓN FRONTAL, PERO SOBRE TODO DE SEQUEDAD DE MUCOSA NASAL; puede tener a LA MAÑANA Y SOBRE TODO A LA TARDE SECRECIÓN ACUOSA, PERO NUNCA MUY ABUNDANTE; Y EN CUANTO LLEGA LA NOCHE, LA SEQUEDAD DE MUCOSA NASO FARINGEA SE MANIFIESTA DE MANERA MUY MARCADA. SE AGRAVA EN CUARTO CALIENTE Y MEJORA AL AIRE LIBRE.

Hay constipación e irritabilidad.

EPISTAXIS, de noche principalmente, o a la mañana, en hemorroidarios, generalmente precedida de dolor de cabeza y enrojecimiento de mejillas.

Trastornos de olfato : sensación de olor a sebo, queso, sopa.

Pero sobre todo HIPERSENSIBILIDAD DE OLFATO, PARTICULARMENTE a olores, perfumes, que pueden provocar desfallecimiento.

Esto nos lleva a compararlo con aur. met., coff., colch., graph., nux mosch.

Tos convulsiva excitada por cosquilleo de laringe.

2) BRONQUIOS Y PULMONES : Tos seca, dolorosa con sensación de rascado causada como por comezón en garganta; desgarras con dificultad mucus transparente, poco abundante; que se hace graso al aire libre.

Las indicaciones de nux v. se encuentran en las modalidades : AGRAVACIÓN DE NOCHE Y PARTICULARMENTE A LA MAÑANA, DE MEDIANOCHE A LA MAÑANA; POR COMIDAS; EJERCICIO; TRABAJO INTELECTUAL; FRÍO, SIMPLEMENTE POR AIRE FRÍO INHALADO.

Mejora POR REPOSO, CALOR, BEBIDAS CALIENTES.

Tos con sensación dolorosa de estallido en cabeza y parte superior de abdomen.

Expectoración a la mañana, difícil, blancuzca o grisácea y poco abundante.

Tos de origen nervioso o gástrico.

Disnea con sensación de opresión de pecho y temor de sofocación.

Dolor profundo de esternón.

Asma por desordenes gástricos.

Después de desarreglo de estómago, puede haber coriza que desciende al pecho y provoca asma (Kent).

En asma provocada por frío seco, nux v. está indicada si hay agravación : A LA MAÑANA; DESPUÉS DE COMER : POR TABACO; Y SI VA ACOMPAÑADO DE SENSACIÓN DE CUERDA APRETADA EN PARTE SUPERIOR DEL PECHO Y PLENITUD DE ESTOMAGO : NERVIOSIDAD, IRRITABILIDAD.

Hemoptisis ligada a supresión de flujo hemorroidario o después de violento acceso de cólera, o de una noche de juerga (Kent).

Espalda y extremidades

DOLOR DE ESPALDA, SOBRE TODO MARCADO EN CAMA.

DE NOCHE SE DEBE SENTAR EN EL LECHO PARA DARSE VUELTA; CUANDO ESTA EN PIE ES MUY DOLOROSO ENDEREZARSE, INCLINARSE, DARSE VUELTA; CAMINA DOBLADO EN DOS; AGRAVACIÓN CUANDO ESTA SENTADO (KOBALTO, puls., rhus tox., zincum).

Dolores localizados sobre todo en región lumbar, aunque pueden localizarse en región dorsal.

EN RELACIÓN CON HEMORROIDES AUNQUE EL LUMBAGO POR ONANISMO PUEDE también encontrar en él su mejor remedio.

El reumatismo de nux v. ataca de preferencia músculos de tronco y grandes articulaciones.

A parte de las modalidades generales, hay agravación por movimiento y sacudidas; muchas sensaciones de tirones, de tensión en músculos, dolores "TIRANTES" de nuca, que obligan a inclinar la cabeza hacia atrás, dolores de espalda hasta el coxis.

ESTADOS PARALÍTICOS DIVERSOS EN MIEMBROS.

Pérdida súbita de fuerza en piernas a la mañana; manos y pies se duermen fácilmente.

Rigidez y tensión en hueso poplíteo; sensación de lazo alrededor del talón donde los vestidos le parecen muy apretados.

ENTUMECIMIENTO Y HORMIGUEOS A LO LARGO DE COLUMNA VERTEBRAL Y EXTREMIDADES.

Pereza, entumecimiento, fatiga y falta de fuerzas en miembros.

Tendencia de las piernas a entumecerse fácilmente; gran pesadez de piernas; tambalea; debilidad y temblor en miembros inferiores, las rodillas se doblan, imposibilidad para caminar o estar parado.

Entumecimiento y hormigueo de todo el miembro inferior; dolores tirantes con rigidez y contracciones a todo lo largo de CIÁTICO; AGRAVADOS A LA MAÑANA, POR FRÍO, ACOSTÁNDOSE SOBRE EL LADO ENFERMO, POR MOVIMIENTO; aplicaciones calientes Y REPOSO MEJORAN.

Nux v. conviene particularmente en tales casos, a constituciones MOROCHAS, DELGADAS, NERVIOSAS, HIPERSENSIBLES.

CALAMBRES EN PANTORRILLAS, principalmente de noche o al atardecer, o después de medianoche a la mañana en cama.

Contracciones con calambres de manos y dedos. (Cuprum).

CONVULSIONES CON OPISTOTONOS; CONVULSIONES DE TODOS LOS MÚSCULOS DEL CUERPO : CARA PÚRPURA, Y PIERDE LA RESPIRACIÓN AL MENOR MOVIMIENTO; CONSCIENTE O SEMI CONSCIENTE DURANTE LA CRISIS, se da más o menos cuenta de su sufrimiento, Y LAS CONVULSIONES QUE SON HORRIBLES SE AGRAVAN POR EL MAS LIGERO TOQUE, una simple corriente de aire.

El solo hecho de tocar la garganta determina espasmo que sofoca.

TÉTANOS.

Piel

Prurito y pinchazos ardientes a la noche en cama.

Urticaria con trastornos gástricos.

Piel roja y manchada.

Acné.

Fiebre

Se caracteriza por este síntoma : GRAN CALOR.

Todo el cuerpo con calor ardiente; la cara sobre todo roja y caliente.

No puede moverse, ni descubrirse, sin temblar.

No hay sed.

Relaciones

Complementarios

Sepia; sulph., que acaba de curar lo que nux v. mejoró.

Incompatibles

Zincum.

Antídotos

Coffea, coccul., ignat., nux v. es incompatible con el alcohol.

OPIUM

Es jugo desecado de cabezas de papaver somnífero.

Llega en forma de tabletas marrones, brillantes, de apariencia grasa, sabor amargo, acre y olor fuerte que se debilita a medida que envejece.

Para preparar el medicamento homeopático utilizamos la especie más fuerte : Opio Negro, o de Esmirna; para las tres primeras dinamizaciones por trituración Hahnemanniana, con ellas hacemos las más elevadas por diluciones sucesivas.

La tintura madre, se prepara haciendo disolver una parte de opium en dos partes de alcohol a 80°.

Acción general del medicamento

Farrington resume así su acción : "A pequeñas dosis, tiene primero efecto hilarante; parece afectar más la esfera emotiva que la intelectual; al sujeto le parece flotar en el aire, independiente de las leyes de espacio y gravedad; su imaginación remonta vuelo.

Si la dosis es aumentada, cae en estado de sueño que varía desde sensación agradable de sopor fácil, hasta el estupor más profundo.

Este efecto narcótico y anodino de opium es resultado de aumento de circulación sanguínea en el cerebro que bajo su influencia sufre las modificaciones siguientes : no solamente aumento de cantidad de sangre suministrada al cerebro, sino que su retorno normal al corazón es dificultado y más lento.

Cara roja oscura e hinchada por distensión de vasos sanguíneos.

Cuanto más profundo es el estupor, más violeta oscuro es la coloración de la cara; puede llegar a violeta negro.

Pupilas contraídas; pulso lleno y lento, respiración profunda y más difícil a medida que el estupor aumenta para hacerse finalmente estertorosa.

Al cabo de cierto tiempo la acción del veneno que desarrolla más profundamente su influencia, produce parálisis casi completa.

Esfínteres relajados, maxilar inferior caído, la saliva cae de los labios entreabiertos.

La muerte llega.

La autopsia muestra las circunvoluciones cerebrales como aplastadas, vasos sanguíneos de eje cerebro espinal lleno de sangre y efusión serosa meníngea y ventricular bastante abundante".

Espanet comenta así la acción de opium : su característica es LA ASTENÍA : característica de tendencia y fondo de todos sus efectos y esencial en su acción.

Si el opium comienza a sobreexcitar músculos voluntarios, por exaltar el psiquismo, es sólo para arrojarlos enseguida a inercia y estupor; y si el embotamiento inicial de sensibilidad general es reemplazado por hiperestesia general, esta debe ser considerada como consecuencia de debilitamiento de sistema nervioso normal.

Opium no desarrolla simultáneamente los mismos efectos en todas partes del sistema nervioso : EXALTA IRRITABILIDAD Y ACTIVIDAD DE MÚSCULOS SOMETIDOS A LA VOLUNTAD, DISMINUYE LA DE MÚSCULOS INVOLUNTARIOS, A LOS QUE EXALTA EN ÚLTIMA FAZ DE INTOXICACIÓN, PERÍODO EN QUE LOS MÚSCULOS VOLUNTARIOS HAN CAÍDO EN INERCIA; EXALTA IMAGINACIÓN Y

VALOR, EMBOTA Y ENTORPECE SENTIDOS QUE SOBREEXCITARA MAS TARDE, Y DETERMINA AUSENCIA, POBREZA DE IMAGINACIÓN Y PUSILANIMIDAD.

Lleva su acción sobre CENTROS NERVIOSOS Y NO SOBRE NERVIOS, a los que sólo puede influenciar por contacto directo, aunque la abolición de sensibilidad que determina parece localizarse en percepciones dolorosas en el cerebro, cuyas funciones, desde la invasión de la droga, son suspendidas, lo que permite a Laborde explicar por exaltación de actividad refleja, la excitación muscular que se constata en su primer período de acción.

LA MEDULA es atacada en segundo término; por eso los fenómenos paralíticos aparecen secundariamente; tocan primero los ganglios intermediarios de los reflejos que son abolidos para interesar en último término los centros vaso motores que conservan todavía su excitabilidad, mientras la respiración se ha hecho lenta, irregular y superficial.

Actúa directamente sobre CORAZÓN (GANGLIOS CARDIACOS) al que acelera primero, determinando oxigenación mayor de sangre; pero lo retarda enseguida y definitivamente, lo que produce exageración de viscosidad de sangre, que se hace impropia a la estimulación normal de los órganos.

SOBRE EL APARATO DIGESTIVO su acción parece doble; por una parte sobre nervios secretores, por otra sobre nervios motores.

Exageradas primero, las secreciones, de modo que la constipación de opium, que es una de sus características importantes, impide secreciones intestinales y paraliza movimientos peristálticos.

Dotado de acción muy rápida, triunfa fácilmente por esta sideración de actividad vital que asusta a personas cuya moral, incapaz de reaccionar, queda anonadada en lugar de estallar en un sentimiento apasionado cualquiera.

Por su efecto astenizante despierta la sensibilidad en sujetos refractarios a la acción de medicamentos, aún en enfermedades agudas, pero en este caso, sólo responde a insensibilidad debida a plétora cerebral.

Características

1) LOS EFECTOS DE opium, CONSTITUIDOS POR INSENSIBILIDAD PROFUNDA DE SISTEMA NERVIOSO, DEPRESIÓN, ENTUMECIMIENTO, ESTUPOR, TORPEZA, PEREZA GENERAL Y FALTA DE REACCIÓN VITAL, CONSTITUYEN HOMEOPÁTICAMENTE, SUS PRINCIPALES INDICACIONES.

2) TODAS LAS ENFERMEDADES EN QUE opium ES ÚTIL, SE CARACTERIZAN POR ESTADO SOPORÍFICO MAS O MENOS ACUSADO; NO TIENEN DOLORES Y VAN ACOMPAÑADAS DE SUEÑO PESADO, ESTÚPIDO : ESTUPOR PROFUNDO; SUEÑO ESTUPEFACTO, COMATOSO, CON RESPIRACIÓN RUIDOSA, ESTERTOROSA, CARA ROJA, HINCHADA, OJOS INYECTADOS Y SEMI ABIERTOS; PIEL CUBIERTA DE SUDOR CALIENTE : TODO ESTO, RESULTADO DE VIOLENTA CONGESTIÓN DE CEREBRO, DE REPLECIÓN INTERNA DE VASOS DE LA CABEZA.

3) UNA MANIFESTACIÓN DE SU INACCIÓN SE MUESTRA EN LA AUSENCIA DE REACCIÓN FRENTE AL REMEDIO HOMEOPÁTICO BIEN ELEGIDO.

Hace al organismo capaz de reaccionar a la acción de medicamentos, frente a los que parecía hasta entonces sin reacción; enfermo postrado, estúpido.

Se puede recordar aquí : Sulph., cuando el obstáculo que impide al medicamento actuar aunque bien elegido, es "diatesis psórica".

Lauroc., cuando esta falta de reacción se encuentre su enfermedad de aparato respiratorio y corazón.

Psor. : muy parecido a sulph.

Capsic. : cuando esta falta de reacción se encuentra en individuo "de fibras laxas".

Valer. Y amb. gris. : cuando el remedio bien elegido no actúa, en enfermedad nerviosa.

Carb. veg. : cuando esta falta de reacción se encuentre en afección abdominal con gran enfriamiento, respiración fría, pulso rápido.

Modalidades

Agravación

a) POR CALOR : reaparición y agravación de síntomas calentándose.

b) Durante y después del sueño. (Apis, lach.).

c) Mientras transpira.

d) Por estimulantes.

Mejoría

a) POR FRÍO, cosas frías; quiere estar destapado, quiere aire fresco, le gusta el aire libre.

b) Moviéndose, caminando constantemente.

Síntomas mentales

NO TIENE GANAS DE NADA : ESTA EN ESTADO DE PAZ, TRANQUILIDAD Y QUIERE QUE LO DEJEN TRANQUILO.

Dice que no está enfermo y tiene 40° de fiebre, cubierto de transpiración ardiente, pulso rápido, delira.

Si le preguntan como está, responde que perfectamente bien, que no sufre nada, que no necesita nada.

Pero en enfermero informa que no ha orinado ni evacuado.

Cara estúpida, hinchada, violeta; ojos vidriosos, pupilas contraídas.

Cerebro confuso pero responde a preguntas.

O bien, síntomas mentales más marcados, confusión mental más profunda, delira un poco, locuaz, estado físico menos saliente; pero esto es raro : generalmente sólo habla cuando lo despiertan, sumergido en tal estado de estupidez que no dice nada.

Delirio con estado mental feliz (Kent).

SENSACIÓN DE BIENESTAR FÍSICO, FELICIDAD, LAS PRIMERAS HORAS DE ABSORCIÓN DE DROGA.

Coff., tiene estado eufórico similar; coff. y opium se parecen y antidotan uno a otro.

COMA, ESTUPOR, ESTERTOR, CON CARA HINCHADA ROJO OSCURO, CALIENTE; ESTADO APOPLETICO, INSENSIBILIDAD : estado primitivo del remedio.

Como efecto secundario : el cuadro sintomático es el siguiente : DELIRIO CON OJOS MUY ABIERTOS, BRILLANTES; cara roja, hinchada; EXALTACIÓN MENTAL, imaginación exaltada, visiones terroríficas, de fantasmas, etc., está muy asustado y la visión reaparece sin cesar.

MOVIMIENTOS BRUSCOS; TEMBLOR de cabeza, brazos, manos; SACUDIDAS DE MÚSCULOS FLEXORES; CONVULSIONES, DELIRIUM TREMENS.

Muy indicado en VIEJOS BEBEDORES, cuya larga vida de excesos alcohólicos ha destruido completamente la constitución, que han tenido varios ataques de delirio "a potu".

La mayor cantidad de alcohol provoca delirium tremens.

Cara con expresión constante de temor, susto, terror; visiones de animales fantásticos que surgen de los rincones del cuarto; imaginan fantasmas, demonios con los que conversan aunque los aterrorizan; si logran dormirse, su sueño tiene carácter de estupor estertoroso.

Conviene comparar : Lach. : visiones de serpientes u otros objetos horribles; sensación de estrangulamiento, de constricción espasmódica de garganta, despertar sobresaltado, como por pesadillas que cortan el sueño.

Stram. : por la violencia de síntomas; en su sueño se endereza en su camalleno de horror absoluto por visiones de animales que se arrojan sobre él de los rincones; violentos esfuerzos por escapar y huir : cara roja brillante.

Cann. ind. : errores de tiempo y espacio.

Ars. alb. : miedo a la muerte y no quiere estar solo.

Calc. ost. : en cuanto cierra los ojos tiene visiones que le obligan a abrirlos.

En esta segunda faz, esta NERVIOSO, IRRITABLE, SE ASUSTA FÁCILMENTE.

Es un medicamento de valor para MALOS EFECTOS DE SUSTO, que provocan convulsiones, diarrea.

Gels., puls., Y ver. alb. : según las otras características, en casos de diarrea por susto.

Para efectos crónicos de susto, recordar : Nat. mur., silic., phosph.

HIPERSENSIBILIDAD : gran sensibilidad a ruido, luz, olores más sutiles.

Los fumadores o tomadores de opio y los alcoholistas son mentirosos por naturaleza; no tienen conciencia de la mentira.

Sueño

INSOMNIO (cimic., coff.) CON AGUDEZA DE OÍDO : el tic tac de un reloj, un reloj que suena a gran distancia, los gallos que cantan a los lejos, lo tienen despierto.

Excesivo deseo de dormir, con imposibilidad absoluta de dormirse.

SOMNOLENCIA COMATOSA CON RONQUIDOS, boca abierta, ojos abiertos y convulsivos, cara roja e hinchada, mandíbula caída; pérdida de conocimiento, respiración difícil, lenta e intermitente, pulso lento y movimientos convulsivos de músculos de cara, ángulos de boca y miembros.

Sueños lascivos, terroríficos, ansiosos.

Cabeza

Dolor de cabeza nervioso, que comienza en occipucio, corriéndose a región frontal y cara; peor a la mañana; sensación de que la cabeza está mantenida sobre la almohada por el dolor de atrás del cerebro; cuando se sienta en la cama, no puede volver a acostarse.

Esto es frecuente en ciertas mujeres, en la menstruación, durante embarazo; presentan estado de falsa plétora, enervadas, con dolor de cabeza tal que cuando están sentadas en su lecho, no pueden volver a acostarse; el dolor comienza a la mañana y se hace tan violento que no pueden soportar el menor movimiento, ni de párpados, ni volver la cabeza; el menor ruido le es extremadamente doloroso : el tic tac de un reloj por ej.; cara congestionada, violeta, ojos inyectados en sangre; a pesar de todo esto, es difícil sacarles algo; opium en tales casos, aliviará rápidamente (Kent).

Provoca violento aflujo de sangre al cerebro; frente a signos de tal estasis circulatorio en este órgano, opium dado homeopáticamente restablecerá en algunas horas las cosas : volverá la lucidez, la piel volverá a ser fresca, la cara volverá a su color normal; el pulso volverá a su ritmo y fuerza regulares.

Es útil en APOPLEGÍA de la que nos ofrece una imagen fiel.

Se debe pensar en él, en ataque de apoplejía, POR ESTADO DE COMA, RESPIRACIÓN ESTERTOROSA, COLOR DE LA CARA Y RIGIDEZ TETÁNICA DEL CUERPO.

Especialmente APOPLEGÍA DE LOS ALCOHÓLICOS (también en estos casos : Lach. y bar. carb.).

Sigue bien a bell. en ataque de apoplejía; am. : indicado en este caso, con pulso lleno y fuerte y parálisis de lado izquierdo; apis : cuando el coma no es aliviado por opium.

Para apoplejía con convulsiones, bell, lach., nux. v., rhus tox...

Cuando va seguida de pérdida de inteligencia helleb.

Pero en todos los casos CUANTO MAS ROJO OSCURO ESTA LA CARA, MAS INDICADO ES opium.

Ojos

Semicerrados o muy abiertos; pupila insensible, CONTRAIDA.

Mirada fija, vidriosa.

Ptosis de párpado superior. (Gels., caust.).

Cara

Hinchada, caliente, coloración ROJO OSCURO, VIOLETA, ASPECTO EMBRUTECIDO, ESTÚPIDO, "BORRACHO PERDIDO".

INTOXICADO (lach. Bapt.); músculos de cara sacudidos espasmódicamente, particularmente ángulos de boca; maxilar inferior caído; rasgos descompuestos; venas de cara aparentes.

Aparato digestivo

BOCA :

Seca; sed intensa, lengua violeta, negruzca, gruesa, paralizada.

Babea; espuma sanguinolenta en labios.

ESTOMAGO :

Parece vacío, mucha hambre; esta hambre esta sensación de vacío de estómago no se alivia comiendo; en vano llena su estómago, la sensación de hambre y la debilidad gástrica persisten.

Los alimentos agrian el estómago y vomita.

No puede absorber nada sin tener náuseas; cubierto de sudor frío, muy débil, NAUSEAS CONTINUAS, hace cesar ESFUERZOS PARA VOMITAR Y LOS VÓMITOS NO CESAN.

Estas náuseas y vómitos son síntoma molesto que sigue a menudo a absorción de opium o inyección de morfina y nada los detiene; felizmente el médico homeópata conoce la indicación de cham. que alivia.

ABDOMEN Y DEPOSICIONES :

CONSTIPACIÓN OBSTINADA POR COMPLETA INERCIA DE INTESTINO, AUSENCIA ABSOLUTA DE DESEO DE EVACUAR, LA MATERIA FECAL QUEDA EN INTESTINO INERTE EN FORMA DE PEQUEÑOS ESCIBALOS NEGROS, SECOS, DUROS, (alum., plumb., bryon.), pero aquí las deposiciones son grandes y secas, lo mismo en alum. : materia dura, seca, nudosa, mezclada con materia blanda; el más parecido a opium es plumb.

Por inercia de recto y todo el tractus intestinal, los intestinos se llenan de materia, los gases se acumulan en parte superior de abdomen comprimiendo órganos de tórax a través del diafragma.

Este síntoma es frecuente después de enfermedades debilitantes de larga duración : en este caso, Farrington da opium a dosis repetidas hasta producir cólicos que indican la vuelta de acción peristáltica de intestino; prescribe entonces enema de aceite para ablandar las heces y se produce evacuación fácil.

En timpanitis comparar a opium con thereb., lycop., carb. veg., colch., raphan. : el síntoma que pide este último es que no puede expulsar gases por arriba ni por abajo durante días.

Opium puede ser indicado en OCLUSIÓN INTESTINAL; hay violentos cólicos con vómitos de materia fecaloide.

EVACUA INVOLUNTARIAMENTE POR INERCIA DE ESFÍNTERES; en estos casos deposiciones ofensivas, negruzcas, espumosas.

Farrington señala que opium puede ser útil en CÓLERA INFANTIL, cuando la cara está roja o pálida y este síntoma va acompañado de estupor marcado, que da la impresión de marchar hacia una terminación fatal; las pupilas no reaccionan ya a la luz, el cerebro parece tomado, no hay diarreas ni vómitos; el niño parece haber sido envenenado.

Opium, administrado a un enfermito en este estado, la volverá a la conciencia.

La diarrea se establecerá y el caso marchará hacia la curación.

Aparato urinario

PARÁLISIS DE VEJIGA, no tiene ninguna necesidad de orinar.

EN RETENCIÓN DE ORINA DESPUÉS DE PARTO, comparar a opium con hyosc., caust., y ars.

En supresión de orina, con stram., zingib., lycop., puls.

MICCIÓNES INVOLUNTARIAS POR INERCIA DE ESFÍNTER.

Órganos genitales

Es útil en casos de supresión de reglas por susto.

Cesación de dolores de parto con coma y convulsiones espasmódicas.

Convulsiones puerperales, sopor y coma entre paroxismos.

Farrington señala que opium es a veces útil en metrorragia, ya sea después de parto o no; enferma agitada; sus sábanas le parecen muy calientes; tiene sueño pero no puede dormir.

Aparato respiratorio

TOS SECA, TITULANTE, PEOR DE NOCHE Y ALIVIADA BEBIENDO AGUA FRÍA (caust.).

LA RESPIRACIÓN SE DETIENE AL EMPEZAR A DORMIRSE; HAY QUE SACUDIRLO PARA QUE SE RESTABLEZCA : (grind).

RESPIRACIÓN ESTERTOROSA : desigual, difícil, intermitente, profunda.

Sensación de calor en el pecho; sensación de ardor alrededor del corazón.

Tos con disnea y cara violeta.

Espalda y extremidades

Sacudidas de miembros.

Convulsiones espasmódicas especialmente consecuencia inmediata de susto, cólera o en un bebé que tiene convulsiones por susto que ha tenido su nodriza : cuerpo en estado de rigidez tetánica; la crisis principia por un grito; hay espuma en la boca cara rojo oscuro y cuerpo cubierto de sudor caliente; sueño profundo, estertoroso, sigue a la crisis (Farrington).

Convulsiones agravadas por luz; convulsiones si el niño está en habitación muy caliente; opistótonos.

Reflejos hipersensibles.

Entumecimiento.

Parálisis sin dolor.

Piel

Caliente, húmeda, cubierta de transpiración caliente en miembros inferiores; desea sin cesar estar destapado.

La propiedad de opium DE ARRUGAR LA PIEL, sugiere su empleo en "marasmo" en niños.

Piel arrugada parecida a la de un viejo seco; con estupor característico.

Cuando estas arrugas marcadas han sido producidas por opium, emplear como antídotos : Sulph., arg. nit., sarsap, según los síntomas (Farrington).

Fiebre

Los síntomas de opium dan el cuadro DE FIEBRE TIFOIDEA CON CONGESTIÓN DE CEREBRO, parálisis de cerebro, respiración estertorosa y ptosis de maxilar inferior.

Cuerpo a menudo bañado de transpiración caliente, pero no crítica; es lo contrario de mal pronóstico : es resultado de parálisis de glándulas sudoríparas y muestra a menudo la proximidad de la muerte.

Este síntoma se encuentra también en stram.

En tal caso de fiebre tifoidea con amenaza del lado del cerebro, recordara lach., hyosc., que tiene también respiración estertorosa y apis (Farrington).

En otras fiebres se puede dar opium cuando hay escalofrío con calores en cabeza y gran sopor, el cuerpo tiene calor ardiente, aún cubierto de sudor abundante; gran deseo de destaparse; estado de estupor inconsciente, y a menudo, este síntoma : sensación como si sus piernas pertenecieran a otro (bapt., stram.) (Farrington).

Relaciones

Antídotos

Ipeca, mur. ac., para debilidad muscular permanente que sigue a opium.

El mejor antídoto de opium es café, a altas dosis.

Opium como bovista y amica, es útil contra malos efectos de inhalaciones de VAPORES DE CARBÓN DE LEÑA.

PETROLEUM

Es un aceite mineral que escapa del seno de la tierra a través de grietas de ciertas rocas o que flota sobre las aguas de ciertas regiones.

Es conocido desde la más remota antigüedad pero en el siglo XIX se descubren importantes yacimientos en Europa, Asia y América y comienza la explotación económica.

Hay cuatro clases de petróleo : I. el negro, de color marrón oscuro, espeso, viscoso, olor fétido, insoportable y susceptible de concretarse en el aire.

II. el rojo, más líquido, III. el blanco, de color amarillo claro, de miel, IV. la nafta de las montañas, la más fina, límpida, incolora, muy líquida, volátil, inflamable, olor aromático.

Para uso homeopático nos servimos de petróleo blanco purificado, las tres primeras dinamizaciones se hacen por trituración.

Acción general del medicamento

Por su acción merece figurar entre los grandes antipsóricos de Hahnemann, como sulph., graph., caust., lycop., etc.

Entre sulph. por una parte y graph. y carb. veg. por otra.

Actúa de manera predominante sobre PIEL.

Los obreros que trabajan con petróleo son propensos a erupciones cutáneas; primero aparecen pústulas con comezón y fuerte sensación de ardor; luego erupción vesiculosa que da el cuadro perfecto del eczema con costras gruesas y secreción de líquido purulento; la piel no tarda en ponerse áspera y seca y se forman profundas fisuras que sangran y supuran (Farrington).

MUCOSAS "piel interna" como las llama Kent, inflamadas, irritadas, aun ulceradas, principalmente las de tubo digestivo y árbol respiratorio.

Hay interesantes síntomas DE SISTEMA GLANDULAR, NERVIOSO Y ARTICULACIONES.

Características

1) CONSTITUCIÓN Y TEMPERAMENTO : Actúa muy bien en personas de cabello claro, piel pálida, irritables y pendencieras, de temperamento nervioso como nux v.

Personas delgadas, esbeltas, altas, de cabello rubio.

Tez pálida; piel de cara seca, salpicada de granitos; párpados inflamados, pestañas escasas, nariz ulcerada, agrietada, labios fisurados; aspecto nervioso.

2) PIEL SECA : AGRIETADA, MUY SENSIBLE, QUE SUPURA A LA MENOR HERIDA; COMEZÓN SOBRE TODO DE NOCHE Y SENSACIÓN DE ARDOR; COSTRAS GRUESAS, VERDOSAS, QUE ARDEN Y PICAN; PIEL ROJA, EN CARNE VIVA; GRIETAS QUE SANGRAN FÁCILMENTE.

Erupciones muy parecidas en apariencia a las de graph., aunque en general las de graph. se parecen más a herpes y las de petrol. a eczema.

Aparecen en diferentes partes : cuero cabelludo, detrás de orejas, escroto, órganos genitales femeninos, manos, pies, piernas, etc.

En erupciones semejantes, petrol. tiene un síntoma característico : ERUPCIÓN PEOR EN INVIERNO. (Aloe, alum., psor.); ningún otro tiene este síntoma tan marcado; en invierno las manos se agrietan, sangran, están cubiertas de eczema.

Piel malsana, el menor rasguño supura; hep. sulph. calc., como petrol, empeora en invierno y por aire frío.

3) HAMBRE; HAMBRE DEVORADORA CON MUCHO DOLOR; SENSACIÓN DE VACÍO DE ESTÓMAGO, SE DEBE LEVANTAR DE NOCHE PARA COMER (phosph. psor., etc.).

4) SENSACIÓN DE FRÍO EN LUGARES LOCALIZADOS.

Es un síntoma particular : frío por partes; en estómago, vientre, matriz, en cualquier lugar entre omoplatos; en el corazón, sensación como si el corazón estuviera frío (Kent).

LOS SÍNTOMAS PUEDEN SOBREVENIR POR ZONAS LOCALIZADAS, como la sensación de frío : erupciones por placas en sitios localizados; comezón en pequeños lugares; transpiración por regiones, por sitios localizados.

5) DOLORS QUE APARECEN Y DESAPARECEN BRUSCAMENTE.

(Bell., magn. phosph.); (platina, stan., al contrario) generalmente presivos, dan sensación de pesadez en la región afectada; en general provocados por cambio de tiempo o emoción.

Modalidades

Agravación

a) POR CAMBIO DE TIEMPO al que es muy sensible como rhus tox o rhodod.; antes y durante tormenta.

b) POR AIRE FRÍO; EN INVIERNO; síntomas de piel agravados durante el invierno : ningún otro lo tiene tan marcado.

c) Por humedad.

d) En coche, tren, BARCO; vértigo en coche, tren, barco (tabac., coccul.) mejora cerrando los ojos y por reposo, con sensación de pesadez en occipucio.

Mejoría

a) EN VERANO, POR CALOR : síntomas de piel mejorados o curados por calor, en verano.

b) Por las comidas; dolores de estómago aliviados cuando come (anac., chelid., sepia).

c) Por reposo.

Síntomas mentales

Carácter IRASCIBLE, VIOLENTO, monta fácilmente en cólera; SUSCEPTIBILIDAD EXAGERADA, enfermiza, se ofende por nada.

Provoca debilitamiento muy marcado de memoria : SE PIERDE AL RECORDAR CALLES QUE CONOCE MUY BIEN.

Si este síntoma aparece después de exposición al sol ardiente, de insolación, dar glonoin. (Farrington).

Muy impresionable; al menor malestar cree que va a morir; PIENSA QUE SU FIN ESTÁ PRÓXIMO, QUE DEBE APRESURARSE A PONER SUS COSAS EN ORDEN.

Puede tener alucinaciones; SE CREE DOBLE, que otra persona está acostada en su lecho a su lado, que hay dos niños en su cama, lo que no hay que confundir con sensación de desdoblamiento de personalidad de anac., bapt., cann. ind., stram., o la sensación de doble de thuya.

MUY ABATIDO, debilitado y este abatimiento puede acompañarse de gran debilidad de vista (Boericke).

Cabeza

Erupción húmeda de cuero cabelludo, erupción costrosa, peor en nuca y orejas.

Cuero cabelludo doloroso al tacto, seguido de entumecimiento.

Cabeza muy sensible, SENSACIÓN COMO SI VIENTO FRÍO SOPLASE SOBRE ELLA; SENSACIÓN DE ENTUMECIMIENTO COMO SI FUERA DE MADERA; OCCIPUCIO PESADO COMO DE PLOMO (opium).

(Boericke).

CEFALEA EN OCCIPUCIO QUE DA IMPRESIÓN DE SER PESADO COMO PLOMO.

Dolor presivo y lancinante que atraviesa de occipucio a ojos, trastorno pasajero de visión.

Para cefalea occipital se parece a gels. : con sensación como si la cabeza estuviera apretada por una venda; bryon., cimic., coccul., jugl. cin.

asociada a trastornos de hígado; nux v., onosod., picr. ac. : agravada por el menor trabajo mental; sang., silic., etc. VÉRTIGO A LA MAÑANA AL LEVANTARSE, AL LEVANTAR LOS OJOS, EN OCCIPUCIO, como si estuviera "intoxicado", o tuviera MAREO.

Dewey, escribe : náuseas peor por movimiento o por andar a caballo, convértigo sobre todo al levantar cabeza y ojos; a veces con vómitos biliosos.

Como tabac., o coccul., petrol. es buen remedio para EL MAREO.

Conviene al dolor de cabeza occipital por viaje en tranvía, o movimiento análogo, con náuseas como en mareo; con vértigo y sensación de hambre, de vacío de estómago (Kent).

Ojos

ÁNGULOS DE PÁRPADOS FISURADOS Y PIEL ALREDEDOR DE PÁRPADOS SECA Y CUBIERTA DE CASPA; BLEFARITIS CILIAR CON GRAN COMEZÓN Y AGLUTINACIÓN DE PÁRPADOS.

PERDIDA DE PESTAÑAS.

BLÉNORREA DE LAGRIMAL; INFLAMACIÓN DE CANAL LAGRIMAL CUANDO LA SUPRESIÓN HA COMENZADO Y UNA FÍSTULA SE HA FORMADO.

Esta tendencia a formación de fístula se ve también en encías, ano, etc.; es un síntoma importante (Farrington).

Para blenorrea de lagrimal comparar a petrol con hep. sulph. calc., merc.

dul., puls., etc. y para fístula calc. carb., fluor ac., silic. etc.

Vista débil; miopía o presbicia; no puede leer letra pequeña sin anteojos.

Sensación de velo ante los ojos.

Oídos

No tiene nada muy característico fuera de lesiones cutáneas de oído externo; eczema, intertrigo en y alrededor de la oreja con fuerte comezón; fisuras de meato.

Boericke da : catarro con sordera y zumbidos; el ruido es insoportable, especialmente de varias personas que hablan en conjunto.

Excesiva secreción de cerumen.

Cara

Tez pálida o amarillenta.

Granitos diseminados en cara.

Piel seca, parece estirada, COMO SI ESTUVIERA CUBIERTA POR DELGADA CLARA DE HUEVO.

Aparato digestivo

BOCA :

Labios agrietados; como cubiertos de barniz opaco, ligeramente azulado.

Gran sequedad de boca, con sed.

Gusto amargo o ácido.

Aliento fétido, a ajo.

Lengua blanca.

Hinchazón de encías con dolores tironeantes al menor contacto.

ESTÓMAGO :

SED EXCESIVA CON DESEO MARCADO DE CERVEZA (kali bich.) REPUGNANCIA POR CARNE (alum., amica. calc. carb., carbo veg., puls., sepia, etc.) Y ALIMENTOS GRASOS (calc. carb., carb. an., carb. veg., hep. sulf., puls.); NO PUEDE SOPORTAR EL REPOLLO (bryon., carb. veg., kali carb.). violenta indigestión de choucrout.

HAMBRE DEVORADORA, con muchos dolores de estómago.

HAMBRE CANINA, SENSACIÓN DE VACÍO DE ESTÓMAGO.

DE GRAN HAMBRE (abrot., alfalfa., anac., calc. carb., cina, iod., lycop., nat. mur., nux v., phosph., psor., sulph., thyr., zinc. met. etc.); HAMBRE DE NOCHE, debe levantarse para comer (cina, phosph., psor., sulph.); ESTE HAMBRE VORAZ PUEDE SER PRONTO SACIADO, como lycop. cinch., cycl., sepia. sulph., etc.

Gastralgia cuando el estómago ESTÁ VACÍO Y QUE SE ALIVIA COMIENDO (anac., chelid., sepia).

HAMBRE DESPUÉS DE EVACUAR.

Eructos calientes, ácidos.

Náuseas a la mañana, náuseas con regurgitación de bocanada de agua; náuseas con vómitos de bilis, peor a la mañana, por movimiento, en barco, auto, durante embarazo.

Es uno de nuestros mejores remedios contra mareo; como coccul.

ABDOMEN Y DEPOSICIONES :

Sensación de frío en abdomen.

Fisuras de ano; fístulas (silic).

Hemorroides con gran comezón, peor de noche por el calor del lecho, porrascado.

Produce diarrea parecida a sulph., deposiciones fétidas y acuosas, con desechos de alimentos no digeridos.

SOBREVIENTEN A LA MAÑANA TEMPRANO, con mucho adelgazamiento; difieren desulph., en que no son exclusivamente matinales, sino continúan todo el día (Farrington).

Puede haber DIARREA SOLAMENTE DE DÍA, acuosa, a chorros, después de comer pollo, choucrout; deposiciones fétidas, con trastornos de estómago, sensación de vacío de estómago, de gran flatulencia y regurgitaciones repitiendo repollo.

Diarrea de día y mejorada de noche, mientras está tranquilo, en reposo.

DESPUÉS DE LA DEPOSICIÓN SENSACIÓN DE HAMBRE QUE IMPULSA A COMER, y lo hace aunque le produzca dolor (Kent).

Aparato urinario

Orina frecuentemente en pequeña cantidad; o la orina escapa constantemente gota a gota después de la micción.

Órganos genitales

1) MASCULINOS : Disminución de apetito venéreo; puede tener poluciones frecuentes.

PRURITO, ENROJECIMIENTO, EXCORIACIONES, SECRECIÓN EN ESCROTO, MUSLOS Y PERINÉ.

Es maravillosamente eficaz con rhus tox., para eczema de órganos genitales de hombre y mujer : erupciones de escroto, pene, vulva, periné.

Rhus tox., produce inflamación violenta de piel en estas regiones, inflamación erisipelatosa con vesículas, ni nódulos y grandes pústulas.

Petrol. pequeñas vesículas que escuecen; y arden; erupciones herpéticas de tendencia erisipelatosa.

Petrol. y rhus tox., son los más usados en erupciones eczematosas de escroto y partes genitales; comezones herpéticos, enrojecimiento y humedad de escroto, piel agrietada, rugosa y sangrante, esto se extiende a caras internas de muslos y periné; erupción eczematosa seca; obstinada, en partes genitales y periné.

Sudor y humedad de órganos genitales en ambos sexos (Kent).

Comparar con : Crot. tig. : prurito intenso en órganos genitales de ambos sexos, muy útil en casos de eczema de escroto con comezón intensa y piel tan dolorosa y sensible al tacto que no se puede rascar (Kent).

Próstata inflamada e hinchada.

Catarro de vejiga y uretra; secreción catarral crónica; gonorrea crónica con COMEZÓN DE MITAD POSTERIOR DE URETRA, lo vuelve loco, lo tiene despierto de noche, se frota, se rasca el periné para aliviarse; esta secreción es blanca o amarilla y el remedio es útil al fin en el período de "gota" o en la primera faz de la gonorrea, cuando hay comezón penosa (Kent).

2) FEMENINOS : PRURITO, SENSIBILIDAD, HUMEDAD, ERUPCIONES ECZEMATOSAS en partes genitales externas; sensación de humedad, eup. perf.

Reglas adelantadas con prurito de partes externas por la secreción de sangre.

Antes de reglas, latidos en cabeza, palpitaciones de corazón (kreosot.).

Leucorrea profusa albuminosa (alum., bórax., bovista, calc. phosph., etc.).

Los pezones tienen caspa blanca con prurito y la piel descama todo el tiempo.

Si las mujeres están debilitadas, estos pezones se inflaman, se hacen hipersensibles al simple contacto de la ropa (cast. equi.) (Kent).

Aparato circulatorio

Sensación de frío, en el pecho, en región del corazón (nat. mur., carb. an.).

Palpitaciones con sensación de presión de corazón, de calor y de fallecimiento.

Aparato respiratorio

1) NARIZ : Fosas nasales ulceradas, agrietadas, en carne viva; la punta de la nariz pica.

Sequedad de nariz.

Ozena con costras y secreción muco purulenta; nariz dolorosa, fosas nasales agrietadas, como graph; espacio naso faríngeo lleno de mucus purulento, que provoca expectoración de flema muco purulenta.

Epistaxis.

2) LARINGE : Ronquera, pérdida de voz.

Tos seca de noche.

3) BRONQUIOS Y PULMONES : Dificultad de respiración al aire frío.

Tos seca, fatigante, del fondo del pecho, cuando se acuesta de noche.

Esto se ve a menudo en niños con diarrea únicamente de día (Farrington).

Espalda y extremidades

Dolores en región lumbar que impiden estar parado (aesc., sulph., agar.) Coxis dolorosa al sentarse.

RIGIDEZ y entumecimiento de miembros.

Dolores tironeantes que aparecen y desaparecen bruscamente.

SENSACIÓN DE MAGULLADURA EN EL CUERPO, PRINCIPALMENTE EN ARTICULACIONES; dolores reumáticos articulares al moverse, articulaciones dolorosas al tacto, con sensación dolorosa de contusión (Kent).

CRUJIDOS EN ARTICULACIONES.

Sensación de ardor en palma de manos o planta de pies.

Sensación de astilla de madera en el talón.

Sudores fétidos en pies y axilas.

Piel

SECA, ÁSPERA, FISURADA, AGRIETADA.

Piel rugosa, agrietada, escamosa, sangrante; tejidos endurecidos, sobretodo palmas de manos y alrededor de uñas, se ulceran y estas ulceraciones se extienden y roen (Kent).

PIEL MALSANA :LA MENOR HERIDA TIENE TENDENCIA A SUPURAR.

PIEL SENSIBLE : soporta difícilmente la ropa.

Gran tendencia a formar en piel vesículas aisladas unas de otras,herpéticas, cubiertas por gruesa costra amarilla con mucha secreción húmeda; a veces no se cubren por esta costra sino revientan y dejan ver una superficie ulcerada que toma la forma fagedénica; ésto se ve sobre todo en dedos, escroto, cara, cráneo, nuca.

Erupciones papulosas, pustulosas, secas, harinosas, generalmente húmedas,que se extienden profundamente.

Erupciones que se forman en el lugar de erupciones antiguas, con aumentode induración en base de erupción antigua (Kent).

Erupción con apariencia de pequeñísimas vesículas rojas y degranitos granuloso; el plano subyacente no es regularmente rojo, pero está cubierto de ligera caspa floja.

Prurito intenso; dolor agravado por rascado y por poco que se rasque,sangra : entonces se produce mejoría (Dr. Baltzer).

ERUPCIONES SECAS, O HÚMEDAS, de cuero cabelludo, detrás de orejas,en escroto, genitales femeninos, manos, piernas, pies.

PEOR EN INVIERNO.

Erupciones húmedas que se cubren de costras gruesas, amarillentas, CONARDOR Y COMEZÓN, peor de noche.

Sabañones rojos, húmedos, con comezón y ardor.

Todas las erupciones pican violentamente.

No tiene reposo si no se rasca y entonces este lugar se hace húmedo,sangrante, en carne viva; inflamado.

COMEZONES SIN ERUPCIONES VISIBLES; se rasca hasta que la serosidad corre,la piel se humedece, sangra y hay sensación de frío (Kent).

Calor y ardor; piel caliente con sensación de frío por partes.

Ardor y comezón en palma de manos o planta de pies; la piel de cara ocráneo arde.

Ardor y comezón van a menudo juntos; los lugares que arden, pican mucho.

Los pies arden con sensación de estar helados.

Sabañones que pican, arden y se ponen violetas.

Las partes heladas pueden, años después, picar, arder, escocer, ponerserojas y calientes.

Puede predecir el deshielo por la comezón de sus sabañones.

Cura comezón y ardor en regiones heladas pero no de manera tan notable comoagáric., que va a la cabeza de los remedios para sabañones, sobre todo cuando afectan partes de tejidos delgados sobre huesos, por ej. dorso de dedos (Kent).

GRIETAS EN PUNTA DE DEDOS Y DORSO DE MANOS.

EXTREMIDADES DE DEDOS ÁSPERAS, AGRIETADAS, FISURADAS, SOBRE TODO EN INVIERNO; MANOS CON GRIETAS, GRIETAS QUE SANGRAN FÁCILMENTE; TRANSPIRACIONES LOCALES en lugares localizados.

SUDOR PROFUSO Y FÉTIDO BAJO LAS AXILAS (calc. carb., hep. sulf. calc.,kali c., nit. ac., tellurium, thuya, sepia, etc.) Y EN PLANTA DE PIES (bar. ac., psor., graph., calc. carb., sanic., silic., etc.).

Relaciones

Complementarios

Sepia.

Antídotos

Phosph., nux v., coccul.

PHOSPHORUS

Fósforo es un cuerpo simple, metaloide, que se extrae de huesos calcinados por el procedimiento de Scheele.

Sólido, flexible, luminoso en oscuridad, transparente reciénpreparado y opaco después de algún tiempo.

Color azul-amarillento; olor aliáceo.

Insoluble en agua, ligeramente soluble en alcohol, glicerina, éter,cloroformo.

Su mejor disolvente es Sulfuro de Carbono.

Para uso homeopático se parte de una solución de fósforo englicerina asociada a alcohol en proporciones tales que la primera dilución es : 1/1.000 ó 3a. decimal.

Acción general del medicamento

Es el tipo de los medicamentos oxigenoides que se adaptan a constituciones en que los cambios son demasiado precipitados, apresurados.

Trae SOBRE ACTIVIDAD INTENSA DE CAMBIOS DE TEJIDOS, ASIMILACIÓN Y DESASIMILACIÓN EXTREMADAMENTE RÁPIDAS, que provocan debilidad.

Su nota dominante es : afecta profundamente la vitalidad y su última etapa de acción : agotamiento de fuerzas orgánicas, abolición del proceso plástico y descomposición de tejidos (Espanet).

Ningún otro tiene, tal vez, acción más potente sobre el SISTEMA NERVIOSO.

Ataca en sus dos centros CEREBRO Y EJE MEDULAR PRODUCIENDO REBLANDECIMIENTO Y ATROFIA con todos sus síntomas concomitantes : POSTRACIÓN, TEMBLORES, ENTUMECIMIENTO, PARÁLISIS (Nash).

Al principio, su acción se caracteriza por SENSACIÓN DE CALOR ARDIENTE EN VARIAS REGIONES, sobre toda piel, con AGITACIÓN, ANSIEDAD A LA CAÍDA DE LA NOCHE e HIPEREXCITABILIDAD DE TODOS LOS SENTIDOS a impresiones exteriores; un síntoma muy característico de esta primera etapa : SE MUEVE SIN CESAR, no puede estar tranquilo un instante, sentado, ni parado; en lugar de agitar sólo los pies como zinc., TODO SU CUERPO SE AGITA.

Una vez producidas las modificaciones orgánicas, se llega al estado opuesto : ANESTESIA Y PARÁLISIS (Nash).

Su acción no se limita a sistema nervioso : alcanza todos los tejidos.

Actúa profundamente sobre MUCOSAS; produce caries y necrosis de huesos; LA SANGRE se hace fluida y pobre, pues tiene acción destructiva sobre GLÓBULOS SANGUÍNEOS : produce DEGENERACIÓN GRASOSA EN HÍGADO, RIÑONES, PÁNCREAS, MÚSCULOS.

Es un gran policresto y si actúa en ciertas regiones del organismo con predilección, como en sistema nervioso, donde determina síntomas que por su influencia preponderante en esta esfera, dominarán toda su experimentación, no hay esfera que le escape completamente (Farrington).

Características

1) CONSTITUCIÓN Y TIPO : Las enfermedades de phosph. alcanzan generalmente a individuos de constitución débil, que nacen enfermizos, crecen demasiado rápido y muy delgados.

Se ven generalmente en sujetos FLACOS, o QUE ADELGAZAN RÁPIDAMENTE, presentan estado de consunción neto.

SUJETOS FRÁGILES, TEZ CEROSA, ENFLAQUECIDOS, ANÉMICOS (Kent).

SIEMPRE FLACO, sin ninguna tendencia a engordar, como calc. ost.

PERSONAS ALTAS, TEMPERAMENTO SANGUÍNEO, PIEL BLANCA, CABELLO RUBIO O PELIRROJO, INTELIGENCIA, VIVA Y DESPIERTA, CARÁCTER IMPRESIONABLE; INDIVIDUOS ALTOS, FLACOS, ESPIGADOS, CABELLO SEDOSO, LARGAS PESTAÑAS DELICADAS, PRETUBERCULOSOS; MUJERES ALTAS, FLACAS, PROPENSAS A ENCORVARSE (Nash).

Morfológicamente, responde al tipo RESPIRATORIO : nariz larga, importante, tórax delgado, muy desarrollado : es la parte que atrae de inmediato la atención por su predominancia (Espiney).

A primera vista, LA CARA tiene ASPECTO ENFERMIZO, RASGOS TIRANTES, PIEL PÁLIDA Y TERROSA, como en la consunción o en los que sufren trastornos constitucionales graves : coloración cambiante, LA MENOR EXCITACIÓN HACE ENROJECER SU CARA; en reposo es pálida, CON HINCHAZÓN DE TEJIDOS ALREDEDOR DE OJOS (apis y kali carb. : palidez de cera que lo hace parecer exangüe; edema e hinchazón de ojos, pero en phosph. es generalizado alrededor de ojos y porción superior de mejillas, en kali carb. se localiza en párpado superior que cuelga como una bolsita llena de agua y en apis en párpado inferior).

Sobre el fondo pálido de la tez, los ojos atraen la atención : grandes, húmedos, sombreados por largas pestañas con ojeras azuladas, a veces tienen gran encanto que comunican a toda la fisonomía (Dr. Espiney).

El sujeto "parece sostener la cabeza con dificultad; TENDENCIA ADOBLAR EL CUELLO HACIA ADELANTE ASÍ COMO TODA LA COLUMNA VERTEBRAL.

Los músculos de su cuerpo descarnado son flojos; visten mal un tórax estrecho y un abdomen relajado y con segmentos digestivos blandos" (Espiney).

Kent observa PTOSIS particularmente de órganos genitales femeninos que tienen ligamentos suspensores relajados y desplazados; también los masculinos son flojos y colgantes.

LOS MIEMBROS DAN EN CONJUNTO IMPRESIÓN DE PESADEZ Y MAL

FUNCIONAMIENTO MUSCULAR (Espiney) : Rígidos, y esta rigidez es rasgo marcado : miembros rígidos como los de un caballo despeado, sobre todo a la mañana; rigidez al comenzar a moverse (Kent).

DEBILIDAD Y TEMBLOR de brazos y piernas por el menor ejercicio; "sacudidas de músculos de muslos y piernas en el momento en que va a dormirse; a veces también estremecimientos espasmódicos estando despierto" (Espiney). INFLAMACIONES MÓRBIDAS DE PIEL; se cubre más o menos de acné o herpes; presenta frecuentes manchas cobrizas, como las de naturaleza sifilítica, principalmente en tórax; manchas hepáticas marrón amarillento salpicadas (Espiney).

MORALMENTE, "da impresión de NERVIOSO; es IRRITABLE, SUS SENSACIONES SON VIVAS Y RÁPIDAS; ES UN FATIGADO QUE BUSCA SIEMPRE APOYO PARA SUS MÚSCULOS DESFALLECIDOS" (Espiney).

Un examen más profundo de su mentalidad muestra que "Es eminentemente entusiasta; sus pasiones son excesivas; inteligencia muy intuitiva pero versátil; atención poco durable; no puede formar ideas generales.

Si los medios de expresión general bastan, llega a ser gran artista, sobre todo músico.

Ultra sensible, se encierra en sí mismo a la menor contrariedad; si surge una dificultad se vuelve febril, fuera de sí; si las complicaciones aumentan, si el dolor se encarna con él se desorienta fácilmente, pues no tiene ninguna fuerza de auto control; quisiera que lo magnetizaran, lo hipnotizaran, que una voluntad más fuerte lo guíe, le quite hasta el trabajo de vivir.

Un paso de más y su sistema nervioso se aplasta definitivamente; el cortejo de angustias lo deshace; en soledad, el miedo a la muerte lo oprime constantemente, por eso no soporta la idea de estar solo; teme la gris oscuridad del crepúsculo, la sombra pesada de la tormenta y la inmovilidad que lo hiela.

Pronto lo invade una especie de coma psíquico, se vuelve indiferente a todo, su comprensión se hace lenta, impotente para pensar claramente.

2) DEBILIDAD IRRITABLE E HIPERSENSIBILIDAD A TODAS LAS IMPRESIONES EXTERIORES : La gran debilidad nerviosa es característica.

Su acción sobre sistema nervioso se puede esquematizar en dos palabras; DEBILIDAD IRRITANTE netamente marcada en muchos de sus síntomas.

Es el origen de la hiperexcitabilidad de todos sus sentidos a impresiones exteriores : no puede soportar luz, ruido, olores; su olfato puede ser tan sensible que el olor a flores lo hace desfallecer; las variaciones eléctricas como las de bruscos cambios de tiempo, particularmente tormentas, lo ponen ansioso y temeroso y agravan todos los síntomas existentes (Farrington).

3) SENSACIÓN DE ARDOR : Sensación de ardor tan marcada como sulph. o ars.; se la puede encontrar en todos los órganos y tejidos.

Puede ser subjetiva o acompañar modificaciones orgánicas de enfermedades graves o con gran elevación de temperatura (Nash).

Síntoma muy característico : "ARDOR EN PALMA DE MANOS; NO SOPORTA TENER LAS MANOS TAPADAS".

Esto es tan característico como el ardor en planta de pies de sulph.

Modalidades

Lateralidad

Derecha.

Mejoría

a) EN LA OSCURIDAD.

b) Acostándose sobre la derecha. c) POR FRÍO : LOS DOLORS DE CABEZA Y ESTOMAGO MEJORAN POR FRÍO Y SE AGRAVAN POR APLICACIONES CALIENTES, alimentación caliente, etc. mientras que lavarse las manos con agua fría los mejora.

TODOS LOS OTROS MALESTARES SE AGRAVAN POR FRÍO Y MEJORAN POR CALOR.

Agravación

a) POR LA PALPACIÓN; b) POR EJERCICIO FÍSICO O MENTAL : c) AL CREPÚSCULO; A LA NOCHE; d) POR CAMBIOS DE TEMPERATURA, TORMENTAS; e) SUBIENDO ESCALERAS; f)

ACOSTÁNDOSE SOBRE LA IZQUIERDA O EL LADO DOLOROSO, g) POR CALOR; dolores de cabeza y estómago se agravan por calor, los otros síntomas no.

h) POR FRÍO; todos sus malestares, excepto de dolor de cabeza y estómago se agravan por frío : sensibilidad de laringe al aire frío; los síntomas del pecho empeoran al aire frío; dolores desgarrantes de muelas a menudo mejorados por calor, mientras que los dolores de cabeza mejoran por frío.

Síntomas mentales

AGITADO, MOVEDIZO no puede sentarse o permanecer tranquilo un momento.

Sin embargo, está SIEMPRE FATIGADO, TIENE SIEMPRE NECESIDAD DE DESCANSAR, EN GENERAL, ESTA MEJOR DESPUÉS DE DORMIR.

MUY DEPRIMIDO, SU FATIGA MENTAL ES SEMEJANTE A LA FÍSICA; desprovisto de todo deseo de acción, HUYE AL MENOR ESFUERZO MENTAL O FÍSICO.

SU CEREBRO LE DA SENSACIÓN DE FATIGA, LA SITUACIÓN, INCAPAZ DE PENSAR Y REFLEXIONAR, de aplicarse al estudio y a trabajos mentales.

Sus ideas no tienen la claridad habitual; las expone lentamente o no puede hacerlo; COMPLETAMENTE INDIFERENTE A TODO LO QUE LO RODEA, aún sus hijos y no se inquieta ya por nada; su mente es tan perezosa que sólo responde muy lentamente, y en ciertos casos extremos, nada responde cuando se le pregunta : TODO LE PARECE TRISTE, ES SOMBRÍO, CANSADO DE LA VIDA, LLORA SIN CESAR.

IRRITABILIDAD DE CUERPO Y ESPÍRITU CON GRAN POSTRACIÓN INTELECTUAL DESPUÉS DEL MENOR ESFUERZO MENTAL Y GRAN LA SITUACIÓN CORPORAL DESPUÉS DE LA MENOR FATIGA FÍSICA (Kent).

Además de estado de profunda depresión sufre de HIPEREXCITABILIDAD NERVIOSA MARCADA.

"MENTE SOBREEXCITADA O, AL CONTRARIO, EXTREMADAMENTE PASIVA, con pérdida de memoria. SUPEREXCITABILIDAD QUE LO MANTIENE DESPIERTO TODA LA NOCHE.

Excitabilidad que llega a éxtasis; ideas violentas y desordenadas" (Kent).t).

ANSIOSO, TEMEROSO, ANGUSTIADO; LLENO DE PRESENTIMIENTOS SOMBRÍOS, MIEDO DE QUE LE PASE ALGO; EL PORVENIR LE PARECE SOMBRÍO Y ESTA LLENO DE APRENSIÓN POR SU ENFERMEDAD, el crepúsculo aumenta su melancolía y angustia, así como las tormentas que determinan en él otros malestares : palpitaciones, temblor, etc.

Esta inquietud de espíritu, esta angustia, lo asemejan a calc. ostr., cycl., lil. tig., nux v., etc.

Miedo de noche, cuando está sola, durante tormenta, tiene miedo y piensa que en los rincones hay seres que lo miran, miedo a la muerte; acon., etc., lleno de ideas locas, raras, miedo de fantasmas (bromium, etc.), está al borde de la locura.

Este estado de excitación que puede volverlo MUY IRRITABLE, COLÉRICO, VIOLENTO, puede llegar a DELIRIO VIOLENTO.

Locuaz, delira, se destapa y queda desnudo, como en delirio de fiebres graves o delirio "A potu".

También puede tener, durante el sueño, ataques de delirio, con accesos de violencia y furor tales que nadie se anima a aproximarsele; y esto puede progresar hasta llegar a reblandecimiento cerebral e idiotez.

El delirio puede tomar forma de EXCITACIÓN SEXUAL; se desnuda sin el menor pudor o trata de satisfacer su apetito sexual sin importarle quién puede ser la víctima.

Puede revestir la forma llamada MANÍA DE GRANDEZAS.

Estos ataques delirantes llegan a estado de COMA, ESTUPOR, APATÍA, en que sólo responde contra su voluntad o nada a lo que le preguntan.

En esto se parece mucho a hyosc. y le sigue bien en manía erótica; también tiene parecido con stram., bapt., rhus tox., y mur. ac. (Farrington).

Sueño

Se duerme tarde de noche y a la mañana, al despertar, le parece no haber dormido bastante.

Durante la noche, sueño agitado; permanece despierto pensando en negocios y forjándose preocupaciones imaginarias o exageradas; a menudo, sueños agitados, lascivos, aún crisis de sonambulismo; SI SE ACUESTA SOBRE LA IZQUIERDA TIENE PALPITACIONES, ANGUSTIA, DOLOR EN REGIÓN DEL CORAZÓN.

La mayoría de síntomas y dolores, en particular los de la cabeza, mejoran durmiendo.

Durante el día, somnoliento, quisiera estar constantemente acostado.

A la noche, después de comer, somnoliento y bostezo, pero si se acuestano puede dormirse.

Cabeza

DOLOR EN LA CABEZA CONGESTIVOS Y CON SENSACIONES DE LATIDO; LA SANGRE SUBE A LA CABEZA, CAUSANDO GRAN SENSACIÓN DE CALOR con rigidez de músculos faciales y mandíbulas y LATIDOS, CHOQUES DOLOROSOS A TRAVÉS DEL CEREBRO; a menudo ACOMPAÑADOS DE HAMBRE y vómitos, enrojecimiento de cara y gran disminución de orina.

Dolores neurálgicos punzantes, lancinantes, desgarrantes, a través de la cabeza.

DOLOR EN LA CABEZA CONGESTIVOS PERIÓDICOS POR TRABAJO MENTAL.

Congestión apopléctica de cabeza.

LA CONGESTIÓN CRÓNICA DE CABEZA ES CARACTERÍSTICA Y LA SENSACIÓN DE ARDOR EN EL CEREBRO, PREEMINENTE; CALOR Y CONGESTIÓN PARECEN SUBIR DE ESPINA DORSAL : este calor que sube de la espalda es más característico en phos. que en ningún otro (Nash).

DOLOR EN LA CABEZA AGRAVADOS POR RUIDO, LUZ, CALOR, MEJORADOS POR FRÍO; AGRAVADOS POR MOVIMIENTO, MEJORADOS POR REPOSO; SE AGRAVAN CUANDO ESTÁN ACOSTADOS, DEBE PERMANECER SENTADO, COMPRIMIENDO SU CABEZA ENTRE LAS MANOS Y CON COMPRESAS FRÍAS; estar en cuarto caliente, tener los pies al calor, las manos en agua caliente, aumentan el dolor de cabeza : los dolores de cabeza o estómago se agravan por calor, aplicaciones calientes, alimentación caliente y mejoran por frío; los otros síntomas físicos tienen modalidad contraria : agravación por frío y mejoría por calor (Kent).

Jaqueca cuyos ataques duran de 1 a 3 días; el dolor parece atravesar el ojo y salir detrás de la cabeza.

SENSACIÓN DE VACÍO, DEBILIDAD EN LA CABEZA, CON FRÍO EN ELOCIPUCIO.

Ningún remedio tiene tanto vértigo como phosph., y Kent dice : EL VÉRTIGO ES SÍNTOMA MUY COMÚN EN EL : Tambalea al caminar como si estuviese intoxicado; vértigo al aire libre; después de comer; a la noche; pesadez y confusión mental; los objetos parecen girar a su alrededor; gran sensación de debilidad de cabeza.

Los vértigos se agravan por fatiga mental, ejercicio, ruido, etc.

Boericke señala : vértigo con desfallecimiento; en ancianos, al levantarse; Nash dice : es uno de los mejores y más indicados para VÉRTIGO DE LOS ANCIANOS.

Síntomas exteriores de la cabeza : cuero cabelludo cubierto de caspa; el cabello cae en placas, dejando zonas de calvicie (CALVICIE EN PLACAS); que a menudo presentan erupción escamosa más o menos abundante.

Puede haber SENSACIÓN DOLOROSA COMO SI LE ARRANCARAN EL CABELLO.

CUERO CABELLUDO MUY SENSIBLE; cuando tiene dolor de cabeza, debe dejarse el cabello suelto.
Sensación de tensión de cara, frente y cuero cabelludo, como si estuvieran apretadas por una venda (Kent).

Cara

CARA PÁLIDA, TEZ ENFERMIZA, OJERAS AZULES, COLORACIÓN CAMBIANTE DE MEJILLAS QUE ENROJECEN A LA MENOR EXCITACIÓN.

En la neumonía de phosph. hay a menudo enrojecimiento circunscripto de mejilla, del mismo lado de la lesión pulmonar (sang.).

DOLORES DESGARRANTES, PUNZANTES, EN TODA LA CARA Y HACIA LOS OJOS, que puede llegar a temporales o del vértex al cigoma; dolores punzantes, desgarrantes de muelas, a menudo mejorados por calor, pero los de cabeza mejoran por frío.

VIOLENTA NEURALGIA FACIAL DE MANDÍBULAS Y TEMPORALES CON SENSACIÓN DE CALOR, CONGESTIÓN FACIAL CON CARA HINCHADA; AGRAVADA CUANDO HABLA O COME (Kent).

CARIE, NECROSIS DE HUESOS FACIALES, PRINCIPALMENTE MAXILAR.

Ojos

Sus síntomas oculares son numerosos; y si no es un gran remedio para las enfermedades de partes externas del ojo, ocupa uno de los primeros lugares en tratamiento de afecciones de globo ocular, retina, corioidea, humor vítreo; muy indicado en afecciones de nervios de ojo.

SENSACIÓN COMO SI VIERA LOS OBJETOS RODEADOS DE NIEBLA.

PUNTOS NEGROS PARECEN FLOTAR ANTE SUS OJOS; VE MEJOR SI PONE SU MANO COMO

PANTALLA SOBRE LOS OJOS.

HALO VERDE alrededor de luz de vela (osmium).

AL LEER, LAS LETRAS PARECEN ROJAS.

Glaucoma.

ATROFIA DEL NERVIÓ OPTICO.

PERDIDA PARCIAL DE LA VISIÓN POR ABUSO DE TABACO (nux. v.).

AMAUROSIS POR EXCESOS SEXUALES.

DIPLOPIA (Boericke).

VISIÓN VAGA; VISTA AGOTADA AL LEER.

VE MEJOR A LA MAÑANA QUE EN EL CREPÚSCULO, CEGUERA MOMENTÁNEA, como por desfallecimiento momentáneo de la vista; LE PARECE ENCEGUECER DE REPENTE (Kent).

PARESIDA DE MÚSCULOS EXTRÍNSECOS DEL OJO.

Párpados que oscilan y tiemblan.

Ardor, enrojecimiento, congestión, DILATACIÓN DE VASOS DEL OJO.

TROMBOSIS DE CAPILARES DE RETINA; y alteración de generativa de células de retina (Boericke).

Los síntomas de ojos, cabeza, cara y mente, se ven sobre todo en TRABAJADORES INTELECTUALES, EL TRABAJO A LA LUZ causa gran afluencia de sangre al cerebro y toda la cabeza sufre por ello (Kent).

Párpados hinchados, edematizados, principalmente el inferior (apis., ars. alb., kali ars.).

Oídos

En el oído, la sordera predomina y tiene la particularidad de que el sujeto ESTA SORDO PARTICULARMENTE PARA LA VOZ HUMANA, síntoma frecuente en ancianos.

RESONANCIA DE SONIDOS.

Aparato digestivo

BOCA :

LABIOS APERGAMINADOS, SECOS, SANGRAN FÁCILMENTE.

ODONTALGIA con dolores lancinantes a menudo calmados por calor; PERIOSTITIS ALVEOLO-DENTAL.

Absceso dental.

ENCÍAS HINCHADAS, SANGRAN FÁCILMENTE, ULCERADAS, MUCOSA BUCAL ULCERADA Y SANGRA FÁCILMENTE.

AFTAS en cara interna de labios y mejillas.

Boca enferma en lactante (Boericke).

LA LENGUA puede presentar diversos aspectos : hinchada, con dificultad de palabra; blanca, pero con predominancia hacia el medio, como bryon.; cargada con capa marrón o negruzca y seca como rhus tox., también con papilas rojas o verdadero enrojecimiento en la punta.

SALIVACIÓN ABUNDANTE con gusto salado o pútrido.

GUSTO AGRIO, SOBRE TODO DESPUÉS DE TOMAR LECHE; A VECES SALADO O DULZÓN; O AMARGO, SOBRE TODO DESPUÉS DE COMER.

GUSTO A HIDROGENO SULFUROSO A LA MAÑANA AL LEVANTARSE.

FARINGE Y ESÓFAGO :

SEQUEDAD CON ARDOR DE GARGANTA, FARINGE QUE DESCIENDE AL ESÓFAGO.

Aumento de volumen de amígdalas y campanilla.

LOS ALIMENTOS TRAGADOS VUELVEN INMEDIATAMENTE COMO SI NO PUDIERAN
DESCENDER AL ESÓFAGO, probablemente por contracción espasmódica del conducto.

APETITO Y SED :

Hay algunas indicaciones muy características : HAMBRIENTO; DEBE COMER A MENUDO O DESFALLECE.
Hambre violenta, poco tiempo después de comer bien.

Debe levantarse de noche para comer.

Hambre terrible durante los dolores de cabeza; siente que va a tener dolor de cabeza porque tiene mucho hambre.

Fiebre con esta característica : hambre durante escalofrío.

Aliviado por la comida, pero enseguida vuelve a tener hambre.

Por todo esto se parece a sodium, chelid., petrol., anacard., etc.

Sed muy particular : como puls., DESEA BEBER COSAS FRÍAS, PERO EN CUANTO SE CALIENTAN EN EL ESTÓMAGO, LAS VOMITA.

La sed es uno de los rasgos más constantes de phosph.; en sus enfermedades agudas o crónicas, sed intensa de bebidas frías, heladas; alivio por ingestión de bebidas o platos fríos (Alivio de trastornos estomacales por frío), pero en cuanto se calientan en el estómago, los vomita y la sed vuelve.

DESEO ANORMAL DE SAL O ALIMENTOS SALADOS; tanto que la consume exageradamente; buen remedio para combatir los efectos de esta práctica; en esto se parece a nat. mur., caust. y conium.

Ha curado el DESEO DE ALCOHOL EN BORRACHOS (Kent).

ESTÓMAGO :

SENSACIÓN DE VACÍO, DEBILIDAD, DESFALLECIMIENTO, EN HUECO DE ESTÓMAGO, HACIA LAS 11 (ver sulph., etc.), pero sobre todo DE NOCHE, DEBE LEVANTARSE PARA COMER ALGO; ESTA SENSACIÓN DE DEBILIDAD NO SE LOCALIZA GENERALMENTE EN HUECO DE ESTÓMAGO, SINO QUE SE EXTIENDE A TODO EL ABDOMEN (Nash).

Hay muchos síntomas de estómago : dolores, náuseas, vómitos, sensación de ardor, etc.

Inflamación de estómago con sensación de ardor que se extiende de garganta a entrañas.

Dolores presivos, ardientes, desgarrantes de estómago; dolores de estómago después de comer; sensibilidad en hueco de estómago; dolores paroxísticos, como si fuera tajeado por un cuchillo, en hueco de estómago, náuseas y vómitos; vuelve el alimento a grandes bocanadas hasta vaciar completamente el estómago; náuseas constantes si tiene algo frío en el estómago; vomita todo en cuanto se calienta en el estómago.

Los síntomas de estómago mejoran por cosas frías y se agravan por calientes; náuseas y vómitos pueden provocarse por el solo acto de poner las manos en agua caliente, entrar en cuarto caliente, comer caliente.

Eliminación de gran cantidad de gases después de comer.

HEMORRAGIA DE ESTÓMAGO, hematemesis; vómito de gran cantidad de sangre coagulada.

ABDOMEN :

MUY SENSIBLE, DOLOROSO AL TACTO.

SENSACIÓN DE FRÍO EN ESTÓMAGO (caps.).

Sensación de vacío, desfallecimiento en hueco de estómago que se siente en toda la cavidad abdominal.

El abdomen parece "relajado"; SENSACIÓN DE PTOSIS, PESADEZ, CAÍDA DE ÓRGANOS EN ABDOMEN.

Borborismos; GORGOTEOS QUE COMIENZA EN ESTÓMAGO, PASA A LO LARGO DEL INTESTINO Y TRAE DEPOSICIÓN INVOLUNTARIA (Kent).

CÓLICOS VIOLENTOS con dolores agudos, violentos, cortantes y hinchazón abdominal y emisión copiosa de gases.

Es uno de los más útiles para EL HÍGADO, en el que presenta muchos síntomas : HEPATITIS AGUDA, HÍGADO CONGESTIONADO, HIPEREMIA, DURO, DOLORS HEPÁTICOS, SENSACIÓN DE PLENITUD, ANCHAS MANCHAS AMARILLAS EN ABDOMEN.

RECTO Y DEPOSICIONES :

HEMORROIDES muy dolorosas, que sangran fácilmente, arden.

Ulceraciones de recto con secreción purulenta y sanguinolenta.

DIARREA ABUNDANTE, SIN DOLOR, PERO EXTREMADAMENTE DEBILITANTE; diarrea abundante con DEPOSICIONES ACUOSAS, EN CHORRO, COPIOSAS, EMITIDAS COMO SI EVACUARA UN ENEMA; profusas, acuosas salen en chorro, contienen trozos blancos como granos de tapioca; secreción de sangre al evacuar, por recto : DEPOSICIONES SANGUINOLentas, CON PEQUEÑOS DESECHOS BLANCOS Y OPACOS COMO HUEVOS DE RANA.

HEMORRAGIA INTESTINAL en fiebre tifoidea y formas graves de enfermedad.

DEPOSICIONES INVOLUNTARIAS COMO SI EL ANO NO SE CONTRAJERA Y QUEDASE ABIERTO; salen involuntariamente con sensación de ano muy abierto.

Después de evacuar, calambres dolorosos en recto, ardor de ano, violento tenesmo.

GRAN DEBILIDAD DESPUÉS DE EVACUAR.

DIARREA CRÓNICA, AGOTADORA, A LA MAÑANA.

CONSTIPACIÓN INVETERADA; DEPOSICIONES LARGAS Y DELGADAS, "COMO PERRO", NEGRAS, SECAS, DURAS, EVACUADAS CON GRAN ESFUERZO.

CONSTIPACIÓN Y DIARREA ALTERNADA EN ANCIANOS (Kent).

Aparato urinario

ORINA ESCASA, TURBIA, COMO CALDO, CON SEDIMENTO ROJO (lycop., sepia, etc.); ORINA BLANCUZCA, TURBIA, ESPESA COMO LECHE.

ORINA ALBUMINOSA, ORINA COPIOSA, ACUOSA, FRECUENTE, O ESCASA.

O TOTALMENTE SUPRIMIDA.

Hematuria.

DOLOR DE CABEZA PERIODICO PRECEDIDO A VECES POR ESCASEZ DE ORINA O MICCIÓN PROFUSA.

Dolores desgarrantes de uretra, punzadas y ardor.

Sensación de ardor en uretra al orinar.

DEBILIDAD PARALÍTICA DE VEJIGA en relación con debilidad de todos los músculos; AUNQUE CON VEJIGA LLENA NO SIENTE NINGUNA NECESIDAD DE ORINAR : NO QUIERE HACER ESFUERZOS PARA ORINAR PORQUE LE AUMENTA EL DOLOR DE VEJIGA.

INCONTINENCIA NOCTURNA EN ANCIANOS por paresia de esfínter (ver sepia).

Cólicos nefríticos y cálculos renales.

DEGENERACIÓN GRASOSA DE RIÑONES.

Útil en DIABETES cuando hay mucha sed, violento deseo de agua helada, alimentos y bebidas fríos; enflaquecido, pierde poco a poco sus fuerzas y se queja de tener cabeza demasiado caliente y extremidades demasiado frías.

Órganos genitales

1) MASCULINOS : Excita de manera irresistible deseos sexuales de ambos sexos; son imperiosos y pueden llevar a delirio erótico.

FUERTE EXALTACIÓN DE APETITO VENÉREO CON DESEO CONSTANTE E IMPERIOSO DE COITO.

A este estado sucede IMPOTENCIA PARA CUMPLIR EL ACTO, PERO LOS DESEOS PERSISTEN AUNQUE LA FUERZA PARA SATISFACERLOS ESTE ABOLIDA.

Los síntomas sexuales van acompañados por otros concomitantes que los caracterizan en conjunto.

Impotencia después de excesos sexuales u onanismo.

Dolor de testículos con hinchazón de cordón espermático.

Hidrocele.

2) FEMENINOS : VIOLENTA EXCITACIÓN SEXUAL, PERO CON AVERSIÓN POR EL COITO.

NINFOMANÍA.

VIOLENTA EXCITACIÓN SEXUAL DURANTE EL COITO CON FALTA DE SENSACIÓN EN VAGINA, COMO SI ESTUVIERA ENTUMECIDA.

Puntadas en vagina que irradian a útero.

INFLAMACIÓN DE OVARIOS CON VIOLENTOS DOLORES HACIA LA CARA INTERNA DE LOS

DURANTE MENSTRUACIÓN.

LLOROSA ANTES DE REGLAS.

Reglas DEMASIADO PRECOCES; secreción roja brillante.

DEMASIADO ABUNDANTE Y DURA DEMASIADO; O PÁLIDA, POCO ABUNDANTE,

SIEMPRE ADELANTADAS Y DEMASIADO LARGAS.

A menudo con dolores constrictivos, desgarrantes, de espalda, agravados de noche; pies y manos frías como hielo; tan cansada y agotada que quisiera estar todo el tiempo acostada; círculo azul alrededor de ojos más marcado; mucho más angustiada, llena de temor y miedo que en otros momentos.

Durante reglas, dolores de cabeza lancinantes, fermentación de vientre, expectoración de sangre, dolor de espalda, latidos de corazón, escalofríos, hinchazón de encías y mejillas y muchos otros, sufrimientos (Jahr).

Si no aparecen reglas, hemorragia supletoria por nariz o pulmones, pues phosph. debe sangrar.

AMENORREA CON HEMORRAGIAS : Bryon. puede tener amenorrea con cefalea y epistaxis, hamam. : si faltan reglas, sangre por nariz, oscura que coagula difícilmente; lach. : reglas irregulares, con palpitaciones de corazón, tufaradas de calor, dolor de cabeza, en menopausia.

Puls., ferr., sen. aur. : epistaxis en lugar de reglas.

Ligera secreción de sangre por útero, como amb. gris., bovista, calc. ost., hamam., sabina, silic., etc.

LEUCORREA BLANCA, ACUOSA, ÁCIDA, MUY EXCORIANTE, que llega a formar ampollas en vulva (ars., amm. carb., kreos., etc.).

INFLAMACIÓN DE SENOS con mucho calor, pesadez y supuración; aspecto erisipelatoso del absceso.

SUPURACIÓN DE SENOS CON SECRECIÓN OFENSIVA, ACUOSA Y ARDIENTE.

Aparato respiratorio

1) NARIZ : Latido de abanico de alas de nariz en congestiones pulmonares (lycop.).

HIPERSENSIBILIDAD DE OLFATO (nux v., carb. ac., aurum, graph., coffea, colch., nux mosch.).

Prurito de nariz que está hinchada, roja, dolorosa al tacto.
 Estornudos frecuentes con sequedad y romadizo, alternando consecreción acuosa, abundante.
 Secreción de mucus amarillento, verdoso, sanguinolento.
 Catarro crónico con pequeñas hemorragias; pañuelo siempre manchado desangre.
EPISTAXIS ABUNDANTE EN LUGAR DE REGLAS.
 Pequeñas epistaxis frecuentes.
PÓLIPOS QUE SANGRAN FÁCILMENTE. (Calcárea, sangu.).
 Osteitis, carie de huesos de nariz.
LARINGE :
INFLAMACIÓN DE LARINGE CON RONQUERA, PEOR AL ATARDECER O ANTES DE LA NOCHE.
GRAN SENSIBILIDAD de laringe al tacto y aire frío.
ARDOR DE LARINGE AL HABLAR; violento cosquilleo de garganta al hablar; no puede hablar por dolor provocado por cosquilleo de garganta.
 Constante irritación de laringe que provoca tos continua.
 Tos por cosquilleo de laringe, peor al aire frío, hablar, leer en alta voz, reír.
 Escorzo, sensación de desolladura, de carne viva en laringe, que también tiene caust., pero con ronquera peor a la mañana, en phosph., al atardecer y se alivia bebiendo agua fría : parece devolverle la voz durante un instante; en phosph. el agua fría lo agrava.
 Tos seca, dura, ronca, que sacude todo el cuerpo y provocada por irritación de laringe.
 La inflamación va de arriba a abajo en vías respiratorias, gana latrámica, con respiración difícil, constricción de laringe, disnea, sofocación, espasmos y constricción de pecho.
BRONQUIOS Y PULMONES :
 Sensación de compresión, de PRESIÓN COMO POR PESO EN ESTERNÓN; SENSACIÓN DE DEBILIDAD EN ESTERNÓN con todos los dolores de pecho (stann., hep.
 sulf. calc., carb. veg., sulfur, phosph. ac.).
SENSACIÓN DE CALOR EN PECHO QUE SUBE A LA CABEZA; tufaradas de calor en pecho que suben;
SENSACIÓN DE AFLUJO DE SANGRE AL PECHO CON O SIN PALPITACIONES.
CONGESTIÓN DE PULMONES, PUNTADAS AGUDAS, en pecho.
 Violentos dolores agudos a la izquierda del pecho, mejorados acostándose del lado derecho (Kent); dolores agudos en base de pulmones.
 Sensación de ardor de pecho.
 Inflamación de pulmones con angustia, disnea con expectoración de sangre roja brillante.
 Rales con tos dura que sacuden todo el cuerpo.
ANSIEDAD, ANGUSTIA, CON RESPIRACIÓN RÁPIDA, DISNEICA, y LATIRDE ALAS DE NARIZ (lycop., chelid., ant. tart., pyrog.) en pulmonía o congestión pulmonar.
VIOLENTO DOLOR DE PECHO CON LA TOS.
 Con la tos, bronquitis, neumonía o síntomas cardíacos, SENSACIÓN DE CONSTRUCCIÓN de PECHO, COMO SI TUVIERA UN VENDAJE APRETADO ALREDEDOR.
ESPUTOS OXIDADOS, SANGUINOLENTOS o PURULENTOS.
HEMOPTISIS REPETIDAS (ARALIUM).
 Violentas hemorragias pulmonares.
EN TUBERCULOSOS, DAR phosph. CON MUCHA PRUDENCIA : tomado demasiado bajo o a menudo puede precipitar el proceso destructivo.
 Tuberculosis pulmonar con supuración rápida de pulmones y formación de cavernas.
Aparato circulatorio
VIOLENTAS PALPITACIONES AGRAVADAS POR movimiento, acostarse sobre la izquierda, al atardecer o sobre todo la noche al despertar, con sensación de congestión sanguínea y sofocación.
VIOLENTO ORGASMO SANGUÍNEO EN PECHO A CADA EXCITACIÓN, por emoción, con sensación de angustia, inquietud, presentimientos, SENSACIÓN DE CALOR EN CORAZÓN.
CORAZÓN DILATADO, PRINCIPALMENTE DERECHO.
 Se aplica especialmente al corazón derecho y sus trastornos, consecuencia de estasis venosa (Farrington).
DEGENERACIÓN GRASOSA DE CORAZÓN con mucha estasis venosa, hinchazón de cara, especialmente ojos.
 Indicado en toda afección cardíaca con sed de agua fría, tan característica; sensación de calor interno y desea beber algo frío para refrescarse el interior del cuerpo.
 Pulso pequeño, rápido, débil.
 Actúa sobre LA SANGRE : la hace más fluida, difícil de coagular, empobrecida, con acción destructiva sobre glóbulos sanguíneos : de ahí, síntomas de anemia característicos y MARCADA TENDENCIA A HEMORRAGIAS; phosph. sangra tan fácilmente que es útil en HEMOFILIA, con arnica, crotal., lach., sulf. ac., etc.
 Espalda y extremidades
 En la espalda, muchos síntomas que dependen de IRRITACIÓN ESPINAL.

COLUMNA VERTEBRAL SENSIBLE AL TACTO, SENSACIÓN DE DEBILIDAD DE RAQUIS, CON TEMBLOR; TEMBLORES EN PIERNAS AL CAMINAR, TROPIEZA, COORDINACIÓN IMPERFECTA DE MOVIMIENTOS, ENTUMECIMIENTO DE ESPALDA Y NUCA, ENTRE HOMBROS, BASE DE RIÑONES; RIGIDEZ AL LEVANTARSE DEL ASIENTO.

SENSACIÓN DE CALOR LOCALIZADA POR ZONAS, A LO LARGO DE COLUMNA VERTEBRAL; SENSACIÓN DE CALOR QUE SUBE POR ESPALDA; sensación de calor intensa, de ARDOR ENTRE OMOPLATOS en afecciones de médula y sistema nervioso; como zincum que tiene mucha sensación de ardor de columna vertebral, son generalmente subjetivos, pero esto no les quita el valor como indicación terapéutica; tienen también sensación de ardor, calor en espalda : Alum., ars. alb., lycop., sulf.

MIELITIS; REBLANDECIMIENTO DE MEDULA; PARÁLISIS ESPINAL PROGRESIVA.

Útil en ATAXIA LOCOMOTRIZ, muchos de cuyos síntomas ha paliado, entre ellos dolores fulgurantes, a veces restaurado reflejos; también ha hecho retroceder síntomas de ESCLEROSIS MEDULAR MÚLTIPLE, cuando hay mucha debilidad y temblor de extremidades (Kent).

Acción electiva sobre VÉRTEBRAS : CARIE DE VÉRTEBRAS en niños escrofulosos (Mal de Pott).

EN EXTREMIDADES, DEBILIDAD PARALÍTICA que se extiende a piernas y brazos, con ENTUMECIMIENTO Y TEMBLOR.

PIES Y MANOS FRÍOS; PUNTAS DE DEDOS ENTUMECIDAS E INSENSIBLES.

Phosph. quiere estar siempre acostado, está agotado, incapaz de caminar; tambalea por debilidad y vértigo; la debilidad lo invade gradual y progresivamente; DEBILIDAD, TEMBLOR, DESFALLECIMIENTO, DEBILIDAD Y TEMBLOR después de todo ejercicio aun liviano, después del menor esfuerzo.

SACUDIDAS Y PUNTADAS, DOLORES COMO RELÁMPAGO, EN MÚSCULOS.

SACUDIDAS EN REGIONES PARALIZADAS.

Las articulaciones flaquean fácilmente (caust.).

LESIONES ÓSEAS DE ARTICULACIONES DE CADERAS Y RODILLAS.

Útil en tumores blandos en estas zonas; en general actúa paralelamente a Silic. y parece completarlo; útil cuando ha solucionado parcialmente estas afecciones.

ARDOR DE MANOS : síntoma tan característico como el ardor de planta de pies en sulf; en enfermedades agudas y crónicas.

NO PUEDE TENER LAS MANOS CUBIERTAS.

SUS TUFARADAS DE CALOR COMIENZAN EN MANOS y se extienden hasta la cara.

Piel

MUCHAS ERUPCIONES, en general, SECAS Y ESCAMOSAS.

LAS HERIDAS, AUN SUPERFICIALES Y LEVES, SANGRAN MUCHO, ANORMALMENTE, HEMOFILIA.

Púrpura hemorrágico; petequias, equimosis.

MANCHAS AMARILLAS en pecho y abdomen; manchas marrones irregulares en el cuerpo.

GANGLIOS HIPERTROFIADOS QUE SUPURAN.

Como en articulaciones, tendencia a formar FÍSTULAS en glándulas; estas úlceras fistulosas tienen borde rodeado de granulaciones exuberantes con secreción purulenta más bien fluida e icorosa; alrededor, phosph. tiene, más que silic., aspecto erisipelatoso que irradia en cadenas inflamatorias, como bell.; dolores ardientes, picantes, con fiebre hética elevada, sudor nocturno, diarrea y ansiedad al atardecer (Farrington).

Fiebre

ESCALOFRÍOS SIN SED a la noche, al acostarse; HAMBRE CANINA DURANTE ESCALOFRÍO.

Calor con sed, sobre todo de noche, a veces con alternancia de calor y escalofríos.

Sudores abundantes sobre todo de noche, hacia la mañana, localizados principalmente en extremos : cabeza, manos, pies.

Fiebre hética con pulso pequeño y rápido.

Relaciones

Complementarios

Ars.; sepia.

Incompatibles

Caust.

Antídotos

Nux v. : útil cuando phosph. ha sido empleado no muy juiciosamente; en todo caso en que ha producido efectos demasiado marcados.

Tereb. : parece antidotar a phosph. por acción química, haciéndolo inerte; también tiene efectos antidotos cuando es dinamizado.

PHOSPHORICUM ACIDUM

O Ácido Fosfórico, compuesto oxigenado de fósforo que se encuentra en estado de combinación en los tres reinos, principalmente en huesos de mamíferos.

Se obtiene tratando fosfato tricálcico por ácido sulfúrico, y se presenta como líquido incoloro, inodoro, muy soluble en agua, sabor ácido.

Las dos primeras dinamizaciones se hacen por procedimientos habituales de dilución Hahnemanniana, con agua; a partir de la tercera, con mezcla igual de agua y alcohol; a partir de la cuarta con alcohol puro.

Acción general del medicamento

Phosph. ac.; actúa profundamente sobre el organismo.

Afecta seriamente SISTEMA NERVIOSO, produce GRAN POSTRACIÓN, AGOTAMIENTO NERVIOSO, la debilidad habitual de los ácidos es más marcada en él que en ningún otro.

Influencia muy marcada sobre TEJIDO ÓSEO en que actúa como phosph., y SOBRE TEJIDO HEPÁTICO Y RENAL.

Determina en TUBO DIGESTIVO, estado atónico característico.

Características

1) CONSTITUCIÓN Y TIPO : Se adapta muy bien a sujetos de temperamento nervioso, primitivamente de constitución robusta, pero a los que el exceso de trabajo o placeres ha llevado a profundo estado de postración nerviosa o fatiga cerebral; a jóvenes que han crecido muy rápidamente, o se han agotado física e intelectualmente. Cada vez que el organismo es expuesto a estragos de enfermedad aguda, excesos repetidos o grandes penas, estamos frente a un caso que puede necesitar phosph. ac.

2) POSTRACIÓN MARCADA Y GRAN DEBILIDAD DE ORIGEN NERVIOSO : A veces causa excitación pasajera, pero su principal característica es PROFUNDA DEBILIDAD NERVIOSA QUE SE MANIFIESTA POR APATÍA, INDIFERENCIA, DEBILITA MIENTO MARCADO DE ESPÍRITU Y CUERPO, COMPLETA DEPRESIÓN SENSORIAL.

Esta debilidad VIENE DE INSUFICIENCIA DE NUTRICIÓN GENERAL; y se ve EN ENFERMEDADES COMO FIEBRE TIFOIDEA, escarlatina, etc., o por AGOTAMIENTO PRODUCIDO POR GRAN ESFUERZO EXIGIDO A UN ÓRGANO O POR ABUSO DE SU FUNCIONAMIENTO : después de excesos sexuales, surmenage cerebral, en viejos bebedores, etc.

Nada tiene en común con la que sobreviene por pérdida súbita y abundante de líquidos humores, como hemorragias, diarrea, etc. como china : por debilidad constitucional orgánica de sistema nervioso, como zincum : es la debilidad habitual de los ácidos; es tan marcada que entraña agotamiento nervioso que trae primero debilidad mental y después física (Nash).

LA DEBILIDAD MENTAL es la primera idea que surge de lo que diceo hace el enfermo y por su aspecto exterior. El cerebro da impresión de gran fatiga; cuando se le interroga responde lentamente o no responde nada contentándose con mirar al que lo interroga; está muy fatigado para hablar o pensar, Dice : no me hable, déjeme tranquilo.

Este estado se ve en enfermedades agudas y crónicas; en casos crónicos, esta fatiga mental, este completo agotamiento es particularmente provocado por largos estudios, preocupaciones prolongadas en hombres de negocios o estudiantes de salud débil, abatidos aún por pocos esfuerzos; en casos agudos, sobre todo en fiebre tifoidea, el enfermo no quiere hablar, ni responder, mira solamente a quien lo interroga; finalmente dice : no me hable, estoy fatigado.

No puede recordar lo que quiere decir, incapaz de formular una respuesta.

Los excesos sexuales, o el vicio solitario pueden ser causa de esta debilidad mental; falta de reacción, estado de turbación, postración mental, como si los centros nerviosos estuvieran vacíos.

DEBILIDAD FÍSICA, IGUAL A SU DEBILIDAD MENTAL; extrema sensación de fatiga en espalda, músculos, en todas partes, verdadera debilidad paralítica.

Más tarde, impotencia sexual equivalente : aversión por el coito, no hay erecciones; en medio del coito, el pene no tiene más erección y no puede terminar (nux. v.) 3) INFLUENCIA DE SHOCKS MENTALES,

PREOCCUPACIONES, PENAS etc. : Depresión característica, resultado de emociones deprimentes tales como penas, pérdida de un ser querido, bienes, posición.

Dos efectos de estas emociones deprimentes parecen más profundamente arraigados que en casos que piden ignat. (ver lach.); el sujeto parece estupefacto por la pena; no tiene ya espasmos nerviosos como ignat., sino desesperación profunda, debilidad y postración general; sus cabellos encanecen, mente fatigada, cansada; mirada desesperada, huraña; se queja de dolor como peso que le aplasta la coronilla, o el occipucio, la nuca.

Parece físicamente agotado y débil, desea estar siempre acostado, detesta la compañía, que se ocupen de él, o le hablen.

Esta depresión se ve también en relación con efectos de onanismo, o excesos de coito.

Remordimiento por debilidades culpables, lo entristece y tiende a caer en desesperación : esto vale para ambos sexos y la depresión es peor si es un joven que crece muy rápido, y agotado moral y físicamente (con calc. ost., engordan demasiado; en phosph. ac., crecen muy pronto) (Nash).

Trastornos o preocupaciones por negocios; tristezas prolongadas; penas de amor; tristeza nostálgica; a continuación languidece y adelgaza, se debilita, su cara se arruga, tiene fácilmente transpiraciones nocturnas; sudor frío a lo largo

de espalda o en brazos y manos más que en pies; extremidades frías; circulación y corazón débiles; toma frío a la menor ocasión; palidez, debilidad y adelgazamiento van en aumento y pueden progresar hasta tuberculosis (Kent).

Modalidades

Mejoría

a) Por calor, manteniéndose al calor, por el calor de la cama.

b) Manteniéndose tranquilo, estando en paz, solo.

c) Por caminar.

Agravación

a) Por esfuerzo físico o mental; cuando se habla.

b) Estando de pie.

c) Acostado sobre la izquierda. d) Al atardecer y de noche.

Síntomas mentales

Son los primeros que aparecen : DESARROLLA SU PATOGENESIA DE LO MENTAL A LO FÍSICO, DE CEREBRO A MÚSCULOS.

Esto es notable y puede ser opuesto a mur. ac., en que la postración muscular aparece primero, precediendo por mucho a los síntomas de cerebro que queda largo tiempo lúcido.

En phosph. ac. a pesar del agotamiento de cerebro, la musculatura persiste largo tiempo en su fuerza; el enfermo parece físicamente vigoroso, puede continuar trabajando físicamente, hacer ejercicios violentos, pero su mente está laxa; gran apatía mental, no puede sumar una columna de cifras; leer un diario ni seguir una idea; olvida los nombres de los miembros de su familia o empleados; no obstante se mueve, pasea; la debilidad muscular sobrevendrá más tarde (Kent).

Estado de GRAN AGOTAMIENTO NERVIOSO (coccul., gels., helleb., kali phosph.); indiferente (apis, china, picr. ac., etc.), no presta ya atención a negocios o cosas de la vida y a las que son más útiles a su interés.

Memoria débil (anac., bar. carb., lycop., nux mosch., sulph., etc.), no puede reunir ideas para reflexionar, o encontrar la palabra justa para expresar su pensamiento.

Comprende difícilmente; postrado, abatido, aniquilado.

En grado más avanzado, da el cuadro siguiente : acostado en gran estado de estupor o sueño estúpido, absolutamente indiferente a todo lo que pasa a su alrededor, pero cuando sale de este estado está plenamente consciente.

Esto se ve en fiebre tifoidea, para la que es uno de nuestros mejores remedios y no hay ninguno que se parezca exactamente al estado depresivo de su sensorio; arnica, tiene esta indiferencia y apatía, pero más profunda, más absoluta, como bapt.; ambos se duermen mientras responden a una pregunta, lo que muestra que el estupor es profundo; en arnica, hay petequias o equimosis que no tiene phosph. ac., ni tendencia a descomposición de humores, manifestada por fetidez extrema de orina y deposición de bapt. opium, sobrepasa a ambos en su poder estupefactivo y su cara, respiración, apariencia general no se encuentran en phosph. ac., rhus tox., y hyosc., presentan también postración y estupor, pero difieren en todos los otros puntos.

Nux mosch., debe mencionarse también (Nash).

Sueño

Somnoliento de día y a la noche temprano y mucha dificultad para despertarse a la mañana.

De noche sueño profundo, a veces agitado, con movimientos de todos los miembros y sueños ansiosos o lascivos.

Cabeza

Los cabellos encanecen temprano, CAEN (nat. mur., selen.).

La caída de cabellos es rasgo saliente, así como de barba, cejas y regiones genitales (Kent).

CABEZA PESADA; SENSACIÓN DE CONFUSIÓN; dolores como si los temporales estuvieran apretados uno contra otro; DOLOR DE CABEZA TRITURANTE; SENSACIÓN DE PRESIÓN DOLOROSA EN VERTEX; AGRAVACIÓN POR SACUDIDAS Y RUIDO.

DOLOR DE CABEZA DESPUÉS DE COITO DOLOR DE CABEZA POR APLICACIÓN SOSTENIDA DE LA VISTA (nat. mur.) (Nash).

Dolores de cabeza congestivos en escolares, por el menor esfuerzo mental o visual.

Dolores periostales; los huesos duelen como si fueran raspados; mejoría por movimiento; acostado el dolor se localiza en el lado sobre el que reposa (Kent).

Dolores de cabeza de mañana.

Dolor de cabeza con dolor que comienza en occipucio para ganar el vértex donde hay sensación como de peso aplastado; agravación por movimiento, luz, conversación.

Vértigos de noche, cuando está parado y camina (Boericke).

Vértigo una vez acostado; le parece que flota; que sus miembros son elevados y flotan mientras su cabeza queda sobre la almohada (Kent).

Cara

Pálida, terrosa, ojos hundidos, anchas ojeras azuladas : a veces sensación DE TENSIÓN EN PIEL COMO POR ALBÚMINA DESECADA.

Labios secos, fisurados, con granitos.

Puede tener sensación de frío en un lado de la cara.

Ojos

Párpados inflamados y fríos.

Dolores en globos oculares como si fueran apretados con fuerza en interiorde cavidades orbitarias.

Dilatación pupilar, ambliopía en onanistas.

Oídos

Sordera; oye mejor a cierta distancia que muy cerca.

O al contrario hiperagudeza de oído; los ruidos musicales son insoportables.

Aparato digestivo

BOCA :

Sequedad de boca sin sed; lengua cubierta de mucus viscoso, tenaz; encías hinchadas, sangran fácilmente, gusto ácido, pútrido.

ESTOMAGO :

GRAN DESEO DE LECHE FRÍA (apis, ars. alb., chelid., rhus tox.).

Le gustan los platos jugosos, aunque frutas, bebidas ácidas, frías, conalimentos pesados que hayan provocado molestias.

ASCO POR PAN (nat. mur., hidrast.), Y POR CAFÉ (cham., flúor ac., lycop.,nux vom., sulph. ac.); desea cosas refrescantes, jugosas, el pan parece muy seco (Jahr).

No ha mostrado acción muy característica en el estómago que sin embargofunciona mal; regurgitaciones agrias, náuseas, vómitos agrios; presión como por peso con deseo de dormir después de comer.

ABDOMEN Y DEPOSICIONES :

Contrariamente al estómago, acción marcada y a menudo comprobada.

Sensación de debilidad en vientre después de deposición normal (Kent).

FERMENTACIÓN Y DISTENSIÓN; borborignos ruidosos y gases.

Cólicos espasmódicos particularmente en región umbilical.

Sensación de magulladura en el abdomen.

Hipertrofia de bazo (ceanothus).

Hemorroides con dolores intolerables estando sentado.

Escozor, tenesmo, prurito y sensación de desgarramiento en ano después deevacuar.

DIARREA ACUOSA, INDOLORA, A VECES INVOLUNTARIA, JAMAS AGOTADORA;DEPOSICIONES SIN DOLORES, BLANCAS O ACUOSAS O AMARILLENTAS; DIARREA CRÓNICA O AGUDA SIN AGOTAMIENTO NI DEBILIDAD MARCADA : resulta curioso que después de hablar de su depresión general, debemos señalar este síntoma característico : LA DIARREA PROFUSA Y A VECES MUY LARGA, NO DEBILITA JAMAS AL ENFERMO.

Las deposiciones son a veces extremadamente abundantes a tal punto queparece imposible que no esté agotado, pero no lo está : diarrea profusa en niños en verano, acuosa, casi inodora, con deposiciones tan copiosas que la mamá pregunta de dónde puede provenir tanta materia acuosa y a pesar de ello el niño parece sentirse bien.

MUCHOS SÍNTOMAS MEJORAN CUANDO LA DIARREA APARECE y se siente mejor :diarrea crónica, abundante, acuosa, blanco gris que no impide sentirse bien, libre y contento; si disminuye, está menos bien : debilidad, postración fatiga cerebral, etc., reaparecen.

Hay enfermos que dicen que sólo se sienten bien cuando tienen diarrea;phosph. ac. es su remedio; podoph., tiene lo contrario, a la más pequeña diarrea, se siente moribundo.

Phosph. ac. : tendencia, después de su gran fatiga nerviosa, de su extremapostración, a ser excelente terreno tuberculoso; si la diarrea sobreviene, la tuberculosis será seguramente evitada (Kent).

No agotadora, no debilitante, la diarrea de phosph. ac. es indolora; seve también bismut., china, ferr. alb., gratiola.

En diarrea por bebidas ácidas, vinagre, hay que distinguir a phosph. ac.

y ant. crud.

Aparato urinario

ORINA MUY ABUNDANTE, CLARA E INCOLORA COMO AGUA; se encuentra en su depresión nerviosa general, y sus casos de cefalea, que, a veces, se alivian por emisión muy abundante de tal orina, como gels.

ORINA LECHOSA, CARGADA DE FOSFATOS, relacionada con desmineralizaciónfosforada; éste es un hecho saliente.

Micción precedida de angustia y seguida de ardor; micciones frecuentesde noche.

Diabetes con poliuria y polaquiuria; la orina parece lechosacuando ha estado depositada un instante; gran debilidad, tos si ha estado expuesto a la menor corriente de aire, sensación de contusión en músculos y ardor en espina dorsal; a veces la orina, muy fosfatúrica se cubre en su superficie, de capa grasosa.

Órganos genitales

1) MASCULINOS : Disminución de poder sexual; testículos blandos, relajados, verga que sólo tiene erecciones difícilmente e incompletas.

Emisión de esperma, protatorrea nocturna o cuando pasa una deposición,aunque sea blanda.

Vesículas seminales inflamadas.

Eczema de escroto (rhus tox., crot. tig., petrol.).

Edema de prepucio e hinchazón de glande.

Herpes prepucial (hep. sulf. calc., nitr. ac.) excrescencias sicóticas (thuya).

Onanismo con depresión cerebral y nerviosa consecutiva (agn. cast., etc.).

2) FEMENINOS :En ciertos casos, amenorrea, pero en general, reglas adelantadas, muy abundantes o duran demasiado; van acompañadas, a veces, de dolores del lado del hígado.

Leucorrea amarillenta con prurito, después de reglas.

Dolores agudos en senos y pezones.

Leche escasa.

Útil para nodrizas agotadas por larga lactancia, cuando existen los otros síntomas de depresión.

Aparato respiratorio

1) LARINGE : Ronquera con escozor y sensación de raspadura en laringe.

Tos continua, por sensación de cosquilleo de laringe, peor a la mañana y a la noche.

2) BRONQUIOS Y PULMONES :ALIENTO CORTO CON IMPOSIBILIDAD DE HABLAR LARGAMENTE.

Opresión espasmódica de pecho, como si estuviera apretado.

Tos con expectoración amarillenta, de gusto herbáceo o expectoración salada a la mañana.

LOS SÍNTOMAS DEL PECHO SE DESARROLLAN DESPUÉS DE LARGO AGOTAMIENTO CEREBRAL, DE GRAN AGOTAMIENTO NERVIOSO.

El aliento se hace corto, respiración difícil; sensación de debilidad en el pecho cuando habla.

(Stann., sulph.); si es un joven de poder cerebral debilitado, indolente, apático, que ha crecido muy rápido, el empleo de phosph. ac. lo puede salvar de la consunción a la que se encamina infaliblemente; si tiene tos con expectoración, esta puede ser copiosa, purulenta, ofensiva; en stann., es espesa, de gusto dulzón.

Este conjunto puede ser provocado no solamente porque el joven ha crecido muy pronto y se ha agotado cerebralmente, sino también por onanismo o excesos sexuales (Nash).

Aparato circulatorio

Palpitaciones en jóvenes que han crecido muy rápido; en onanistas después de tristeza o alegría viva.

Sensación de opresión dolorosa en región del corazón.

Pulso irregular.

Espalda y extremidades

Dolores en espalda y miembros, COMO SI HUBIERAN SIDO GOLPEADOS.

Dolores de cansancio en todo el cuerpo, mejorados por movimiento y agravados por frío; parecen PROFUNDOS, se localizan a lo largo de nervios, pero sobre todo en HUESOS LARGOS donde hay sensación como si fueran raspados con algo rugoso.

Los dolores generalmente peor de noche (Kent).

DOLORES desgarrantes en articulaciones, huesos y periosteo por el que parece tener gran predilección.

NEURITIS DE MUÑONES DESPUÉS DE AMPUTACIÓN.

Extremidades débiles; tropieza fácilmente al caminar y da pasos en falso.

Piel

SENSACIÓN de hormigueo en varias regiones.

Granos, acné, forúnculos.

Úlceras con secreción de pus.

Grandes placas violetas; extravasación de sangre de capilares, equimosis; estos puntos se pueden ulcerar.

Tendencia a abscesos después de fiebre prolongada.

Fiebre

Fiebre con sudor profuso, noche y mañana.

Fiebre adinámica con depresión, apatía completa y estupor; estado tifoideo.

Relaciones

Complementarios

Comparar phosph., puls., picr. ac., silic., mur. ac., en estados tifoideos.

Actúa bien antes o después de cinchona en casos de sudor profuso, diarrea, debilidad; después de nux. v. en casos de desfallecimiento después de una comida.

PHYTOLACCA

O Espinaca de la India, gran planta herbácea de la familia de las Quenopodias, originaria de América Septentrional, casi naturalizada en el Mediodía de Francia, donde se cultiva como planta ornamental.

Para uso homeopático se parte de una tintura alcohólica preparada con toda la planta recogida en el momento de la floración.

Acción general del medicamento

Podoph. ha sido llamado "Mercurio Vegetal"; más valdría reservar este nombre a phytolacca, por el gran número de síntomas que tiene relacionados con este metal.

REMEDIO GLANDULAR preeminente, su acción sobre GLÁNDULA MAMARIA es tan característica como profunda y es de gran utilidad en muchas de sus afecciones.

Actúa sobre MUCOSAS, particularmente de GARGANTA, punto de elección, por lo que se parece a merc.

Efecto marcado lleno de consecuencias sintomáticas interesantes sobre TEJIDO CICATRICIAL, en el que puede provocar induraciones parecidas a graph.

Características

1) CONSTITUCIÓN Y TIPO : Especialmente útil en individuos con diatesis reumática, casos de reumatismo de tejidos fibrosos, también en sujetos sífilíticos o mercurializados, con alteraciones periosteas (Allen).

2) GRAN AGOTAMIENTO Y POSTRACIÓN PROFUNDA (Allen).

3) DOLORIMIENTO Y SENSIBILIDAD DOLOROSA (Allen) : "Sensación dolorosa de rotura en todo el cuerpo que provoca gemidos; pero, como rhus tox. siente necesidad de moverse que lo agrava; muy postrado y el sólo incorporarse le produce debilidad y vértigo, como bryon.

Mucha fiebre, pulso rápido pero todo el calor está en cabeza, como arnica, cuerpo y miembros helados.

Con estos síntomas se trate de difteria, amigdalitis simple o escarlatina, el remedio es phytol" (Nash).

SENSACIÓN GENERALIZADA DE DOLORIMIENTO, SENSACIÓN DOLOROSA, AGITACIÓN Y POSTRACIÓN son sus síntomas guías (Boericke).

Modalidades

Agravación

a) Por humedad, cuando se moja, por cambio de tiempo, agua fría, frío.

b) Por el calor de la cama.

c) De noche.

d) Por movimiento.

Mejoría

a) Por tiempo seco; calor moderado; por descanso.

Cabeza

Dolores reumáticos en cuero cabelludo.

El cerebro parece doloroso.

Dolores atrás de la región frontal.

Intenso dolor de cabeza con dolor de riñones; sensación de dolor, demagulladura; deseo de moverse sin cesar pero el movimiento lo agrava (lac. can., merc., bryon.) (Allen).

Vértigo cuando se sienta en su cama; parece roto de fatiga.

Ojos

Dolores que escuecen; sensación como si tuviera arena bajo los párpados, escozor, ardor en borde de párpados.

Fístula lacrimal (flúor. ac.); lagrimeo abundante con escozor y ardor.

Aparato digestivo

BOCA :

Irresistible necesidad, en niños, de masticar, frotar las encías una contra otra; irresistible deseo de apretar las encías una contra otra (podoph.) durante dentición (Allen).

Lengua muy cargada y seca.

Ulceraciones de mucosa bucal; ulceraciones sífilíticas en boca cuando el conjunto de síntomas concuerda.

FARINGE :

Garganta dolorosa, rojo oscuro; campanilla grande, edematizada, casi transparente (kali bich., rhus tox.) (Allen).

FARINGITIS PARTICULAR en oradores o personas que fuerzan la voz; SENSACIÓN DE ARDOR de garganta, como por algo caliente.

FARINGITIS CON AMIGDALITIS; amígdalas hinchadas, primero muy rojas, muestran puntitos blancos que pronto se vuelven confluentes y se transforman en verdaderas placas blancas; violentos dolores lancinantes de oído del lado enfermo o en ambos (Nash).

FARINGITIS DIFTERICA con amígdalas, campanilla y bóveda palatina, en el istmo, cubiertas por falsa membrana gris ceniza; sensación de cuerpo extraño en garganta con constante deseo de tragar; gran dolor en raíz de lengua, puntadas desde garganta hasta oídos al tragar; dificultad para tragar, y sus manos tiemblan al tener el vaso para beber; no puede tragar líquidos (lach); ardor de garganta como por carbón ardiente; lengua cargada, sobre todo la raíz y roja en la punta; aliento fétido; ganglios cervicales muy inflamados e hipertrofiados.

Phytol. se parece en muchos puntos a merc.

ANGINA sífilítica o mercurial.

Glándulas mamarias

Según Kent su acción principal se localiza en glándulas mamarias.

Dolores y bultos en senos cuando el

tiempo se pone frío y húmedo : dolor de senos cuando toma frío.

Dolor de senos relacionado con reglas :SENOS DOLOROSOS ANTES Y DURANTE REGLAS, QUE SON FRECUENTES Y DEMASIADO ABUNDANTES (conium).

La menor contrariedad es sentida en los senos; después de miedo, enervamiento, senos dolorosos y se forman bolas. Cuando amamanta a su bebe, el seno le duele tanto, tiene tales dolores que irradian a espalda, a lo largo de piernas, a todo el cuerpo, que casi se siente mal.

MASTITIS.

Senos duros, dolorosos; cuando el bebe mama, DOLOR QUE IRRADIA A TODO EL CUERPO; debe elegirse con bryon. pues se completan mutuamente.

Si la mastitis llega a supuración, phytol. puede ser el indicado o silic.

y hep. sulf. calc.; entonces puede compararse con otros remedios :Crot. tigl.; cuando el niño mama el dolor irradia a la espalda; (puls., silic.); phelland. : el dolor corre a lo largo de canales galactóforos entre las mamadas; lac. can. : senos hinchados y tan dolorosos que su propio peso hace sufrir a la enferma que desea que estén sostenidos; acon., bell., y cast. equ., deben tenerse en cuenta (Nash).

Los senos tienen tendencia a empastarse; están duros; hinchados, dolorosos, sobre todo cuando hay tendencia a supuración que parece inevitable; cuando el niño mama, el dolor irradia a todo el cuerpo (el dolor irradia a espalda solamente : crot. tigl.; hacia útero : silic., puls.).

Abscesos de seno; fistulas, pus sanioso, icoroso, fétido (bryon., lac. can., thel.).

Pezones sensibles, fisurados, dolorosos (graph.) dolor agravado por lactancia e irradia a todo el cuerpo (Allen).

CÁNCER DE SENO (conium, calc. flúor., silic.); se debe dar preferencia durante período menguante de luna (Nash).

Antiguas cicatrices de abscesos de seno, que tienen tendencia a inflamarse en un nuevo embarazo.

Aparato respiratorio

Catarro inveterado de nariz con caries óseas.

Ozena sifilítico con secreción saniosa, sanguinolenta y carie de huesos de nariz.

Úlceras corrosivas y afecciones cancerosas de nariz.

Espalda y extremidades

Gota antigua y reumatismo articular; reumatismo agudo que tira a cronicidad con dolores peor de noche, agravados por el calor de la cama, compresas calientes.

Dolores reumáticos fulgurantes, rápidos como una sacudida eléctrica, lancinantes, perforantes, que cambian fácilmente de lugar (puls., kali bich.).

CIÁTICA con sensación de dolorimiento y los dolores lancinantes, tironeantes, latentes, localizados particularmente en CARA INTERNA DE MUSLO y también en cara posterior; estos dolores se agravan por movimiento, presión, y de noche, después del sueño; el calor y reposo los mejoran; gran fatiga con deseo de acostarse.

Un terreno sifilítico es una indicación más.

Dolores periósticos agravados por humedad.

Tumores óseos y periósticos en sifilíticos o mercurializados.

Piel

Disposición a granos, forúnculos.

Forúnculos que se hacen gangrenosos.

Úlceras de piel.

Tendencia a induración de antiguas cicatrices. (Graph.).

Erupciones sifilíticas.

Rash como la escarlatina.

Hinchazón e induración de ganglios.

Relaciones

Phytol está entre rhus tox. y bryon.

Los ayudará cuando aunque parezcan indicados, no actúan con éxito.

Antídotos

La leche, sal, parecen detener la acción de phytol.

Antidota el MERCURIO con el que tiene tantos síntomas parecidos.

Bell., mezer.

PICRICUM ACIDUM

Ácido pícrico o fenol trinitrado, se presenta en forma de láminas amarillo claro, inodoro, pero de sabor muy amargo al que debe su nombre (PICROS, amargo), muy poco soluble en agua.

Las tres primeras dinamizaciones se preparan por trituración; las más elevadas, por diluciones hahnemannianas sucesivas.

Acción general del medicamento

Ataca la fuerza vital y su acción se manifiesta por EXCESIVA LANGUIDEZ o SENSACIÓN PERSISTENTE DE FATIGA con DEBILIDAD MENTAL, indiferencia, abolición de voluntad y deseo indomable de permanecer acostado.

GRAN SENSACIÓN DE PESADEZ EN PIERNAS que apenas puede mover alcaminar; SENSACIÓN DE FATIGA, DOLORIMIENTO DE HUESOS con, a veces, sensación de ardor (phosph. y zinc. met.) en región inferior de espalda.

CEREBRO FATIGADO, el más ligero esfuerzo mental provoca CEFALEA; sobre todo en ESTUDIANTES, HOMBRES DE NEGOCIOS CON SURMENAGE E INDIVIDUOS DEPRIMIDOS POR PENAS O EMOCIONES PROFUNDAS Y PROLONGADAS; se localiza en REGIÓN CERVICO-OCCIPITAL (nat. mur., silic.), se agrava POR TRABAJO CEREBRAL.

Presenta un cuadro perfecto de postración nerviosa y debe ser estudiado con phosph. ac., phosph., arg. nit., sulf., alum., silic. y todos los otros que actúan sobre cerebro, médula y sistema nervioso (Nash).

Acción marcada sobre ÓRGANOS GENITALES, SOBRE TODO MASCULINOS; que es un eco de su influencia sobre sistema nervioso general : provoca DESEO SEXUAL MUY VIOLENTO CON TERRIBLES ERECCIONES pero pronto seguidas por DEBILIDAD Y HASTA IMPOTENCIA CARACTERÍSTICA Y COMPLETA (phosph., y phosph. ac.).

Características

1) LASITUD, FATIGA, POSTRACIÓN, MENTAL Y FÍSICA; FATIGA CEREBRAL; la más ligera excitación, trabajo mental poco importante, dan dolor de cabeza o provocan sensación de ardor a lo largo de columna vertebral (kali phosph.).

LASITUD, FATIGA FÍSICA, desde simple sensación de lasitud hasta verdadera fatiga paralítica.

SENSACIÓN DE FATIGA AGOTADORA EN TODO EL CUERPO, particularmente en riñones, agravada por movimiento.

Picr. ac. es un restaurador de las constituciones agotadas, las que se definen con las palabras : postración, agotamiento nervioso, neurastenia..

2) DOLOR DE CABEZA EN ESTUDIANTES.

HOMBRES DE NEGOCIOS O DE ESTUDIO, RECARGADOS DE TRABAJO; por emociones deprimentes o preocupaciones prolongadas : LOCALIZADAS EN REGIÓN OCCIPITAL, AGRAVADO POR EL MENOR EJERCICIO MENTAL O el menor movimiento.

Modalidades

Mejoría

Al aire libre, al aire fresco; por agua fría.

Agravación

Por el menor ejercicio mental, el estudio, el movimiento; por tiempo húmedo y lluvioso.

Síntomas mentales

Gran fatiga mental con pérdida de voluntad; no tiene más deseos de trabajar.

Postración intelectual después del menor trabajo mental o el menor movimiento.

Cabeza

DOLOR DE CABEZA OCCIPITAL (nat. mur., silic.), agravado por el menor esfuerzo mental, el menor movimiento, particularmente en intelectuales recargados, o después de penas o preocupaciones agotadoras.

Órganos genitales

ERECCIONES VIOLENTAS DURANTE LARGO TIEMPO; pérdidas seminales profusas; satiriasis (canth., phosph.); priapismo en afecciones de médula.

Pequeños forúnculos en cualquier parte del cuerpo, pero principalmente en conducto auditivo externo.

Espalda y extremidades

SENSACIÓN DE ARDOR A LO LARGO DE COLUMNA VERTEBRAL, CON GRAN LASITUD.

SENSACIÓN DE FATIGA, AGOTAMIENTO, EN TODO EL CUERPO, PARTICULARMENTE EN MIEMBROS, AGRAVADA POR EL MENOR EJERCICIO.

PLATINA

Metal precioso existente en arenas auríferas o restos de rocas antiguas, con oro y diamante, en BRASIL, COLOMBIA, SIBERIA, MONTES URALES.

Está mezclado con otros metales de propiedades análogas : osmium, iridium, paladium, rodium, rutenium; separarlo de ellos es largo y difícil y se necesitan numerosas manipulaciones para obtenerlo puro.

Es blanco grisáceo, blando, dúctil, muy tenaz, inalterable al aire, no se oxida a ninguna temperatura y ningún ácido lo ataca.

El remedio homeopático se prepara con espuma de platino o con negro de platino, las tres primeras dinamizaciones por trituración hahnemanniana.

Acción general del medicamento

Según Dewey es DEPRESOR DE SISTEMA CEREBRO ESPINAL que produce TENDENCIA A TORPEZA, PARÁLISIS Y EN ESFERA EMOCIONAL ANSIEDAD, APRENSIÓN, etc.

"Actúa principalmente sobre SIMPÁTICO ABDOMINAL (OVARIOS, ÚTERO).

Por eso es esencialmente femenino, desarrolla en forma muy neta y profunda en esfera útero-ovárica numerosos desordenes que tienen síntomas de tipo espasmódico muy parecidos a los de ciertas mujeres nerviosas de instinto sexual muy pronunciado, como consecuencia de afección genital, parto o miedo, violenta cólera o profunda humillación" (Espanet).

Sus indicaciones generales se basan en dos elementos muy definidos y rigurosamente exigibles : uno MORAL PARTICULAR que consiste esencialmente en DEPRESIÓN MELANCÓLICA PROFUNDA, otro SENTIMIENTO DE ORGULLO O DEMASIADO BUENA OPINIÓN DE SI MISMA, profundo desdén por todos, hasta por lo que ama o venera, y MENSTRUACIÓN DEFECTUOSA, caracterizada por adelanto y abundancia, presión violenta en partes genitales y exaltación violenta de apetito venéreo.

Características

CONSTITUCIÓN Y TIPO : Conviene a MUJERES DE CABELLO NEGRO, fibra rígida, DELGADAS, ASPECTO NERVIOSO Y FATIGADO, tez pálida, con frecuentes tufaradas de calor al rostro, labios secos y agrietados.

ORGULLOSAS Y ALTIVAS, parecen mirar a todos de arriba (lycop. tienen también altanería orgullosa) y humor altivo con síntomas mentales y trastornos genitales característicos.

Síntomas mentales

TODO ORGULLO, ARROGANCIA Y ALTANERÍA : Representa el cuadro de mente femenina pervertida.

Mujeres histéricas que han sufrido gran miedo, excitación nerviosa prolongada, decepción moral, shock psíquico o hemorragias uterinas de larga duración.

Se vuelven arrogantes y uno de sus rasgos más notables es : ORGULLO Y PROPIA ESTIMA DEMASIADO ALTA.

Imagina tener origen aristocrático, que padres y amigos tienen origen humilde y los desprecia : sus relaciones son inferiores a ella.

Y, cosa extraña, tal ilusión se extenderá a su cuerpo : lo imagina muy grande y el de los demás muy pequeño en comparación.

Humor desdenoso, inquieta y seria por cosas que no lo son; se irrita por tonterías, está de mal humor y protesta por contrariedades muy pequeñas; llora fácilmente.

Palpitaciones, temblor de todos los miembros; al menor movimiento.

TIENE MIEDO A LA MUERTE, pero deserta de la vida.

EL MIEDO es síntoma muy saliente.

Tiene miedo de que le suceda cualquier cosa, que su marido ausente no regrese nunca, aunque tenga costumbre de regresar regularmente.

Predisposición a estar siempre inquieta, excitable; se pasea, se mueve y llora.

Imagina que pertenece a otra raza que los suyos y se vuelve realmente LOCA POR TEMAS RELIGIOSOS; se sienta en un rincón, rumia y no dice nada.

Muestra verdaderamente locura; se vuelve PERVERTIDA SEXUAL, tiene ideas indecentes y tiembla.

Los ataques son provocados por contrariedad o cólera.

Silba, canta y baila.

Habla continuamente de cosas imaginarias.

Puede caer en melancolía o locura.

Todo lo que contraría su orgullo puede provocar un ataque.

La excitación sexual también.

Los síntomas mentales habituales se presentan con temblores de extremidades, excitación sexual y sensación de entumecimiento en diferentes partes del cuerpo (Kent).

1) DOLORES QUE APARECEN Y DESAPARECEN BRUSCAMENTE : Bell., cactus, carb. ac., eupat., ignat., kali bich., magn. ph., nit. ac., petrol., strich.

2) DOLORES QUE APARECEN Y DESAPARECEN GRADUALMENTE : Platina, stann., str. carb., syphil., arg. nit.

3) DOLORES QUE APARECEN PROGRESIVAMENTE Y DESAPARECEN BRUSCAMENTE : Ignat., sulf. ac.

4) DOLORES QUE APARECEN PROGRESIVAMENTE : Calc., cinch., radium, silic., tellur.

5) DOLORES QUE APARECEN BRUSCAMENTE Y CESAN PROGRESIVAMENTE : Puls.

LOS SÍNTOMAS FÍSICOS DESAPARECEN CUANDO APARECEN LOS MENTALES Y VICEVERSA.

Jahr escribe : "afecciones morales y físicas alternadas; cuando unas se manifiestan, las otras se disipan y viceversa".

Sensación de COMPRESIÓN : dolores de compresión, COMPRESIÓN DE MIEMBROS COMO SI ESTUVIERAN VENDADOS O COMPRIMIDOS; sensación de tensión de piel de miembros como si estuvieran cubiertos por venda apretada (Kent).

NEURALGIAS; LOS DOLORES AUMENTAN Y DESAPARECEN GRADUALMENTE Y

VAN ACOMPAÑADOS POR SENSACIÓN DE ENTUMECIMIENTO DE REGIONES DOLOROSAS : Arg. nit. : dolores que aparecen y desaparecen gradualmente como : Str. carb., syphil., stann., pero platina no tiene la

debilidad característica del estaño; cham. : entumecimiento de regiones dolorosas, pero el enfermo de plat. no es tan constantemente huraño.

Platina ES HEMORRÁGICO : sangría en diferentes partes del cuerpo y mucosas, particularmente por útero.

Las hemorragias están formadas por COÁGULOS NEGROS MEZCLADOS CON SANGRE LIQUIDA.

Modalidades

Agravación

a) Al descansar; la mayoría de síntomas se agravan en el descanso y se alivian por movimiento.

b) Sentándose o permaneciendo de pie.

c) Al atardecer o la noche.

Mejoría

a) Caminando; por movimiento b) Al aire libre, los síntomas que se alivian al aire libre se agravan generalmente al atardecer en el interior de la casa.

Síntomas mentales

EGOÍSTA, ORGULLOSA, ALTIVA, ARROGANTE, ALTANERO, TODA LLENA DE UN SENTIMIENTO EXAGERADO DE SU PROPIO VALOR, MIRA A LOS DEMÁS DE ARRIBA.

TODO LE PARECE INFERIOR A ELLA, MORAL Y FÍSICAMENTE; los que la rodean le parecen más pequeños que ella, los objetos le parecen más pequeños de lo que son.

Alucinaciones al volver a casa, después de haber caminado cierto tiempo : cree todo lo que la rodea como si fuera muy pequeño, y todas las personas le son inferiores moral y físicamente, y se siente superior a todo y a todos en altura; valor intelectual y moral.

Por este estado mental altanero y arrogante hay que compararlo con lycop., también altanero y arrogante, particularmente cuando está enfermo, muy susceptible, fácilmente irritable; pallad. : muy altanero y pagado de sí mismo cuando está en sociedad, desea ser ponderado, se ofende fácilmente, cree que lo desprecian; ver. alb. : altanero, arrogante, muy orgulloso de su situación, tendencia a hablar de defectos de los demás, busca sus debilidades, para reprochárselas; lach. : orgulloso, susceptible, celoso; phosph. : puede presentar verdadera manía de grandezas.

HUMOR CAMBIANTE, TRISTE O ALEGRE, alternado; tristeza, sobre todo al anochecer, con gran necesidad de llorar, alternada con alegría loca y hasta bufona; llantos involuntarios; humor histérico con gran agotamiento moral, debilidad nerviosa y sobreexcitación de sistema vascular; carácter histérico con alternativas de llanto o risa, sobre todo cuando no son apropiados.

Esto se encuentra también en ignat., croccus, nux mosch., acon.

Asco por la vida con mente taciturna y temor a la muerte; miedos, angustias.

Propensión a cólera por pequeñeces, protesta continuamente.

Gran irritabilidad con mal humor que dura mucho.

Deseo irresistible de matar.

Deseo irresistible en una madre de asesinar a su hijo (Jahr).

Sueño

Bostezos convulsivos y espasmódicos sobre todo de tarde.

Sueño irresistible a la noche.

Sueño corto, agitado, con despertares frecuentes y prolongados.

Sueños espantosos y lascivos.

De noche, se acuesta de espaldas, brazos sobre la cabeza, piernas retiradas y necesidad de destaparse (Jahr).

Despertar, de noche, sobre todo después de medianoche, con pensamientos ansiosos, tristes y penosos (Jahr).

Cabeza

SENSACIÓN DE ENTUMECIMIENTO DE PIEL DE CRÁNEO con dolores presivos de cabeza, taladantes, y DE COMPRESIÓN DE CABEZA.

SENSACIÓN DE TENSIÓN DE PIEL DE CRÁNEO, DE CONSTRICCIÓN PARECIDO ACALAMBRE DE PIEL DE CRÁNEO, que aumenta poco a poco hasta hacerse muy violento.

Sensación de opresión en cabeza.

Sensación de carne de gallina, tirones, ENTUMECIMIENTO DE CUERO CABELLUDO.

Sacudidas súbitas en cabeza.

No hay en cabeza síntoma más persistente que el ENTUMECIMIENTO DE CUERO CABELLUDO; reina en todas las sensaciones, dolores.

A veces, es descripto como "cerebro insensible".

Todos los dolores de cabeza aumentan progresivamente hasta hacerse muy violentos; son provocados por tristeza, miedo, contrariedad, excitación sexual o hemorragia (Kent).

Ojos

Temblor o estremecimientos espasmódicos de párpados.

Temblores, contracciones espasmódicas de músculos de ojos.

Sensación de frío en ojos.

Dolores calambroides en borde de órbitas.

Oídos

Dolores como calambres.

Sensación de entumecimiento que se extiende a cara, nariz, cuero cabelludo.

Insensibilidad de oído externo.

Sensación de frío en oídos; sensación de frío en conducto auditivo.

Cara pálida, tufaradas de calor sin cambios apreciables en piel.

Sensación de frío en cara, de ENTUMECIMIENTO de hueso malar.

Neuralgias faciales, dolores taladrantes, tironeantes, con sensación de entumecimiento.

Aparato digestivo

BOCA :

Sensación de frío.

Dolores de pulsación, taladrantes, agudos, a través de mandíbula inferior, sobre todo derecha, con sensación de entumecimiento y frío.

Sensación como si la lengua estuviera quemada, escaldada.

Sensación de tirones en lengua.

ESTOMAGO :

Pérdida de apetito con estado depresivo mental o apetito voraz; come todo lo que encuentra; come con avidez.

Pérdida de apetito por tristeza (Jahr).

Asco por carne.

Sed repetida, principalmente después de comer o de noche.

Este síntoma es dado por Jousset; Jahr y Clarke, señalan ausencia de sed.

Mucha flatulencia, fermentaciones en estómago.

Eruetos, náuseas persistentes, con gran debilidad y temblor.

Sensación de presión, hinchazón de epigastrio con necesidad de aflojar laropa.

ABDOMEN Y DEPOSICIONES :

Sensación como si todo el vientre estuviera fuertemente comprimido o vendado; sensación de tensión de piel de vientre.

Dolores violentos de vientre, como calambres; dolores tirantes de ombligo, como por un hilo, con sensación de retracción abdominal; dolores presivos, que tiran hacia abajo, de vientre.

Estos dolores se parecen mucho a plumb. y platina se ha usado como antídoto.

Dolores presivos, tirantes, provocados por gases acumulados.

La pesadez de canal intestinal se parece mucho a plumb.

Dolores de abdomen, cólicos después de envenenamiento por plomo (Kent).

Comezón, cosquilleo y tenesmo de ano sobre todo de noche.

CONSTIPACIÓN MUY OBSTINADA, parecida a alum. :DEPOSICIONES QUE ADHIEREN AL ANO COMO ARCILLA BLANDA.

Esta constipación se debe a GRAN INERCIA INTESTINAL, hay frecuentes esfuerzos infructuosos para evacuar, la materia se parece a masilla, como consistencia, y se adhiere al ano.

Materia dura, como quemada, o poco abundante, pero siempre muy difícil de evacuar.

Esfuerzos prolongados, a menudo infructuosos.

Constipación de viajeros, emigrantes, etc.

Dolor de magulladura, y salida de hemorroides durante evacuación.

Aparato urinario

Micciones frecuentes; la orina corre lentamente.

Órganos genitales

EXCESIVO DESEO SEXUAL, SOBRE TODO EN VÍRGENES; DESARROLLO PREMATURO O EXAGERADO DE INSTINTO SEXUAL.

TITILACIÓN, COSQUILLEO CONSTANTE DE ÓRGANOS SEXUALES, INTERIOR Y EXTERIORMENTE, NINFOMANÍA agravada durante embarazo, con pinchazos y titilación que se extiende al abdomen.

"EL EROTISMO SEXUAL es uno de sus rasgos más salientes en mujeres.

Excitación sexual insoportable y sensación de "PIEL DE GALLINA" voluptuosa en partes genitales.

SENSIBILIDAD TAN GRANDE EN PARTES GENITALES EXTERNAS QUE NO PUEDE SOPORTAR EL CONTACTO DE LA ROPA DURANTE REGLAS.

Vagina tan sensible que ES IMPOSIBLE PRACTICAR UN TACTO; esto no es consecuencia de inflamación, sino de GRAN HIPERESTESIA.

Excitación sexual aumentada en niñas o mujeres casadas, con comezón, pinchazos y sensaciones voluptuosas" (Kent).

VAGINISMO; pierde casi el conocimiento durante el coito o mientras la examinan : comparar con bell. : gran sensibilidad durante el coito por sequedad de vagina; kreos. : coito seguido por secreción sanguinolenta; ferr., nat.

mur., apis : hipersensibilidad vaginal asociada con punzadas dolorosas como picadura de abeja en ovarios; thuya, etc.

DOLORES EN REGIÓN OVARICA SOBRE TODO IZQUIERDA; DOLORES ardientes y punzantes de ovarios.

Inflamación de ovarios POR HEMORRAGIA UTERINA O DURANTE REGLAS.

Ha curado tumores, quistes de ovario, ESTERILIDAD, sobre todo causada por gran excitación sexual (Kent).

Inflamación de útero, sensación de tirones de arriba a abajo, como en caída de matriz.

CAÍDA DE MATRIZ Y SENSACIÓN DE PTOSIS DE PELVIS.

Pólipos uterinos y hemorragias uterinas.

NINFOMANÍA CON PROLAPSO E INDURACIÓN DE ÚTERO, COMO aurum.

REGLAS PRECOCES Y MUY ABUNDANTES CON NUMEROSOS COÁGULOS OSCUROS; CON PESADEZ

DOLOROSA EN REGIÓN UTERINA Y ESPASMOS QUE PUEDEN LLEGAR A VERDADERA RIGIDEZ

TETÁNICA, A CONTRACTURAS Y TRISMUS ALTERNANDO CON DISNEA (Farrington).

Puede haber durante reglas DOLORES COMO DE PARTO que aparecen generalmente al principio y cesan una vez establecido copiosamente el flujo menstrual, como lach.

REGLAS PRECOCES Y MUY ABUNDANTES : SECRECIÓN OSCURA, HASTA NEGRA; CONSTITUIDA POR COÁGULOS MEZCLADOS CON SANGRE LÍQUIDA.

La mujer nerviosa de plat. tiene continuamente sensación de que las reglas van a comenzar.

Reglas demasiado tempranas, abundantes y generalmente de corta duración.

La hemorragia menstrual se parece más bien a reglas de mujeres de edad.

Vuelven a veces cada quince días o son completamente suprimidas (Kent).

Reglas demasiado tempranas y abundantes, a veces con dolor de cabeza, inquietud mental y llantos (Jahr).

Hay, con plat., muchos trastornos de embarazo : amenazas de aborto, hemorragias agotadoras, secreción de sangre negra, en coágulos.

Durante el parto, contracciones interrumpidas por hipersensibilidad de vagina y útero-pelviana; Imposible para la partera practicar un examen por hipersensibilidad de vagina.

Calambres en miembros durante parto, o hemorragia abundante, convulsiones histéricas, convulsiones puerperales (Kent).

Aparato respiratorio

Ronquera con sensación de constricción de garganta.

Aliento corto con sensación de peso en el pecho.

Aparato circulatorio

Sensación de dolor precordial; palpitaciones con anginas.

Pulso acelerado.

Espalda y extremidades

Rigidez de nuca.

Sensación de rotura en riñones y espalda.

Posturación, debilidad paralítica de miembros peor en descanso.

Inquietudes, hormigueos, sensación de debilidad y temblor en miembros, sobre todo en reposo y al aire libre (Jahr).

Pequeños movimientos fibrilares en músculos de nuca, espalda y extremidades.

Convulsiones tónicas sin pérdida de conocimiento.

Calambres.

Después de todo esfuerzo mental, temblor, sensación de entumecimiento, estremecimiento o inquietud en miembros.

Sensación de miembros vendados, apretados por venda.

Sensación dolorosa de temblor de cuerpo con latidos de arterias.

Dolores neurálgicos vagabundos; dolores de contracción, constricción que vienen y desaparecen gradualmente; acompañados de entumecimiento.

Exaltación de sensibilidad general; nervios casi siempre en estado de gran excitación..

Afecciones espasmódicas en mujeres histéricas.

Espasmos por eretismo sexual.

Sensación de frío "carne de gallina" y sensación de entumecimiento de piel sobre todo durante fiebre (Kent).

Pies fríos; latidos dolorosos en dedos grandes de pies; dolor en dedo grande como si estuviera fuertemente vendado.

Relaciones

Antídotos

Puls., colch., spir. nit.

Dulc., platina antidota malos efectos del plomo.

Complementario

Palladium.

PLUMBUM

Plumbum metallicum o Plomo metálico, metal blando, gris azulado, muy brillante al seccionarlo, abunda en la naturaleza, pero raramente en estado puro; se encuentra más a menudo en combinación con azufre en forma de galena; las minas más ricas están en Alemania, Francia, Inglaterra.

Para uso homeopático se usa plomo puro.

Se disuelve plomo de uso comercial en ácido nítrico; se sumerge en estadiolución una varilla de zinc a cuyo alrededor pronto se precipita el plomo.

Este precipitado lavado y seco es reducido en mortero a plomo fino que sirve para las preparaciones.

Las tres primeras dinamizaciones se hacen por trituración y las más elevadas, por diluciones sucesivas.

Acción general del medicamento

Provoca modificaciones profundas de tejidos que se traducen en VASO CONSTRICCIÓN interna de todos los pequeños vasos Y ESCLEROSIS PROGRESIVA DE TEJIDOS, PRINCIPALMENTE DEL SISTEMA NERVIOSO, TERMINACIONES DE NERVIOS Y CUERNOS ANTERIORES DE MEDULA.

Esta tendencia a esclerosis de todas las lesiones que provoca, es su característica mórbida, por eso es gran medicamento para estados de esclerosis y muy útil en endurecimiento de tejido orgánico por procesos esclerosos (Boericke).

Las consecuencias de esta acción fisiopatológica se manifiestan por síntomas de parálisis, atonía y atrofia muscular, y violentos dolores espasmódicos, pues provoca violentas contracciones de fibras musculares voluntarias o involuntarias (Cólico de plomo).

Su acción es lenta e insidiosa, no abandona ya al organismo del que se ha apoderado, por eso conviene a casos crónicos sin ninguna tendencia a curación (Kent).

Características

1) CONSTITUCIÓN Y TIPO : INDIVIDUOS DELGADOS, secos, biliosos, MUY DEBILITADOS, tan débiles como flacos, con miembros temblorosos o entumecidos, fríos, azulados.

Piel de cara pálida, brillante, grasosa.

Tienen frío Y NECESITAN ABRIGARSE MUCHO, aun en tiempo caluroso.

Piel de manos y pies arrugada y pies cubiertos de sudor fétido.

2) LENTITUD DE ACTIVIDAD NERVIOSA QUE LLEGA A PARÁLISIS : Llama la atención el estado paralítico de la mayoría de sus síntomas.

La acción de las funciones orgánicas ha disminuido; los nervios no transmiten su influjo con la celeridad habitual, los músculos son lentos; primero hay paresia y finalmente parálisis, al principio en ciertas regiones, luego completa.

Mente debilitada, lenta, comprensión lenta, recuerda con dificultad; percepción difícil no puede recordar las palabras que necesita; elaboración cerebral lenta; cuando se le habla uno se pregunta qué piensa antes de decidirse a responder.

Gran lentitud de percepción en sensibilidad de piel; si se le pincha, sólo reacciona al cabo de un instante.

En afecciones agudas, hiperestesia cutánea, pero en casos crónicos hay anestesia de piel.

Entumecimiento de dedos de manos y pies, planta de pies, que se extiende a piel de columna vertebral.

PARÁLISIS DE EXTENSORES Y FLEXORES, PARTICULARMENTE DE EXTREMIDADES; la parálisis comienza en extensores y cuando pasa a brazos hay caída de muñeca; no puede levantar nada con la mano; extensión difícil; esto se ve en pianistas, no pueden levantar rápido los dedos por parálisis o paresia de extensores, mientras que la flexión de dedos se puede todavía hacer con la rapidez necesaria.

Curare es útil en casos de parálisis de extensores por fatiga, en pianistas, cuando han hecho muchos ejercicios, ejecutando muchas escalas, durante horas.

Rhus tox., puede aliviar estos casos, pero es un remedio agudo que actúa durante poco tiempo y sólo alivia momentáneamente; corresponde a casos en que ciertos grupos musculares han sido agotados y cuando el enfermo ha tomado frío, los músculos agotados se paralizan; el estado de rhus tox.

Llega cuando después de fatiga muscular el enfermo se moja; para el estado crónico que sigue, plumb. y a veces Curare.

Paresia de intestinos; constipación con imposibilidad para hacer esfuerzos cuando evacua; puede servirse de los músculos abdominales pero el recto está paralizado, no puede expulsar la deposición.

Parálisis de vejiga; los músculos vesicales cooperan en expulsión de orina y hay retención (Kent).

3) ADELGAZAMIENTO GENERAL CON GRAN DEBILIDAD Y TEMBLOR DE MIEMBROS : Funciones tróficas muy lentas en su funcionamiento, no compensan con bastante rapidez el desgaste orgánico, adelgaza hasta convertirse en esqueleto.

Piel arrugada; plegada.

Adelgazamiento.

A VECES LOCAL GENERALMENTE EN UNA REGIÓN DOLOROSA : la parte que sufre se deteriora : dolor en pierna, a lo largo del ciático, con puntadas, ardor, sensación como si el hueso fuera arrancado, aserrado, el miembro se atrofia; dolores violentos en plexo braquial, hombro, a lo largo del brazo y el miembro superior se atrofia; neuralgia de un lado de la cara que adelgaza; parálisis de grupos musculares aislados que se atrofian (Kent).

ATROFIA MUSCULAR PROGRESIVA, PARÁLISIS PROGRESIVA.

TEMBLOR, sobre todo en extremidades superiores, con oscilaciones visibles en miembros QUE AUMENTAN POR FATIGA, al fin del día, con cierto grado de pereza motriz o sensitiva, a veces temblor generalizado; temblor de labios, castañeteo de dientes por temblor de maxilares, movimiento de cabeza; parálisis agitante (Jousset).

Modalidades

Lateralidad

Izquierda inferior, derecha superior.

Agravación

a) POR MOVIMIENTO : los síntomas mentales y de cabeza se agravan por el menor esfuerzo, sobre todo al aire libre; paseando al aire libre, toma calor en la cabeza, la cara palidece y las extremidades se enfrían; manos y pies helados, como muertos; si continúa el esfuerzo la cara toma aspecto cadavérico.

No puede hacer movimientos ni continuarlos sin tener las extremidades heladas, pero puede hacer gran esfuerzo mental, sin tener frío.

Esto sólo es causado por ejercicio físico, como caminar al aire libre.

Dolores paroxísticos en miembros al atardecer y de noche, mejorados por presión y agravados por movimiento (Kent). b) Por toque superficial.

c) Por ejercicio mental.

d) De noche.

Mejoría

a) Por fricciones, presión vigorosa.

b) Doblándose en dos. (Cólicos).

Síntomas mentales

PERCEPCIÓN LENTA, lentitud de psiquismo; indiferencia, agitación; tristeza inquietud, temor, debilidad de memoria y mental; asco por el trabajo; torpeza intelectual, descorazonado de la vida.

Lentitud mental, lleno de melancolía, tristeza; sensación de angustia como si le fuera a suceder una desgracia; cuerpo y espíritu débiles, melancolía profunda con timidez e inquietud.

Piensa lentamente, pero piensa mucho; sus pensamientos lo atormentan toda la noche y le impiden dormir; tiene insomnio porque hace un esfuerzo continuo para pensar.

Su cerebro no quiere funcionar, o muy lentamente, no obstante, está lleno de imaginaciones; incapaz de comprender rápido y recordar, pero sus pensamientos lo acosan; a la faz de insomnio puede suceder una faz de coma asociada a supresión de orina.

He aquí una corta observación que ilustrará mejor : hace algunos años, un colega me consulta por su mujer : estaba sin conocimiento desde hacía dos días, después de algún tiempo sin emitir orina y la sonda había mostrado que la vejiga estaba vacía.

Presentaba una serie de síntomas, pero sin características, salvo esto : desde algún tiempo lentitud física y moral; se quejaba de sensación dolorosa de tirón en ombligo como si fuera tirado hacia atrás por un hilo contra la columna vertebral; luego había caído en coma.

Después de una sola dosis de plumb. en alta dilución la orina vuelve al cabo de algunas horas y sale del coma; desde entonces no ha tenido ninguna crisis semejante.

Extremadamente cambiante, pasa de una cosa a otra, de una serie de imaginaciones a otra, de una emoción a otra.

Tendencia a engañar, trampear.

Tendencia a exagerar malestares, a fingir enfermedad.

Verdadero estado histérico con movimientos nerviosos, convulsiones locales histéricas, delirio aparente, entumecimientos locales, dolores cardíacos histéricos.

El acetato de plomo ha producido en una mujer que lo había tomado para suicidarse, estado histérico crónico : en cuanto la miraban entraba en crisis, cuando creía estar sola se levantaba, paseaba, se miraba al espejo para ver cuán biela era; pero en cuanto oía caminar, volvía a acostarse y parecía conocimiento; se la podía pinchar profundamente sin que se moviese y apenas se oía su respiración (Kent).

Miedo de ser asesinado, envenenado; los que lo rodean le parecen asesinos; delirio furioso con intolerancia mental.

Cabeza

Gran sequedad de cabellos.

Vértigo al agacharse o mirar arriba.

Sensación de pesadez de cabeza, sobre todo en occipucio y frente.

Cefalea con zumbidos de oídos.

Estado de estupor apoplético; cuando opium ha sido el simillimum indicado para la reabsorción del coágulo.

Plumb. puede seguirle útilmente; en tales casos puls., phosph., y alum.

convienen : a menudo en casos en que opium fue el remedio al principio; la parálisis muscular o la debilidad parálitica de un lado del cuerpo o de regiones separadas muestra el parentesco del remedio en tales casos (Kent).

Ojos

Casos de intoxicación accidental o experimental con paresia de párpado superior, nistagmus, estrabismo, diplopia, estrechamiento, luego dilatación pupilar y trastornos de acomodación; estos trastornos pueden localizarse del lado paralizado.

La conjuntiva puede tener tinte subictérico y anestesia detegumentos.

Dolor presivo en el ojo, como si el globo ocular fuera muy voluminoso.

A veces útil en glaucoma, especialmente si está en relación con lesión de médula.

Cara

Pálida, cadavérica o amarillo lívida, como de cadáver; de aspecto caquético; a veces grasosa, brillante. (Nat. mur., sanic.).

Aparato digestivo

BOCA :

Seca; BORDE NEGRIZCO O PIZARRA SOBRE TODO EN CANINOS O INCISIVOS, EN TODO EL BORDE DENTARIO ENCÍAS QUE ESTÁN TUMEFACTAS, SANGRANTES, ROJAS, O HINCHADAS Y PÁLIDAS.

Dientes descarnados, cariados y negros.

En cara interna de mejillas y labios, placas pizarra o azuladas.

Aliento fétido, sabor azucarado y astringente, a veces ligero ptialismo.

Lengua blanca y seca, a veces temblorosa.

FARINGE Y ESÓFAGO :

Sensación de bola en garganta; disfagia y sensación de constricción de faringe; parálisis faríngea; incapacidad para tragar; parálisis de esófago.

ESTÓMAGO :

Inapetencia o asco por los alimentos.

Estómago incapaz de digerir; náuseas, vómitos.

Sensación de presión y calambres violentos de estómago.

ABDOMEN :

ABDOMEN DURO Y RETRAÍDO HACIA ESPINA DORSAL; VERDADERA RETRACCIÓN.

EL VIENTRE PARECE HUNDIDO Y SENSACIÓN SUBJETIVA DE RETRACCIÓN COMO SI LA PARED ABDOMINAL ESTUVIERA TIRADA POR UN HILO CONTRA LA ESPINA DORSAL.

CÓLICOS EXTREMADAMENTE VIOLENTOS, QUE IRRADIAN DE TODOS LADOS, EN ABDOMEN, CON DOLORES CONTINUOS, OBTUSOS, QUE PRESENTAN A INTERVALOS PAROXISMOS CON PUNTADAS ATROCES, CALMADOS POR PRESIÓN PROGRESIVA Y CONTINUA EN UNA ANCHA SUPERFICIE, PERO QUE AUMENTAN POR CHOQUE BRUSCO O SACUDIDAS, VIENTRE DURO Y RETRAÍDO, MÚSCULOS ABDOMINALES CON HIPERALGIA A PELLIZCO Y RASCADO.

Dolor de plenitud con sensación de presión tironeante DE HÍGADO (cirrosis); sensibilidad de región hepática a la palpación; ictericia de tegumentos.

ANO Y DEPOSICIONES :

Ano contraído; como tirado hacia arriba con sensación de constricción, tenesmo.

CONSTIPACIÓN VIOLENTA, OBSTINADA; DESEOS INEFICACES DE EVACUAR Y ESPASMOS DE

ANO; DURANTE LOS ESFUERZOS PARA EVACUAR, SENSACIÓN COMO DE CORTADURA EN OMBLIGO QUE ESTÁ RETRAÍDO; DEPOSICIONES DURAS, NEGRAS, EN PEDAZOS, COMO DE OVEJA.

Aparato urinario

Espasmo de cuello vesical; emisión de orina difícil, gota a gota, tenesmo con necesidad frecuente e ineficaz de orinar.

Cólicos con estranguria.

Retención de orina por falta de sensación de vejiga llena.

Actúa sobre riñón y secreción urinaria.

Al principio de intoxicación crónica orina escasa, casi suprimida; neutra o calcárea, bastante oscura; en período final, abundante, pálida, de débil densidad, peso específico poco elevado, albúmina en cantidad variable (NEFRITIS INTERSTICIAL); azúcar en orina.

Órganos genitales

1) MASCULINOS : Anafrodisia que puede llegar a impotencia, o exaltación de apetito venéreo.

Hinchazón e induración de testículos.

2) FEMENINOS : Vaginismo.

REGLAS GENERALMENTE ATRASADAS LLEGANDO hasta AMENORREA.

Dismenorrea espasmódica.

En intoxicación crónica por plumb. en la mujer ABORTOS frecuentes por eso es útil para combatir esta tendencia cuando se reúnen sus características.

En esto se parece a : Alet. far. : tendencia marcada a aborto en mujeres débiles, "con fibra laxa", anemiadas, por larga enfermedad o nutrición defectuosa : sensación de pesadez en región uterina.

Ferr. met. : gran tendencia a aborto por atonía de órganos genitales, en mujeres cloróticas, propensas a flujo, amenorrea, o mujeres pletóricas con gran tendencia a eretismo vascular, cara roja, pulso lleno y fuerte, reglas precoces y muy abundantes.

Helon. : tendencia a aborto por atonía, la menor fatiga o una violenta emoción pueden determinar expulsión de feto.

Lycop. : si las reglas son habitualmente muy abundantes y largas, con prurito y ardor y várices en órganos genitales, gran sequedad de vagina, flujo y gran disposición a melancolía, tristeza y llanto, cefaleas frecuentes, accesos de desfallecimiento y dolor de riñón, etc., sabina : mujeres pletóricas, con reglas muy abundantes y largas, sobre todo si el aborto tiene tendencia a producirse en el tercer mes.

Sec. cor. : disposición a aborto hacia el tercer mes, particularmente en mujeres anémicas, deprimidas, que adelgazan aunque el apetito sea normal.

Aparato circulatorio

Casos de saturnismo, miocarditis esclerosa, hipertrofia de corazón por producción exagerada del tejido conjuntivo.

Violentas palpitaciones espasmódicas de corazón, agravadas cuando está acostado sobre la izquierda, con sensación de angustia marcada en región precordial.

Dolores lancinantes en el corazón.

La auscultación revela ruidos de soplo cardíaco y vascular.

Ruido de galope.

Pulso a veces duro y frecuente durante crisis de cólicos, más a menudo pequeño, blando, depresible, irregular; cae a 50 ó 40 pulsaciones.

La sangre contiene plomo, en saturninos, glóbulos rojos en muy pequeña cantidad y son más grandes : ANEMIA SATURNINA.

Aparato respiratorio

Ronquera que puede llegar a afonía.

Los trastornos pulmonares afectan dos formas : asma aguda con disnea paroxística, ataques de tos penosos, expectoración de esputos grisáceos y coriza fluente; a la auscultación, rales sonoros; y asma crónica en saturninos caquéticos, con tos seca, por accesos paroxísticos, expectoración abundante, opresión extrema, rales húmedos; como consecuencia enfisema y tisis.

Espalda y extremidades

Convulsiones clónicas y tónicas.

A veces, sin pérdida de conocimiento, con cierto estupor, las convulsiones empiezan por temblor generalizado; se localizan en un punto aislado : cara, miembros o grupos musculares; son ordinariamente clónicas, pero pueden ser tónicas y llegar hasta opistótonos.

Útil en ciertas formas de corea o histero-epilepsia.

TEMBLOR, SOBRE TODO DE EXTREMIDADES SUPERIORES, CON OSCILACIONES VISIBLES DE MIEMBROS, que aumentan por fatiga, hacia el fin del día y con cierto grado de pereza motriz o sensitiva; a veces TEMBLOR GENERALIZADO; TEMBLOR DE LABIOS, CASTAÑETEADO DE DIENTES, OSCILACIONES DE CABEZA; PARÁLISIS AGITANTE.

PARÁLISIS MUSCULARES : parálisis de encefalopatía saturnina absoluta, sensitiva y motriz; raramente limitada a miembros superiores o inferiores; más a menudo hemipléjica o limitada a un lado de cara y miembro superior correspondiente.

Todos los músculos de los miembros pueden ser invadidos por parálisis, pero se localiza sobre todo en miembros superiores y principalmente MÚSCULOS EXTENSORES DE ANTEBRAZO que están lesionados; los músculos flexores que no tienen ya antagonistas producen flexión de muñeca y dedos característica que recuerda la de PARÁLISIS RADIAL en la que ha dado resultados sorprendentes.

Consecutivamente a la parálisis se encuentra ATROFIA MUSCULAR PROGRESIVA.

DOLORES, principalmente en músculos y articulaciones.

Dolores de contusión constrictivos y lancinantes, a veces, verdaderos dolores fulgurantes; agravados de noche, por movimiento; mejorados por presión fuerte; aparecen lentamente, desaparecen durante algún tiempo para reaparecer enseguida; a menudo la parte dolorosa se atrofia.

Útil en CIÁTICA CRÓNICA con atrofia muscular; dolores continuos, constrictivos, desgarrantes, agravados por movimiento, de noche, por calor, por presión ligera, mientras una presión fuerte y masaje mejoran.

Hay que recordar para diferenciarlos de plumb. a ammon mur., gels., lycop., visc. alb.

Útil a veces para aliviar DOLORES FULGURANTES DE ATAXIA LOCOMOTRIZ.

Comparar con : Aesc. hip., arg. nit., sec. cor., zinc, etc.

CALAMBRES DOLOROSOS muy frecuentes; localizados en miembros superiores o inferiores; espontáneos o provocados por falsas posiciones, extensión forzada en decúbito de cama.

Otros síntomas interesantes de miembros son : dolores en músculos atrofiados, alternando con cólicos; pérdida de reflejos patelares; edema de maleolos.

Piel

Seca, color "plomo"; manchas marrón oscuro en todo el cuerpo.

Atraso de percepción de sensibilidad.

Anestesia en diferentes partes del cuerpo o a veces, hemi-anestesia.

Relaciones

Antídotos

Alum., bell., nux v., opium, petrol., platina, sulph. ac., antidotan malos efectos de plumb.

PODOPHYLLUM PELTATUM

O manzana de mayo, o Mandrak, que significa Mandrágora, aunque no hay que confundirlo con la verdadera mandrágora que se clasifica entre las solanáceas, es una planta vivaz de la familia de las Berberidáceas; crece en América Septentrional.

Con tintura de madre se preparan las dinamizaciones sucesivas por maceración en alcohol a 90º de raíces y frutos.

Podophyllum, su alcaloide, parece contener todas sus virtudes activas.

Acción general del medicamento

Aplicado exteriormente produce estado de inflamación ulcerativa de piel, parecido a intertrigo.

Si un poco de polvo de la planta entra en los ojos determina inflamación violenta de conjuntiva y verdadera ulceración perforante de córnea.

Su punto central de acción es TUBO DIGESTIVO y particularmente, DUODENO E INTESTINO DELGADO DONDE PROVOCA una especie de gastroenteritis con deposiciones particulares con irritación de recto o PROLAPSO ANAL.

Influencia también de manera muy marcada EL HÍGADO, a tal punto que se puede decir que en él está su principal indicación : determina pereza de este órgano con congestión portal con hemorroides e hinchazón de venas superficiales, dolores en hipocondrio derecho y región hipogástrica, ictericia y subictericia. Influencia en ÓRGANOS GENITALES FEMENINOS donde produce y cura PROLAPSO UTERINO con NEURALGIA DE OVARIO DERECHO.

Características

1) CONSTITUCIÓN Y TIPO : Muy indicado en hepáticos que sufren trastornos gastro intestinales o cólicos hepáticos (especialmente después de abuso de merc.).

2) ACCIÓN SOBRE HÍGADO Y CUADRO DE HEPATISMO : Útil para hígado perezoso, crónicamente congestionado; hinchado, sensible, doloroso, una suave fricción sobre hipocondrio derecho lo alivia.

Cara y escleróticas teñidas de amarillo; mal gusto en boca y lengua extendida, conserva marca de dientes cubierta de espesa capa amarilla o blanca.

Bilis espesa que puede llegar a solidificarse en cálculos.

Deposiciones constipadas y color amarillo, muestran retención biliar odiorréica.

Todo esto se parece mucho a merc. en esfera hepato-digestiva, y ha hecho merecer a podoph. el nombre de merc. VEGETAL.

3) DIARREA CARACTERIZADA POR ABUNDANCIA DE DEPOSICIONES; OLOROFENSIVO; AGRAVACIÓN A LA MAÑANA, EN TIEMPO CALUROSO, Y EN EL NIÑO, DURANTE DENTICIÓN.

Modalidades

Agravación

a) Temprano, a la mañana (aloe, nux v., sulf.).

b) En tiempo caluroso.

c) Durante dentición.

d) Lado derecho : afecta particularmente la derecha, hipocondrio derecho, ovario derecho, lado derecho de garganta.

Síntomas mentales

Moral deprimida, desanimado; imagina que va a morir o que está muy enfermo (ars. alb.); asqueado de la vida.

Cabeza

Cefalea matinal con sensación de calor en vértex.

Dolores de cabeza alternados con diarrea (aloe); o por temporadas; dolor de cabeza en invierno, diarrea en verano.

Aparato digestivo

BOCA :

LENGUA GENERALMENTE CARGADA, ENSANCHADA, HÚMEDA, CONSERVA LA MARCA DE LOS DIENTES (merc., ars. alb., stramon., rhus tox., yuc. fil.); MAL GUSTO EN BOCA a veces llena de mucosidades viscosas y abundantes.

Sensación de ardor en base de lengua.

Dentición difícil; gemidos y crujir de dientes DE NOCHE; INTENSO DESEODE APRETAR ENCÍAS UNA CONTRA OTRA (phytol.); cabeza caliente y gira de un lado a otro (bell.).

GARGANTA :

Sensación de sequedad con dolores que irradian hasta oídos, sobre todo lado derecho.

ESTOMAGO :

Pérdida de apetito y falta de deseo de otra cosa que ácidos; sobre todo MUY SEDIENTO; mucha sed de grandes cantidades por vez. (Bryon.).

Regurgitaciones alimenticias, pirosis; sensación como si tuviera un agujero; vacío, en estómago, pero sobre todo NAUSEAS Y VÓMITOS biliosos o mucosos; vómitos no tan acentuados como ipeca, pero con esfuerzos sin vómitos muy marcados como sec. corn.

ABDOMEN :

SENSACIÓN DE DEBILIDAD, DE PTOSIS; sólo está bien acostado sobre el vientre.

Ptosis abdominal después de parto.

BORBORIGMOS Y GASES EN COLON ASCENDENTE :

En enfermedades crónicas de intestino (Nash).

Nat. sulf. se le parece mucho en esto.

Dolores y borborismos en colon transversal a las 3 hs con diarrea.

Dolores calambrosos de intestino con retracción de músculos abdominales a las 10 y a las 17; sensación de calor en intestinos con deseo de evacuar.

SENSACIÓN DE PLENITUD DOLOROSA EN HIPOCONDRIO DERECHO; LO FRICCIÓN SINCESAR O MANTIENE CONSTANTEMENTE LA MANO APOYADA allí.

HÍGADO DOLOROSO.

CONGESTIONADO, HIPEREMIA DE HÍGADO.

HEPATITIS CRÓNICA.

CÁLCULOS BILIARES Y CÓLICOS HEPÁTICOS.

RECTO Y DEPOSICIONES :

Diarrea con DEPOSICIONES ACUOSAS, EXTREMADAMENTE ABUNDANTES y tales que ninguna parece vaciarlo; o MUCOSAS y menos abundantes, pero SIEMPRE EXTREMADAMENTE OFENSIVAS; TEMPRANO A LA MAÑANA.

Para esta diarrea, lo que lo hace preferir a aloes, apis, sulf., rumex onophris, es que no tiene tanta urgencia para emitirla; DEPOSICIONES ABUNDANTES, amarillentas o grises, tan abundantes que asombran; contienen a menudo restos alimenticios sin digerir y MUY FÉTIDA diarrea larga, temprana, continua a la mañana y seguida por deposición normal a la tarde (aloe), con sensación de debilidad, de ptosis de abdomen o recto.

Diarrea después de comer o beber (arg. nit., ars. alb., china, croton, staph.); deposiciones normales pero demasiado frecuentes de día y agotadoras; diarrea y constipación alternadas (ant. crud.).

Deposiciones frecuentes, (phosph., gamb., etc.) como tiza o gelatina (aloe) o con restos mal digeridos (cinch., ferr.), o acuosas, que dejan sedimento harinoso amarillento; fétidas, con tenesmo; o precedidas por cólicos, con retortijones, calor y dolores de ano.

Diarrea en niños durante dentición; después de comer; de bañarlo o mojarse; pañal completamente empapado de agua salada (benz. ac.).

HEMORROIDES, PROLAPSO ANAL; se puede comparar con aesc., aloe, arnica, bell., ferr., ign., mur. ac., phosph., ruta, sepia, sulfur., etc.)

Órganos genitales

DOLORES EN REGIÓN OVARICA, PARTICULARMENTE DERECHA, QUE IRRADIAN A MUSLO DEL MISMO LADO (lil. tigr.), CON, A VECES, SENSACIÓN DE ENTUMECIMIENTO DE ESE SECTOR.

Dolor en útero y ovario derecho con gases que pasean en colon ascendente.

PROLAPSO UTERINO; sensación como si el útero quisiera salir con la deposición; sensación de ptosis.

Prolapso uterino después de embarazo.

Reglas suprimidas.

Durante primeros meses de embarazo, sólo puede estar acostada confortablemente sobre el vientre (acet. ac.). (Allen).

Espalda y extremidades

Dolores entre hombros, bajo omoplato derecho, en riñones, región lumbar.

Dolor en región inguinal derecha con puntadas, a través de muslos del mismo lado hasta la rodilla.

Debilidad parálitica de lado derecho.

Ataques repentinos de dolores espasmódicos.

Calambres violentos en pies, piernas, muslos, con deposiciones acuosas y sin dolores (Allen).

Fiebre

Fiebre con paroxismo hacia las 7 h, con dolores en hipocondrio, rodillas, tobillos y muñecas; gran locuacidad durante estados de escalofrío y calor, mientras duerme durante el sudor, que es muy abundante.

Relaciones

Antídotos malos efectos de merc.

Actúa bien después de ipeca y nux v. en afecciones gástricas; después de calc. ostr. y sulf. en afecciones de hígado.

PULSATILLA NIGRICANS

O Anémone de los prados, planta de la familia de las Ranunculáceas, que no debe confundirse con anémone pulsatilla, pulsatilla vulgaris.

Crece en Europa en colinas elevadas y descubiertas, lugares elevados y sacudidos por vientos; tiene bonita flor, cuyo nombre "flor de los vientos" está relacionado con los síntomas del remedio, veleidoso e inconstantes.

Las diferentes dinamizaciones se preparan partiendo de una tintura madre obtenida por maceración en alcohol de toda la planta recolectada en el momento de su floración.

Acción general del medicamento

No parece tener acción muy marcada sobre sistema nervioso, sino sobre ESTADO MENTAL en que determina síntomas característicos muy útiles para su elección.

Pulsatilla tiene acción muy marcada e importante sobre APARATOCIRCULATORIO, particularmente SISTEMA VENOSO en que causa ESPESAMIENTO DE SANGRE QUE BAJO SU INFLUENCIA SE HACE MENOS FLUIDA Y MAS NEGRA.

Esto produce atascamiento de capilares, lentitud de circulación y esta éstasis venosa trae trastornos tales como disminución de cambios y calor vital, estado cianótico de extremidades, várices, etc.

Sus grandes modalidades son : congestiva venosa que ve SU ESTADO AGRAVADO POR TODO LO QUE DISMINUYE SU CIRCULACIÓN.

MEJORA POR TODO LO QUE PUEDE ACTIVAR CAMBIOS Y ESTIMULAR VASOS Y TEJIDOS.

Acción muy profunda sobre MUCOSAS donde produce ESTADO CATARRALcaracterístico que se traduce por SECRECIONES AMARILLO VERDOSAS Y NO IRRITANTES.

Para el Dr. Nebel, sus secreciones no son otra cosa que VERDADERAS CRISIS ESPONTANEAS DE ELIMINACIÓN DE TOXINAS : bajo su influencia y la de la congestión venosa que produce los órganos excretores habituales eliminan mal; el organismo se sirve de superficies mucosas para desembarazarse de toxinas pidiendo a las glándulas de esta región hacerlo.

Por eso conviene en último grado de enfermedades agudas y principio de crónicas : en el primer caso restablece el orden normal de eliminaciones disminuyendo irritabilidad de mucosas; en el segundo disminuye intoxicación crónica autógena activando circulación venosa y descongestionando órganos : es EL TIPO DE REMEDIOS DE DRENAJE (Dr. Nebel).

Si no parece tener acción sobre serosas viscerales lo tiene sobre SINOVIALES ARTICULARES donde produce estado reumático particular.

Características

1) CONSTITUCIÓN Y TIPO : AUNQUE afecta tanto a hombres como mujeres parece ESPECIALMENTE ADAPTADO AL ORGANISMO FEMENINO, y cuando se trata de hombres, afecta particularmente a los que TIENEN TIPO FEMENINO.

En general RUBIAS, DE CARNES BLANCAS Y OJOS AZULES.

2) CARÁCTER PARTICULAR :Es extremadamente importante y puede ser su indicación más preciosa. CARÁCTER SUAVE, FÁCIL, SILENCIOSO Y SUMISO, INCLINACIÓN MARCADA ATRISTEZA; FÁCILMENTE TRISTE Y DESANIMADA, LLORA POR NADA Y POR TODO.

BUSCA CONSUELO QUE LE AGRADA Y LA MEJORA, contrariamente a nat. mur. Que tiene disposición suave y llorosa, pero huye del consuelo que postra y agrava.

Aunque triste y fácilmente melancólica como ignat., otro gran remedio paramujeres, no tiene su humor reconcentrado : BUSCA LA SIMPATÍA DE LOS QUE LA RODEAN, HACIÉNDOLOS PARTICIPES DE SUS PENAS; ignat. no es la mujer suave de puls; sin duda, esta última puede a veces estar enervada y ser gruñona, pero es más bien mal humor que verdadera irritabilidad y cólera; no es irascible como sepia que presenta esto en grado marcado, o nux v. o cham. SU PENA SE DISIPA TAN FÁCILMENTE COMO NACIÓ, en accesos de alegría y risa, a veces exorbitantes; sus ideas son numerosas pero MUY CAMBIANTES.

Si está muy enferma toma el aire de resignada, sufre sus penas sin quejarse,cae fácilmente en manía religiosa, miedo mórbido al sexo opuesto.

Sus quehaceres domésticos la inquietan sin descanso, sobre todo a lamaanana, a veces el temor a la muerte la impulsa a suicidio con tendencia a ahogarse.

De noche no puede dormirse, lo consigue muy tarde, después de medianoche,brazos levantados y manos detrás de la cabeza.

3) EXTREMA VARIABILIDAD DE SÍNTOMAS :Otra característica es : EXTREMA VARIABILIDAD DE SÍNTOMAS.

Los mentales son extremadamente variables, muy inconstantes : ya de malhumor; o llora; o suave y amable; pasa sin razón de alegría a llanto.

Los síntomas físicos ofrecen la misma variabilidad : neuralgias en sitiosvariables : dolores erráticos que se desplazan rápidamente de un punto a otro; cuando son articulares, van acompañados a veces de enrojecimiento e hinchazón de articulación; hemorragias intermitentes que corren, luego se detienen, recomienzan, sin que nada aparente lo explique; diarrea variable : jamás dos deposiciones iguales.

Hace un exposición en que los síntomas cambian a cada instante, todo esuna mezcla variable, lo que cuentan no tiene al primer examen pies ni cabeza (Nash).

Esto no es exclusivo de puls., se encuentra en amb. gris., nux mosch., ignat., etc.; el diagnóstico deberá hacerse por las otras características.

4) CONGESTIÓN VENOSA CON TEZ VIOLÁCEA DE TEJIDOS : Piel violácea como lach.; pero en éste se debe a lo que se podrá llamar "estado venoso" de sangre arterial con falta de oxigenación; en puls. es consecuencia de marcada congestión venosa.

Puls. ES SOBRE TODO UNA CONGESTIVA VENOSA : venas como obstruidas por una especie de estasis venosa que da gran calor a la piel y aspecto rojo violáceo a la cara; y esta plétora, que es falsa plétora, puede acarrear HINCHAZÓN, SOBRE TODO EN EL MOMENTO DE LAS REGLAS : hinchazón de cara y párpados; de vientre; pies tan hinchados que no puede calzar, rojo violeta; todo esto mejora por aparición de flujo menstrual.

Muchas mujeres tienen reglas atrasadas y durante este período, cara hinchada, violácea o marmórea, vientre hinchado, disnea, no pueden respirar en pieza caliente, quieren que se abran las ventanas; se sofocan en cama caliente, de noche; pero un ejercicio lento al aire libre alivia; estómago tan hinchado, que da tal sensación de plenitud que no tienen ningún deseo de alimento; y esto aumenta hasta la aparición de reglas cuyo flujo alivia todos los síntomas (Kent).

5) ESTADO CATARRAL DE MUCOSAS.

Este estado catarral es tan importante que merece ser repetido aquí, pues va acompañado de características importantes : "POR CONGESTIÓN VENOSA.

LAS MUCOSAS INFLAMADAS SE PONEN ROJO VIOLETAS, HINCHADAS; CON SECRECIÓN CATARRAL ESPESA, AMARILLO-VERDOSO, VERDE SOBRE TODO, Y SUAVE; ESTA SUAVIDAD ESTA AUSENCIA DE IRRITACIÓN DE LA SECRECIÓN SE RELACIONA CON LA SUAVIDAD DE CARÁCTER; a veces son mal olientes, o sanguinolentas, pero JAMAS IRRITANTES, SALVO A VECES LA DE VAGINA" (Kent).

Modalidades

Unilateralidad

Los síntomas pueden presentar su máximo ya a la derecha, ya a la izquierda.

Agravación

a) POR CALOR; EN PIEZA CALIENTE : "El estado general y el mental se agravan en pieza caliente; sofocación, aumento de dolores y sensación de frío, en pieza caliente; escalofríos nerviosos cuando transpira en pieza caliente.

Agravación por acumulación de ropa, por vestidos abrigados; quiere llegar ropa delgada aún en tiempo fresco; no tiene necesidad de abrigarse mucho; si tiene ropa gruesa y abrigada, o muchas frazadas en la cama, se agrava" (Kent).

b) POR REPOSO : que le es nocivo, aunque es difícil hacerle hacer ejercicio, le hace bien.

Fatigada a la mañana al despertar, y de noche no desea acostarse porque no tiene sueño.

c) CUANDO LA PRESIÓN BAROMÉTRICA AUMENTA; con aproximación de tormenta (rhodod.).

d) DESPUÉS DE COMER : síntomas nerviosos y mentales se agravan después de comer; muchos se relacionan con debilidad de estómago y mala digestión (Kent).

e) POR ALIMENTOS GRASOS; POR ALIMENTOS PESADOS.

f) ACOSTADO SOBRE EL COSTADO DOLOROSO.

g) SÍNTOMAS DE ESTÓMAGO PEOR POR LA MAÑANA, mentales por la noche (Kent).

h) Tiene síntomas provocados : DESPUÉS DE HABERSE MOJADO POR LLUVIA, DE HABERSE MOJADO LOS PIES.

Mejoría

a) AL AIRE LIBRE, POR APLICACIONES FRÍAS A PESAR DE LO FRIOLENTA QUE ES.

Es muy friolenta; sus dolores van acompañados de esta sensación constante.

Cuanto mayor es el dolor, más frío tiene (dolores con transpiración abundante : cham.; con desvanecimiento; hep. sulph. calc. : con micciones frecuentes : thuya; con delirio : ver. alb.).

Y a pesar de esta sensación de frío, está mejor al aire libre; lo desea; no puede soportar el calor del verano a menos de hacer mucha hidroterapia fría.

"Los síntomas inflamatorios, reumatismos, neuralgias se alivian por aplicaciones frías, comiendo y bebiendo frío; las bebidas frías alivian aunque no tenga sed; el agua helada hace bien mientras atraviesa el esófago y estómago la conserva así; los alimentos fríos son bien digeridos, los calientes calientan el cuerpo y agravan síntomas (Kent).

b) POR MOVIMIENTO : mejora caminando al aire libre, sobre todo con tiempo fresco y claro; se alivia POR MOVIMIENTO LENTO A PLENO AIRE; SE AGRAVA CUANTO TRATA DE ESTAR TRANQUILA, EN REPOSO; está mejor cuando hace algo : generalmente, un movimiento moderado y lento.

El alivio por movimiento lento, la agravación por reposo, el alivio al aire libre agravación en habitación caliente, nos dan un buen resumen de sus modalidades principales.

Algunos medicamentos tienen también esta modalidad.

Puls., ferr., son los más característicos.

Los que se alivian por movimiento rápido, quieren andar rápido : Ars. alb., y bromium.

Al contrario, todo movimiento que calienta al enfermo de puls. lo agrava (Kent).

c) ACOSTÁNDOSE SOBRE EL LADO DOLOROSO (bryon).

Síntomas mentales

KENT resume en el cuadro siguiente el conjunto de síntomas mentales de puls.

"FALSA PLÉTORA QUE DA ENGAÑOSA APARIENCIA DE SALUD, y hace que no se crea que no se siente bien.

Sin embargo LLORA FÁCILMENTE, NERVIOSA, AGITADA, CAPRICHOSA PERO SUAVE, FÁCIL DE CONVENCER Y CONDUCIR.

Aunque siempre llora y en el fondo es de naturaleza fácil, es FÁCILMENTE IRRITABLE, NO AGRESIVA, PERO FÁCILMENTE HERIDA, EXCITADA; se cree siempre ofendida y piensa que no le prestan atención.

MELANCOLÍA, TRISTEZA, LLANTOS, DESESPERACIÓN : DESESPERACIÓN RELIGIOSA, particularmente : llena de CAPRICHOS E IDEAS VARIABLES.

IMAGINACIONES, y MUY EXCITABLE.

Imagina que es peligroso cultivar la sociedad de personas del sexo opuesto o hacer ciertas cosas consideradas por la sociedad útiles a la humanidad y estas imaginaciones interesan tanto a las cosas materiales, la alimentación por ejemplo, como las morales : se imaginará que no está bien tomar leche y no la tocará; que ciertos platos perfectamente comestibles no son buenos para la especie humana y rehusará tocarlos.

Tendrá aversión muy marcada al casamiento; también se ve en un hombre que se hace la idea de que es malo tener relaciones con su mujer y se abstiene.

Tendencia a rumiar temas religiosos, obsesionada por las Santas Escrituras de las que se sirve en forma equivocada con propia desventaja; preocupada por su santificación que llega a fanatismo y locura; imagina ser una admirable santa o, al contrario, estar condenada por sus faltas; esto durará hasta que se vuelve completamente loca, pasará el día triste y taciturno, sentada silenciosamente en un rincón, sin responder a preguntas y si lo hace será solamente por si o no moviendo la cabeza.

MUJER JOVEN QUE ERA SUAVE, FÁCIL Y LLORONA, LUEGO SE HACE TRISTE Y TACITURNA Y PERMANECE SENTADA TODO EL DÍA, SIN DECIR NADA NI RESPONDER A LAS PREGUNTAS MAS QUE CON SI O NO O UN MOVIMIENTO DE CABEZA.

LOS SÍNTOMAS MENTALES VAN A MENUDO ASOCIADOS A TRASTORNOS UTERINOS U OVÁRICOS (Kent).

CARÁCTER SUAVE, SUMISO, PROFUNDAMENTE SIMPÁTICO, GRAN TIMIDEZ; enrojece en cuanto le dirigen la palabra.

TRISTE, MELANCOLICA, ENCIERRA SU PENA EN SI MISMA, LLORA FÁCILMENTE PERO UNA BUENA PALABRA LA CONSUELA FÁCILMENTE; esta tendencia a llorar por nada recuerda a graph., ignat., sepia.

VACILANTE, IRRESOLUTA, SE DESANIMA PRONTO, pero manifiesta GRAN RESIGNACIÓN con su suerte a la que no tiene energía para dominar.

MIEDO MÓRBIDO AL SEXO OPUESTO, MELANCOLÍA RELIGIOSA, ANSIEDAD, INQUIETUD PROFUNDA de todo y por todo IMPULSO SUICIDA CON PREFERENCIA AHOGARSE.

Recuerda a : Amb. gris : profundamente triste, melancólica, con aspecto de vejez prematura; débil, vacilante, desea estar solo; la música lo hace llorar; caust. : carácter melancólico, triste, llanto fácil; excesiva simpatía por los otros; teme que les suceda una desgracia y ve todo negro; graph. : triste, profundamente desalentado, melancólico, infeliz, llora sin cesar sin razón; la música lo hace también llorar; ignat : triste melancólico, taciturno, lanza profundos suspiros, concentra sus penas en sí mismo, llora por nada, pero pasa con extrema facilidad de las lágrimas a la risa. Nat. mur. : triste y melancólico rememora constantemente recuerdos desagradables, llora muy fácilmente; cuando tratan de consolarlo, llora más.

Sepia : triste, abatida, llora sin cesar, muy inquieta por su salud; llora al contar su miseria, pero de carácter difícil que nada tiene en común en el dolor de puls.

Sueño

Somnolencia durante el día, principalmente a la tarde, no puede llegar a dormirse de noche; sólo encuentra el sueño muy tarde y a menudo tiene crisis de insomnio por tufaradas de calor por orgasmo sanguíneo.

Duerme de espaldas, las manos por encima de la cabeza; no puede dormir acostada sobre la izquierda porque le da palpitaciones, disnea.

Sueño agitado, entrecortado por despertares frecuentes y sueños incoherentes o fijos sobre el mismo objeto.

Al despertar está entumecida, indiferente.

Nux v., sulph., y coccul. tienen también sueño difícil pero mientras puls. está bien despierta de noche, espíritu alerta, nux v. se duerme en ese momento.

Coccul., tiene insomnio con sobre actividad cerebral que impide dormirse, la más ligera privación de sueños causa náuseas.

Sulph., tiene ese sueño característico que se ha comparado a "sueño de gato", el más ligero ruido lo despierta.

Cabeza

CEFALALGIA CON DOLORES LANCINANTES, DESGARRANTES EN PROMINENCIAS FRONTALES Y REGIÓN SUPRAORBITARIA, AGRAVADO POR TRABAJO MENTAL, REPOSO Y CALOR, MEJORA POR MOVIMIENTO, CAMINANDO O PASEANDO LENTAMENTE. (Ferr.).

A MENUDO LOS DOLORES SON MÓVILES, VAN DE UN LUGAR A OTRO DE LA CABEZA.

DOLOR DE CABEZA UNILATERAL, ESTALLANTE, CON NAUSEAS, VÓMITOS, CUANDO HA SOBRECARGADO EL ESTOMAGO, SOBRE TODO CON ALIMENTOS GRASOS. (Nux v., bryon.).

Dolor de cabeza que comienza en región temporal derecha, con lagrimeos calientes del lado enfermo.

Hemicrania principalmente derecha (act. rac.).

Hay que recordar que los dolores de cabeza unilaterales son, como muchos otros síntomas localizados en un solo lado del cuerpo, especiales de puls. : transpiración de un solo lado de cabeza y cara "fiebre" de un solo lado del cuerpo, un lado fresco y normal, el otro caliente.

CEFALEA ALIVIADA APRETANDO FUERTE LA CABEZA (apis y arg. nit.).

"Dolores de cabeza en escolares en la proximidad de las reglas.

Dolores de cabeza con las reglas.

DOLORES DE CABEZA RELACIONADOS CON REGLAS SUPRIMIDAS O DESORDENES

MENSTRUALES; no provocados, sino ligados a estos estados.

Dolores de cabeza antes, durante y después de reglas, pero en generalantes, cuando hay estado general de congestión, de éstasis venoso con mejoría cuando las reglas comienzan, si el flujo es normal.

Es frecuente encontrar dolores de cabeza y síntomas nerviosos del remedio, durante reglas, cuando la secreción es tan poco abundante, apenas una especie de leucorrea sanguinolenta, con algunos coágulos durante el día solamente" (Kent).

EL DOLOR DE CABEZA DE puls., ES CONGESTIVO, LATENTE, CON MUCHO CALOR EN LA CABEZA, MEJORADO POR APLICACIONES FRÍAS, PRESIÓN EXTERIOR, A VECES POR MOVIMIENTO LENTO, Y SE AGRAVA ESTANDO ACOSTADO, TRANQUILO; AUMENTA AL ATARDECER Y MAS, POCO A POCO, DE NOCHE; ESTA PEOR MOVIENDO LOS OJOS O AGACHÁNDOSE.

DOLORES A MENUDO LATENTES, CONGESTIVOS" (Kent).

Ojos

SECRECIÓN PROFUSA, AMARILLO VERDOSO NO IRRITANTE, SUAVE como todas las de puls.

PÁRPADOS INFLAMADOS, AGLUTINADOS; INFLAMACIÓN DE BORDE MARGINAL DE

PÁRPADOS, en una o varias glándulas sebáceas, con enrojecimiento de esclerótica y conjuntiva, secreción abundante de mucus espeso que de noche forma costra o aglutina reborde ciliar de párpados.

Sensación de dolor, ardor y escozor o dolor como si tuviera arena entre párpados y globo ocular, o puntadas (Clarke).

GRANULACIONES EN BORDE MARGINAL DE PÁRPADOS QUE APARECE AQUÍ O ALLA, EN GRUPOS GRANDES COMO CABEZAS DE ALfiler, párpados inflamados y sangran fácilmente.

Cada vez que toma frío repercute en ojos y nariz; los ojos enrojecen inflamados y la conjuntiva segrega mucus espeso, amarillo verdoso.

MEJORA LAVANDO LOS OJOS CON AGUA CALIENTE O TIBIA O AUN FRÍA, que da sensación de bienestar contraria a sulph. que se agrava por lavado : en este remedio los ojos arden, escuecen y se ponen más rojos después de lavarlos.

Afecciones catarrales de ojos en recién nacidos; oftalmia de recién nacidos, que tienen a menudo necesidad en los primeros días de vida, del mismo remedio constitucional que la madre.

ORZUELOS (Kent).

Antes de reglas, principalmente en niñas, todo se oscurece antes de los ojos, COMO SI TUVIERA DELANTE

NIEBLA, UN VELO, con manifestaciones nerviosas, espasmos, desvanecimientos.

En primeras fases de parálisis de nervio óptico, puls. es gran remedio : el enfermo frota continuamente sus ojos como si tuviera una niebla o velo, haya o no mucosidad en conjuntivas y mejora por fricción.

COMEZÓN DE OJOS QUE CONCUERDA CON SÍNTOMAS DE PIEL; COMEZÓN DE OJOS, OÍDOS, NARIZ; COSQUILLEO DE LARINGE Y GARGANTA (Kent).

Oídos

OTORREA CON SECRECIÓN CARACTERÍSTICA : SECRECIÓN ESPESA, MALOLIENTE, NO IRRITANTE, A VECES SANGUINOLENTA.

OTALGIA EN NIÑOS.

Indicado en dolor de oído en niños regordetes, congestivos, de cara rosada, carácter fácil, pero lloran todo el tiempo.

En otalgia sin características, en niños de constitución difícilmente individualizable, se dará al azar puls. que será buen remedio temporario, pues está estrechamente ligado a dolor de oído.

Dolor de oídos al atardecer o de noche, mejorados paseando lentamente al niño en la pieza.

Cham. : otalgia con parecida mejoría paseando al niño en brazos; el niño de cham. y puls. desea ser entretenido.

Uno y otro jamás están contentos y lloriquean; cham. es huraño y malo, puls. en el fondo es fácil; si no está distraído da gritos plañideros, el de cham. da gritos coléricos, dan ganas de acariciar a uno y azotar al otro.

OTITIS MEDIA; ABSCESOS DE OÍDO MEDIO CON SECRECIÓN ABUNDANTE, ESPESA, PRIMERO SANGUINOLENTA, LUEGO AMARILLO VERDOSA QUE CONTINUA HASTA RUPTURA DE TÍMPANO. He encontrado tales estados endémicos en merc., hep. sulf. calc., Y puls.

Afecciones catarrales de oído medio después de rubéola, escarlatina, fiebre eruptiva cualquiera, con secreción fétida. Inflamación e hinchazón de oído externo; estado erisipelatoso con tez violeta; costra sobre el trago (Kent).

Cara

Aspecto malsano, TEZ AZULADA, VIOLÁCEA O MARMÓREA, a menudo manchas amarillas; con frecuencia HINCHADA POR PLÉTORA VENOSA.

A veces COLOREADA, ROJA, CON ASPECTO DE SALUD ENGAÑOSA, que hace que uno crea que está enferma.

Tufaradas de calor que hacen enrojecer mejillas.

A veces rasgos tirantes y grandes ojeras azules.

Pálida, verdosa, clorótica.

LABIO INFERIOR HINCHADO, GRUESO, ESPESO, SECO, PARTIDO EN MEDIO.

(Apis, bar. carb., bell., calc. ost., hep. sulf. calc.) tienen LABIOSUPERIOR HINCHADO.

Estremecimiento convulsivo de músculos de cara.

DOLORES NEURÁLGICOS QUE COMIENZAN EN REGIÓN TEMPORAL DERECHA CON LAGRIMO ABUNDANTE DEL MISMO LADO; NEURALGIA DE TRIGÉMINO QUE COMIENZA A LA NOCHE, A MEDIA NOCHE; escalofríos con dolores localizados principalmente a la derecha.

Tienen fácilmente manchas erisipelatosas que se extienden a cuero cabelludo, con ardor y escozor; en este momento, piel de cara muy sensible al tacto (Kent).

Aparato digestivo

BOCA :

BOCA SECA, SIN SED : esta ausencia de sed que acompaña la gran sequedad de boca es característica.

Este síntoma se ve en apis mel., coccul, lycop., nux mosch., ars. alb., y bryonia tienen boca seca, pero con mucha sed.

MAL GUSTO EN LA BOCA A LA MAÑANA AL DESPERTAR, o pérdida de gusto yolfato; bryon. : mal gusto a la mañana, al despertar, con lengua saburral, pero tiene gran sed.

Gusto amargo de todos los alimentos, particularmente pan.

Gusto salado, a grasa, a bilis.

Saliva con gusto dulce, a veces acumulación de saliva en la boca o demucosidades tenaces.

LENGUA CARGADA, cubierta de mucus blanco o amarillento tenaz.

ODONTALGIA PULSATIL agravada a la noche al calor del lecho, por alimentos calientes, por tacto, mejorada dejando calentar en la boca un poco de agua fría.

FARINGE Y GLÁNDULAS SALIVARES :

SEQUEDAZ DE GARGANTA; ENROJECIMIENTO OSCURO, AZULADO DE MUCOSA DE FARINGE CON VARICOSIDADES, DEGLUCIÓN DIFÍCIL COMO POR PARÁLISIS DE FARINGE.

INFLAMACIÓN DE PARÓTIDAS, PAPERAS CON METÁSTASIS : Si una niña o mujer con paperas toma frío y esto hace desaparecer inconvenientemente la hinchazón de parótida y sus senos se hinchan e inflaman o la inflamación va de parótidas a testículos : Puls. es uno de nuestros medicamentos más importantes en estas metástasis.

Cura dolores que cambian así de lugar y es generalmente empleado paratestículos muy inflamados e hinchados en muchachos con paperas.

Carb. veg. : buen remedio en este caso, pero para su tipo característico.

Abrot. : cuando los síntomas cambian de lugar.

Puls. : dolores errantes, reumatismos que van de una articulación a otra; neuralgias que van de un lugar al otro, pero se diferencian por los siguientes rasgos : Puls. PERMANECE SIEMPRE EN SU CARACTERÍSTICA : LOS SÍNTOMAS VAN DE UN LUGAR A OTRO, PERO AL CAMBIAR DE LUGAR NO MANIFIESTAN NUEVA FORMA DE ENFERMEDAD.

Abrot. : EL CAMBIO DE LUGAR DE SÍNTOMAS HACE VARIAR EL DIAGNOSTICO : por ejemplo, enfermo con diarrea violenta, mal y bruscamente suprimida : sobreviene por ej. reumatismo y un alópata dirá : es una nueva enfermedad, la diarrea está curada pero ha hecho reumatismo, sin ver lo que une las dos cosas; en abrot. la supresión intempestiva y brusca de diarrea, hemorragia, hemorroides, provoca otro cuadro sintomático : se suprime a destiempo diarrea estival en un niño, sobrevienen trastornos de riñón, hígado o estado neurasténico con gran adelgazamiento de abajo a arriba : estos son los casos de abrot. (Kent).

ESTOMAGO :

AVERSIÓN POR ALIMENTOS GRASOS, QUE NO PUEDE SOPORTAR (thuya, ipeca, carb. veg.).

REPUGNANCIA POR LECHE, MANTECA, PAN, CERDO, PASTELERÍA, QUE DIGIERE CONDIFICULTAD; POR ALIMENTOS Y BEBIDAS CALIENTES, SIN EMBARGO NO DIGIERE HELADOS. DESEO DE ENSALADA, PEPINOS, VINAGRE.

ALTERNANCIA DE HAMBRE CANINA Y ANOREXIA.

AUSENCIA DE SED; un rasgo saliente es que JAMAS DESEA AGUA; AUNQUE TENGA FIEBRE NO TIENE SED, PERO HAY EXCEPCIONES PARA ciertos casos de fiebre grave; ausencia de sed, esté la lengua húmeda o seca.

Pero, DESEA COSAS ÁCIDAS, refrescantes : limonada, fruta jugosa; cosas fuertes, condimentados que sabe no podrá digerir; desea helados, pasteles, que le hace mal, y su estado se agrava.

Desea cosas que hacen vomitar; esto no es nada extraordinario : el bebedor de whisky desea su bebida favorita, aunque sabe que a la larga lo matará.

Desea salame muy condimentado y tiene aversión por cerdo natural (Kent).

Falta de sed completa o sed excesiva, con lengua húmeda, gran deseo de cerveza, bebidas espirituosas, picantes, ácidos (Jahr).

DIGESTIÓN DIFÍCIL, SENSACIÓN DE HINCHAZÓN DE ESTÓMAGO DESPUÉS DE COMER; debe aflojar su ropa.

ERUCTOS CON GUSTO A ALIMENTOS.

Durante horas después de comer ERUCTOS agrios, rancios, amargos; los líquidos suben en bocanadas hasta la garganta.

HINCHAZÓN, GASES, Y VINAGRERA son síntomas muy salientes.

DIGESTIÓN LENTA; muchas horas después de comer, sensación de tener todavía sus alimentos en el estómago.

Otras veces, aunque la digestión sea lenta, llega a la comida siguiente con mucha hambre, no se sacia.

Numerosos dolores de estómago, esté lleno o vacío.

Náuseas y vómitos : pirosis gástrica.

Sensación DE PESADEZ DE ESTÓMAGO, COMO DE PIEDRA, particularmente a la mañana al despertar.

(Ab. nigr., Bryon., Kali bichr., Lycop., Nux v.).

Especie de SENSACIÓN DE ANGUSTIA DE ESTÓMAGO 1 hora ó 2 después de comer.

(Nux v.) y mucha flatulencia.

Sensación de desfallecimiento de estómago en bebedores de té.

ABDOMEN :

SENSACIÓN DE FRÍO EN ABDOMEN, EXTREMADAMENTE SENSIBLE AL TACTO.

FLATULENCIA Y DISTENSIÓN EXTREMADAMENTE PENOSA DE ABDOMEN.

CÓLICOS Y BORBORIGMOS DESPUÉS DE COMER, AL ATARDECER O A LA NOCHE, COMO SI FUESE A TENER DIARREA.

La mayoría de malestares de abdomen se manifiesta por hinchazón, grandistensión, mucha flatulencia, fermentación muy marcada de alimentos, borborismos y cólicos.

TODO LIGADO A DIARREA O TRASTORNOS MENSTRUALES.

Gran sensibilidad, hinchazón, sensación de magulladura en región epigástrica, vientre, órganos pelvianos, que están dolorosos al tacto.

Hinchazón después de comer alimentos grasos y pesados.

Plétora venosa.

Estasis venoso general, atascado : debe aflojar su ropa, desatar su corseto sacárselo; deseos de desvestirse completamente y acostarse; con esto, cara y labios hinchados, ojos inyectados y pies hinchados al punto que no se puede calzar; sensación de gran debilidad y tirones hacia órganos pelvianos generalmente en relación con desórdenes menstruales o uterinos.

No puede caminar mucho, ni estar mucho parada por el peso y tironeo hacia abajo que siente en órganos abdominales.

Sensibilidad, dolores de abdomen, útero y espalda como si las reglas estuvieran por venir.

No es raro que tenga todo el mes sensación de reglas por venir (Kent).

Provoca y cura ICTERICIA; consecuencia de tendencia crónica a HEPATITIS OTROS TRASTORNOS EN SECRECIÓN BILIAR, CON DIARREA; CATARRO DUODENAL; digestión mala, desordenada; fiebre y ausencia de sed; después de abuso de quinina (Kent).

ANO Y DEPOSICIONES :

DOLORES DE EXCORIACIÓN DE ANO; PRURITO ANAL; HEMORROIDES PROCIDENTES PICANTES.

Hemorroides con dolores muy grandes, mejorados por movimiento lento, paseando lentamente al aire libre y agravadas estando acostada, al calor del lecho.

Se pone nerviosa en su pieza, en reposo, los dolores se hacen tan fuertes que obligan a moverse; ammon. carb. : hemorroides muy dolorosas, pero aliviadas acostándose de espaldas; en casos de hemorroides muy dolorosas, con ardor intenso, ars. alb. y kali carb. : cuando tiene dolores lancinantes, desgarrantes, aesc. : en hemorroides en sujeto cuya salud está enteramente arruinada, en que la enfermedad parece concentrarse en hemorroides salientes, sangrantes, tan hipersensibles, que un simple roce hace gritar o hasta provoca convulsiones tan dolorosas que le parece que la muerte sería un alivio, que queda acostado, las nalgas separadas con las manos y después de cada deposición tiene de 3 a 4 horas de sufrimiento atroz, PEONIA (Kent).

DIARREA CON DEPOSICIONES EXTREMADAMENTE VARIABLES, ACUOSAS, FÉTIDAS, PARTICULARMENTE DE NOCHE, DESPUÉS DE COMER FRUTAS, PASTELES, HELADOS.

Para diarrea después de comer fruta, comparar ars. alb., bryon., cinch., podoph., ver. alb., etc.; después de comer helados, acon., ars. alb., bryon., etc.

Diarrea con cólicos y deposiciones acuosas, verdes, amarillas, cambiando continuamente de color.

Diarrea alternando con constipación (ant. crud., chelid., collins., nux v., podoph., sulph., etc.).

Síntomas intestinales y diarrea se agravan estando tranquilo y mejoran por movimiento lento particularmente al aire libre.

CONSTIPACIÓN CRÓNICA, PENOSA, DESEOS FRECUENTES Y DEPOSICIÓN INSUFICIENTE; como nux v., necesidad frecuente sin resultado o con deposición poco abundante.

Necesidad frecuente pero ineficaz, en constipación crónica, indica también puls., anacard., lycop., sulf., etc.

Aparato urinario

ARDOR DE MEATO URINARIO, durante y después de orinar.

DOLORES ESPASMÓDICOS DE VEJIGA, DESPUÉS DE ORINAR.

FRECUENTES E INÚTILES DESEOS DE ORINAR, SOBRE TODO ACOSTADO DE ESPALDAS.

Micciones frecuentes con tenesmo extraordinario, dolorosas, con orinas sanguinolentas, ardientes, escozor.

Apenas tiene una gota de orina en vejiga la tiene que expulsar; no se puede acostar de espaldas sin tener deseos de orinar; no puede pasar la noche sin orinar si se acuesta de espaldas.

Está acostada y duerme tranquila, pero si se da vuelta de espaldas es despertada por necesidad de orinar y le parece que si no se apura emitirá involuntariamente su orina (Kent).

EMISIÓN INVOLUNTARIA DE ORINA AL TOSER, (caust.).

SENTADO DE NOCHE.

Micciones involuntarias al toser, estornudar, provocadas por sorpresa o alegría súbita, al reír, por ruido súbito de puerta cerrada bruscamente o tiro de fusil inesperado; la orina escapa a la menor provocación; debe pensar sin cesar en retener su orina, si no la pierde, se escapa.

Niñitas suaves, calmas, de buen color, pletóricas, de sangre caliente, que se destapan de noche, tienen incontinencia nocturna de orina.

Niñas de tez amarilla, enfermiza, que pierden orina durante el primer sueño, necesitan sepia.

Caust. y sepia se consideran generalmente indicados para incontinencia durante el primer sueño, pero yo la he curado con otros remedios; un hombre que había pasado la cuarentena inundaba su lecho de noche en cuanto se dormía y había tomado en vano, todos los medicamentos que tienen ese síntoma; profundizando el caso supe que retenía fácilmente mientras se movía por trabajo, pero en cuanto se sentaba, tenía dificultad para retener, que cuando le sucedió por primera vez, se encontraba a orillas del Atlántico donde tomaba baños : guiado por ello y por agravación por reposo y mejoría por movimiento tan marcada en este caso, le di rhus tox. : que lo curó.

En otros casos, pocos médicos pensarían en bryon; sin embargo está indicado en incontinencia, cuando se constata que la orina corre gota a gota cuando se mueve, y más abundante si camina; no hay alivio si permanece tranquilo.

Puls. es útil con otros remedios cuando se deben hacer esfuerzos para contener la orina durante el día; la pierde durante el primer sueño, cuando ha perdido voluntad y atención; con esto y las otras modalidades y características (Kent).

"Las afecciones urinarias están PEOR DESPUÉS DE HABER TOMADO FRÍO (dulcam.); puls.

CATARRO CRÓNICO INVETERADO DE VEJIGA; abundante secreción de mucosidades, sobre todo después de tomar frío, espeso, filamentosos, purulentos, verde, maloliente" (Kent).

Órganos genitales

1) MASCULINOS : EXALTACIÓN DE APETITO SEXUAL; ERECCIONES MATUTINAS PROLONGADAS; excesos sexuales seguidos de dolor de cabeza, de espaldas, sensación de pesadez de miembros (Kent).

SENSACIÓN DE ARDOR Y MAGULLADURA EN TESTÍCULOS CON O SIN HIPERTROFIA.

Hinchazón y retracción de un testículo; tumefacción de cordón espermático.

ORQUITIS Y EPIDERMITIS POR BLENORRAGIA; dolores espontáneos, agudos, tirantes a lo largo del cordón; testículo retraído, más o menos hipertrofiado.

(Rhodod., clemat., iodum, spong.) muy sensible al tacto; piel roja, METÁSTASIS POR PAPERAS EN TESTÍCULOS.

Orquitis, inflamación e hinchazón de testículos por supresión brusca de secreción blenorragica, relacionada con paperas, después de tomar frío, estando acalorado; enfriamiento de testículos (Kent).

GONORREA CON SECRECIÓN ESPESA AMARILLO VERDOSA; DOLORES DE MUSLOS QUE LLEGAN A HIPOCONDRIOS; si en este caso, después de puls. se queja de dolores de estómago, cesar el remedio o espaciar dosis (Farrington).

"Muy indicado en blenorragia con secreción amarilla, espesa o amarilloverdosa, en sujetos sensibles al calor y mejorados caminando suavemente al aire libre; y también en los que no tienen otros síntomas que secreción amarilla verdosa o verde; secreción rebelde; vieja blenorragia a cuya continuación hay secreción espesa amarilla en cuanto toma frío o después de coito : tenesmo frecuente, corditis; la orina arde durante la micción; edema de prepucio (nit.

ac., flúor. ac., cann. sat.); útil en casos de blenorragia suprimida brusca y erróneamente por lavajes y contra ciertas complicaciones que le siguen (Kent).

2) FEMENINOS :Como en el hombre, puede haber verdadera exasperación DE APETITO SEXUAL, deseo venéreo indomable, está como fuera de sí por ideas sexuales constantes, ninfomanía (Kent).

INFLAMACIÓN DE OVARIOS Y ÚTERO (Kent).

AMENORREA (cimic. polyg. pernet., cina).

REGLAS ATRASADAS, DÉBILES O SUPRIMIDAS DESPUÉS DE MOJARSE LOS PIES.

REGLAS ATRASADAS EN JÓVENES (kali carb., tuber.).

ÚTIL EN JÓVENES, EN LA PUBERTAD, CUANDO NO TIENEN REGLAS O SE HAN INICIADOMAL.

REGLAS ATRASADAS, POCO ABUNDANTES, DE SANGRE NEGRA, REGLAS MUYDOLOROSAS, CON GRAN AGITACIÓN, SE REVUELCA POR EL SUFRIMIENTO.

DIARREA DURANTE Y DESPUÉS DE REGLAS.

Violentos cólicos menstruales obligan a doblarse en dos, con sensación de magulladura en útero y ovarios; vientre distendido; llorosa, llora sin razón, se agita, rechaza las frazadas.

La secreción se establece lentamente y es apenas una leucorrea sanguinolenta.

Menstruaciones dolorosas después de la pubertad, en jóvenes pletóricas.

He curado a muchas, entre 16 y 18 años, con puls., cuando la madre decía :que tenían reglas muy dolorosas después de la pubertad, o de un baño, de haberse mojado los pies.

En niñas de carácter suave, de formación anormalmente atrasada, o confunciones menstruales irregulares, pálidas, lánguidas, se quejan de dolores de cabeza, escalofrío y lasitud, puls. es gran remedio para desarrollarlas.

Calc. phosph. es muy útil en tales casos pero el estado constitucionales muy diferente (Kent).

REGLAS IRREGULARES, MUY TARDÍAS o tempranas de muy corta o muy larga duración, O ENTERAMENTE SUPRIMIDAS, CON CÓLICOS, ESPASMOS HISTÉRICOS ABDOMINALES, dolores hepáticos, gastralgia, dolor de riñones, NAUSEAS Y VÓMITOS, ESCALOFRIOS Y PALIDEZ DE CARA, jaqueca, vértigos, trastornos psíquicos, tenesmo de ano y vejiga Y MUCHOS OTROS SUFRIMIENTOS, no solamente durante, sino antes y después de reglas (Jahr).

LECHE EN SENOS DURANTE REGLAS.

Jóvenes que en la pubertad tienen leche en los senos.

En jóvenes que aún no están encintas. (Cyclam., merc.) (Kent).

LEUCORREA ESPESA, LECHOSA, AMARILLO VERDOSA, NO IRRITANTE aunque Kent señala que a menudo, contrariamente a otras secreciones de puls., la leucorrea puede ser irritante (Jahr igualmente), SOBRE TODO ABUNDANTE ANTES Y DESPUÉS DE REGLAS.

Indicada como en el hombre al tratamiento de LEUCORREAS BLENORRAGICAS.

Puls. compete con sepia, nat. mur., sécale y bell. en PROLAPSOUTERINO.

Indicada cuando las otras características la llaman parece contener tendencia a aborto, cura ciertos embarazos nerviosos, contiene desarrollo de fibromas.

Durante EMBARAZO Y PARTO, muchos síntomas la indican.

Sobre todo útil cuando no está agitada ni irascible, los dolores son cambiantes, irregulares, a veces de espaldas, otras a lo largo de muslos, o cuando son débiles e ineficaces.

Si la mujer es irascible, cham. está mejor indicada; pero cuando es de naturaleza suave, carácter fácil, con dolores irregulares, cuando a pesar de la dilatación de cuello las contracciones expulsivas cesan, dolores muy cortos, hay cierta inacción puls., hará terminar las cosas : buen remedio para DOLORS DÉBILES (Kent).

Aparato respiratorio

1) NARIZ : Propenso a FRECUENTES CORIZAS con estornudos y obstrucción de fosas nasales, estado de escalofrío, fiebre, con un poco de transpiración.

Al atardecer, secreción mucosa bastante abundante con estornudos a la mañana, sensación de obstrucción de fosas nasales con mucosidades espesas amarillo verde.

Puls. conviene a CATARROS CRÓNICOS de nariz con secreción espesa amarillo-verde, suave, no irritante.

Obstrucción de nariz, secreción abundante y sensación de mal olor, hediondo en nariz.

Espesas costras sanguinolentas amarillentas, se acumulan en nariz, se endurecen y son expulsadas a la mañana con espeso mucus purulento amarillento.

En casos de catarros antiguos, hay pérdida de olfato y gusto.

Sensación de plenitud en lo alto de la nariz, sensación de obstrucción en fosas nasales y rino farinx; escupe espesas mucosidades amarillas en pequeñas masas, a veces de olor muy fétido, hay formación de costras que salen a la mañana sonándose.

Muchos enfermos de puls. obtienen en semejantes casos de catarro nasal, alivio de este olor fétido, expulsando gruesas costras; espesas costras de mucopus seco, o mucosidades y pus seco se acumulan en nariz durante varios días y este terrible olor se manifiesta, pero en cuanto se suena y expulsa las costras el olor desaparece hasta que nuevas costras se forman al cabo de algunos días.

Está mejor al aire libre que en pieza caliente; respira mejor al aire libre y se sofoca en pieza caliente; estornuda más y su nariz se tapa más en pieza caliente.

En casos de catarro crónico y agudo hay a menudo pérdida de olfato.

NARIZ OBSTRUÍDA SOBRE TODO AL ATARDECER; de día, se suena fácilmente y destapa su nariz; pero al atardecer la nariz está tapada y en vano se suena, no puede destaparla.

A la mañana, cuando se levanta, nariz tapada pero se suena y la sensación de obstrucción desaparece, mientras a menudo en ese momento tiene mal gusto, lengua cargada, debe lavarse bien los dientes, enjuagarse abundantemente la boca antes de desayunar; síntomas de boca y estómago peor a la mañana, los de nariz y los mentales peor al atardecer.

"Es una de nuestras tablas de salvación".

En casos de catarros antiguos con pérdida de olfato, secreción amarilla espesa con mejoría al aire libre, obstrucción de nariz al atardecer y durante la noche y secreción abundante a la mañana; en nerviosos, tímidos y suaves.

Con resfrios agudos y catarros crónicos hay **PERDIDA DE SANGRE POR NARIZ** cuando al sonarse expulsa costras por nariz y esto provoca pequeña pérdida de sangre, la nariz sangra fácilmente, está sujeta a epistaxis.

Sangría por nariz durante o antes de reglas.

EPISTAXIS DE SANGRE ESPESA, VISCOSA, OSCURA, CASI NEGRA; esto se ve en sujetos predispuestos a catarros de puls.

En mujeres con reglas poco abundantes, atrasadas, apenas más marcadas que una leucorrea teñida de sangre; en jóvenes de reglas irregulares y propensas a estados catarrales de puls.

Muy útil en "HAY-FEWER".

La cura de la fiebre de heno exige un estudio considerable; a veces los enfermos dan informes incompletos e inexactos; sólo hablan del resfrió por el que han venido a consultar y desean curar.

No hablan de sus hemorroides, diarrea alternando con constipación o piel de planta de pies gruesa y dolorosa, etc. Todo esto anda mejor durante el resfrió de heno.

Fuera de ello, dicen que se encuentran bien; no dan importancia a todas estas cosas y olvidan hablar de ellas.

Pero los síntomas de resfrió de heno, solos, no indicará casi nunca el remedio verdaderamente útil.

Sólo se encontrarán los síntomas del medicamento necesario en el estudio del sujeto fuera de su crisis de asma de heno.

En puls. **SE ENCUENTRA CON EL ASMA DE HENO TRASTORNOS DE MENSTRUACIÓN Y PROLAPSO UTERINO**; cuando el asma de heno comienza todos los otros síntomas mejoran.

Los síntomas de puls. están peor a la noche : nariz llena de gruesas mucosidades amarillentas, verdes, y cuando se destapa después de sonarse, hay sensación de sequedad, ardor, escozor y si la pieza en que se encuentra es caliente, no puede dormir.

Nat. mur. se le parece un poco, al menos por la sensación de ardor e imposibilidad de dormir de noche en pieza caliente; pero los síntomas están peor a la mañana, hacia mediodía, la secreción puede continuar noche y día.

Catarro nasal con secreción acuosa abundante y muchos estornudos.

Al principio podemos pensar en carb. veg., ars. alb., all. cepa, euphr., carb. veg. : secreción acuosa e irritación que se extiende hasta el pecho, con ronquera y dolor de garganta.

All. cepa. : secreción excoriante por nariz y lagrimeo suave; en laringe sensación de aspereza, sequedad, constricción, o más bien como de lima, como si tuviera agujas; estas sensaciones descienden por debajo de laringe; agravación en pieza caliente como puls.

Euphr. : se parece a all. cepa, pero la secreción conjuntiva es acuosa pero **ARDIENTE LAGRIMEO QUE QUEMA OJOS Y MEJILLAS Y SECRECIÓN DE NARIZ DULCE COMO puls.** no irritante; cuando la irritación gana el pecho euphr.

ya no está indicada.

Iodium se agrava en pieza caliente con secreción nasal espesa, **IRRITANTE**, amarillo verde, pero en cuanto **EL CATARRO SE INSTALA, ADELGAZA A PESAR DE SU APETITO VORAZ.**

Kali hydrio : secreción espesa, amarilla, peor en pieza caliente; mucho **ARDOR EN NARIZ CUYO EXTERIOR ES MUY DOLOROSO AL TACTO**; raíz de nariz sensible; toda la cara duele y enfermo muy agitado; quiere pasear sin cesar al aire libre y esto no lo fatiga.

Ars. iod. : **ANGUSTIA, AGITACIÓN**, pero **DÉBIL**; estornudos frecuentes y abundante secreción nasal **ACUOSA QUE QUEMA EL LABIO** con abundante **LAGRIMEO QUE QUEMA LOS OJOS** como ars. alb.

QUE TIENE NECESIDAD DE CALOR, APLICA AGUA CALIENTE SOBRE OJOS, SE TIENE ALIVIO RESPIRANDO AGUA CALIENTE POR NARIZ.

Ars. iod. : peor en **PIEZA CALIENTE**; al cabo de cierto tiempo, su secreción espesa, como miel, espesa, amarilla, muy excoriante, con muchos dolores en raíz de nariz y ojos; a menudo dolores **DE PECHO Y DISNEA.**

Tienen disnea : ars. alb., ars. iod., kali hydrio.

Y sabad.; son tal vez los más indicados en fiebre de heno.

Si los síntomas aparecen por acaloramiento, durante este período, comparar con silic., puls. y carb. veg.

Hay remedios que tienen gran sensación de obstrucción nasal no aliviada por secreción mucosa; necesidad continua de sonarse sin ningún alivio; lach., kali bich., psorin., naja y stic.

Psor. : secreción abundante, acuosa suave o excoriante con sensación de obstrucción nasal al aire libre, MEJORA EN HABITACIÓN CALIENTE, CERRADA Y ACOSTÁNDOSE; tiene un poco de disnea aliviada extendiendo los brazos en ángulo recto.

El asma de heno es enfermedad psórica; una dosis de psorin. desarrollará los síntomas propios del caso y lo esclarecerá.

Vale más no prescribir a ciegas por la crisis sola, si no hay indicación precisa y en este caso, si el resfrío es muy violento dar solamente un remedio de acción poco durable que lo atenuará.

Nux v. : respiración fácil al aire libre, PERO NARIZ TAPADA EN CUANTO ENTRA EN PIEZA CALIENTE, también de noche, aunque una secreción nasal abundante corre por la almohada; nariz tapada como puls., bryon. y SALES DE iodium, cyclam.

En esta enumeración no figuran todos los remedios contra asma de heno, sino solamente ejemplos de remedios útiles en enfermos que tienen esta enfermedad.

Para tener éxito se debe examinar el conjunto del sujeto a tratar y curar (Kent).

2) LARINGE : SENSACIÓN DE SEQUEDAD, CONSTRICCIÓN, COSQUILLEO QUE PROVOCA TOS; RONQUERA CAPRICHOSA que desaparece y aparece con la mayor facilidad.

TOS SECA, EXCITANTE, QUE COMIENZA A LA TARDE Y DURA TODA LA NOCHE.

Peor acostado y en pieza caliente.

3) BRONQUIOS Y PULMONES : Bronquitis con tos seca al atardecer y húmeda a la mañana, con expectoración de mucosidades amarillo verdoso, abundantes.

Tos seca de noche; debe sentarse en la cama para aliviarse; la tos cesa a la mañana después de copiosa expectoración mucosa amarilla verdosa.

Dolorimiento y sensación de presión en pecho, SENSACIÓN DE DOLORIMIENTO EN PECHO, EN REGIÓN SUB O SUPRA CLAVÍCULAR EN VÉRTICE DE UNO U OTRO PULMÓN, SOBRE TODO CUANDO ESTA ACOSTADO SOBRE EL LADO ENFERMO O SE APOYA EN EL.

ESTA SENSIBILIDAD PARECE INVADIR TEJIDO MUSCULAR DE HOMBRO Y BRAZO DELADO AFECTADO.

Esto resulta de fenómenos congestivos en esta región y es frecuente en niñas en la pubertad; con tipo característico de puls. y reglas características.

Disnea sobre todo de noche, acostado de espaldas.

Asma nocturna, como si respirara vapores de azufre.

HEMOPTISIS DE SANGRE NEGRA, COAGULADA, SOBRE TODO POR SUPRESIÓN DE REGLAS.

SENSACIÓN DE CONGESTIÓN DE PECHO.

Aparato circulatorio

Dolor, puntadas en región precordial, dolor submamario como si un hilo tirase allí (act. rac., conium., ustil., mosch., ETC.).

SENSACIÓN DE PULSACIONES, LATIDOS A TRAVÉS DE TODO EL CUERPO (Nash).

VARICES, DILATACIÓN DE VENAS DE MIEMBROS, VARICOCELE; VENAS AZULES, HINCHADAS, INFLAMADAS, QUE MOLESTAN POR DOLORES LANCINANTES. (Hamam).

En afecciones de venas.

Puls. ocupa casi el mismo lugar que hamam.; lo supera en flebitis crural después de parto, pero le cede paso en hemorragias venosas.

En hemorroides y otras afecciones varicosas, como de cordón espermático o miembros inferiores, puls., actúa con ventaja cuando el estado general indica su uso.

Se recomienda en dilatación ventrículo derecho (Hughes).

Es útil en casos de dilatación de capilares venosos y paredes de venas (por desmineralización al perder calc. fluor. y sobre todo silic. y calc. ost.).

En estos casos, hay debilidad funcional de esos vasos, consecuencia de desmineralización que repercute en musculatura involuntaria; el resultado es estasis venosa que determina gran sensibilidad al frío, tez azulada de manos, cara, etc. (Nebel).

Niñas o mujeres jóvenes cloróticas que se quejan siempre de sensación de frío, pero muchos de sus síntomas mejoran por frío a pesar de ser tan friolentas.

Sus dolores van acompañados de escalofríos y cuanto más marcados son los dolores, más friolentas están.

Toda la economía debilitada, tejidos relajados, sufre al mismo tiempo de desviación o ptosis uterina; reglas tardías, escasas, oscuras, de sangre coagulada, variables, etc.

El cuadro se completa con síntomas morales característicos. En clorosis complicadas por abuso de hierro, puls. es el remedio.

Es antídoto del HIERRO y sus sales tomados en exceso y tiene con ferr. la misma relación que nux v. con drásticos.

Después de abuso de hierro o quinina el organismo está completamente debilitado y la enferma se siente extenuada; sufre desordenes uterinos y trastornos menstruales, tal caso, procedente de manos alopáticas deberá ante todo recibir puls. (Dewey).

Espalda y extremidades

LA IRRITACIÓN ESPINAL indica puls.

Dolores de nuca y cuello, a veces unilaterales, con sensibilidad al tacto.

Crujidos de vértebras de cuello.

El cuello, toda la espalda y el cuerpo están RÍGIDOS como una tabla.

LUMBAGO como si estuviera entumecido.

Dolores reumáticos en columna vertebral, peor en reposo, mejorados por movimiento lento.

Cintura como fuertemente vendada.

Dolores en región sacra peor al sentarse.

(Zincum, sepia, cann. ind.) e inclinándose hacia atrás.

DOLORES REUMÁTICOS EN MIEMBROS QUE CAMBIAN FÁCILMENTE DE LUGAR, (bryon., colch., sulph., kalmia, kali sulph.); dolores que cambian de lugar FÁCILMENTE EN ARTICULACIONES QUE ESTÁN ROJAS E HINCHADAS.

Cuando se ve esto en reumatismo (kalmia, kali bichr., lac. can., mang. ac.) con constitución y características de puls., podremos hacer con ella curas increíbles (Nash).

Las articulaciones parecen débiles, como si se fueran a dislocar; el reposo lo alivia, por eso mejora después del sueño.

Dolores agudos, desgarrantes en talones al atardecer; dolor peor de cuando colgar el miembro enfermo; conium, lo contrario.

Sensación de retracción de tendones y ligamentos articulares (caust.) VARICES DOLOROSAS; VARICES CON SENSIBILIDAD Y DOLOR PICANTE (calc. flúor., flúor ac., hamam., lycop., vipera, zincum).

Piel

PIEL FEBRIL Y CALIENTE AL TACTO, TEMPERATURA DEL CUERPO NORMAL (Kent).

Otro síntoma general es comezón y ardor; prurito generalizado peor al atardecer y de noche; urticaria con ardiente comezón después de ingestión de alimentos grasos.

Acné, en la pubertad, por alimentación demasiado grasa, rica.

Otro estado muy marcado de piel es :COLORACIÓN AZULADA, como lach.; puede ser marmórea, manchada, violácea, en partes.

Hinchazón roja azulada con dolores ardientes.

PARTES INFLAMADAS, AZULADAS (lach., tarent., cub.).

VARICOSIDADES EN PIEL.

VENAS VARICOSAS (hamam., flúor ac.); ÚLCERAS VARICOSAS con secreción de sangre negra, que se coagula muy rápido, no muy abundante y forma rápido pequeños coágulos negros como alquitrán, malolientes o dejan correr líquido purulento, sanguinolento (Kent).

RASH CUTÁNEO COMO ERUPCIÓN DE RUBÉOLA CON SÍNTOMAS CATARRALES DE MUCOSAS.

TOS catarral, dolor de pecho, conjuntivitis, etc.

SABAÑONES EN EXTREMIDADES; COLORACIÓN AZULADA DE PIEL DE EXTREMIDADES.

Fiebre

Fiebre con las características siguientes : muy friolenta, siempre con frío, hasta en pieza caliente; el escalofrío predomina aunque esté en pieza caliente; puede estar sedienta un poco antes del escalofrío pero durante éste no tiene sed; el escalofrío aparece a la tarde y al atardecer; puede haber vómitos mucosos durante escalofrío; o escalofríos diarios, mañana y noche; comienzan en manos y pies; hay dolores de miembros durante el escalofrío; escalofríos de un solo lado del cuerpo con entumecimiento; fiebre unilateral.

Calor seco, ardiente, sin sed, principalmente de noche con distensión de venas, pulso acelerado y opresión por congestión venosa; agravación en pieza caliente.

Sudor abundante de noche, entre 2 y 5 de la mañana, a veces fétido, otras limitado a un sólo lado del cuerpo.

Relaciones

Antídotos

Coffea, chamom., ignat., nux vom.

Complementarios

Ars. alb. es complementario de puls. en caso de catarro gástrico por enfriamiento de estómago por absorción de crema helada.

Silic. : crónico de puls. en casi todas las enfermedades; kalimur. : análogo en la serie de remedios químicos (Allen).

Lycop., sulf. ac. Actúa bien después de sepia Y sulph.

PYROGENIUM

O pyrogen o pyrexin, es un nosode introducido en la Materia Médica por los ingleses a fin del siglo pasado : el Dr. John Drysdale fue el primero, en 1880, en aconsejar su empleo como medicamento, en una publicación imposible de encontrar hoy : "ON pyrexin OR pyrogen AS A THERAPEUTIC AGENT", (edit. por Baillere, Tyndale and Cox).

Se extrae de carne de buey flaca, que se trata de la siguiente manera :según procedimiento del Dr. Díaz de Cruz, se toma un recipiente que contenga 500 gr. de agua y 200 gr. de carne de buey desprovista de grasa y cortada en trocitos.

Se expone al aire seco durante una veintena de días y se obtiene un líquido rojizo, espeso, consistencia de jarabe y fétido.

Se filtra y se evapora a baño María hasta desecarlo.

Se deja macerar en alcohol durante dos horas el residuo seco que formará una masa compacta oscura.

Se deja secar; se mezcla con 30 gr. de agua destilada y se filtra, después de dos horas.

El líquido claro y amarillento que se obtiene es extracto acuoso de pyrogenium.

Se agrega un volumen doble de glicerina y con esta preparación que se puede considerar tintura madre, se preparan según métodos hahnemannianos las diferentes dinamizaciones : 3ø, 6ø, 12ø, 30ø, etc.

Características

Sus principales características son : 1) ESTADO SEPTICEMICO GRAVE CON GRAN AGITACIÓN : Se mueve sin cesar, desea continuamente cambiar de lugar porque la parte del cuerpo sobre la que se apoya le da casi enseguida sensación dolorosa de magulladura (arnica, bapt.).

En enfermos de pyrog. se nota estado complejo que responde a lacuádruple influencia de arnica, eupat., ars. alb., y rhus tox. : SENSACIÓN DE DOLORIMIENTO, MAGULLADURA, QUE HACE QUE LA CAMA PAREZCA DURA, de arnica : SENSACIÓN DE ROTURA, DE FATIGA DOLOROSA DE HUESOS, de eupat.; ANSIEDAD, ANGUSTIA AGITADA, de ars.; AGITACIÓN QUE DA ILUSIÓN DE ALIVIO, de rhus tox.

2) Es frecuente ver indicación de pyrog. en un síntoma desconocido para todos los otros remedios : DESACUERDO ENTRE TEMPERATURA Y FRECUENCIA DE PULSO : temperatura muy elevada, que pasa de 39 39ø5 a 40ø, con pulso relativamente lento; o temperatura relativamente moderada : 38ø5, y pulso frecuente y rápido, a 150 o 160 pulsaciones por minuto.

3) EXTREMA FETIDEZ DE TODAS LAS SECRECIONES :Diarrea, vómitos, sudor, reglas, etc., que es otro punto de contacto ars. alb.

4) ESFERA DE ACCIÓN :La esfera de acción de los remedios comprende todos los casos en que están presentes sus características, cualquiera sea el nombre de la enfermedad.

Pero, está permitido al terapeuta dirigir su atención a cuatro grupos clínicos en la que se encuentra, con mayor frecuencia, su sintomatología : a) ESTADOS SÉPTICOS, cuando hay indicaciones características para otro remedio, o cuando el elegido homeopáticamente no revela reacción orgánica, esfera de acción de todos los nosodes.

b) SEPTICEMIAS AGUDAS :Fiebre tifoidea, neumonía, influenza, difteria, fiebre escarlatina, disentería, cólera, intoxicaciones por ptomaínas, etc., estando presentes los síntomas característicos.

c) INFECCIONES LOCALES GRAVES por traumatismo que tienden a ganar todo el organismo : fiebre puerperal; metritis infecciosa, mastoiditis; apendicitis aguda; pinchazos anatómicos, etc.

d) ESTADOS INFLAMATORIOS DE ORIGEN SÉPTICO QUE TIENDEN A SUPURACIÓN.

Este grupo comprende casos que presentan historia de supuración o infección local con cura aparente, seguida tardíamente por trastornos de infección general graves, sin la menor provocación aparente.

Y los casos en que se constata, desde el principio, cuando la enfermedad aún no se ha desarrollado totalmente sino tiende a localización supurativa indeterminada.

En este caso actúa como preventivo, impidiendo la evolución hacia un estado más serio.

5) La única MODALIDAD saliente es :MEJORÍA PASAJERA POR MOVIMIENTO, como rhus tox.

Síntomas mentales

Aquí se ven las dominantes de ars. : angustia, agitación, multitud de ideas atropelladas en su mente, lo atormentan. Locuaz, agitado, delirante.

"LOCUACIDAD; piensa y habla más rápido que habitualmente, sobre todo durante fiebre.

Irritable.

Delirio y confusión mental con respecto a su cuerpo y miembros (bapt.).

Sensación como si cubriera toda la cama.

Sabe que su cabeza está sobre la almohada, pero no sabe dónde está el resto de su cuerpo.

Acostada de lado, cree ser cierta persona y al darse vuelta del otro, cree ser otra.

Sensación como si tuviera multitud de brazos y piernas.

Sus síntomas se parecen mucho a bapt., pero si la temperatura sube mucho bapt.

no será tan eficaz como pyrog. (Kent).

Cabeza y cara

Dolores latentes en cabeza.

Dolor de cabeza estallante, con agitación.
 Congestión violenta de cabeza con DOLORES PRESIVOS y pulsaciones, aumentada por presión.
 Transpiración abundante de cabeza.
 Dolores en occipucio al toser; a la mañana al despertar.
 Globos oculares dolorosos al tacto, al volverlos hacia arriba o afuera. (Kent).
 Sangría de nariz de origen séptico.
 Mejillas calientes y ardientes.
 Cara cubierta de sudor frío.
 Latidos como de abanico de alas de nariz, como lycop.
 Aparato digestivo
 BOCA :
 ALIENTO EXTREMADAMENTE FÉTIDO.
 Boca seca; mal gusto.
 Dientes cubiertos de fuliginosidades.
 Lengua fofa, extendida, ROJO VIVO, como BARNIZADA, seca, a veces como resquebrajada.
 Habla difícilmente (cros., ter.).
 ESTOMAGO :
 NAUSEAS persistentes y VÓMITOS.
 Vomita el agua en cuanto se le calienta en el estómago. (phosph.).
 VÓMITOS EXTREMADAMENTE FÉTIDOS.
 Vómitos de materias tirando a marrón, hematemesis; vómitos estercoreosos.
 ABDOMEN Y DEPOSICIONES :
 Vientre hinchado, sensible, doloroso.
 Retortijones; dolores lancinantes, cólicos.
 Dolores si trata de respirar profundamente.
 Tenesmo intolerable, vesical y rectal.
 Diarrea con DEPOSICIONES OFENSIVAS, marrones o negruzcas, dolorosas, involuntarias; cada vez que expulsa un gas, sale un poco de materia líquida.
 Puede haber constipación, con inercia intestinal completa (opium).
 Se ven deposiciones abundantes, marrones, olor de carroña; o constituidas por bolitas secas, marrones.
 Hemorragia intestinal.
 Aparato urinario
 Orina escasa, a veces incontinencia, a menudo albuminosa.
 Tenesmo vesical.
 Aparato circulatorio
 Palpitación, angustia y debilidad precordial, sensación como si el corazón fuera demasiado grande.
 Siente su corazón; oye los latidos; los latidos le resuenan en los oídos.
 Debilidad de corazón.
 DISOCIACIÓN ENTRE FRECUENCIA DE PULSO Y TEMPERATURA : PULSO
 ANORMALMENTE RÁPIDO PARA LA FIEBRE QUE ES MAS BIEN MODERADA, O PULSO MAS BIEN
 MODERADO CON FIEBRE EXTREMA.
 Órganos genitales
 Reglas o más bien perdidas sanguíneas EXTRAORDINARIAMENTE OFENSIVAS, que huelen atrozmente.
 Metrorragia fétida.
 Loquios de olor nauseabundo, generalmente poco abundantes, como detenidos.
 Aparato respiratorio
 Epistaxis.
 Expiración sibilante.
 Respiración rápida; disnea.
 Tos con expectoración espesa, más o menos abundante y pútrida, como la última fase de la tisis.
 Piel y extremidades
 Generalmente seca, fría; en casos graves, lívida o color ceniza.
 A veces cubierta de transpiración abundante, de OLOR CADAVERÍCO y que no corresponde a caída de temperatura.
 Entumecimiento de manos, brazos, piernas, DOLORIMIENTO DE TRONCO Y MIEMBROS; la cama le parece demasiado dura; mejoría pasajera por movimiento (thus tox) por lo que quiere cambiar sin cesar de lugar y esta agitación puede aumentar por la angustia mental del remedio (ars. alb.).
 Fiebre
 Determina y está indicado en fiebres de carácter séptico; caracterizadas por escalofríos que comienzan en espalda, entre hombros, muy marcados y terminan por agitar todo el cuerpo.

La faz de calor sobreviene de repente : piel ardiente y seca y temperatura muy elevada, que puede pasar de 40°. Sudor frío, viscoso y de OLORES FÉTIDOS, le sigue, pero sin que el termómetro baje.

RANUNCULUS BULBOSUS

O Nabo de San Antonio, planta vivaz de la familia de las ranunculáceas, común en prados, campos y pendientes soleadas.

Se obtiene la tintura madre, con la cual se preparan por diluciones sucesivas las diferentes dinamizaciones, haciendo macerar en alcohol a 90°, la planta entera recolectada en verano.

Acción general del medicamento

Actúa principalmente en PIEL Y TEJIDO MUSCULAR.

Aplicado en PIEL, produce eritema violento, con erupción primero vesicular con ardor, escozor y comezón; si los síntomas aumentan por acción de la intensidad del medicamento sin que nada se haga para exasperarla, puede sobrevenir ulceración y hasta gangrena, esta última asociada a fiebre y delirio.

EN MÚSCULOS, provoca y cura algia reumatoidea sobre todo marcada en músculos de tronco, el reumatismo intercostal cede mucho más rápido a este medicamento que a cualquier otro; hay dolor, mucha sensibilidad al tacto, y los músculos tienen sensación de rotura como si hubieran sido triturados.

En SEROSAS, se ven los mismos dolores agudos que en músculos, y pleuray peritoneo parecen ser los que más sufren su influencia.

Algunas MUCOSAS no escapan a su acción irritante.

Características

DOLORES AGUDOS, LANCINANTES, VIVOS, COMO PUÑALADAS, NEURÁLGICOS, MIALGICOS, REUMÁTICOS, EN PAREDES DEL PECHO, POR PAROXISMOS PROVOCADOS O AGRAVADOS POR CAMBIOS ATMOSFÉRICOS.

Modalidades

Agravación

a) POR MOVIMIENTO, INSPIRACIÓN, TACTO.

b) POR CAMBIOS ATMOSFÉRICOS, especialmente TIEMPO TORMENTOSO Y HUMEDAD.

c) AL AIRE LIBRE, POR AIRE FRÍO.

Ojos

Nictalopía; niebla ante los ojos.

Sensación de presión en glóbulos oculares.

Inflamación, lagrimeo y prurito.

Dolores que escuecen en ángulos de ojos.

Pequeñas vesículas de córnea con dolores intensos, fotofobia y lagrimeo; herpes de córnea.

Aparato respiratorio

NARIZ:

HORMIGUEO PENOSO y dolores de nariz.

Nariz roja, hinchada, inflamada, con colores tensivos y costras abundantes en interior.

RESFRÍO DE HENO, con nariz hinchada, especialmente al atardecer, sensación de presión dolorosa en raíz y de comezón violenta en fosas nasales; a veces esta sensación pruriginosa se extiende haciendo escupir y tragar al enfermo que trata de desembarazarse por todos los medios de esta irritación; al mismo tiempo, sensación de escozor de ojos cuyos párpados arden y están dolorosos.

Ars. alb. y silic. también tienen estos síntomas.

También hay ronquera, muy fácilmente dolores picantes en el pecho y sus paredes, sensibilidad muscular que también puede ser general; cuello de vejiga afectado en algunos casos, con sensación de ardor en la micción.

PECHO :

SENSIBILIDAD DOLOROSA DE PECHO EN PAREDES, MÚSCULOS INTERCOSTALES, PLEURA, etc. QUE SE MANIFIESTA O AGRAVA SOBRE TODO POR MOVIMIENTO, TACTO, O AL EXTENDER EL CUERPO.

DOLORES LANCINANTES DE MÚSCULOS INTERCOSTALES; REUMATISMO INTERCOSTAL
CONDOLores AGUDOS, VIVOS, PICANTES, PUNTADAS EN PECHO, TODO AGRAVADO POR MOVIMIENTO, AUN DE LA RESPIRACIÓN, POR PRESIÓN Y CAMBIOS ATMOSFÉRICOS; LA DISNEA DA A VECES EN ESTOS CASOS SENSACIÓN DE ANGUSTIA; MUCHA SENSIBILIDAD AL TACTO Y SENSACIÓN DE MAGULLADURA EN MÚSCULOS COMO SI HUBIERAN SIDO TRITURADOS (amca, acon., bryonia).

DERRAMES PLEURALES con dolores agudos, como puñalada, gran ansiedad, disnea y desfallecimiento, por el derrame y la angustia provocada por los dolores : podrá, en esto, ser tan útil como : apis, bryon. o sulf. cuando están presentes sus dolores característicos.

Puede ser útil contra puntadas de pecho después de neumonía; la sensación característica que acompaña su sensibilidad dolorosa es una sensación de ulceración subcutánea, puramente subjetiva.

Este síntoma también se ve en puls. ranunc. puede ser útil contra dolores de pecho por adherencias consecutivas a pleuresía.

Ha curado dolores lancinantes de pecho a cada cambio de tiempo.

Está indicado en inflamaciones reumáticas de diafragma con dolores agudos, lancinantes, que van de hipocondrios y epigastrio hasta la espalda.

Espalda y extremidades

Dolores reumáticos de rotura en todo el tronco y entre omoplatos.

Dolores musculares en borde de omoplato en mujeres con oficio sedentario, sensación de ardor en pequeños puntos localizados (phosph., agar.), en costureras, dactilógrafas, pianistas (act. rac.). (Allen).

Dolores reumáticos en miembros y músculos; dolores provocados por contacto, movimiento, expansión, o cambio de posición, sobre todo en tronco y miembros.

Piel

Sensación de ardor con intenso prurito, luego, por tacto, erupción herpética con mucho prurito; zona precedido o seguido por neuralgias intercostales (mezer.).

Eczema con espesamiento de piel y formación de costras duras, corneas; comparcon : ant. crud. que tiene excrescencias córneas y callosidades de planta de pies.

Callos hipersensibles, que escuecen, ardientes (salyc. ac.).

Pénfigo con anchas ampollas que revientan y dejan superficie en carne viva.

Relaciones

Sulfur no sigue bien a ranunc. que es incompatible con staph.

RHODODENDRON

Rhododendron chrysanthum, o Rosa de Siberia, pequeño arbusto de la familia de las Ericáceas, crece en altas mesetas de Siberia y Kamtchatka.

Con brotes y pedúnculos secos se obtienen las diferentes dinamizaciones preparando las tres primeras por trituración.

Acción general del medicamento

Actúa sobre TEJIDO MUSCULAR Y FIBROSO, determinando DOLORES GRANDEMENTE INFLUENCIADOS POR EL TIEMPO.

En él, la modalidad tiempo tiene gran influencia, como dulc., acon., etc. y su gran característica es : AGRAVACIÓN POR TIEMPO TORMENTOSO.

Especialmente ANTES DE TORMENTA, SOBRE TODO CON TRUENOS; DESPUÉS DE LA TORMENTAMEJORAN Y LA AGRAVACIÓN POR TORMENTA CON TRUENOS NO PARECE DEPENDER TANTO DE LA HUMEDAD; PARECIDO A phosph., nat. carb., y silic.

Sus dolores, como los de rhus, se agravan por tiempo húmedo y REPOSO, y MEJORAN POR MOVIMIENTO.

En cuanto a su acción propiamente dicha sobre el organismo, parecetener especial afinidad por TESTÍCULOS : están HINCHADOS, con DOLORES CONTUSOS, TIRONEANTES, a veces SE EXTIENDEN DE ABDOMEN A MUSLOS Y MUY SENSIBLES AL TACTO.

Los que más se le parecen en esto son : aur. met., clemat., puls., arg. nit. y spong.

En afecciones de origen sifilítico preferimos aur. met., sobre todo si antes el sujeto ha sido fuertemente mercurializado; después de supresión brusca de gonorrea, clemat. y puls.; si es de origen o carácter reumático rhodod. ocupa el primer lugar.

Características

CONSTITUCIÓN Y TIPO : INDIVIDUOS NERVIOSOS, que temen las tormentas y se asustan particularmente del trueno; se agravan por tormentas, PARTICULARMENTE CON ATMÓSFERA CARGADA DE ELECTRICIDAD (phosh., nat. carb., psor., silic.).

Modalidades

Agravación

a) Por tormenta, tiempo ventoso y tormentoso, cambios eléctricos de atmósfera, aproximación de tormenta con relámpagos y truenos; los síntomas vuelven con este mal tiempo.

b) Por tiempo húmedo.

c) Por reposo (rhus tox.).

Mejoría

a) DESPUÉS DE TORMENTA; POR MOVIMIENTO Y CALOR SECO; abrigándose la cabeza.

b) Comiendo.

Patogenesia

Su patogenesia, con cuadro poco característico y sin gran personalidad, presenta no obstante, fuera de sus modalidades tan importantes, algunos síntomas particulares : DOLOR DE DIENTES con dolores neurálgicos profundos, desgarrantes, MAS VIVOS ANTES O DURANTE TIEMPO TORMENTOSO, A CADA CAMBIO DE TIEMPO, CON GRAN VIENTO DE TORMENTA, en cada primavera; aliviados mientras come.

TESTÍCULOS RETRAÍDOS, HINCHADOS y dolorosos; testículos en particular epidídimo, muy dolorosos al tacto; dolores de contusión en testículos; alternando con dolores agudos; tumefacción e induración de testículos, en particular izquierdo, con violentos dolores agudos, que se extienden a abdomen y muslos. Orquitis con sensación como si el glande fuera aplastado (aur., chamom.); orquitis reumática. HINCHAZÓN INFLAMATORIA AGUDA DE ARTICULACIONES, QUE PASA DE UNA A OTRA, MUY DOLOROSA DE NOCHE, AGRAVADO POR REPOSO Y TIEMPO TORMENTOSO (kalmia). DOLORS REUMÁTICOS TIRANTES, DESGARRANTES, EN TODOS LOS MIEMBROS, AGRAVADOS POR TORMENTA, REPOSO, TIEMPO HÚMEDO, O VENTOSO, O POR FRÍO (rhus tox.). Gota con depósitos en articulaciones de dedos grandes de pie, confundida con juanetes (led. pal., colch.) con DOLORS AGRAVADOS Y PROVOCADOS POR TIEMPO TORMENTOSO. NO PUEDE DORMIRSE O DORMIR SIN TENER LAS PIERNAS CRUZADAS.

RHUS TOXICODENDRON

Arbusto de la familia de la terebintáceas originario de América Septentrional, se encuentra también en bosques frondosos y lugares húmedos de Europa.

Tiene grandes ramas flexibles, delgadas, que alcanzan muchos metros de altura y se mezclan a árboles vecinos en cuya corteza se implantan.

Hojas color verde pálido, dentadas, y según la estación, flores verdosas pequeñas en espigas y pequeños frutos carnosos, blancos, redondeados.

Contiene jugo marrón amarillento, de olor penetrante y nauseoso, cáustico y produce en piel vesículas llenas de serosidad extremadamente pruriginosas y ardientes; son las hojas las que contienen más; con ellas se prepara la tintura madre con la que se obtienen las diferentes dinamizaciones por diluciones sucesivas.

Acción general del medicamento

Rhus tiene acción muy profunda en PIEL; provoca ERUPCIÓN VESICULOSA característica, con EDEMA, ARDOR, COMEZÓN y PINCHAZOS : la menor cantidad de tintura de rhus o de jugo de la hoja produce en anchas superficies de piel enrojecimiento y ardor que no tardan en producir tumefacción, edema y cubrirse de vesículas con prurito casi intolerable (Hughes).

El ardor y enrojecimiento de boca y garganta, diarrea, tos irritativa, e irritación cutánea, indican acción análoga sobre mucosas.

Para TESTE sus efectos son los de un cáustico corrosivo que, por su extrema sutileza, tiene tendencia a invadir anchas superficies más bien que a penetrar profundamente en tejidos; lo compara a arnica que penetra más y a ledum cuya acción se localiza mejor (Hughes).

Tiene SOBRE MENTE ACCIÓN DEPRIMENTE que se traduce en estado de prostración y estupor que lo indica en muchos estados tifoideos.

Ejerce sobre SISTEMA MUSCULAR acción igualmente deprimente que se manifiesta por rigidez dolorosa y fenómenos parálisis.

Pero ejerce sobre todo su acción electiva EN TEJIDO CONJUNTIVO FIBROSO.

Ningún medicamento actúa más profundamente en aponeurosis y tendones musculares, de ahí derivan numerosos síntomas de muchos estados reumáticos, dolores aponeuróticos, etc.; especialmente si el factor surmenage está etiologicamente en juego.

Para el Dr. Nebel esta acción electiva sobre tejido conjuntivo fibroso explica su gran característica : mejoría por movimiento; según él, bajo su influencia el organismo drena toxinas a nivel de aponeurosis, tendones, envolturas fibro conjuntivas de articulaciones, y, como el movimiento favorece la aceleración de la circulación linfática, permitiría así una eliminación tóxica más rápida, lo que trae alivio.

Por su acción sobre tejido conjuntivo fibroso, influencia LA CIRCULACIÓN actuando sobre túnica externa fibrosa de vasos.

Características

1) CONSTITUCIÓN Y TIPO : No tiene tipo netamente definido.

Es útil en casi todos los temperamentos.

Lo más que se puede decir es que desarrolla más fácilmente sus síntomas en neuroartríticos y gotosos.

2) ESTUPOR : ESTUPOR CON DELIRIO SUAVE, PERO REGULAR, PERSISTENTE, es estado característico de rhus tox.

Va acompañado de AGITACIÓN que es otra de sus características; se da vuelta para todos lados sin tener consciencia de su agitación ni de lo que pasa alrededor.

Este estado se ve en disentería, peritonitis, neumonía, escarlatina, difteria, fiebre tifoidea, etc., localización y nombre de enfermedad nada importan en el caso (Nash).

3) AGITACIÓN : Muy grande, puede ser su primera característica.

Tiene de particular QUE ESTA EN RELACIÓN CON EL DOLOR, DOLORIMIENTO O SENSACIÓN DE MOLESTIA DOLOROSA y que MEJORA TEMPORARIAMENTE POR MOVIMIENTO.

Aunque no haya dolor muy neto, hay una especie de molestia vaga, pero intensa, mejorada por movimiento, de manera tal que desea estar sin cesar en movimiento, porque el solo hecho de cambiar de sitio alivia.

Esto se parece a la agitación de acon; y ars. alb. con los que rhus. forma lo que Nash llama "TRIO DE LA AGITACIÓN".

Modalidades

Lateralidad

De preferencia derecha.

Mejoría

a) POR MOVIMIENTO : como bryon., su principal característica está en la modalidad : MEJORÍA POR MOVIMIENTO, AGRAVACIÓN POR REPOSO, que es tan importante para la acción de rhus como la inversa : agravación por movimiento y mejoría por reposo es para bryon.

En enfermedades crónicas, como reumatismo, debe moverse para tener alivio; al principio de los movimientos sufre, pero si continúa se siente mejor.

En enfermedades agudas, el movimiento que hace parece ser su único alivio, de ahí su gran agitación.

b) POR CALOR, APLICACIONES CALIENTES; TIEMPO SECO Y CALUROSO

Agravación

a) POR REPOSO b) POR HUMEDAD; TIEMPO FRÍO Y HÚMEDO; todo esto está lleno de malos efectos para el enfermo, y en todas las formas : agravación por lluvia, cuando se moja, por haber estado expuesto al frío, mientras transpira abundantemente.

c) DE NOCHE, PARTICULARMENTE A MEDIA NOCHE; sus síntomas sobrevienen o se agravan de noche.

d) ESTANDO ACOSTADO SOBRE EL LADO DOLOROSO, al contrario de bryon.

Síntomas mentales

Tiene fácilmente fatiga cerebral; no puede encontrar su mente, reflexionar largo tiempo, sostener esfuerzo mental. Memoria débil, olvida letras o palabras al escribir; ideas fácilmente confusas.

Irritable, inquieto, gran sensibilidad moral, la más ligera contrariedad aumenta todos sus sufrimientos; agitado, nerviosidad extrema; gran aprensión como si la fuera a pasar una desgracia que le impide quedar en el lecho de noche. Asco por la vida, triste, llora sin saber porqué, ideas de suicidio, quiere ahogarse pero teme a la muerte; quisiera morir, pero no tiene valor para suicidarse.

Oscurecimiento de sensorio; delirio suave pero regular y persistente.

Delirio vago y consciente.

Delirio de persecución, delirio con miedo de ser envenenado (hyosc.).

Sueño

Insomnio antes de medianoche, enseguida sueño agitado, no reparador, con sueños, principalmente de violentos ejercicios físicos, fatigantes : carreras, natación, remo, etc.; sueña con sus ocupaciones cotidianas.

Cabeza

ERUPCIÓN HÚMEDA, PRURIGINOSA DE CUERO CABELLUDO; COSTRAS DE LECHE.

Cabeza pesada; sensación como si el cerebro fuese sacudido y golpease la caja craneana al mover la cabeza.

Cefalea con dolores presivos en temporales, frente y órbitas, como si los ojos fueran empujados hacia afuera.

Sensación dolorosa como si una tablita estuviera unida muy apretada sobre la frente.

Cefalea occipital (rhus radicans).

Vértigo estando parado o al caminar.

Ojos

Inflamación de ojos, en reumáticos, después de exposición a humedad y frío, o de transpiración bruscamente detenida por haberse expuesto al frío (Kent).

Párpados inflamados, hinchados y pegados a la mañana, con sensación de escozor.

Ojos rojos, hinchados, conjuntiva inyectada; dolores presivos, ardientes, de ojos, que escuecen y pican.

Pústulas de córnea, iritis reumática después de exposición a frío húmedo.

Inyección circunscripta de córnea.

Fotofobia; sensación como si tuviera velo o niebla delante de los ojos.

Ptosis.

Parálisis de músculos de pupila por reumatismo o después de haber tomado frío, en tiempo húmedo, o después de mojarse los pies (Kent).

Oídos

Sensación de zumbidos o silbidos, peor al caminar, neuralgia de oídos.

Inflamación erisipelatosa con vesículas de oído externo.

Cara

Pálida, de aspecto enfermizo, o roja y cubierta de sudor.

Ulceraciones de comisuras de labios.

Herpes febril alrededor de la boca.

LAS MANDÍBULAS CRUJEN A CADA MOVIMIENTO DE MASTICACIÓN Y SE DISLOCAN FÁCILMENTE.

Luxación fácil de mandíbula en articulaciones témporo-maxilares (ignat., petrol.).

ERISPELA DE CARA con anchas ampollas que se extienden rápidamente de izquierda a derecha, con inflamación violeta de piel que está edematizada, hinchada; mucho ardor, escozor, pinchazos; con fuerte temperatura, delirio y agitación características.

Eczema pruriginoso y escozor de cara : COSTRAS DE LECHE, (viola tricol., calc. ost.).

Neuralgias faciales reumáticas.

Aparato digestivo

BOCA :

SEQUEDAD DE BOCA, LENGUA Y FARINGE, CON GRAN SED.

Encías ardientes y dolorosas.

Los dientes parecen largos y flojos.

Lengua seca, dolorosa, agrietada, con capa espesa de mucus blanco u oscuro excepto en la punta donde hay UN ESPACIO TRIANGULAR ROJO; POR OTRA PARTE a menudo sus bordes gruesos conservan impresión de dientes.

Arg. nit., puede tener extremidad de lengua roja dolorosa pero no se parece al triángulo rojo de rhus tox., con lengua seca, en arg. nit., no hay sed como en rhus tox.

Gusto amargo y metálico.

FARINGE Y ESÓFAGO :

Faringe seca, dolorosa, inflamada; la inflamación recae particularmente en tejido mucoso pero también submucoso; pinchazos y gran dificultad para tragar alimentos sólidos cuya deglución provoca espasmo de faringe.

Papilas con hinchazón de parótidas que están rojo oscuro, sobre todo izquierda, pinchazos al tragar.

Inflamación aguda de esófago por absorción de líquidos corrosivos que determinan en mucosa lesiones parecidas a rhus tox (Kent).

ESTÓMAGO :

SED MUY MARCADA, INEXTINGUIBLE; CON GRAN SEQUEDAD DE BOCA, GENERALMENTE CON DESEO DE AGUA O LECHE FRÍA.

Deseo de ostras y dulces, aversión por carne.

Hambre si apetito.

Sensación de hambre, de vacío en boca de estómago pero si deseo de alimentos (Kent).

Náuseas y vómitos; vómitos biliosos y náuseas después de beber agua fría.

Náuseas después de comer, con vómitos súbitos, apetito anormal con tendencia a vomitar; náuseas y regurgitaciones, peor de noche o después de comer.

Sensación de plétora y pesadez de estómago como de peso.

Sensación de latidos en boca de estómago.

Dolor que roe, de estómago.

Sensación dolorosa de estómago y náuseas, sobre todo después de tomar alimentos fríos, helados.

ABDOMEN Y DEPOSICIONES :

Gran distensión abdominal con acumulación de gas; sensibilidad tal que no puede soportar ninguna presión ni aún las frazadas.

Cólicos, dolores como pinchazos, cortantes, aliviados acostándose de espaldas levantando las piernas.

Dolores marcados en región de colon ascendente.

Hígado grande, doloroso, impide acostarse sobre la derecha.

DIARREA CON DEPOSICIONES POCO ABUNDANTES, VISCOSAS, A MENUDO MEZCLADAS CON SANGRE; sensación de ardor DE RECTO antes de deposición que alivia inmediatamente.

Deposiciones DE OLOR CADAVÉRICO, espumosas sin dolor; deposiciones acuosas o en chorro,

INVOLUNTARIAS, MUY NUMEROSAS DE NOCHE y menos de día; deposiciones involuntarias con GRAN AGOTAMIENTO.

Deposición disenterica a la mañana temprano que obliga a levantarse enseguida. (sulphur).

Comezón y ardor de recto con violento tenesmo.

Aparato urinario

Orina poco abundante, muy coloreada, con sedimento más o menos marcado y a veces olor fuerte y penetrante.

Disuria con hematuria.

Necesidad de orinar con tenesmo y dolores en región prostática que provocan deseo de evacuar; mejoría moviéndose.

Tenesmo vesical violento con orina sanguinolenta.

Orina emitida lentamente por especie de debilidad parálitica de vejiga.

Hay a veces parálisis completa de vejiga con incontinencia nocturna.

Micciones frecuentes día y noche, debilidad de vejiga en niñas o mujeres con necesidad de orinar, pérdida involuntaria de orina si tiene frío (Kent).

Dolores en región renal con orina albuminúrica, sanguinolenta o cargada de espeso sedimento blanco que se deposita en el fondo del recipiente (Kent).

Órganos genitales

MASCULINOS :

Hinchazón erisipelatosa, erupción húmeda, piel gruesa, edematizada, en escroto, con prurito intolerable.

FEMENINOS :

Hinchazón erisipelatosa, erupción húmeda, extremadamente pruriginosa de órganos genitales externos : labios, etc.

Reglas adelantadas, acres e irritantes, se prolongan demasiado.

A veces, con restos mucosos (Kent).

Loquios en pequeña cantidad, durante largo tiempo, ofensivos, dolores de puntada en vagina.

Prurito de pezón.

Aparato respiratorio

NARIZ :

Erupción costrosa alrededor de fosas nasales con comezón y ardor.

Coriza con sensación abundante, acre y excoriante; dolores en huesos de nariz al estornudar; particularmente indicado si ese coriza sobreviene después de exposición torpe a humedad.

Epistaxis al agacharse, o de noche; la sangre es negra.

LARINGE Y PULMONES :

Sensación de calor, escozor, desolladura de laringe.

Ronquera después de forzar la voz (arnica).

Ronquera sobre todo marcada al empezar a hablar, cantar, luego desaparece o mejora después de hablar un instante o cantar algunas notas.

Tos provocada por sensación de cosquilleo detrás de esternón, seca, molesta, sobre todo marcada de medianoche a la mañana, o durante escalofrío o en cuanto se destapa un poco, o simplemente por sacar las manos de las frazadas.

Resfrío gripal, influenza con dolores en todos los huesos (eupat.

perf.) particularmente después de estar expuesto al frío húmedo.

Hemoptisis de sangre rojo vivo por esfuerzo, por haber tocado muy violentamente un instrumento de viento.

Aparato circulatorio

Produce verdadero ERETISMO CIRCULATORIO con PALPITACIONES a veces muy marcadas, y pueden sobrevenir aún estando sentado, en reposo; palpitations que sacuden todo el cuerpo; palpitations con angustia, a la mañana al despertar; palpitations haciendo ejercicio.

Sensación de debilidad en pecho como por músculo cardíaco fatigado, como si hubiera sido forzado.

Por eso está indicado EN HIPERTROFIA CARDÍACA SIMPLE, no ASOCIADA A LESIONES, VALVULARES O RENALES Y PROVENIENTES DE ESFUERZOS PROLONGADOS, EXAGERADOS.

(Arnica, cactus); hipertrofia cardíaca en corredores a pie y deportistas.

A menudo los malestares de corazón van acompañados DE SENSACIÓN DE ENTUMECIMIENTO Y

DEBILIDAD DE BRAZO Y HOMBRO IZQUIERDOS.

PULSO PEQUEÑO Y ACELERADO, A MENUDO IRREGULAR E INTERMITENTE; sin tendencia a ser lleno y fuerte como acon.

Espalda y extremidades

Por su acción electiva sobre TEJIDO FIBRO CONJUNTIVO tiene influencia de primer orden en esta región.

Ningún medicamento tiene síntomas tan marcados en APONEUROSIS, TENDONES MUSCULARES O LIGAMENTOS ARTICULARES Y rhus tox es el más indicado cuando están inflamadas POR ATAQUE DE REUMATISMO, O DESPUÉS DE ABUSO DE EJERCICIO, O TORCEDURA SÚBITA, una entorsis, por ej.

En todos estos casos; el factor humedad como causa determinante o agravante, tiene gran importancia.

SENSACIÓN DE RIGIDEZ MUSCULAR DOLOROSA ALIVIADA POR MOVIMIENTO.

SENSACIÓN DE RIGIDEZ DOLOROSA DE TENDONES, LIGAMENTOS, ARTICULACIONES Y FASCIES, DESPUÉS DE REUMATISMO, DE ESFUERZO VIOLENTO, EJERCICIO MUSCULAR PROLONGADO, EXPOSICIÓN A FRÍO HÚMEDO; Y SIEMPRE MEJORADOS POR MOVIMIENTO.

RIGIDEZ MUSCULAR GENERAL O PARCIAL, RIGIDEZ ARTICULAR, QUE DESAPARECE POR MOVIMIENTO.

Ante tales síntomas y cuando son consecuencia de ejercicio muy violento o prolongado, comparar con arnica; pero ésta actúa más especialmente sobre músculos que sobre ligamentos; está indicado cuanto después de largo ejercicio, hay menos rigidez muscular y sobre todo articular, que una especie de sensación dolorosa que da sensación de contusión, de magulladura muscular; las articulaciones están poco o nada interesadas; el movimiento no alivia como en rhus tox....

Para entorsis, arnica no es el mejor remedio, sino más bien rhus tox. a menos que haya equimosis, o extravasación sanguínea, en cuyo caso arnica está indicado.

Ars. alb., para consecuencias de largo esfuerzo muscular, cuando se ha hecho para escalar una montaña, para hacer una ascensión larga y penosa, aquí los efectos de la rarefacción del aire se pueden agregar a los de la fatiga.

En ambos no se nota mejoría por movimiento característica de rhus tox.

RIGIDEZ ARTICULAR DOLOROSA, REUMÁTICA AGRAVADA POR REPOSO, MEJORADA POR MOVIMIENTO : RIGIDEZ DOLOROSA AGRAVADA CUANDO COMIENZA A MOVERSE, PERO CONTINUAR EL MOVIMIENTO ALIVIA; EL CALOR TAMBIÉN MEJORA, EL FRÍO Y LA HUMEDAD TIENEN COMO PARA TODO EN rhus tox., LOS MALOS EFECTOS QUE YA CONOCEMOS.

MIEMBROS SIEMPRE E MOVIMIENTO PORQUE SE SIENTE MEJOR POR UN TIEMPO, DESPUÉS DE CAMBIO DE POSICIÓN.

HINCHAZÓN ARTICULAR DOLOROSA; DOLORS DESGARRANTES DE TENDONES, LIGAMENTOS ARTICULARES Y FASCIAS MEJORADOS POR MOVIMIENTO, AGRAVADOS POR REPOSO; EL AIRE NO ES TOLERADO, PONE LA PIEL DOLOROSA.

DOLORS ARTICULARES DE DISLOCACIÓN, TORSIÓN, PESADEZ, PRESIÓN CON SENSACIÓN DE FRÍO, ENTUMECIMIENTO, RIGIDEZ; AGRAVADOS POR REPOSO, HUMEDAD, FRÍO, DESPUÉS DE MEDIANOCHE; MEJORADOS POR MOVIMIENTO DE ARTICULACIÓN ENFERMA.

Cierto número de remedios tienen mejoría por movimiento y se pueden comparar con rhus tox. : anacard. : dolor de cuello peor al comenzar a moverse pero no tiene enseguida mejoría por reposo; conium : agravación al principio del movimiento, pero ambos difieren completamente.

Lycop. y puls. : alivio por movimiento lento.

Ferr. met. : dolores neurálgicos y reumáticos aliviados hacia la noche por movimientos lentos.

Kalmia lat. : dolores tirantes de piernas pero extremadamente inestables, cambian de lugar a cada instante y no se alivian por movimiento.

Rhodod. : gran susceptibilidad a cambios de tiempo, hormigueos y rigidez dolorosa como rhus tox., y agravación por reposo; especialmente indicado para gota reumática de pequeñas articulaciones y tiene características especiales que impiden confundirlo con rhus tox.

DOLOR y RIGIDEZ DE CINTURA, PEOR ESTANDO SENTADO, MEJOR ACOSTADO SOBRE ALGO DURO Y POR MOVIMIENTO.

DOLORS EN REGIÓN LUMBAR COMO SI LA ESPALDA ESTUVIERA ROTA.

EXCELENTE PARA LUMBAGO DESPUÉS DE MOJADURA, DE HABER TOMADO FRÍO, DE SUPRESIÓN MAL HECHA DE TRANSPIRACIÓN ABUNDANTE, DE LEVANTAR ALGO MUY PESADO : DOLOR MAS VIVO CUANDO COMIENZA A MOVERSE.

PERO LA CONTINUACIÓN DEL MOVIMIENTO MEJORA.

SENSACIÓN DE RIGIDEZ DOLOROSA EN SACRO Y REGIÓN LUMBAR, AGRAVADA REPOSANDO DESPUÉS DE HABER HECHO EJERCICIO.

Sulph. : dolores reumáticos, con rigidez en región lumbar, pérdida súbita de fuerza al tratar de moverse, pero tiene otras características que no tiene rhus y permiten elegir entre ambos.

Bryon. : dolores tireantes, pinchazos, con rigidez de músculos de espalda y lumbares que impiden caminar, pero con agravación por movimiento y mejoría por reposo.

Calc. fluor. : dolores de lumbago por esfuerzo, agravados al comenzar los movimientos, que, continuados, mejoran, lo mismo que el calor.

Nux vom. : dolores de lumbago en relación con hemorroides o abuso de onanismo; vivos, obligan a sentarse para darse vuelta, cuando está acostado; estando parado le es penoso darse vuelta o doblar el cuerpo; la posición sentada le es particularmente desagradable.

Kali carb. : dolores agudos en región lumbar, peores a las 3 de la mañana y obligan a levantarse y caminar; irradian hacia abajo, hacia nalgas.

Petrol., y ruta : útiles cuando los dolores lumbares están peor a la mañana, pies rígidos.

Hay que pensar en valer.

Debilidad paralítica de miembro superior con sensación de frío e insensibilidad.

Hinchazón y contractura dolorosa de dedos.

Cuando toma algo, siente pinchazos y hormigueos en manos y dedos; entumecimiento y hormigueo en dedos.

Sensación constante en vejiga como si estuviera llena.

CIÁTICA CON DOLORS DESGARRANTES, TIRONEANTES A LO LARGO DEL NERVIJO, PEOR DURANTE REPOSO, MEJOR POR MOVIMIENTO, MIEMBRO DOLOROSO EN MOVIMIENTO CONSTANTE; PARTICULARMENTE ÚTIL EN TAL CIÁTICA POR FRÍO, TIEMPO HÚMEDO, EXPOSICIÓN A LLUVIA, POR TOMAR FRÍO ESTANDO TRANSPIRADO, SI HA SIDO SUPRIMIDA LA TRANSPIRACIÓN.

A continuación los principales medicamentos para tratamiento de ciática clasificados por lateralidad de acción : no basta para determinar la elección pues muchos tienen lateralidad indiferente; pero; al menos, esta clasificación tiene la ventaja de fijar la atención, sin excluir la búsqueda de otras características.

(Según el Dr. Paul Chiron) : "El tratamiento de la ciática" en La revista francesa de homeopatía - Septiembre 1920. Medicamentos de lateralidad indiferente

Acon. : Ciática al principio, con dolores lancinantes o desgarrantes, con entumecimiento e hipersensibilidad al menor contacto.

Agravación de noche y por movimiento, mejoría estando sentado; gran agitación.

Ars. alb. : Ciática con dolores ardientes y desgarrantes con agitación, gran debilidad, tendencia a estar acostado.

Agravación de noche, particularmente después de medianoche.

Por frío.

Mejoría por calor y aplicaciones calientes.

Bell. : Ciática con dolores lancinantes en ataques cotidianos, a latarde hasta medianoche.

Hipersensibilidad de piel de miembros tal que ni puede soportar el simple contacto de las frazadas.

Gran agitación.

Agravación por la menor corriente de aire.

Mejoría por calor; o estando parado o cuando tiene las piernas colgando.

Bryon. : Ciática con dolores tironeantes, desgarrantes, lancinantes o como causados por ulceración subcutánea; dolores localizados en región lumbar y que se extienden al muslo.

Agravación por el menor movimiento y por presión fuerte.

Mejoría por reposo y estando acostado sobre el lado doloroso.

Gelsem. : Ciática obstinada, dolores ardientes, por ataques, contemblor y gran debilidad del miembro.

Agravación de noche por reposo y al comenzar a caminar.

Mejoría por transpiración y por movimiento.

Lycop. : Caso crónico, con dolores ardientes y pinchazos, periódica, con completa remisión en intervalos de ataques.

Rigidez y debilidad de miembro afectado, no puede enderezar la pierna.

Agravación por reposo, estando parado, o acostándose sobre el lado doloroso.

Mejoría por movimiento.

El Dr. Chiron lo clasifica como teniendo ciática de lateralidad indiferente; ciertos autores aconsejan no olvidar que lo más frecuente es su lateralidad derecha.

Merc. : Ciática con dolores desgarrantes y tironeantes a todo lo largo de muslo, de cadera a rodilla con sensación de debilidad, de calor intenso aunque la piel esté fría.

Agravación por acostarse, al movimiento, al atardecer y de noche.

Mejoría al aire libre y al mañana.

Nux v. : Dolores tironeantes y desgarrantes a lo largo de miembro afectado, de cadera a pie, con rigidez y contracción.

Agravación a la mañana, acostándose sobre el lado doloroso, por frío.

Mejoría por reposo y aplicaciones de agua caliente.

Plumb. : Ciática crónica, con atrofia muscular.

Dolores continuos, constrictivos y desgarrantes.

Agravación de noche, por calor, movimiento, presión ligera.

Mejoría por masaje.

Phytol. : Dolores lancinantes, tironeantes, latentes de parte externa, localizados en cara externa de muslo, aunque se puede encontrar en parte posterior.

Agravación por movimiento, presión de noche y después del sueño.

Mejoría por reposo y calor.

Un terreno sífilítico es una indicación más.

Rhus tox. : Dolores penetrantes, ardientes, desgarrantes, con sensación de frío y entumecimiento.

Hormigueos y rigidez parálitica de miembro.

Agravación de noche, por reposo y al empezar a moverse.

Mejoría por movimiento, calor seco.

Ciática a frigore o por esfuerzos.

Ruta grav. : Dolores profundamente situados, como en médula de huesos, o con sensación como si el hueso estuviera roto.

Enfermo obligado a caminar constantemente durante el ataque, porque el dolor aumenta en cuanto se sienta o acuesta.

Agravación por tiempo húmedo, de noche.

Visc. alb. : Caso grave; dolores tironeantes y latentes en los muslos.

Sensación como si los músculos fueran retorcidos con pinzas calientes.

La pierna parece pesada como plomo.

Hipersensibilidad de muslo.

Gran postración.

Agravación por tacto, por el menor movimiento.

Mejoría por reposo.

Medicamentos con lateralidad derecha

Colocynth. : Ciática derecha con dolores agudos, tironeantes, pinchazos, en región sacra, cadera, muslo, rodilla; a veces dolores fulgurantes de sacro a talón.
Ataques dolorosos intolerables.
Mejoría por reposo absoluto y aplicaciones calientes.
Dioscorea : Ciática derecha con dolores desgarrantes, tironeantes en cadera derecha y a lo largo del muslo.
Dolores calambroides de piernas.
Agravación al levantarse, moviendo el miembro al caminar.
Mejoría por reposo.
Graph. : Afecta particularmente la derecha : dolores lancinantes, a todo lo largo del nervio ciático y dolores ardientes; sensación de entumecimiento alternando con dolores.
Agravación dejando el miembro estirado, por caminar, por movimiento.
Mejoría estando sentado en una silla, flexionando la pierna sobre el abdomen.
Índigo : Dolores agudos de cadera derecha al resto de la pierna, con rigidez de miembro.
Agravación por reposo, estando sentado, después de comer.
Mejoría por movimiento.
Magn. phosph. : Ciática derecha, con dolores lancinantes, agudos por ataques bruscos fulgurantes.
Imposibilidad de quedar en cama de noche, debe estar de pie constantemente.
Pallad. : Ciática derecha con dolores lancinantes, de dedo grande a cadera o de trocánter a hueco poplíteo.
Agravación por frío, movimiento, a la noche.
Mejoría por calor y reposo.
Tellur. : Ciática principalmente derecha, que irradia de sacro a pierna con sensibilidad de columna vertebral.
Agravación por el menor esfuerzo, risa, tos y estando acostado sobre el lado afectado.
Medicamentos con lateralidad izquierda
Amm. mur. : Ciática grave que dura largo tiempo.
Dolores de pierna izquierda con sensación de contractura en miembro que obliga a renguear.
Dolores desgarrantes y pinchazos agravados cuando está sentado, ligeramente disminuidos por caminar; enteramente mejorado estando acostado.
Chamom. : Ciática izquierda con dolores tironeantes y desgarrantes; sensación de entumecimiento en todo el miembro.
Gran sensibilidad al menor dolor que es insoportable.
Agravación de noche, en cama y por el menor movimiento.
Cimicif. : Dolores violentos de cadera izquierda que obligan a salir del lecho.
Mejoría por presión y estando parado.
Aupat. perf. : Ciática izquierda con dolores violentos en todo el largo del nervio con sensación de pierna débil como paralizada.
Agravación por movimiento.
Iris versic. : Ciática izquierda, con dolores agudos, ardientes, a todo lo largo del nervio, hasta el pie.
Sensación como si la articulación coxo femoral estuviera luxada.
Agravación de noche, por reposo, al principio del movimiento.
Mejoría por movimiento.
Kali bichro. : Ciática izquierda con dolores violentos que se desplazan a todo lo largo de la pierna.
El dolor sobreviene y desaparece bruscamente.
Agravación estando parado, estando en la cama y sentado.
Mejoría por caminar, por flexión de miembro.
Kali iodat. : Dolores tironeantes con puntadas en parte posterior de muslo y rodilla izquierdos.
Contracciones espasmódicas de músculos.
Agravación de noche y acostado sobre el lado afectado.
Mejoría por movimiento.
Ledum pal. : Dolores que afectan más el lado izquierdo.
Pinchazos y tirones que se extienden de cadera a pie, con sensación de presión y contractura en músculos de región posterior del muslo.
Agravación de noche, por calor del lecho, tacto.
Mejoría por frío.
Stillingia : Ciática izquierda con dolores violentos con tirones de cadera a pierna y dedo grande.
Terreno sifilítico Sulphur : Dolores penetrantes, tironeantes, de cadera izquierda a extremidad inferior de miembro, con sensación de pesadez y entumecimiento.
Agravación por caminar y de noche, por el calor del lecho.
Si deseamos clasificar estos medicamentos, no solamente por lateralidad sino por otras características, tendremos el cuadro siguiente.
Medicamentos con lateralidad indiferente

- 1) MEJORÍA POR REPOSO : Acon., bryon., merc., nux v., plumb., phytol., visc. alb.
- 2) MEJORÍA POR MOVIMIENTO : Gels., lycop., rhus tox., ruta.
- 3) MEJORÍA POR CALOR : Ars. alb., bell., rhus tox.
- 4) MEJORÍA POR APLICACIONES DE AGUA CALIENTE : Nux v.
- 5) AGRAVACIÓN DE NOCHE : Acon., gels., merc., plumb., rhus tox., ruta.
- 6) AGRAVACIÓN A LA MAÑANA : Nux v.

Medicamentos con lateralidad derecha

- 1) MEJORÍA POR REPOSO : Coloc., dioscor., graph., pallad., tellur.
- 2) MEJORÍA POR MOVIMIENTO : Índigo, magn. phosph.
- 3) MEJORÍA POR CALOR : Coloc., magn. phosph.
- 4) AGRAVACIÓN POR FRÍO : Coloc., pallad.
- 5) MEJORÍA DOBLANDO LA PIERNA : Gnaphal.
- 6) AGRAVACIÓN POR EL MENOR ESFUERZO : Tellur.

Medicamentos con lateralidad izquierda

- 1) MEJORÍA POR MOVIMIENTO : Iris., kali iod., kali bich.
- 2) AGRAVACIÓN POR REPOSO : Chamom., eupat purp., sulph., still.
- 3) MEJORÍA ESTANDO ACOSTADO : Ammom. mur.
- 4) AGRAVACIÓN EN CAMA, DE NOCHE : Chamom., sulph., ledum.
- 5) MEJORÍA POR PRESIÓN O ESTANDO PARADO : Cimicif.

Gran fatiga y sensación de pesadez de miembros inferiores pero que no impiden moverlos, porque esto alivia.

Debilidad de piernas al subir escaleras.

ENTORSIS DE TOBILLOS Y OTRAS ARTICULACIONES; si hay equimosis, es útil después que arnica ha hecho desaparecer los síntomas más dolorosos, y para combatir debilidad de ligamentos articulares y tendones que sigue generalmente a entorsis.

Calambres de pantorrillas, de noche, o cuando se sienta después decaminar, mejorados por movimiento.

Hinchazón de pies, de noche.

Piel

DOLOROSA AL AIRE FRÍO Y AGUA FRÍA.

Rhus tox. desarrolla y cura ERUPCIÓN VESICULOSA CON EDEMA, ARDOR Y COMEZÓN INTENSA, NO MEJORADA POR RASCADO : HAY MUCHA HUMEDAD, REZUMA MUCHO LA PIEL CON LA ERUPCIÓN.

LA COMEZÓN CONTINUA SE ALIVIA A VECES APLICANDO AGUA TAN CALIENTE COMO LA PUEDESOPORTAR.

Para Nash, es uno de nuestros mejores remedios en EL ZONA.

Comparar aquí con ars. alb., crot. tigl., dolich. prur., graph., mezer., ran. bulb.

ERISPELA, LO MAS A MENUDO DE CARA, con vesículas, supuración, escozory prurito externo; edema de piel, que está rojo oscuro en ese lugar; tendencia a ir DE IZQUIERDA A DERECHA al contrario de apis, que va de derecha a izquierda y se acompaña de coloración menos oscura, rosada, ausencia de supuración, de sed y mejora por frío.

Rhus tox. precede a menudo aquí al estado de ars. alb.

Fiebre

Cada vez que, en enfermedad febril, la inteligencia se vuelve confusa, nublada, o la estupefacción se instala con profundo grado de delirio suave, balbuceo, lengua seca, cubierta por capa oscura con triángulo rojo en la punta, gran sed, hay que pensar en rhus tox.; siempre que haya su agitación característica (Nash).

Fiebre adinámica con agitación y temblor.

Escalofríos pasajeros o continuos con sensación de ser salpicado con agua fría y seguidos de calor y deseo de estirar los miembros.

Sed durante el calor, raramente durante escalofríos.

Sudor en todo el cuerpo, excepto cabeza y cara.

En FIEBRE TIFOIDEA, el cuadro clínico que requiere rhus tox. es : delirio suave asociado a agitación mental y física con profunda postración; enfermo indiferente a todo y la sensación de gran debilidad está fuera de proporción con los otros síntomas; cuando se lo interroga, responde lentamente y contra su voluntad, a veces con vivacidad, jamás con violencia; tiene fuerte cefalea frontal cuyo dolor compara al que causaría una plancha fuertemente apretada sobre la frente; esta cefalea puede ser acompañada de epistaxis que alivia.

Lengua seca, marrón, agrietada, conserva impresión de dientes, con triángulo rojo en la punta.

Diarrea más o menos abundante, de olor cadavérico, con deposiciones marrón amarillento, a veces involuntarias, sobre todo durante el sueño.

Abdomen timpanizado, superficie del cuerpo seca y caliente y si hay transpiración, e copiosa, de olor agrio con rash miliar.

En fiebres intermitentes, la tos durante el escalofrío es característica.

Relaciones

Complementarios

Bryon., calc. fluor., ars. alb., bovista, en urticaria.

Antídotos

Anacard., croton tigl., mezer., cyriped., plumbago (eczema de vulva); graph., bryon., bell., rhodod.

Incompatible

Apis.

RUMEX CRISPUS

O Paciencia Silvestre, Paciencia Amarilla, planta vivaz de la familia de las Polygonáceas, crece en lugares húmedos.

Se prepara la tintura madre con la que se obtienen, por diluciones hahnemannianas sucesivas, las diferentes dinamizaciones, haciendo macerar en alcohol a 90º, la planta recolectada durante la floración.

Acción general del medicamento

Rumex crispus sólo ha sido experimentado incompletamente; sus síntomas mentales han sido mal observados y la información que tenemos no es perfecta; pero sus síntomas catarrales han sido bien experimentados y los conocemos bien (Kent).

SU TENDENCIA CATARRAL es muy notable; bajo su influencia, todas las mucosas del árbol respiratorio se inflaman y esta inflamación va acompañada de MUCOSIDAD EXTREMADAMENTE ABUNDANTE.

"La he visto correr tan abundantemente por nariz, escribe Kent, que parecía continua; también la he visto en tal cantidad por tráquea y bronquios que en poco tiempo el enfermo había expectorado un cuarto litro de mucosidades blancas como agua".

Pero en ciertos casos DISMINUYE SECRECIONES DE MUCOSA TRAQUEAL Y LARINGEA, provocando sequedad marcada en esas zonas con exaltación de sensibilidad; de ahí, alteraciones de voz y tos con sensación desagradable de cosquilleo; yendo apenas esta acción hasta la inflamación.

A veces toma carácter gripal, hay secreción mucosa abundante y expectoración líquida, acuosa, espumosa, emitida en verdaderas bocanadas; luego el mucus se hace espeso, blanco o amarillo, filamentosos, tenaz, tan difícil de expectorar que ni tosiendo no sonándose llega a expectorarlo.

Este estado catarral va generalmente acompañado por DIARREA MATINAL, que es rasgo importante de su acción.

Actúa de manera marcada sobre PIEL donde determina INTENSO PRURITO AGRAVADO POR EXPOSICIÓN A AIRE FRÍO Y ALIVIADO POR CALOR, diferente del de sulf.

y merc.

Modalidades

Agravación

a) AL FRÍO, RESPIRANDO AIRE FRÍO, ESTANDO DESCUBIERTO : gran sensibilidad al aire frío, marcada sobre todo en vías respiratorias; tal vez ningún otro tiene mucosas de estas regiones tan sensibles al frío : debe cubrir su cabeza con las frazadas para no respirar el aire frío que enseguida excitaría la tos.

b) Sensible al aire frío, a baños fríos, como rhus tox., pero SE AGRAVA POR MOVIMIENTO.

Por eso, se podría confundir con bryon. pero éste no es tan sensible al aire frío; al contrario, bryon. puede aliviarse por aire frío y agravarse en cuarto caliente (Kent).

c) La sensibilidad nerviosa de rumex al aire libre es tan marcada como en nux. v. (Kent).

d) A LA NOCHE (excepto la diarrea que es peor a la mañana).

e) En hemitórax izquierdo.

f) Estando extendido (hyosc.).

Mejoría

POR CALOR

CABEZA

Dolor de cabeza catarral con gran irritación de laringe y tráquea, y sensación de magulladura dolorosa detrás de clavículas y esternón.

Estos dolores sobrevienen durante las fases de sequedad de mucosa alternando con aquellas en que domina secreción abundante (Kent).

Aparato digestivo

ESTOMAGO :

La mucosa gástrica parece interesada como las otras.

Digiere difícilmente y sólo el alimento más liviano y simple.

Dolores sordos, constrictivos, sofocantes, en epigastrio hasta la espalda.

La ropa parece muy ajustada.

Dolores sordos en hueco de estómago que se extienden al pecho, con sensación de presión como de bola en hueco de estómago, a veces con sensación de subir hasta detrás del esternón; agravación después de comer y mejoría permaneciendo acostado muy tranquilo.

Dolor lancinante en hueco de estómago que irradia al pecho, particularmente ala izquierda, dolor sordo, o lancinante, en hueco de estómago, y arriba, de cada lado del esternón.

SE AGRAVA HABLANDO; ES CURIOSO OBSERVAR COMO SE AGRAVAN HABLANDO LOS SÍNTOMAS DE ESTOMAGO; este parece magullado; se grava caminando, respirando aire frío; necesita cosas calientes.

ABDOMEN Y DEPOSICIONES :

Flatulencia abdominal y gástrica, con dolores, por gases; dolores aliviados por emanaciones y emisiones de gas (carb. veg.).

DIARREA parecida a sulph., podoph., y nat. sulf., en que SOBREVIE NE LA MAÑANA Y ES TAN IMPERIOSA QUE OBLIGA A LEVANTARSE ENSEGUIDA PARA EVACUAR; pero es una diarrea marrón, maloliente, QUE TIENE TENDENCIA A ACOMPAÑARSE DE TOS.

Tal diarrea se encuentra a veces en tisis y rumex será muy útil.

Aparato respiratorio

NARIZ :

Coriza con sensación de obstrucción nasal y de sequedad hasta en rino-farinx.

Coriza que comienza por sensación de sequedad muy marcada en parte posterior de nariz y rino-farinx a tal punto que carraspea continuamente; irritación inflamatoria grande que no puede dejarla tranquila; sensación de mucosa como gruesa; de picoteo, comezón, desde punta de nariz hasta faringe y se suena sin cesar, estornuda y carraspea. Esta inflamación puede descender a laringe, tráquea, bronquios, y alcanzar terminaciones brónquicas, desencadenando bronquitis capilar o neumonía (Kent).

Estornudos violentos con el coriza que es fluente sobre todo al atardecer y noche, como muchos síntomas del remedio.

Coriza líquido con estornudos y dolores de cabeza, agravando al atardecer y la noche.

Acumulación de mucosidades en rino-farinx, muy difíciles de expectorar.

Secreción de mucosidades amarillas detrás de la nariz, en rino-farinx.

Epistaxis, estornudos violentos e irritación violenta de fosas nasales (Kent).

LARINGE, BRONQUIOS Y PULMONES :

Sensación de comezón e irritación de faringe y tráquea; carraspea continuamente; afonía, no puede hablar porque las cuerdas vocales están cubiertas de mucosidades tenaces que tiene gran dificultad para expectorar.

Caust. afonía por estado paralítico de cuerdas vocales; phosph. : afonía aliviada carraspeando y sacando mucosidades allí acumuladas.

Sensación de bola en garganta, no aliviada al tragar o carraspear; parece descender y desaparecer cuando traga, pero el movimiento de deglución terminado, enseguida sube (este es también un gran síntoma de lach.).

Afecciones catarrales de garganta y rino-farinx.

Este remedio muestra las fases sucesivas de un gran resfrío, pero es sobre todo indicado en los que TOMAN FRÍO CONTINUAMENTE, SE AGRAVAN AL MENOR CAMBIO DE TIEMPO, ESTÁN SIEMPRE TIRITANDO, NO ABANDONAN EL RINCÓN AL LADO DEL FUEGO, QUIEREN ESTAR MUY ABRIGADOS, AUN LA CABEZA (KENT).

Afonía después de exponerse al frío, con mucosidades tenaces en laringe y deseo continuo de carraspear.

COSQUILLEO EN EL FONDO DE LA GARGANTA QUE PROVOCA TOS; trata de luchar tanto como puede contra la tos por la sensación de ardor y desolladura que experimenta en laringe y tráquea.

TOS INCESANTE, VIOLENTA, SECA, FATIGANTE, CON POCO O NADA DE EXPECTORACIÓN.

AGRAVADA AL HABLAR, POR PRESIÓN Y SOBRE TODO AL RESPIRAR AIRE FRÍO, DE NOCHE.

(Phosph., spong.), PASANDO DE CUARTO CALIENTE A PIEZA MAS FRÍA O AL AIRE FRÍO (bryon. y nat. carb. lo contrario).

Tos con dolor detrás del esternón.

Tos ronca, perruna, algunos instantes después de acostarse o por ataques, hacia las 23 hs. o entre 2 y 5.

Lach., tiene un síntoma similar; en él, se ve a niños, toser así durante el primer sueño, pero si se los mantiene despiertos no tosen más : esta tos corresponde a la agravación general por el sueño.

En rumex, al contrario, la tos sobreviene hacia las 23, duerma o no el niño.

Tos seca, atormentadora, impide dormir; agravada por presión, por hablar, y ESPECIALMENTE DE NOCHE, Y RESPIRANDO AIRE FRÍO; la tos se agrava, no solamente por frío; sino POR TODO LO QUE AUMENTA EL VOLUMEN O RAPIDEZ DE AIRE RESPIRANDO; debe permanecer sentado sin moverse; no puede respirar rápido ni profundamente, ni irregularmente, porque eso provoca violentos accesos de tos con violenta sensación de ardor en laringe y tráquea.

El ataque es tan violento que lo tiene a la mañana, al despertar, al mismo tiempo que la necesidad de evacuar, emitirá la evacuación involuntariamente.

También la orina corre involuntariamente durante el ataque. (caust.).

Gran sensación de ardor y escozor en laringe y tráquea.

DOLOR DE MAGULLADURA, DE DESOLLADURA DETRÁS DE CLAVÍCULAS, con sensación como si el tejido estuviera en carne viva, si a cada inspiración, el aire frío pasara por esa parte y avivara la sensación de desolladura y ardor.

Calmante precioso en tisis avanzada; ayuda a soportar un invierno más.

Con rumex, puls., senega, ars. alb., y nux v. se podrán aliviar los últimos años de un tísico.

Con respecto a la diarrea de la mayoría de casos de tisis, acet. ac. se puede recomendar; pero, a menos que sea muy marcado, vale más dejar este estado tranquilo; si tal diarrea es muy agotadora, más vale emplear un remedio simple como éste para disminuirla un poco; pero si hay sólo un poco de diarrea, una sola deposición líquida a la mañana, esto es mejor para el tísico; en cuanto a sudores nocturnos, cuanto más se trate de detener estos emuntorios naturales, de cerrar estas válvulas, más se perjudicará al enfermo, y si se llega a esto, vale más abandonar la homeopatía pues sólo se podrán calmar los sufrimientos del paciente con morfina.

Los dolores sordos, las sensaciones de magulladura, de fatiga dolorosa del tísico, se calmarán con arnica que también calmará la tos y traerá el sueño.

Mas tarde, pyrog. puede calmar dolores de huesos y accesos de tos dolorosa.

Así se lleva a tropezones, al enfermo, de un año a otro.

A veces necesita ars. alb. y generalmente hay que repetirlo más frecuentemente.

Otras, lycop. o puls.

Pero finalmente se produce la decadencia vital, y estos remedios, aún repetidos cada vez con mayor frecuencia ya no surten efecto.

Poco a poco se instala una terrible disnea, la superficie respiratoria disminuye y hay falta de aire, extremidades edematizadas, mayor adelgazamiento, facies hipocrática y fallo cardíaco, sudor frío; debilidad cada vez mayor.

Siempre se puede aliviar con tarent. cub. que provocará una eutanasia que nada tiene de comparable con los efectos de la morfina (Kent).

Piel

ERUPCIÓN CARACTERIZADA POR COMEZÓN INTENSA EN CUANTO SE DESVISTE PARA ACOSTARSE.

Es vesiculosa o parecida a urticaria simple.

PRURITO VIOLENTO EN REGIONES VARIADAS; AGRAVADO POR FRÍO; MEJORADO POR CALOR; PEOR AL DESVESTIRSE O EXPONERSE AL AIRE (hep. sulf. calc., nat. sulf., oleand.; en éste último hay más ictericia y síntomas de paludismo; si se trata de comezón general agravada por calor, sobre todo calor de la cama, pensar en merc. sol. o merc. protoiod.) (Nash).

RUTA GRAVEOLENS

Planta herbácea vivaz, familia de la Rutáceas crece en el Mediodía de Europa y Norte de África.

También se cultiva en jardines, pero la silvestre es más activa y es la que se emplea para la preparación del remedio; tiene olor fuerte, fétido, penetrante, característico.

Las diferentes dinamizaciones se preparan por diluciones hahnemannianas sucesivas, partiendo de la tintura madre obtenida por maceración en alcohol a 90º de hojas y botones floríferos recogidos un poco antes de que abran las flores.

Acción general del medicamento

Aplicada en estado fresco sobre la PIEL, irrita violentamente y determina inflamación con enrojecimiento y tumefacción y flictenas.

Ingerida y en dosis ponderables, inflama mucosa de estómago y duodeno, no tardando en producir un poco de narcotismo con agitación y excitación nerviosa y finalmente, si es una mujer encinta, irritación espasmódica de útero y expulsión de feto.

Es, para nosotros, un remedio importante, por su INFLUENCIA SOBRE TEJIDO FIBROSO, APONEUROSIS Y TENDONES, particularmente flectores (Kent).

Las MUÑECAS parecen ser uno de los principales lugares de elección en su acción sobre estos tejidos.

Tiene acción pronunciada sobre PERIOSTEO y parece actuar particularmente bien sobre él, después de haber sido lesionado por traumatismo, intervención quirúrgica.

Tiene tendencia a FORMACIÓN DE DEPÓSITOS, NUDOSIDADES, en tendones, alrededor de articulaciones y en periosteo (Nash).

Características

1) SENSACIÓN DE MAGULLADURA, FATIGA DOLOROSA, EN TODO EL CUERPO COMO DESPUÉS DE CAÍDA, PERO MAS MARCADA EN MIEMBROS Y ARTICULACIONES.

Todas las partes del cuerpo sobre las que reposa están dolorosas, como magulladas y ESTO LE HACE CAMBIAR CONTINUAMENTE DE POSICIÓN (bapt., pyrog., arnica); no tiene descanso, cambia sin cesar de posición cuando está acostado; tan agitado como rhus tox.

Modalidades

Agravación

- a) POR FRÍO HÚMEDO, como rhus tox.
- b) POR REPOSO; ESTANDO ACOSTADO, sobre todo los dolores.
- c) HACIA LA NOCHE : tendencia a melancolía hacia la noche.

Mejoría

- a) Por movimiento, siempre como rhus tox.

Síntomas mentales

Aquí no hay nada muy particular; irritable, de mal humor, descontento de los otros y de sí mismo.

También puede estar deprimido, triste, inquieto, abatido, sobre todo hacia la noche.

Ojos.

Si fatiga la musculatura del ojo leyendo caracteres demasiado finos o mal impresos, con trabajos de costura demasiado fina, si ABUSA DE LA VISTA por trabajo demasiado minucioso o prolongado, puede tener en los ojos sensación de FATIGA DOLOROSA, se ponen ROJOS, CALIENTES, ARDIENTES, con dolores de cabeza.

En tal caso, ruta grav. podrá ser de suma utilidad.

Pero hay que distinguirlo de onosmod. y arg. nit., que con nat. mur. se parecen por el dolor de cabeza por fatiga de ojos.

También hay que pensar en mang. acet.

Aparato digestivo

Muy sediento de agua fría, como phosph. (Kent).

Constipación con PROLAPSO RECTAL cuando quiere evacuar; necesidades frecuentes sin resultados con prolapso anal; salida de recto después de parto; dolores de recto estando sentado (Kent).

Prolapso de recto al tratar de evacuar, o si la deposición tiene la menor dificultad para pasar; o si lleva vida demasiado sedentaria; ruta se parece mucho a ignat. en esto; ambos se agravan al agacharse, levantar algo pesado, evacuar; mur. ac. y podoph. también deben tenerse en cuenta : con el primero, prolapso de recto muy doloroso y sensible al menor contacto, al menor tacto, hasta de la sábanas; el recto desciende también al orinar (aloe) el prolapso del segundo va casi siempre acompañado de diarrea característica y puede ser resultado de esfuerzo; también puede haber prolapso uterino.

Aparato urinario

Sensación constante en vejiga, como si estuviera llena aún después de la micción; fin de micción doloroso.

Espalda extremidades

SENSACIÓN DE FATIGA DOLOROSA EN ESPALDA.

Dolor de magulladura en vértebras lumbares.

Dolores de espalda y coxis como si se hubiera magullado por golpe o caída.

SENSACIÓN DE AGOTAMIENTO GENERAL; miembros inferiores que parecen incapaces de sostenerlo por lo débiles que le parecen caderas y muslos (phosph., conium); las piernas flaquean al levantarse de la posición sentado. Los dolores son a menudo provocados por forzada o esguince de articulación (rhus tox.).

Dificultad para mover la muñeca o tobillo después de entorsis; al principiar a arnica y pronto rhus tox., pero cuando se forman nudosidades de tendones de articulaciones lesionadas, dar ruta.

Tendones dolorosos, como magullados.

Muslos dolorosos al estirar las piernas.

Contractura de tendones flexores de manos y pies.

Dolores en tendón de AQUILES, (act. rac.).

Dolor de ciática que desciende desde espalda a caderas y muslos, soportable de día, pero agravado en cuanto se acuesta a la noche. (graph.).

Piel

Erupciones de piel con comezón que cambia de lugar cuando se rasca la región pruriginosa. (Mezer).

SABADILLA

O veratrum sabadilla, o cebadilla (de Cebada), planta herbácea vivaz de la familia de las Colchicáceas originaria de México.

Su raíz es un rizoma tuberoso; su tallo termina en espiga de flores púrpura negruzco; fruto rojizo que se compone de 3 folículos oblongos que contienen semillas, generalmente tres, negruzcas y angulosas; pulverizadas, llevan el nombre vulgar de polvo de capucina.

El sabor de las cápsulas es algo amargo; el de la semilla acre y cáustico; son extremadamente venenosas y encierran un alcaloide, la veratrina, cuyo poder tóxico es considerable.

Para uso homeopático se emplean las semillas con sus cápsulas pulverizadas, y con ellas se obtienen las tres primeras dinamizaciones por trituración hahnemanniana.

Acción general del medicamento

Además de una influencia muy particular sobre LA MENTE en que provoca síntomas tan marcados como especiales, actúa fuertemente sobre MUCOSAS, particularmente de vías respiratorias superiores y tubo digestivo.

En ciertas patogenias se han visto síntomas de PIEL bastante marcados.

Modalidades

Lateralidad

DE IZQUIERDA DE DERECHA (lach.); dolores y estados inflamatorios de garganta comienzan a la izquierda y ganan la derecha, como lach. pero en éste el calor agrava los dolores y provoca espasmos de garganta con sensación de ahogo que la hace desear bebidas frías que lo alivian y traga más fácilmente; en sabad. se alivia por calor, externo o interno (Kent).

Agravación

a) POR FRÍO : "Tirita, sensible a cuarto frío, a alimentos y bebidas fríos que agravan; quiere estar bien abrigado; quiere bebidas calientes para calentar su estómago; propenso a estados catarrales y entonces pide aire caliente, si es catarro nasal, bebidas y alimentos calientes, si es inflamación catarral de garganta; las cosas calientes lo reconfortan; dificultad para tragar cosas frías, esto aumenta sus dolores" (Kent).

b) CON LUNA LLENA.

Mejoría

POR BEBIDAS CALIENTES, ALIMENTOS CALIENTES, ESTANDO BIEN ABRIGADO.

Síntomas mentales

Presenta estado mental tan curioso como particular en sus síntomas : "Lleno de TRASTORNOS IMAGINARIOS; ideas extrañas con respecto a los demás y a sí mismo; impresiones erróneas con respecto a estado de su cuerpo; por ej. : imagina que su cuerpo se marchita, que sus miembros están retorcidos o encogidos, que su mentón se ha alargado, que está más gordo de un lado que del otro; aunque pueda ver que todo esto no es verdad, está persuadido de que así es; convencido de que tiene una espantosa enfermedad de garganta cuyo fin será fatal; imagina estar encinta cuando sólo está hinchada por gases.

Todo esto no es fundado : son enfermedades imaginarias, sin embargo sufretal vez más que si fuera real.

Aquí, pueden compararse algunos remedios : thuya, imagina que su cuerpo es de vidrio y tiene miedo terrible de que se rompa; puls. : gran temor de la mujer que cree perderá su alma; anacard. : cree tener un diablo sentado sobre el hombro, que le habla al oído, mientras en el otro un ángel parece a su vez hablarle, y no sabe a cual escuchar; iod. : lleno de ideas fijas, etc.

Delirio por intermitencia.

Gran disposición a dormir de día; se duerme leyendo, pensando, reflexionando; el esfuerzo mental, que aumenta el dolor de cabeza, provoca sueño; reflexionando, sentado en su sillón, se duerme como nux mosch. y phosph. ac. (Kent).

Cabeza

Puede estar cubierta de sudor frío : muchos síntomas de ver. alb.

están estrechamente ligados, particularmente el sudor frío en la frente, que también acompaña muchos trastornos para los que es apropiado.

Muchos DOLORS DE CABEZA.

A menudo se levanta a la mañana con dolor de cabeza que aumenta.

Dolor de cabeza unilateral.

Meditación, esfuerzo mental, que lo impulsan al sueño, provocan dolor de cabeza.

Dolores de cabeza en escolares; niños débiles que deben suspender la escuela por sus dolores de cabeza y regresan a casa con toda clase de imaginaciones raras con respecto a la escuela y a sí mismo.

Dolor de cabeza estupefactivo, dolor en senos frontales, sobre los ojos, asociado a coriza.

Cefalalgia estupefactiva asociada a coriza; sensación de plétora, estallido, embrutecimiento, agravado por sacudidas, estornudos, caminar (Kent).

Vértigos, aturdimientos; despierta de noche con vértigo; vértigo al aire libre, en cualquier ocasión (Kent).

Aparato digestivo

BOCA Y GARGANTA :

Sequedad de garganta; sensación como si tuviera una astilla en la garganta que lo obliga a esfuerzos para tragar; aspereza y picazón de garganta con necesidad de tragar.

Todo más marcado a la izquierda, o va de izquierda a derecha (lach.) y se alivia por bebidas calientes.

ESTOMAGO :

Gran deseo de bebidas y alimentos calientes.

Apetito extraño, generalmente en mujeres encintas ; dicen que no tienen hambre hasta que tienen aversión por los alimentos, verdadero asco por todo lo que se les ofrece; pero si, al hacerlas razonar consienten en tomar un bocado, encuentran que está rico y el apetito vuelve y hacen una buena comida (Kent).

Asco por todo alimento, carne, alimentos agrios, café, ajo.

Hambre mórbida o aversión por los alimentos.

Deseo violento de cosas dulces y farináceas.

Pirosis; salivación copiosa; vómitos de vermes.

ABDOMEN Y DEPOSICIONES :

Cólicos; retortijones con dolores como por hojas de cuchillo.

Dolores ardientes de abdomen.

Diarrea; deposiciones marrones y como fermentadas.

Hormigueo pruriginoso en recto y ano.

Gran remedio contra VERMES INTESTINALES, particularmente oxiuros.

Órganos genitales

Reglas tardías, algo antes de su aparición, sensación dolorosa de tirones hacia abajo, en útero.

Reglas disminuidas, que corren irregularmente, caprichosamente, con fuerza poco marcadas; reglas intermitentes (puls., kreosot.).

Dolores cortantes, como por cuchillo, en ovario.

Ninfomanía provocada por vermes.

Aparato respiratorio

Coriza con ESTORNUDOS CONTINUOS y sensación como si la mucosa nasal estuviera en carne viva; sensación de ardor y obstrucción en nariz.

Secreción de mucosidades líquidas primero, enseguida espesas, mejora respirando aire caliente, el olor a flores lo agrava; al sólo pensar en el olor de flores, estornuda y la secreción de coriza aumenta.

El estornudo es un gran síntoma de irritación de mucosa nasal de sabad.

Útil cuando el estado catarral de mucosa nasal se prolonga, en casos de coriza persistente que no cede a remedios habituales; en coriza prolongados cuya secreción aumenta por el olor de flores (Kent).

En "HAY-FEWER", cuando hay ATAQUES DE ESTORNUDOS ESPASMÓDICOS; aunque a veces hay secreción marcada, nariz con sensación de obstrucción y respiración difícil; y violenta comezón en fosas nasales, fuertes dolores en raíz de nariz y frente, enrojecimiento de párpados y gran sensibilidad a olor de flores y ajo que aumenta estornudos.

Comparar esto con algunos medicamentos, en resfrío de heno : en ciertos casos, comezón muy marcada de velo de paladar, tal que está obligado a frotarlo con la lengua, todo con coriza y estornudos, etc.; wyethia detendrá esto.

Cuando la comezón se extiende a laringe y tráquea, con gran irritabilidad y sensibilidad al frío, nux v.

Cuando la secreción es tan irritante y con tanto escozor que labio superior y fosas nasales están rojos e inflamados, ars. alb.

Si hay nariz suave, euphras.; all. cepa, lo contrario : secreción suave porojos e irritante por nariz.

Piel

SECA, como pergamino.

Sensación de calor, ardor; hormigueo.

Carne de gallina.

Relaciones

Antídotos

Puls., lycop., conium., lach.

SABINA

Juniperus sabina, o sabina, arbusto de la familia de las Coníferas, crece en colinas áridas del Mediodía de Europa, Italia, España, Grecia; se cultiva como planta ornamental.

Se conocen dos clases : una alta de 3 a 4 metros, sabina macho, o con hojas de ciprés; otra más pequeña, sabina hembra, o con hojas de tamarindo.

Para uso homeopático se usan indistintamente hojas de sabina macho hembra recogidas en primavera, para preparar la tintura madre de la que se obtienen las diversas dinamizaciones por diluciones hahnemannianas sucesivas.

Acción general del medicamento

Tiene acción generalmente limitada a RIÑONES, VEJIGA, PARTE TERMINAL DE TUBO DIGESTIVO-RECTO y ANO-, Y SOBRE TODO ÚTERO; provoca profundo desorden en su sistema circulatorio, con TENDENCIA

NETA A SANGRAR que ocupa un primer lugar entre los indicados contra pérdidas sanguíneas de esas regiones.

Actúa sobre SEROSAS ARTICULARES y es de gran indicación en ciertas formas de gota.

Características

1) METRORRAGIA CON FLUJO PAROXISTICO DE SANGRE CLARA, LÍMPIDA, CON DOLORES EN ARTICULACIONES.

Amenaza de aborto en el 3er. mes de embarazo.

CON DOLORES EN BASE DE RIÑONES QUE VAN HASTA MUSLOS; SENSACIÓN DE MAGULLADURA, ROTURA, A LO LARGO DE CARA ANTERIOR DE MUSLOS.

Metrorragia con las siguientes características : la hemorragia tiene tendencia a producirse POR PAROXISMOS; se AGRAVA POR EL MENOR MOVIMIENTO (secale), sangre fluida que se COAGULA ENSEGUIDA, u oscura (kali nit., cyclam.), y EN COÁGULOS (crocus) o en PARTE COÁGULOS EN PARTE LÍQUIDA (ferrum), éstos son muy negros.

Parece consecuencia de pérdida de tonicidad de útero (cauloph.) después de parto o aborto, con dolores que van DE ESPALDA A PUBIS; este dolor es su gran característica y se ve no solamente en hemorragias sino también en amenazas de aborto y trastornos menstruales, en que está indicado.

Como puls., se AGRAVA POR AIRE CALIENTE, EN CUARTO CALIENTE, MEJORA EN HABITACIÓN FRESCA, AL AIRE LIBRE; esto se ve a veces con reglas muy profusas : en este caso no habría que dar puls. que aumentaría el flujo menstrual.

Respecto al dolor característico de sabina en el aborto su modalidad de dirección de espalda a pubis, no debe confundirse con vib. opul. que comienza en espalda, irradia alrededor y termina en calambres de útero.

2) HINCHAZÓN ARTRÍTICA DE ARTICULACIONES DE MUÑECA Y DEDOS GRANDES DE PIE.
GOTA CON DOLOR ARTRÍTICO : estado que alterna con hemorragia ; cuando sufre de gota, no hay hemorragia; cuando empieza a sangrar, la gota desaparece (Kent).

Modalidades

Agravación

a) AL AIRE CALIENTE, POR CALOR, EN CUARTO CALIENTE (puls., apis).

Se siente incómodo en cuarto caliente, estando abrigado; desea tener ventanas abiertas o estar al aire libre.

b) POR EL MENOR MOVIMIENTO.

Mejoría

AL AIRE FRÍO, AL AIRE FRESCO, AL AIRE LIBRE.

Síntomas mentales

LA MÚSICA LE ES INSOPORTABLE; determina agitación nerviosa (nat. carb.), especie de desfallecimiento nervioso, sensación extraña, como vibración, a lo largo de médula ósea (thuya : La música da ganas de llorar).

Cabeza

Vértigo con supresión de reglas.

Flujo de sangre a cabeza y cara.

Dolor tirante en músculos maseter.

Aparato digestivo

Sensación de plenitud en ano con HEMORROIDES Y PERDIDAS ABUNDANTES DE SANGRE ROJA, BRILLANTE.

Constipación con hemorroides que sangran copiosamente y sensación de plétora en ano.

Aparato urinario

Dolores ardientes, SENSACIÓN DE ARDOR Y LATIDOS EN REGIÓN RENAL.

Grandes sufrimientos en aparato urinario, con síntomas inflamatorios; ORINA SANGUINOLenta CON NECESIDAD CONTINUA DE ORINAR Y SENSACIÓN DE PULSACIONES, LATIDOS, EN TODO EL CUERPO; AGRAVACIÓN GENERAL POR CALOR (Kent).

Retención de orina con emisión ardiente que corre gota a gota alternada con emisión de orina abundante (Jousset).

Órganos genitales

MASCULINOS :

Inflamación dolorosa de uretra con secreción de pus.

Útil en casos de inflamación gonorréica de uretra con secreción como pus.

Dolores de glándula que está roja oscura y retracción de prepucio difícil (fimosi).

Induración de dorso de verga.

Exaltación de apetito venéreo, en los dos sexos.

FEMENINOS :

Este es su radio de acción más importante; sus síntomas se relacionan con trastornos de menstruación asociados a hemorragias uterinas (Kent).

REGLAS PROFUSAS, DEMASIADO PRECOCES, DURAN DEMASIADO; DE SANGRE EN PARTE LIQUIDA, ROJO BRILLANTE, EN PARTE COAGULADA (ferr.); en niñas que se desarrollan demasiado pronto; la sangre corre por paroxismos CON CÓLICOS COMO DE PARTO; DOLOR DE SACRO A PUBIS.

Reglas que duran demasiado, demasiado abundantes, y a veces la secreción no cesa, se prolonga hasta el período siguiente; reglas demasiado abundantes, demasiado prolongadas, demasiado frecuentes; secreción líquida, rojo vivo, mezclada con coágulos.

Con dolores tirantes de arriba a abajo, cólicos como de parto y dolor violento de atrás a adelante, de sacro pubis o útero y muslos; dolores lancinantes como cuchillada que escuecen, suben a lo largo de vagina, hasta útero arrancando a veces con cada punzada, gritos a la enferma : estos dos rasgos, dolores lancinantes de atrás a adelante, de sacro pubis, y de abajo a arriba, en vagina, son confirmación marcada de su indicación (Kent).

Útil cuando, durante un período menstrual, la secreción disminuye, cesa durante algún tiempo; sobrevienen cólicos como de parto y emite un enorme coágulo semi descompuesto y vuelve la secreción abundante de sangre rojo vivo (Kent).

Hemorragias uterinas abundantes con cólicos uterinos.

Dolores constrictivos parecidos a los de parto, y que se extienden de espalda a pubis con gran deseo de orinar; emisión dolorosa de grandes coágulos, luego de sangre rojo vivo, en chorros.

Aquí se puede comparar a ipeca que tiene violenta hemorragia uterina de sangre rojo vivo tan abundante como sabina; pero en ipeca, desde el principio de la hemorragia, antes de que sea bastante abundante y prolongada como

para provocar por agotamiento sanguíneo tales síntomas, la cara se pone pálida, hay náuseas y estado sincopal demasiado precoz para ser consecuencia secundaria de hemorragia, y que es el síndrome patogenético del remedio.

Millef. : secreción continua, gota a gota, durante días y días, de sangrerujo vivo.

Secale : se parece a sabina pero su secreción es de sangre oscura, maloliente, coagula difícilmente, casi acuosa al cabo de cierto tiempo, abundante y continua, como si el útero no pudiera ya contraerse; mejora por frío.

Phosph. : se parece un poco a sabina : secreción abundante de sangre rojo vivo con o sin coágulos; lo que lo indica es su facies, lengua seca, con sed violenta, inextinguible, de agua helada (Kent).

ABORTO O PARTO PREMATURO; HEMORRAGIA UTERINA DE SANGRE EN PARTEROJO-CLARO Y EN PARTE EN COÁGULOS, AGRAVADA POR EL MENOR MOVIMIENTO (secale), A MENUDO ALIVIADA POR CAMINAR Y CON DOLORES QUE SE EXTIENDEN DE SACRO A PUBIS (Allen).

Bell. Y sabina son los dos más importantes en aborto de 3er mes; ambos tienen los mismos dolores de expulsión para eliminar un gran coágulo, luego viene un flujo abundante de sangre rojo vivo; pero el estado de bell. no se parece a sabina.

En bell. hay hiperestesia nerviosa extremadamente marcada al tacto, sacudidas, etc.

El menor golpe dado por la enfermera a la cama le es insoportable; la sangre de hemorragia es caliente, pero demasiado caliente para la piel hipersensible sobre la que corre; es hipersensible a la luz, etc.

Hay muchos dolores, no solamente lancinantes de abajo a arriba, sino en todos sentidos; vienen y se van bruscamente, como relámpagos, aparecen e irradian en todas direcciones (Kent).

RETENCIÓN PLACENTARIA CON ATONÍA UTERINA; INTENSOS DOLORES DESPUÉS DEL PARTO (cauloph., secale).

La atonía uterina es uno de sus rasgos salientes; el útero no quiere contraerse a menos que sea excitado por la presencia de un coágulo en su cavidad (Kent).

Provoca expulsión de molas.

Secreción de sangre entre períodos menstruales con excitación sexual marcada (ambra).

Menorragia en menopausia en mujeres que han tenido numerosos abortos, o en niñas, en primeras reglas prematuras.

En viejas hemorragias uterinas con pérdidas que no terminan, molestas, quieren comenzar a la menor provocación, detendrá la sangre, pero su acción no será de larga duración y la hemorragia volverá.

Si se quiere curar a la enferma, hay que darle un remedio constitucional : sulf. será a menudo el indicado (Kent).

Inflamación de ovarios o útero de aborto o parto prematuro.

Catarro crónico de vagina con granulaciones, leucorrea abundante, sanguinolenta : es útil cuando esto está ligado a leucorrea.

Excrecencias verrugosas en coliflor en labios o ano (thuya).

Verrugas con prurito intolerable y sensación de ardor; verrugas excoriantes (thuya, nit. ac.).

Espalda extremidades

DOLOR DE SACRO A PUBIS, DE UN HUESO A OTRO.

Dolores gotosos de articulaciones; nudosidades gotosas en articulaciones (amm. phosph.); arden tanto y están tan calientes que obligan a sacar manos y pies de la cama, de noche, si las articulaciones de esas regiones son alcanzadas.

Indicado en casos de gota en que los dolores alternan con hemorragias.

Relaciones

Complementarios

De thuya.

Antídotos

Puls.

SANGUINARIA

Sanguinaria canadensis o sanguinaria de Canadá, planta herbácea de la familia de las papaveráceas, crece en selvas de Estados Unidos y Canadá; se cultiva en jardines.

El nombre viene del jugo rojo como sangre que corre de su raíz al cortarla.

Para la tintura madre con la cual se obtiene, por diluciones hahnemannianas sucesivas, las diversas dinamizaciones, se hace macerar en alcohol a 90º la raíz, antes de que las hojas se desarrollen.

Acción general del medicamento

Actúa fuertemente sobre MUCOSAS A LAS QUE IRRITA violentamente, causando primero EXTREMA SEQUEDAD, ya sea conjuntiva, bucal, de tubo digestivo o vías respiratorias o cualquier otra región.

Alterna con esta sequedad SENSACIÓN DE AVIVAMIENTO, ARDOR, como si las mucosas estuvieran desprovistas de epitelio.

Otro efecto sobre mucosas es formación de PÓLIPOS que sangran de manera prolongada y profusa (Farrington).

TRASTORNOS VASO MOTORES caracterizados por enrojecimiento circunscripto de mejillas, TUFARADAS DE CALOR, AFLUJO DE SANGRE a cabeza y pecho, distensión de temporales Y SENSACIÓN DE ARDOR EN PALMAS DE MANOS Y PLANTA DE PIES.

No tiene acción profunda y larga.

Si se interrumpe una jaqueca periódica con sang., esta cura será momentánea y el dolor de cabeza volverá, a menos que se produzca una metástasis más grave, si no se da en el intervalo otro remedio de acción más profunda, constitucional.

Un enfermo muy debilitado por catarro de bronquios que dura largo tiempo y se hace sospechoso; toma frío al menor cambio de tiempo, si se expone a humedad, por la más pequeña corriente de aire, si se desabriga sensación de ardor de pecho, detrás de esternón, expectoración espesa, filamentosas, accesos de tos espasmódica que terminan en eructos; si se agrega a esta sensación de ardor de pecho, a dolores de laringe al hablar y de tráquea, a tos que termina en eructos, sensación de ardor en palma de manos y planta de pies.

Sang. atenuará el dolor y curará momentáneamente; muchos de estos casos son tratados con sulph., pero erróneamente.

Hay una serie de medicamentos que convienen más a estos estados tuberculosos que sulph., silic., o graph. : son puls., sang., senec. grac., cocc. cact., que atenúan este estado y puede traer mejoría tal del estado general que se puede dar un medicamento de acción profunda.

Hay que evitar esto si la vitalidad está muy disminuida, el organismo muy deteriorado por tratar de repararlo violentamente.

Hahnemann ha prevenido contra el empleo de phosph. en estos casos; sang. de acción superficial, procura sin inconvenientes, gran alivio (Kent).

Características

No presenta ningún "Keynote"; pero en su patogenesia se encuentran algunos síntomas generales bastante acusados.

1) GRAN DEBILIDAD Y POSTRACIÓN : Con el dolor de cabeza y muchos de sus síntomas hay sensación de debilidad, falta de fuerzas, desfallecimiento, con sensación de vacío de estómago, de falsa hambre; que en realidad es falsa hambre pues sang. tiene verdadera aversión por el alimento (Kent).

Debilidad y desfallecimiento; gran debilidad; sobre todo durante y después de los vómitos, o gran debilidad de piernas, de noche, al pasear al aire libre (Jahr).

2) TUFARADAS DE CALOR Y TRASTORNOS VASO MOTORES : GRAN SENSACIÓN DE CALOR ARDIENTE EN PALMAS DE MANOS Y PLANTA DE PIES, QUE A VECES OBLIGA A SALIR DEL LECHO DE NOCHE, COMO sulph.

3) ACRITUD DE SECRECIONES Y DOLORES ARDIENTES : Son otro trazo saliente que se ve a lo largo de su patogenesia.

4) VARIABILIDAD CONTINUA DE SÍNTOMAS : El enfermo sufre, y a de jaqueca, síntomas de pecho, diarrea, constipación, etc.

Modalidades

Lateralidad

DERECHA : se adapta principalmente a trastornos orgánicos predominantes del lado derecho.

Agravación

a) Estando acostado sobre la derecha.

b) De noche.

c) Por tacto, movimiento.

d) Por ruido.

Mejoría

a) Por sueño, oscuridad.

b) Por aire frío.

c) Por ácidos.

Síntomas mentales

ANSIEDAD casi siempre presente en sang.; aparece dando calificación a dolores de cabeza, trastornos gástricos, síntomas de pecho o aparato circulatorio; INQUIETUD, de noche, gran aprensión que impide quedarse en cama; GRAN AGITACIÓN, no puede estar largo tiempo en la misma posición.

Gran IRRITABILIDAD DE CARÁCTER, que lo hace fúnebre, de mal humor, irritable, fácilmente excitable; GRAN SENSIBILIDAD MORAL : la menor contrariedad aumenta todos sus sufrimientos.

La fatiga general se manifiesta aquí por TORPEZA MENTAL; FATIGA CEREBRAL FÁCIL; no puede concentrar su mente largo tiempo; tiene fácilmente ideas confusas; memoria débil; olvida palabras y cifras al escribir.

En ciertos casos de delirio vago y consciente, delirio de persecución.

Temor enfermizo de ser envenenado, a veces con impulso ansioso al suicidio.

Sueño

Mucha dificultad para dormirse en la primera parte de la noche; insomnio antes de medianoche.

Más tarde, sueño agitado, no reparador; este sueño es tan ligero que despierta al menor ruido, como sulph.; a veces despierta sobresaltado como si fuera a caer.

Cabeza

Es uno de sus principales puntos de elección en su acción.

Dolor de cabeza nauseoso; sufre de aflujos de sangre a la cabeza que causan el fallecimiento y estado nauseoso marcado que llega a vómitos; LOS DOLORS, DE CARÁCTER LATENTE, EN TODO CASO AGUDO, LANCINANTES, COMIENZAN EN REGIÓN OCCIPITAL, SE EXTIENDEN A LA CABEZA PARA FIJARSE FINALMENTE EN REGIÓN SUPRA ORBITAL, GENERALMENTE DERECHA (ojo izquierdo spig.); en el momento de la crisis, no puede soportar olores, ni que caminen en la pieza donde está, el menor crujido le es insoportable; vomita a menudo en ese momento alimentos y bilis.

Debe estar acostado en habitación oscura y sólo tiene sosiego cuando el sueño viene a aliviarlo; a veces el dolor es tan violento que pierde la cabeza o busca alivio apretando fuertemente su cabeza con las manos o hundiéndola en su almohada.

Comparar aquí bell. : intolerancia a luz y ruido y localización particular derecha.

Pero bell. tiene casi siempre pies fríos y cabeza caliente lo que no siempre está presente en sang.; el enfermo de bell. no se alivia acostándose, sino sentándose en su lecho; no sigue necesariamente la dirección del desarrollo de los dolores de sang., que comienzan en occipucio para ganar la región supra orbitaria derecha, dirección imperativa en sang.; sang. es más útil que bell. en forma gástrica de la jaqueca.

Mell. alba. : violento dolor de cabeza con congestión intensa; le parece que el cerebro va a estallar a través de la frente y el dolor latente es casi tan violento como en glon. llevando casi hasta el furor el enfermo.

Iris vers. : jaquecas periódicas, principalmente las que sobrevienen en domingo, porque el esfuerzo de seis días de trabajo precedente ha cesado y el paciente que siente los efectos de ese esfuerzo sufre la jaqueca; dolores intensos, de carácter latente; supra orbitarios, afectan las dos regiones por encima de los dos ojos, causando a veces ceguera temporaria; en el máximo del dolor de cabeza puede haber vómitos de materia amarga o agria o ambas (Farrington).

Ver act. rac.

Dolor de cabeza con estado congestivo; aunque comience a la mañana, sube desde el occipucio para fijarse sobre el ojo derecho, cabeza caliente y dolorosa.

Pulsaciones en cabeza con vómitos amargos, agravadas por movimiento; pero esta agravación no es tan acusada como en bryon.

Dolor de cabeza como si la frente fuera a estallar con escalofríos y ardor de estómago.

Dolor de cabeza arriba del ojo derecho.

Dolor de cabeza periódico con vómitos, comienza a la mañana, aumenta en el día y dura hasta la noche, la cabeza da sensación de querer estallar o como si los ojos quisieran salir de las órbitas; latidos dolorosos lancinantes a través del cerebro, peores a la derecha, sobre todo en frente y vértex, con escalofríos, náuseas, vómitos alimenticios o biliosos, está obligado a acostarse, estar tranquilo; mejora por sueño; luz, ruido, movimiento lo agravan (Kent).

Dolor de cabeza persistente de salida a puesta de sol (gels., glon., nat. mur., spig.).

No se encuentran todos estos síntomas en cada caso, pero todos contribuyen a describir el dolor de cabeza de sang. (Kent).

DOLOR DE CABEZA PERIÓDICO, comienzan de mañana, aumenta durante el día y disminuye a la noche; dolor de cabeza periódico QUE SOBREVIENE CADA 7 DÍAS, comienza de mañana cuando despierta, o lo despierta un dolor occipital que sube poco a poco hasta el vértice de la cabeza, para fijarse sobre ojo derecho o temporal derecho; se agrava de día por luz, a tal punto que busca una pieza oscura donde acostarse porque el movimiento también lo agrava; LOS DOLORS DE CABEZA SE ALIVIAN EXPULSANDO GASES.

Sulph., silic. también tienen dolores de cabeza periódicos cada 7 días; esto no quiere decir que no pueden curar otros dolores de cabeza; sang. por ej., tiene dolor de cabeza que vuelve cada 3 días.

La mayoría de dolores de cabeza que sobrevienen cada 15 días, son curados por ars. alb., o al menos aliviados, sobre todo en sujetos debilitados (Kent).

Dolor de cabeza por desarreglo de estómago, después de comer mucho o alimentos muy pesados o bebido vino; sang. es casi tan inútil como nux. v., en viejos bebedores; sujetos que han arruinado su estómago y destruido su buena digestión bebiendo demasiada cerveza; no puede ya comer, ningún alimento o líquido puede quedar en su estómago, vomitan hasta una cucharada de agua; dolores de cabeza asociados a esos trastornos, o a diarrea (Kent).
Vértigo al girar rápidamente la cabeza o levantar los ojos.

Ojos

Sequedad ardiente de ojos; sensación como si tuviera cabellos bajo los párpados.

Sensación de ardor con lagrimeo de ojo derecho que está doloroso al tacto, seguido de coriza.

Neuralgia en y sobre el ojo.

Dilatación pupilar.

Oídos

Calor ardiente de oídos con enrojecimiento circunscripto en mejillas.

Enrojecimiento de oído externo con zumbidos y tintineos por congestión sanguínea.

Hyperexcitación de nervio auditivo; sensibilidad dolorosa particularmente a ruidos súbitos; sensación como si estuviera en un vagón que hiciera ruido como un tren en marcha, como si todas las personas que lo rodeasen hablasen rápido y confusamente, desea que lo sostengan para disminuir esta sensación nerviosa vibratoria que repercute a través de su cuerpo; esto es común en mujeres en la menopausia, sang. en este caso se parece a glon.; el

deseo de estar sostenido recuerda a gels. que tiene trastornos cardíacos con temblores en todo el cuerpo y desea que lo sostengan para aliviarse (Farrington).

Cara

ENROJECIMIENTO CIRCUNSCRIPTO DE MEJILLAS CON SENSACIÓN DE CALOR ARDIENTE EN OÍDOS.

TUFARADAS DE CALOR EN CARA.

Hinchazón de cara con enrojecimiento marcado y sensación de rigidez.

NEURALGIA FACIAL mejorada arrodillándose y apretando fuertemente la cabeza contra el piso; dolor que irradia de maxilar superior en todas direcciones; sensación de plenitud y dolorimiento detrás de ángulo maxilar inferior.

Aparato digestivo

BOCA :

Sensación de sequedad ardiente de labios.

Lengua roja, arde como si tocara algo caliente (Kent).

Sensación de sequedad y excoiación de lengua.

Hormigueos y pinchazos en lengua.

Lengua cargada de capa blanca.

Odontalgia agravada por agua fría y mejorada por bebidas calientes.

Dientes flojos.

LARINGE Y ESÓFAGO :

La garganta parece en carne viva.

Deglución difícil; sensación al tragar como de sofocación, por hinchazón de mucosa de garganta.

SENSACIÓN DE ARDOR EN FARINGE Y A LO LARGO DE ESÓFAGO desde boca y paladar.

SENSACIÓN DE CALOR ARDIENTE en garganta, mejorada aspirando aire frío; garganta seca que la mucosa da sensación de querer rasgar.

Esta sensación de ardor y desolladura se aplica a cualquier mucosa interesada por la acción del remedio (Kent).

ESTOMAGO :

GRAN SED, FALTA DE APETITO.

SENSACIÓN DE FALSA HAMBRE, sensación de vacío, desfallecimiento en boca de estómago, pero no es hambre verdadera, pues tiene AVERSIÓN POR LOS ALIMENTOS y el pensamiento y olor de náuseas.

Esta sensación de falsa hambre acompaña a menudo los dolores de cabeza, "DOLORES DE CABEZA CON HAMBRE" que recuerdan a psorin. O phosph., pero uno y otro, psorin. sobre todo, tienen hambre real, deben comer y no se pueden saciar.

Deseo de platos condimentados.

Aversión por manteca.

Náuseas con salivación abundante.

VÓMITOS DE LÍQUIDOS ÁCIDOS, ARDIENTES que desuellan garganta y boca (Kent).

Vómitos que no alivian las náuseas.

SENSACIÓN DE ARDOR DE ESTOMAGO, esófago, abdomen, con toda clase de desarreglos de estómago.

ABDOMEN Y DEPOSICIONES :

Cólicos ardientes en abdomen.

Hinchazón abdominal con emisión frecuente de gases.

Sensación de plétora, contusión, dolores en región del hígado; trastornos biliares; el hígado parece fabricar mucha bilis, y esto va acompañado de catarro gástrico duodenal : la bilis parece subir al estómago y es vomitada en forma de líquido verdoso o amarillo, muy amargo.

En un enfermo crónico de sang. hay durante una semana desarreglos de estómago con vómitos biliosos, mucha flatulencia, eructos ardientes, agrios, constipación; luego todo desaparece y sobreviene diarrea con deposiciones extremadamente abundantes, líquidas, biliosas : nat. sulph., sang., puls., lycop., curan estas alternativas de diarrea y constipación (Kent).

Constipación con deseos ineficaces de evacuar y sensación de gruesa masa en recto.

Diarrea con deposiciones biliosas, acuosas, precedidas de cólicos y con copiosa emisión de gases.

DIARREA POR SUPRESIÓN BRUSCA DE CATARRO DE VÍAS RESPIRATORIAS.

Órganos genitales

Reglas adelantadas, abundantes, de sangre oscura mezclada con coágulos, irritantes y de mal olor.

Flujo menstrual rojo brillante, con coágulos, fétido, luego se hace oscuro y pierde su fetidez.

Reglas abundantes con dolor de cabeza supra orbitario sobre todo a la derecha.

Para cefalea durante reglas, comparar con : act. rac. : dolores de cabeza latentes.

Alum., calc., carb., calc. veg., croc. sat. : latidos dolorosos en cabeza en el momento de las reglas con sensación como si el aire frío pasara a través de los ojos; cyclam. : reglas irregulares con jaquecas y sensación de encandilamiento con puntos, manchas brillantes delante de ojos.

Glou. : reglas que se detienen bruscamente y reemplazadas por dolor de cabeza congestivo o dolor de cabeza congestivo en lugar de reglas; graph., ignat., lach., lycop., magn. carb.; nat. mur. : dolor de cabeza como si mil pequeños martillos golpearan su cabeza, marcado entre salida y puesta de sol y durante reglas, como si fuera resultado de pérdida de sangre; nat. sulph.; nux. v.; phosph.; platina; puls.; sepia : cefalea congestiva en el momento de las reglas cuando la secreción es poco abundante : sulph. : dolor de cabeza antes de reglas.

Ver. alb.; ustil. : dolor de cabeza nervioso con irregularidades menstruales.

Metrorragias de menopausia de sangre rojo brillante, con coágulos ya menudo fétidas; con jaqueca característica, aflujo de sangre a la cara que se pone escarlata y este color vivo desaparece cuando sobreviene sudor y sensación de desfallecimiento.

Se puede aquí comparar con : glou., lach., y nitr. de amilo. (Farrington).

Amenorrea con tufaradas de calor, palpitaciones, dolores neurálgicos en temporal derecho y dolores abdominales como si las reglas estuvieran por aparecer.

Sensibilidad e hinchazón dolorosa de senos en menopausia.

Pólipos uterinos.

Fisometría. (bromium, lycop., phosph. ac.).

Aparato respiratorio

NARIZ :

Coriza fluente, corrosivo, excoriente; sensación de ardor de nariz como en carne viva, fosas nasales excoriadas; todas las secreciones son excoriantes; mucosidades irritantes se forman en rino farinx provocando ardor de garganta. Hipersensibilidad tal a olores que puede provocar desvanecimiento; sensible a perfume de flores, "resfrío de rosas"; asma de heno con violenta sensación, en nariz, de ardor y sequedad, como si la mucosa se fuera a rasgar; también en garganta.

Ozena con secreción abundante, amarilla, muy irritante.

Pólipos de nariz, que sangran fácilmente (calc. ost., kali nitr., phosph., teucr. marum, etc.).

LARINGE Y TRAQUEA :

Inflamación y sensibilidad de laringe; sensación de sequedad y ardor de laringe con ronquera; sensación de cosquilleo que se extiende atrás de esternón.

Sensación de sequedad crónica de garganta, hinchazón de laringe con expectoración de mucosidades espesas, sensación de ardor y escozor.

Tos espasmódica, coqueluchoidea, peor de noche, con diarrea; tos violenta después de coqueluche, con caracteres espasmódicos de ataques de coqueluche; un adulto toma frío y tiene tos espasmódica, como coqueluche, dice que proviene del estómago, porque al mismo tiempo hace esfuerzos para vomitar; al mismo tiempo, sensación de ardor y diarrea (Kent).

Tos seca, espasmódica, penosa, agotadora, sobre todo en niños, acostándose, de noche, al entrar en habitación fría para dormir; sensación de despelamiento en tráquea y bronquios (Kent).

Sensación de ardor y desolladura en tráquea; "un enfermo se acostaba con enfriamiento; tiene gran sensación de ardor de pecho, tos violenta, cada acceso provoca en tráquea y bifurcación de gruesos bronquios, sensación dolorosa de desolladura como si tuviera un cuchillo que lo desgarraba y después de la tos, numerosos y ruidosos eructos; esputos rosados y síntomas de congestión pulmonar : este conjunto no se encuentra en ningún otro remedio". (Kent).

PULMONES :

SENSACIÓN DE ARDOR DE PECHO, TOS SECA, JADEANTE Y SENSACIÓN DE GRAN SEQUEDAZ AL PASO DEL AIRE.

Sensación de ardor de pecho como de secreción caliente que desciende de pecho a abdomen.

TOS VIOLENTA, CONTINUA, CON O SIN EXPECTORACIÓN, CON

ENROJECIMIENTO CIRCUNSCRIPTO A MEJILLAS Y DOLOR EN PECHO, tos seca y sacudida, peor de noche cuando está acostado, y obliga a sentarse en su lecho; tos cargada, esputos color jugo de ciruelas secas o de óxido, adherentes, difíciles de expectorar, ofensivos; tos gruesa con esputos que huelen mal lo mismo que el aliento y este olor es tan objetivo como subjetivo.

Esputos herrumbrosos, viscosos, adherentes (bryon., phosph., squilla).

Gran DISNEA con sensación de constricción de pecho; asma asociada a desórdenes gástricos, como nux. v.

Puntadas agudas en lado derecho del pecho, cerca del pezón.

CONGESTIÓN PULMONAR particularmente lado derecho del pecho que parece estar bajo la influencia del remedio, con enrojecimiento circunscripto a mejillas, como en fiebre hética, fiebre elevada.

Sang. puede compararse aquí a ver. vir. : que tiene el mismo estado congestivo de pulmón con gran intensidad de síntomas; pero tiene más excitación arterial; si se da antes que la hepatización se produzca, apacigua pulso, reduce congestión y modifica marcha de enfermedad; cuando la hepatización está francamente instalada, ya no está indicado; a phosph., ant. tart., etc.

Sulph., se parece a sang. en el estado de resolución cuando el pulmón no puede llegar a liberarse, los esputos se hacen purulentos; en este caso sang. es preferible si los esputos son extremadamente fétidos.

Hemoptisis por supresión de reglas. (phosph., bryon., etc.) Sang. es TUBERCULOSIS FLORIDA.

Aparato circulatorio

Palpitaciones de corazón con sensación de desfallecimiento.

Irregularidades de latidos del corazón.

Pulso lento, débil, irregular.

Trastornos circulatorios vaso motores.

Espalda y extremidades

Dolor de nuca y cuello, particularmente derecho; con rigidez, no puede darse vuelta en su lecho; el dolor corre a lo largo del cuello y va hasta DELTOIDES Y HOMBRO.

DOLORES REUMÁTICOS EN HOMBRO, AL PUNTO QUE NO PUEDE LEVANTAR LOS BRAZOS Y TODOS LOS MÚSCULOS DE HOMBRO Y CUELLO ESTÁN TOMADOS; si el dolor sobreviene de día, aumenta de noche; todos los síntomas se agravan de noche.

Dolores agudos, lancinantes, con hipersensibilidad y entumecimiento muscular; REUMATISMO DE DELTOIDE DERECHO (de deltoide izquierdo ferr. met.); REUMATISMO DE HOMBRO Y BRAZO DERECHO (magn. carb., coloc.), PEOR EN CAMA, DE NOCHE; si sang. prefiere el lado derecho puede ser igualmente útil en reumatismo izquierdo de hombro izquierdo (Kent).

Puede haber toda clase de dolores neurálgicos : cortantes, lacerantes, desgarrantes como si se estirasen los músculos; dolores desgarrantes en cualquier parte, neurálgicos o reumáticos.

Rigidez de articulaciones de dedos.

Debilidad en piernas.

ARDOR Y TUFARADAS DE CALOR EN PALMA DE MANOS Y PLANTAS DE PIES, sobretodo de noche; entonces está obligado a sacarlos de la cama.

Relaciones

Complementarios

Ant. tart.

SARSAPARRILLA

O smilax officinalis, pequeño arbusto de la familia de las Asparagináceas, crece en selvas de América tropical y meridional.

Para uso homeopático se emplea la raíz con la que se prepara la tinturamadre de la que se obtienen, por diluciones hahnemannianas sucesivas, las diversas dinamizaciones.

Acción general del medicamento

Actúa de manera marcada sobre PIEL que, bajo su influencia, se pone seca, arrugada, con vesículas herpéticas, grietas, granos rojizos, etc.; Dewey la llama potente antisicótico.

Bajo su acción, las MUCOSAS se inflaman, pero la irritación es más BIENSECA; se caracteriza por dolores ardientes, sensación de ulceración y espasmos consecutivos; sólo ocasiona poca secreción serosa o sero-purulenta, pero de consistencia viscosa, acre, corrosiva.

Síntomas urinarios muy marcados y tan característicos que van a la cabeza para su indicación.

Conviene particularmente a ESTADOS CRÓNICOS COMPLEJOS, consecuencia de diatesis sicóticas y sífilíticas mezcladas y a las que el abuso de mercurio ha venido a complicar.

GRAN DEBILIDAD REACCIONAL de todo el individuo, como merc., lach., etc., tejidos sin vitalidad; cuando se hieren la lesión no quiere curar; se ulceran por la menor cosa; toda herida permanece abierta, se extiende y se hace fagedénica como ars. alb., lach., y merc. corr.

Gran SENSACIÓN DE DEBILIDAD en todo el cuerpo, especie de estado paralítico.

En cuanto a LA MENTE? ESTA TAN DÉBIL COMO LOS TEJIDOS; estado de estupidez; no puede comprender nada, mente lenta, debilidad de cerebro que frisa en imbecilidad.

TODOS LOS ÓRGANOS TIENEN ACCIÓN LENTA, DÉBIL, PEREZOSA y están CONGESTIONADOS.

Debilidad y dilatación de venas; tendencia a várices, úlceras varicosas, hemorroides; cara a menudo roja o con manchas rojas; donde la circulación es débil : tibias, dorso de dedos grandes, la piel toma Tinte AZULADO; manchas violetas, como gangrena senil en formación : útil en ancianos, cuando aparecen manchas negras o azul oscuro en dorso de manos u otra parte del cuerpo.

Erupciones húmedas con comezón; descamación como caspa, escaras.

Piel de dorso de manos y cara palmaria gruesa y dura, con descamación como de psoriasis y manchas azules (Kent).

Características

1) CONSTITUCIÓN Y TEMPERAMENTO : Conviene particularmente a sujetos de cabello morocho, con trastornos, de litiasis renal, a individuos de diatesis urática sicótica (Allen).

Indicado en antiguos sífilíticos cuya enfermedad ha estado disfrazada, que han sido blanqueados por mercurio; con mente y cuerpo postrados; especie de debilidad parética de extremidades, no tienen ningún aguante; palpitaciones al menor esfuerzo; siempre fatigados; en piel, úlceras indolentes salpicadas; piel floja, se agravan de noche; dolores osteoscópicos peor de noche; en tales casos, sarsap. antidota a merc. y permite reaccionar contra la enfermedad primitiva.

Niños muy enflaquecidos, atrepsicos, por sífilis hereditaria; enflaquecimiento especialmente marcado alrededor del cuello, cara de viejo; piel seca y fofa con erupciones o manchas violáceas, cobrizas; asimilan mal el alimento, deposiciones líquidas y vientre grande.

Niños que dejan arena amarillenta o blancuzca en los pañales; gritan cuando van a orinar, porque recuerdan cuánto sufrieron en micciones anteriores; a veces al fin de la micción lanzan un grito infernal; dolor agrio de vejiga al fin de la micción.

Viejos farristas debilitados por excesos de bebida y abuso de mujeres; mujeres enflaquecidas, arrugadas, con corazón, pulmones, cerebro, vejiga, débiles.

Sujetos envejecidos antes de tiempo, parecen de 80 años a los 40, caminan con dificultad, con paso tembloroso apoyados en bastón, con edema de piernas.

Al principio nux v. podrá atenuar el debilitamiento físico, pero llega el momento en que la debilidad mental iguala a la física y hay que orientarse hacia remedio como sarsap., lach., secale, etc. (Kent).

2) TRASTORNOS VESICALES CARACTERÍSTICOS QUE SE TRADUCEN POR :a) VIOLENTO DOLOR AL FIN DE LA MICCIÓN, INTOLERABLE (berb., equiset., medorr., thuya) a menudo con VIOLENTO TENESMO VESICAL.

Ningún otro tiene este síntoma tan marcado, aunque en puls. se encuentra algo análogo para tenesmo, relacionado con próstata grande; nat. mur. : después de la micción, ardor y sensación de cortadura que escuece en uretra, contracciones espasmódicas de abdomen, etc. (Nash).

b) ESPASMO DE ESFÍNTER CUANDO SE SIENTA PARA ORINAR, QUE HACE LA MICCIÓN IMPOSIBLE EN ESA POSICIÓN, PERO CUANDO SE LEVANTA Y ESTA PARADA LA ORINA CORRE FRANCAMENTE (Kent).

Modalidades

Agravación

a) POR CALOR : el calor INTERIOR agrava todos los síntomas, EXCEPTO SENSACIÓN DE FRÍO EXTERIOR QUE SE ALIVIA POR CALOR; bebidas y alimentos calientes agravan, desea bebidas y alimentos fríos; pero el calor exterior reconforta (Kent).

b) DE NOCHE.

c) POR HUMEDAD.

d) EN PRIMAVERA; como todos los remedios venenosos.

Lach., secale, hamam., se tonifica en invierno y se debilita en primavera, etc. (Kent).

e) Al bostezar.

f) Antes de reglas.

g) Después de micción.

Síntomas mentales

Gran debilidad mental, descorazonado, taciturno, de mal humor, carácter sensible, se ofende fácilmente.

Cabeza

Dolores de cabeza que causan depresión mental; dolores desde occipucio a ojos.

Dolor de cabeza después de gonorrea suprimida a destiempo y bruscamente (Nash).

Dolores óseos y periósticos, consecuencia de afección venérea.

Erupción húmeda de cuero cabelludo.

Costras de leche que empiezan en cara; erupción en cara y labio superior.

Aparato digestivo

BOCA Y GARGANTA :

Lengua cargada; salivación abundante; gusto metálico; olor fétido; no hay sed.

Aftas.

Se diría que mucosa de boca, lengua y faringe van a ulcerarse; manchas violetas que parecen querer ulcerarse, pero no es así y permanecen así semanas y meses (Kent).

ESTOMAGO :

En mal estado; flatulencia, eructos, náuseas continuas, vómitos de alimentos agrios.

Se diría que tiene fermentaciones molestas en estómago; sensación como si hubiera comido mucho, como si los alimentos le quedaran en estómago; digestión lenta y débil (Kent).

ABDOMEN Y DEPOSICIONES :

Borborismos y fermentaciones en abdomen; muchos gases.

Cólicos y dolor de riñones a cada período menstrual.

Constipación obstinada con necesidad violenta de orinar al tratar de evacuar.

Deposición pequeña y expulsión con muchos tirones de arriba a abajo.

Necesidad de evacuar con contracción de intestinos que da sensación como si fueran a salir por recto.

Durante deposición, violentos dolores cortantes de recto (Kent).

Aparato urinario

DEPOSITO DE ARENA BLANCA EN ORINA QUE ES ESCASA, VISCOSA O VEDIJOSA, ORINA POCO ABUNDANTE, VISCOSA, VEDIJOSA, DEJA DEPOSITO ARENOSO O PEQUEÑOS CÁLCULOS.

Cólicos nefríticos; arenillas; cálculos vesicales; arenillas con reumatismocrónico.

Catarro de vejiga.

DOLORES INTOLERABLES AL FIN DE MICCIÓN.

NO PUEDE ORINAR SENTADO PERO SI ESTA PARADO LA ORINA CORRE LIBREMENTE;

orinaabundante de noche, inunda su cama; de día, sólo puede orinar parado.

Sensación de "SACUDIDAS" a lo largo de uretra masculina.

Cada vez que orina sale aire de uretra, con ruido de gorgoteo : frecuente en catarro de vejiga y consecuencia de fermentaciones vesicales.

Necesidad frecuente de orinar sin resultado, con secreción disminuida (Kent).

Órganos genitales

MASCULINOS :

Olor fétido intolerable de partes genitales; erupciones herpéticas con prurito.

FEMENINOS :

Erupciones húmedas y pruriginosas en frente antes de reglas; erupción húmeda, a veces, en ingle derecha, antes de reglas.

Reglas atrasadas y poco abundantes.

Senos flácidos, pequeños, pezones retraídos.

Piel

PIEL FACA, SECA, ARRUGADA, REVENIDA.

Va a la par de iodium, nat. mur., y abrot. para enflaquecimiento.

En sarsap., cuello enflaquecido y piel en general arrugada; sarsap., sanic., y nat. mur., como lycop. : adelgazamiento de arriba a abajo; abrot., de abajo a arriba.

Iodium : enflaquecimiento general con constante deseo de comer; nat. mur. : come todo el tiempo, pero adelgaza sin cesar, particularmente cuello; abrot. : enflaquecimiento general, sobre todo en piernas.

Arg. nit. : niño con aspecto de viejo seco, como momia (Nash).

Rash por exposición al aire libre, seco, pruriginoso.

Erupciones en primavera.

Grietas; piel agrietada en manos y pies.

Rash como rubéola de sífilis, molesta de manera intolerable.

Erupciones húmedas que segregan líquido irritante.

Manchas violáceas.

Manchas cobrizas.

Úlceras indolentes.

Espalda y extremidades

Dolores reumáticos después de gonorrea mal suprimida.

Debilidad paralítica de extremidades; temblor de manos y pies.

Depósitos gotosos en articulaciones.

Edemas de extremidades inferiores.

Grietas en manos y pies, particularmente bordes de dedos y dedos grandes depies.

Onixis; ulceraciones en puntas de dedos y sensación de pinchazos bajo las uñas. (psorin.).

Relaciones

Complementarios

Merc., sepia.

Antídotos

Bell.

SECALE CORNUTUM

Secale cornutum, es el micelium del claviceps purpúrea hongo que se desarrolla en años lluviosos en ovarios del centeno y otras gramíneas.

Se recoge antes de cortar el centeno y se reduce a polvo con el que se prepara, por maceración en alcohol a 90º, la tintura madre con la que se obtienen, por diluciones hahnemannianas sucesivas, las diferentes dinamizaciones.

Acción general del medicamento

Actúa electivamente sobre TEJIDO MUSCULAR para el que es UN VENENO PARALIZANTE.

La parálisis que produce no se instala bruscamente, es progresiva y precedida por fase esténica de espasmos o convulsiones que marca principio de intoxicación; fase esténica que puede determinar por isquemia de médula por vaso constricción inicial de sus pequeños vasos, fenómenos paralíticos que no hay que confundir con el efecto de la actividad propia del veneno y que aparecen cuando su efecto tóxico se ejerce en su plenitud.

Actúa sobre músculos de vida de relación y vida vegetativa, modifica profundamente propiedades inherentes a la fibra muscular; la falta de coordinación de movimientos que produce marcha vacilante e insegura debe atribuirse a

trastornos de tonicidad; la abolición de contractilidad explica la desaparición de reflejos; el relajamiento de fibra que termina por paralizarse y atrofiarse se relaciona con lesión de contractilidad.

LOS TRASTORNOS SENSITIVOS tienen marcha paralela a la de los motores; primero con calambres y dolores; luego, disociación de sentido muscular y abolición completa de sensibilidad.

LA ASTENIA MUSCULAR, que es expresión esencial de su acción, se encuentra en músculos voluntarios, donde se registra sensación de profunda laxitud, debilidad, pesadez y entorpecimiento de miembros, imposibilidad de deglutir, debilitamiento de voz, pérdida de palabra, incontinencia de esfínteres, lentitud de respiración que trae, por insuficiencia de hematosis, tendencia de la sangre a conservar aspecto de sangre venosa; se paralizan definitivamente los movimientos respiratorios causa de asfixia terminal y muerte.

El miocardio sufre la misma influencia : después de una fase muy corta de palpitations y a veces arritmia, el corazón se hace lento; sus contracciones se espacian cada vez más y a veces se detienen en diástole.

Manifiesta con más intensidad su poder asténico SOBRE FIBRAS LISAS particularmente DE ÚTERO Y CAPILARES.

En caso de inercia uterina por parto, se muestra heroica, pero es incapaz durante embarazo, de provocar contracciones uterinas : la ley de los semejantes explica este hecho; por eso no estamos de acuerdo con Piedevache cuando escribe : "la excitación de fibra lisa de útero sólo alcanza su desarrollo completo en el acto fisiológico del parto".

Es éste un error, porque si la ergotina solamente actúa entonces, es que despierta un útero blando cuyas contracciones excita homeopáticamente; durante embarazo al contrario, mientras la tonicidad de fibra uterina es normal, la ergotina con dosis largamente prolongadas, sólo puede producir relajamiento de fibra muscular uterina; si desencadena algunos espasmos uterinos, son pasajeros; y sorprenderse por no verlos persistir como en el momento del parto es mostrar que uno confunde la primera fase del efecto primitivo su efecto curativo.

Por su acción sobre CAPILARES provoca éstasis sanguíneos que cuando son crónicos contienen la circulación y dan lugar a lesiones gangrenosas.

Esta atonía vascular produce también inercia de actividad plástica y trastorna profundamente el funcionamiento de glándulas, particularmente salivares e intestinales que ya sólo segregan productos mal elaborados a los que dejan correr pasivamente.

Características

1) CONSTITUCIÓN Y TIPO : Individuos flacos, descarnados; tales sujetos serán los que más a menudo necesitan ergotina.

Pero no está necesariamente contraindicado en gordos; ciertas naturalezas son más sensibles que otras a ciertos remedios; pero no hay por qué creer que estos remedios no actuarán en otros sujetos cuando los síntomas concuerdan : individuos descarnados corresponden especialmente a secale, pero cuando los síntomas lo llaman actuará también en gordos (Kent).

Personas de cierta edad, con músculos flojos y blandos, de apariencia enclenque; cara pálida, como cenicienta, rasgos tirantes, ojeras; labios contraídos; piel arrugada, marchita y fría; con expresión de tristeza y desaliento; como viejos y quebrantados.

Mujeres con fibras musculares laxas, propensas a hemorragias pasivas por todos los orificios del cuerpo (Nash).

2) ASPECTO SECO Y ARRUGADO DE PIEL QUE ESTA INSENSIBLE O CON SENSACIÓN DE HORMIGUEO SUBCUTÁNEO MAS O MENOS MARCADA, COMO SI HORMIGAS CAMINASEN DEBAJO : Piel marchita, como si cubriera musculatura descarnada; de apariencia malsana; coloración púrpura o azulada, sea de manera generalizada, sea localmente, por zonas; manchas violetas en piel marchita, arrugada, principalmente donde la circulación es débil, como dorso de manos y pies, o tibias.

Hay allí sensación de entumecimiento, hormigueo.

Las extremidades pican, arden y hormiguean; sensación de reptación como si anduvieran hormigas bajo la piel, entre carne y piel; sensación de entumecimiento, como si estuvieran muertos, como si fueran de madera, en dedos y sobre todo dedos de pies.

Arruga senil de piel en extremidades, como en viejos adelgazados y debilitados; los vasos sanguíneos se obturan, la sangre circula mal en los dedos que se entumecen, se ponen insensibles y toman tinte violeta negro; sec. corn. mejora circulación de extremidades en viejos y lucha contra gangrena senil (Kent).

3) GRAN FRÍO EN TODA LA SUPERFICIE DEL CUERPO, PERO NO PUEDE SOPORTAR ESTAR TAPADO PORQUE EL CALOR AGRAVA; SENSACIÓN OBJETIVA DE FRÍO MUY INTENSO EN TODA LA SUPERFICIE DEL CUERPO PERO NO TOLERA ESTAR TAPADO (Nash).

Esto se ve en gangrena senil y cólera; en este último, este síntoma hace pensar en camph., pero este es útil sobre todo en la primera parte de la enfermedad, en caso de colapso precoz, antes que las evacuaciones se hagan ofensivas y oscuras (Nash).

4) SENSACIÓN DE ARDOR A PESAR DE LA SENSACIÓN OBJETIVA DE FRÍO EXTERIOR : La sensación objetiva de frío no excluye sensación subjetiva de ardor : piel y extremidades arden; sensación intensa de ardor y exteriormente la región que arde está fría al tacto; sensación de ardor con frío.

Sensación de ardor de órganos interiores.

Sensación de sequedad con ardor en estómago, intestino, boca, garganta, vías respiratorias, pulmones (Kent).

5) INFLAMACIÓN VIOLENTA DE CUALQUIER PARTE DEL CUERPO : Neumonía gangrenosa, gastritis, peritonitis, inflamación de útero, ovarios, etc.

En estados inflamatorios compite con ars. alb.

Los síntomas de ambos tienen puntos tan parecidos que a menudo es difícil distinguirlos : ambos tienen vientre violentamente distendido, timpanismo marcado, sensación de quemadura ardiente, como de fuego, sed violenta, sensibilidad extrema a tacto y movimiento, tal que la menor sacudida es insoportable, vómitos de sangre, expulsiones de sangre en coágulos, secreciones extremadamente fétidas y sanguinolentas por intestinos; pero difieren en que ars. alb. quiere estar tapado, tener calor, mejora por aplicaciones calientes, secas o húmedas, secale quiere estar destapado y mejora al aire frío (Kent).

AFECCIONES CATARRALES DE TODAS LAS MUCOSAS.

ESTÁN SECAS Y SANGRAN FÁCILMENTE; POR SUPERFICIE MUCOSAS CATARRALES

CORRESANGRE LIQUIDA, NEGRA, MALOLIENTE, SE COAGULA LENTAMENTE, DIFÍCILMENTE O NADA (Kent).

6) HEMORRAGIAS PASIVAS DE SANGRE LIQUIDA, DIFÍCILMENTE COAGULABLE, OSCURA, A MENUDO MALOLIENTE, AGRAVADAS POR EL MENOR MOVIMIENTO : Pérdidas de sangre negra, líquida, aun cuando no haya inflamación de superficie que sangra.

Epistaxia de sangre líquida, venosa, negra, maloliente, hemorragia de garganta, pulmones, recto, vejiga, de sangre oscura.

Orina como tinta.

Hemorragias uterinas prolongadas durante reglas, al punto que un período se prolonga hasta el siguiente en mujeres marchitas, arrugadas; el primer día, flujo considerable de sangre líquida y negruzca, que se prolonga algún tiempo, luego secreción saniosa oscura, líquida y negruzca, que dura el próximo período, en cuya fecha aparece el verdadero flujo sanguíneo negro, de olor muy fétido.

Esto en mujeres que han tomado antes ergotina en altas dosis para abortar en un parto y son muy sensibles a su acción (Kent).

Anemia por tendencia a hemorragias y a destruir glóbulos rojos; la cara de estas anémicas es descarnada, arrugada, envejecida con aspecto sucio, grisáceo, como si no se hubieran lavado desde hace mucho y la suciedad hubiera secado; este aspecto arrugado, envejecido y sucio, es muy marcado en extremidades (Kent).

A propósito de las hemorragias de sec. com. se pueden comparar con carb. veg. : análogo en epistaxis persistentes; secreción obstinada de sangre oscura que no coagula; el diagnóstico de elección sólo se puede hacer por las otras características.

Ustil. : hemorragias uterinas, generalmente por pequeñas causas, simple tacto vaginal, por ej.; pero de sangre roja, brillante, en parte coagulada.

Bovista : parece producir relajamiento de capilares; epistaxis y hemorragias menstruales; esta secreción es más marcada a la caída de la noche o a la mañana.

Mitchella : hemorragia uterina de sangre más brillante que sec. y asociada a disnea.

Tril. pend. : flujo de sangre roja, brillante y profusa con sensación de debilidad; es más indicado en hemorragia activa, aguda que en secreción crónica y lenta de sec.; se parece a china.

Hamam. : secreción venosa y pasiva, oscura, agotadora; cefalea latente marcada en temporales.

Erig. canad. : hemorragia asociada a disuria como mitch., pero sobreviene por rachas : el flujo aparece, luego desaparece súbitamente.

Ferr. phosph. : hemorragias de sangre brillante en cualquier orificio, millef., ipeca, etc.

7) CONVULSIONES; ESPASMOS MUSCULARES : Son uno de los síntomas predominantes :

ESTREMECIMIENTOS MUSCULARES QUE COMIENZAN EN CARA Y SE EXTIENDEN A TODO EL CUERPO.

Convulsiones, espasmos, generalizados en todo el sistema muscular o localizados en un grupo de músculos, opistótonos, calambres en pantorrillas, muslos, plantas de pie, palmas de manos; contracciones, histéricas.

Espasmo y convulsiones comienzan en músculos de cara como cic. vir. (Kent).

Modalidades

Agravación

a) POR CALOR, ESTANDO TAPADO, EN HABITACIÓN CALIENTE : Estado constitucional, en general, agravado por calor y hay pocas excepciones : desea tener frío, aunque tocándolo se ve que sus miembros están fríos como hielo, quiere ventanas abiertas; una enferma con hemorragia de sec., quiere que la destapen aunque la pieza esté fresca; una enferma con úlceras de sec.

quiere estar destapada; y si tiene estado inflamatorio de sec. en intestinos estómago, quiere tener pecho y vientre descubiertos (Kent).

b) DURANTE SECRECIÓN HEMORRÁGICA, espasmos musculares y síntomas nerviosos agravados : convulsión puerperal, en medio de hemorragia (Kent).

Mejoría

a) POR FRÍO ESTANDO DESTAPADO : Estado de calor en piel y desea estar destapado; dolores agudos que escuecen, ardientes como fuego o cortantes como por un cuchillo, neurálgicos, aliviados por aplicaciones calientes; dolor de cabeza, peor al aire frío; peor de manera general, MEJORÍA DESTAPÁNDOSE EN HABITACIÓN FRÍA, Y SI EL AIRE LLEGA HASTA EL (Kent).

b) Estirándose, alargando los miembros.

Síntomas mentales

Los síntomas de depresión moral e intelectual dominan pero sin características particulares : desaliento con tristeza y melancolía; temores y angustias; temor a la muerte, gran debilitamiento de facultades intelectuales.

Demencia furiosa con IMPULSO DE AHOGARSE.

Locura activa con gran excitación; se desnuda, arranca sus partes genitales; mete sus dedos en vagina y se rasca hasta que la mucosa sangra, ha perdido toda idea de pudor (Kent).

Sueño

Somnolencia difícil de vencer o al contrario, insomnio, sueño turbado por pasadillas angustiosas.

Cabeza

Cefalea supraorbitaria u occipital, sorda, de invasión muy rápida.

Hemicránea con náuseas.

Vértigo, pesadez y latidos en cabeza.

Ojos

Vista débil; niebla, sensación de velo delante de los ojos.

CATARATA al principio.

Los sujetos envenenados por ergotina, particularmente ergotismo crónico, presentan opacidad de córnea como en casos de catarata senil; individuos arrugados, descarnados, con tendencia a ulceración, piel malsana y agravación marcada por calor, son maravillosamente curados por sec. (Kent).

Cara

Pálida, alterada, de rasgos tirantes, arrugada, marchita; ojos hundidos, ojeras azuladas; a veces expresión manifiesta de estupidez.

SENSACIÓN DE HORMIGUEO BAJO LA PIEL DE LA CARA.

CONTORSIONES ESPASMÓDICAS, CALAMBRES Y CONVULSIONES QUE COMIENZAN ENCARA Y GANAN TODO EL CUERPO.

Aparato digestivo

BOCA Y FARINGE :

Boca seca, agrietada, deja a veces exudar sangre negruzca que no coagula.

Lengua cargada, fría, lívida; o hinchada, paralizada.

PINCHAZOS EN PUNTA DE LENGUA QUE ESTA COMO PARALIZADA.

Parálisis de faringe y deglución imposible.

ESTOMAGO :

Hambre voraz, anormal; apetito excesivo pero continúa siendo flaco. (iod., nat. mur., etc.).

Como síntoma alternante, inapetencia y asco por alimentos, principalmente carne.

SED ARDIENTE.

Sensación de ardor en estómago y abdomen.

Náuseas y vómitos; estado nauseoso como mareo; vómitos como borra de café.

ABDOMEN Y DEPOSICIONES :

Violentos cólicos con vientre hinchado y distendido; timpanismo.

Diarrea acuosa, agotadora, con deposiciones como en CÓLERA, con calambres y frialdad de cuerpo y gran debilidad; y sed ardiente; en esto es muy parecido a camph., pero se distinguen fácilmente porque éste mejora por calor y agrava por frío.

Deposiciones involuntarias; la materia no termina de pasar por el ano que queda muy abierto (apis, phosph.).

Diarrea y hemorragia intestinal tienen gran tendencia a marchar parejas, sobrevenir juntas; diarrea acuosa, sanguinolenta o mezclada con sangre oscura, líquida, que coagula mal.

Aparato urinario

Al principio de intoxicación crónica, MICCIONES FRECUENTES, PENOSAS, GOTA A GOTA, CON TENESMO.

En esto se parece a cann. sat. : deseos frecuentes con dolores en cuello de vejiga, dolores ardientes durante micción, peor después; emisión de algunas gotas de orina solamente.

Canth. : deseo frecuente de orinar con dolores violentos de vejiga, emisión de algunas gotas de orina sanguinolenta con sensación de ardor, como por hierro candente, a lo largo de uretra; tenesmo vesical.

Copaiva : deseo frecuente e ineficaz de orinar; la orina corre gota a gota; ardor de cuello de vejiga.

Eup. perf. : constante deseo de orinar a pesar de frecuentes micciones, la vejiga parece siempre llena.

Más tarde parálisis de vejiga.

HEMATURIA.

Órganos genitales

Cólicos menstruales con sensación objetiva de frío en toda la superficie del cuerpo, pero intolerancia al calor.

REGLAS IRREGULARES, ABUNDANTES Y DE MUY LARGA DURACIÓN, DE SANGRE

NEGRA, LIQUIDA, POCO O NADA COAGULADA, MAL OLOR; CONTINUA SECRECIÓN DE SANGRE ACUOSA HASTA EL PERIODO SIGUIENTE.

Hemorragia pasiva de sangre negra en mujeres débiles y caquéticas, con gran postración, sensación objetiva de frío en superficie del cuerpo, y a pesar de ello, deseo de aire frío.

Dolores ardientes de útero que está congestionado.

Leucorrea marrón, ofensiva, irritante.

Amenaza de aborto hacia el tercer mes.

Cura esterilidad en casos en que el útero es incapaz de conservar el feto; esta debilidad se debe a abortos repetidos (Kent).

Dolores irregulares, débiles o ausentes, durante el parto, sin que una acción expulsiva se manifieste.

INERCIA UTERINA.

ACCIÓN SOBRE FIBRA UTERINA A LA QUE HACE CONTRAER, CUANDO LOS DOLORES DE PARTO SON DÉBILES, SUPRIMIDOS O INEFICACES, en MUJERES DELGADAS, DESCARNADAS, CON PIEL MARCHITA, PROPENSAS A HEMORRAGIAS.

Fuertes dosis de ergotina provocan tales contracciones de útero que su contenido es expulsado y una hemorragia agotadora se produce : expulsión de grandes coágulos mezclados con sangre roja al principio, pero el rasgo más saliente es secreción de sangre negra que no coagula (Kent).

Se puede comparar con Arnica : inercia uterina por fatiga de músculo uterino; dolores débiles; la parturienta desea constantemente cambiar de posición.

Caust. : inercia uterina con gran relajamiento de tejidos y postración.

Chamom. : dolores intolerables, ineficaces, a veces rigidez de cuello.

Gels. : inercia uterina con ausencia de dolor, aunque la dilatación sea completa; gran debilidad y temblor.

Puls. : loquios marrones y de mal olor.

Languidez de senos que se arrugan.

Ausencia de leche después de parto; senos marchitos, arrugados.

Aparato circulatorio

Además de su influencia sobre sangre y circulación hay : angustia precordial con palpitaciones; irregularidad de latidos de corazón; pulso pequeño e irregular.

Aparato respiratorio

NARIZ :

Hemorragia nasal; sangre oscura, líquida, que corre sin parar, con pulso pequeño, huido y gran postración : en viejos o borrachos, o mujeres jóvenes muy débiles.

BRONQUIOS Y PULMONES :

Respiración lenta.

Disnea y opresión con calambres de diafragma.

Espalda y extremidades

Irritación espinal; rigidez de nuca; sensación de frío a lo largo de espalda.

CALAMBRES Y ENTUMECIMIENTO DE MIEMBROS.

HORMIGUEO EN DEDOS, en esto se parece a : Aconit. : sensación parecida, particularmente cuando escribe; Amm.

Mur. : hormigueo en dedos con tirones y latidos con dolores como de ulceración en punta de dedos, Lycop. :

hormigueo de dedos, brazos, dedos entumecidos, también de noche.

Rhus tox. : sensación de hormigueo en punta de dedos con entumecimiento después de fatiga.

Silicea : entumecimiento con hormigueo de dedos y brazos cuando se duerme sobre uno de ellos.

FRÍO DE HIELO EN EXTREMIDADES (Aran. diad., Ars. alb., Camph., Carb.

veg., Helod., Hydrc. ac., Tabac., Silic., Ver. alb.).

Estado parético, parálisis de extremidades inferiores; estado parético de una pierna y un brazo, del mismo lado del cuerpo; parálisis de extremidades superiores con entumecimiento y hormigueo.

Entumecimiento y sensación de ardor a lo largo de columna vertebral.

Con estado parético, adelgazamiento general o solamente del nervio afectado (Kent).

Marcha vacilante, temblorosa; ataxia locomotriz.

GANGRENA, EFALO DE DEDO GRANDE (Ars. alb., se alivia por calor, se cala por frío).

Piel

SECA Y ARRUGADA, MARCHITA; FRÍA AL TACTO PERO NO PUEDE SOPORTAR ESTAR TAPADO.

SENSACIÓN DE ARDOR ALIVIADA POR FRÍO.

HORMIGUEO BAJO LA PIEL, SENSACIÓN DE QUE HORMIGAS CORREN BAJO SU PIEL.

GANGRENA SECA QUE SE DESARROLLA LENTAMENTE, CON PIEL DE ASPECTO APERGAMINADO Y ARRUGADO.

La menor herida segrega durante largo tiempo y continuamente sangrelíquida y negra.

Púrpura hemorrágica.

Úlceras varicosas con dolores ardientes aliviados por frío.

Tendencia a escaras : ulceraciones antiguas toman aspecto extraño, lustroso, negruzco, marchito, arrugado, al mismo tiempo que se secan sin que se formen granulaciones; súbitamente aparecen granulaciones negruzcas, indolentes; finalmente toda la zona se despegue lentamente; esta zona se seca; cuando mucho deja correr a veces un poco de sangre negra, fétida (Kent).

Relaciones

Antídotos

Camphora, opium.

SEPIA

Sepia o tinta de camarón, líquido marrón negruzco, proviene de un molusco cefalópodo que lo segrega por una glándula que se abre al lado del ano, para oscurecer el agua y disimular su presencia.

En tiempo de Hipócrates ya se conocía y empleaba como astringente; Plinio la prescribía como diurético y purgante.

Varios médicos de la antigüedad, Dioscorides, Plinio, Soranus, y Marcellus, empleaban su carne, huevos, huesos contra leucorrea, gonorrea, catarro de vejiga, cálculos, espasmos de vejiga, alopecia.

Hoy sólo se emplea el jugo.

Hahnemann lo utilizaba como antipsórico y según Farrington, volvió a descubrir este remedio conocido desde la antigüedad.

Hahnemann tenía un amigo artista que cayó gravemente enfermo y al que no podía curar; un día lo observó trabajar y vio que se llevaba el pincel a la boca.

Se le ocurrió que allí podía residir la causa de la enfermedad.

El artista sostenía que su color sepia era inofensivo.

Pero, por consejo de Hahnemann dejó de llevarse el pincel a la boca y, curiosamente, curó rápidamente.

Secreción

El producto obtenido por compresión de la bolsa de la tinta es un líquido espeso, de un negro intenso, reacción neutra y poder colorante muy considerable.

Algunas gotas bastan para oscurecer un vaso de agua.

Composición química

Materia colorante (melanina) 78%, carbonato de calcio 10,4%, carbonato de magnesio 7%, cloruro de sodio y sulfato de soda 2,16%, mucina 0,84%.

Soda 2,16%, mucina 0,84%.

Es un compuesto complejo que tiene esencialmente : calcearia carbónica, magnesio carbónico, natrum sulphuricum, natrum muriaticum, y como componente específico : melanina.

Von Fürth y Schneider admiten de manera general, que se puede atribuir la formación de pigmentos melánicos a la acción combinada de dos fermentos : uno AUTOLÍTICO que separaría de la albúmina un grupo aromático, el cual sería a su vez transformado en melanina por una TYROSINASA.

Acción general del medicamento

Sepia tiene acción profunda sobre el organismo, principalmente de la mujer, en que influye de manera marcada fuerzas vitales y órganos.

Causa ERETISMO DE SISTEMA NERVIOSO CON AGITACIÓN, ANSIEDAD, TRASTORNOS MENTALES CARACTERÍSTICOS; EL IMPRESIONA SEVERAMENTE LA CIRCULACIÓN POR INTERMEDIO DE LOS VASOS MOTORES Y ESTA ACCIÓN SE HACE SENTIR MÁS ESPECIALMENTE Y MUY INTENSAMENTE SOBRE CIRCULACIÓN PORTA, QUE ES VIOLENTAMENTE PLETORIZADA.

Cuatro horas después de absorción hay TUMORES DE CALOR EN CABEZA, QUE TERMINAN EN TRANSPIRACIÓN, CON SENSACIÓN DE DEBILIDAD Y ANIQUILAMIENTO.

Todo movimiento, ejercicio, provoca gran calor y termina en sudores abundantes.

A medida que la experimentación progresa la influencia general deprimente de sepia aumenta y se generaliza : el sujeto LANGUIECE, SE ABATE y queda POSTRADO; tiene desfallecimientos, es presa de temblores; se queja de sensación general de aniquilamiento después del menor esfuerzo, se siente vacío.

Pero esta debilidad no se limita a fuerzas vitales y sistema nervioso : TEJIDOS Y ÓRGANOS RELAJADOS, DÉBILES Y PEREZOSOS, realizan un trabajo orgánico más difícil, LAS VÍSCERAS ESTÁN CAÍDAS POR LAXITUD ANORMAL DE TEJIDOS, LIGAMENTOS, Y POR ESTADO CONGESTIVO QUE LOS HACE MÁS PESADOS.

La congestión venosa, particularmente de sistema porta y que aparece rápidamente, se va agravando e instalando cada vez más profundamente : de ahí dolores de cabeza, congestiones locales, várices, etc.

ÚTERO CADA VEZ MÁS CONGESTIONADO, SE PROLAPSA; HÍGADO HIPEREMiado PESADO Y PEREZOSO; éstasis venoso en miembros, inferiores que se traduce en SENSACIÓN DOLOROSA DE ROTURA Y TIRONES; las piernas parecen pesadas, como paralizadas, rígidas, pesadas sobre todo después del sueño; LAS

ARTICULACIONES PARECEN MAS DÉBILES Y DAN IMPRESIÓN DE DISLOCARSE FÁCILMENTE; LOS ESFÍNTERES terminan por ser atacados y perder tonicidad : poco a poco, la evacuación de vejiga e intestinos se hace más difícil, perezosa, pero no hay verdadera parálisis, más bien inercia.

Por éstasis venoso, sepias manifiesta en mucosas TENDENCIA CATARRAL MARCADA que se traduce EN SECRECIÓN MUCOSA ESPESA Y BLANCA COMO LECHE, O ESPESA AMARILLA Y VERDOSA, CON FORMACIÓN DE COSTRAS SECAS EN MUCOSAS.

Organismo profundamente atacado : CAMBIOS Y ELIMINACIONES SE HACEN MAL; las excreciones se hacen fétidas, AGRIAS, EXCORIANTES y el tinte es AMARILLO, TERROSO, aparece DISPOSICIÓN MARCADA A ERUPCIONES Y ULCERACIONES MALSANAS DE LA PIEL.

Estado general gravemente atacado y rápido agotamiento.

Sus principales centros de acción son : a) SISTEMA NERVIOSO SIMPÁTICO : por medio del cual disminuye la actividad funcional de todos los órganos y tejidos bajo su dependencia, con sensación de desfallecimiento, llamaradas de calor y sudores.

b) CIRCULACIÓN VENOSA : muy disminuida al punto que produce verdadera congestión venosa con éstasis sobre todo marcado en sistema porta, con plétora venosa de órganos pelvianos y tejidos irrigados por sistema porta.

Esto explica por qué su acción es tan grande sobre ÓRGANOS ÚTERO OVÁRICOS, en que determina CONGESTIÓN CRÓNICA, con prolapso, versión o flexión uterina y sensación "Bearing Down".

Como consecuencia de esta congestión de órganos genitales, hay numerosos trastornos reflejos.

Esta congestión uterina va acompañada de más o menos leucorrea blanca o amarillenta o también sanguinolenta.

c) ÓRGANOS DIGESTIVOS : digestión lenta con sensación de desfallecimiento en boca de estómago y constipación marcada, plétora violenta de sistema porta, congestión, en alto grado, de hígado y numerosos síntomas en relación con este estado.

d) RIÑONES : por perturbaciones propias de sepias en cambios y eliminaciones orgánicas, emiten orina turbia, de coloración oscura, muy fétida, con abundante sedimento rojo o gris.

e) PIEL : bajo su influencia se hace malsana, terrosa, con manchas amarillas, sobre todo en cara y tendencia marcada a erupciones.

El hecho notable de su patogenesia y de las modalidades sintomáticas sucesivas de su acción general sobre el organismo humano, es intensa congestión VENOSA PORTAL que es su característica.

De ahí 2 zonas principales de influencia : 1) POLO HEPÁTICO.

2) POLO GENITAL.

Características

CONSTITUCIÓN Y TIPO : Actúa especialmente sobre EL ORGANISMO FEMENINO aunque también puede ser útil en el hombre; pero ese caso de tipo femenino, como puls.

Se adapta perfectamente a mujeres en período pleno de actividad útero-ovárica; parece actuar mejor en : ALTAS, DELGADAS, DELICADAS, SENSIBLES A TODAS LAS IMPRESIONES, DE OJOS Y CABELLOS NEGROS, (aunque estos últimos no siempre son negros), tez pálida o ligeramente sucia con una especie de MANCHA AMARILLA CABALGANDO SOBRE RAÍZ DE NARIZ QUE SE EXTIENDE COMO ALAS DE MARIPOSA SOBRE MEJILLAS, BAJO LOS OJOS; otra mancha hepática AUREOLA TAMBIÉN FRECUENTEMENTE LA BOCA y es tan característica como la precedente.

Labio superior cubierto de fino vello negro aparente, mientras el labio inferior, un poco hinchado, está agrietado generalmente en el medio.

Tendencia a transpirar, particularmente órganos genitales, axilas, espalda.

Propensas a desórdenes característicos de órganos sexuales : eretismo genital con ÚTERO PESADO QUE DA SENSACIÓN DE QUERER CAER; A MENUDO PASA DE UNA SENSACIÓN Y EL ÚTERO ESTA VERDADERAMENTE PROLAPSO; el hombre también tiene eretismo sexual, pero en ambos el coito causa gran debilidad.

Estas mujeres sufren de AFLUJOS DE CALOR, CONGESTIONES LOCALES, dolor de cabeza, particularmente al despertar, en que se sienten aturridas y fatigadas.

Pero lo más notable es sobre todo el éstasis portal que las marca profundamente : además de los síntomas uterinos que están íntimamente ligados con la plétora venosa portal, el HÍGADO ESTA CONGESTIONADO, perezoso, lo mismo que el estómago que presenta dispepsia atónica; el intestino sufre muy a menudo CONSTIPACIÓN REBELDE.

En la orina hay uratos en cantidad más o menos grande y una serie de signos que atestiguan mala asimilación.

EL ASPECTO GENERAL DE TALES PERSONAS NO ES JAMAS DE FUERZA NI SALUD, MAS BIEN DE POSTRACIÓN, LANGUIDEZ, CON GRAN LACITUD DE TEJIDO CONJUNTIVO; TIENEN FÁCILMENTE PALPITACIONES Y ANIQUILAMIENTO FÍSICO EN RELACIÓN CON ANIQUILAMIENTO MORAL.

sepias Mujer de cabellos (bastante escasos) y ojos negros; Cara amarilla y más bien flaca, tez descolorida, terrosa.

Algunas pecas; Párpados pesados e incompletamente abiertos con ptosis más marcada en el izquierdo; Silla amarronada en raíz de nariz con "alas de mariposa" en mejillas u ojos.

Mancha marrón que rodea la boca; Labio superior cubierto por fino vello aparente; Labio inferior un poco caído, hinchado, con algunas grietas en el medio; Expresión fatigada e indiferente, apática, irritable, que da impresión de llano fácil.

Rasgos blandos, débiles, faltos de firmeza.

(Dr. Brissaud)

Síntomas mentales

Una de sus características más marcadas es su estado mental, sus síntomas mentales.

PARECE ABOLIR EL PODER DE SER NATURALMENTE AMABLE, AFECTUOSO; estose demuestra por el lenguaje de una madre de familia : "siento que debería amar más a mis hijos, a mi marido, mi casa y a pesar de mi deseo no consigo tener esos sentimientos" (Kent).

Enferma TRISTE, DEPRIMIDA, LÁNGUIDA; LLORA FÁCILMENTE, se vuelve INDIFERENTE A TODO; OCUPACIONES, FAMILIA, A LAS PERSONAS QUE MAS QUIERE, su casa, todo lo suyo.

Su memoria ES DÉBIL Y SIENTE SU CABEZA "VACÍA", lo que le apena.

A esta depresión, a esta tristeza melancólica del espíritu, se une IRRITACIÓN QUE PUEDE LLEGAR A IRASCIBILIDAD MUY MARCADA : SE TORNA DE CARÁCTER ODIOSO.

No es mala ni francamente colérica, sino constantemente irritable, no sabe lo que quiere, contradice todo lo que le dicen; su hipersensibilidad la hace llorar sin cesar, la pone hipocondríaca, la empuja a la soledad a la que teme, pues su angustia es perpetua, sin ideas fijas, pero está como envuelta en una nube de melancolía que pinta toda su vida de negro.

Su astenia es extrema y la evolución de sus tendencias psíquicas la conduce a retraerse cada vez más en su actividad física, intelectual y sentimental, a indiferencia perfecta por sus ocupaciones preferidas, a sus afectos más caros.

1) DEBILIDAD Y DESFALLECIMIENTO : SENSACIÓN DE VACÍO EN BOCA DE ESTOMAGO.

Muy débil; un paseo, aún pequeño, la fatiga mucho; DESFALLECE FÁCILMENTE; por calor o frío, tiempo húmedo, arrodillándose, después de corto paseo a pie o en coche, etc., por pequeñeces.

Un síntoma muy característico es : SENSACIÓN DE VACÍO, DESFALLECIMIENTO EN BOCA DE ESTOMAGO, NO MEJORADA POR COMER; frecuentemente unido a desórdenes; y en conexión con estado de ptosis de órganos y postración general.

En esto puede compararse con sulph. : sensación de vacío de estómago, como si se muriera de hambre, a las 11, a menudo asociado con sensación de ardor en planta de pies, de noche y calor en la coronilla de la cabeza.

Phosph. : sensación marcada de vacío en la boca de estómago, pero se extiende a todo el abdomen y se agrava de noche y debe levantarse para comer.

Ignat. : sensación de vacío, desfallecimiento, pero no ligada a desórdenes orgánicos, sino que es manifestación puramente nerviosa, ligada a veces a desórdenes verdaderamente histerálgicos matriz y sistema nervioso presentan estado irritable.

Hydrast. : desfallecimiento muy marcado.

Lycop. : hambre pero se sacia a los primeros bocados; alternativas de hambre e inapetencia.

China : alternativamente, gran apetito e inapetencia como lycop.

Iodium : necesidad de comer todo el tiempo y mejora mientras come.

2) MANCHAS AMARILLAS ESPECIALMENTE EN CARA, DE FORMA CARACTERÍSTICA : Salpicadas en todas LAS MEJILLAS, sus manchas amarillas se agrupan más generalmente en coloración uniforme que cubre nariz y parte que rodea mejillas, como una silla de montar sobre arista de nariz, o dos manchas a cada lado de alas de nariz, o hacia las sienes, o en cualquier parte del cuerpo, sobre todo VIENTRE.

3) LLAMARADAS DE CALOR CON TRANSPIRACIÓN Y DESFALLECIMIENTO : Congestiones locales y llamaradas de calor casi tan características como en sulph., pues la irregularidad de circulación es tan marcada en uno como en otro, pero sepia no tiene sensación tan intensa de calor como sulph.; en sepia hay tendencia muy marcada a asociación de síntomas congestivos con pelvianos, de pesadez característica; las llamaradas de calor parecen tener origen en órganos pelvianos e irradiar a todo el cuerpo; la congestión de órganos va acompañada de muchos latidos y pulsaciones.

4) SENSACIÓN DE PESADEZ HACIA ABAJO, PRESIÓN DE ARRIBA HACIA ABAJO, EN REGIÓN PELVIANA, CON DOLOROS TIRANTES DE SACRO; SENSACIÓN DE CAÍDA DE TODOS LOS ÓRGANOS PELVIANOS.

Dolores de útero, como de parto, con sensación tal, que tiene que cruzar las piernas o sentarse con las piernas apretadas como para retener algo que parece querer salir de la vagina (Guernsey).

Prolapso de útero con sensación como si algo quisiera salir por vulva (Lippe).

Presión en vejiga y micciones frecuentes, con sensación de tensión en partes inferiores de abdomen.

Sensación de peso, de bola en recto.

Modalidades

Lateralidad

Izquierda

Agravaciones

- a) A LA MAÑANA Y AL ATARDECER, de manera general, la tarde trae mejoría momentánea.
- b) Por aire frío.
- c) Lavándose.
- d) ANTES DE TORMENTA.
- E) DESPUÉS DE LA COMIDAS.

Mejoría

- a) A LA TARDE.
- b) POR EJERCICIO VIOLENTO (que da un latigazo a la circulación venosaobstruida).
- c) POR CALOR DE LECHO, POR APLICACIONES CALIENTES.
- d) TENIENDO LAS PIERNAS LEVANTADAS.

Síntomas mentales

COMPLETA INDIFERENCIA POR LOS QUE MAS QUIERE; aversión por su familia, casa, ocupaciones habituales.

TRISTE, MISERABLE, LLENA DE ANSIEDAD, MIEDO, IDEAS NEGRAS, SE ASUSTA DE TODO, INQUIETA POR SU SALUD, SENSIBLE A TODAS LAS IMPRESIONES, MENTE PEREZOSA, MEMORIA DEBILITADA, NO TIENE ALEGRÍA DE VIVIR, INDOLENTE, FATIGADA FÍSICA Y MORALMENTE, TACITURNA, responde apenas a las preguntas, muy distraída.

EXCESIVAMENTE IRRITABLE, se agrava por ruido, sociedad, aunque seasusta de estar sola.

FÁCILMENTE SE OFENDE, NO SOPORTA CONTRADICCIÓN, CARÁCTER EXCESIVAMENTE DIFÍCIL Y DESAGRADABLE, DESCARGA SU MAL HUMOR Y CÓLERA CONTRA LOS QUE MAS QUIERE, TODO LA EXCITA, LA ABURRE.

Este estado mental debe diferenciarse de puls. que también tiene estado de llanto, con ansiedad, mal humor, tristeza y preocupación extrema por su propia salud.

Puls. tiene un fondo de suavidad, busca ser rodeada de ternura y consuelo.

Sepia tiene irritabilidad colérica e indiferencia fría, carácter difícil, personal y desagradable, que no permite confundir los dos estados mentales.

Nat. mur. : complementario de sepia, ambos tienen humor lloroso, gran depresión mental, memoria disminuida, indiferencia; ambos se agravan por consuelo, desean que los dejen tranquilos, tienen gran debilidad e irritabilidad nerviosa.

Pero la INDIFERENCIA DE nat. mur., proviene de su desesperación y languidez de espíritu, en sepia tiene su origen en AVERSIÓN NO DISIMULADA POR TODOS LOS QUE LA RODEAN Y SON MAS QUERIDOS; sepia TIENE ERETISMO VASCULAR Y nat; mur. NO; con sepia, los trastornos de la sensibilidad determinan trastornos congestivos de la cabeza, pecho.

Una conversación animada provoca tufaradas de calor en la cara y toda agitación pronto va seguida de sudores.

Con nat. mur. los síntomas están más en conexión con debilidad nerviosa, lo que hace que las emociones determinen dolor de cabeza; los PENSAMIENTOS DESAGRADABLES, TRISTEZA, DEBILIDAD O IRRITABILIDAD, PERO SIN ERETISMO CIRCULATORIO.

Si es una hipocondríaca, es un estado de melancolía por depresión mental en relación íntima con la INERCIA DE INTESTINOS de nat. mur. y en sepia, el mismo estado está ligado a ESTASIS PORTAL MUY MARCADO, MAS PERSISTENTE Y ASOCIADO A TEMPERAMENTO MAS IRRITABLE.

Se puede encontrar perfectamente indicado a nat. mur. cuando el ESTADO MENTAL ESTÁ LIGADO A IRREGULARIDAD MENSTRUAL O PROLAPSO UTERINO, PERO SIN LA OBSTRUCCIÓN VENOSA DE sepia.

Caust. : causa gran tristeza particularmente antes de reglas como sepia.

Cara amarilla, pero la enferma es tímida, tiene estado de ansiedad que no se encuentra en sepia; teme la POSIBILIDAD DE ACCIDENTES PARA ELLA O LOS SUYOS.

Sueño

Gran deseo de dormir de día y al atardecer.

Luego gran insomnio por sobre excitación.

Despertares frecuentes sin causa aparente; sueño agitado, con sueños fantásticos, terroríficos, angustiosos, frecuentes sobresaltos de susto; puede tener sueños lascivos durmiendo, cree oír que la llaman; o grita y mueve sin cesar los miembros agitados por continuos estremecimientos.

Despierta a las 3 ó 4 y no puede volverse a dormir.

Cuando tiene que levantarse está muy cansada, con sensación de no haber tenido un sueño reparador.

Tal sueño nos hace pesar en magn. mur.; en sulph. : "sueño de gato", despierta a las 4 y no se duerme más.

Platina : durante muchas noches, despierta sin razón alguna a las 3, pero se vuelve a dormir en seguida; nux v. de sueño y despertar tan característicos : ars. : después de medianoche y sobre todo alrededor de las 3 se agita y sólo duerme a ratos; graph. : despierta a las 3 y no puede dormirse por mucho tiempo, por eso al levantarse está aturdido y destrozado; mezer. : despierta alrededor de las 3 con sensación de pesadez de miembros y cabeza y no puede volverse a dormir por mucho tiempo y es entonces atormentado por sueños angustiosos.

Cabeza

HEMICRÁNIA EN ENFERMAS CON TEMPERAMENTO DE sepia Y QUE SUFREN DESARREGLOS UTERINOS CARACTERÍSTICOS.

Dolores de CARÁCTER LATENTE con sensación dolorosa, de presión o estallido latido de adentro hacia afuera; localizados GENERALMENTE SOBRE UN OJO, MAS A MENUDO EL IZQUIERDO, Y SE AGRAVAN POR LUZ, RUIDO, MOVIMIENTO, SALVO EJERCICIO VIOLENTO; pueden venir en puntadas terribles que provocan movimiento espasmódico que echa la cabeza hacia atrás a pesar suyo.

Pueden ESTAR PEOR A LA MAÑANA Y VAN ACOMPAÑADOS DE NAUSEAS Y VÓMITOS, CON HÍGADO OBSTRUÍDO Y ORINA CARGADA DE ÁCIDO ÚRICO.

DOLOR DE CABEZA LATENTE, EXTREMADAMENTE doloroso en el momento de la formación con débil secreción menstrual.

CEFALEA CONGESTIVA DURANTE REGLAS, CUANDO LA SECRECIÓN ES POCO ABUNDANTE (ver sang.).

Cefalea el día que está libre o franco en el trabajo (sulph.).

Sensación de frío en la coronilla de la cabeza.

Vértigos con sensación de que algo gira dentro de ella, peor al agacharse o caminar.

Cefalea en frente principalmente arriba de cejas, o en occipicio, con sensación de presión y estallido, peor a la mañana, al aire libre, por trabajo mental, por ejercicio moderado.

Los cabellos se ponen grises y caen en gran cantidad.

Comezón de cuero cabelludo que se cubre de erupciones húmedas, rezumantes, sobretodo en coronilla y nuca; cuero cabelludo sensible al tacto.

Cara

HABITUALMENTE CARA PÁLIDA, TEZ AMARILLA, TERROSA O DE ASPECTO SUCIO; NUMEROSAS PECAS Y SOBRE TODO ANCHAS MANCHAS AMARILLAS ALREDEDOR DE LABIOS Y MENTÓN, O BAJO LOS OJOS, A CADA LADO DE LA NARIZ SOBRE LA CUAL CABALGAN Y SE REÚNEN EN FORMA DE MARIPOSA O SILLA DE MONTAR.

Puede estar hinchada, con aspecto abatido, de miedo, párpados superiores hinchados y caídos.

Labio inferior un poco hinchado y resquebrajado en el medio, labio superior recubierto de vello negro, si es morena, más o menos aparente.

A menudo es útil en erupciones herpéticas en cara, labios y mentón.

Ojos

PTOSIS, principalmente izquierda; periódica y sobreviene después de exposición a viento seco o por aire frío, especialmente durante reglas, acompañada de fatiga en globos oculares, con necesidad de cerrar los ojos.

Parece haber localización de ptosis general que caracteriza a sepia (caust., etc.).

NUMEROSOS SÍNTOMAS CATARRALES con vesículas, pústulas y manifestaciones psóricas; estado de infiltración variado en y alrededor de los ojos; pústulas en globo ocular y borde de párpados; tumores tarsales; aglutinación catarral de párpados.

LE PARECE VER LOS OBJETOS A TRAVÉS DE UNA GASA O NEBLINA (KENT).

Estos síntomas oculares se relacionan con sepia tuberculinica, con eliminaciones de endotoxinas que causan trastornos de insuficiencia hepática, congestión venosa de origen portal; de ahí metástasis tóxicas sobre ojos; o con sepia que con sus congestiones de pelvis, provoca ptosis orgánicas y reflejos nerviosos que pueden atacar acomodación y sistema nervioso extrínseco del ojo (Dr. Nebel).

Oídos

SECRECIÓN DE PUS AMARILLENTO, espeso, ofensivo.

Sensación de obstrucción de conducto auditivo.

Zumbidos.

Aparato digestivo

BOCA :

Gusto pútrido y viscoso con aliento fétido.

La lengua puede estar pálida, floja, toma fácilmente la impresión de los dientes, lo que recuerda a merc.

Puede estar cargada, blanca y limpia durante reglas.

Puede haber sensación de ardor como si hubiera sido quemada, en paladar y lengua, sobre todo marcada en la punta.

Odontalgia peor al contacto del aire, en el lecho o comiendo caliente.

Labio inferior hinchado con grietas sobre todo al medio.

ESTOMAGO :

NO TIENE HAMBRE, puede haber ANOREXIA.

DESEA COSAS ÁCIDAS, VINAGRE, PICKLES, condimentos y la satisfacción del deseo parece aliviar los síntomas. (ant. crud.).

NO PUEDE SOPORTAR LECHE que la agrava (aeth., calc. ost., carb. veg., conium, magn. mur., magn. carb., nat. carb., sulph.); no le gusta mucho la CARNE (alumina, arnica, calc. ost., carb. veg., puls., sulph.).

A menudo LA VISTA U OLOR DE ALIMENTOS LE DAN NAUSEAS (colch.)NAUSEAS A LA MAÑANA ANTES DE COMER.

Esto hace a veces de sepia un buen remedio para náuseas y vómitos de embarazo. (nux v.).

Aunque la anorexia sea una de las características de sepia, se ha notado a veces GRAN SENSACIÓN DE HAMBRE difícil DE SATISFACER AUNQUE COME ENORMEMENTE.

Este síntoma que parece contradictorio con la anorexia que parece ligada al estado de insuficiencia hepática se explica si se lo considera en conexión CON LA GRAN FATIGA DEL REMEDIO y sobre todo con LA SENSACIÓN DE VACÍO, DE TIRONES EN EPIGASTRIO Y ABDOMEN Y PTOSIS DE VÍSCERAS DE PARTE INFERIOR DEL TRONCO.

Sensación de vacío, tirones, gran hambre, que no mejora comiendo o mejor por poco tiempo.

Todo tiene gusto muy salado (carb. veg., china) (Boericke).

Dispepsia ácida con abdomen hinchado y eructos agrios.

Tendencia a vomitar después de comer.

Trastornos dispépticos con lengua blanca y gusto ácido y amargo.

Pirosis.

Eructos ácidos.

Dolor de cintura alrededor de hipocondrio.

Generalmente los trastornos dispépticos van asociados a síntomas uterinos.

Dispepsia por tabaco.

ABDOMEN, RECTO Y DEPOSICIONES :

SENSACIÓN DE PTOSIS, RELAJAMIENTO DE ÓRGANOS DEL ABDOMEN QUE RESPONDE A REALIDAD ANATÓMICA.

Abdomen hinchado, distendido y digestión intestinal lenta, con ruidos, presión y pesadez abdominal.

SENSACIÓN DE PLENITUD, PRESIÓN, PINCHAZOS EN REGIÓN DEL HÍGADO QUE ESTACIONADO, MAS O MENOS HIPERTROFIADO Y DOLOROSO A PALPACIÓN, CON MANCHAS AMARILLAS EN PIEL DE ABDOMEN.

INTESTINO PEREZOSO; DEPOSICIONES DURAS, INSUFICIENTES, PERO AUN NORMALES EXPULSADAS CON DIFICULTAD.

ESCIBALOS MARRÓN OSCUROS, PEGADOS POR MUCUS.

SENSACIÓN DE PESO, BOLA EN RECTO, QUE NO SE ALIVIA POR DEPOSICIÓN.

SENSACIÓN COMO DE BOLA EN RECTO; NO PUEDE HACER ESFUERZOS; tenesmo con puntadas de abajo a arriba.

CONSTIPACIÓN POR FALTA DE DESEO Y NECESIDAD DE EVACUAR DURANTE DÍAS Y DÍAS; PROFUNDA INACTIVIDAD, GRAN PEREZA DE RECTO NO PUEDE EXPULSAR LA DEPOSICIÓN.

Tejidos, alrededor de recto, relajados e infiltrados de sangre venosa; esto puede traer PROLAPSO RECTAL, GRUESAS HEMORROIDES SALIENTES Y SECRECIÓN CONSTANTE, HUMEDAD TENAZ DE ANO. HEMORROIDES SENSIBLES Y DOLOROSAS QUE SANGRAN AL EVACUAR CON SENSACIÓN DE PLENITUD EN RECTO, COMO SI ESTUVIERA DISTENDIDO POR CUERPO EXTRAÑO QUE EXCITARA LA NECESIDAD DE EVACUAR (NUX V.).

Aparato urinario

Puede haber DESEO ANORMALMENTE FRECUENTE DE ORINAR Y MICCIONES REPETIDAS por presión de vejiga por ptosis de órganos pelvianos sobre todo útero, que puede estar prolapsado o en ante flexión.

VEJIGA IRRITABLE Y SECRECIÓN INVOLUNTARIA DE ORINA EN EL PRIMER SUEÑO.

INCONTINENCIA; en el primer sueño, en cuanto se duerme; aquí generalmente sepia sigue bien a caust.

ORINA DE OLOR FÉTIDO PARTICULAR, a tal punto que no puede tenerse en la pieza; muy turbia en reposo y con DEPOSITO QUE SE ADHIERE MUY TENAZMENTE COMO ARCILLA QUEMADA Y MOLIDA, MARRÓN O ROJIZA COMO POLVO DE LADRILLO. (caust., kali carb., berb. vulg., benz. ac.).

Órganos genitales

MASCULINOS :

Transpiración irritante de escroto.

Debilidad de órganos sexuales.

Frigidez.

"Gota militar"; secreción liviana pasiva, durante mucho tiempo; frecuentes emisiones de esperma acuoso y claro.

Se considera a sepia y kali hydr., como grandes remedios para gota crónica, "gota militar", persistente.

Condilomas alrededor de glándula.

FEMENINOS :

He aquí una gran esfera de acción del remedio tanto directamente como por acción refleja.

Sus síntomas en órganos genitales de la mujer son muy marcados, muy profundos, muy característicos.

EN ÚTERO, DOLORS COMO DE PARTO, CON SENSACIÓN TAL QUE DEBE CRUZARLAS PIERNAS Y SENTARSE CON LAS PIERNAS APRETADAS, COMO SI DESEARA RETENER ALGO QUE TRATARA DE SALIR POR VAGINA. (bell., kreos., lac. can., lil. tig., nat. carb., y podoph.).

DOLORS DE ÚTERO, SENSACIÓN DE PRESIÓN HACIA ABAJO, DE ESPALDA A ABDOMEN, QUECAUSA OPRESIÓN Y CRUZA LAS PIERNAS PARA EVITAR PROLAPSO DE ÚTERO.

PESADEZ COMO SI ALGO QUISIERA PASAR A LA FUERZA A TRAVÉS DE VULVA Y

ESTASSENSACIÓN PARECE ALIVIADA POR SENTARSE CRUZANDO LAS PIERNAS.

A esta sensación de pesadez can asociado DOLOR DE ESPALDAS, EN REGIÓN LUMBO SACRA, PEOR CUANDO ESTA PARADA O CAMINA.

DOLORS ARDIENTES DE ÚTERO Y A VECES DOLORS AGUDOS LATENTES HACIA LA PARTESUPERIOR DEL ÓRGANO; PUEDE HABER SENSACIÓN DE CONSTRICCIÓN DOLOROSA COMO SI EL ÚTERO FUERA AGARRADO POR UNA MANO.

CONGESTIÓN O INDURACIÓN DE CUELLO DE ÚTERO CON SENSIBILIDAD O ARDOR.

OBSTRUCCIÓN CONGESTIVA DE ÚTERO QUE ES DESPLAZADO, PROLAPSADO O EN MALA

FLEXIÓN; Y LEUCORREA ABUNDANTE GRIS AMARILLENTO, MUY FÉTIDA.

REGLAS EN GENERAL TARDÍAS Y POCO ABUNDANTES AUNQUE EXCEPCIONALMENTE PUEDEN ADELANTARSE Y SON PROFUSAS.

Antes de reglas, cólicos; durante reglas, melancolía, odontalgia, cefalalgia, FATIGA DOLOROSA DE MIEMBROS, O CÓLICOS ESPASMÓDICOS Y SENSACIÓN DE PRESIÓN, PESADEZ EN REGIÓN UTERO-VAGINAL.

REGLAS IRREGULARES : atrasadas y poco abundantes, o adelantadas y profusas con sangre negra.

Conium tiene reglas semejantes con curiosa relación refleja entre útero y senos que están grandes y dolorosos antes de reglas.

Iodium : igualmente y esta irregularidad de reglas va acompañada de vértigos y palpitación.

Senecio : además de reglas irregulares, dismenorrea por falta de tonicidad de útero.

Thuya : en general se agrava durante reglas, irregulares como sepia; tiene dolores como de parto.

LEUCORREA AMARILLO VERDOSA CON MUCHA COMEZÓN Y FETIDEZ EN GENERAL. (ars. alb., cham., bovista, hydrast., lach., lill., merc., nat. sulph.).

Dolores picantes en parte superior de vagina, que irradian hasta ombligo.

VAGINA DOLOROSA DURANTE COITO.

El conjunto de esta acción de sepia sobre órganos genitales femeninos lo tienen también dos medicamentos que desarrollan en esta esfera un cuadro patogenético muy parecido : mur. purp. : sensación de vacío, desfallecimiento en boca de estómago y de presión hacia abajo, como si órganos de pelvis menor quisieran salir, "Dolores de útero; sensación de dolorimiento en útero (helon.), "siente" el útero; útero tan doloroso que no puede caminar sin sufrir; sensación de ptosis, de prolapso uterino, con verdadera ptosis uterina; hipertrofia de útero con tenesmo pelviano y dolores punzantes que irradian al pecho y agravado acostándose; dismenorrea y endometritis crónica con desplazamiento uterino; necesidad de apretar los muslos como para retener el contenido pelviano" (Nash).

Todo esto se parece a sepia; pero la gran diferencia es que en sepia no hay deseo sexual, hasta hay aversión, sobre todo cuando hay prolapso.

En mur. purp. deseo contrario, EXTREMADAMENTE VIOLENTO, IRRESISTIBLE; EL MAS LIGERO TOCAMIENTO PUEDE LLEVAR AL PAROXISMO ESTA FIEBRE SEXUAL, ESTA IRRITACIÓN DEL ERETISMO GENITAL POR EL MAS LIGERO CONTACTO ES CASI CARACTERÍSTICA (Nash).

La enferma de mur. purp., es fácilmente excitada y sigue el camino casi siempre fatal de la ninfomanía (lil. tig., platina).

EL MENOR CONTACTO EN VULVA PROVOCA VIOLENTE IRRITACIÓN SEXUAL (orig., zincum).

En esfera genital lill. tigr. es muy parecido a sepia : conviene a muchos estados reflejos que dependen de ciertas condiciones patológicas del útero y sus reflejos.

Lill. tiene de manera muy marcada este síntoma : PESADEZ CON SENSACIÓN COMO SI EL CONTENIDO DE LA PELVIS QUISIERA SALIR POR VAGINA A MENOS QUE LO CONTENGA POR PRESIÓN DE LAS MANOS O SENTÁNDOSE.

Es muy eficaz en desplazamientos uterinos : la sensación de constante pesadez hacia abajo en región uterina va acompañada de sensación muy marcada como si las VÍSCERAS PELVIANAS Y TODO EL CONTENIDO ABDOMINAL FUERAN ATRAÍDOS HACIA ABAJO HASTA LA VAGINA; ESTA SENSACIÓN DE PTOSIS SE SIENTE TAMBIÉN EN EL PECHO, HASTA LOS HOMBROS.

El diagnóstico entre lill. tig. y sepia no siempre es fácil; los casos de sepiason más bien crónicos, los de lill. tienen manifestaciones más intensas, dolorosas, molestas, más agudas; pero si la caquexia del remedio es bastante marcada, decidirá en favor de sepia.

Lill. tig. TIENE MAS IRRITACIÓN URINARIA QUE sepia, más frecuente necesidad de orinar y los trastornos de la micción son tan intensos que hacen pensar en cantharis; siempre en lill. tig. a la irritación vesical puede agregarse verdadera IRRITACIÓN RECTAL y (recordemos al respecto a merc. corr., caps., y nux v.) (Nash).

En ciertos casos de lill. los síntomas uterinos pueden estar disfrazados por TRASTORNOS VIOLENTOS DE CORAZÓN : palpitaciones, latidos, dolores vivos, agudos, sensación como si el corazón estuviera apretado por una mano de hierro (cactus).

Pero en realidad todos estos trastornos : cardíacos, urinarios y rectales parecen de origen reflejo cuyo punto de partida se encuentra en útero y ovarios.

Aparato circulatorio

Gran congestión venosa principalmente de sistema porta.

Sepia puede tener gran resonancia sobre manifestaciones circulatorias.

Llamaradas de calor que comienzan en el tronco y suben a la cabeza con ansiedad y sensación de presión y terminan en transpiración.

Se nota también sensación de congestión latente, pulsátil, particularmente en epigastrio, región hepática, uterina y riñones.

Dolores latentes de útero que está repleto de sangre caliente, sensible al tacto, pesado y desplazado de su posición normal.

Manos calientes y pies fríos o en cuanto los pies se calientan, las manos se enfrían.

Palpitaciones de corazón a la noche después de la comida.

Suspensión de latidos de corazón con gran angustia sobre todo al levantarse de la cama.

Epistaxis por supresión de reglas (phosph., puls., etc.) o estando encamada demasiado caliente.

Aparato respiratorio

NARIZ :

Catarro crónico con secreción mucosa espesa, abundante, no irritante (kali bichr., puls.).

LARINGE :

Ronquera súbita, sequedad de laringe y tráquea.

Escozor de laringe.

BRONQUIOS Y PULMONES :

Tos que parece venir de estómago o abdomen, con expectoración salada y pinchazos en epigastrio.

Tos a la mañana con expectoración abundante, salada.

Tos seca, breve, espasmódica, fatigante, a la noche en cama, casi sin expectoración.

El Dr. Pierre Schmidt, en la publicación de un caso interesante ; "La tos de sepia" señala como grandes características : agravación de la tos por posición acostada y mejoría sentándose; tos que impide dormir y despierta, tos que parece venir del estómago; debe apretarse el pecho mientras tose.

Asma nocturna.

Disnea peor después del sueño.

Espalda y extremidades

Sensación de debilidad en parte baja de la espalda.

TODOS LOS DOLORES PARECEN IRRADIAR A LA ESPALDA.

Sensación de frío entre hombros (ab. can., amm. mur., capsic., lach. nant.).

Debilidad en base de riñones.

DEBILIDAD EN ARTICULACIONES SOBRE TODO TIBIO-TARSIANA que se tuerce fácilmente cuando camina.

Indicado en casos en que las articulaciones se dislocan fácilmente. (caust.).

Temor continuo de torcerse.

Sensación de pesadez y rotura en miembros.

Crujidos de rodillas y tobillos.

Rigidez de extremidades inferiores y rengueo; rigidez de tendón de Aquiles.

Piel

Como consecuencia de mal estado de hígado, hay en piel numerosas MANCHAS AMARILLO MARRÓN en la cara, donde tienen el aspecto característico ya descrito, en pecho y vientre.

Pecas en mujeres jóvenes.

Muchos síntomas de piel dependen de la circulación venosa defectuosa que la hace más susceptible.

Sensibilidad dolorosa de piel, que está HÚMEDA sobre todo en rodillas y otras articulaciones.

ENROJECIMIENTO Y COMEZÓN que se transforma a menudo en sensación de ardor, después del rascado, (sulph.).

ERUPCIONES VESICULOSAS ALREDEDOR DE BOCA Y MENTÓN.

Herpes.

Erupciones herpéticas, vesiculosas, principalmente en ARTICULACIONES, codos, rodillas y sobre todo articulaciones de dedos que se localizan SOBRE TODO EN PLIEGUES DE FLEXIÓN, pues es una característica general del remedio determinar TRASTORNOS CUTÁNEOS, PARTICULARMENTE EN PLIEGUES ARTICULARES.

PRURITO NO MEJORADO POR RASCADO.

Sepia causa y cura, como sulph., numerosas formas de erupción de piel; hay gran parecido entre estos dos antipsóricos; cada uno de ellos sigue a menudo bien al otro, por supuesto cuando los síntomas concuerdan, cosa frecuente.

Sepia puede presentar ULCERACIONES PERO GENERALMENTE INDOLORAS que no se encuentran en borax ni en merc.

LA PIEL de sepia tiene en GENERAL MAL OLOR.

Transpiración fétida en axilas; HIPERHIDROSIS Y "BRONQUIDROSIS"; transpiración de pies, sobre todo en planta y dedos grandes, de olor fétido.

Relaciones

Incompatibles

Lach., puls.

Antídotos

Aconit., antim. crud., rhus tox.

Complementarios

Nat. mur., nux v., que intensifica su acción.

SILICEA

Silicea, tierra silicea o ácido salicílico es un compuesto oxigenado de silicium.

Se encuentra en la naturaleza en gran número de variedades minerales : cristal de roca, sílex, ágata, ónix, ópalo etc.

Para preparar el medicamento homeopático se usa silicea pura extraída de cristal de roca.

Las tres primeras dinamizaciones por trituración; a partir de la tercera se obtienen las más elevadas por dilución hahnemanniana.

Es uno de nuestros grandes remedios constitucionales, pero sólo puede tener valor como tal si se desarrolla el poder terapéutico por procedimientos de dinamización de Hahnemann.

En estado natural, es un cuerpo insoluble de acción nula; dinamizado es uno de los remedios más poderosos de la

Materia Médica : es un gran ejemplo de la eficacia de la potencialización.

Acción general del medicamento

PREDOMINA EN TEJIDO CONJUNTIVO, es como una especie de cemento celular.

Es esencial en número considerable de PROCESOS DE ASIMILACIÓN en los tejidos más diversos : nervioso, cutáneo, ganglionar, óseo, fibras elásticas de aparato pulmonar y sistema vascular.

DOMINA EN CIERTO MODO LA NUTRICIÓN GENERAL DEL INDIVIDUO y responde A

MALA ASIMILACIÓN, PERTURBACIÓN EN CAMBIOS NUTRITIVOS, EN GRADO DE DESMINERALIZACIÓN AVANZADO DE LA CÉLULA y se manifiesta por EXTREMA DEBILIDAD FÍSICA Y MENTAL, y en el niño por DETENCIÓN DE DESARROLLO.

Está en relación estrecha con inflamación de tejidos, cuando ha progresado hasta SUPURACIÓN.

Cada vez que se ha formado pus, puede estar indicada.

Como calc. sulph., corresponde a procesos supurativos; particularmente cuando la zona está infiltrada y debe continuar hasta que toda infiltración desaparezca.

Si la curación tarda y la supuración persiste corresponde calc. sulph.

Características

1) CONSTITUCIÓN Y TIPO : Acción lenta.

Se necesita mucho tiempo para desarrollar los síntomas.

Por eso conviene a enfermedades de desarrollo lento.

Se ve, en ciertos momentos del año y en ciertas condiciones, aparecer síntomas que muestran que su influencia dura siempre y puede persistir en algunos por el resto de su vida.

Así actúan los medicamentos de acción larga y profunda; son capaces de impregnar profundamente el organismo, descubren taras hereditarias dormidas y las hacen manifestar por síntomas aparentes (Kent).

Conviene mejor a individuos que desarrollan muy completamente su historia patogenética : HIPERSENSIBLE, DELGADO NO POR FALTA DE ALIMENTACIÓN, SINO DE ASIMILACIÓN (Nash).

El niño de silicea no es anormalmente gordo, pero tiene vientre grande, miembros delgados, cara desdichada, envejecida; no aumenta de peso, ni fuerzas, tarda en caminar; parece detenido en su desarrollo : Cabeza muy grande, transpira fácilmente, cuero cabelludo, cuello y cara; calc.

ost., transpira en cuero cabelludo solamente.

Niños escrofulosos con vientre grande y tobillos débiles, transpiran abundantemente toda la cabeza.

Constipación fácil característica : hace violentos y largos esfuerzos y consigue deposición incompleta que no tarda en volver a entrar casi completamente, como si su debilidad general afectase poder expulsivo de recto.

En otros casos, diarrea persistente especialmente durante dentición o calores; no tiene dos deposiciones iguales pero no hay que dejarse engañar por este solo síntoma y dar puls.

Este pequeño enfermo come bien, pero conserve o no su alimento la debilidad aumenta, la delgadez progresa y puede haber muerte por inanición.

Nervioso, movedizo, inquieto, agitado, hipersensible; inteligente, extremadamente sensible, moral y físicamente, se estremece al menor ruido; ansioso, tímido, propenso a ideas fijas, testarudo, obstinado.

El adulto delgado, débil, con músculos blandos, como su moral y sistema nervioso que están debilitados; deprimido, afectado por agotamiento con eretismo, irritable, débil, tímido, sumiso, dócil, se deja estar sin energía; el trabajo mental le es muy difícil; leer, hablar, pensar, la fatigan.

2) ESQUEMA COMPARATIVO ENTRE EL NIÑO DE calc. ost., calc. phosph., sílicea y sulphur : I. calc. ostrear.

1) CUERPO GORDO, HINCHADO; LEUCOFLEMÁTICO; OLOR AGRIO EN TODO EL CUERPO MUY DIFERENTE DEL OLOR FÉTIDO DE sulphur.

2) NIÑOS APÁTICOS.

3) PIEL PÁLIDA, BLANCA, COMO CRETA.

Tez clara, ojos azules, CABELLOS RUBIOS.

4) CABEZA GRANDE, cubierta de transpiración abundante, PERO SOBRE TODO EN CUERPO CABELLUDO.

5) VIENTRE GRANDE, DURO, HINCHADO, EN MEDIO DEL CUERPO DEMASIADO GORDO.

6) DESEO DE HUEVO; TOLERA MAL LA LECHE.

7) Deposiciones acuosas CON RESTOS DE ALIMENTOS NO DIGERIDOS.

II. calc. phosph. 1) Sujeto MAGRO, con cuerpo enflaquecido.

2) Niños HURANOS, comprenden mal.

3) Tez y ojos oscuros, MOROCHOS.

4) VIENTRE HUNDIDO Y BLANDO.

5) DESEO DE TOCINO Y JAMÓN.

6) DEPOSICIONES VERDES, viscosas, en chorros con muchos gases fétidos.

III. sílicea 1) Niño FLACO con miembros delgados.

2) Niños voluntariosos, obstinados, movedizos, agitados.

Hipersensibles.

3) CARA INFELIZ Y AVEJENTADA.

4) Cabeza grande, transpira abundantemente, TANTO DE CUERO CABELLUDO COMO DE CARA Y CUELLO.

5) VIENTRE GRANDE, se destaca en la delgadez del cuerpo.

6) FALTA DE APETITO Y GRAN SED.

7) CONSTIPACIÓN ESPECIAL : La deposición sale con mucha dificultad pero cuando comienza a ser expulsada, vuelve a entrar.

IV. sulphur 1) Niño de CUERPO FLACO, piel floja y arrugada, VIEJECITO, ASPECTO DE SUCIO, HUELE MAL.

2) Niños IRRITABLES Y GRUÑONES.

3) Cara pálida, AVEJENTADA, LABIOS MUY ROJOS, GRANATES como las OREJAS.

4) Cabeza GRANDE, TRANSPIRAN ABUNDANTEMENTE DURANTE EL SUEÑO.

5) VIENTRE GRANDE, llama la atención en medio del cuerpo flaco.

6) Aunque gran comilón, está delgado; BEBE MUCHO, DESEA DULCES.

A) VIENTRE HUNDIDO, BLANDO. Calcarea phosphorica Transpiración abundante de cabeza, sobre todo durante el sueño.

Enrojecimiento de orificios del cuerpo.

Cabeza (arriba) caliente y pies fríos.

1. NIÑO FLACO B) GRAN VIENTRE QUE LLAMA LA ATENCIÓN EN CUERPO DELGADO sulphur de lo cual está delgado. Sucio, maloliente; gran apetito a pesar

Gran sed, deseo de confituras; irritable, gruñón.

sílicea Sudor de toda la cabeza.

Gran sed; constipación especial.

Hipersensibilidad.

2. NIÑO GORDO C) VIENTRE GRANDE EN MEDIO DE CUERPO REGORDETE, blando como carácter; huele agrio.

Calc. ostrear.

Conviene a estados de malformación en niños cuyos fascículos nerviosos no han tenido crecimiento normal, estados de debilidad nerviosa sería en agotados por trabajo intelectual, tristeza, vida desordenada.

Indicado en supuraciones crónicas : tisis, bronquiectasia, gangrena pulmonar, en que el armazón del órgano está como roído por lesión, abscesos, ulceraciones, fistulas interminables, caries óseas, en caquéticos.

Influencia beneficiosa en arteriosclerosis al principio, en evolución de tumores muy duros : escirros, osteomas, etc. (Dr. Mouézy-Eon).

En caquexias en linfáticos o agotados por largas enfermedades, cuando esas caquexias se caracterizan por eretismo, fiebre lenta, agravada después de comer, constipación, esputos abundantes o vómitos a la mañana, cefalalgia obtusa, dolores erráticos muy vivos, piel terrosa, amarillenta, seca y lisa, *a veces cubierta de manchas ptiéricas, silic. es el más apropiado para restablecer la armonía de funciones, reconstruir tonicidad de trama orgánica, plasticidad de sangre, dirigir fuerzas nutritivas, activar vitalidad de sistema óseo y piel.

Es uno de los remedios esenciales en diatesis purulenta, sobre todo después de largas enfermedades y cuando hay eretismo interno y expansión con descomposición pirogénica de piel en tejido celular subcutáneo, abscesos de superficie. (Dr. Espanet).

3) FALTA DE VITALIDAD PARA RESISTIR INFLUENCIAS EXTERIORES : Parece haber falta de poder nervioso reaccional de vitalidad PARA RESISTIR las influencias deprimentes exteriores (Nash).

FALTA DE CALOR VITAL, TIENE SIEMPRE FRÍO, AUN HACIENDO EJERCICIO (Hering).

Muy sensible al aire frío, toma frío fácilmente; ESTA MEJOR AL CALOR que suple su falta de calor natural y le da temperatura que no puede darle su propia combustión.

4) Silicea Y LA SUPURACIÓN : Silicea puede ser un precioso recurso en la supuración.

Es útil en período más tardío que hep. sulf. calc., cuando la supuración no quiere cesar ni producirse cicatrización normal, como en abscesos fríos, etc.

Parece indicado en SUPURACIONES DE TIPO INDOLENTE NO NECESARIAMENTE MALIGNAS, PERO CON MAS O MENOS TENDENCIA A CRONICIDAD.

La constitución tiene gran importancia para la elección.

Si se elige juiciosamente es muy útil primero, actuando localmente y secundando la supuración, luego levantando el estado general más o menos afectado por larga supuración.

Comparar con calc. sulph.; la diferencia está en que silic. favorece la supuración, hace madurar el proceso y vacía el absceso; calc. sulph. favorece la detención y formación de brotes cicatriciales.

Modalidades

Lateralidad

Izquierda.

Agravación

a) POR FRÍO AL AIRE LIBRE, EN INVIERNO, DESTAPÁNDOSE A LA MAÑANA, ACOSTADO.

Frío, sus síntomas desarrollan particularmente en tiempo frío y húmedo y pueden mejorar en tiempo frío y seco (Kent).

b) Por humedad; a veces los síntomas aparecen después de un baño.

c) DURANTE REGLAS.

d) En luna nueva y durante luna llena.

Mejoría

a) POR CALOR, en verano, se envuelve la cabeza; se AGRAVA POR EXTREMOS DE CALOR Y FRÍO; fácilmente afectado por diferencia de temperatura aún de algunos grados; enferma por tener mucho calor, se acalora y transpira fácilmente a la menor elevación de temperatura y se resfría (Kent).

b) Siendo magnetizado. (phosph.).

Síntomas mentales

Produce sobre sistema nervioso tendencia de debilidad PARALÍTICA, que parece debida A NUTRICIÓN DEFECTUOSA DE NERVIOS Y CEREBRO.

Este estado paralítico va acompañado de constipación característica e hiperestesia sensorial, hipersensibilidad a estimulantes nerviosos.

Cerebro y médula no pueden soportar choque ni vibración común, superficie del cuerpo hipersensible a tacto e impresiones exteriores.

LA INDOLENCIA ES UNA CONTRAINDICACIÓN DE silic. EN ESTADOS NERVIOSOS; no se debe emplear en individuos flojos, sin nervios; exactamente lo contrario en trastornos de tejidos inferiores, la supuración, por ej., indolente.

Moral debilidad como todo el sistema nervioso en general.

Silic. es al espíritu humano lo mismo que el tallo de trigo.

Mirad el exterior liso, rígido, sólido, de un tallo de trigo y veréis con qué firmeza llevará la espiga; esta fuerza la debe a silic. acumulada poco a poco en sus tejidos para darle rigidez y resistencia necesarias.

Así pasa con la mente : cuando el individuo necesita silic., está en gran estado de debilidad, temor, impotencia y tiene conciencia de su impotencia (Kent).

TÍMIDO, ANSIOSO, PUSILÁNIME, CEREBRO FATIGADO, REFLEXIONA DIFÍCILMENTE, LE CUESTA FIJAR SU ATENCIÓN; DEBE SER ESTIMULADO PERO SE FATIGA FÁCILMENTE MORAL Y FÍSICAMENTE.

DESALENTADO, HURAÑO, TIENE ASCO POR LA VIDA.

Los escolares, se confunden al recitar sus lecciones porque no pueden concentrar su atención.

Debería reflexionar más pero son incapaces.

Un abogado en un pleito, un pastor u orador acostumbrado a hablaren público con confianza, seguridad, en plena posesión de su mente o palabra dirá que tiene aprensión de hablar ante un auditorio porque tiene conciencia de no poder hacerlo, de no poderse concentrar; tiene miedo de no poder arreglarse, su mente no quiere funcionar; está fatigado por el esfuerzo prolongado de trabajo mental asiduo.

Pero hace un esfuerzo de voluntad y decide vencer el temor, el propio dominio vuelve y puede hacer su discurso con soltura; la tarea se cumple rápida y correctamente.

El estado especial de silic. consiste EN TEMOR DE NO TENER ÉXITO, SI SE LE EXIGE UN ESFUERZO MENTAL O TRABAJO INTELECTUAL INUSITADO.

TEME NO ESTAR A LA ALTURA DE SU TAREA, FRACASAR, Y SIN EMBARGO CUANDO ESTÁ OBLIGADO A HACERLO, LO LOGRA CON ÉXITO.

He aquí otro ejemplo : un joven que terminó sus estudios, cerca de fin de curso, teme extremadamente el examen final y sin embargo lo aprueba, pero enseguida es presa de gran fatiga mental; no puede ejercer la profesión a la cual estaba destinado pues teme emprender cualquier cosa.

Lycop., está realmente embrutecido y su temor a emprender algo proviene de la comprensión de su incapacidad intelectual, que es real, mientras en silic.

es imaginaria.

Silic. no conviene a agotamiento nervioso, por surmenage por negocios, sino más bien al de estudiante, abogados, predicadores.

Un abogado dice : "no me he sentido bien desde el proceso X, que me exigió largo esfuerzo intelectual con insomnio".

Silic. volverá a poner en buena forma a tal cerebro.

Este miedo de fracasar en algo y que al final resulta bien, es el estado del principio de la moral del sujeto que necesita silic.; llega un momento en que no puede cumplir su trabajo con exactitud y por lo tanto puede necesitar silic.

(Kent).

NERVIOSO, IRRITABLE, MUY SENSIBLE A TODAS LAS IMPRESIONES, HIPERSENSIBLE AL RUIDO, ETC., CON ANSIEDAD, GRAN IRRITABILIDAD, NIÑOS VOLUNTARIOSOS, OBSTINADOS, HIPERSENSIBLES, AGITADOS, MOVEDIZOS.

Irritable, irascible, cuando está animado; cuando lo dejan tranquilo, tímido; trata de escapar a todo; niñas suaves, tímidas, lloronas.

El niño, gruñón, llora cuando le hablan.

Es el complemento natural y crónico de puls., por su gran parecido; es más profundo y extenso.

Silic. cura superimpresionabilidad en personas de nutrición insuficiente, no por calidad y cantidad, sino por falta de asimilación; son constipadas, propensas a neuralgias súbitas, erotismo, melancolía (Espanet).

Hipocondría religiosa; tristeza; irascibilidad; depresión (Kent).

Ideas fijas; ideas fijas de alfileres : les teme, los busca, los cuenta.

Estado mental particular marcado por tendencia a jugar durante horas con alfileres o agujas.

Sueño

Insomnio con congestión y calor en cabeza; INSOMNIO POR ORGASMOS SANGUÍNEOS; palpitaciones, pulso rápido, calor, comienza a transpirar en cuanto se duerme. (puls., conium).

Insomnio nocturno con sueño interrumpido por sueños lascivos o terroríficos.

Tufaradas de calor, borboteo de sangre, somnolencia de día y gran agotamiento; insomnio obstinado, a menudo sin ninguna afección orgánica (Espanet).

Frecuentes sobresaltos, sacudidas de miembros durante el sueño.

Habla dormido; tiene sueños angustiosos.

Salte de su lecho dormido; sonambulismo.

Inquietud nocturna con sueños lascivos o terribles, ansiedad nerviosa con movimientos congestivos de cabeza, latidos y borboteo de sangre y aunque los síntomas del sueño varían, a veces una de las contraindicaciones de silic., es el sueño apacible (Espanet).

Cabeza

Cuero cabelludo muy sensible y fácilmente doloroso.

Puede ser sede de prurito marcado o DE ERUPCIONES HÚMEDAS, eczemas, escamas.

Caída de cabello.

Erupción ofensiva en cuero cabelludo, particularmente en occipucio.

TRANSPIRACIÓN DE CABEZA EN NIÑOS, COMO SI HUBIERA TENIDO ENVOLTURAS CALIENTES; FONTANELAS ABIERTAS.

Puede ser muy útil cuando hay especies de nódulos generalmente de origen sífilítico bajo cuero cabelludo, entre piel y huesos del cráneo; y para tratamiento de ulceraciones fagedénicas sífilíticas de cuero cabelludo.

Hay numerosos síntomas cefalálgicos : DOLOR DE CABEZA CEREBRO ESPINAL, QUE COMIENZA EN NUCA Y ASCIENDE PROGRESIVAMENTE A CABEZA HASTA REGIÓN SUPRAORBITARIA DONDE SE FIJA.

Dolores de cabeza crónicos, con náuseas y aún vómitos.

Dolor de cabeza que comienza atrás, a la mañana o a medio día, con tendencia a ganar la frente, peor a la noche, agravado por ruido; MEJOR POR CALOR, neuralgia supraorbitaria mejorada por presión Y CALOR, con abundante transpiración de cabeza.

Dolor de cabeza de nuca a vértex, peor a la derecha, agravado por ruido, ejercicio, luz, y aliviado por calor : EN GENERAL MEJORA SU DOLOR ABRIGÁNDOSE LA CABEZA. (magn. mur., strontia).

Dolor de cabeza a través de nuca sobre todo a la derecha. (Parecido a sang.).

Sensación de peso en occipucio, como si fuera tirado hacia atrás por aflujos de sangre a la cabeza, como carb. veg. y sepia.

Dolor de cabeza una vez por semana (gels., lycop., sang., sulph.).

Dolor de cabeza latente presivo, CON SENSACIÓN DE FRÍO EN LA CABEZA Y NECESIDAD CONSTANTE DE ABRIGARLA; DOLOR de cabeza agravado al aire frío; psorin. usa gorro de piel aún en verano; mag. mur. está mejor con cabeza cubierta pero quiere estar al aire libre.

Silic. evita el aire frío; necesita abrigarse la cabeza, sobre todo la parte dolorosa que transpira abundantemente.

Dolor de cabeza agravado por esfuerzo mental, estudios prolongados, movimiento, alteración de paso, luz, agacharse, esfuerzos para evacuar, hablar, al aire frío, por tacto.

Dolor de cabeza en ayunas.

Dolor de cabeza con vértigo que coincide con existencia de pequeños nódulos bajo el cuero cabelludo, después de haber tenido hambre, por irritación abdominal o fatiga nerviosa.

Dolor de cabeza presivo de arriba a abajo con prurito intermitente en vulva.

Silic. es apto para curar jaqueca esencial en vértigo y náuseas o vómitos, sobre todo a la mañana; los dolores son desgarrantes por accesos, parecen salir de los ojos a cada tirón.

Puntadas, latidos, vértigo forman parte de ella y el movimiento de los ojos hacia arriba o abajo o el agacharse aumenta el vértigo y se acompañan a menudo con sudores en la frente (Espanet).

El dolor de cabeza de silic. se parece a spig., par. quad., picr. ac., coccul., gels., sang., etc. (Boericke), también act. rac.

Puede ser útil en apoplejía cerebral precedida por dolor profundo en región parietal derecha y pesadez, entumecimiento y dolor con calambres en brazos.

Vértigos que parecen ir, como la cefalea, de médula a cabeza; agravados al levantar la cabeza, mirar arriba (puls.); vértigo con tendencia a caer hacia adelante y hacia la izquierda, vértigo laberíntico (natr. salyc.).

Ojos

Silic. tiene numerosos e importantes síntomas en ojos.

Hinchazón roja y caliente de párpados, más marcada a la mañana y disminuyendo durante el día, con secreción espesa y abundante supuración de borde de párpados con enrojecimiento, sensación de ardor, escozor, inflamación, caída de pestañas.

Es buen remedio para orzuelos, y VÍAS LAGRIMALES, en que desarrolla muchos síntomas tipo, particularmente en bolsa lagrimal.

Inflamación con supuración de vías lagrimales, "ángulo interno del ojo" enfermo; hinchazón de conductos lagrimales; fistulas lagrimales (nat. mur., petrol.).

Las afecciones del ojo van acompañadas de FOTOFobia intensa; la luz, principalmente del día hace doler y provoca encandilamiento.

Trastornos de visión; las letras bailan ante los ojos al leer.

Dolores agudos a través de los ojos que están sensibles al tacto, sobre todo cerrados.

Excelente remedio, cuando los otros síntomas concuerdan, en iritis iridocoroiditis con pus en cámara anterior; en casos de perforación o úlcera de córnea, en abscesos de córnea después de traumatismo.

Oftalmias escrofulosas con inminencia de perforación de córnea, ulceraciones de córnea con hinchazón de bordes libres de párpados y casos muy graves de esa clase de oftalmias crónicas y a menudo indoloras (Espanet).

Oídos

Así como en trastornos del ojo, el nervio óptico es hipersensible a la luz, a menudo el nervio auditivo es hipersensible al ruido; hipersensibilidad al ruido.

Puede haber zumbidos, ruidos diversos asociados a diversas afecciones de estos órganos y aún sordera.

Silbidos como producidos por chorros de vapor; estruendo como el de un tren al pasar; que puede ser provocado por causa exterior o estado de nervios, pero en general es un principio de catarro seco de oído medio.

Útil en catarro de oído medio y trompa de Eustaquio; hay una fase de sordera que dura cierto tiempo, luego del oído vuelve después de un ruido seco provocado por escape de mucus acumulado en oído o trompa y que el enfermo describe como detonación; detonaciones súbitas en el oído o ruidos como lejanos, acompañado de vuelta del oído.

Estados catarrales de oído interno y trompa de Eustaquio con sensación súbita de obstrucción mejorada al bostezar o tragar (Kent).

Otorrea antigua, maloliente, espesa o grumosa.

Inflamación del oído medio, especialmente cuando hay supuración crónica.

Hinchazón inflamatoria de meato.

Otorrea con pus granuloso e icoroso con carie de células mastoideas.

Otitis supurada; carie de huesecillos.

Inflamación con supuración de oído después de un baño.

Eczema en pabellón de la oreja.

Tos espasmódica provocada al rascarse el conducto auditivo. (kali carb., mang.).

Cara

Pálida, cerosa; de aspecto fatigado la piel se agrieta fácilmente, particularmente en ala de nariz y labios que están agrietados; erupciones herpetiformes, acné, principalmente de mentón.

Puede haber sudor frío, pegajoso, maloliente en la frente.

Cuando hace un esfuerzo, aún ligero, TRANSPIRA PRONTO LA CARA, PARTE INFERIOR DEL CUERPO SECA O CASI; sólo un ejercicio violento provoca transpiración general; la transpiración de cara, cabeza y parte superior del cuerpo, es rasgo notable de silic.

Neuralgia facial con latidos, tirones, enrojecimiento de cara, peor en tiempo húmedo.

Ciertas neuralgias de cara, cabeza, ojos, dientes, oídos, necesitan silic.

Hay tirones, por sacudidas, dan puntadas desgarrantes; tocarlas agrava, en intervalos de paroxismos, hormigueos, prurito, debilidad; vista, oído, olfato exaltados al principio de la neuralgia o mientras dura; pierde a la vez agudeza y se embota; hay escalofríos y las extremidades están frías y por momentos, sudores parciales en pies, axilas; nariz seca, hay costras, excoriaciones en el interior; ojos lagrimosos, mucosa de boca irritada, pero piel generalmente lisa y pálida (Espanet).

Induración de tejido celular de cara por absceso de encías.

Carie y necrosis de huesos de cara con aberturas fistulosas.

Aparato digestivo

BOCA :

Síntomas marcados en labios.

Primero, LABIO SUPERIOR FRECUENTEMENTE HINCHADO como hep. sulf. calc.

De manera más general LABIOS AGRIETADOS, FISURADOS, SECOS, RESQUEBRAJADOS, ESCAMOSOS, particularmente, borde externo.

A lo largo del borde, contorno agrietado, costroso.

COMISURAS ULCERADAS, AGRIETADAS (amm. carb., aur. tryph., condurango, graph., nat. mur., nit. ac., hep. sulf. calc.).

Boca seca y puede haber sed viva.

Lengua revestida de capa marrón, tumefacta, excoriada, parece entumecida.

Un síntoma particular es : SENSACIÓN DE CABELLO SOBRE LA LENGUA, como all. sat., en que esta sensación es marcada sobre todo de noche y a la mañana; nat. mur.; nat. ph. : más marcada en la punta; kali bich. : en la base.

LOS DIENTES SE ARRUINAN POR ALTERACIÓN DEL ESMALTE, en sujetos con desmineralización de silic. marcada; la dentina contiene mucho silicato de calcio y la superficie del diente se hace rugosa, pierde su apariencia esmaltada y la carie poco a poco se instala; esto es más marcado a lo largo de la encía, en el cuello (Kent).

Los dientes duelen con tiempo húmedo y frío, dolor de muelas en tiempo lluvioso.

DIENTES AMARILLOS, se arruinan rápidamente y en cuello, se descarnan, la encía se retrae (Kent).

Violento dolor de muelas de noche, cuando ni calor ni frío alivian y después de haber tomado frío en los pies.

En GENERAL, LOS DOLORS DE DIENTES DE silic. MEJORAN EN HABITACIÓN CALIENTE Y POR BEBIDAS CALIENTES (Kent).

Dolor de dientes muy profundo en periosteo, en vaina fibrosa de raíces y formación de absceso; FÍSTULAS DENTARIAS; ABSCESES EN RAÍZ DE DIENTES.

PIORREA. (merc. sol.).

Encías sensibles al frío, al tacto; abscesos de encías; encías hinchadas y sensibles al frío.

El niño de silic., DENTICIÓN DIFÍCIL.

HINCHAZÓN E INDURACIÓN DE GLÁNDULAS SALIVARES, SOBRE TODO PAROTIDAS, se agrandan a cada resfrío y se hacen duras (bar. carb., calc., sulph.).

Puls. conviene más en inflamación aguda de parótida, silic. en formas crónicas, en casos en que la escrófula está en juego.

En estos viejos casos crónicos los síntomas están peor después de un baño, quiere calor, teme al frío, tiritas continuamente y en hipertrofia indurada de glándulas salivares y parótidas y ganglios de cuello.

Puede ser útil en inflamación aguda o reciente de esas glándulas, pero con modalidades contrarias; el enfermo se queja de tufaradas de calor, fiebre irregular, extremidades frías y parte superior del cuerpo caliente; transpiración marcada en cabeza y cuello; sensación de calor y sofocación en habitación caliente; en esto se parece a puls. : en sus manifestaciones crónicas tiene mucho calor, pero en sus enfermedades agudas es friolento.

Silic. y puls. tienen modalidades inversas en estados agudos y crónicos; puls.

en estados agudos es friolento y transpira (Kent).

FARINGE :

En resfríos que repiten sin cesar ANGINAS, AMIGDALITIS A REPETICIÓN, que bell.

u otros remedios han curado, pero que recomienzan siempre, silic. contienea menudo esta enfadosa tendencia; hay, en cierta manera, un catarro crónico de garganta que cada resfrío, cada enfriamiento despierta; silic. está al lado de nat. mur., para esos dolores de garganta inveterados.

ANGINAS PERIÓDICAS; enrojecimiento de mucosa faríngea; deglución difícil con dolores y pinchazos.

En AMIGDALITIS SUPURADA, cuando las amígdalas han evacuado su contenido purulento y sin embargo la cicatrización no se hace, hay que pensar en silic.

PARÁLISIS DE VELO DE PALADAR; los alimentos son expulsados por la nariz cuando trata de comer.

Al tragar se atora fácilmente.

ESTOMAGO :

FALTA DE APETITO Y GRAN SED.

Sin embargo, a veces hay gran hambre : la bulimia, especie de hambre canina que hace que se coma enormemente y a menudo, se relaciona con silic., sea esencial o sintomática, cuando los sujetos son secos, nerviosos, irritables, con mucha saliva, deposiciones fáciles o diarreicas y transpiración, sobre todo nocturna (Espanet).

AVERSIÓN MUY DECIDIDA POR ALIMENTOS CALIENTES, QUIERE COSAS FRÍAS; le agradan los

helados, agua helada y se siente bien cuando los tiene en el estómago; a veces le es completamente imposible beber caliente, los líquidos calientes provocan transpiración en cara y cabeza y tufaradas de calor (bar. carb.) (Kent).

Peró aunque tenga aversión marcada por alimentos y bebidas calientes y los desea fríos, en afecciones del pecho bebidas y platos fríos aumentan la tos hasta sofocación y aparición de esfuerzos violentos para vomitar; es generalmente cubierto por carb. veg., pero silic. también lo tiene (Kent).

ASO POR CARNE, como alum., arnica, calc., carb. veg., puls., sepia, etc.; pero si come carne, la prefiere fría cortada en tajadas (Kent).

Intolerancia característica por ESTIMULANTES ALCOHÓLICOS.

LA LECHE NO LE CONVIENE.

El niño vomita inmediatamente después de mamar; diarrea causada por leche; se puede comparar a silic. con aeth. cyn., nat. carb., etc.

"Repugnancia por alimentos, pronta saciedad, pérdida de apetito, testimonio de atonía de órganos digestivos.

El hambre extraordinaria de ciertos casos, traiciona la necesidad urgente de la economía de reparar sus fuerzas agotadas y darle los materiales alimenticios que le faltan" (Espanet).

Estómago a veces débil, perezoso; antiguos dispépticos que vomitan desde hace largo tiempo tienen aversión marcada por comidas calientes, no pueden digerir leche, no les gusta la carne, se encuentran bien con silic. cuando los otros síntomas mentales y físicos concuerdan (Kent).

Hipo, náuseas; eructos ruidosos, ácidos o con el gusto de los alimentos; pirosis.

Vómitos sobre todo después de alimentos calientes; vómitos después de beber (ars. alb., ver. alb.).

Vómitos acuosos con escalofríos, lengua cubierta de capa marrón; náuseas con vómitos de lo que ha bebido, peor a la mañana; el agua tiene mal gusto; vomita después de beber (Kent).

Puede curar gastralgias sea con pirosis, hipos y náuseas y vómitos viscosos; hay calor, pesadez, sensibilidad y sensación de constricción; constipación obstinada, gases, eructos, somnolencia, agotamiento frío en extremidades; pérdida de apetito; digestión lenta; laboriosa; a menudo bulimia pero con imposibilidad de satisfacer el apetito (Dr. Espanet).

Después de la comida sensación de plenitud y peso en el estómago.

Sensibilidad de hueco epigástrico; sensación dolorosa de contusión a la presión.

ABDOMEN :

Hígado grande e indurado; en abscesos de hígado, silic. es útil cuando los otros síntomas concuerdan.

Abdomen duro, tenso, sobre todo después de comer; flatulencia y borborismos.

Dolor de contusión en abdomen; cólicos, dolores cortantes alrededor del ombligo con necesidad de evacuar; sensación de constricción a través del vientre; no le gustan vestidos ajustados y se agrava después de comer y el rasgo saliente es mejoría por calor.

RECTO Y DEPOSICIONES :

Prurito, ardor en ano y recto.

Hemorroides muy dolorosas.

FISURAS DE ANO con espasmos de esfínter.

FÍSTULA ANAL.

Sujetos que son buen terreno para tuberculosis, tienen fácilmente abscesos en región del recto, abscesos que al vaciarse provocan trayecto fistuloso que no cura; y este estado parece suplir una localización pulmonar que no tarda en mostrarse si se curan brutalmente estas fistulas por intervención quirúrgica intempestiva o cualquier otro medio externo; silic., al contrario pondrá las cosas en orden, en profundidad, en un lapso de 1 a 5 años.

Transformará el terreno tuberculoso y la fistula que ya no será necesaria para drenaje curará : durante cierto tiempo el enfermo está bien, algunos años sobreviene tuberculosis pulmonar u otra y muere.

Caust., berb., calc. ost., calc. phosph., graph., sulph., pueden compararse con silic. que sigue bien a thuya (Kent).

EL RECTO PARECE PARALIZADO; HACE VIOLENTOS ESFUERZOS PARA EVACUAR.

LA DEPOSICIÓN SALE DESPUÉS DE MUCHAS DIFICULTADES, PERO CUANDO HA SALIDO EN PARTE, VUELVE A ENTRAR.

Gran constipación por incapacidad de recto para expulsar materia fecal.

Es raro que la deposición permanezca en ampolla rectal sin provocar necesidad de expulsarla, como en alumina; hay en silic. necesidad marcada de evacuar, hace muchos esfuerzos, pero el recto es incapaz de expulsar la materia, la deposición puede estar formada por bolitas o largos trozos blandos o duros, pero cualquiera sea la naturaleza de la materia que la constituye, va acompañada de esfuerzos violentos, con dolores y transpiración de cabeza; hace esfuerzos violentos y repetidos, la deposición sale un poco, el esfínter se agota, vuelve a entrar y abandona su tentativa infructuosa, desesperada; sólo puede aliviarse con ayuda de medio mecánico.

Los violentos esfuerzos que acompañan la necesidad de evacuar se encuentran en muchos remedios, pero sobre todo, con silic. en alum., alumen., china, nat. mur., nux v., nux mosch. (Kent).

CONSTIPACIÓN CONSTANTE ANTES Y DURANTE REGLAS, con irritación de esfínter (graph., kali carb., nat. mur., plumb.).

Kent señala que en ciertos sujetos con síntomas característicos silic.

ha provocado expulsión de tenia, como calc., y sulph.

Diarrea causada por leche o humedad, mucosa, disenteriforme, sanguinolenta, de olor cadavérico con necesidades frecuentes y tenesmo.

Aparato urinario

Micciones frecuentes; deseo continuo y tenesmo.

La orina sale gota a gota con viva irritación de uretra.

Incontinencia nocturna en niños.

Orina poco abundante, se enturbia rápidamente Y DEJA DEPOSITAR SEDIMENTO ROJO LADRILLO, ARENOSO.

Orina sanguinolenta, involuntaria, deja sedimento rojo o amarillo.

ORINA PURULENTE, SUPURACIÓN DE VÍAS URINARIAS; SUPURACIÓN DE RIÑONES.

PROSTATITIS SUPURADA.

Órganos genitales

MASCULINOS :

ERETISMO SEXUAL con pensamientos lascivos persistentes y espermatorea nocturna con afección paralítica.

O al contrario DEBILIDAD DESPUÉS DEL COITO QUE LO AGOTA; aunque tenga relaciones con frecuencia moderada, queda agotado, necesita de 10 a 15 días para reponerse (agaricus) (Kent).

TRANSPIRACIÓN A VECES ABUNDANTE DE ESCROTO.

Puede haber erupción eczema tosa en escroto que se extiende a superficie interna de muslos.

INFLAMACIÓN E INDURACIÓN CRÓNICA DE TESTÍCULOS con muchos dolores y sensación dolorosa como si estuvieran apretados, comprimidos.

HYDROCELE.

ABSCESOS CON FÍSTULA de periné o un testículo o de pene o próstata.

Gonorrea crónica con pus fétido y espeso.

Emisión de líquido prostático a cada deposición o micción.

FEMENINOS :

Como en el hombre, estado de deficiencia de funciones sexuales.

Comezón en vulva y vagina.

Silic. es un remedio de primer plano para abscesos fistulizados de vulva y vagina que dejan una vez cicatrizados nódulo fibroso que se siente bien bajo la piel, o cicatriza y segrega líquido maloliente, con olor a queso rancio.

En mujeres de tal tendencia, silic. los hace a menudo desaparecer (Kent).

Quistes serosos en vagina, desde el tamaño de una arveja hasta una naranja o a veces pequeños quistes del grosor de una avellana agrupados; rhodo. y silic. los han curado cuando no hay otros síntomas (Kent).

También lycop. y puls. actúan bien en estos casos.

Reglas ADELANTADAS, muy abundantes, o demasiado débiles y a veces AMENORREA.

CONSTIPACIÓN DURANTE REGLAS; o sensación de ardor de vagina, con erupción en cara interna de muslos, hacia vulva.

SECRECIÓN DE SANGRE ENTRE PERIODOS MENSTRUALES, PIERDE fácilmente sangre por útero; sobreviene hemorragia uterina antes de reglas por agitación, sobre todo en nodrizas : SECRECIÓN DE SANGRE POR VAGINA MIENTRAS CRÍA; cuando el niño mama, la secreción comienza; calc. ost. : hemorragias parecidas durante lactancia pero no especialmente cuando el niño mama (Kent).

Por secreción de sangre en períodos intermenstruales comparar con amb. gris., bovista, calc. carb., hamam., phosph., sabina, etc.

Muy útil en cura de ciertos casos de hidrosalpinx, piosalpinx.

Ciertas mujeres tienen en región ovárica, de un lado o del otro del útero, un pequeño tumor que crece hasta que súbitamente tienen por útero y vulva abundante secreción de líquido acuoso, sanguinolento, purulento y el pequeño tumor desaparece, para llenarse de nuevo al cabo de cierto tiempo y volverá a desaparecer de la misma manera (Kent).

Leucorrea abundante, acre, ardiente, lechosa (calc. carb., sepia, puls.) precedida por dolores cortantes alrededor de ombligo, sobre todo abundante durante micción o después de comida agria; puede coexistir con cáncer de útero (Kent).

Pezones muy sensibles, fácilmente ulcerados, hundidos.

Masas duras en senos (conium).

Amenaza de absceso de seno; si es dado a tiempo, hará abortar el absceso; si la supuración es inevitable; es útil; puede haber dolor, sensación de pesadez y latidos en seno enfermo; silic. los calmará, apresurará la abertura del absceso y traerá cicatrización rápida (Kent).

Ulceraciones fistulosas de senos.

Útil en casos de esterilidad en mujeres que tienen tendencia a abortar cuyos órganos son muy débiles para cumplir sus funciones normales (Kent).

Aparato respiratorio

NARIZ :

Catarro nasal, con, en mucosas, ulceraciones que segregan líquido fluente, excoriante : o catarro seco, con sequedad molesta de nariz.

Proceso catarral que se extiende hacia abajo, a rino farinx e invade trompa de Eustaquio donde produce cosquilleo, comezón intolerable.

Ozena con secreción fétida, ofensiva, cuando la afección tiene origen en tejido conjuntivo submucoso o periosteo.

Carie de huesos de nariz.

Costras secas en nariz con hemorragia nasal cuando las quita.

Epistaxis abundantes.

Coriza alternativamente fluente, seco, muy tenaz; estornudos a la mañana.

Secreción nasal sanguinolenta, en niños (calc. sulph.) (Kent).

Comezón y enrojecimiento de punta de nariz.

LARINGE :

Ronquera, crudeza, sequedad de laringe, tos con cosquilleo que parece venir de fosa supraesternal; sensación como si tuviera un cabello en garganta, laringe o tráquea; la tos es excitada por bebidas frías (rhus tox.), por la menor palabra (phosph., rumex, amb. gris.), peor de noche acostado (rumex, phosph., lycop.); a veces termina en vómito de mucus.

Tos seca, agotadora, con ronquera, con amenaza de tuberculosis laríngea; voz quebrada, de timbre especial característico, consecuencia de espesamiento de mucosa laríngea.

BRONQUIOS Y PULMONES :

Tendencia crónica a resfriados localizados en pecho donde provocan síntomas asmáticos.

Conviene a primer grado de tisis, cuando el pulmón no está afectado y los signos premonitorios se manifiestan en individuos de constitución característica.

Útil afecciones pulmonares en talladores de piedras en cuyas vías respiratorias partículas de piedra provocan irritación crónica; provoca supuración alrededor de estos pedacitos de piedra y son expulsados con la expectoración (Kent).

Disnea con imposibilidad para hacer inspiraciones profundas.

Útil en casos de antiguos catarros de vías respiratorias inferiores, cuando la respiración se hace asmática, sofocante al menor esfuerzo; esto pasa porque estando acalorado se expone a corriente de aire o toma frío después del baño; asma con grandes rales húmedos, el pecho parece lleno de mucosidades, parece no poder respirar; muy útil en casos de asma en antiguos "sicóticos" o en niños de padres "sicóticos", en estos casos, comparar con nat. sulph.; tales sujetos son débiles postrados, de tez pálida cerosa y muy sedientos (Kent).

Útil en asma nerviosa esencial; con tos seca y espasmódica; opresión que impide estar acostado y agacharse; constricción de garganta y latidos bajo el esternón: accesos a toda hora pero sobre todo después de acostarse; respiración a veces corta y sibilante de noche, aunque no haya accesos de asma.

Útil cuando tal afección, después de duración más o menos larga, ha modificadola mucosa brónquica; el asma se hace húmeda y toma forma de catarro sofocante; provoca vómitos y expectoración abundante y a menudo purulenta (Espanet).

Útil EN ABSCESOS DE PULMÓN, NEUMONÍA TUBERCULOSIS QUE HAN LLEGADO A ESTADOS DE SUPURACIÓN, (phell. aquat.); COPIOSA EXPECTORACIÓN DE ESPUTOS PURULENTOS, ESPESOS, VERDE AMARILLO, CON FIEBRE HÉCTICA, TRANSPIRACIÓN NOCTURNA ABUNDANTE y gran debilidad.

Tos con expectoración abundante, vómitos viscosos a la mañana, en medio del acceso de tox, disnea, esputos de sangre y sudores nocturnos la indican en tisis (Espanet).

Expectoración abundante, purulenta, FÉTIDA, a menudo sólo de día; viscosa, lechosa; a veces mezclada con un poco de sangre.

Bronquitis crónica; inflamación de pulmones con supuración.

Conviene a casos avanzados de neumonía o en complicaciones crónicas después de neumonía; neumonía de convalecencia lenta, prolongada (lycop., sulph., phosph., calc. ost.).

Tufaradas de calor en cara de día como sulph., sepia, lach., lycop., y rales en pecho como ant. tart. (Kent).

Broncorrea en viejos con expectoración fétida (bals. peru.).

Hemoptisis de sangre granate.

Pleurodinia con dolores lancinantes, agudos en costados del pecho; imposibilidad de acostarse del lado doloroso (kali carb., etc.).

Espalda y extremidades

Actúa sobre la médula, causando debilidad general de todo lo que depende de este centro nervioso.

IRRITABILIDAD DE MEDULA y sensibilidad de columna vertebral con numerosos dolores reflejos; TEMBLOR DE MIEMBROS CON SÍNTOMAS PARETICOS.

IRRITACIÓN ESPINAL DESPUÉS DE TRAUMATISMO DE COLUMNA VERTEBRAL.

Rigidez de cuello por irritación espinal; rigidez extendida a músculos de canales vertebrales.

Región lumbar dolorosa como si hubiera sido golpeada.

Dolor hacia el coxis con calambres como cuando ha estado mucho tiempo sentado.

Tabes (alumina, ruta).

Debilidad de espina dorsal; muy sensible a corriente de aire en la espalda.

CARIE DE VÉRTEBRAS; MAL DE POTT.

Debilidad paralítica de miembros superiores.

Debilidad paralítica de antebrazo.

TEMBLOR DE MANOS AL USARLAS.

Entumecimiento de manos, de noche.

Calambres en las manos al escribir. (magn. ph., gels., sulph. ac., arg. met., caust., etc.).

Dedos como entumecidos, con pérdida de fuerza.

Dolores picantes, tirones en punta de dedos, con pérdida de fuerza o entumecimiento.

Extremidad de dedos fisurada, agrietada.

Uñas rugosas, grises, sucias, quebradizas, deformadas, CON MANCHAS BLANCAS.

Panadizos.

MANOS HÚMEDAS SIEMPRE Y A VECES TRANSPIRAN ABUNDANTEMENTE.

Dolores tironeantes en caderas y muslos.

Dolor de rodillas como si estuvieran fuertemente apretadas por un lazo.

Calambres en pantorrillas; tensión y contracción de pantorrillas.

Debilidad paralítica de piernas.

Osteítis de tibia.

PIES FRÍOS COMO HIELO Y SIN EMBARGO CUBIERTOS DE SUDOR; SUDOR DE PIES

OFENSIVO (baryta, graph., lycop., nit. ac., psorin., sanic., sepia), FÁCILMENTE SUPRIMIDO SI TIENE FRÍO EN ESTA REGIÓN; TRANSPIRACIÓN HABITUAL DE PIES Y CUYA SUPRESIÓN TRAE TRASTORNOS DE SALUD; hay que remediar esta supresión y restaurar esos sudores con medicación apropiada, so no sobrevendrán accidentes más o menos serios : silic. es buen remedio para conseguirlo cuando las características generales lo indican y hace desaparecer esta tendencia molesta (Nash), a menudo este sudor va acompañado de excoriación entre dedos grandes.

Dolores agudos que atraviesan los pies.

Sensibilidad dolorosa de planta de pies (ant. crud., ruta, etc.).

UÑAS ENCARNADAS; cuando silic. es insuficiente graph. le sigue bien.

Callos en pies (ant. crud., graph., etc.) (Kent).

Cuando se duerme sobre cualquier parte del cuerpo, ésta se entumece.

Epilepsia en ataques particularmente nocturnos que parte del plexosolar para subir a estómago y pecho.

Cura ciertas afecciones histéricas epileptoides y paralíticas relacionadas, con excesos eróticos, trabajos forzados de gabinete, neuralgias obstinadas, jaquecas.

Las convulsiones son calambroides y afectan músculos de relación; la parálisis incompleta y recae más sobre sensibilidad; va acompañada de atrofia (Espanet).

Piel

Sensibilidad dolorosa de piel, que es fina, malsana con TENDENCIA A SUPURACIÓN; la menor herida tiende a supurar (hep., sulph. calc., borax, graph., merc., etc.).

Las afecciones cutáneas mejor curadas o ventajosamente modificadas por silic.

son : erupciones papiliformes, psoriformes, impetiginosas y pitiriásicas; pielseca, lisa, pero con placas de pitiriásis que sirven a menudo de afección más avanzada.

Los jugos nutritivos faltan, diríamos, en la piel para reparar, mantener sutejido y la plasticidad disminuye al punto que los cabellos caen y el cuero cabelludo se cubre de capa de películas furfuráceas.

Este es uno de los caracteres de silic., lo mismo que ciertos enrojecimientos en piel de nariz y algunas articulaciones.

Estos intertrigos, enrojecimientos, esta alopecia, películas furfuráceas, son frecuentemente síntoma de astenia en convalecientes con otros síntomas característicos (Espanet).

ABSCESOS QUE SE VACÍAN MAL Y TIENE TENDENCIA A FISTULIZACIÓN; panadizos, forúnculos, viejas heridas fistulosas.

De todos los remedios de la MATERIA MEDICA, ninguna es más apta que silic.

para corregir la disposición viciosa de la úlceras más malignas, para cambiar una supuración fétida en pus de buena naturaleza, prevenir caries subyacentes : úlceras escrofulosas, saniosas, abscesos en madriguera con comunicaciones fistulosas y pus de mala índole, úlceras fungosas y rebeldes, úlceras callosas, herpéticas, varicosas, corrosivas y sobre todo sicóticas, que suceden a excrecencia varicosa de fondo grisáceo y bordes duros.

Como calc. ost., y los medicamentos que actúan sobre nutrición y jugos nutritivos que corresponden a erosiones de tejidos y exuberancias vegetativas, silic. tiene acción favorable en tales úlceras en grietas y ulceraciones largas y profundas, estrechas, como ciertas rasgaduras de pezón y otras partes de piel fina alterada por afección herpética y contra producciones verrugosas o sicóticas; en tales casos, difiere de thuya, lycop., y nitr. ac. en que concierne a granos sicóticos, tensos, lustrados, lancinantes, duros, dispuestos a degenerar o que comienzan a hacerlo.

Uno de los caracteres ordinarios de esas ulceraciones, de esos orificios fistulosos, es tener bordes callosos, indurados o reposar en base indurada (Espanet).

Hipertrofia ganglionar con tendencia a supuración.

Muchas enfermedades de silic. están asociadas a ganglios indurados pero sobre todo en cuello, ganglios cervicales, glándulas salivares y sobre todo parótidas; a cada resfrío las parótidas se hipertrofian e induran. (calc. carb., barb. carb., sulph.) (Kent).

SUDOR OFENSIVO EN PIES, AXILAS, MANOS, COMIENZA A TRANSPIRAR EN CUANTO SE DUERME (puls., conium) (Kent).

Fiebre

Constantes escalofríos, aún haciendo ejercicio o en habitación caliente, escalofríos en todo el cuerpo.

Violento calor general con sed intensa a la tarde, y noche.

Sudores abundantes de noche, sobre todo hacia la mañana, con olor irritante.

Pulso pequeño, rápido, frecuentemente irregular.

En fiebres hécticas se parece mucho a phosph.

Enfermo friolento; con frecuentes ataques de calor que duran poco; fiebre caliente sin escalofrío de día y sudores nocturnos.

En general, la menor caminata lo hace transpirar y a la mañana se declara transpiración que debilita mucho.

Hay abscesos, focos de supuración, obstrucciones, flujos mucosos que agotan y mantienen la fiebre a menudo con reabsorción purulenta.

Enrojecimiento de mejillas, como manchas, con calor ardiente, sensación ardiente en punta de dedos y al atardecer gran ardor de pies; pero habitualmente tiene frío en las extremidades.

Edemas de pies frecuentes, como las palpitaciones, opresión, palidez, adelgazamiento y debilidad general, excepto en paroxismos de fiebre, en que goza de cierta energía física y moral (Espanet).

Indicaciones muy marcadas en niños y jóvenes en estado de crecimiento enfermizo, con fiebre, dolores violentos en articulaciones, entumecimiento de miembros, borboteo de sangre o latidos arteriales.

Útil en fiebre de dentición prolongada en niños que enflaquecen mucho (Espanet).

Relaciones

Antídotos

Camph.; merc. que no le sigue bien; fluor. ac.; antidota el abuso de silic. en afecciones óseas. hep. sulph. calc.

Complementarios

Thuya ; afecciones nerviosas y malos efectos de vacuna; sanic.; puls. : es el crónico de este último; corresponde a formas crónicas que el primero cura en estado agudo; puls. influye en terrenos que contienen silic. en sus partes constituyentes.

Las aguas de Barèges, en los Pirineos, contienen gran cantidad de silic. y son elegidas empíricamente como muy útiles en muchos casos en que silic. está homeopáticamente indicada. Moleschott escribe en "Kristanf des leches" que las cenizas de equisetum contienen mucha silic., la cura de ciertos trastornos de vejiga, atribuidas a este remedio, se explican probablemente por el hecho de que contiene mucha silic. Silic. sigue muy bien a bell., puls., rhus tox., merc., en afecciones de esfera sanguínea; a spig., puls., merc., phosph., en afecciones de estera nutritiva y plástica. Ars. alb., carb. veg., sulph., sepia, calc. ost., lycop. completan la buena acción de silic. (Espanet).

SPIGELIA ANTHELMIA

O spigelia anthelmintica, planta herbácea anual; de la familia de las Logoniáceas, crece en América del Norte, especialmente en Carolina del Norte.

El primero en estudiarla fue un botánico belga, Adrián von der Spiegel (latinizado en Spigelius) de donde deriva su nombre.

Fresca, tiene olor fétido que, en ambiente cerrado puede causar una especie de narcotismo; y por estas cualidades y sus propiedades tóxicas se le ha dado el nombre de Brinvillier, por la marquesa de Brinvillier, célebre envenenadora de la época de Luis XIV.

Las dinamizaciones homeopáticas se preparan partiendo de una tintura madre obtenida de la planta fresca o de una trituración hecha con toda la planta seca y pulverizada.; en este caso, las tres primeras dinamizaciones se hacen por trituración hahnemanniana y después por diluciones sucesivas habituales.

Acción general del medicamento

Actúa principalmente sobre SISTEMA NERVIOSO que, bajo su influencia, tiende a astenia alojada de la vez sobre sistema cerebro-espinal y simpático.

Interesa más particularmente NERVIOS SENSITIVOS, entre ellos, regiones cervicales y torácicas, que presentan DOLORES AGUDOS, LANCINANTES, intolerables, que constituyen sus principales características.

Bajo su influencia, las SECRECIONES INTESTINALES sufren modificaciones que las hacen aptas para mantener vermes intestinales, lombrices particularmente, e impropias para la buena elaboración del bolo alimenticio.

Características

1) CONSTITUCIÓN Y TEMPERAMENTO : Especialmente indicado en anémicos de larga data, o deprimidos por mal estado de salud, cuyos trastornos parecen localizados en los nervios donde desarrollan estados neurálgicos muy dolorosos, tiene en general, pelo rubio, son pálidos y delgados, agitados, inquietos, no pueden dominarse, tiene palpitaciones, pulso irregular; al levantarse vértigos, aturdimiento y sus dolores se manifiestan principalmente en ese momento.

2) DOLORES NEURÁLGICOS LANCINANTES, ARDIENTES, DESGARRANTES, en cualquier nervio del cuerpo, pero más marcados en CARA, CUELLO, HOMBRO, a veces con sensación como si la región atacada fuera pinchada con agujas al rojo; se agravan por movimiento, hasta el simple movimiento de ojos o inspiración (bryon., kalmia, nat. mur., act. rac.) por ruido (bell.), por el menor contacto (china), por frío, humedad, lluvia; cuando se localizan en el ojo, mejoran por frío y por en cuello u hombro.

Dolores lancinantes, desgarrantes en extremidades, como si allí tuviera un alambre al rojo, a veces se agravan al acostarse, pero generalmente mejoran estando tranquilo; se agravan por luz, comiendo, moviéndose, por sacudidas; subir o descender escaleras, pasear en coche que sacude al enfermo lo hace insoportable.

3) CONTRACCIONES CARDIACAS TAN VIOLENTAS QUE SE PUEDEN VER LOS LATIDOS DEL CORAZÓN A TRAVÉS DE LA ROPA; SACUDEN SU CUERPO Y EL RUIDO DE SU RITMO SE OYE A DISTANCIA.

Modalidades

Agravación

a) A LA MAÑANA : muchos de sus síntomas se manifiestan a la mañana; a la mañana fatigado y lleno de dolores desgarrantes.

b) POR CALOR : LOS DOLORES DE CABEZA SE AGRAVAN por calor; el frío los mejora; cuando se localizan en otra región, el calor mejora los dolores.

Los síntomas de cabeza y estómago de phosph. mejoran por frío.

En ars. alb. los síntomas de cabeza mejoran lavándola con agua fría, pero el enfermo es sensible al frío y quiere calor para apaciguar sus otros síntomas.

c) CON LA SALIDA DEL SOL Y MEJORA A MEDIDA QUE DECRECE (nat. mur., tabac., nat. carb., sang., glonoin., kal.).

d) POR TIEMPO FRÍO, HÚMEDO, LLUVIOSOS sobre todo.

e) Por movimiento.

f) Por ruido, a un contacto ligero.

Mejoría

a) Permaneciendo tranquilo.

b) Por calor (dolores del cuerpo).

c) Por frío (dolores de cabeza).

d) Acostándose con la cabeza levantada o sobre la derecha.

Debe ser más experimentado pues sus síntomas mentales no son bien conocidos.

Estado de temor, angustia, ansiedad, como la mayoría de individuos en estado de neuralgia casi constante, cuyo sistema nervioso está muy debilitado.

Fácilmente irritable, memoria débil, aversión por trabajo; inquieto, agitado, movido, preocupado por el porvenir, sombrío.

A veces aparece el síntoma siguiente ; temor por objetos que pinchan, por ej., alfileres.

Cabeza

DOLORES DE CABEZA GENERALMENTE DE UN SOLO LADO; a menudo **COMIENZAN EN OCCIPUCIO** y se extienden hacia adelante por la coronilla, **SE FIJAN ARRIBA DEL OJO IZQUIERDO** (ojo derecho : sang. y silic.); **SE AGRAVAN POR EL MENOR RUIDO Y MAS LIGERO MOVIMIENTO, LA MENOR SACUDIDA;** **AUMENTAN O COMIENZAN A LA SALIDA DEL SOL PARA DISMINUIR O DESAPARECER CUANDO SE PONE;** **EL OJO DEL LADO AFECTADO DEJA CORRER LAGRIMAS LÍMPIDAS** (chel. maj.) : lado derecho con lágrimas.

DOLOR COMO SI TUVIERA UNA VENDA FUERTEMENTE APRETADA ALREDEDOR DE LA CABEZA (cactus, gels., carbol. ac.).

Pulsaciones y puntadas en cabeza, a veces mejoradas acostándose con la cabeza levantada y agravadas al agacharse, moverse, por ruido.

A veces los dolores mejoran lavándose con agua fría, particularmente si se localizan en el ojo, pero enseguida empeoran.

Con estos dolores de cabeza neurálgicos, cuello y hombros rígidos porque no puede moverlos por el dolor; permanece sentado, inmóvil, como anquilosado, el ruido, la luz, agravan; hasta la vista de personas que se mueven a su alrededor y a las que quiere seguir con los ojos agrava.

Dolores picantes, ardientes, desgarrantes, en el cerebro, o que siente en el cerebro, pero localizados probablemente en nervios de cuero cabelludo.

Dolor violento en región de parietal izquierdo, agravado por moverse, caminar, dar un paso en falso; al atardecer sensación de presión violenta de adentro a afuera de la frente, agravada al agacharse, al apretar con la mano; dolor de tensión, desgarrante, en frente, particularmente protuberancia frontal que se extiende a región supraorbitaria.

Dolor de gran intensidad, taladrante, desgarrante, en occipucio, en lado izquierdo de cabeza y frente, agravado por movimiento, ruido, hablar o hasta por sólo abrir la boca; mejora acostado.

Dolor presivo en lado derecho de la frente, sobre el ojo derecho, a la mañana cuando despierta, pero peor después de levantarse; el dolor se siente profundamente, o influenciado por la presión, muy agudo cuando mueve la cabeza, o la vuelve repentinamente, con sensación como si el cerebro se despegara; agravado a cada sacudida, a cada paso, por el esfuerzo al evacuar.

Al mover los músculos de la cara sensación como si la cabeza fuera a estallar.

Dolor neurálgico alrededor y en el ojo izquierdo en tiempo frío, húmedo, lluvioso..

Hiperestesia de ramales del quinto par.

Menos hiperestesia al principio del dolor, pero aumenta a medida que el ojo se congestiona.

Dolor a veces tan violento que provoca postración completa con sudor frío y vómitos.

Hep. sulf. es tan sensible al dolor que se siente mal, se desvanece.

Chamom. : siente el dolor con tal intensidad que cede a ataques de cólera, frenesí violento, extrema irritabilidad.

Spig. : sufre tan intensamente los dolores que le provocan hinchazón, enrojecimiento e hiperestesia en la región (Kent).

Ojos

Neuralgia ciliar cuyos dolores tienen las mismas características que los dolores de cabeza; son como puñaladas y se extienden a occipucio, o como en act. rac. : presivos de adentro a afuera, como si los ojos fueran demasiado grandes para las órbitas (comocladia) (Nash).

Neuralgia ciliar con dolores que irradian alrededor del ojo y sensación de frío en el ojo (thuya).

Agravación cuando piensa en ellos.

Agravación presionando sobre el ojo fuertemente; a veces una presión suave y prolongada alivia, pero el menor movimiento de la mano que presiona agrava; **REGIÓN ABOTAGADA E INFLAMADA, OJOS ROJOS Y CONGESTIONADOS** (Kent).

No puede mirar derecho hacia adelante, pues tiene vértigos aunque no sufra al mirar de arriba a abajo.

Trastornos de acomodación; es difícil encontrar cristales que corrijan su vista de manera constante (Kent).

Afecta particularmente la **ESCLERÓTICA** y si la esclerótica es atacada por oftalmía reumática spig. cura de la manera más satisfactoria (Hughes).

Cara

NEURALGIA FACIAL CON DOLORES VIOLENTOS PICANTES Y ARDIENTES; PIEL ABOTAGADA Y DOLORIDA EN LA REGIÓN DOLOROSA; LOCALIZADA PARTICULARMENTE A LA IZQUIERDA.

GRAN ESTADO DE ERETISMO NERVIOSO, EXCITACIÓN E INTOLERANCIA A DOLOR.

Se puede comparar con : acon., ars. alb., coloc., colch., china, chamom., platina, puls., phosph., mezer., verbasum, thuya, etc.

Las principales indicaciones de los grandes remedios de la neuralgiafacial son : Acon : Neuralgia facial PARTICULARMENTE IZQUIERDA, dolores agudos, desgarrantes, intolerables.

CON HORMIGUEO; neuralgia a frigore, por exposición a viento frío y seco, congestiva, con dolores intolerables, cortantes, violentos, ardientes que llevan A LA DESESPERACIÓN, con SENSACIÓN DE HORMIGUEO, peor de noche, HACIA MEDIANOCHE; cara roja, hinchada, congestionada, AGITACIÓN característica.

Bell : Neuralgia con violentos DOLORS LATENTES, desgarrantes, más marcados a la derecha, agravados o despertados por el menor contacto, la menor sacudida, el menor movimiento; con mucho CALOR Y ENROJECIMIENTO DE CARA, latido de carótidas; después de EXPOSICIÓN A FRÍO; rigidez de nuca y estremecimientos convulsivos de músculos de cara.

China : Neuralgia facial con violentos dolores lancinantes en mejillas, mandíbula inferior, región supraorbitaria; EL AIRE FRÍO o UN SIMPLE ROCE SUPERFICIAL agravan en extremo; dolores típicos por su reaparición periódica y es muy indicado si hay antecedentes maláricos.

Comparar con cedron : neuralgia supraorbitaria con ataques con regularidad de reloj; casi siempre hay antecedentes maláricos.

Caust. : Neuralgia con dolores tensivos, pulsátiles, en huesos de cara y sobre todo pómulos, CON UNA ESPECIE DE PARÁLISIS DE MÚSCULOS FACIALES, o dolores tractivos de mandíbulas que impiden abrir la boca.

Sigue bien a acon.

Colocynt. : Neuralgia con dolores desgarrantes, lancinantes, especialmente a la izquierda de la cara, que se propagan hasta sien, cabeza, nariz, oreja, dientes, con HINCHAZÓN DE CARA DEL LADO DOLOROSO, aliviados al principio por presión; AGRAVACIÓN AL MENOR CONTACTO, etc.

Colch. : Neuralgia principalmente IZQUIERDA de cara, hasta el oído con HORMIGUEO de piel como si allí estuviera helada; mejilla del lado enfermo roja, hinchada, transpira; MUCHO ERETISMO NERVIOSO con los dolores que parecen insupportables, pero sin la AGITACIÓN TAN PARTICULAR DE acon.

Cham. : Neuralgia facial INTOLERABLE con dolores insupportables, desgarrantes, lancinantes, tractivos, pulsátiles, agravados por calor, CON ESTADO NERVIOSO CARACTERÍSTICO.

Phosph. : Violenta neuralgia de cara en mandíbulas y sienes, con sensación de calor, congestión de mejilla que está hinchada; AGRAVADO CUANDO HABLA, COME, POR TODO MOVIMIENTO DE MÚSCULOS DE CARA.

Platina : Neuralgia facial con dolores formicantes y SENSACIÓN DE FRÍO, ENTORPECIMIENTO, del lado afectado, o dolores calambroides y presión tensiva en pómulo; agravación o renovación de dolores al atardecer y durante el descanso; DOLORS QUE APARECEN GRADUALMENTE.

Puls. : Neuralgia de trigémico, comienza en región temporal derecha, con LAGRIMEO ABUNDANTE DEL MISMO LADO; con escalofríos; más marcada o comienza en medio de la noche.

Mezer. : Neuralgia facial con sensación de presión calambroide y aturdidora en huesos de cara, a veces de un solo lado y que se extiende a ojo, temporal, oído, dientes, cuello, hombro; a menudo ligada a supresión desafortunada de erupción o mercurialización profunda.

Nux vom. : Neuralgia facial con dolores desgarrantes que se extienden a interior de oído, con ENROJECIMIENTO Y A VECES HINCHAZÓN DE MEJILLA Y ESPASMOS MUSCULARES; AGRAVACIÓN POR TRABAJO INTELECTUAL, USO DE CAFÉ O VINO.

Merc. : Neuralgia con dolores desgarrantes o lancinantes, que afecta todo un lado de cabeza, desde temporales a dientes.

AGRAVADOS SOBRE TODO DE NOCHE AL CALOR DE LA CAMA, con SALIVACIÓN, LAGRIMEO, SUDOR en cara o cabeza, insomnio.

Lycop. : Dolores neurálgicos en la cara, EMPIEZAN POR SENSACIÓN DE FRÍO, principalmente a la derecha, con AGRAVACIÓN AL ATARDECER O LA NOCHE.

Lach. : Neuralgia facial principalmente izquierda con dolores profundos en huesos y SENSIBILIDAD EXQUISITA DE PIEL al tacto; AFLUJOS DE CALOR EN MEJILLA dolorosa.

Verbas. : Neuralgia facial principalmente izquierda, con lagrimeo, coriza y SENSACIÓN COMO SI LAS PARTES DOLOROSAS FUERAN APLASTADAS, ROÍDAS, POR PINZAS.

Thuya : Neuralgia con dolores calambroides, lancinantes, de gran intensidad en pómulo, maxilar superior y dientes, a lo largo de ramales supraorbitarios; SENSACIÓN DE FRÍO INTERIOR; A CADA EXASPERACIÓN DEL DOLOR, CARA SÚBITAMENTE PÚRPURA; movimientos convulsivos de labio superior (TIC DOLOROSO).

Agaric. : Neuralgia facial con DOLORS PARECIDOS A PINCHAZOS CON AGUJAS DE HIELO EN MEJILLAS E IRRITANDO EL NERVIO : dolores lancinantes, agudos, como provocados por astilla de madera.

Ars. alb. : Neuralgia con dolores extremadamente ardientes, aliviados por calor.

Staphis. : Neuralgia con dolores presivos pusátiles, desde dientes hasta ojos; o dolores lancinantes, ardientes, tractivos, incisivos o desgarrantes, con SENSACIÓN DE HINCHAZÓN DEL LADO AFECTADO, LLANTO ESPASMÓDICO, MANOS FRÍAS Y SUDOR FRÍO EN CARA.

APARATO DIGESTIVO

BOCA :

Dolor de muelas desgarrante, peor por frío y después de comer.

Mal olor en la boca.

INTESTINOS :

Helmintiasis con estrabismo, movimientos sacudidos en ciertos músculos de cara, gran palidez de cara y ojeras azuladas; debilidad, abatimiento, náuseas y cólicos alrededor de ombligo (Dewey).

Aparato circulatorio

GRAN VIOLENCIA DE LATIDOS DE CORAZÓN que se pueden oír y ver a distancia y a veces sacuden el cuerpo.

DOLORES AGUDOS, PICANTES, PUNZANTES, en región precordial, que IRRADIAN ABRAZO Y CUELLO, AUMENTADOS POR MOVIMIENTO.

Sensación como si el corazón estuviera comprimido por una mano.

Sensación de palpitations por oleadas NO SINCRÓNICAS CON PULSO en región cardíaca.

Al poner la mano sobre la región del corazón se siente como un ronroneo como cuando se acaricia un gato.

ANGINA DE PECHO : dolor repentino en lado izquierdo de pecho que irradia a uno o ambos brazos y tan violento que puede hacer desfallecer.

Comparar con acon. : sensación de constricción de pecho con sofocación, cardialgia que irradia a brazo izquierdo, angustia y gran miedo a la muerte; amyl. nitr. : de acción clásica.

Arnica : dolor particularmente severo de hombro y brazo izquierdos.

Ars. alb. : de acción tan marcada sobre el corazón.

Cactus : sensación como de corazón apretado por mano de hierro, que impide todo movimiento, sofocación, sudor frío.

Cimicif. : sensación como de corazón doloroso, aumentado de volumen.

Cuprum. : cardialgia con sensación de apretón espasmódico, de violenta presión, seguida de vómitos.

Naja : dolor picante en región del corazón, sensación de ahogo imposibilidad de hablar y pulso irregular.

Nat. iod.; spong.; tabac. : síntomas de ardor con dolor marcado en región precordial.

AFECCIONES VALVULARES crónicas con ruidos de soplo que estalla y ataques violentos de palpitations; sólo puede acostarse sobre la derecha (phosph., nat. mur.) y con cabeza alta; el menor movimiento agrava (naja).

Complicaciones cardíacas del reumatismo; en estos casos, rara vez está indicado spig. en "flemáticos" que sienten poco intensamente (Kent).

Espalda y extremidades

Dolores neurálgicos en músculos de pecho.

Muchos dolores de spig. en el pecho, se atribuyen al corazón; pero tiene verdaderas neuralgias intercostales; dolores lancinantes en hombro y cuello, particularmente marcados a la izquierda y a lo largo del brazo; dolores volantes aquí y allá (Kent).

Relaciones

Antídotos

Puls.

PYROGENIUM

O pyrogen o pyrexin, es un nosode introducido en la Materia Médica por los ingleses a fin del siglo pasado : el Dr. John Drysdale fue el primero, en 1880, en aconsejar su empleo como medicamento, en una publicación imposible de encontrar hoy : "ON pyrexin OR pyrogen AS A THERAPEUTIC AGENT", (edit.

por Baillere, Tyndale and Cox).

Se extrae de carne de buey flaca, que se trata de la siguiente manera : según procedimiento del Dr. Díaz de Cruz, se toma un recipiente que contenga 500 gr. de agua y 200 gr. de carne de buey desprovista de grasa y cortada en trocitos.

Se expone al aire seco durante una veintena de días y se obtiene un líquido rojizo, espeso, consistencia de jarabe y fétido.

Se filtra y se evapora a baño María hasta desecarlo.

Se deja macerar en alcohol durante dos horas el residuo seco que formará una masa compacta oscura.

Se deja secar; se mezcla con 30 gr. de agua destilada y se filtra, después de dos horas.

El líquido claro y amarillento que se obtiene es extracto acuoso de pyrogenium.

Se agrega un volumen doble de glicerina y con esta preparación que se puede considerar tintura madre, se preparan según métodos hahnemannianos las diferentes dinamizaciones : 3ø, 6ø, 12ø, 30ø, etc.

Características

Sus principales características son : 1) ESTADO SEPTICEMICO GRAVE CON GRAN AGITACIÓN : Se mueve sin cesar, desea continuamente cambiar de lugar porque la parte del cuerpo sobre la que se apoya le da casi enseguida sensación dolorosa de magulladura (arnica, bapt.).

En enfermos de pyrog. se nota estado complejo que responde a lacuádruple influencia de arnica, eupat., ars. alb., y rhus tox. : SENSACIÓN DE DOLORIMIENTO, MAGULLADURA, QUE HACE QUE LA CAMA PAREZCA DURA, de arnica : SENSACIÓN DE ROTURA, DE FATIGA DOLOROSA DE HUESOS, de eupat.; ANSIEDAD, ANGUSTIA AGITADA, de ars.; AGITACIÓN QUE DA ILUSIÓN DE ALIVIO, de rhus tox.

2) Es frecuente ver indicación de pyrog. en un síntoma desconocido paratodos los otros remedios : DESACUERDO ENTRE TEMPERATURA Y FRECUENCIA DE PULSO : temperatura muy elevada, que pasa de 39 39ø5 a 40ø, con pulso relativamente lento; o temperatura relativamente moderada : 38ø5, y pulso frecuente y rápido, a 150 o 160 pulsaciones por minuto.

3) EXTREMA FETIDEZ DE TODAS LAS SECRECIONES :Diarrea, vómitos, sudor, reglas, etc., que es otro punto de contacto ars. alb.

4) ESFERA DE ACCIÓN :La esfera de acción de los remedios comprende todos los casos en que están presentes sus características, cualquiera sea el nombre de la enfermedad.

Pero, está permitido al terapeuta dirigir su atención a cuatro grupos clínicos en la que se encuentra, con mayor frecuencia, su sintomatología : a) ESTADOS SÉPTICOS, cuando hay indicaciones características para otro remedio, o cuando el elegido homeopáticamente no revela reacción orgánica, esfera de acción de todos los nosodes.

b) SEPTICEMIAS AGUDAS :Fiebre tifoidea, neumonía, influenza, difteria, fiebre escarlatina, disentería, cólera, intoxicaciones por ptomainas, etc., estando presentes los síntomas característicos.

c) INFECCIONES LOCALES GRAVES por traumatismo que tienden a ganar todo el organismo : fiebre puerperal; metritis infecciosa, mastoiditis; apendicitis aguda; pinchazos anatómicos, etc.

d) ESTADOS INFLAMATORIOS DE ORIGEN SÉPTICO QUE TIENDEN A SUPURACIÓN.

Este grupo comprende casos que presentan historia de supuración o infección local con cura aparente, seguida tardíamente por trastornos de infección general graves, sin la menor provocación aparente.

Y los casos en que se constata, desde el principio, cuando la enfermedad aún no se ha desarrollado totalmente sino tiende a localización supurativa indeterminada.

En este caso actúa comp preventivo, impidiendo la evolución hacia un estado más serio.

5) La única MODALIDAD saliente es :MEJORÍA PASAJERA POR MOVIMIENTO, como rhus tox.

Síntomas mentales

Aquí se ven las dominantes de ars. : angustia, agitación, multitud de ideas atropelladas en su mente, lo atormentan.

Locuaz, agitado, delirante.

"LOCUACIDAD; piensa y habla más rápido que habitualmente, sobre todo durante fiebre.

Irritable.

Delirio y confusión mental con respecto a su cuerpo y miembros (bapt.).

Sensación como si cubriera toda la cama.

Sabe que su cabeza está sobre la almohada, pero no sabe dónde está el resto de su cuerpo.

Acostada de lado, cree ser cierta persona y al darse vuelta del otro, cree ser otra.

Sensación como si tuviera multitud de brazos y piernas.

Sus síntomas se parecen mucho a bapt., pero si la temperatura sube mucho bapt.

no será tan eficaz como pyrog. (Kent).

Cabeza y cara

Dolores latentes en cabeza.

Dolor de cabeza estallante, con agitación.

Congestión violenta de cabeza con DOLORES PRESIVOS y pulsaciones, aumentada por presión.

Transpiración abundante de cabeza.

Dolores en occipucio al toser; a la mañana al despertar.

Globos oculares dolorosos al tacto, al volverlos hacia arriba o afuera. (Kent).

Sangría de nariz de origen séptico.

Mejillas calientes y ardientes.

Cara cubierta de sudor frío.

Latidos como de abanico de alas de nariz, como lycop.

Aparato digestivo

BOCA :

ALIENTO EXTREMADAMENTE FÉTIDO.

Boca seca; mal gusto.

Dientes cubiertos de fuliginosidades.

Lengua fofa, extendida, ROJO VIVO, como BARNIZADA, seca, a veces como resquebrajada.

Habla difícilmente (cros., ter.).

ESTOMAGO :

NAUSEAS persistentes y VÓMITOS.

Vomita el agua en cuanto se le calienta en el estómago. (phosph.).

VÓMITOS EXTREMADAMENTE FÉTIDOS.

Vómitos de materias tirando a marrón, hematemesis; vómitos estercorosos.

ABDOMEN Y DEPOSICIONES :

Vientre hinchado, sensible, doloroso.

Retortijones; dolores lancinantes, cólicos.

Dolores si trata de respirar profundamente.

Tenesmo intolerable, vesical y rectal.

Diarrea con DEPOSICIONES OFENSIVAS, marrones o negruzcas, dolorosas, involuntarias; cada vez que expulsa un gas, sale un poco de materia líquida.

Puede haber constipación, con inercia intestinal completa (opium).

Se ven deposiciones abundantes, marrones, olor de carroña; o constituidas porbolitas secas, marrones.

Hemorragia intestinal.

Aparato urinario

Orina escasa, a veces incontinencia, a menudo albuminosa.

Tenesmo vesical.

Aparato circulatorio

Palpitación, angustia y debilidad precordial, sensación como si el corazón fuera demasiado grande.

Siente su corazón; oye los latidos; los latidos le resuenan en los oídos.

Debilidad de corazón.

DISOCIACIÓN ENTRE FRECUENCIA DE PULSO Y TEMPERATURA : PULSO

ANORMALMENTE RÁPIDO PARA LA FIEBRE QUE ES MAS BIEN MODERADA, O PULSO MAS BIEN MODERADO CON FIEBRE EXTREMA.

Órganos genitales

Reglas o más bien perdidas sanguíneas EXTRAORDINARIAMENTE OFENSIVAS, que huelen atrozmente.

Metrorragia fétida.

Loquios de olor nauseabundo, generalmente poco abundantes, como detenidos.

Aparato respiratorio

Epistaxis.

Expiración sibilante.

Respiración rápida; disnea.

Tos con expectoración espesa, más o menos abundante y pútrida, como la última fase de la tisis.

Piel y extremidades

Generalmente seca, fría; en casos graves, lívida o color ceniza.

A veces cubierta de transpiración abundante, de OLOR CADAVERICO y que no corresponde a caída de temperatura.

Entumecimiento de manos, brazos, piernas, DOLORIMIENTO DE TRONCO Y MIEMBROS; la cama le parece demasiado dura; mejoría pasajera por movimiento (rhus tox) por lo que quiere cambiar sin cesar de lugar y esta agitación puede aumentar por la angustia mental del remedio (ars. alb.).

Fiebre

Determina y está indicado en fiebres de carácter séptico; caracterizadas por escalofríos que comienzan en espalda, entre hombros, muy marcados y terminan por agitar todo el cuerpo.

La faz de calor sobreviene de repente : piel ardiente y seca y temperatura muy elevada, que puede pasar de 40°.

Sudor frío, viscoso y de OLOR FÉTIDO, le sigue, pero sin que el termómetro baje.

RANUNCULUS BULBOSUS

O Nabo de San Antonio, planta vivaz de la familia de las ranunculáceas, común en prados, campos y pendientes soleadas.

Se obtiene la tintura madre, con la cual se preparan por diluciones sucesivas las diferentes dinamizaciones, haciendo macerar en alcohol a 90°, la planta entera recolectada en verano.

Acción general del medicamento

Actúa principalmente en PIEL Y TEJIDO MUSCULAR.

Aplicado en PIEL, produce eritema violento, con erupción primero vesicular con ardor, escozor y comezón; si los síntomas aumentan por acción de la intensidad del medicamento sin que nada se haga para exasperarla, puede sobrevenir ulceración y hasta gangrena, esta última asociada a fiebre y delirio.

EN MÚSCULOS, provoca y cura algia reumatoidea sobre todo marcada en músculos de tronco, el reumatismo intercostal cede mucho más rápido a este medicamento que a cualquier otro; hay dolor, mucha sensibilidad al tacto, y los músculos tienen sensación de rotura como si hubieran sido triturados.

En SEROSAS, se ven los mismos dolores agudos que en músculos, y pleura y peritoneo parecen ser los que más sufren su influencia.

Algunas MUCOSAS no escapan a su acción irritante.

Características

DOLORES AGUDOS, LANCINANTES, VIVOS, COMO PUÑALADAS, NEURÁLGICOS, MIALGICOS, REUMÁTICOS, EN PAREDES DEL PECHO, POR PAROXISMOS PROVOCADOS O AGRAVADOS POR CAMBIOS ATMOSFÉRICOS.

Modalidades

Agravación

a) POR MOVIMIENTO, INSPIRACIÓN, TACTO.

b) POR CAMBIOS ATMOSFÉRICOS, especialmente TIEMPO TORMENTOSO Y HUMEDAD.

c) AL AIRE LIBRE, POR AIRE FRÍO.

Ojos

Nictalopía; niebla ante los ojos.

Sensación de presión en glóbulos oculares.

Inflamación, lagrimeo y prurito.

Dolores que escuecen en ángulos de ojos.

Pequeñas vesículas de córnea con dolores intensos, fotofobia y lagrimeo; herpesde córnea.

Aparato respiratorio

NARIZ:

HORMIGUEO PENOSO y dolores de nariz.

Nariz roja, hinchada, inflamada, con colores tensivos y costras abundantes en interior.

RESFRÍO DE HENO, con nariz hinchada, especialmente al atardecer, consensación de presión dolorosa en raíz y de comezón violenta en fosas nasales; a veces esta sensación pruriginosa se extiende haciendo escupir y tragar al enfermo que trata de desembarazarse por todos los medios de esta irritación; al mismo tiempo, sensación de escozor de ojos cuyos párpados arden y están dolorosos.

Ars. alb. y silic. también tienen estos síntomas.

También hay ronquera, muy fácilmente dolores picantes en el pecho y sus paredes, sensibilidad muscular que también puede ser general; cuello de vejiga afectado en algunos casos, con sensación de ardor en la micción.

PECHO :

SENSIBILIDAD DOLOROSA DE PECHO EN PAREDES, MÚSCULOS INTERCOSTALES, PLEURA, etc. QUE SE MANIFIESTA O AGRAVA SOBRE TODO POR MOVIMIENTO, TACTO, O AL EXTENDER EL CUERPO.

DOLORES LANCINANTES DE MÚSCULOS INTERCOSTALES; REUMATISMO INTERCOSTAL
CONDOLores AGUDOS, VIVOS, PICANTES, PUNTADAS EN PECHO, TODO AGRAVADO POR MOVIMIENTO, AUN DE LA RESPIRACIÓN, POR PRESIÓN Y CAMBIOS ATMOSFÉRICOS; LA DISNEA DA A VECES EN ESTOS CASOS SENSACIÓN DE ANGUSTIA; MUCHA SENSIBILIDAD AL TACTO Y SENSACIÓN DE MAGULLADURA EN MÚSCULOS COMO SI HUBIERAN SIDO TRITURADOS (amica, acon., bryonia).

DERRAMES PLEURALES con dolores agudos, como puñalada, gran ansiedad, disnea y desfallecimiento, por el derrame y la angustia provocada por los dolores : podrá, en esto, ser tan útil como : apis, bryon. o sulf. cuando están presentes sus dolores característicos.

Puede ser útil contra puntadas de pecho después de neumonía; la sensación característica que acompaña su sensibilidad dolorosa es una sensación de ulceración subcutánea, puramente subjetiva.

Este síntoma también se ve en puls. ranunc. puede ser útil contra dolores de pecho por adherencias consecutivas a pleuresía.

Ha curado dolores lancinantes de pecho a cada cambio de tiempo.

Está indicado en inflamaciones reumáticas de diafragma con dolores agudos, lancinantes, que van de hipocondrios y epigastrio hasta la espalda.

Espalda y extremidades

Dolores reumáticos de rotura en todo el tronco y entre omoplatos.

Dolores musculares en borde de omoplato en mujeres con oficio sedentario, consensación de ardor en pequeños puntos localizados (phosph., agar.), en costureras, dactilógrafas, pianistas (act. rac.). (Allen).

Dolores reumáticos en miembros y músculos; dolores provocados por contacto, movimiento, expansión, o cambio de posición, sobre todo en tronco y miembros.

Piel

Sensación de ardor con intenso prurito, luego, por tacto, erupción herpética con mucho prurito; zona precedido o seguido por neuralgias intercostales (mezer.).

Eczema con espesamiento de piel y formación de costras duras, corneas; comparar con : ant. crud. que tiene excrecencias córneas y callosidades de planta de pies.

Callos hipersensibles, que escuecen, ardientes (salyc. ac.).

Pénfigo con anchas ampollas que revientan y dejan superficie en carne viva.

Relaciones

Sulfur no sigue bien a ranunc. que es incompatible con staph.

RHODODENDRON

Rhododendron chrysanthum, o Rosa de Siberia, pequeño arbusto de la familia de las Ericáceas, crece en altas mesetas de Siberia y Kamtchatka.

Con brotes y pedúnculos secos se obtienen las diferentes dinamizaciones preparando las tres primeras por trituración.

Acción general del medicamento

Actúa sobre TEJIDO MUSCULAR Y FIBROSO, determinando DOLORES GRANDEMENTE

INFLUENCIADOS POR EL TIEMPO.

En él, la modalidad tiempo tiene gran influencia, como dulc., acon., etc. y su gran característica es : AGRAVACIÓN POR TIEMPO TORMENTOSO.

Especialmente ANTES DE TORMENTA, SOBRE TODO CON TRUENOS; DESPUÉS DE LA TORMENTAMEJORAN Y LA AGRAVACIÓN POR TORMENTA CON TRUENOS NO PARECE DEPENDER TANTO DE LA HUMEDAD; PARECIDO A phosph., nat. carb., y silic.

Sus dolores, como los de rhus, se agravan por tiempo húmedo y REPOSO, y MEJORAN POR MOVIMIENTO.

En cuanto a su acción propiamente dicha sobre el organismo, pareceter tener especial afinidad por TESTÍCULOS : están HINCHADOS, con DOLORES CONTUSOS, TIRONEANTES, a veces SE EXTIENDEN DE ABDOMEN A MUSLOS Y MUY SENSIBLES AL TACTO.

Los que más se le parecen en esto son : aur. met., clemat., puls., arg. nit., y spong.

En afecciones de origen sifilítico preferimos aur. met., sobre todo si antes el sujeto ha sido fuertemente mercurializado; después de supresión brusca de gonorrea, clemat. y puls.; si es de origen o carácter reumático rhodod.

ocupa el primer lugar.

Características

CONSTITUCIÓN Y TIPO : INDIVIDUOS NERVIOSOS, que temen las tormentas y se asustan particularmente del trueno; se agravan por tormentas, PARTICULARMENTE CON ATMÓSFERA CARGADA DE ELECTRICIDAD (phosph., nat. carb., psor., silic.).

Modalidades

Agravación

a) Por tormenta, tiempo ventoso y tormentoso, cambios eléctricos de atmósfera, aproximación de tormenta con relámpagos y truenos; los síntomas vuelven con este mal tiempo.

b) Por tiempo húmedo.

c) Por reposo (rhus tox.).

Mejoría

a) DESPUÉS DE TORMENTA; POR MOVIMIENTO Y CALOR SECO; abrigándose la cabeza.

b) Comiendo.

Patogenesia

Su patogenesia, con cuadro poco característico y sin gran personalidad, presenta no obstante, fuera de sus modalidades tan importantes, algunos síntomas particulares : DOLOR DE DIENTES con dolores neurálgicos profundos, desgarrantes, MAS VIVOS ANTES O DURANTE TIEMPO TORMENTOSO, A CADA CAMBIO DE TIEMPO, CON GRAN VIENTO DE TORMENTA, en cada primavera; aliviados mientras come.

TESTÍCULOS RETRAÍDOS, HINCHADOS y dolorosos; testículos en particular epidídimo, muy dolorosos al tacto; dolores de contusión en testículos; alternando con dolores agudos; tumefacción e induración de testículos, en particular izquierdo, con violentos dolores agudos, que se extienden a abdomen y muslos.

Orquitis con sensación como si el glándula fuera aplastado (aur., chamom.); orquitis reumática.

HINCHAZÓN INFLAMATORIA AGUDA DE ARTICULACIONES, QUE PASA DE UNA A OTRA, MUY DOLOROSA DE NOCHE, AGRAVADO POR REPOSO Y TIEMPO TORMENTOSO (kalmia).

DOLORES REUMÁTICOS TIRANTES, DESGARRANTES, EN TODOS LOS MIEMBROS, AGRAVADOS POR TORMENTA, REPOSO, TIEMPO HÚMEDO, O VENTOSO, O POR FRÍO (rhus tox.).

Gota con depósitos en articulaciones de dedos grandes de pie, confundida con juanetes (led. pal., colch.) con DOLORES AGRAVADOS Y PROVOCADOS POR TIEMPO TORMENTOSO.

NO PUEDE DORMIRSE O DORMIR SIN TENER LAS PIERNAS CRUZADAS.

RHUS TOXICODENDRON

Arbusto de la familia de la terebintáceas originario de América Septentrional, se encuentra también en bosques frondosos y lugares húmedos de Europa.

Tiene grandes ramas flexibles, delgadas, que alcanzan muchos metros de altura y se mezclan a árboles vecinos en cuya corteza se implantan.

Hojas color verde pálido, dentadas, y según la estación, flores verdosas pequeñas en espigas y pequeños frutos carnosos, blancos, redondeados.

Contiene jugo marrón amarillento, de olor penetrante y nauseoso, cáustico y produce en piel vesículas llenas de serosidad extremadamente pruriginosas y ardientes; son las hojas las que contienen más; con ellas se prepara la tintura madre con la que se obtienen las diferentes dinamizaciones por diluciones sucesivas.

Acción general del medicamento

Rhus tiene acción muy profunda en PIEL; provoca ERUPCIÓN VESICULOSA característica, con EDEMA, ARDOR, COMEZÓN y PINCHAZOS : la menor cantidad de tintura de rhus o de jugo de la hoja produce en anchas superficies de piel enrojecimiento y ardor que no tardan en producir tumefacción, edema y cubrirse de vesículas con prurito casi intolerable (Hughes).

El ardor y enrojecimiento de boca y garganta, diarrea, tos irritativa, erirritación cutánea, indican acción análoga sobre mucosas.

Para TESTE sus efectos son los de un cáustico corrosivo que, por su extrema sutileza, tiene tendencia a invadir anchas superficies más bien que a penetrar profundamente en tejidos; lo compara a arnica que penetra más y a ledum cuya acción se localiza mejor (Hughes).

Tiene SOBRE MENTE ACCIÓN DEPRIMENTE que se traduce en estado de prostración y estupor que lo indica en muchos estados tifoideos.

Ejerce sobre SISTEMA MUSCULAR acción igualmente deprimente que se manifiesta por rigidez dolorosa y fenómenos paralíticos.

Pero ejerce sobre todo su acción electiva EN TEJIDO CONJUNTIVO FIBROSO.

Ningún medicamento actúa más profundamente en aponeurosis y tendones musculares, de ahí derivan numerosos síntomas de muchos estados reumáticos, dolores aponeuróticos, etc.; especialmente si el factor surmenage está etiologicamente en juego.

Para el Dr. Nebel esta acción electiva sobre tejido conjuntivo fibroso explica su gran característica : mejoría por movimiento; según él, bajo su influencia el organismo drena toxinas a nivel de aponeurosis, tendones, envolturas fibro conjuntivas de articulaciones, y, como el movimiento favorece la aceleración de la circulación linfática, permitiría así una eliminación tóxica más rápida, lo que trae alivio.

Por su acción sobre tejido conjuntivo fibroso, influencia LA CIRCULACIÓN actuando sobre túnica externa fibrosa de vasos.

Características

1) CONSTITUCIÓN Y TIPO : No tiene tipo netamente definido.

Es útil en casi todos los temperamentos.

Lo más que se puede decir es que desarrolla más fácilmente sus síntomas en neuroartríticos y gotosos.

2) ESTUPOR : ESTUPOR CON DELIRIO SUAVE, PERO REGULAR, PERSISTENTE, es estado característico de rhus tox.

Va acompañado de AGITACIÓN que es otra de sus características; se da vuelta para todos lados sin tener consciencia de su agitación ni de lo que pasa alrededor.

Este estado se ve en disentería, peritonitis, neumonía, escarlatina, difteria, fiebre tifoidea, etc., localización y nombre de enfermedad nada importan en el caso (Nash).

3) AGITACIÓN : Muy grande, puede ser su primera característica.

Tiene de particular QUE ESTA EN RELACIÓN CON EL DOLOR, DOLORIMIENTO O SENSACIÓN DE MOLESTIA DOLOROSA y que MEJORA TEMPORARIAMENTE POR MOVIMIENTO.

Aunque no haya dolor muy neto, hay una especie de molestia vaga, pero intensa, mejorada por movimiento, de manera tal que desea estar sin cesar en movimiento, porque el solo hecho de cambiar de sitio alivia.

Esto se parece a la agitación de acon; y ars. alb. con los que rhus. forma lo que Nash llama "TRIO DE LA AGITACIÓN".

Modalidades

Lateralidad

De preferencia derecha.

Mejoría

a) POR MOVIMIENTO : como bryon., su principal característica está en la modalidad : MEJORÍA POR MOVIMIENTO, AGRAVACIÓN POR REPOSO, que es tan importante para la acción de rhus como la inversa : agravación por movimiento y mejoría por reposo es para bryon.

En enfermedades crónicas, como reumatismo, debe moverse para tener alivio; al principio de los movimientos sufre, pero si continúa se siente mejor.

En enfermedades agudas, el movimiento que hace parece ser su único alivio, de ahí su gran agitación.

b) POR CALOR, APLICACIONES CALIENTES; TIEMPO SECO Y CALUROSO

Agravación

a) POR REPOSO b) POR HUMEDAD; TIEMPO FRÍO Y HÚMEDO; todo esto está lleno de malos efectos para el enfermo, y en todas las formas : agravación por lluvia, cuando se moja, por haber estado expuesto al frío, mientras transpira abundantemente.

c) DE NOCHE, PARTICULARMENTE A MEDIA NOCHE; sus síntomas sobrevienen o se agravan de noche.

d) ESTANDO ACOSTADO SOBRE EL LADO DOLOROSO, al contrario de bryon.

Síntomas mentales

Tiene fácilmente fatiga cerebral; no puede encontrar su mente, reflexionar largo tiempo, sostener esfuerzo mental.

Memoria débil, olvida letras o palabras al escribir; ideas fácilmente confusas.

Irritable, inquieto, gran sensibilidad moral, la más ligera contrariedad aumenta todos sus sufrimientos; agitado, nerviosidad extrema; gran aprensión como si la fuera a pasar una desgracia que le impide quedar en el lecho de noche. Asco por la vida, triste, llora sin saber porqué, ideas de suicidio, quiere ahogarse pero teme a la muerte; quisiera morir, pero no tiene valor para suicidarse.

Oscurecimiento de sensorio; delirio suave pero regular y persistente.

Delirio vago y consciente.

Delirio de persecución, delirio con miedo de ser envenenado (hyosc.).

Sueño

Insomnio antes de medianoche, enseguida sueño agitado, no reparador, con sueños, principalmente de violentos ejercicios físicos, fatigantes : carreras, natación, remo, etc.; sueña con sus ocupaciones cotidianas.

Cabeza

ERUPCIÓN HÚMEDA, PRURIGINOSA DE CUERO CABELLUDO; COSTRAS DE LECHE.

Cabeza pesada; sensación como si el cerebro fuese sacudido y golpease la caja craneana al mover la cabeza.

Cefalea con dolores presivos en temporales, frente y órbitas, como si los ojos fueran empujados hacia afuera.

Sensación dolorosa como si una tablita estuviera unida muy apretada sobre la frente.

Cefalea occipital (rhus radicans).

Vértigo estando parado o al caminar.

Ojos

Inflamación de ojos, en reumáticos, después de exposición a humedad y frío, o de transpiración bruscamente detenida por haberse expuesto al frío (Kent).

Párpados inflamados, hinchados y pegados a la mañana, con sensación de escozor.

Ojos rojos, hinchados, conjuntiva inyectada; dolores presivos, ardientes, de ojos, que escuecen y pican.

Pústulas de córnea, iritis reumática después de exposición a frío húmedo.

Inyección circunscripta de córnea.

Fotofobia; sensación como si tuviera velo o niebla delante de los ojos.

Ptosis.

Parálisis de músculos de pupila por reumatismo o después de haber tomado frío, en tiempo húmedo, o después de mojarse los pies (Kent).

Oídos

Sensación de zumbidos o silbidos, peor al caminar, neuralgia de oídos.

Inflamación erisipelatosa con vesículas de oído externo.

Cara

Pálida, de aspecto enfermizo, o roja y cubierta de sudor.

Ulceraciones de comisuras de labios.

Herpes febril alrededor de la boca.

LAS MANDÍBULAS CRUJEN A CADA MOVIMIENTO DE MASTICACIÓN Y SE DISLOCAN FÁCILMENTE.

Luxación fácil de mandíbula en articulaciones temporomaxilares (ignat., petrol.).

ERISPELA DE CARA con anchas ampollas que se extienden rápidamente de izquierda a derecha, con inflamación violeta de piel que está edematizada, hinchada; mucho ardor, escozor, pinchazos; con fuerte temperatura, delirio y agitación características.

Eczema pruriginoso y escozor de cara : COSTRAS DE LECHE, (viola tricol., calc. ost.).

Neuralgias faciales reumáticas.

Aparato digestivo

BOCA :

SEQUEZAL DE BOCA, LENGUA Y FARINGE, CON GRAN SED.

Encías ardientes y dolorosas.

Los dientes parecen largos y flojos.

Lengua seca, dolorosa, agrietada, con capa espesa de mucus blanco u oscuro excepto en la punta donde hay UN ESPACIO TRIANGULAR ROJO; POR OTRA PARTE a menudo sus bordes gruesos conservan impresión de dientes.

Arg. nit., puede tener extremidad de lengua roja dolorosa pero no se parece al triángulo rojo de rhus tox., con lengua seca, en arg. nit., no hay sed como en rhus tox.

Gusto amargo y metálico.

FARINGE Y ESÓFAGO :

Faringe seca, dolorosa, inflamada; la inflamación recae particularmente en tejido mucoso pero también submucoso; pinchazos y gran dificultad para tragar alimentos sólidos cuya deglución provoca espasmo de faringe. Paperas con hinchazón de parótidas que están rojo oscuro, sobre todo izquierda, pinchazos al tragar. Inflamación aguda de esófago por absorción de líquidos corrosivos que determinan lesiones mucosas parecidas a rhus tox (Kent).

ESTOMAGO :

SED MUY MARCADA, INEXTINGUIBLE; CON GRAN SEQUEDAD DE BOCA, GENERALMENTE CON DESEO DE AGUA O LECHE FRÍA.

Deseo de ostras y dulces, aversión por carne.

Hambre si apetito.

Sensación de hambre, de vacío en boca de estómago pero si deseo de alimentos (Kent).

Náuseas y vómitos; vómitos biliosos y náuseas después de beber agua fría.

Náuseas después de comer, con vómitos súbitos, apetito anormal con tendencia a vomitar; náuseas y regurgitaciones, peor de noche o después de comer.

Sensación de plétora y pesadez de estómago como de peso.

Sensación de latidos en boca de estómago.

Dolor que roe, de estómago.

Sensación dolorosa de estómago y náuseas, sobre todo después de tomar alimentos fríos, helados.

ABDOMEN Y DEPOSICIONES :

Gran distensión abdominal con acumulación de gas; sensibilidad tal que no puede soportar ninguna presión ni aún las frazadas.

Cólicos, dolores como pinchazos, cortantes, aliviados acostándose de espaldas levantando las piernas.

Dolores marcados en región de colon ascendente.

Hígado grande, doloroso, impide acostarse sobre la derecha.

DIARREA CON DEPOSICIONES POCO ABUNDANTES, VISCOSAS, A MENUDO MEZCLADAS CON SANGRE; sensación de ardor DE RECTO antes de deposición que alivia inmediatamente.

Deposiciones DE OLOR CADAVERÍCO, espumosas sin dolor; deposiciones acuosas o en chorro,

INVOLUNTARIAS, MUY NUMEROSAS DE NOCHE y menos de día; deposiciones involuntarias con GRAN AGOTAMIENTO.

Deposición disintérica a la mañana temprano que obliga a levantarse en seguida. (sulphur).

Comezón y ardor de recto con violento tenesmo.

Aparato urinario

Orina poco abundante, muy coloreada, con sedimento más o menos marcado y a veces olor fuerte y penetrante.

Disuria con hematuria.

Necesidad de orinar con tenesmo y dolores en región prostática que provocan deseo de evacuar; mejoría moviéndose.

Tenesmo vesical violento con orina sanguinolenta.

Orina emitida lentamente por especie de debilidad parálitica de vejiga.

Hay a veces parálisis completa de vejiga con incontinencia nocturna.

Micciones frecuentes día y noche, debilidad de vejiga en niñas o mujeres con necesidad de orinar, pérdida involuntaria de orina si tiene frío (Kent).

Dolores en región renal con orina albuminúrica, sanguinolenta o cargada de espeso sedimento blanco que se deposita en el fondo del recipiente (Kent).

Órganos genitales

MASCULINOS :

Hinchazón erisipelatosa, erupción húmeda, piel gruesa, edematizada, en escroto, con prurito intolerable.

FEMENINOS :

Hinchazón erisipelatosa, erupción húmeda, extremadamente pruriginosa de órganos genitales externos : labios, etc.

Reglas adelantadas, acres e irritantes, se prolongan demasiado.

A veces, con restos mucosos (Kent).

Loquios en pequeña cantidad, durante largo tiempo, ofensivos, con dolores de puntada en vagina.

Prurito de pezón.

Aparato respiratorio

NARIZ :

Erupción costrosa alrededor de fosas nasales con comezón y ardor.

Coriza con sensación abundante, acre y excoriante; dolores en huesos de nariz al estornudar; particularmente indicado si ese coriza sobreviene después de exposición torpe a humedad.

Epistaxis al agacharse, o de noche; la sangre es negra.

LARINGE Y PULMONES :

Sensación de calor, escozor, desolladura de laringe.

Ronquera después de forzar la voz (arnica).

Ronquera sobre todo marcada al empezar a hablar, cantar, luego desaparece o mejora después de hablar un instante o cantar algunas notas.

Tos provocada por sensación de cosquilleo detrás de esternón, seca, molesta, sobre todo marcada de medianoche a la mañana, o durante escalofrío o en cuanto se destapa un poco, o simplemente por sacar las manos de las frazadas.

Resfrío gripal, influenza con dolores en todos los huesos (eupat.

perf.) particularmente después de estar expuesto al frío húmedo.

Hemoptisis de sangre rojo vivo por esfuerzo, por haber tocado muy violentamente un instrumento de viento.

Aparato circulatorio

Produce verdadero ERETISMO CIRCULATORIO con PALPITACIONES a veces muy marcadas, y pueden sobrevenir aún estando sentado, en reposo; palpitaciones que sacuden todo el cuerpo; palpitaciones con angustia, a la mañana al despertar; palpitaciones haciendo ejercicio.

Sensación de debilidad en pecho como por músculo cardíaco fatigado, como si hubiera sido forzado.

Por eso está indicado EN HIPERTROFIA CARDÍACA SIMPLE, no ASOCIADA A LESIONES, VALVULARES O RENALES Y PROVENIENTES DE ESFUERZOS PROLONGADOS, EXAGERADOS.

(Arnica, cactus); hipertrofia cardíaca en corredores a pie y deportistas.

A menudo los malestares de corazón van acompañados DE SENSACIÓN DE ENTUMECIMIENTO Y DEBILIDAD DE BRAZO Y HOMBRO IZQUIERDOS.

PULSO PEQUEÑO Y ACELERADO, A MENUDO IRREGULAR E INTERMITENTE; sin tendencia a ser lleno y fuerte como acon.

Espalda y extremidades

Por su acción electiva sobre TEJIDO FIBRO CONJUNTIVO tiene influencia de primer orden en esta región.

Ningún medicamento tiene síntomas tan marcados en APONEUROSIS, TENDONES MUSCULARES O LIGAMENTOS ARTICULARES Y rhus tox es el más indicado cuando están inflamadas POR ATAQUE DE REUMATISMO, O DESPUÉS DE ABUSO DE EJERCICIO, O TORCEDURA SÚBITA, una entorsis, por ej.

En todos estos casos; el factor humedad como causa determinante o agravante, tiene gran importancia.

SENSACIÓN DE RIGIDEZ MUSCULAR DOLOROSA ALIVIADA POR MOVIMIENTO.

SENSACIÓN DE RIGIDEZ DOLOROSA DE TENDONES, LIGAMENTOS, ARTICULACIONES Y FASCIES, DESPUÉS DE REUMATISMO, DE ESFUERZO VIOLENTO, EJERCICIO MUSCULAR PROLONGADO, EXPOSICIÓN A FRÍO HÚMEDO; Y SIEMPRE MEJORADOS POR MOVIMIENTO.

RIGIDEZ MUSCULAR GENERAL O PARCIAL, RIGIDEZ ARTICULAR, QUE DESAPARECE POR MOVIMIENTO.

Ante tales síntomas y cuando son consecuencia de ejercicio muy violento o prolongado, comparar con arnica; pero ésta actúa más especialmente sobre músculos que sobre ligamentos; está indicado cuanto después de largo ejercicio, hay menos rigidez muscular y sobre todo articular, que una especie de sensación dolorosa que da sensación de contusión, de magulladura muscular; las articulaciones están poco o nada interesadas; el movimiento no alivia como en rhus tox....

Para entorsis, arnica no es el mejor remedio, sino más bien rhus tox. a menos que haya equimosis, o extravasación sanguínea, en cuyo caso arnica está indicado.

Ars. alb., para consecuencias de largo esfuerzo muscular, cuando se ha hecho para escalar una montaña, para hacer una ascensión larga y penosa, aquí los efectos de la rarefacción del aire se pueden agregar a los de la fatiga.

En ambos no se nota mejoría por movimiento característica de rhus tox.

RIGIDEZ ARTICULAR DOLOROSA, REUMÁTICA AGRAVADA POR REPOSO, MEJORADA POR MOVIMIENTO : RIGIDEZ DOLOROSA AGRAVADA CUANDO COMIENZA A MOVERSE, PERO CONTINUAR EL MOVIMIENTO ALIVIA; EL CALOR TAMBIÉN MEJORA, EL FRÍO Y LA HUMEDAD TIENEN COMO PARA TODO EN rhus tox., LOS MALOS EFECTOS QUE YA CONOCEMOS.

MIEMBROS SIEMPRE E MOVIMIENTO PORQUE SE SIENTE MEJOR POR UN TIEMPO, DESPUÉS DE CAMBIO DE POSICIÓN.

HINCHAZÓN ARTICULAR DOLOROSA; DOLORS DESGARRANTES DE TENDONES, LIGAMENTOS ARTICULARES Y FASCIES MEJORADOS POR MOVIMIENTO, AGRAVADOS POR REPOSO; EL AIRE NO ES TOLERADO, PONE LA PIEL DOLOROSA.

DOLORS ARTICULARES DE DISLOCACIÓN, TORSIÓN, PESADEZ, PRESIÓN CON SENSACIÓN DE FRÍO, ENTUMECIMIENTO, RIGIDEZ; AGRAVADOS POR REPOSO, HUMEDAD, FRÍO, DESPUÉS DE MEDIANOCHES; MEJORADOS POR MOVIMIENTO DE ARTICULACIÓN ENFERMA.

Cierto número de remedios tienen mejoría por movimiento y se pueden comparar con rhus tox. : anacard. : dolor de cuello peor al comenzar a moverse pero no tiene enseguida mejoría por reposo; conium : agravación al principio del movimiento, pero ambos difieren completamente.

Lycop. y puls. : alivio por movimiento lento.

Ferr. met. : dolores neurálgicos y reumáticos aliviados hacia la noche por movimientos lentos.

Kalmia lat. : dolores tirantes de piernas pero extremadamente inestables, cambian de lugar a cada instante y no se alivian por movimiento.

Rhodod. : gran susceptibilidad a cambios de tiempo, hormigueos y rigidez dolorosa como rhus tox., y agravación por reposo; especialmente indicado para gota reumática de pequeñas articulaciones y tiene características especiales que impiden confundirlo con rhus tox.

DOLOR y RIGIDEZ DE CINTURA, PEOR ESTANDO SENTADO, MEJOR ACOSTADO SOBRE ALGO DURO Y POR MOVIMIENTO.

DOLORES EN REGIÓN LUMBAR COMO SI LA ESPALDA ESTUVIERA ROTA.

EXCELENTE PARA LUMBAGO DESPUÉS DE MOJADURA, DE HABER TOMADO FRÍO, DE SUPRESIÓN MAL HECHA DE TRANSPIRACIÓN ABUNDANTE, DE LEVANTAR ALGO MUY PESADO : DOLOR MAS VIVO CUANDO COMIENZA A MOVERSE.

PERO LA CONTINUACIÓN DEL MOVIMIENTO MEJORA.

SENSACIÓN DE RIGIDEZ DOLOROSA EN SACRO Y REGIÓN LUMBAR, AGRAVADA REPOSANDO DESPUÉS DE HABER HECHO EJERCICIO.

Sulph. : dolores reumáticos, con rigidez en región lumbar, pérdida súbita de fuerza al tratar de moverse, pero tiene otras características que no tiene rhus y permiten elegir entre ambos.

Bryon. : dolores tironeantes, pinchazos, con rigidez de músculos de espalda y lumbares que impiden caminar, pero con agravación por movimiento y mejoría por reposo.

Calc. fluor. : dolores de lumbago por esfuerzo, agravados al comenzar los movimientos, que, continuados, mejoran, lo mismo que el calor.

Nux vom. : dolores de lumbago en relación con hemorroides o abuso de onanismo; vivos, obligan a sentarse para darse vuelta, cuando está acostado; estando parado le es penoso darse vuelta o doblar el cuerpo; la posición sentada le es particularmente desagradable.

Kali carb. : dolores agudos en región lumbar, peores a las 3 de la mañana y obligan a levantarse y caminar; irradian hacia abajo, hacia nalgas.

Petrol., y ruta : útiles cuando los dolores lumbares están peor a la mañana, pies rígidos.

Hay que pensar en valer.

Debilidad paralítica de miembro superior con sensación de frío e insensibilidad.

Hinchazón y contractura dolorosa de dedos.

Cuando toma algo, siente pinchazos y hormigueos en manos y dedos; entumecimiento y hormigueo en dedos.

Sensación constante en vejiga como si estuviera llena.

CIÁTICA CON DOLORES DESGARRANTES, TIRONEANTES A LO LARGO DEL NERVIJO, PEOR DURANTE REPOSO, MEJOR POR MOVIMIENTO, MIEMBRO DOLOROSO EN MOVIMIENTO CONSTANTE; PARTICULARMENTE ÚTIL EN TAL CIÁTICA POR FRÍO, TIEMPO HÚMEDO, EXPOSICIÓN A LLUVIA, POR TOMAR FRÍO ESTANDO TRANSPIRADO, SI HA SIDO SUPRIMIDA LA TRANSPIRACIÓN.

A continuación los principales medicamentos para tratamiento de ciática clasificados por lateralidad de acción : no basta para determinar la elección pues muchos tienen lateralidad indiferente; pero; al menos, esta clasificación tiene la ventaja de fijar la atención, sin excluir la búsqueda de otras características.

(Según el Dr. Paul Chiron) : "El tratamiento de la ciática" en La revista francesa de homeopatía - Septiembre 1920.

Medicamentos de lateralidad indiferente

Acon. : Ciática al principio, con dolores lancinantes o desgarrantes, con entumecimiento e hipersensibilidad al menor contacto.

Agravación de noche y por movimiento, mejoría estando sentado; gran agitación.

Ars. alb. : Ciática con dolores ardientes y desgarrantes con agitación, gran debilidad, tendencia a estar acostado.

Agravación de noche, particularmente después de medianoche.

Por frío.

Mejoría por calor y aplicaciones calientes.

Bell. : Ciática con dolores lancinantes en ataques cotidianos, a la tarde hasta medianoche.

Hipersensibilidad de piel de miembros tal que ni puede soportar el simple contacto de las frazadas.

Gran agitación.

Agravación por la menor corriente de aire.

Mejoría por calor; o estando parado o cuando tiene las piernas colgando.

Bryon. : Ciática con dolores tironeantes, desgarrantes, lancinantes o como causados por ulceración subcutánea; dolores localizados en región lumbar y que se extienden al muslo.

Agravación por el menor movimiento y por presión fuerte.

Mejoría por reposo y estando acostado sobre el lado doloroso.

Gelsem. : Ciática obstinada, dolores ardientes, por ataques, contemblor y gran debilidad del miembro.

Agravación de noche por reposo y al comenzar a caminar.

Mejoría por transpiración y por movimiento.

Lycop. : Caso crónico, con dolores ardientes y pinchazos, periódica, con completa remisión en intervalos de ataques.

Rigidez y debilidad de miembro afectado, no puede enderezar la pierna.

Agravación por reposo, estando parado, o acostándose sobre el lado doloroso.
Mejoría por movimiento.
El Dr. Chiron lo clasifica como teniendo ciática de lateralidad indiferente; ciertos autores aconsejan no olvidar que lo más frecuente es su lateralidad derecha.
Merc. : Ciática con dolores desgarrantes y tironeantes a todo lo largo de muslo, de cadera a rodilla con sensación de debilidad, de calor intenso aunque la piel esté fría.
Agravación por acostarse, al movimiento, al atardecer y de noche.
Mejoría al aire libre y al mañana.
Nux v. : Dolores tironeantes y desgarrantes a lo largo de miembro afectado, de cadera a pie, con rigidez y contracción.
Agravación a la mañana, acostándose sobre el lado doloroso, por frío.
Mejoría por reposo y aplicaciones de agua caliente.
Plumb. : Ciática crónica, con atrofia muscular.
Dolores continuos, constrictivos y desgarrantes.
Agravación de noche, por calor, movimiento, presión ligera.
Mejoría por masaje.
Phytol. : Dolores lancinantes, tironeantes, latentes de parte externa, localizados en cara externa de muslo, aunque se puede encontrar en parte posterior.
Agravación por movimiento, presión de noche y después del sueño.
Mejoría por reposo y calor.
Un terreno sífilítico es una indicación más.
Rhus tox. : Dolores penetrantes, ardientes, desgarrantes, con sensación de frío y entumecimiento.
Hormigueos y rigidez parálitica de miembro.
Agravación de noche, por reposo y al empezar a moverse.
Mejoría por movimiento, calor seco.
Ciática a frigore o por esfuerzos.
Ruta grav. : Dolores profundamente situados, como en médula de huesos, o con sensación como si el hueso estuviera roto.
Enfermo obligado a caminar constantemente durante el ataque, porque el dolor aumenta en cuanto se sienta o acuesta.
Agravación por tiempo húmedo, de noche.
Visc. alb. : Caso grave; dolores tironeantes y latentes en los muslos.
Sensación como si los músculos fueran retorcidos con pinzas calientes.
La pierna parece pesada como plomo.
Hipersensibilidad de muslo.
Gran postración.
Agravación por tacto, por el menor movimiento.
Mejoría por reposo.
Medicamentos con lateralidad derecha
Colocynth. : Ciática derecha con dolores agudos, tironeantes, pinchazos, en región sacra, cadera, muslo, rodilla; a veces dolores fulgurantes de sacro a talón.
Ataques dolorosos intolerables.
Mejoría por reposo absoluto y aplicaciones calientes.
Dioscorea : Ciática derecha con dolores desgarrantes, tironeantes en cadera derecha y a lo largo del muslo.
Dolores calambroides de piernas.
Agravación al levantarse, moviendo el miembro al caminar.
Mejoría por reposo.
Graph. : Afecta particularmente la derecha : dolores lancinantes, a todo lo largo del nervio ciático y dolores ardientes; sensación de entumecimiento alternando con dolores.
Agravación dejando el miembro estirado, por caminar, por movimiento.
Mejoría estando sentado en una silla, flexionando la pierna sobre el abdomen.
Índigo : Dolores agudos de cadera derecha al resto de la pierna, con rigidez de miembro.
Agravación por reposo, estando sentado, después de comer.
Mejoría por movimiento.
Magn. phosph. : Ciática derecha, con dolores lancinantes, agudos por ataques bruscos fulgurantes.
Imposibilidad de quedar en cama de noche, debe estar de pie constantemente.
Pallad. : Ciática derecha con dolores lancinantes, de dedo grande de cadera o de trocánter a hueso poplíteo.
Agravación por frío, movimiento, a la noche.
Mejoría por calor y reposo.
Tellur. : Ciática principalmente derecha, que irradia de sacro a pierna con sensibilidad de columna vertebral.

Agravación por el menor esfuerzo, risa, tos y estando acostado sobre el lado afectado.

Medicamentos con lateralidad izquierda

Amm. mur. : Ciática grave que dura largo tiempo.

Dolores de pierna izquierda con sensación de contractura en miembro que obliga a renguear.

Dolores desgarrantes y pinchazos agravados cuando está sentado, ligeramente disminuidos por caminar; enteramente mejorado estando acostado.

Chamom. : Ciática izquierda con dolores tironeantes y desgarrantes; sensación de entumecimiento en todo el miembro.

Gran sensibilidad al menor dolor que es insoportable.

Agravación de noche, en cama y por el menor movimiento.

Cimicif. : Dolores violentos de cadera izquierda que obligan a salir del lecho.

Mejoría por presión y estando parado.

Aupat. perf. : Ciática izquierda con dolores violentos en todo el largo del nervio con sensación de pierna débil como paralizada.

Agravación por movimiento.

Iris versic. : Ciática izquierda, con dolores agudos, ardientes, a todo lo largo del nervio, hasta el pie.

Sensación como si la articulación coxo femoral estuviera luxada.

Agravación de noche, por reposo, al principio del movimiento.

Mejoría por movimiento.

Kali bichro. : Ciática izquierda con dolores violentos que se desplazan todo lo largo de la pierna.

El dolor sobreviene y desaparece bruscamente.

Agravación estando parado, estando en la cama y sentado.

Mejoría por caminar, por flexión de miembro.

Kali iodat. : Dolores tironeantes con puntadas en parte posterior de muslo y rodilla izquierdos.

Contracciones espasmódicas de músculos.

Agravación de noche y acostado sobre el lado afectado.

Mejoría por movimiento.

Ledum pal. : Dolores que afectan más el lado izquierdo.

Pinchazos y tirones que se extienden de cadera a pie, con sensación de presión y contractura en músculos de región posterior del muslo.

Agravación de noche, por calor del lecho, tacto.

Mejoría por frío.

Stillingia : Ciática izquierda con dolores violentos con tirones de cadera a pierna y dedo grande.

Terreno sifilítico Sulphur : Dolores penetrantes, tironeantes, de cadera izquierda a extremidad inferior de miembro, con sensación de pesadez y entumecimiento.

Agravación por caminar y de noche, por el calor del lecho.

Si deseamos clasificar estos medicamentos, no solamente por lateralidad sino por otras características, tendremos el cuadro siguiente.

Medicamentos con lateralidad indiferente

1) MEJORÍA POR REPOSO : Acon., bryon., merc., nux v., plumb., phytol., visc. alb.

2) MEJORÍA POR MOVIMIENTO : Gels., lycop., rhus tox., ruta.

3) MEJORÍA POR CALOR : Ars. alb., bell., rhus tox.

4) MEJORÍA POR APLICACIONES DE AGUA CALIENTE : Nux v.

5) AGRAVACIÓN DE NOCHE : Acon., gels., merc., plumb., rhus tox., ruta.

6) AGRAVACIÓN A LA MAÑANA : Nux v.

Medicamentos con lateralidad derecha

1) MEJORÍA POR REPOSO : Coloc., dioscor., graph., pallad., tellur.

2) MEJORÍA POR MOVIMIENTO : Indigo, magn. phosph.

3) MEJORÍA POR CALOR : Coloc., magn. phosph.

4) AGRAVACIÓN POR FRÍO : Coloc., pallad.

5) MEJORÍA DOBLANDO LA PIERNA : Gnaphal.

6) AGRAVACIÓN POR EL MENOR ESFUERZO : Tellur.

Medicamentos con lateralidad izquierda

1) MEJORÍA POR MOVIMIENTO : Iris., kali iod., kali bich.

2) AGRAVACIÓN POR REPOSO : Chamom., eupat purp., sulph., still.

3) MEJORÍA ESTANDO ACOSTADO : Ammom. mur.

4) AGRAVACIÓN EN CAMA, DE NOCHE : Chamom., sulph., ledum.

5) MEJORÍA POR PRESIÓN O ESTANDO PARADO : Cimicif.

Gran fatiga y sensación de pesadez de miembros inferiores pero que no impiden moverlos, porque esto alivia.

Debilidad de piernas al subir escaleras.

ENTORSIS DE TOBILLOS Y OTRAS ARTICULACIONES; si hay equimosis, es útil después que arnica ha hecho desaparecer los síntomas más dolorosos, y para combatir debilidad de ligamentos articulares y tendones que sigue generalmente a entorsis.

Calambres de pantorrillas, de noche, o cuando se sienta después decaminar, mejorados por movimiento.

Hinchazón de pies, de noche.

Piel

DOLOROSA AL AIRE FRÍO Y AGUA FRÍA.

Rhus tox. desarrolla y cura ERUPCIÓN VESICULOSA CON EDEMA, ARDOR Y COMEZÓN INTENSA, NO MEJORADA POR RASCADO : HAY MUCHA HUMEDAD, REZUMA MUCHO LA PIEL CON LA ERUPCIÓN.

LA COMEZÓN CONTINUA SE ALIVIA A VECES APLICANDO AGUA TAN CALIENTE COMO LA PUEDASOPORTAR.

Para Nash, es uno de nuestros mejores remedios en EL ZONA.

Comparar aquí con ars. alb., crot. tigl., dolich. prur., graph., mezer., ran. bulb.

ERISPELA, LO MAS A MENUDO DE CARA, con vesículas, supuración, escozory prurito externo; edema de piel, que está rojo oscuro en ese lugar; tendencia a ir DE IZQUIERDA A DERECHA al contrario de apis, que va de derecha a izquierda y se acompaña de coloración menos oscura, rosada, ausencia de supuración, de sed y mejora por frío.

Rhus tox. precede a menudo aquí al estado de ars. alb.

Fiebre

Cada vez que, en enfermedad febril, la inteligencia se vuelve confusa, nublada, o la estupefacción se instala con profundo grado de delirio suave, balbuceo, lengua seca, cubierta por capa oscura con triángulo rojo en la punta, gran sed, hay que pensar en rhus tox.; siempre que haya su agitación característica (Nash).

Fiebre adinámica con agitación y temblor.

Escalofríos pasajeros o continuos con sensación de ser salpicado con agua fría y seguidos de calor y deseo de estirar los miembros.

Sed durante el calor, raramente durante escalofríos.

Sudor en todo el cuerpo, excepto cabeza y cara.

En FIEBRE TIFOIDEA, el cuadro clínico que requiere rhus tox. es :delirio suave asociado a agitación mental y física con profunda postración; enfermo indiferente a todo y la sensación de gran debilidad está fuera de proporción con los otros síntomas; cuando se lo interroga, responde lentamente y contra su voluntad, a veces con vivacidad, jamás con violencia; tiene fuerte cefalea frontal cuyo dolor compara al que causaría una plancha fuertemente apretada sobre la frente; esta cefalea puede ser acompañada de epistaxis que alivia.

Lengua seca, marrón, agrietada, conserva impresión de dientes, con triángulo rojo en la punta.

Diarrea más o menos abundante, de olor cadavérico, con deposiciones marrón amarillento, a veces involuntarias, sobre todo durante el sueño.

Abdomen timpanizado, superficie del cuerpo seca y caliente y si hay transpiración, e copiosa, de olor agrio con rash miliar.

En fiebres intermitentes, la tos durante el escalofrío es característica.

Relaciones

Complementarios

Bryon., calc. fluor., ars. alb., bovista, en urticaria.

Antídotos

Anacard., croton tigl., mezer., cyriped., plumbago (eczema de vulva); graph., bryon., bell., rhodod.

Incompatible

Apis.

RUMEX CRISPUS

O Paciencia Silvestre, Paciencia Amarilla, planta vivaz de la familia de las Polygonáceas, crece en lugares húmedos. Se prepara la tintura madre con la que se obtienen, por diluciones hahnemannianas sucesivas, las diferentes dinamizaciones, haciendo macerar en alcohol a 90º, la planta recolectada durante la floración.

Acción general del medicamento

Rumex crispus sólo ha sido experimentado incompletamente; sus síntomas mentales han sido mal observados y la información que tenemos no es perfecta; pero sus síntomas catarrales han sido bien experimentados y los conocemos bien (Kent).

SU TENDENCIA CATARRAL es muy notable; bajo su influencia, todas las mucosas del árbol respiratorio se inflaman y esta inflamación va acompañada de MUCOSIDAD EXTREMADAMENTE ABUNDANTE.

"La he visto correr tan abundantemente por nariz, escribe Kent, que parecía continúa; también la he visto en tal cantidad por tráquea y bronquios que en poco tiempo el enfermo había expectorado un cuarto litro de mucosidades blancas como agua".

Pero en ciertos casos DISMINUYE SECRECIONES DE MUCOSA TRAQUEAL Y LARINGEA, provocando sequedad marcada en esas zonas con exaltación de sensibilidad; de ahí, alteraciones de voz y tos con sensación desagradable de cosquilleo; yendo apenas esta acción hasta la inflamación.

A veces toma carácter gripal, hay secreción mucosa abundante y expectoración líquida, acuosa, espumosa, emitida en verdaderas bocanadas; luego el mucus se hace espeso, blanco o amarillo, filamentosos, tenaz, tan difícil de expectorar que ni tosiendo no sonándose llega a expectorarlo.

Este estado catarral va generalmente acompañado por DIARREA MATINAL, que es rasgo importante de su acción. Actúa de manera marcada sobre PIEL donde determina INTENSO PRURITO AGRAVADO POR EXPOSICIÓN A AIRE FRÍO Y ALIVIADO POR CALOR, diferente del de sulf.

y merc.

Modalidades

Agravación

a) AL FRÍO, RESPIRANDO AIRE FRÍO, ESTANDO DESCUBIERTO : gran sensibilidad al aire frío, marcada sobre todo en vías respiratorias; tal vez ningún otro tiene mucosas de estas regiones tan sensibles al frío : debe cubrir su cabeza con las frazadas para no respirar el aire frío que enseguida excitaría la tos.

b) Sensible al aire frío, a baños fríos, como rhus tox., pero SE AGRAVA POR MOVIMIENTO.

Por eso, se podría confundir con bryon. pero éste no es tan sensible al aire frío; al contrario, bryon. puede aliviarse por aire frío y agravarse en cuarto caliente (Kent).

c) La sensibilidad nerviosa de rumex al aire libre es tan marcada como en nux. v. (Kent).

d) A LA NOCHE (excepto la diarrea que es peor a la mañana).

e) En hemitórax izquierdo.

f) Estando extendido (hyosc.).

Mejoría

POR CALOR

CABEZA

Dolor de cabeza catarral con gran irritación de laringe y tráquea, y sensación de magulladura dolorosa detrás de clavículas y esternón.

Estos dolores sobrevienen durante las fases de sequedad de mucosa alternando con aquellas en que domina secreción abundante (Kent).

Aparato digestivo

ESTOMAGO :

La mucosa gástrica parece interesada como las otras.

Digiere difícilmente y sólo el alimento más liviano y simple.

Dolores sordos, constrictivos, sofocantes, en epigastrio hasta la espalda.

La ropa parece muy ajustada.

Dolores sordos en hueco de estómago que se extienden al pecho, con sensación de presión como de bola en hueco de estómago, a veces con sensación de subir hasta detrás del esternón; agravación después de comer y mejoría permaneciendo acostado muy tranquilo.

Dolor lancinante en hueco de estómago que irradia al pecho, particularmente a la izquierda, dolor sordo, o lancinante, en hueco de estómago, y arriba, de cada lado del esternón.

SE AGRAVA HABLANDO; ES CURIOSO OBSERVAR COMO SE AGRAVAN HABLANDO LOS SÍNTOMAS DE ESTOMAGO; este parece magullado; se grava caminando, respirando aire frío; necesita cosas calientes.

ABDOMEN Y DEPOSICIONES :

Flatulencia abdominal y gástrica, con dolores, por gases; dolores aliviados por emanaciones y emisiones de gas (carb. veg.).

DIARREA parecida a sulph., podoph., y nat. sulf., en que SOBREVIENE LA MAÑANA Y ES TAN IMPERIOSA QUE OBLIGA A LEVANTARSE ENSEGUIDA PARA EVACUAR; pero es una diarrea marrón, maloliente, QUE TIENE TENDENCIA A ACOMPAÑARSE DE TOS.

Tal diarrea se encuentra a veces en tisis y rumex será muy útil.

Aparato respiratorio

NARIZ :

Coriza con sensación de obstrucción nasal y de sequedad hasta en rino-farinx.

Coriza que comienza por sensación de sequedad muy marcada en parte posterior de nariz y rino-farinx a tal punto que carraspea continuamente; irritación inflamatoria grande que no puede dejarla tranquila; sensación de mucosa como gruesa; de picoteo, comezón, desde punta de nariz hasta faringe y se suena sin cesar, estornuda y carraspea. Esta inflamación puede descender a laringe, tráquea, bronquios, y alcanzar terminaciones bronquicas, desencadenando bronquitis capilar o neumonía (Kent).

Estornudos violentos con el coriza que es fluente sobre todo a la tarde y noche, como muchos síntomas del remedio.

Coriza líquido con estornudos y dolores de cabeza, agravando al atardecer y la noche.

Acumulación de mucosidades en rino-farinx, muy difíciles de expectorar.

Secreción de mucosidades amarillas detrás de la nariz, en rino-farinx.

Epistaxis, estornudos violentos e irritación violenta de fosas nasales (Kent).

LARINGE, BRONQUIOS Y PULMONES :

Sensación de comezón e irritación de faringe y tráquea; carraspea continuamente; afonía, no puede hablar porque las cuerdas vocales están cubiertas de mucosidades tenaces que tiene gran dificultad para expectorar.

Caust. afonía por estado paralítico de cuerdas vocales; phosph. : afonía aliviada carraspeando y sacando mucosidades allí acumuladas.

Sensación de bola en garganta, no aliviada al tragar o carraspear; parece descender y desaparecer cuando traga, pero el movimiento de deglución terminado, enseguida sube (este es también un gran síntoma de lach.).

Afecciones catarrales de garganta y rino-farinx.

Este remedio muestra las fases sucesivas de un gran resfrío, pero es sobretodo indicado en los que TOMAN FRÍO CONTINUAMENTE, SE AGRAVAN AL MENOR CAMBIO DE TIEMPO, ESTÁN SIEMPRE TIRITANDO, NO ABANDONAN EL RINCÓN AL LADO DEL FUEGO, QUIEREN ESTAR MUY ABRIGADOS, AUN LA CABEZA (KENT).

Afonía después de exponerse al frío, con mucosidades tenaces en laringe y deseo continuo de carraspear.

COSQUILLEO EN EL FONDO DE LA GARGANTA QUE PROVOCA TOS; trata de luchar tanto como puede contra la tos por la sensación de ardor y desolladura que experimenta en laringe y tráquea.

TOS INCESANTE, VIOLENTA, SECA, FATIGANTE, CON POCO O NADA DE EXPECTORACIÓN.

AGRAVADA AL HABLAR, POR PRESIÓN Y SOBRE TODO AL RESPIRAR AIRE FRÍO, DE NOCHE.

(Phosph., spong.), PASANDO DE CUARTO CALIENTE A PIEZA MÁS FRÍA O AL AIRE FRÍO (byron. y nat. carb. lo contrario).

Tos con dolor detrás del esternón.

Tos ronca, perruna, algunos instantes después de acostarse o por ataques, hacíalas 23 hs. o entre 2 y 5.

Lach., tiene un síntoma similar; en él, se ve a niños, toser así durante el primer sueño, pero si se los mantiene despiertos no tosen más : esta tos corresponde a la agravación general por el sueño.

En rumex, al contrario, la tos sobreviene hacia las 23, duerma o no el niño.

Tos seca, atormentadora, impide dormir; agravada por presión, por hablar, y ESPECIALMENTE DE NOCHE, Y RESPIRANDO AIRE FRÍO; la tos se agrava, no solamente por frío; sino POR TODO LO QUE AUMENTA EL VOLUMEN O RAPIDEZ DE AIRE RESPIRANDO; debe permanecer sentado sin moverse; no puede respirar rápido ni profundamente, ni irregularmente, porque eso provoca violentos accesos de tos con violenta sensación de ardor en laringe y tráquea.

El ataque es tan violento que lo tiene a la mañana, al despertar, al mismo tiempo que la necesidad de evacuar, emitirá la evacuación involuntariamente.

También la orina corre involuntariamente durante el ataque. (caust.).

Gran sensación de ardor y escozor en laringe y tráquea.

DOLOR DE MAGULLADURA, DE DESOLLADURA DETRÁS DE CLAVÍCULAS, con sensación como si el tejido estuviera en carne viva, si a cada inspiración, el aire frío pasara por esa parte y avivara la sensación de desolladura y ardor.

Calmante precioso en tisis avanzada; ayuda a soportar un invierno más.

Con rumex, puls., senega, ars. alb., y nux v. se podrán aliviar los últimos años de un tísico.

Con respecto a la diarrea de la mayoría de casos de tisis, acet. ac. se puede recomendar; pero, a menos que sea muy marcado, vale más dejar este estado tranquilo; si tal diarrea es muy agotadora, más vale emplear un remedio simple como éste para disminuirla un poco; pero si hay sólo un poco de diarrea, una sola deposición líquida a la mañana, esto es mejor para el tísico; en cuanto a sudores nocturnos, cuanto más se trate de detener estos emuntorios naturales, de cerrar estas válvulas, más se perjudicará al enfermo, y si se llega a esto, vale más abandonar la homeopatía pues sólo se podrán calmar los sufrimientos del paciente con morfina.

Los dolores sordos, las sensaciones de magulladura, de fatiga dolorosa del tísico, se calmarán con arnica que también calmará la tos y traerá el sueño.

Más tarde, pyrog. puede calmar dolores de huesos y accesos de tos dolorosa.

Así se lleva a tropezones, al enfermo, de un año a otro.

A veces necesita ars. alb. y generalmente hay que repetirlo más frecuentemente.

Otras, lycop. o puls.

Pero finalmente se produce la decadencia vital, y estos remedios, aún repetidos cada vez con mayor frecuencia ya no surten efecto.

Poco a poco se instala una terrible disnea, la superficie respiratoria disminuye y hay falta de aire, extremidades edematizadas, mayor adelgazamiento, facies hipocrática y fallo cardíaco, sudor frío; debilidad cada vez mayor.

Siempre se puede aliviar con tarent. cub. que provocará una eutanasia que nada tiene de comparable con los efectos de la morfina (Kent).

Piel

ERUPCIÓN CARACTERIZADA POR COMEZÓN INTENSA EN CUANTO SE DESVISTE PARA ACOSTARSE.

Es vesiculosa o parecida a urticaria simple.

PRURITO VIOLENTO EN REGIONES VARIADAS; AGRAVADO POR FRÍO; MEJORADO POR CALOR; PEOR AL DESVESTIRSE O EXPONERSE AL AIRE (hep. sulf. calc., nat. sulf., oleand.; en éste último hay más ictericia y síntomas de paludismo; si se trata de comezón general agravada por calor, sobre todo calor de la cama, pensar en merc. sol. o merc. protoiod.) (Nash).

RUTA GRAVEOLENS

Planta herbácea vivaz, familia de la Rutáceas crece en el Mediodía de Europa y Norte de África.

También se cultiva en jardines, pero la silvestre es más activa y es la que se emplea para la preparación del remedio; tiene olor fuerte, fétido, penetrante, característico.

Las diferentes dinamizaciones se preparan por diluciones hahnemannianas sucesivas, partiendo de la tintura madre obtenida por maceración en alcohol a 90º de hojas y botones floríferos recogidos un poco antes de que abran las flores.

Acción general del medicamento

Aplicada en estado fresco sobre la PIEL, irrita violentamente y determina inflamación con enrojecimiento y tumefacción y flictenas.

Ingerida y en dosis ponderables, inflama mucosa de estómago y duodeno, no tardando en producir un poco de narcotismo con agitación y excitación nerviosa y finalmente, si es una mujer encinta, irritación espasmódica de útero y expulsión de feto.

Es, para nosotros, un remedio importante, por su INFLUENCIA SOBRE TEJIDO FIBROSO, APONEUROSIS Y TENDONES, particularmente flectores (Kent).

Las MUÑECAS parecen ser uno de los principales lugares de elección en su acción sobre estos tejidos.

Tiene acción pronunciada sobre PERIOSTEO y parece actuar particularmente bien sobre él, después de haber sido lesionado por traumatismo, intervención quirúrgica.

Tiene tendencia a FORMACIÓN DE DEPÓSITOS, NUDOSIDADES, en tendones, alrededor de articulaciones y en periosteo (Nash).

Características

1) SENSACIÓN DE MAGULLADURA, FATIGA DOLOROSA, EN TODO EL CUERPO COMO DESPUÉS DE CAÍDA, PERO MÁS MARCADA EN MIEMBROS Y ARTICULACIONES.

Todas las partes del cuerpo sobre las que reposa están dolorosas, como magulladas y ESTO LE HACE CAMBIAR CONTINUAMENTE DE POSICIÓN (bapt., pyrog., arnica); no tiene descanso, cambia sin cesar de posición cuando está acostado; tan agitado como rhus tox.

Modalidades

Agravación

a) POR FRÍO HÚMEDO, como rhus tox.

b) POR REPOSO; ESTANDO ACOSTADO, sobre todo los dolores.

c) HACIA LA NOCHE : tendencia a melancolía hacia la noche.

Mejoría

a) Por movimiento, siempre como rhus tox.

Síntomas mentales

Aquí no hay nada muy particular; irritable, de mal humor, descontento de los otros y de sí mismo.

También puede estar deprimido, triste, inquieto, abatido, sobre todo hacia la noche.

Ojos.

Si fatiga la musculatura del ojo leyendo caracteres demasiado finos o mal impresos, con trabajos de costura demasiado fina, si ABUSA DE LA VISTA por trabajo demasiado minucioso o prolongado, puede tener en los ojos sensación de FATIGA DOLOROSA, se ponen ROJOS, CALIENTES, ARDIENTES, con dolores de cabeza.

En tal caso, ruta grav. podrá ser de suma utilidad.

Pero hay que distinguirlo de onosmod. y arg. nit., que con nat. mur. se parecen por el dolor de cabeza por fatiga de ojos.

También hay que pensar en mang. acet.

Aparato digestivo

Muy sediento de agua fría, como phosph. (Kent).

Constipación con PROLAPSO RECTAL cuando quiere evacuar; necesidades frecuentes sin resultados con prolapso anal; salida de recto después de parto; dolores de recto estando sentado (Kent).

Prolapso de recto al tratar de evacuar, o si la deposición tiene la menor dificultad para pasar; o si lleva vida demasiado sedentaria; ruta se parece mucho a ignat. en esto; ambos se agravan al agacharse, levantar algo pesado, evacuar; mur. ac. y podoph. también deben tenerse en cuenta : con el primero, prolapso de recto muy doloroso y

sensible al menor contacto, al menor tacto, hasta de la sábanas; el recto desciende también al orinar (aloe) el prolapso del segundo va casi siempre acompañado de diarrea característica y puede ser resultado de esfuerzo; también puede haber prolapso uterino.

Aparato urinario

Sensación constante en vejiga, como si estuviera llena aún después de la micción; fin de micción doloroso.

Espalda extremidades

SENSACIÓN DE FATIGA DOLOROSA EN ESPALDA.

Dolor de magulladura en vértebras lumbares.

Dolores de espalda y coxis como si se hubiera magullado por golpe o caída.

SENSACIÓN DE AGOTAMIENTO GENERAL; miembros inferiores que parecen incapaces de sostenerlo por lo débiles que le parecen caderas y muslos (phosph., conium); las piernas flaquean al levantarse de la posición sentado.

Los dolores son a menudo provocados por forzada o esguince de articulación (rhus tox.).

Dificultad para mover la muñeca o tobillo después de entorsis; al principiodar arnica y pronto rhus tox., pero cuando se forman nudosidades de tendones de articulaciones lesionadas, dar ruta.

Tendones dolorosos, como magullados.

Muslos dolorosos al estirar las piernas.

Contractura de tendones flexores de manos y pies.

Dolores en tendón de AQUILES, (act. rac.).

Dolor de ciática que desciende desde espalda a caderas y muslos, soportable de día, pero agravado en cuanto se acuesta a la noche. (graph.).

Piel

Erupciones de piel con comezón que cambia de lugar cuando se rasca la región pruriginosa. (Mezer).

SABADILLA

O veratrum sabadilla, o cebadilla (de Cebada), planta herbácea vivaz

de la familia de las Colchicáceas originaria de México.

Su raíz es un rizoma tuberoso; su tallo termina en espiga de flores púrpura negruzco; fruto rojizo que se compone de 3 folículos oblongos que contienen semillas, generalmente tres, negruzcas y angulosas; pulverizadas, llevan el nombre vulgar de polvo de capucina.

El sabor de las cápsulas es algo amargo; el de la semillas acre y cáustico; son extremadamente venenosas y encierran un alcaloide, la veratrina, cuyo poder tóxico es considerable.

Para uso homeopático se emplean las semillas con sus cápsulas pulverizadas, y con ellas se obtienen las tres primeras dinamizaciones por trituración hahnemanniana.

Acción general del medicamento

Además de una influencia muy particular sobre LA MENTE en que provoca síntomas tan marcados como especiales, actúa fuertemente sobre MUCOSAS, particularmente de vías respiratorias superiores y tubo digestivo.

En ciertas patologías se han visto síntomas de PIEL bastante marcados.

Modalidades

Lateralidad

DE IZQUIERDA DE DERECHA (lach.); dolores y estados inflamatorios de garganta comienzan a la izquierda y ganan la derecha, como lach. pero en éste el calor agrava los dolores y provoca espasmos de garganta con sensación de ahogo que la hace desear bebidas frías que lo alivian y traga más fácilmente; en sabad. se alivia por calor, externo o interno (Kent).

Agravación

a) POR FRÍO : "Tirita, sensible a cuarto frío, a alimentos y bebidas fríos que agravan; quiere estar bien abrigado; quiere bebidas calientes para calentar su estómago; propenso a estados catarrales y entonces pide aire caliente, si es catarro nasal, bebidas y alimentos calientes, si es inflamación catarral de garganta; las cosas calientes lo reconfortan; dificultad para tragar cosas frías, esto aumenta sus dolores" (Kent).

b) CON LUNA LLENA.

Mejoría

POR BEBIDAS CALIENTES, ALIMENTOS CALIENTES, ESTANDO BIEN ABRIGADO.

Síntomas mentales

Presenta estado mental tan curioso como particular en sus síntomas : "Lleno de TRASTORNOS IMAGINARIOS; ideas extrañas con respecto a los demás y a sí mismo; impresiones erróneas con respecto a estado de su cuerpo; por ej. : imagina que su cuerpo se marchita, que sus miembros están retorcidos o encogidos, que su mentón se ha alargado, que está más gordo de un lado que del otro; aunque pueda ver que todo esto no es verdad, está persuadido de que así es; convencido de que tiene una espantosa enfermedad de garganta cuyo fin será fatal; imagina estar encinta cuando sólo está hinchada por gases.

Todo esto no es fundado : son enfermedades imaginarias, sin embargo sufren a veces más que si fuera real.

Aquí, pueden compararse algunos remedios : thuya, imagina que su cuerpo es de vidrio y tiene miedo terrible de que se rompa; puls. : gran temor de la mujer que cree perderá su alma; anacard. : cree tener un diablo sentado sobre el

hombro, que le habla al oído, mientras en el otro un ángel parece a su vez hablarle, y no sabe a cual escuchar; iod. : lleno de ideas fijas, etc.

Delirio por intermitencia.

Gran disposición a dormir de día; se duerme leyendo, pensando, reflexionando; el esfuerzo mental, que aumenta el dolor de cabeza, provoca sueño; reflexionando, sentado en su sillón, se duerme como nux mosch. y phosph. ac. (Kent).

Cabeza

Puede estar cubierta de sudor frío : muchos síntomas de ver. alb.

están estrechamente ligados, particularmente el sudor frío en la frente, que también acompaña muchos trastornos para los que es apropiado.

Muchos DOLORS DE CABEZA.

A menudo se levanta a la mañana con dolor de cabeza que aumenta.

Dolor de cabeza unilateral.

Meditación, esfuerzo mental, que lo impulsan al sueño, provocan dolor de cabeza.

Dolores de cabeza en escolares; niños débiles que deben suspender la escuela por sus dolores de cabeza y regresan a casa con toda clase de imaginaciones raras con respecto a la escuela y a sí mismo.

Dolor de cabeza estupefactivo, dolor en senos frontales, sobre los ojos, asociado a coriza.

Cefalalgia estupefactiva asociada a coriza; sensación de plétora, estallido, embrutecimiento, agravado por sacudidas, estornudos, caminar (Kent).

Vértigos, aturdimientos; despierta de noche con vértigo; vértigo al aire libre, en cualquier ocasión (Kent).

Aparato digestivo

BOCA Y GARGANTA :

Sequedad de garganta; sensación como si tuviera una astilla en la garganta que lo obliga a esfuerzos para tragar; aspereza y picazón de garganta con necesidad de tragar.

Todo más marcado a la izquierda, o va de izquierda a derecha (lach.) y se alivia por bebidas calientes.

ESTOMAGO :

Gran deseo de bebidas y alimentos calientes.

Apetito extraño, generalmente en mujeres encintas ; dicen que no tienen hambre hasta que tienen aversión por los alimentos, verdadero asco por todo lo que se les ofrece; pero si, al hacerlas razonar consienten en tomar un bocado, encuentran que está rico y el apetito vuelve y hacen una buena comida (Kent).

Asco por todo alimento, carne, alimentos agrios, café, ajo.

Hambre mórbida o aversión por los alimentos.

Deseo violento de cosas dulces y farináceas.

Pirosis; salivación copiosa; vómitos de vermes.

ABDOMEN Y DEPOSICIONES :

Cólicos; retortijones con dolores como por hojas de cuchillo.

Dolores ardientes de abdomen.

Diarrea; deposiciones marrones y como fermentadas.

Hormigueo pruriginoso en recto y ano.

Gran remedio contra VERMES INTESTINALES, particularmente oxiuros.

Órganos genitales

Reglas tardías, algo antes de su aparición, sensación dolorosa de tirones hacia abajo, en útero.

Reglas disminuidas, que corren irregularmente, caprichosamente, con fuerza poco marcadas; reglas intermitentes (puls., kreosot.).

Dolores cortantes, como por cuchillo, en ovario.

Ninfomanía provocada por vermes.

Aparato respiratorio

Coriza con ESTORNUDOS CONTINUOS y sensación como si la mucosa nasal estuviera en carne viva; sensación de ardor y obstrucción en nariz.

Secreción de mucosidades líquidas primero, enseguida espesas, mejora respirando aire caliente, el olor a flores lo agrava; al sólo pensar en el olor de flores, estornuda y la secreción de coriza aumenta.

El estornudo es un gran síntoma de irritación de mucosa nasal de sabad.

Útil cuando el estado catarral de mucosa nasal se prolonga, en casos de coriza persistente que no cede a remedios habituales; en coriza prolongados cuya secreción aumenta por el olor de flores (Kent).

En "HAY-FEWER", cuando hay ATAQUES DE ESTORNUDOS ESPASMÓDICOS; aunque a veces hay secreción marcada, nariz con sensación de obstrucción y respiración difícil; y violenta comezón en fosas nasales, fuertes dolores en raíz de nariz y frente, enrojecimiento de párpados y gran sensibilidad a olor de flores y ajo que aumenta estornudos.

Comparar esto con algunos medicamentos, en resfrío de heno : en ciertos casos, comezón muy marcada de velo de paladar, tal que está obligado a frotarlo con la lengua, todo con coriza y estornudos, etc.; wyethia detendrá esto.

Cuando la comezón se extiende a laringe y tráquea, con gran irritabilidad y sensibilidad al frío, nux. v.
Cuando la secreción es tan irritante y con tanto escozor que labio superior y fosas nasales están rojos e inflamados, ars. alb.

Si hay nariz suave, euphras.; all. cepa, lo contrario : secreción suave por los ojos e irritante por nariz.

Piel

SECA, como pergamino.

Sensación de calor, ardor; hormigueo.

Carne de gallina.

Relaciones

Antídotos

Puls., lycop., conium., lach.

SABINA

Juniperus sabina, o sabina, arbusto de la familia de las Coníferas, crece en colinas áridas del Mediodía de Europa, Italia, España, Grecia; se cultiva como planta ornamental.

Se conocen dos clases : una alta de 3 a 4 metros, sabina macho, o con hojas de ciprés; otra más pequeña, sabina hembra, o con hojas de tamarindo.

Para uso homeopático se usan indistintamente hojas de sabina macho o hembra recogidas en primavera, para preparar la tintura madre de la que se obtienen las diversas dinamizaciones por diluciones hahnemannianas sucesivas.

Acción general del medicamento

Tiene acción generalmente limitada a RIÑONES, VEJIGA, PARTE TERMINAL DE TUBO DIGESTIVO-RECTO y ANO-, Y SOBRE TODO ÚTERO; provoca profundo desorden en su sistema circulatorio, con TENDENCIA NETA A SANGRAR que ocupa un primer lugar entre los indicados contra pérdidas sanguíneas de esas regiones. Actúa sobre SEROSAS ARTICULARES y es de gran indicación en ciertas formas de gota.

Características

1) METRORRAGIA CON FLUJO PAROXISTICO DE SANGRE CLARA, LÍMPIDA, CON DOLORES EN ARTICULACIONES.

Amenaza de aborto en el 3er. mes de embarazo.

CON DOLORES EN BASE DE RIÑONES QUE VAN HASTA MUSLOS; SENSACIÓN DE MAGULLADURA, ROTURA, A LO LARGO DE CARA ANTERIOR DE MUSLOS.

Metrorragia con las siguientes características : la hemorragia tiene tendencia a producirse POR PAROXISMOS; se AGRAVA POR EL MENOR MOVIMIENTO (secale), sangre fluida que se COAGULA ENSEGUIDA, u oscura (kali nit., cyclam.), y EN COÁGULOS (crocus) o en PARTE COÁGULOS EN PARTE LIQUIDA (ferrum), éstos son muy negros.

Parece consecuencia de pérdida de tonicidad de útero (cauloph.) después de parto o aborto, con dolores que van DE ESPALDA A PUBIS; este dolor es su gran característica y se ve no solamente en hemorragias sino también en amenazas de aborto y trastornos menstruales, en que está indicado.

Como puls., se AGRAVA POR AIRE CALIENTE, EN CUARTO CALIENTE, MEJORA EN HABITACIÓN FRESCA, AL AIRE LIBRE; esto se ve a veces con reglas muy profusas : en este caso no habría que dar puls. que aumentaría el flujo menstrual.

Respecto al dolor característico de sabina en el aborto su modalidad de dirección de espalda a pubis, no debe confundirse con vib. opul. que comienza en espalda, irradia alrededor y termina en calambres de útero.

2) HINCHAZÓN ARTRÍTICA DE ARTICULACIONES DE MUÑECA Y DEDOS GRANDES DE PIE.

GOTA CON DOLORES ARTRÍTICOS : estado que alterna con hemorragia ; cuando sufre de gota, no hay hemorragia; cuando empieza a sangrar, la gota desaparece (Kent).

Modalidades

Agravación

a) AL AIRE CALIENTE, POR CALOR, EN CUARTO CALIENTE (puls., apis).

Se siente incómodo en cuarto caliente, estando abrigado; desea tener ventanas abiertas o estar al aire libre.

b) POR EL MENOR MOVIMIENTO.

Mejoría

AL AIRE FRÍO, AL AIRE FRESCO, AL AIRE LIBRE.

Síntomas mentales

LA MÚSICA LE ES INSOPORTABLE; determina agitación nerviosa (nat. carb.), especie de desfallecimiento nervioso, sensación extraña, como vibración, a lo largo de médula ósea (thuya : La música da ganas de llorar).

Cabeza

Vértigo con supresión de reglas.

Flujo de sangre a cabeza y cara.

Dolor tironeante en músculos maseter.

Aparato digestivo

Sensación de plenitud en ano con HEMORROIDES Y PERDIDAS ABUNDANTES DE SANGRE ROJA, BRILLANTE.

Constipación con hemorroides que sangran copiosamente y sensación de plétora en ano.

Aparato urinario

Dolores ardientes, SENSACIÓN DE ARDOR Y LATIDOS EN REGIÓN RENAL.

Grandes sufrimientos en aparato urinario, con síntomas inflamatorios; ORINASANGUINOLENTA CON NECESIDAD CONTINUA DE ORINAR Y SENSACIÓN DE PULSACIONES, LATIDOS, EN TODO EL CUERPO; AGRAVACIÓN GENERAL POR CALOR (Kent).

Retención de orina con emisión ardiente que corre gota a gota alternada con emisión de orina abundante (Jousset).

Órganos genitales

MASCULINOS :

Inflamación dolorosa de uretra con secreción de pus.

Útil en casos de inflamación gonorréica de uretra con secreción como pus.

Dolores de glándula que está rojo oscuro y retracción de prepucio difícil (fimosi).

Induración de dorso de verga.

Exaltación de apetito venéreo, en los dos sexos.

FEMENINOS :

Este es su radio de acción más importante; sus síntomas se relacionan con trastornos de menstruación asociados a hemorragias uterinas (Kent).

REGLAS PROFUSAS, DEMASIADO PRECOCES, DURAN DEMASIADO; DE SANGRE EN PARTE LIQUIDA, ROJO BRILLANTE, EN PARTE COAGULADA (ferr.); en niñas que se desarrollan demasiado pronto; la sangre corre por paroxismos CON CÓLICOS COMO DE PARTO; DOLORES DE SACRO A PUBIS.

Reglas que duran demasiado, demasiado abundantes, y a veces la secreción no cesa, se prolonga hasta el período siguiente; reglas demasiado abundantes, demasiado prolongadas, demasiado frecuentes; secreción líquida, rojo vivo, mezclada con coágulos.

Con dolores tironeantes de arriba a abajo, cólicos como de parto y dolor violento de atrás a adelante, de sacro pubis o útero y muslos; dolores lancinantes como cuchillada que escuecen, suben a lo largo de vagina, hasta útero arrancando a veces con cada punzada, gritos a la enferma : estos dos rasgos, dolores lancinantes de atrás a adelante, de sacro pubis, y de abajo a arriba, en vagina, son confirmación marcada de su indicación (Kent).

Útil cuando, durante un período menstrual, la secreción disminuye, cesa durante algún tiempo; sobrevienen cólicos como de parto y emite un enorme coágulo semi descompuesto y vuelve la secreción abundante de sangre rojo vivo (Kent).

Hemorragias uterinas abundantes con cólicos uterinos.

Dolores constrictivos parecidos a los de parto, y que se extienden de espalda a pubis con gran deseo de orinar; emisión dolorosa de grandes coágulos, luego de sangre rojo vivo, en chorros.

Aquí se puede comparar a ipeca que tiene violenta hemorragia uterina de sangre rojo vivo tan abundante como sabina; pero en ipeca, desde el principio de la hemorragia, antes de que sea bastante abundante y prolongada como para provocar por agotamiento sanguíneo tales síntomas, la cara se pone pálida, hay náuseas y estado sincopal demasiado precoz para ser consecuencia secundaria de hemorragia, y que es el síndrome patogenético del remedio. Millef. : secreción continua, gota a gota, durante días y días, de sangre rojo vivo.

Secale : se parece a sabina pero su secreción es de sangre oscura, maloliente, coagula difícilmente, casi acuosa al cabo de cierto tiempo, abundante y continua, como si el útero no pudiera ya contraerse; mejora por frío.

Phosph. : se parece un poco a sabina : secreción abundante de sangre rojo vivo con o sin coágulos; lo que lo indica es su facies, lengua seca, con sed violenta, inextinguible, de agua helada (Kent).

ABORTO O PARTO PREMATURO; HEMORRAGIA UTERINA DE SANGRE EN PARTE ROJO-CLARO Y EN PARTE EN COÁGULOS, AGRAVADA POR EL MENOR MOVIMIENTO (secale), A MENUDO ALIVIADA POR CAMINAR Y CON DOLORES QUE SE EXTIENDEN DE SACRO A PUBIS (Allen).

Bell. Y sabina son los dos más importantes en aborto de 3er mes; ambos tienen los mismos dolores de expulsión para eliminar un gran coágulo, luego viene un flujo abundante de sangre rojo vivo; pero el estado de bell. no se parece a sabina.

En bell. hay hiperestesia nerviosa extremadamente marcada al tacto, sacudidas, etc.

El menor golpe dado por la enfermera a la cama le es insoportable; la sangre de hemorragia es caliente, pero demasiado caliente para la piel hipersensible sobre la que corre; es hipersensible a la luz, etc.

Hay muchos dolores, no solamente lancinantes de abajo a arriba, sino en todos sentidos; vienen y se van bruscamente, como relámpagos, aparecen e irradian en todas direcciones (Kent).

RETENCIÓN PLACENTARIA CON ATONÍA UTERINA; INTENSOS DOLORES DESPUÉS DEL PARTO (cauloph., secale).

La atonía uterina es uno de sus rasgos salientes; el útero no quiere contraerse a menos que sea excitado por la presencia de un coágulo en su cavidad (Kent).

Provoca expulsión de molas.

Secreción de sangre entre períodos menstruales con excitación sexual marcada (ambra).
Menorragia en menopausia en mujeres que han tenido numerosos abortos, o en niñas, en primeras reglas prematuras.
En viejas hemorragias uterinas con pérdidas que no terminan, molestas, que recomienzan a la menor provocación, detendrá la sangre, pero su acción no será de larga duración y la hemorragia volverá.
Si se quiere curar a la enferma, hay que darle un remedio constitucional : sulf. será a menudo el indicado (Kent).
Inflamación de ovarios o útero de aborto o parto prematuro.
Catarro crónico de vagina con granulaciones, leucorrea abundante, sanguinolenta : es útil cuando esto está ligado a leucorrea.
Excrecencias verrugosas en coliflor en labios o ano (thuya).
Verrugas con prurito intolerable y sensación de ardor; verrugas excoriantes (thuya, nit. ac.).
Espalda extremidades
DOLOR DE SACRO A PUBIS, DE UN HUESO A OTRO.
Dolores gotosos de articulaciones; nudosidades gotosas en articulaciones (amm. phosph.); arden tanto y están tan calientes que obligan a sacar manos y pies de la cama, de noche, si las articulaciones de esas regiones son alcanzadas.
Indicado en casos de gota en que los dolores alternan con hemorragias.
Relaciones
Complementarios
De thuya.
Antídotos
Puls.

SANGUINARIA

Sanguinaria canadensis o sanguinaria de Canadá, planta herbácea de la familia de las papaveráceas, crece en selvas de Estados Unidos y Canadá; se cultiva en jardines.
El nombre viene del jugo rojo como sangre que corre de su raíz al cortarla.
Para la tintura madre con la cual se obtiene, por diluciones hahnemannianas sucesivas, las diversas dinamizaciones, se hace macerar en alcohol a 90º la raíz, antes de que las hojas se desarrollen.
Acción general del medicamento
Actúa fuertemente sobre MUCOSAS A LAS QUE IRRITA violentamente, causando primero EXTREMA SEQUEDAD, ya sea conjuntiva, bucal, de tubo digestivo o vías respiratorias o cualquier otra región.
Alternan con esta sequedad SENSACIÓN DE AVIVAMIENTO, ARDOR, como si las mucosas estuvieran desprovistas de epitelio.
Otro efecto sobre mucosas es formación de PÓLIPOS que sangran de manera prolongada y profusa (Farrington).
TRASTORNOS VASO MOTORES caracterizados por enrojecimiento circunscripto de mejillas, TUFARADAS DE CALOR, AFLUJO DE SANGRE a cabeza y pecho, distensión de temporales Y SENSACIÓN DE ARDOR EN PALMAS DE MANOS Y PLANTA DE PIES.
No tiene acción profunda y larga.
Si se interrumpe una jaqueca periódica con sang., esta cura será momentánea y el dolor de cabeza volverá, a menos que se produzca una metástasis más grave, si no se da en el intervalo otro remedio de acción más profunda, constitucional.
Un enfermo muy debilitado por catarro de bronquios que dura largo tiempo y se hace sospechoso; toma frío al menor cambio de tiempo, si se expone a humedad, por la más pequeña corriente de aire, si se desabriga sensación de ardor de pecho, detrás de esternón, expectoración espesa, filamentosas, accesos de tos espasmódica que terminan en eructos; si se agrega a esta sensación de ardor de pecho, a dolores de laringe al hablar y de tráquea, a tos que termina en eructos, sensación de ardor en palma de manos y planta de pies.
Sang. atenuará el dolor y curará momentáneamente; muchos de estos casos son tratados con sulph., pero erróneamente.
Hay una serie de medicamentos que convienen más a estos estados tuberculosos que sulph., silic., o graph. : son puls., sang., senec. grac., cocc. cact., que atenúan este estado y puede traer mejoría tal del estado general que se puede dar un medicamento de acción profunda.
Hay que evitar esto si la vitalidad está muy disminuida, el organismo muy deteriorado por tratar de repararlo violentamente.
Hahnemann ha prevenido contra el empleo de phosph. en estos casos; sang. de acción superficial, procura sin inconvenientes, gran alivio (Kent).
Características
No presenta ningún "Keynote"; pero en su patogenesia se encuentran algunos síntomas generales bastante acusados.
1) GRAN DEBILIDAD Y POSTRACIÓN : Con el dolor de cabeza y muchos de sus síntomas hay sensación de debilidad, falta de fuerzas, desfallecimiento, con sensación de vacío de estómago, de falsa hambre; que en realidad es falsa hambre pues sang. tiene verdadera aversión por el alimento (Kent).

Debilidad y desfallecimiento; gran debilidad; sobre todo durante y después de los vómitos, o gran debilidad de piernas, de noche, al pasear al aire libre (Jahr).

2) TUFARADAS DE CALOR Y TRASTORNOS VASO MOTORES :GRAN SENSACIÓN DE CALOR ARDIENTE EN PALMAS DE MANOS Y PLANTA DE PIES, QUE A VECES OBLIGA A SALIR DEL LECHO DE NOCHE, COMO sulph.

3) ACRTUD DE SECRECIONES Y DOLORES ARDIENTES :Son otro trazo saliente que se ve a lo largo de su patogenesia.

4) VARIABILIDAD CONTINUA DE SÍNTOMAS :El enfermo sufre, y a de jaqueca, síntomas de pecho, diarrea, constipación, etc.

Modalidades

Lateralidad

DERECHA : se adapta principalmente a trastornos orgánicos predominantes del lado derecho.

Agravación

a) Estando acostado sobre la derecha.

b) De noche.

c) Por tacto, movimiento.

d) Por ruido.

Mejoría

a) Por sueño, oscuridad.

b) Por aire frío.

c) Por ácidos.

Síntomas mentales

ANSIEDAD casi siempre presente en sang.; aparece dando calificación a dolores de cabeza, trastornos gástricos, síntomas de pecho o aparato circulatorio; INQUIETUD, de noche, gran aprensión que impide quedarse en cama; GRAN AGITACIÓN, no puede estar largo tiempo en la misma posición.

Gran IRRITABILIDAD DE CARÁCTER, que lo hace fúnebre, de mal humor, irritable, fácilmente excitable; GRAN SENSIBILIDAD MORAL : la menor contrariedad aumenta todos sus sufrimientos.

La fatiga general se manifiesta aquí por TORPEZA MENTAL; FATIGA CEREBRAL FÁCIL; no puede concentrar su mente largo tiempo; tiene fácilmente ideas confusas; memoria débil; olvida palabras y cifras al escribir.

En ciertos casos de delirio vago y consciente, delirio de persecución.

Temor enfermizo de ser envenenado, a veces con impulso ansioso al suicidio.

Sueño

Mucha dificultad para dormirse en la primera parte de la noche; insomnio antes de medianoche.

Más tarde, sueño agitado, no reparador; este sueño es tan ligero que despierta al menor ruido, como sulph.; a veces despierta sobresaltado como si fuera a caer.

Cabeza

Es uno de sus principales puntos de elección en su acción.

Dolor de cabeza nauseoso; sufre de aflujo de sangre a la cabeza que causa desfallecimiento y estado nauseoso marcado que llega a vómitos; LOS DOLORES, DE CARÁCTER LATENTE, EN TODO CASO AGUDO, LANCINANTES, COMIENZAN EN REGIÓN OCCIPITAL, SE EXTIENDEN A LA CABEZA PARA FIJARSE FINALMENTE EN REGIÓN SUPRA ORBITAL, GENERALMENTE DERECHA (ojo izquierdo spig.); en el momento de la crisis, no puede soportar olores, ni que caminen en la pieza donde está, el menor crujido le es insoportable; vomita a menudo en ese momento alimentos y bilis.

Debe estar acostado en habitación oscura y sólo tiene sosiego cuando el sueño viene a aliviarlo; a veces el dolor es tan violento que pierde la cabeza o busca alivio apretando fuertemente su cabeza con las manos o hundiéndola en su almohada.

Comparar aquí bell. : intolerancia a luz y ruido y localización particular derecha.

Pero bell. tiene casi siempre pies fríos y cabeza caliente lo que no siempre está presente en sang.; el enfermo de bell. no se alivia acostándose, sino sentándose en su lecho; no sigue necesariamente la dirección del desarrollo de los dolores de sang., que comienzan en occipucio para ganar la región supra orbitaria derecha, dirección imperativa en sang.; sang. es más útil que bell. en forma gástrica de la jaqueca.

Mell. alba. : violento dolor de cabeza con congestión intensa; le parece que el cerebro va a estallar a través de la frente y el dolor latente es casi tan violento como en glon. llevando casi hasta el furor el enfermo.

Iris vers. : jaquecas periódicas, principalmente las que sobrevienen en domingo, porque el esfuerzo de seis días de trabajo precedente ha cesado y el paciente que siente los efectos de ese esfuerzo sufre la jaqueca; dolores intensos, de carácter latente; supra orbitarios, afectan las dos regiones por encima de los dos ojos, causando a veces ceguera temporaria; en el máximo del dolor de cabeza puede haber vómitos de materia amarga o agria o ambas (Farrington). Ver act. rac.

Dolor de cabeza con estado congestivo; aunque comience a la mañana, sube desde el occipucio para fijarse sobre el ojo derecho, cabeza caliente y dolorosa.

Pulsaciones en cabeza con vómitos amargos, agravadas por movimiento; pero esta agravación no es tan acusada como en bryon.

Dolor de cabeza como si la frente fuera a estallar con escalofríos y ardor de estómago.

Dolor de cabeza arriba del ojo derecho.

Dolor de cabeza periódico con vómitos, comienza a la mañana, aumenta en el día y dura hasta la noche, la cabeza da sensación de querer estallar o como si los ojos quisieran salir de las órbitas; latidos dolorosos lancinantes a través del cerebro, peores a la derecha, sobre todo en frente y vértex, con escalofríos, náuseas, vómitos alimenticios o biliosos, está obligado a acostarse, estar tranquilo; mejora por sueño; luz, ruido, movimiento lo agravan (Kent).

Dolor de cabeza persistente de salida a puesta de sol (gels., glon., nat. mur., spig.).

No se encuentran todos estos síntomas en cada caso, pero todos contribuyen a describir el dolor de cabeza de sang. (Kent).

DOLOR DE CABEZA PERIÓDICO, comienzan de mañana, aumenta durante el día y disminuye a la noche; dolor de cabeza periódico QUE SOBREVIENE CADA 7 DÍAS, comienza de mañana cuando despierta, o lo despierta un dolor occipital que sube poco a poco hasta el vértice de la cabeza, para fijarse sobre ojo derecho o temporal derecho; se agrava de día por luz, a tal punto que busca una pieza oscura donde acostarse porque el movimiento también lo agrava; LOS DOLORES DE CABEZA SE ALIVIAN EXPULSANDO GASES.

Sulph., silic. también tienen dolores de cabeza periódicos cada 7 días; esto no quiere decir que no pueden curar otros dolores de cabeza; sang. por ej., tiene dolor de cabeza que vuelve cada 3 días.

La mayoría de dolores de cabeza que sobrevienen cada 15 días, son curados por ars. alb., o al menos aliviados, sobre todo en sujetos debilitados (Kent).

Dolor de cabeza por desarreglo de estómago, después de comer mucho o alimentos muy pesados o bebido vino; sang. es casi tan inútil como nux. v., en viejos bebedores; sujetos que han arruinado su estómago y destruido su buena digestión bebiendo demasiada cerveza; no puede ya comer, ningún alimento o líquido puede quedar en su estómago, vomitan hasta una cucharada de agua; dolores de cabeza asociados a esos trastornos, o a diarrea (Kent). Vértigo al girar rápidamente la cabeza o levantar los ojos.

Ojos

Sequedad ardiente de ojos; sensación como si tuviera cabellos bajo los párpados.

Sensación de ardor con lagrimeo de ojo derecho que está doloroso al tacto, seguido de coriza.

Neuralgia en y sobre el ojo.

Dilatación pupilar.

Oídos

Calor ardiente de oídos con enrojecimiento circunscripto en mejillas.

Enrojecimiento de oído externo con zumbidos y tintineos por congestión sanguínea.

Hyperexcitación de nervio auditivo; sensibilidad dolorosa particularmente a ruidos súbitos; sensación como si estuviera en un vagón que hiciera ruido como un tren en marcha, como si todas las personas que lo rodeasen hablasen rápido y confusamente, desea que lo sostengan para disminuir esta sensación nerviosa vibratoria que repercute a través de su cuerpo; esto es común en mujeres en la menopausia, sang. en este caso se parece a glon.; el deseo de estar sostenido recuerda a gels. que tiene trastornos cardíacos con temblores en todo el cuerpo y desea que lo sostengan para aliviarse (Farrington).

Cara

ENROJECIMIENTO CIRCUNSCRIPTO DE MEJILLAS CON SENSACIÓN DE CALOR ARDIENTE EN OÍDOS.

TUFARADAS DE CALOR EN CARA.

Hinchazón de cara con enrojecimiento marcado y sensación de rigidez.

NEURALGIA FACIAL mejorada arrodillándose y apretando fuertemente la cabeza contra el piso; dolor que irradia de maxilar superior en todas direcciones; sensación de plenitud y dolorimiento detrás de ángulo maxilar inferior.

Aparato digestivo

BOCA :

Sensación de sequedad ardiente de labios.

Lengua roja, arde como si tocara algo caliente (Kent).

Sensación de sequedad y excoiación de lengua.

Hormigueos y pinchazos en lengua.

Lengua cargada de capa blanca.

Odontalgia agravada por agua fría y mejorada por bebidas calientes.

Dientes flojos.

LARINGE Y ESÓFAGO :

La garganta parece en carne viva.

Deglución difícil; sensación al tragar como de sofocación, por hinchazón de mucosa de garganta.

SENSACIÓN DE ARDOR EN FARINGE Y A LO LARGO DE ESÓFAGO desde boca y al tragar.

SENSACIÓN DE CALOR ARDIENTE en garganta, mejorada aspirando aire frío; gargantatan seca que la mucosa da sensación de quererse rasgar.

Esta sensación de ardor y desolladura se aplica a cualquier mucosa interesada por la acción del remedio (Kent).

ESTOMAGO :

GRAN SED, FALTA DE APETITO.

SENSACIÓN DE FALSA HAMBRE, sensación de vacío, desfallecimiento en boca de estómago, pero no es hambre verdadera, pues tiene AVERSIÓN POR LOS ALIMENTOS y el pensamiento y olor de náuseas.

Esta sensación de falsa hambre acompaña a menudo los dolores de cabeza, "DOLORES DE CABEZA CON HAMBRE" que recuerdan a psorin. O phosph., pero uno y otro, psorin. sobre todo, tienen hambre real, deben comer y no se pueden saciar.

Deseo de platos condimentados.

Aversión por manteca.

Náuseas con salivación abundante.

VÓMITOS DE LÍQUIDOS ÁCIDOS, ARDIENTES que desuellan garganta y boca (Kent).

Vómitos que no alivian las náuseas.

SENSACIÓN DE ARDOR DE ESTOMAGO, esófago, abdomen, con toda clase de desarreglos de estómago.

ABDOMEN Y DEPOSICIONES :

Cólicos ardientes en abdomen.

Hinchazón abdominal con emisión frecuente de gases.

Sensación de plétora, contusión, dolores en región del hígado; trastornos biliares; el hígado parece fabricar mucha bilis, y esto va acompañado de catarro gastro duodenal : la bilis parece subir al estómago y es vomitada en forma de líquido verdoso o amarillo, muy amargo.

En un enfermo crónico de sang. hay durante una semana desarreglos de estómago con vómitos biliosos, mucha flatulencia, eructos ardientes, agrios, constipación; luego todo desaparece y sobreviene diarrea con deposiciones extremadamente abundantes, líquidas, biliosas : nat. sulph., sang., puls., lycop., curan estas alternativas de diarrea y constipación (Kent).

Constipación con deseos ineficaces de evacuar y sensación de gruesa masa en recto.

Diarrea con deposiciones biliosas, acuosas, precedidas de cólicos y con copiosa emisión de gases.

DIARREA POR SUPRESIÓN BRUSCA DE CATARRO DE VÍAS RESPIRATORIAS.

Órganos genitales

Reglas adelantadas, abundantes, de sangre oscura mezclada con coágulos, irritantes y de mal olor.

Flujo menstrual rojo brillante, con coágulos, fétido, luego se hace oscuro y pierde su fetidez.

Reglas abundantes con dolor de cabeza supra orbitario sobre todo ala derecha.

Para cefalea durante reglas, comparar con : act. rac. : dolores de cabeza latentes.

Alum., calc. carb., calc. veg., croc. sat. : latidos dolorosos en cabeza en el momento de las reglas con sensación como si el aire frío pasara a través de los ojos; cyclam. : reglas irregulares con jaquecas y sensación de encandilamiento con puntos, manchas brillantes delante de ojos.

Glon. : reglas que se detienen bruscamente y reemplazadas por dolor de cabeza congestivo o dolor de cabeza congestivo en lugar de reglas; graph., ignat., lach., lycop., magn. carb.; nat. mur. : dolor de cabeza como si mil pequeños martillos golpeasen su cabeza, marcado entre salida y puesta de sol y durante reglas, como si fuera resultado de pérdida de sangre; nat. sulph.; nux. v.; phosph.; platina; puls.; sepia : cefalea congestiva en el momento de las reglas cuando la secreción es poco abundante : sulph. : dolor de cabeza antes de reglas.

Ver. alb.; ustil. : dolor de cabeza nervioso con irregularidades menstruales.

Metrorragias de menopausia de sangre rojo brillante, con coágulos ya menudo fétidas; con jaqueca característica, aflujo de sangre a la cara que se pone escarlata y este color vivo desaparece cuando sobreviene sudor y sensación de desfallecimiento.

Se puede aquí comparar con : glon., lach., y nitr. de amilo. (Farrington).

Amenorrea con tufaradas de calor, palpitaciones, dolores neurálgicos en temporal derecho y dolores abdominales como si las reglas estuvieran por aparecer.

Sensibilidad e hinchazón dolorosa de senos en menopausia.

Pólipos uterinos.

Fisometría. (bromium, lycop., phosph. ac.).

Aparato respiratorio

NARIZ :

Coriza fluente, corrosivo, excoriante; sensación de ardor de nariz como en carne viva, fosas nasales excoriadas; todas las secreciones son excoriantes; mucosidades irritantes se forman en rino farinx provocando ardor de garganta.

Hipersensibilidad tal a olores que puede provocar desvanecimiento; sensible a perfume de flores, "resfrio de rosas"; asma de heno con violenta sensación, en nariz, de ardor y sequedad, como si la mucosa se fuera a rasgar; también en garganta.

Ozena con secreción abundante, amarilla, muy irritante.

Pólipos de nariz, que sangran fácilmente (calc. ost., kali nitr., phosph., teucr. marum, etc.).

LARINGE Y TRAQUEA :

Inflamación y sensibilidad de laringe; sensación de sequedad y ardor de laringe con ronquera; sensación de cosquilleo que se extiende atrás de esternón.

Sensación de sequedad crónica de garganta, hinchazón de laringe con expectoración de mucosidades espesas, sensación de ardor y escozor.

Tos espasmódica, coqueluchoidea, peor de noche, con diarrea; tos violenta después de coqueluche, con caracteres espasmódicos de ataques de coqueluche; un adulto toma frío y tiene tos espasmódica, como coqueluche, dice que proviene del estómago, porque al mismo tiempo hace esfuerzos para vomitar; al mismo tiempo, sensación de ardor y diarrea (Kent).

Tos seca, espasmódica, penosa, agotadora, sobre todo en niños, acostándose, de noche, al entrar en habitación fría para dormir; sensación de despellejamiento en tráquea y bronquios (Kent).

Sensación de ardor y desolladura en tráquea; "un enfermo se acuesta con enfriamiento; tiene gran sensación de ardor de pecho, tos violenta, cada acceso provoca en tráquea y bifurcación de gruesos bronquios, sensación dolorosa de desolladura como si tuviera un cuchillo que lo desgarrar y después de la tos, numerosos y ruidosos eructos; esputos rosados y síntomas de congestión pulmonar : este conjunto no se encuentra en ningún otro remedio". (Kent).

PULMONES :

SENSACIÓN DE ARDOR DE PECHO, TOS SECA, JADEANTE Y SENSACIÓN DE GRAN SEQUEDAZ AL PASO DEL AIRE.

Sensación de ardor de pecho como de secreción caliente que desciende de pecho a abdomen.

TOS VIOLENTA, CONTINUA, CON O SIN EXPECTORACIÓN, CON

ENROJECIMIENTO CIRCUNSCRIPTO A MEJILLAS Y DOLORES EN PECHO, tos seca y sacudida, peor de noche cuando está acostado, y obliga a sentarse en su lecho; tos cargada, esputos color jugo de ciruelas secas o de óxido, adherentes, difíciles de expectorar, ofensivos; tos gruesa con esputos que huelen mal lo mismo que el aliento y este olor es tan objetivo como subjetivo.

Esputos herrumbrosos, viscosos, adherentes (bryon., phosph., squilla).

Gran DISNEA con sensación de constricción de pecho; asma asociada a desórdenes gástricos, como nux v.

Puntadas agudas en lado derecho del pecho, cerca del pezón.

CONGESTIÓN PULMONAR particularmente lado derecho del pecho que parece estar bajo la influencia del remedio, con enrojecimiento circunscripto a mejillas, como en fiebre hética, fiebre elevada.

Sang. puede compararse aquí a ver. vir. : que tiene el mismo estado congestivo de pulmón con gran intensidad de síntomas; pero tiene más excitación arterial; si se da antes que la hepatización se produzca, apacigua pulso, reduce congestión y modifica marcha de enfermedad; cuando la hepatización está francamente instalada, ya no está indicado; a phosph., ant. tart., etc.

Sulph., se parece a sang. en el estado de resolución cuando el pulmón no puede llegar a liberarse, los esputos se hacen purulentos; en este caso sang. es preferible si los esputos son extremadamente fétidos.

Hemoptisis por supresión de reglas. (phosph., bryon., etc.) Sang. es TUBERCULOSIS FLORIDA.

Aparato circulatorio

Palpitaciones de corazón con sensación de desfallecimiento.

Irregularidades de latidos del corazón.

Pulso lento, débil, irregular.

Trastornos circulatorios vaso motores.

Espalda y extremidades

Dolor de nuca y cuello, particularmente derecho; con rigidez, no puede darse vuelta en su lecho; el dolor corre a lo largo del cuello y va hasta DELTOIDES Y HOMBRO.

DOLORES REUMÁTICOS EN HOMBRO, AL PUNTO QUE NO PUEDE LEVANTAR LOS BRAZOS

Y TODOS LOS MÚSCULOS DE HOMBRO Y CUELLO ESTÁN TOMADOS; si el dolor sobreviene de día, aumenta de noche; todos los síntomas se agravan de noche.

Dolores agudos, lancinantes, con hipersensibilidad y entumecimiento muscular; REUMATISMO DE DELTOIDE DERECHO (de deltoide izquierdo ferr. met.); REUMATISMO DE HOMBRO Y BRAZO DERECHO (magn. carb., coloc.), PEOR EN CAMA, DE NOCHE; si sang. prefiere el lado derecho puede ser igualmente útil en reumatismo izquierdo de hombro izquierdo (Kent).

Puede haber toda clase de dolores neurálgicos : cortantes, lacerantes, desgarrantes como si se estirasen los músculos; dolores desgarrantes en cualquier parte, neurálgicos o reumáticos.

Rigidez de articulaciones de dedos.

Debilidad en piernas.

ARDOR Y TUFARADAS DE CALOR EN PALMA DE MANOS Y PLANTAS DE PIES, sobre todo de noche; entonces está obligado a sacarlos de la cama.

Relaciones

Complementarios

Ant. tart.

SARSAPARRILLA

O smilax officinalis, pequeño arbusto de la familia de las Asparagináceas, crece en selvas de América tropical y meridional.

Para uso homeopático se emplea la raíz con la que se prepara la tinturamadre de la que se obtienen, por diluciones hahnemannianas sucesivas, las diversas dinamizaciones.

Acción general del medicamento

Actúa de manera marcada sobre PIEL que, bajo su influencia, se pone seca, arrugada, con vesículas herpéticas, grietas, granos rojizos, etc.; Dewey la llama potente antisicótico.

Bajo su acción, las MUCOSAS se inflaman, pero la irritación es más BIENSECA; se caracteriza por dolores ardientes, sensación de ulceración y espasmos consecutivos; sólo ocasiona poca secreción serosa o sero-purulenta, pero de consistencia viscosa, acre, corrosiva.

Síntomas urinarios muy marcados y tan característicos que van a lacabeza para su indicación.

Conviene particularmente a ESTADOS CRÓNICOS COMPLEJOS, consecuencia de diatesis sicóticas y sifilíticas mezcladas y a las que el abuso de mercurio ha venido a complicar.

GRAN DEBILIDAD REACCIONAL de todo el individuo, como merc., lach., etc., tejidos sin vitalidad; cuando se hieren la lesión no quiere curar; se ulceran por la menor cosa; toda herida permanece abierta, se extiende y se hace fagedénica como ars. alb., lach., y merc. corr.

Gran SENSACIÓN DE DEBILIDAD en todo el cuerpo, especie de estado paralítico.

En cuanto a LA MENTE? ESTA TAN DÉBIL COMO LOS TEJIDOS; estado de estupidez; no puede comprender nada, mente lenta, debilidad de cerebro que frisa en imbecilidad.

TODOS LOS ÓRGANOS TIENEN ACCIÓN LENTA, DÉBIL, PEREZOSA y están CONGESTIONADOS.

Debilidad y dilatación de venas; tendencia a várices, úlceras varicosas, hemorroides; cara a menudo roja o con manchas rojas; donde la circulación es débil: tibias, dorso de dedos grandes, la piel toma TINTE AZULADO; manchas violetas, como gangrena senil en formación: útil en ancianos, cuando aparecen manchas negras o azul oscuro en dorso de manos u otra parte del cuerpo.

Erupciones húmedas con comezón; descamación como caspa, escaras.

Piel de dorso de manos y cara palmaria gruesa y dura, con descamación como de psoriasis y manchas azules (Kent).

Características

1) CONSTITUCIÓN Y TEMPERAMENTO: Conviene particularmente a sujetos de cabello morocho, con trastornos, de litiasis renal, a individuos de diatesis urática sicótica (Allen).

Indicado en antiguos sifilíticos cuya enfermedad ha estado disfrazada, que han sido blanqueados por mercurio; con mente y cuerpo postrados; especie de debilidad parética de extremidades, no tienen ningún aguante; palpitaciones al menor esfuerzo; siempre fatigados; en piel, úlceras indolentes salpicadas; piel floja, se agravan de noche; dolores osteoscópicos peor de noche; en tales casos, sarsap. antidota a merc. y permite reaccionar contra la enfermedad primitiva.

Niños muy enflaquecidos, atrepsicos, por sífilis hereditaria; enflaquecimiento especialmente marcado alrededor del cuello, cara de viejo; piel seca y fofa con erupciones o manchas violáceas, cobrizas; asimilan mal el alimento, deposiciones líquidas y vientre grande.

Niños que dejan arena amarillenta o blancuzca en los pañales; gritan cuando van a orinar, porque recuerdan cuánto sufrieron en micciones anteriores; a veces al fin de la micción lanzan un grito infernal; dolor agrio de vejiga al fin de la micción.

Viejos farristas debilitados por excesos de bebida y abuso de mujeres; mujeres enflaquecidas, arrugadas, con corazón, pulmones, cerebro, vejiga, débiles.

Sujetos envejecidos antes de tiempo, parecen de 80 años a los 40, caminan con dificultad, con paso tembloroso apoyados en bastón, con edema de piernas.

Al principio nux v. podrá atenuar el debilitamiento físico, pero llega el momento en que la debilidad mental iguala a la física y hay que orientarse hacia remedio como sarsap., lach., secale, etc. (Kent).

2) TRASTORNOS VESICALES CARACTERÍSTICOS QUE SE TRADUCEN POR :a) VIOLENTO DOLOR AL FIN DE LA MICCIÓN, INTOLERABLE (berb., equiset., medorr., thuya) a menudo con VIOLENTO TENESMO VESICAL.

Ningún otro tiene este síntoma tan marcado, aunque en puls. se encuentra algo análogo para tenesmo, relacionado con próstata grande; nat. mur.: después de la micción, ardor y sensación de cortadura que escuece en uretra, contracciones espasmódicas de abdomen, etc. (Nash).

b) ESPASMO DE ESFÍNTER CUANDO SE SIENTA PARA ORINAR, QUE HACE LA MICCIÓN IMPOSIBLE EN ESA POSICIÓN, PERO CUANDO SE LEVANTA Y ESTA PARADA LA ORINA CORRE FRANCAMENTE (Kent).

Modalidades

Agravación

a) POR CALOR : el calor INTERIOR agrava todos los síntomas, EXCEPTO SENSACIÓN DE FRÍO EXTERIOR QUE SE ALIVIA POR CALOR; bebidas y alimentos calientes agravan, desea bebidas y alimentos fríos; pero el calor exterior reconforta (Kent).

b) DE NOCHE.

c) POR HUMEDAD.

d) EN PRIMAVERA; como todos los remedios venenosos.

Lach., secale, hamam., se tonifica en invierno y se debilita en primavera, etc. (Kent).

e) Al bostezar.

f) Antes de reglas.

g) Después de micción.

Síntomas mentales

Gran debilidad mental, descorazonado, taciturno, de mal humor, carácter sensible, se ofende fácilmente.

Cabeza

Dolores de cabeza que causan depresión mental; dolores desde occipucio a ojos.

Dolor de cabeza después de gonorrea suprimida a destiempo y bruscamente (Nash).

Dolores óseos y periósticos, consecuencia de afección venérea.

Erupción húmeda de cuero cabelludo.

Costras de leche que empiezan en cara; erupción en cara y labio superior.

Aparato digestivo

BOCA Y GARGANTA :

Lengua cargada; salivación abundante; gusto metálico; olor fétido; no hay sed.

Aftas.

Se diría que mucosa de boca, lengua y faringe van a ulcerarse; manchas violetas que parecen querer ulcerarse, pero no es así y permanecen así semanas y meses (Kent).

ESTOMAGO :

En mal estado; flatulencia, eructos, náuseas continuas, vómitos de alimentos agrios.

Se diría que tiene fermentaciones molestas en estómago; sensación como si hubiera comido mucho, como si los alimentos le quedaran en estómago; digestión lenta y débil (Kent).

ABDOMEN Y DEPOSICIONES :

Borborismos y fermentaciones en abdomen; muchos gases.

Cólicos y dolor de riñones a cada período menstrual.

Constipación obstinada con necesidad violenta de orinar al tratar de evacuar.

Deposición pequeña y expulsión con muchos tirones de arriba a abajo.

Necesidad de evacuar con contracción de intestinos que da sensación como si fueran a salir por recto.

Durante deposición, violentos dolores cortantes de recto (Kent).

Aparato urinario

DEPOSITO DE ARENA BLANCA EN ORINA QUE ES ESCASA, VISCOSA O VEDIJOSA, ORINA POCO ABUNDANTE, VISCOSA, VEDIJOSA, DEJA DEPOSITO ARENOSO O PEQUEÑOS CÁLCULOS.

Cólicos nefríticos; arenillas; cálculos vesicales; arenillas con reumatismo crónico.

Catarro de vejiga.

DOLORES INTOLERABLES AL FIN DE MICCIÓN.

NO PUEDE ORINAR SENTADO PERO SI ESTA PARADO LA ORINA CORRE LIBREMENTE;

orina abundante de noche, inunda su cama; de día, sólo puede orinar parado.

Sensación de "SACUDIDAS" a lo largo de uretra masculina.

Cada vez que orina sale aire de uretra, con ruido de gorgoteo : frecuente catarro de vejiga y consecuencia de fermentaciones vesicales.

Necesidad frecuente de orinar sin resultado, con secreción disminuida (Kent).

Órganos genitales

MASCULINOS :

Olor fétido intolerable de partes genitales; erupciones herpéticas con prurito.

FEMENINOS :

Erupciones húmedas y pruriginosas en frente antes de reglas; erupción húmeda, a veces, en ingle derecha, antes de reglas.

Reglas atrasadas y poco abundantes.

Senos flácidos, pequeños, pezones retraídos.

Piel

PIEL FACA, SECA, ARRUGADA, REVENIDA.

Va a la par de iodium, nat. mur., y abrot. para enflaquecimiento.

En sarsap., cuello enflaquecido y piel en general arrugada; sarsap., sanic., y nat. mur., como lycop. : adelgazamiento de arriba a abajo; abrot., de abajo a arriba.

Iodium : enflaquecimiento general con constante deseo de comer; nat. mur. : come todo el tiempo, pero adelgaza sin cesar, particularmente cuello; abrot. : enflaquecimiento general, sobre todo en piernas.

Arg. nit. : niño con aspecto de viejo seco, como momia (Nash).

Rash por exposición al aire libre, seco, pruriginoso.

Erupciones en primavera.

Grietas; piel agrietada en manos y pies.

Rash como rubéola de sífilis, molesta de manera intolerable.

Erupciones húmedas que segregan líquido irritante.

Manchas violáceas.

Manchas cobrizas.

Úlceras indolentes.

Espalda y extremidades

Dolores reumáticos después de gonorrea mal suprimida.

Debilidad parálitica de extremidades; temblor de manos y pies.

Depósitos gotosos en articulaciones.

Edemas de extremidades inferiores.

Grietas en manos y pies, particularmente bordes de dedos y dedos grandes depies.

Onixis; ulceraciones en puntas de dedos y sensación de pinchazos bajo lasuñas. (psorin.).

Relaciones

Complementarios

Merc., sepia.

Antídotos

Bell.

SECALE CORNUTUM

Secale comutum, es el micelium del claviceps purpúrea hongo que se desarrolla en años lluviosos en ovarios del centeno y otras gramíneas.

Se recoge antes de cortar el centeno y se reduce a polvo con el que se prepara, por maceración en alcohol a 90º, la tintura madre con la que se obtienen, por diluciones hahnemannianas sucesivas, las diferentes dinamizaciones.

Acción general del medicamento

Actúa electivamente sobre TEJIDO MUSCULAR para el que es UN VENENO PARALIZANTE.

La parálisis que produce no se instala bruscamente, es progresiva y precedida por fase esténica de espasmos o convulsiones que marca principio de intoxicación; fase esténica que puede determinar por isquemia de médula por vaso constricción inicial de sus pequeños vasos, fenómenos paralíticos que no hay que confundir con el efecto de la actividad propia del veneno y que aparecen cuando su efecto tóxico se ejerce en su plenitud.

Actúa sobre músculos de vida de relación y vida vegetativa, modifica profundamente propiedades inherentes a la fibra muscular; la falta de coordinación de movimientos que produce marcha vacilante e insegura debe atribuirse a trastornos de tonicidad; la abolición de contractilidad explica la desaparición de reflejos; el relajamiento de fibra que termina por paralizarse y atrofiarse se relaciona con lesión de contractilidad.

LOS TRASTORNOS SENSITIVOS tienen marcha paralela a la de los motores; primero con calambres y dolores; luego, disociación de sentido muscular y abolición completa de sensibilidad.

LA ASTENIA MUSCULAR, que es expresión esencial de su acción, se encuentra en músculos voluntarios, donde se registra sensación de profunda laxitud, debilidad, pesadez y entorpecimiento de miembros, imposibilidad de deglutir, debilitamiento de voz, pérdida de palabra, incontinencia de esfínteres, lentitud de respiración que trae, por insuficiencia de hematosi, tendencia de la sangre a conservar aspecto de sangre venosa; se paralizan definitivamente los movimientos respiratorios causa de asfixia terminal y muerte.

El miocardio sufre la misma influencia : después de una fase muy corta de palpitations y a veces arritmia, el corazón se hace lento; sus contracciones se espacian cada vez más y a veces se detienen en diástole.

Manifiesta con más intensidad su poder asténico SOBRE FIBRAS LISAS y particularmente DE ÚTERO Y CAPILARES.

En caso de inercia uterina por parto, se muestra heroica, pero es incapaz durante embarazo, de provocar contracciones uterinas : la ley de los semejantes explica este hecho; por eso no estamos de acuerdo con Piedevache cuando escribe : "la excitación de fibra lisa de útero sólo alcanza su desarrollo completo en el acto fisiológico del parto".

Es éste un error, porque si la ergotina solamente actúa entonces, es que despierta un útero blando cuyas contracciones excita homeopáticamente; durante embarazo al contrario, mientras la tonicidad de fibra uterina es normal, la ergotina con dosis largamente prolongadas, sólo puede producir relajamiento de fibra muscular uterina; si desencadena algunos espasmos uterinos, son pasajeros; y sorprenderse por no verlos persistir como en el momento del parto es mostrar que uno confunde la primera fase del efecto primitivo su efecto curativo.

Por su acción sobre CAPILARES provoca estasis sanguíneos que cuando son crónicos contienen la circulación y dan lugar a lesiones gangrenosas.

Esta atonía vascular produce también inercia de actividad plástica y trastorna profundamente el funcionamiento de glándulas, particularmente salivares e intestinales que ya sólo segregan productos mal elaborados a los que dejan correr pasivamente.

Características

1) CONSTITUCIÓN Y TIPO : Individuos flacos, descarnados; tales sujetos serán los que más a menudo necesitan ergotina.

Pero no está necesariamente contraindicado en gordos; ciertas naturalezas son más sensibles que otras a ciertos remedios; pero no hay por qué creer que estos remedios no actuarán en otros sujetos cuando los síntomas concuerdan : individuos descarnados corresponden especialmente a secale, pero cuando los síntomas lo llaman actuará también en gordos (Kent).

Personas de cierta edad, con músculos flojos y blandos, de apariencia enclenque; cara pálida, como cenicienta, rasgos tirantes, ojeras; labios contraídos; piel arrugada, marchita y fría; con expresión de tristeza y desaliento; como viejos y quebrantados.

Mujeres con fibras musculares laxas, propensas a hemorragias pasivas por todos los orificios del cuerpo (Nash).

2) ASPECTO SECO Y ARRUGADO DE PIEL QUE ESTA INSENSIBLE O CON SENSACIÓN DE HORMIGUEO SUBCUTÁNEO MAS O MENOS MARCADA, COMO SI HORMIGAS CAMINASEN DEBAJO : Piel marchita, como si cubriera musculatura descarnada; de apariencia malsana; coloración púrpura o azulada, sea de manera generalizada, sea localmente, por zonas; manchas violetas en piel marchita, arrugada, principalmente donde la circulación es débil, como dorso de manos y pies, o tibias.

Hay allí sensación de entumecimiento, hormigueo.

Las extremidades pican, arden y hormiguean; sensación de reptación como si anduvieran hormigas bajo la piel, entre carne y piel; sensación de entumecimiento, como si estuvieran muertos, como si fueran de madera, en dedos y sobre todo dedos de pies.

Arruga senil de piel en extremidades, como en viejos adelgazados y debilitados; los vasos sanguíneos se obturan, la sangre circula mal en los dedos que se entumecen, se ponen insensibles y toman tinte violeta negro; sec. com.

mejora circulación de extremidades en viejos y lucha contra gangrena senil (Kent).

3) GRAN FRÍO EN TODA LA SUPERFICIE DEL CUERPO, PERO NO PUEDE SOPORTAR ESTAR TAPADO PORQUE EL CALOR AGRAVA; SENSACIÓN OBJETIVA DE FRÍO MUY INTENSO EN TODA LA SUPERFICIE DEL CUERPO PERO NO TOLERA ESTAR TAPADO (Nash).

Esto se ve en gangrena senil y cólera; en este último, este síntoma hace pensar en camph., pero este es útil sobre todo en la primera parte de la enfermedad, en caso de colapso precoz, antes que las evacuaciones se hagan ofensivas y oscuras (Nash).

4) SENSACIÓN DE ARDOR A PESAR DE LA SENSACIÓN OBJETIVA DE FRÍO EXTERIOR : La sensación objetiva de frío no excluye sensación subjetiva de ardor : piel y extremidades arden; sensación intensa de ardor y exteriormente la región que arde está fría al tacto; sensación de ardor con frío.

Sensación de ardor de órganos interiores.

Sensación de sequedad con ardor en estómago, intestino, boca, garganta, vías respiratorias, pulmones (Kent).

5) INFLAMACIÓN VIOLENTA DE CUALQUIER PARTE DEL CUERPO : Neumonía gangrenosa, gastritis, peritonitis, inflamación de útero, ovarios, etc.

En estados inflamatorios compete con ars. alb.

Los síntomas de ambos tienen puntos tan parecidos que a menudo es difícil distinguirlos : ambos tienen vientre violentamente distendido, timpanismo marcado, sensación de quemadura ardiente, como de fuego, sed violenta, sensibilidad extrema a tacto y movimiento, tal que la menor sacudida es insoportable, vómitos de sangre, expulsiones de sangre en coágulos, secreciones extremadamente fétidas y sanguinolentas por intestinos; pero difieren en que ars. alb. quiere estar tapado, tener calor, mejora por aplicaciones calientes, secas o húmedas, secale quiere estar destapado y mejora al aire frío (Kent).

AFECIONES CATARRALES DE TODAS LAS MUCOSAS.

ESTÁN SECAS Y SANGRAN FÁCILMENTE; POR SUPERFICIE MUCOSAS CATARRALES CORRESANGRE LIQUIDA, NEGRA, MALOLIENTE, SE COAGULA LENTAMENTE, DIFÍCILMENTE O NADA (Kent).

6) HEMORRAGIAS PASIVAS DE SANGRE LIQUIDA, DIFÍCILMENTE COAGULABLE, OSCURA, A MENUDO MALOLIENTE, AGRAVADAS POR EL MENOR MOVIMIENTO : Pérdidas de sangre negra, líquida, aun cuando no haya inflamación de superficie que sangra.

Epistaxia de sangre líquida, venosa, negra, maloliente, hemorragia de garganta, pulmones, recto, vejiga, de sangre oscura.

Orina como tinta.

Hemorragias uterinas prolongadas durante reglas, al punto que un período se prolonga hasta el siguiente en mujeres marchitas, arrugadas; el primer día, flujo considerable de sangre líquida y negruzca, que se prolonga algún tiempo, luego secreción saniosa oscura, líquida y negruzca, que dura el próximo período, en cuya fecha aparece el verdadero flujo sanguíneo negro, de olor muy fétido.

Esto en mujeres que han tomado antes ergotina en altas dosis para abortar en un parto y son muy sensibles a su acción (Kent).

Anemia por tendencia a hemorragias y a destruir glóbulos rojos; la cara de estas anémicas es descarnada, arrugada, envejecida con aspecto sucio, grisáceo, como si no se hubieran lavado desde hace mucho y la suciedad hubiera secado; este aspecto arrugado, envejecido y sucio, es muy marcado en extremidades (Kent).

A propósito de las hemorragias de sec. com. se pueden comparar con carb. veg. : análogo en epistaxis persistentes; secreción obstinada de sangre oscura que no coagula; el diagnóstico de elección sólo se puede hacer por las otras características.

Ustil. : hemorragias uterinas, generalmente por pequeñas causas, simple tacto vaginal, por ej.; pero de sangre roja, brillante, en parte coagulada.

Bovista : parece producir relajamiento de capilares; epistaxis y hemorragias menstruales; esta secreción es más marcada a la caída de la noche o a la mañana.

Mitchella : hemorragia uterina de sangre más brillante que sec. y asociada a disnea.

Tril. pend. : flujo de sangre roja, brillante y profusa con sensación de debilidad; es más indicado en hemorragia activa, aguda que en secreción crónica y lenta de sec.; se parece a china.

Hamam. : secreción venosa y pasiva, oscura, agotadora; cefalea latente marcada en temporales.

Erig. canad. : hemorragia asociada a disuria como mitch., pero sobreviene por rachas : el flujo aparece, luego desaparece súbitamente.

Ferr. phosph. : hemorragias de sangre brillante en cualquier orificio, melleo, ipeca, etc.

7) CONVULSIONES; ESPASMOS MUSCULARES : Son uno de los síntomas predominantes :

ESTREMECIMIENTOS MUSCULARES QUE COMIENZAN EN CARA Y SE EXTIENDEN A TODO EL CUERPO.

Convulsiones, espasmos, generalizados en todo el sistema muscular o localizados en un grupo de músculos, opistótonos, calambres en pantorrillas, muslos, plantas de pie, palmas de manos; contracciones, histéricas.

Espasmo y convulsiones comienzan en músculos de cara como cic. vir. (Kent).

Modalidades

Agravación

a) POR CALOR, ESTANDO TAPADO, EN HABITACIÓN CALIENTE : Estado constitucional, en general, agravado por calor y hay pocas excepciones : desea tener frío, aunque tocándolo se ve que sus miembros están fríos como hielo, quiere ventanas abiertas; una enferma con hemorragia de sec., quiere que la destapen aunque la pieza esté fresca; una enferma con úlceras de sec.

quiere estar destapada; y si tiene estado inflamatorio de sec. en intestinos estómago, quiere tener pecho y vientre descubiertos (Kent).

b) DURANTE SECRECIÓN HEMORRÁGICA, espasmos musculares y síntomas nerviosos agravados : convulsión puerperal, en medio de hemorragia (Kent).

Mejoría

a) POR FRÍO ESTANDO DESTAPADO : Estado de calor en piel y desea estar destapado; dolores agudos que escuecen, ardientes como fuego o cortantes como por un cuchillo, neurálgicos, aliviados por aplicaciones calientes; dolor de cabeza, peor al aire frío; peor de manera general, MEJORÍA DESTAPÁNDOSE EN HABITACIÓN FRÍA, Y SI EL AIRE LLEGA HASTA EL (Kent).

b) Estirándose, alargando los miembros.

Síntomas mentales

Los síntomas de depresión moral e intelectual dominan pero sin características particulares : desaliento con tristeza y melancolía; temores y angustias; temor a la muerte, gran debilitamiento de facultades intelectuales.

Demencia furiosa con IMPULSO DE AHOGARSE.

Locura activa con gran excitación; se desnuda, arranca sus partes genitales; mete sus dedos en vagina y se rasca hasta que la mucosa sangra, ha perdido toda idea de pudor (Kent).

Sueño

Somnolencia difícil de vencer o al contrario, insomnio, sueño turbado por pasadillas angustiosas.

Cabeza

Cefalea supraorbitaria u occipital, sorda, de invasión muy rápida.

Hemicránea con náuseas.

Vértigo, pesadez y latidos en cabeza.

Ojos

Vista débil; niebla, sensación de velo delante de los ojos.

CATARATA al principio.

Los sujetos envenenados por ergotina, particularmente ergotismo crónico, presentan opacidad de córnea como en casos de catarata senil; individuos arrugados, descarnados, con tendencia a ulceración, piel malsana y agravación marcada por calor, son maravillosamente curados por sec. (Kent).

Cara

Pálida, alterada, de rasgos tirantes, arrugada, marchita; ojos hundidos, ojeras azuladas; a veces expresión manifiesta de estupidez.

SENSACIÓN DE HORMIGUEO BAJO LA PIEL DE LA CARA.

CONTORSIONES ESPASMÓDICAS, CALAMBRES Y CONVULSIONES QUE COMIENZAN EN CARA Y GANAN TODO EL CUERPO.

Aparato digestivo

BOCA Y FARINGE :

Boca seca, agrietada, deja a veces exudar sangre negruzca que no coagula.

Lengua cargada, fría, lívida; o hinchada, paralizada.

PINCHAZOS EN PUNTA DE LENGUA QUE ESTA COMO PARALIZADA.

Parálisis de faringe y deglución imposible.

ESTOMAGO :

Hambre voraz, anormal; apetito excesivo pero continúa siendo flaco. (iod., nat. mur., etc.).

Como síntoma alternante, inapetencia y asco por alimentos, principalmente carne.

SED ARDIENTE.

Sensación de ardor en estómago y abdomen.

Náuseas y vómitos; estado nauseoso como mareo; vómitos como borra de café.

ABDOMEN Y DEPOSICIONES :

Violentos cólicos con vientre hinchado y distendido; timpanismo.

Diarrea acuosa, agotadora, con deposiciones como en CÓLERA, calambres y frialdad de cuerpo y gran debilidad; y sed ardiente; en esto es muy parecido a camph., pero se distinguen fácilmente porque éste mejora por calor y agrava por frío.

Deposiciones involuntarias; la materia no termina de pasar por el ano que queda muy abierto (apis, phosph.).

Diarrea y hemorragia intestinal tienen gran tendencia a marchar parejas, sobrevenir juntas; diarrea acuosa, sanguinolenta o mezclada con sangre oscura, líquida, que coagula mal.

Aparato urinario

Al principio de intoxicación crónica, MICCIONES FRECUENTES, PENOSAS, GOTA A GOTA, CON TENESMO.

En esto se parece a cann. sat. : deseos frecuentes con dolores en cuello de vejiga, dolores ardientes durante micción, peor después; emisión de algunas gotas de orina solamente.

Canth. : deseo frecuente de orinar con dolores violentos de vejiga, emisión de algunas gotas de orina sanguinolenta con sensación de ardor, como por hierro candente, a lo largo de uretra; tenesmo vesical.

Copaiva : deseo frecuente e ineficaz de orinar; la orina corre gota a gota; ardor de cuello de vejiga.

Eup. perf. : constante deseo de orinar a pesar de frecuentes micciones, la vejiga parece siempre llena.

Más tarde parálisis de vejiga.

HEMATURIA.

Órganos genitales

Cólicos menstruales con sensación objetiva de frío en toda la superficie del cuerpo, pero intolerancia al calor.

REGLAS IRREGULARES, ABUNDANTES Y DE MUY LARGA DURACIÓN, DE SANGRE NEGRA, LÍQUIDA, POCO O NADA COAGULADA, MAL OLOR; CONTINUA SECRECIÓN DE SANGRE ACUOSA HASTA EL PERIODO SIGUIENTE.

Hemorragia pasiva de sangre negra en mujeres débiles y caquéticas, con gran postración, sensación objetiva de frío en superficie del cuerpo, y a pesar de ello, deseo de aire frío.

Dolores ardientes de útero que está congestionado.

Leucorrea marrón, ofensiva, irritante.

Amenaza de aborto hacia el tercer mes.

Cura esterilidad en casos en que el útero es incapaz de conservar el feto; esta debilidad se debe a abortos repetidos (Kent).

Dolores irregulares, débiles o ausentes, durante el parto, sin que una acción expulsiva se manifieste.

INERCI A UTERINA.

ACCIÓN SOBRE FIBRA UTERINA A LA QUE HACE CONTRAER, CUANDO LOS DOLORS DE PARTO SON DÉBILES, SUPRIMIDOS O INEFICACES, en MUJERES DELGADAS, DESCARNADAS, CON PIEL MARCHITA, PROPENSAS A HEMORRAGIAS.

Fuertes dosis de ergotina provocan tales contracciones de útero que su contenido es expulsado y una hemorragia agotadora se produce : expulsión de grandes coágulos mezclados con sangre roja al principio, pero el rasgo más saliente es secreción de sangre negra que no coagula (Kent).

Se puede comparar con amica : inercia uterina por fatiga de músculo uterino; dolores débiles; la parturienta desea constantemente cambiar de posición.

Caut. : inercia uterina con gran relajamiento de tejidos y postración.

Chamom. : dolores intolerables, ineficaces, a veces rigidez de cuello.

Gels. : inercia uterina con ausencia de dolor, aunque la dilatación se completa; gran debilidad y temblor.

Puls. : loquios marrones y de mal olor.

Languidez de senos que se arrugan.

Ausencia de leche después de parto; senos marchitos, arrugados.

Aparato circulatorio

Además de su influencia sobre sangre y circulación hay : angustia precordial con palpitaciones; irregularidad de latidos de corazón; pulso pequeño e irregular.

Aparato respiratorio

NARIZ :

Hemorragia nasal; sangre oscura, líquida, que corre sin parar, con pulso pequeño, huido y gran postración : en viejos o borrachos, o mujeres jóvenes muy débiles.

BRONQUIOS Y PULMONES :

Respiración lenta.

Disnea y opresión con calambres de diafragma.

Espalda y extremidades

Irritación espinal; rigidez de nuca; sensación de frío a lo largo de espalda.

CALAMBRES Y ENTUMECIMIENTO DE MIEMBROS.

HORMIGUEO EN DEDOS, en esto se parece a : aconit. : sensación parecida, particularmente cuando escribe; amm.

mur. : hormigueo en dedos con tirones y latidos con dolores como de ulceración en punta de dedos, lycop. :

hormigueo de dedos, brazos, dedos entumecidos, también de noche.

Rhus tox. : sensación de hormigueo en punta de dedos con entumecimiento después de fatiga.

Silicea : entumecimiento con hormigueo de dedos y brazos cuando se duerme sobre uno de ellos.

FRÍO DE HIELO EN EXTREMIDADES (aran. diad., ars. alb., camph., carb.

veg., helod., hydroc. ac., tabac., silic., ver. alb.).

Estado parético, parálisis de extremidades inferiores; estado parético de una pierna y un brazo, del mismo lado del cuerpo; parálisis de extremidades superiores con entumecimiento y hormigueo.

Entumecimiento y sensación de ardor lo largo de columna vertebral.

Con estado parético, adelgazamiento general o solamente del nervio atacado (Kent).

Marcha vacilante, temblorosa; ataxia locomotriz.

GANGRENA, EFACELADO DE DEDO GRANDE (ars. alb., se alivia por calor, se cala por frío).

Piel

SECA Y ARRUGADA, MARCHITA; FRÍA AL TACTO PERO NO PUEDE SOPORTAR ESTAR TAPADO.

SENSACIÓN DE ARDOR ALIVIADA POR FRÍO.

HORMIGUEO BAJO LA PIEL, SENSACIÓN DE QUE HORMIGAS CORREN BAJO SU PIEL.

GANGRENA SECA QUE SE DESARROLLA LENTAMENTE, CON PIEL DE ASPECTO APERGAMINADO Y ARRUGADO.

La menor herida segrega durante largo tiempo y continuamente sangre líquida y negra.

Púrpura hemorrágica.

Úlceras varicosas con dolores ardientes aliviados por frío.

Tendencia a escaras : ulceraciones antiguas toman aspecto extraño, lustroso, negruzco, marchito, arrugado, al mismo tiempo que se secan sin que se formen granulaciones; súbitamente aparecen granulaciones negruzcas, indolentes; finalmente toda la zona se despega lentamente; esta zona se seca; cuando mucho deja correr a veces un poco de sangre negra, fétida (Kent).

Relaciones

Antídotos

Camphora, opium.

SEPIA

Sepia o tinta de camarón, líquido marrón negruzco, proviene de un molusco cefalópodo que lo segrega por una glándula que se abre al lado del ano, para oscurecer el agua y disimular su presencia.

En tiempo de Hipócrates ya se conocía y empleaba como astringente; Plinio la prescribía como diurético y purgante.

Varios médicos de la antigüedad, Dioscorides, Plinio, Soranus, y Marcellus, empleaban su carne, huevos, huesos contra leucorrea, gonorrea, catarro de vejiga, cálculos, espasmos de vejiga, alopecia.

Hoy sólo se emplea el jugo.

Hahnemann lo utilizaba como antipsórico y según Farrington, volvió a descubrir este remedio conocido desde la antigüedad.

Hahnemann tenía un amigo artista que cayó gravemente enfermo y al que no podía curar; un día lo observó trabajar y vio que se llevaba el pincel a la boca.

Se le ocurrió que allí podía residir la causa de la enfermedad.

El artista sostenía que su color sepia era inofensivo.

Pero, por consejo de Hahnemann dejó de llevarse el pincel a la boca y, cosacuriosa, curó rápidamente.

Secreción

El producto obtenido por compresión de la bolsa de la tinta es un líquido espeso, de un negro intenso, reacción neutra y poder colorante muy considerable.

Algunas gotas bastan para oscurecer un vaso de agua.

Composición química

Materia colorante (melanina) 78%, carbonato de calcio 10,4%, carbonato de magnesio 7%, cloruro de sodio y sulfato de soda 2,16%, mucina 0,84%.

Soda 2,16%, mucina 0,84%.

Es un compuesto complejo que tiene esencialmente : calcaria carbónica, magnesio carbónica, natrum sulphuric, natrum muriatic, y como componente específico : melanina.

Von Fürth y Schneider admiten de manera general, que se puede atribuir la formación de pigmentos melánicos a la acción combinada de dos fermentos : uno AUTOLÍTICO que separaría de la albúmina un grupo aromático, el cual sería a su vez transformado en melanina por una TYROSINASA.

Acción general del medicamento

Sepia tiene acción profunda sobre el organismo, principalmente de la mujer, en que influencia de manera marcada fuerzas vitales y órganos.

Causa ERETISMO DE SISTEMA NERVIOSO CON AGITACIÓN, ANSIEDAD, TRASTORNOS MENTALES CARACTERÍSTICOS; EL IMPRESIONA SEVERAMENTE LA CIRCULACIÓN POR INTERMEDIO DE LOS VASOS MOTORES Y ESTA ACCIÓN SE HACE SENTIR MÁS ESPECIALMENTE Y MUY INTENSAMENTE SOBRE CIRCULACIÓN PORTA, QUE ES VIOLENTAMENTE PLETORIZADA.

Cuatro horas después de absorción hay TUMORES DE CALOR EN CABEZA, QUE TERMINAN EN TRANSPIRACIÓN, CON SENSACIÓN DE DEBILIDAD Y ANIQUILAMIENTO.

Todo movimiento, ejercicio, provoca gran calor y termina en sudores abundantes.

A media que la experimentación progresa la influencia general deprimente de sepia aumenta y se generaliza : el sujeto LANGUIDECE, SE ABATE y queda POSTRADO; tiene desfallecimientos, es presa de temblores; se queja de sensación general de aniquilamiento después del menor esfuerzo, se siente vacío.

Pero esta debilidad no se limita a fuerzas vitales y sistema nervioso : TEJIDO Y ÓRGANOS RELAJADOS, DÉBILES Y PEREZOSOS, realizan un trabajo orgánico más difícil, LAS VÍSCERAS ESTÁN CAÍDAS POR LAXITUD ANORMAL DE TEJIDOS, LIGAMENTOS, Y POR ESTADO CONGESTIVO QUE LOS HACE MÁS PESADOS.

La congestión venosa, particularmente de sistema porta y que aparece rápidamente, se va agravando e instalando cada vez más profundamente : de ahí dolores de cabeza, congestiones locales, várices, etc.

ÚTERO CADA VEZ MÁS CONGESTIONADO, SE PROLAPSA; HÍGADO HIPEREMiado PESADO Y PEREZOSO; éstasis venoso en miembros, inferiores que se traduce en SENSACIÓN DOLOROSA DE ROTURA Y TIRONES; las piernas parecen pesadas, como paralizadas, rígidas, pesadas sobre todo después del sueño; LAS ARTICULACIONES PARECEN MÁS DÉBILES Y DAN IMPRESIÓN DE DISLOCARSE FÁCILMENTE; LOS ESFÍNTERES terminan por ser atacados y perder tonicidad : poco a poco, la evacuación de vejiga e intestinos se hace más difícil, perezosa, pero no hay verdadera parálisis, más bien inercia.

Por éstasis venoso, sepia manifiesta en mucosas TENDENCIA CATARRAL MARCADA que se traduce EN SECRECIÓN MUCOSA ESPESA Y BLANCA COMO LECHE, O ESPESA AMARILLA Y VERDOSA, CON FORMACIÓN DE COSTRAS SECAS EN MUCOSAS.

Organismo profundamente atacado : CAMBIOS Y ELIMINACIONES SE HACEN MAL; las excreciones se hacen fétidas, AGRIAS, EXCORIANTES y el tinte es AMARILLO, TERROSO, aparece DISPOSICIÓN MARCADA A ERUPCIONES Y ULCERACIONES MALSANAS DE LA PIEL.

Estado general gravemente atacado y rápido agotamiento.

Sus principales centros de acción son : a) SISTEMA NERVIOSO SIMPÁTICO : por medio del cual disminuye la actividad funcional de todos los órganos y tejidos bajo su dependencia, con sensación de desfallecimiento, llamaradas de calor y sudores.

b) CIRCULACIÓN VENOSA : muy disminuida al punto que produce verdadera congestión venosa con éstasis sobre todo marcada en sistema porta, con plétora venosa de órganos pelvianos y tejidos irrigados por sistema porta.

Esto explica por qué su acción es tan grande sobre ÓRGANOS ÚTERO OVÁRICOS, en que determina CONGESTIÓN CRÓNICA, con prolapso, versión o flexión uterina y sensación "Bearing Down".

Como consecuencia de esta congestión de órganos genitales, hay numerosos trastornos reflejos.

Esta congestión uterina va acompañada de más o menos leucorrea blanca o amarillenta o también sanguinolenta.

c) ÓRGANOS DIGESTIVOS : digestión lenta con sensación de desfallecimiento en boca de estómago y constipación marcada, plétora violenta de sistema porta, congestión, en alto grado, de hígado y numerosos síntomas en relación con este estado.

d) RIÑONES : por perturbaciones propias de sepia en cambios y eliminaciones orgánicas, emiten orina turbia, de coloración oscura, muy fétida, con abundante sedimento rojo o gris.

e) PIEL : bajo su influencia se hace malsana, terrosa, con manchas amarillas, sobre todo en cara y tendencia marcada a erupciones.

El hecho notable de su patogenesia y de las modalidades sintomáticas sucesivas de su acción general sobre el organismo humano, es intensa congestión VENOSA PORTAL que es su característica.

De ahí 2 zonas principales de influencia : 1) POLO HEPÁTICO.

2) POLO GENITAL.

Características

CONSTITUCIÓN Y TIPO : Actúa especialmente sobre EL ORGANISMO FEMENINO aunque también puede ser útil en el hombre; pero ese caso de tipo femenino, como puls.

Se adapta perfectamente a mujeres en período pleno de actividad útero-ovárica; parece actuar mejor en : ALTAS, DELGADAS, DELICADAS, SENSIBLES A TODAS LAS IMPRESIONES, DE OJOS Y CABELLOS NEGROS, (aunque estos últimos no siempre son negros), tez pálida o ligeramente sucia con una especie de MANCHA AMARILLA CABALGANDO SOBRE RAÍZ DE NARIZ QUE SE EXTIENDE COMO ALAS DE MARIPOSA SOBRE MEJILLAS, BAJO LOS OJOS; otra mancha hepática AUREOLA TAMBIÉN FRECUENTEMENTE LA BOCA y es tan característica como la precedente.

Labio superior cubierto de fino vello negro aparente, mientras el labio inferior, un poco hinchado, está agrietado generalmente en el medio.

Tendencia a transpirar, particularmente órganos genitales, axilas, espalda.

Propensas a desórdenes característicos de órganos sexuales : eretismo genital con ÚTERO PESADO QUE DA SENSACIÓN DE QUERER CAER; A MENUDO PASA DE UNA SENSACIÓN Y EL ÚTERO ESTA VERDADERAMENTE PROLAPSO; el hombre también tiene eretismo sexual, pero en ambos el coito causa gran debilidad.

Estas mujeres sufren de AFLUJOS DE CALOR, CONGESTIONES LOCALES, dolor de cabeza, particularmente al despertar, en que se sienten aturridas y fatigadas.

Pero lo más notable es sobre todo el éstasis portal que las marca profundamente : además de los síntomas uterinos que están íntimamente ligados con la plétora venosa portal, el HÍGADO ESTA CONGESTIONADO, perezoso, lo mismo que el estómago que presenta dispepsia atónica; el intestino sufre muy a menudo CONSTIPACIÓN REBELDE.

En la orina hay uratos en cantidad más o menos grande y una serie de signos que atestiguan mala asimilación.

EL ASPECTO GENERAL DE TALES PERSONAS NO ES JAMAS DE FUERZA NI SALUD, MAS BIEN DE POSTRACIÓN, LANGUIDEZ, CON GRAN LASITUD DE TEJIDO CONJUNTIVO; TIENEN FÁCILMENTE PALPITACIONES Y ANIQUILAMIENTO FÍSICO EN RELACIÓN CON ANIQUILAMIENTO MORAL.

sepia Mujer de cabellos (bastante escasos) y ojos negros; Cara amarilla y más bien flaca, tez descolorida, terrosa.

Algunas pecas; Párpados pesados e incompletamente abiertos con ptosis más marcada en el izquierdo; Silla amarronada en raíz de nariz con "alas de mariposa" en mejillas u ojos.

Mancha marrón que rodea la boca; Labio superior cubierto por fino vello aparente; Labio inferior un poco caído, hinchado, con algunas grietas en el medio; Expresión fatigada e indiferente, apática, irritable, que da impresión de llano fácil.

Rasgos blandos, débiles, faltos de firmeza.

(Dr. Brissaud)

Síntomas mentales

Una de sus características más marcadas es su estado mental, sus síntomas mentales.

PARECE ABOLIR EL PODER DE SER NATURALMENTE AMABLE, AFECTUOSO; esto se demuestra por el lenguaje de una madre de familia : "siento que debería amar más a mis hijos, a mi marido, mi casa y a pesar de mi deseo no consigo tener esos sentimientos" (Kent).

Enferma TRISTE, DEPRIMIDA, LÁNGUIDA; LLORA FÁCILMENTE, se vuelve INDIFERENTE A TODO; OCUPACIONES, FAMILIA, A LAS PERSONAS QUE MAS QUIERE, su casa, todo lo suyo.

Su memoria ES DÉBIL Y SIENTE SU CABEZA "VACÍA", lo que le apena.

A esta depresión, a esta tristeza melancólica del espíritu, se une IRRITACIÓN QUE PUEDE LLEGAR A IRASCIBILIDAD MUY MARCADA : SE TORNA DE CARÁCTER ODIOSO.

No es mala ni francamente colérica, sino constantemente irritable, no sabe lo que quiere, contradice todo lo que le dicen; su hipersensibilidad la hace llorar sin cesar, la pone hipocondríaca, la empuja a la soledad a la que teme, pues su angustia es perpetua, sin ideas fijas, pero está como envuelta en una nube de melancolía que pinta toda su vida de negro.

Su astenia es extrema y la evolución de sus tendencias psíquicas la conduce a retraerse cada vez más en su actividad física, intelectual y sentimental, a indiferencia perfecta por sus ocupaciones preferidas, a sus afectos más caros.

1) DEBILIDAD Y DESFALLECIMIENTO : SENSACIÓN DE VACÍO EN BOCA DE ESTÓMAGO.

Muy débil; un paseo, aún pequeño, la fatiga mucho; DESFALLECE FÁCILMENTE; por calor o frío, tiempo húmedo, arrodillándose, después de corto paseo a pie o en coche, etc., por pequeñeces.

Un síntoma muy característico es : SENSACIÓN DE VACÍO, DESFALLECIMIENTO EN BOCA DE ESTÓMAGO, NO MEJORADA POR COMER; frecuentemente unido a desórdenes; y en conexión con estado de ptosis de órganos y postración general.

En esto puede compararse con sulph. : sensación de vacío de estómago, como si se muriera de hambre, a las 11, a menudo asociado con sensación de ardor en planta de pies, de noche y calor en la coronilla de la cabeza.

Phosph. : sensación marcada de vacío en la boca de estómago, pero se extiende a todo el abdomen y se agrava de noche y debe levantarse para comer.

Ignat. : sensación de vacío, desfallecimiento, pero no ligada a desórdenes orgánicos, sino que es manifestación puramente nerviosa, ligada a veces a desórdenes verdaderamente histerálgicos matriz y sistema nervioso presentan estado irritable.

Hydrast. : desfallecimiento muy marcado.

Lycop. : hambre pero se sacia a los primeros bocados; alternativas de hambre e inapetencia.

China : alternativamente, gran apetito e inapetencia como lycop.

Iodium : necesidad de comer todo el tiempo y mejora mientras come.

2) MANCHAS AMARILLAS ESPECIALMENTE EN CARA, DE FORMA CARACTERÍSTICA : Salpicadas en todas LAS MEJILLAS, sus manchas amarillas se agrupan más generalmente en coloración uniforme que cubre nariz y parte que rodea mejillas, como una silla de montar sobre arista de nariz, o dos manchas a cada lado de alas de nariz, o hacia las sienes, o en cualquier parte del cuerpo, sobre todo VIENTRE.

3) LLAMARADAS DE CALOR CON TRANSPIRACIÓN Y DESFALLECIMIENTO : Congestiones locales y llamaradas de calor casi tan características como en sulph., pues la irregularidad de circulación es tan marcada en uno como en otro, pero sepia no tiene sensación tan intensa de calor como sulph.; en sepia hay tendencia muy marcada a asociación de síntomas congestivos con pelvianos, de pesadez característica; las llamaradas de calor parecen tener origen en órganos pelvianos e irradiar a todo el cuerpo; la congestión de órganos va acompañada de muchos latidos y pulsaciones.

4) SENSACIÓN DE PESADEZ HACIA ABAJO, PRESIÓN DE ARRIBA HACIA ABAJO, EN REGIÓN PELVIANA, CON DOLORES TIRANTES DE SACRO; SENSACIÓN DE CAÍDA DE TODOS LOS ÓRGANOS PELVIANOS.

Dolores de útero, como de parto, con sensación tal, que tiene que cruzar las piernas o sentarse con las piernas apretadas como para retener algo que parece querer salir de la vagina (Guernsey).

Prolapso de útero con sensación como si algo quisiera salir por vulva (Lippe).

Presión en vejiga y micciones frecuentes, con sensación de tensión en partes inferiores de abdomen.

Sensación de peso, de bola en recto.

Modalidades

Lateralidad

Izquierda

Agravaciones

a) A LA MAÑANA Y AL ATARDECER, de manera general, la tarde trae mejoría momentánea.

b) Por aire frío.

c) Lavándose.

d) ANTES DE TORMENTA.

e) DESPUÉS DE LA COMIDAS.

Mejoría

a) A LA TARDE.

b) POR EJERCICIO VIOLENTO (que da un latigazo a la circulación venosa obstruida).

c) POR CALOR DE LECHO, POR APLICACIONES CALIENTES.

d) TENIENDO LAS PIERNAS LEVANTADAS.

Síntomas mentales

COMPLETA INDIFERENCIA POR LOS QUE MAS QUIERE; aversión por su familia, casa, ocupaciones habituales.

TRISTE, MISERABLE, LLENA DE ANSIEDAD, MIEDO, IDEAS NEGRAS, SE ASUSTA DE TODO, INQUIETA POR SU SALUD, SENSIBLE A TODAS LAS IMPRESIONES, MENTE PEREZOSA, MEMORIA DEBILITADA, NO TIENE ALEGRÍA DE VIVIR, INDOLENTE, FATIGADA FÍSICA Y MORALMENTE, TACITURNA, responde apenas a las preguntas, muy distraída.

EXCESIVAMENTE IRRITABLE, se agrava por ruido, sociedad, aunque sea asusta de estar sola.

FÁCILMENTE SE OFENDE, NO SOPORTA CONTRADICCIÓN, CARÁCTER EXCESIVAMENTE DIFÍCIL Y DESAGRADABLE, DESCARGA SU MAL HUMOR Y CÓLERA CONTRA LOS QUE MAS QUIERE, TODO LA EXCITA, LA ABURRE.

Este estado mental debe diferenciarse de puls. que también tiene estado de llanto, con ansiedad, mal humor, tristeza y preocupación extrema por su propia salud.

Puls. tiene un fondo de suavidad, busca ser rodeada de ternura y consuelo.

Sepia tiene irritabilidad colérica e indiferencia fría, carácter difícil, personal y desagradable, que no permite confundir los dos estados mentales.

Nat. mur. : complementario de sepia, ambos tienen humor lloroso, gran depresión mental, memoria disminuida, indiferencia; ambos se agravan por consuelo, desean que los dejen tranquilos, tienen gran debilidad e irritabilidad nerviosa.

Pero la INDIFERENCIA DE nat. mur., proviene de su desesperación y languidez de espíritu, en sepia tiene su origen en AVERSIÓN NO DISIMULADA POR TODOS LOS QUE LA RODEAN Y SON MAS QUERIDOS; sepia TIENE ERETISMO VASCULAR Y nat; mur. NO; con sepia, los trastornos de la sensibilidad determinan trastornos congestivos de la cabeza, pecho.

Una conversación animada provoca tufaradas de calor en la cara y toda agitación pronto va seguida de sudores.

Con nat. mur. los síntomas están más en conexión con debilidad nerviosa, lo que hace que las emociones determinen dolor de cabeza; los PENSAMIENTOS DESAGRADABLES, TRISTEZA, DEBILIDAD O IRRITABILIDAD, PERO SIN ERETISMO CIRCULATORIO.

Si es una hipocondríaca, es un estado de melancolía por depresión mental en relación íntima con la INERCIA DE INTESTINOS de nat. mur. y en sepia, el mismo estado está ligado a ESTASIS PORTAL MUY MARCADO, MAS PERSISTENTE Y ASOCIADO A TEMPERAMENTO MAS IRRITABLE.

Se puede encontrar perfectamente indicado a nat. mur. cuando el ESTADO MENTAL ESTÁ LIGADO A IRREGULARIDAD MENSTRUAL O PROLAPSO UTERINO, PERO SIN LA OBSTRUCCIÓN VENOSA DE sepia.

Caust. : causa gran tristeza particularmente antes de reglas como sepia.

Cara amarilla, pero la enferma es tímida, tiene estado de ansiedad que no se encuentra en sepia; teme la POSIBILIDAD DE ACCIDENTES PARA ELLA O LOS SUYOS.

Sueño

Gran deseo de dormir de día y al atardecer.

Luego gran insomnio por sobre excitación.

Despertares frecuentes sin causa aparente; sueño agitado, con sueños fantásticos, terroríficos, angustiosos, frecuentes sobresaltos de susto; puede tener sueños lascivos durmiendo, cree oír que la llaman; o grita y mueve sin cesar los miembros agitados por continuos estremecimientos.

Despierta a las 3 ó 4 y no puede volverse a dormir.

Cuando tiene que levantarse está muy cansada, con sensación de no haber tenido un sueño reparador.

Tal sueño nos hace pesar en magn. mur.; en sulph. : "sueño de gato", despierta a las 4 y no se duerme más.

Platina : durante muchas noches, despierta sin razón alguna a las 3, pero se vuelve a dormir en seguida; nux v. de sueño y despertar tan característicos : ars. : después de medianoche y sobre todo alrededor de las 3 se agita y sólo duerme a ratos; graph. : despierta a las 3 y no puede dormirse por mucho tiempo, por eso al levantarse está aturdido y destrozado; mezer. : despierta alrededor de las 3 con sensación de pesadez de miembros y cabeza y no puede volverse a dormir por mucho tiempo y es entonces atormentado por sueños angustiosos.

Cabeza

HEMICRÁNIA EN ENFERMAS CON TEMPERAMENTO DE sepia Y QUE SUFREN DESARREGLOS UTERINOS CARACTERÍSTICOS.

Dolores de CARÁCTER LATENTE con sensación dolorosa, de presión o estallido latido de adentro hacia afuera; localizados GENERALMENTE SOBRE UN OJO, MAS A MENUDO EL IZQUIERDO, Y SE AGRAVAN POR LUZ, RUIDO, MOVIMIENTO, SALVO EJERCICIO VIOLENTO; pueden venir en puntadas terribles que provocan movimiento espasmódico que echa la cabeza hacia atrás a pesar suyo.

Pueden ESTAR PEOR A LA MAÑANA Y VAN ACOMPAÑADOS DE NAUSEAS Y VÓMITOS, CON HIGADO OBSTRUÍDO Y ORINA CARGADA DE ÁCIDO ÚRICO.

DOLOR DE CABEZA LATENTE, EXTREMADAMENTE doloroso en el momento de la formación con débil secreción menstrual.

CEFALEA CONGESTIVA DURANTE REGLAS, CUANDO LA SECRECIÓN ES POCO ABUNDANTE (ver sang.).

Cefalea el día que está libre o franco en el trabajo (sulph.).

Sensación de frío en la coronilla de la cabeza.

Vértigos con sensación de que algo gira dentro de ella, peor al agacharse o caminar.

Cefalea en frente principalmente arriba de cejas, o en occipucio, con sensación de presión y estallido, peor a la mañana, al aire libre, por trabajo mental, por ejercicio moderado.

Los cabellos se ponen grises y caen en gran cantidad.

Comezón de cuero cabelludo que se cubre de erupciones húmedas, rezumantes, sobretudo en coronilla y nuca; cuero cabelludo sensible al tacto.

Cara

HABITUALMENTE CARA PÁLIDA, TEZ AMARILLA, TERROSA O DE ASPECTO SUCIO; NUMEROSAS PECAS Y SOBRE TODO ANCHAS MANCHAS AMARILLAS ALREDEDOR DE LABIOS Y MENTÓN, O

BAJO LOS OJOS, A CADA LADO DE LA NARIZ SOBRE LA CUAL CABALGAN Y SE REÚNEN EN FORMA DE MARIPOSA O SILLA DE MONTAR.

Puede estar hinchada, con aspecto abatido, de miedo, párpados superiores hinchados y caídos.

Labio inferior un poco hinchado y resquebrajado en el medio, labio superior recubierto de vello negro, si es morena, más o menos aparente.

A menudo es útil en erupciones herpéticas en cara, labios y mentón.

Ojos

PTOSIS, principalmente izquierda; periódica y sobreviene después de exposición a viento seco o por aire frío, especialmente durante reglas, acompañada de fatiga en globos oculares, con necesidad de cerrar los ojos.

Parece haber localización de ptosis general que caracteriza a sepias (caust., etc.).

NUMEROSOS SÍNTOMAS CATARRALES con vesículas, pústulas y manifestaciones esporádicas; estado de infiltración variado en y alrededor de los ojos; pústulas en globo ocular y borde de párpados; tumores tarsales; aglutinación catarral de párpados.

LE PARECE VER LOS OBJETOS A TRAVÉS DE UNA GASA O NEBLINA (KENT).

Estos síntomas oculares se relacionan con sepias tuberculinicas, con eliminaciones de endotoxinas que causan trastornos de insuficiencia hepática, congestión venosa de origen portal; de ahí metástasis tóxicas sobre ojos; o con sepias que con sus congestiones de pelvis, provoca ptosis orgánicas y reflejos nerviosos que pueden atacar acomodación y sistema nervioso extrínseco del ojo (Dr. Nebel).

Oídos

SECRECIÓN DE PUS AMARILLENTO, espeso, ofensivo.

Sensación de obstrucción de conducto auditivo.

Zumbidos.

Aparato digestivo

BOCA :

Gusto pútrido y viscoso con aliento fétido.

La lengua puede estar pálida, floja, toma fácilmente la impresión de los dientes, lo que recuerda a merc.

Puede estar cargada, blanca y limpia durante reglas.

Puede haber sensación de ardor como si hubiera sido quemada, en paladar y lengua, sobre todo marcada en la punta. Odontalgia peor al contacto del aire, en el lecho o comiendo caliente.

Labio inferior hinchado con grietas sobre todo al medio.

ESTOMAGO :

NO TIENE HAMBRE, puede haber ANOREXIA.

DESEA COSAS ÁCIDAS, VINAGRE, PICKLES, condimentos y la satisfacción del deseo parece aliviar los síntomas. (ant. crud.).

NO PUEDE SOPORTAR LECHE que la agrava (aeth., calc. ost., carb. veg., conium, magn. mur., magn. carb., nat. carb., sulph.); no le gusta mucho la CARNE (alumina, amica, calc. ost., carb. veg., puls., sulph.).

A menudo LA VISTA U OLORES DE ALIMENTOS LE DAN NAUSEAS (colch.) NAUSEAS A LA MAÑANA ANTES DE COMER.

Esto hace a veces de sepias un buen remedio para náuseas y vómitos de embarazo. (nux v.).

Aunque la anorexia sea una de las características de sepias, se ha notado a veces GRAN SENSACIÓN DE HAMBRE difícil DE SATISFACER AUNQUE COME ENORMEMENTE.

Este síntoma que parece contradictorio con la anorexia que parece ligada a su estado de insuficiencia hepática se explica si se lo considera en conexión CON LA GRAN FATIGA DEL REMEDIO y sobre todo con LA SENSACIÓN DE VACÍO, DE TIRONES EN EPIGASTRIO Y ABDOMEN Y PTOSIS DE VÍSCERAS DE PARTE INFERIOR DEL TRONCO.

Sensación de vacío, tirones, gran hambre, que no mejora comiendo o mejor a poco tiempo.

Todo tiene gusto muy salado (carb. veg., china) (Boericke).

Dispepsia ácida con abdomen hinchado y eructos agrios.

Tendencia a vomitar después de comer.

Trastornos dispepticos con lengua blanca y gusto ácido y amargo.

Pirosis.

Eructos ácidos.

Dolor de cintura alrededor de hipocondrio.

Generalmente los trastornos dispepticos van asociados a síntomas uterinos.

Dispepsia por tabaco.

ABDOMEN, RECTO Y DEPOSICIONES :

SENSACIÓN DE PTOSIS, RELAJAMIENTO DE ÓRGANOS DEL ABDOMEN QUE RESPONDE A REALIDAD ANATÓMICA.

Abdomen hinchado, distendido y digestión intestinal lenta, con ruidos, presión y pesadez abdominal.

SENSACIÓN DE PLENITUD, PRESIÓN, PINCHAZOS EN REGIÓN DEL HÍGADO QUE ESTACONGESTIONADO, MAS O MENOS HIPERTROFIADO Y DOLOROSO A PALPACIÓN, CON MANCHAS AMARILLAS EN PIEL DE ABDOMEN.

INTESTINO PEREZOSO; DEPOSICIONES DURAS, INSUFICIENTES, PERO AUN NORMALESEXPULSADAS CON DIFICULTAD.

ESCIBALOS MARRÓN OSCUROS, PEGADOS POR MUCUS.

SENSACIÓN DE PESO, BOLA EN RECTO, QUE NO SE ALIVIA POR DEPOSICIÓN.

SENSACIÓN COMO DE BOLA EN RECTO; NO PUEDE HACER ESFUERZOS; tenesmo con puntadasde abajo a arriba.

CONSTIPACIÓN POR FALTA DE DESEO Y NECESIDAD DE EVACUAR DURANTE DÍAS YDÍAS; PROFUNDA INACTIVIDAD, GRAN PEREZA DE RECTO NO PUEDE EXPULSAR LA DEPOSICIÓN.

Tejidos, alrededor de recto, relajados e infiltrados de sangre venosa;esto puede traer PROLAPSO RECTAL, GRUESAS HEMORROIDES SALIENTES Y SECRECIÓN CONSTANTE, HUMEDAD TENAZ DE ANO. HEMORROIDES SENSIBLES Y DOLOROSAS QUE SANGRAN AL EVACUAR CON SENSACIÓN DEPLENITUD EN RECTO, COMO SI ESTUVIERA DISTENDIDO POR CUERPO EXTRAÑO QUE EXCITARA LA NECESIDAD DE EVACUAR (NUX V.).

Aparato urinario

Puede haber DESEO ANORMALMENTE FRECUENTE DE ORINAR Y MICCIONES REPETIDAS por presión de vejiga por ptosis de órganos pelvianos sobre todo útero, que puede estar prolapsado o en ante flexión.

VEJIGA IRRITABLE Y SECRECIÓN INVOLUNTARIA DE ORINA EN EL PRIMER SUEÑO.

INCONTINENCIA; en el primer sueño, en cuanto se duerme; aquí generalmentesepia sigue bien a caust.

ORINA DE OLOR FÉTIDO PARTICULAR, a tal punto que no puede tenerse enla pieza; muy turbia en reposo y con DEPOSITO QUE SE ADHIERE MUY TENAZMENTE COMO ARCILLA QUEMADA Y MOLIDA, MARRÓN O ROJIZA COMO POLVO DE LADRILLO. (caust., kali carb., berb. vulg., benz. ac.).

Órganos genitales

MASCULINOS :

Transpiración irritante de escroto.

Debilidad de órganos sexuales.

Frigidez.

"Gota militar"; secreción liviana pasiva, durante mucho tiempo; frecuentesemisiones de esperma acuoso y claro.

Se considera a sepia y kali hydr., como grandes remedios para gota crónica,"gota militar", persistente.

Condilomas alrededor de glande.

FEMENINOS :

He aquí una gran esfera de acción del remedio tanto directamente como por acción refleja.

Sus síntomas en órganos genitales de la mujer son muy marcados, muy profundos,muy característicos.

EN ÚTERO, DOLOROS COMO DE PARTO, CON SENSACIÓN TAL QUE DEBE CRUZARLAS PIERNAS Y SENTARSE CON LAS PIERNAS APRETADAS, COMO SI DESEARA RETENER ALGO QUE TRATARA DE SALIR POR VAGINA. (bell., kreos., lac. can., lil. tig., nat. carb., y podoph.).

DOLOROS DE ÚTERO, SENSACIÓN DE PRESIÓN HACIA ABAJO, DE ESPALDA A ABDOMEN, QUECAUSA OPRESIÓN Y CRUZA LAS PIERNAS PARA EVITAR PROLAPSO DE ÚTERO.

PESADEZ COMO SI ALGO QUISIERA PASAR A LA FUERZA A TRAVÉS DE VULVA Y ESTASENSACIÓN PARECE ALIVIADA POR SENTARSE CRUZANDO LAS PIERNAS.

A esta sensación de pesadez can asociado DOLOR DE ESPALDAS, EN REGIÓNLUMBO SACRA, PEOR CUANDO ESTA PARADA O CAMINA.

DOLOROS ARDIENTES DE ÚTERO Y A VECES DOLOROS AGUDOS LATENTES HACIA LA PARTESUPERIOR DEL ÓRGANO; PUEDE HABER SENSACIÓN DE CONSTRICCIÓN DOLOROSA COMO SI EL ÚTERO FUERA AGARRADO POR UNA MANO.

CONGESTIÓN O INDURACIÓN DE CUELLO DE ÚTERO CON SENSIBILIDAD O ARDOR.

OBSTRUCCIÓN CONGESTIVA DE ÚTERO QUE ES DESPLAZADO, PROLAPSADO O EN MALA FLEXIÓN;Y LEUCORREA ABUNDANTE GRIS AMARILLENTO, MUY FÉTIDA.

REGLAS EN GENERAL TARDÍAS Y POCO ABUNDANTES AUNQUE EXCEPCIONALMENTEPUEDEN ADELANTARSE Y SON PROFUSAS.

Antes de reglas, cólicos; durante reglas, melancolía, odontalgia, cefalalgia,FATIGA DOLOROSA DE MIEMBROS, O CÓLICOS ESPASMÓDICOS Y SENSACIÓN DE PRESIÓN, PESADEZ EN REGIÓN UTERO-VAGINAL.

REGLAS IRREGULARES : atrasadas y poco abundantes, o adelantadas yprofusas con sangre negra.

Conium tiene reglas semejantes con curiosa relación refleja entre útero ysenos que están grandes y dolorosos antes de reglas.

Iodium : igualmente y esta irregularidad de reglas va acompañada de vértigosy palpitación.

Senecio : además de reglas irregulares, dismenorrea por falta de tonicidadde útero.

Thuya : en general se agrava durante reglas, irregulares come sepia; tienedolores como de parto.

LEUCORREA AMARILLO VERDOSA CON MUCHA COMEZÓN Y FETIDEZ EN GENERAL. (ars. alb., cham., bovista, hydrast., lach., lill., merc., nat. sulph.).

Dolores picantes en parte superior de vagina, que irradian hasta ombligo.

VAGINA DOLOROSA DURANTE COITO.

El conjunto de esta acción de sepia sobre órganos genitales femeninos lo tienen también dos medicamentos que desarrollan en esta esfera un cuadro patogenético muy parecido : mur. purp. : sensación de vacío, desfallecimiento en boca de estómago y de presión hacia abajo, como si órganos de pelvis menor quisieran salir, "Dolores de útero; sensación de dolorimiento en útero (helon.), "siente" el útero; útero tan doloroso que no puede caminar sin sufrir; sensación de ptosis, de prolapso uterino, con verdadera ptosis uterina; hipertrofia de útero con tenesmo pelviano y dolores punzantes que irradian al pecho y agravado acostándose; dismenorrea y endometritis crónica con desplazamiento uterino; necesidad de apretar los muslos como para retener el contenido pelviano" (Nash).

Todo esto se parece a sepia; pero la gran diferencia es que en sepia no hay deseo sexual, hasta hay aversión, sobre todo cuando hay prolapso.

En mur. purp. deseo contrario, EXTREMADAMENTE VIOLENTO, IRRESISTIBLE; EL MAS LIGERO TOCAMIENTO PUEDE LLEVAR AL PAROXISMO ESTA FIEBRE SEXUAL, ESTA IRRITACIÓN DEL ERETISMO GENITAL POR EL MAS LIGERO CONTACTO ES CASI CARACTERÍSTICA (Nash).

La enferma de mur. purp., es fácilmente excitada y sigue el camino casi siempre fatal de la ninfomanía (lil. tig., platina).

EL MENOR CONTACTO EN VULVA PROVOCA VIOLENTA IRRITACIÓN SEXUAL (orig., zincum).

En esfera genital lill. tigr. es muy parecido a sepia : conviene a muchos estados reflejos que dependen de ciertas condiciones patológicas del útero y sus reflejos.

Lill. tiene de manera muy marcada este síntoma : PESADEZ CON SENSACIÓN COMO SI EL CONTENIDO DE LA PELVIS QUISIERA SALIR POR VAGINA A MENOS QUE LO CONTENGA POR PRESIÓN DE LAS MANOS O SENTÁNDOSE.

Es muy eficaz en desplazamientos uterinos : la sensación de constante pesadez hacia abajo en región uterina va acompañada de sensación muy marcada como si las VÍSCERAS PELVIANAS Y TODO EL CONTENIDO ABDOMINAL FUERAN ATRAÍDOS HACIA ABAJO HASTA LA VAGINA; ESTA SENSACIÓN DE PTOSIS SE SIENTE TAMBIÉN EN EL PECHO, HASTA LOS HOMBROS.

El diagnóstico entre lill. tig. y sepia no siempre es fácil; los casos de sepia son más bien crónicos, los de lill. tienen manifestaciones más intensas, dolorosas, molestas, más agudas; pero si la caquexia del remedio es bastante marcada, decidirá en favor de sepia.

Lill. tig. TIENE MAS IRRITACIÓN URINARIA QUE sepia, más frecuente necesidad de orinar y los trastornos de la micción son tan intensos que hacen pensar en cantharis; siempre en lill. tig. a la irritación vesical puede agregarse verdadera IRRITACIÓN RECTAL y (recordemos al respecto a merc. corr., caps., y nux v.) (Nash).

En ciertos casos de lill. los síntomas uterinos pueden estar disfrazados por TRASTORNOS VIOLENTOS DE CORAZÓN : palpitaciones, latidos, dolores vivos, agudos, sensación como si el corazón estuviera apretado por una mano de hierro (cactus).

Pero en realidad todos estos trastornos : cardíacos, urinarios y rectales parecen de origen reflejo cuyo punto de partida se encuentra en útero y ovarios.

Aparato circulatorio

Gran congestión venosa principalmente de sistema porta.

Sepia puede tener gran resonancia sobre manifestaciones circulatorias.

Llamaradas de calor que comienzan en el tronco y suben a la cabeza con ansiedad y sensación de presión y terminan en transpiración.

Se nota también sensación de congestión latente, pulsátil, particularmente en epigastrio, región hepática, uterina y riñones.

Dolores latentes de útero que está repleto de sangre caliente, sensible al tacto, pesado y desplazado de su posición normal.

Manos calientes y pies fríos o en cuanto los pies se calientan, las manos se enfrían.

Palpitaciones de corazón a la noche después de la comida.

Suspensión de latidos de corazón con gran angustia sobre todo al levantarse de la cama.

Epistaxis por supresión de reglas (phosph., puls., etc.) o estando en pie demasiado caliente.

Aparato respiratorio

NARIZ :

Catarro crónico con secreción mucosa espesa, abundante, no irritante (kali bichr., puls.).

LARINGE :

Ronquera súbita, sequedad de laringe y tráquea.

Escozor de laringe.

BRONQUIOS Y PULMONES :

Tos que parece venir de estómago o abdomen, con expectoración salada y pinchazos en epigastrio.

Tos a la mañana con expectoración abundante, salada.

Tos seca, breve, espasmódica, fatigante, a la noche en cama, casi sin expectoración.

El Dr. Pierre Schmidt, en la publicación de un caso interesante ; "La tos desepia" señala como grandes características : agravación de la tos por posición acostada y mejoría sentándose; tos que impide dormir y despierta, tos que parece venir del estómago; debe apretarse el pecho mientras tose.

Asma nocturna.

Disnea peor después del sueño.

Espalda y extremidades

Sensación de debilidad en parte baja de la espalda.

TODOS LOS DOLORES PARECEN IRRADIAR A LA ESPALDA.

Sensación de frío entre hombros (ab. can., amm. mur., capsic., lach. nant.).

Debilidad en base de riñones.

DEBILIDAD EN ARTICULACIONES SOBRE TODO TIBIO-TARSIANA que se tuerce fácilmente cuando camina.

Indicado en casos en que las articulaciones se dislocan fácilmente. (caust.).

Temor continuo de torcerse.

Sensación de pesadez y rotura en miembros.

Crujidos de rodillas y tobillos.

Rigidez de extremidades inferiores y rengueo; rigidez de tendón de Aquiles.

Piel

Como consecuencia de mal estado de hígado, hay en piel numerosas MANCHAS AMARILLO MARRÓN en la cara, donde tienen el aspecto característico ya descrito, en pecho y vientre.

Pecas en mujeres jóvenes.

Muchos síntomas de piel dependen de la circulación venosa defectuosa que la hace más susceptible.

Sensibilidad dolorosa de piel, que está HÚMEDA sobre todo en rodillas y otras articulaciones.

ENROJECIMIENTO Y COMEZÓN que se transforma a menudo en sensación de ardor, después del rascado, (sulph.).

ERUPCIONES VESICULOSAS ALREDEDOR DE BOCA Y MENTÓN.

Herpes.

Erupciones herpéticas, vesiculosas, principalmente en ARTICULACIONES, codos, rodillas y sobre todo articulaciones de dedos que se localizan SOBRE TODO EN PLIEGUES DE FLEXIÓN, pues es una característica general del remedio determinar TRASTORNOS CUTÁNEOS, PARTICULARMENTE EN PLIEGUES ARTICULARES.

PRURITO NO MEJORADO POR RASCADO.

Sepia causa y cura, como sulph., numerosas formas de erupción de piel; hay gran parecido entre estos dos antipsóricos; cada uno de ellos sigue a menudo bien al otro, por supuesto cuando los síntomas concuerdan, cosa frecuente.

Sepia puede presentar ULCERACIONES PERO GENERALMENTE INDOLORAS que no se encuentran en borax ni en merc.

LA PIEL de sepia tiene en GENERAL MAL OLOR.

Transpiración fétida en axilas; HIPERHIDROSIS Y "BRONQUIDROSIS"; transpiración de pies, sobre todo en planta y dedos grandes, de olor fétido.

Relaciones

Incompatibles

Lach., puls.

Antídotos

Aconit., antim. crud., rhus tox.

Complementarios

Nat. mur., nux v., que intensifica su acción.

SILICEA

Silicea, tierra silicea o ácido salicílico es un compuesto oxigenado de silicium.

Se encuentra en la naturaleza en gran número de variedades minerales : cristal de roca, sílex, ágata, ónix, ópalo etc.

Para preparar el medicamento homeopático se usa silicea pura extraída de cristal de roca.

Las tres primeras dinamizaciones por trituración; a partir de la tercera se obtienen las más elevadas por dilución hahnemanniana.

Es uno de nuestros grandes remedios constitucionales, pero sólo puede tener valor como tal si se desarrolla el poder terapéutico por procedimientos de dinamización de Hahnemann.

En estado natural, es un cuerpo insoluble de acción nula; dinamizado es uno de los remedios más poderosos de la Materia Médica : es un gran ejemplo de la eficacia de la potencialización.

Acción general del medicamento

PREDOMINA EN TEJIDO CONJUNTIVO, es como una especie de cemento celular.

Es esencial en número considerable de PROCESOS DE ASIMILACIÓN en los tejidos más diversos : nervioso, cutáneo, ganglionar, óseo, fibras elásticas de aparato pulmonar y sistema vascular.

DOMINA EN CIERTO MODO LA NUTRICIÓN GENERAL DEL INDIVIDUO y responde A MALASIMILACIÓN, PERTURBACIÓN EN CAMBIOS NUTRITIVOS, EN GRADO DE DESMINERALIZACIÓN AVANZADO DE LA CÉLULA y se manifiesta por EXTREMA DEBILIDAD FÍSICA Y MENTAL, y en el niño por DETENCIÓN DE DESARROLLO.

Está en relación estrecha con inflamación de tejidos, cuando ha progresado hasta SUPURACIÓN.

Cada vez que se ha formado pus, puede estar indicada.

Como calc. sulph., corresponde a procesos supurativos; particularmente cuando la zona está infiltrada y debe continuar hasta que toda infiltración desaparezca.

Si la curación tarda y la supuración persiste corresponde calc. sulph.

Características

1) CONSTITUCIÓN Y TIPO : Acción lenta.

Se necesita mucho tiempo para desarrollar los síntomas.

Por eso conviene a enfermedades de desarrollo lento.

Se ve, en ciertos momentos del año y en ciertas condiciones, aparecer síntomas que muestran que su influencia dura siempre y puede persistir en algunos por el resto de su vida.

Así actúan los medicamentos de acción larga y profunda; son capaces de impregnar profundamente el organismo, descubren taras hereditarias dormidas y las hacen manifestar por síntomas aparentes (Kent).

Conviene mejor a individuos que desarrollan muy completamente su historia patogenética : HIPERSENSIBLE, DELGADO NO POR FALTA DE ALIMENTACIÓN, SINO DE ASIMILACIÓN (Nash).

El niño de sílicea no es anormalmente gordo, pero tiene vientre grande, miembros delgados, cara desdichada, envejecida; no aumenta de peso, ni fuerzas, tarda en caminar; parece detenido en su desarrollo : Cabeza muy grande, transpira fácilmente, cuero cabelludo, cuello y cara; calc.

ost., transpira en cuero cabelludo solamente.

Niños escrofulosos con vientre grande y tobillos débiles, transpiran abundantemente toda la cabeza.

Constipación fácil característica : hace violentos y largos esfuerzos y consigue deposición incompleta que no tarda en volver a entrar casi completamente, como si su debilidad general afectase poder expulsivo de recto.

En otros casos, diarrea persistente especialmente durante dentición o calores; no tiene dos deposiciones iguales pero no hay que dejarse engañar por este solo síntoma y dar puls.

Este pequeño enfermo come bien, pero conserve o no su alimento la debilidad aumenta, la delgadez progresa y puede haber muerte por inanición.

Nervioso, movedizo, inquieto, agitado, hipersensible; inteligente, extremadamente sensible, moral y físicamente, se estremece al menor ruido; ansioso, tímido, propenso a ideas fijas, testarudo, obstinado.

El adulto delgado, débil, con músculos blandos, como su moral y sistema nervioso que están debilitados; deprimido, afectado por agotamiento con eretismo, irritable, débil, tímido, sumiso, dócil, se deja estar sin energía; el trabajo mental le es muy difícil; leer, hablar, pensar, la fatigan.

2) ESQUEMA COMPARATIVO ENTRE EL NIÑO DE calc. ost., calc. phosph., sílicea y sulphur : I. calc. ostrear.

1) CUERPO GORDO, HINCHADO; LEUCOFLEMÁTICO; OLOR AGRIO EN TODO EL CUERPO MUY DIFERENTE DEL OLOR FÉTIDO DE sulphur.

2) NIÑOS APÁTICOS.

3) PIEL PÁLIDA, BLANCA, COMO CRETA.

Tez clara, ojos azules, CABELLOS RUBIOS.

4) CABEZA GRANDE, cubierta de transpiración abundante, PERO SOBRE TODO EN CUERPO CABELLUDO.

5) VIENTRE GRANDE, DURO, HINCHADO, EN MEDIO DEL CUERPO DEMASIADO GORDO.

6) DESEO DE HUEVO; TOLERA MAL LA LECHE.

7) Deposiciones acuosas CON RESTOS DE ALIMENTOS NO DIGERIDOS.

II. calc. phosph. 1) Sujeto MAGRO, con cuerpo enflaquecido.

2) Niños HURANOS, comprenden mal.

3) Tez y ojos oscuros, MOROCHOS.

4) VIENTRE HUNDIDO Y BLANDO.

5) DESEO DE TOCINO Y JAMÓN.

6) DEPOSICIONES VERDES, viscosas, en chorros con muchos gases fétidos.

III. sílicea 1) Niño FLACO con miembros delgados.

2) Niños voluntariosos, obstinados, movedizos, agitados.

Hipersensibles.

- 3) CARA INFELIZ Y AVEJENTADA.
- 4) Cabeza grande, transpira abundantemente, TANTO DE CUERO CABELLUDOCOMO DE CARA Y CUELLO.
- 5) VIENTRE GRANDE, se destaca en la delgadez del cuerpo.
- 6) FALTA DE APETITO Y GRAN SED.
- 7) CONSTIPACIÓN ESPECIAL : La deposición sale con mucha dificultadpero cuando comienza a ser expulsada, vuelve a entrar.

IV. sulphur 1) Niño de CUERPO FLACO, piel floja y arrugada, VIEJECITO, ASPECTO DE SUCIO, HUELE MAL.

2) Niños IRRITABLES Y GRUÑONES.

3) Cara pálida, AVEJENTADA, LABIOS MUY ROJOS, GRANATES como las OREJAS.

4) Cabeza GRANDE, TRANSPIRAN ABUNDANTEMENTE DURANTE EL SUEÑO.

5) VIENTRE GRANDE, llama la atención en medio del cuerpo flaco.

6) Aunque gran comilón, está delgado; BEBE MUCHO, DESEA DULCES.

A) VIENTRE HUNDIDO, BLANDO. Calcarea phosphorica Transpiración abundante de cabeza, sobre todo durante el sueño.

Enrojecimiento de orificios del cuerpo.

Cabeza (arriba) caliente y pies fríos.

1. NIÑO FLACOB) GRAN VIENTRE QUE LLAMA LA ATENCIÓN EN CUERPO DELGADO sulphur
Sucio, maloliente; gran apetito a pesar de lo cual está delgado.

Gran sed, deseo de confituras; irritable, gruñón.
silicea Sudor de toda la cabeza.

Gran sed; constipación especial.
Hipersensibilidad.

2. NIÑO GORDOC) VIENTRE GRANDE EN MEDIO DE CUERPO REGORDETE, blando como carácter; huele agrio.

Calc. ostrear.

Conviene a estados de malformación en niños cuyos fascículos nerviosos no han tenido crecimiento normal, estados de debilidad nerviosa seria en agotados por trabajo intelectual, tristeza, vida desordenada.

Indicado en supuraciones crónicas : tisis, bronquiectasia, gangrena pulmonar, en que el almacén del órgano está como roído por lesión, abscesos, ulceraciones, fistulas interminables, caries óseas, en caquéticos.

Influencia beneficiosa en arteriosclerosis al principio, en evolución de tumores muy duros : escirros, osteomas, etc. (Dr. Mouézy-Eon).

En caquexias en linfáticos o agotados por largas enfermedades, cuando esas caquexias se caracterizan por eretismo, fiebre lenta, agravada después de comer, constipación, esputos abundantes o vómitos a la mañana, cefalalgia obtusa, dolores erráticos muy vivos, piel terrosa, amarillenta, seca y lisa, *a veces cubierta de manchas ptiriásicas, silic. es el más apropiado para restablecer la armonía de funciones, reconstruir tonicidad de trama orgánica, plasticidad de sangre, dirigir fuerzas nutritivas, activar vitalidad de sistema óseo y piel.

Es uno de los remedios esenciales en diatesis purulenta, sobre tododespués de largas enfermedades y cuando hay eretismo interno y expansión con descomposición pirogénica de piel en tejido celular subcutáneo, abscesos de superficie. (Dr. Espanet).

3) FALTA DE VITALIDAD PARA RESISTIR INFLUENCIAS EXTERIORES : Parece haber falta de poder nervioso reaccional de vitalidad PARA RESISTIR las influencias deprimentes exteriores (Nash).

FALTA DE CALOR VITAL, TIENE SIEMPRE FRÍO, AUN HACIENDO EJERCICIO (Hering).

Muy sensible al aire frío, toma frío fácilmente; ESTA MEJOR AL CALOR que suplesu falta de calor natural y le da temperatura que no puede darle su propia combustión.

4) Silicea Y LA SUPURACIÓN : Silicea puede ser un precioso recurso en la supuración.

Es útil en período más tardío que hep. sulf. calc., cuando lasupuración no quiere cesar ni producirse cicatrización normal, como en abscesos fríos, etc.

Parece indicado en SUPURACIONES DE TIPO INDOLENTE NO NECESARIAMENTE MALIGNAS,PERO CON MAS O MENOS TENDENCIA A CRONICIDAD.

La constitución tiene gran importancia para la elección.

Si se elige juiciosamente es muy útil primero, actuando localmente y secandola supuración, luego levantando el estado general más o menos afectado por larga supuración.

Comparar con calc. sulph.; la diferencia está en que silic. favorece lasupuración, hace madurar el proceso y vacía el absceso; calc. sulph. favorece la detención y formación de brotes cicatriciales.

Modalidades

Lateralidad

Izquierda.

Agravación

a) POR FRÍO AL AIRE LIBRE, EN INVIERNO, DESTAPÁNDOSE A LA MAÑANA, ACOSTADO.
Friolento, sus síntomas desarrollan particularmente en tiempo frío y húmedo y pueden mejorar en tiempo frío y seco (Kent).

b) Por humedad; a veces los síntomas aparecen después de un baño.

c) DURANTE REGLAS.

d) En luna nueva y durante luna llena.

Mejoría

a) POR CALOR, en verano, se envuelve la cabeza; se AGRAVA POR EXTREMOS DE CALOR Y FRÍO; fácilmente afectado por diferencia de temperatura aún de algunos grados; enferma por tener mucho calor, se acalora y transpira fácilmente a la menor elevación de temperatura y se resfría (Kent).

b) Siendo magnetizado. (phosph.).

Síntomas mentales

Produce sobre sistema nervioso tendencia de debilidad PARALÍTICA, que parece debida A NUTRICIÓN DEFECTUOSA DE NERVIOS Y CEREBRO.

Este estado paralítico va acompañado de constipación característica e hipersensibilidad a estimulantes nerviosos.

Cerebro y médula no pueden soportar choque ni vibración común, superficie del cuerpo hipersensible a tacto e impresiones exteriores.

LA INDOLENCIA ES UNA CONTRAINDICACIÓN DE silic. EN ESTADOS NERVIOSOS; no se debe emplear en individuos flojos, sin nervios; exactamente lo contrario en trastornos de tejidos inferiores, la supuración, por ej., indolente.

Moral debilidad como todo el sistema nervioso en general.

Silic. es al espíritu humano lo mismo que el tallo de trigo.

Mirad el exterior liso, rígido, sólido, de un tallo de trigo y veréis con qué firmeza llevará la espiga; esta fuerza la debe a silic. acumulada poco a poco en sus tejidos para darle rigidez y resistencia necesarias.

Así pasa con la mente : cuando el individuo necesita silic., está en gran estado de debilidad, temor, impotencia y tiene conciencia de su impotencia (Kent).

TÍMIDO, ANSIOSO, PUSILÁNIME, CEREBRO FATIGADO, REFLEXIONA DIFÍCILMENTE, LE CUESTA FIJAR SU ATENCIÓN; DEBE SER ESTIMULADO PERO SE FATIGA FÁCILMENTE MORAL Y FÍSICAMENTE.

DESALENTADO, HURAÑO, TIENE ASCO POR LA VIDA.

Los escolares, se confunden al recitar sus lecciones porque no pueden concentrar su atención.

Debería reflexionar más pero son incapaces.

Un abogado en un pleito, un pastor u orador acostumbrado a hablaren público con confianza, seguridad, en plena posesión de su mente o palabra dirá que tiene aprensión de hablar ante un auditorio porque tiene conciencia de no poder hacerlo, de no poderse concentrar; tiene miedo de no poder arreglarse, su mente no quiere funcionar; está fatigado por el esfuerzo prolongado de trabajo mental asiduo.

Pero hace un esfuerzo de voluntad y decide vencer el temor, el propio dominio vuelve y puede hacer su discurso con soltura; la tarea se cumple rápida y correctamente.

El estado especial de silic. consiste EN TEMOR DE NO TENER ÉXITO, SI SE LE EXIGE UN ESFUERZO MENTAL O TRABAJO INTELECTUAL INUSITADO.

TEME NO ESTAR A LA ALTURA DE SU TAREA, FRACASAR, Y SIN EMBARGO CUANDO ESTÁ OBLIGADO A HACERLO, LO LOGRA CON ÉXITO.

He aquí otro ejemplo : un joven que terminó sus estudios, cerca de fin de curso, teme extremadamente el examen final y sin embargo lo aprueba, pero enseguida es presa de gran fatiga mental; no puede ejercer la profesión a la cual estaba destinado pues teme emprender cualquier cosa.

Lycop., está realmente embrutecido y su temor a emprender algo proviene de la comprensión de su incapacidad intelectual, que es real, mientras en silic.

es imaginaria.

Silic. no conviene a agotamiento nervioso, por surmenage por negocios, sino más bien al de estudiante, abogados, predicadores.

Un abogado dice : "no me he sentido bien desde el proceso X, que me exigió largo esfuerzo intelectual con insomnio".

Silic. volverá a poner en buena forma a tal cerebro.

Este miedo de fracasar en algo y que al final resulta bien, es el estado del principio de la moral del sujeto que necesita silic.; llega un momento en que no puede cumplir su trabajo con exactitud y por lo tanto puede necesitar silic.

(Kent).

NERVIOSO, IRRITABLE, MUY SENSIBLE A TODAS LAS IMPRESIONES, HIPERSENSIBLE AL RUIDO, ETC., CON ANSIEDAD, GRAN IRRITABILIDAD, NIÑOS VOLUNTARIOSOS, OBSTINADOS, HIPERSENSIBLES, AGITADOS, MOVEDIZOS.

Irritable, irascible, cuando está animado; cuando lo dejan tranquilo, tímido; trata de escapar a todo; niñas suaves, tímidas, lloronas.

El niño, gruñón, llora cuando le hablan.

Es el complemento natural y crónico de puls., por su gran parecido; es más profundo y extenso.

Silic. cura superimpresionabilidad en personas de nutrición insuficiente, no por calidad y cantidad, sino por falta de asimilación; son constipadas, propensas a neuralgias súbitas, erotismo, melancolía (Espanet).

Hipocondría religiosa; tristeza; irascibilidad; depresión (Kent).

Ideas fijas; ideas fijas de alfileres : les teme, los busca, los cuenta.

Estado mental particular marcado por tendencia a jugar durante horas con alfileres o agujas.

Sueño

Insomnio con congestión y calor en cabeza; INSOMNIO POR ORGASMOS SANGUÍNEOS; palpitaciones, pulso rápido, calor, comienza a transpirar en cuanto se duerme. (puls., conium).

Insomnio nocturno con sueño interrumpido por sueños lascivos o terroríficos.

Tufaradas de calor, borboteo de sangre, somnolencia de día y gran agotamiento; insomnio obstinado, a menudo sin ninguna afección orgánica (Espanet).

Frecuentes sobresaltos, sacudidas de miembros durante el sueño.

Habla dormido; tiene sueños angustiosos.

Sale de su lecho dormido; sonambulismo.

Inquietud nocturna con sueños lascivos o terribles, ansiedad nerviosa con movimientos congestivos de cabeza, latidos y borboteo de sangre y aunque los síntomas del sueño varían, a veces una de las contraindicaciones de silic., es el sueño apacible (Espanet).

Cabeza

Cuero cabelludo muy sensible y fácilmente doloroso.

Puede ser sede de prurito marcado o DE ERUPCIONES HÚMEDAS, eczematosas, escamosas.

Caída de cabello.

Erupción ofensiva en cuero cabelludo, particularmente en occipucio.

TRANSPIRACIÓN DE CABEZA EN NIÑOS, COMO SI HUBIERA TENIDO ENVOLTURAS CALIENTES; FONTANELAS ABIERTAS.

Puede ser muy útil cuando hay especies de nódulos generalmente de origen sífilítico bajo cuero cabelludo, entre piel y huesos del cráneo; y para tratamiento de ulceraciones fagedénicas sífilíticas de cuero cabelludo.

Hay numerosos síntomas cefalálgicos : DOLOR DE CABEZA CEREBRO ESPINAL, QUE COMIENZA EN NUCA Y ASCIENDE PROGRESIVAMENTE A CABEZA HASTA REGIÓN SUPRAORBITARIA DONDE SE FIJA.

Dolores de cabeza crónicos, con náuseas y aún vómitos.

Dolor de cabeza que comienza atrás, a la mañana o a medio día, con tendencia a ganar la frente, peor a la noche, agravado por ruido; MEJOR POR CALOR, neuralgia supraorbitaria mejorada por presión Y CALOR, con abundante transpiración de cabeza.

Dolor de cabeza de nuca a vértex, peor a la derecha, agravado por ruido, ejercicio, luz, y aliviado por calor : EN GENERAL MEJORA SU DOLOR ABRIGÁNDOSE LA CABEZA. (magn. mur., strontia).

Dolor de cabeza a través de nuca sobre todo a la derecha. (Parecido a sang.).

Sensación de peso en occipucio, como si fuera tirado hacia atrás por aflujos de sangre a la cabeza, como carb. veg. y sepia.

Dolor de cabeza una vez por semana (gels., lycop., sang., sulph.).

Dolor de cabeza latente presivo, CON SENSACIÓN DE FRÍO EN LA CABEZA Y NECESIDAD CONSTANTE DE ABRIGARLA; DOLOR de cabeza agravado al aire frío; psorin. usa gorro de piel aún en verano; mag. mur. está mejor con cabeza cubierta pero quiere estar al aire libre.

Silic. evita el aire frío; necesita abrigarse la cabeza, sobre todo la parte dolorosa que transpira abundantemente.

Dolor de cabeza agravado por esfuerzo mental, estudios prolongados, movimiento, alteración de paso, luz, agacharse, esfuerzos para evacuar, hablar, al aire frío, por tacto.

Dolor de cabeza en ayunas.

Dolor de cabeza con vértigo que coincide con existencia de pequeños nódulos bajo el cuero cabelludo, después de haber tenido hambre, por irritación abdominal o fatiga nerviosa.

Dolor de cabeza presivo de arriba a abajo con prurito intermitente en vulva.

Silic. es apto para curar jaqueca esencial en vértigo y náuseas o vómitos, sobre todo a la mañana; los dolores son desgarrantes por accesos, parecen salir de los ojos a cada tirón.

Puntadas, latidos, vértigo forman parte de ella y el movimiento de los ojos hacia arriba o abajo o el agacharse aumenta el vértigo y se acompañan a menudo con sudores en la frente (Espanet).

El dolor de cabeza de silic. se parece a spig., par. quad., picr. ac., coccul., gels., sang., etc. (Boericke), también act. rac.

Puede ser útil en apoplejía cerebral precedida por dolor profundo en región parietal derecha y pesadez, entumecimiento y dolor con calambres en brazos.

Vértigos que parecen ir, como la cefalea, de médula a cabeza; agravados al levantar la cabeza, mirar arriba (puls.); vértigo con tendencia a caer hacia adelante y hacia la izquierda, vértigo laberíntico (natr. salyc.).

Ojos

Silic. tiene numerosos e importantes síntomas en ojos.

Hinchazón roja y caliente de párpados, más marcada a la mañana y disminuyendo durante el día, con secreción espesa y abundante supuración de borde de párpados con enrojecimiento, sensación de ardor, escozor, inflamación, caída de pestañas.

Es buen remedio para orzuelos, y VÍAS LAGRIMALES, en que desarrolla muchos síntomas tipo, particularmente en bolsa lagrimal.

Inflamación con supuración de vías lagrimales, "ángulo interno del ojo" enfermo; hinchazón de conductos lagrimales; fistulas lagrimales (nat. mur., petrol.).

Las afecciones del ojo van acompañadas de FOTOFobia intensa; la luz, principalmente del día hace doler y provoca encandilamiento.

Trastornos de visión; las letras bailan ante los ojos al leer.

Dolores agudos a través de los ojos que están sensibles al tacto, sobre todo cerrados.

Excelente remedio, cuando los otros síntomas concuerdan, en iritis iridocoroiditis con pus en cámara anterior; en casos de perforación o úlcera de córnea, en abscesos de córnea después de traumatismo.

Oftalmias escrofulosas con inminencia de perforación de córnea, ulceraciones de córnea con hinchazón de bordes libres de párpados y casos muy graves de esa clase de oftalmias crónicas y a menudo indoloras (Espanet).

Oídos

Así como en trastornos del ojo, el nervio óptico es hipersensible a la luz, a menudo el nervio auditivo es hipersensible al ruido; hipersensibilidad al ruido.

Puede haber zumbidos, ruidos diversos asociados a diversas afecciones de estos órganos y aún sordera.

Silbidos como producidos por chorros de vapor; estruendo como el de un tren al pasar; que puede ser provocado por causa exterior o estado de nervios, pero en general es un principio de catarro seco de oído medio.

Útil en catarro de oído medio y trompa de Eustaquio; hay una fase de sordera que dura cierto tiempo, luego del oído vuelve después de un ruido seco provocado por escape de mucus acumulado en oído o trompa y que el enfermo describe como detonación; detonaciones súbitas en el oído o ruidos como lejanos, acompañado de vuelta del oído.

Estados catarrales de oído interno y trompa de Eustaquio con sensación súbita de obstrucción mejorada al bostezar o tragar (Kent).

Otorrea antigua, maloliente, espesa o grumosa.

Inflamación del oído medio, especialmente cuando hay supuración crónica.

Hinchazón inflamatoria de meato.

Otorrea con pus granuloso e icoroso con carie de células mastoideas.

Otitis supurada; carie de huesecillos.

Inflamación con supuración de oído después de un baño.

Eczema en pabellón de la oreja.

Tos espasmódica provocada al rascarse el conducto auditivo. (kali carb., mang.).

Cara

Pálida, cerosa; de aspecto fatigado la piel se agrieta fácilmente, particularmente en ala de nariz y labios que están agrietados; erupciones herpetiformes, acné, principalmente de mentón.

Puede haber sudor frío, pegajoso, maloliente en la frente.

Cuando hace un esfuerzo, aún ligero, TRANSPIRA PRONTO LA CARA, PARTE INFERIOR DEL CUERPO SECA O CASI; sólo un ejercicio violento provoca transpiración general; la transpiración de cara, cabeza y parte superior del cuerpo, es rasgo notable de silic.

Neuralgia facial con latidos, tirones, enrojecimiento de cara, peor en tiempo húmedo.

Ciertas neuralgias de cara, cabeza, ojos, dientes, oídos, necesitan silic.

Hay tirones, por sacudidas, dan puntadas desgarrantes; tocarlas agrava, en intervalos de paroxismos, hormigueos, prurito, debilidad; vista, oído, olfato exaltados al principio de la neuralgia o mientras dura; pierde a la vez agudeza y se embota; hay escalofríos y las extremidades están frías y por momentos, sudores parciales en pies, axilas; nariz seca, hay costras, excoriaciones en el interior; ojos lagrimosos, mucosa de boca irritada, pero piel generalmente lisa y pálida (Espanet).

Induración de tejido celular de cara por absceso de encías.

Carie y necrosis de huesos de cara con aberturas fistulosas.

Aparato digestivo

BOCA :

Síntomas marcados en labios.

Primero, LABIO SUPERIOR FRECUENTEMENTE HINCHADO como hep. sulf. calc.

De manera más general LABIOS AGRIETADOS, FISURADOS, SECOS, RESQUEBRAJADOS, ESCAMOSOS, particularmente, borde externo.

A lo largo del borde, contorno agrietado, costroso.

COMISURAS ULCERADAS, AGRIETADAS (amm. carb., aur. tryph., condurango, graph., nat. mur., nit. ac., hep. sulf. calc.).

Boca seca y puede haber sed viva.

Lengua revestida de capa marrón, tumefacta, excoriada, parece entumecida.

Un síntoma particular es : SENSACIÓN DE CABELLO SOBRE LA LENGUA, como all. sat., en que esta sensación es marcada sobre todo de noche y a la mañana; nat. mur.; nat. ph. : más marcada en la punta; kali bich. : en la base.

LOS DIENTES SE ARRUINAN POR ALTERACIÓN DEL ESMALTE, en sujetos con desmineralización de silic. marcada; la dentina contiene mucho silicato de calcio y la superficie del diente se hace rugosa, pierde su apariencia esmaltada y la carie poco a poco se instala; esto es más marcado a lo largo de la encía, en el cuello (Kent).

Los dientes duelen con tiempo húmedo y frío, dolor de muelas en tiempo lluvioso.

DIENTES AMARILLOS, se arruinan rápidamente y en cuello, se descarnan, la encía se retrae (Kent).

Violento dolor de muelas de noche, cuando ni calor ni frío alivian y después de haber tomado frío en los pies.

En GENERAL, LOS DOLORES DE DIENTES DE silic. MEJORAN EN HABITACIÓN CALIENTE Y POR BEBIDAS CALIENTES (Kent).

Dolor de dientes muy profundo en periosteo, en vaina fibrosa de raíces y formación de absceso; FÍSTULAS DENTARIAS; ABSCESOS EN RAÍZ DE DIENTES.

PIORREA. (merc. sol.).

Encías sensibles al frío, al tacto; abscesos de encías; encías hinchadas y sensibles al frío.

El niño de silic., DENTICIÓN DIFÍCIL.

HINCHAZÓN E INDURACIÓN DE GLÁNDULAS SALIVARES, SOBRE TODO PAROTIDAS, se agrandan a cada resfrío y se hacen duras (bar. carb., calc., sulph.).

Puls. conviene más en inflamación aguda de parótida, silic. en formas crónicas, en casos en que la escrófula está en juego.

En estos viejos casos crónicos los síntomas están peor después de un baño, quiere calor, teme al frío, tiritita continuamente y en hipertrofia indurada de glándulas salivares y parótidas y ganglios de cuello.

Puede ser útil en inflamación aguda o reciente de esas glándulas, pero con modalidades contrarias; el enfermo se queja de tufaradas de calor, fiebre irregular, extremidades frías y parte superior del cuerpo caliente; transpiración marcada en cabeza y cuello; sensación de calor y sofocación en habitación caliente; en esto se parece a puls. : en sus manifestaciones crónicas tiene mucho calor, pero en sus enfermedades agudas es friolento.

Silic. y puls. tienen modalidades inversas en estados agudos y crónicos; puls.

en estados agudos es friolento y transpira (Kent).

FARINGE :

En resfríos que repiten sin cesar ANGINAS, AMIGDALITIS A REPETICIÓN, que bell.

y otros remedios han curado, pero que recomienzan siempre, silic. contiene a menudo esta enfadosa tendencia; hay, en cierta manera, un catarro crónico de garganta que cada resfrío, cada enfriamiento despierta; silic. está al lado de nat. mur., para esos dolores de garganta inveterados.

ANGINAS PERIÓDICAS; enrojecimiento de mucosa faríngea; deglución difícil con dolores y pinchazos.

En AMIGDALITIS SUPURADA, cuando las amígdalas han evacuado su contenido purulento y sin embargo la cicatrización no se hace, hay que pensar en silic.

PARÁLISIS DE VELO DE PALADAR; los alimentos son expulsados por la nariz cuando trata de comer.

Al tragar se atorra fácilmente.

ESTÓMAGO :

FALTA DE APETITO Y GRAN SED.

Sin embargo, a veces hay gran hambre : la bulimia, especie de hambre canina que hace que se coma enormemente y a menudo, se relaciona con silic., sea esencial o sintomática, cuando los sujetos son secos, nerviosos, irritables, con mucha saliva, deposiciones fáciles o diarreicas y transpiración, sobre todo nocturna (Espanet).

AVERSIÓN MUY DECIDIDA POR ALIMENTOS CALIENTES, QUIERE COSAS FRÍAS; le agradan los helados, agua helada y se siente bien cuando los tiene en el estómago; a veces le es completamente imposible beber caliente, los líquidos calientes provocan transpiración en cara y cabeza y tufaradas de calor (bar. carb.) (Kent).

Pero aunque tenga aversión marcada por alimentos y bebidas calientes y los desea fríos, en afecciones del pecho bebidas y platos fríos aumentan la tos hasta sofocación y aparición de esfuerzos violentos para vomitar; es generalmente cubierto por carb. veg., pero silic. también lo tiene (Kent).

ASO POR CARNE, como alum., arnica, calc., carb. veg., puls., sepia, etc.; pero si come carne, la prefiere fría cortada en tajadas (Kent).

Intolerancia característica por ESTIMULANTES ALCOHÓLICOS.

LA LECHE NO LE CONVIENE.

El niño vomita inmediatamente después de mamar; diarrea causada por leche; se puede comparar a silic. con aeth. cyn., nat. carb., etc.

"Repugnancia por alimentos, pronta saciedad, pérdida de apetito, testimonio de anatonía de órganos digestivos.

El hambre extraordinaria de ciertos casos, traiciona la necesidad urgente de la economía de reparar sus fuerzas agotadas y darle los materiales alimenticios que le faltan" (Espanet).

Estómago a veces débil, perezoso; antiguos dispépticos que vomitan desde hace largo tiempo tienen aversión marcada por comidas calientes, no pueden digerir leche, no les gusta la carne, se encuentran bien con silic. cuando los otros síntomas mentales y físicos concuerdan (Kent).

Hipo, náuseas; eructos ruidosos, ácidos o con el gusto de los alimentos; pirosis.

Vómitos sobre todo después de alimentos calientes; vómitos después de beber (ars. alb., ver. alb.).

Vómitos acuosos con escalofríos, lengua cubierta de capa marrón; náuseas con vómitos de lo que ha bebido, peor a la mañana; el agua tiene mal gusto; vomita después de beber (Kent).

Puede curar gastralgias sea con pirosis, hipos y náuseas y vómitos viscosos; hay calor, pesadez, sensibilidad y sensación de constricción; constipación obstinada, gases, eructos, somnolencia, agotamiento frío en extremidades; pérdida de apetito; digestión lenta; laboriosa; a menudo bulimia pero con imposibilidad de satisfacer el apetito (Dr. Espanet).

Después de la comida sensación de plenitud y peso en el estómago.

Sensibilidad de hueco epigástrico; sensación dolorosa de contusión a la presión.

ABDOMEN :

Hígado grande e indurado; en abscesos de hígado, silic. es útil cuando los otros síntomas concuerdan.

Abdomen duro, tenso, sobre todo después de comer; flatulencia y borborismos.

Dolor de contusión en abdomen; cólicos, dolores cortantes alrededor del ombligo con necesidad de evacuar; sensación de constricción a través del vientre; no le gustan vestidos ajustados y se agrava después de comer y el rasgo saliente es mejoría por calor.

RECTO Y DEPOSICIONES :

Prurito, ardor en ano y recto.

Hemorroides muy dolorosas.

FISURAS DE ANO con espasmos de esfínter.

FÍSTULA ANAL.

Sujetos que son buen terreno para tuberculosis, tienen fácilmente abscesos en región del recto, abscesos que al vaciarse provocan trayecto fistuloso que no cura; y este estado parece suplir una localización pulmonar que no tarda en mostrarse si se curan brutalmente estas fístulas por intervención quirúrgica intempestiva o cualquier otro medio externo; silic., al contrario pondrá las cosas en orden, en profundidad, en un lapso de 1 a 5 años.

Transformará el terreno tuberculoso y la fístula que ya no será necesaria para drenaje curará : durante cierto tiempo el enfermo está bien, algunos años sobreviene tuberculosis pulmonar u otra y muere.

Caut., berb., calc. ost., calc. phosph., graph., sulph., pueden compararse con silic. que sigue bien a thuya (Kent).

EL RECTO PARECE PARALIZADO; HACE VIOLENTOS ESFUERZOS PARA EVACUAR.

LA DEPOSICIÓN SALE DESPUÉS DE MUCHAS DIFICULTADES, PERO CUANDO HA SALIDO EN PARTE, VUELVE A ENTRAR.

Gran constipación por incapacidad de recto para expulsar materia fecal.

Es raro que la deposición permanezca en ampolla rectal sin provocar necesidad de expulsarla, como en alumina; hay en silic. necesidad marcada de evacuar, hace muchos esfuerzos, pero el recto es incapaz de expulsar la materia, la deposición puede estar formada por bolitas o largos trozos blandos o duros, pero cualquiera sea la naturaleza de la materia que la constituye, va acompañada de esfuerzos violentos, con dolores y transpiración de cabeza; hace esfuerzos violentos y repetidos, la deposición sale un poco, el esfínter se agota, vuelve a entrar y abandona su tentativa infructuosa, desesperada; sólo puede aliviarse con ayuda de medio mecánico.

Los violentos esfuerzos que acompañan la necesidad de evacuar se encuentran en muchos remedios, pero sobre todo, con silic. en alum., alumen., china, nat. mur., nux v., nux mosch. (Kent).

CONSTIPACIÓN CONSTANTE ANTES Y DURANTE REGLAS, con irritación de esfínter (graph., kali carb., nat. mur., plumb.).

Kent señala que en ciertos sujetos con síntomas característicos silic.

ha provocado expulsión de tenia, como calc., y sulph.

Diarrea causada por leche o humedad, mucosa, disenteriforme, sanguinolenta, de olor cadavérico con necesidades frecuentes y tenesmo.

Aparato urinario

Micciones frecuentes; deseo continuo y tenesmo.

La orina sale gota a gota con viva irritación de uretra.

Incontinencia nocturna en niños.

Orina poco abundante, se enturbia rápidamente Y DEJA DEPOSITAR SEDIMENTO ROJO LADRILLO, ARENOSO.

Orina sanguinolenta, involuntaria, deja sedimento rojo o amarillo.

ORINA PURULENTA, SUPURACIÓN DE VÍAS URINARIAS; SUPURACIÓN DE RIÑONES.

PROSTATITIS SUPURADA.

Órganos genitales

MASCULINOS :

ERETISMO SEXUAL con pensamientos lascivos persistentes y espermatorea nocturna con afección paralítica.

O al contrario DEBILIDAD DESPUÉS DEL COITO QUE LO AGOTA; aunque tenga relaciones con frecuencia moderada, queda agotado, necesita de 10 a 15 días para reponerse (agaricus) (Kent).

TRANSPIRACIÓN A VECES ABUNDANTE DE ESCROTO.

Puede haber erupción eczema tosa en escroto que se extiende a superficie interna de muslos.

INFLAMACIÓN E INDURACIÓN CRÓNICA DE TESTÍCULOS con muchos dolores y sensación dolorosa como si estuvieran apretados, comprimidos.

HYDROCELE.

ABSCESOS CON FÍSTULA de periné o un testículo o de pene o próstata.

Gonorrrea crónica con pus fétido y espeso.

Emisión de líquido prostático a cada deposición o micción.

FEMENINOS :

Como en el hombre, estado de deficiencia de funciones sexuales.

Comezón en vulva y vagina.

Silic. es un remedio de primer plano para abscesos fistulizados de vulva y vagina que dejan una vez cicatrizados nódulo fibroso que se siente bien bajo la piel, o cicatriza y segrega líquido maloliente, con olor a queso rancio.

En mujeres de tal tendencia, silic. los hace a menudo desaparecer (Kent).

Quistes serosos en vagina, desde el tamaño de una arveja hasta un anaranjado o a veces pequeños quistes del grosor de una avellana agrupados; rhodo. y silic. los han curado cuando no hay otros síntomas (Kent).

También lycop. y puls. actúan bien en estos casos.

Reglas ADELANTADAS, muy abundantes, o demasiado débiles y a veces AMENORREA.

CONSTIPACIÓN DURANTE REGLAS; o sensación de ardor de vagina, con erupción encarnada interna de muslos, hacia vulva.

SECRECIÓN DE SANGRE ENTRE PERIODOS MENSTRUALES, PIERDE fácilmente sangre por útero;

sobreviene hemorragia uterina antes de reglas por agitación, sobre todo en nodrizas : SECRECIÓN DE SANGRE

POR VAGINA MIENTRAS CRÍA; cuando el niño mama, la secreción comienza; calc. ost. : hemorragias parecidas durante lactancia pero no especialmente cuando el niño mama (Kent).

Por secreción de sangre en períodos intermenstruales comparar con amb. gris., bovista, calc. carb., hamam., phosph., sabina, etc.

Muy útil en cura de ciertos casos de hidrosalpinx, piosalpinx.

Ciertas mujeres tienen en región ovárica, de un lado o del otro del útero, un pequeño tumor que crece hasta que súbitamente tienen por útero y vulva abundante secreción de líquido acuoso, sanguinolento, purulento y el pequeño tumor desaparece, para llenarse de nuevo al cabo de cierto tiempo y volverá a desaparecer de la misma manera (Kent).

Leucorrea abundante, acre, ardiente, lechosa (calc. carb., sepia, puls.) precedida por dolores cortantes alrededor de ombligo, sobre todo abundante durante micción o después de comida agria; puede coexistir con cáncer de útero (Kent).

Pezones muy sensibles, fácilmente ulcerados, hundidos.

Masas duras en senos (conium).

Amenaza de absceso de seno; si es dado a tiempo, hará abortar el absceso; si la supuración es inevitable; es útil; puede haber dolor, sensación de pesadez y latidos en seno enfermo; silic. los calmará, apresurará la abertura del absceso y traerá cicatrización rápida (Kent).

Ulceraciones fistulosas de senos.

Útil en casos de esterilidad en mujeres que tienen tendencia a abortar cuyos órganos son muy débiles para cumplir sus funciones normales (Kent).

Aparato respiratorio

NARIZ :

Catarro nasal, con, en mucosas, ulceraciones que segregan líquido fluente, excoriente : o catarro seco, con sequedad molesta de nariz.

Proceso catarral que se extiende hacia abajo, a rino farinx e invade trompa de Eustaquio donde produce cosquilleo, comezón intolerable.

Ozena con secreción fétida, ofensiva, cuando la afección tiene origen en tejido conjuntivo submucoso o periosteal.

Carie de huesos de nariz.

Costras secas en nariz con hemorragia nasal cuando las quita.

Epistaxis abundantes.

Coriza alternativamente fluente, seco, muy tenaz; estornudos a la mañana.

Secreción nasal sanguinolenta, en niños (calc. sulph.) (Kent).

Comezón y enrojecimiento de punta de nariz.

LARINGE :

Ronquera, crudeza, sequedad de laringe, tos con cosquilleo que parece venir de fosa supraesternal; sensación como si tuviera un cabello en garganta, laringe o tráquea; la tos es excitada por bebidas frías (rhus tox.), por la menor palabra (phosph., rumex, amb. gris.), peor de noche acostado (rumex, phosph., lycop.); a veces termina en vómito de mucus.

Tos seca, agotadora, con ronquera, con amenaza de tuberculosis laringea; voz quebrada, de timbre especial característico, consecuencia de espesamiento de mucosa laringea.

BRONQUIOS Y PULMONES :

Tendencia crónica a resfriós localizados en pecho donde provocan síntomas asmáticos.

Conviene a primer grado de tisis, cuando el pulmón no está afectado y los signos premonitorios se manifiestan en individuos de constitución característica.

Útil afecciones pulmonares en talladores de piedras en cuyas vías respiratorias partículas de piedra provocan irritación crónica; provoca supuración alrededor de estos pedacitos de piedra y son expulsados con la expectoración (Kent).

Disnea con imposibilidad para hacer inspiraciones profundas.

Útil en casos de antiguos catarros de vías respiratorias inferiores, cuando la respiración se hace asmática, sofocante al menor esfuerzo; esto pasa porque estando acalorado se expone a corriente de aire o toma frío después del baño; asma con grandes rales húmedos, el pecho parece lleno de mucosidades, parece no poder respirar; muy útil en casos de asma en antiguos "sicóticos" o en niños de padres "sicóticos", en estos casos, comparar con nat. sulph.; tales sujetos son débiles postrados, de tez pálida cerosa y muy sedientos (Kent).

Útil en asma nerviosa esencial; con tos seca y espasmódica; opresión que impide estar acostado y agacharse; constricción de garganta y latidos bajo el esternón: accesos a toda hora pero sobre todo después de acostarse; respiración a veces corta y sibilante de noche, aunque no haya accesos de asma.

Útil cuando tal afección, después de duración más o menos larga, ha modificado la mucosa brónquica; el asma se hace húmeda y toma forma de catarro sofocante; provoca vómitos y expectoración abundante y a menudo purulenta (Espanet).

Útil EN ABSCESOS DE PULMÓN, NEUMONÍA TUBERCULOSIS QUE HAN LLEGADO A ESTADOS DE SUPURACIÓN, (phell. aquat.); COPIOSA EXPECTORACIÓN DE ESPUTOS PURULENTOS, ESPESOS, VERDE AMARILLO, CON FIEBRE HÉTICA, TRANSPIRACIÓN NOCTURNA ABUNDANTE y gran debilidad.

Tos con expectoración abundante, vómitos viscosos a la mañana, en medio del acceso de tox, disnea, esputos de sangre y sudores nocturnos la indican en tisis (Espanet).

Expectoración abundante, purulenta, FÉTIDA, a menudo sólo de día; viscosa, lechosa; a veces mezclada con un poco de sangre.

Bronquitis crónica; inflamación de pulmones con supuración.

Conviene a casos avanzados de neumonía o en complicaciones crónicas después de neumonía; neumonía de convalecencia lenta, prolongada (lycop., sulph., phosph., calc. ost.).

Tufaradas de calor en cara de día como sulph., sepia, lach., lycop., y rales en pecho como ant. tart. (Kent).

Broncorrea en viejos con expectoración fétida (bals. peru.).

Hemoptisis de sangre granate.

Pleurodinia con dolores lancinantes, agudos en costados del pecho; imposibilidad de acostarse del lado doloroso (kali carb., etc.).

Espalda y extremidades

Actúa sobre la médula, causando debilidad general de todo lo que depende de este centro nervioso.

IRRITABILIDAD DE MEDULA y sensibilidad de columna vertebral con numerosos dolores reflejos; TEMBLOR DE MIEMBROS CON SÍNTOMAS PARETICOS.

IRRITACIÓN ESPINAL DESPUÉS DE TRAUMATISMO DE COLUMNA VERTEBRAL.

Rigidez de cuello por irritación espinal; rigidez extendida a músculos de canales vertebrales.

Región lumbar dolorosa como si hubiera sido golpeada.

Dolor hacia el coxis con calambres como cuando ha estado mucho tiempo sentado.

Tabes (alumina, ruta).

Debilidad de espina dorsal; muy sensible a corriente de aire en la espalda.

CARIE DE VÉRTEBRAS; MAL DE POTT.

Debilidad paralítica de miembros superiores.

Debilidad paralítica de antebrazo.

TEMBLOR DE MANOS AL USARLAS.

Entumecimiento de manos, de noche.

Calambres en las manos al escribir. (magn. ph., gels., sulph. ac., arg. met., caust., etc.).

Dedos como entumecidos, con pérdida de fuerza.

Dolores picantes, tirones en punta de dedos, con pérdida de fuerza o entumecimiento.

Extremidad de dedos fisurada, agrietada.

Uñas rugosas, grises, sucias, quebradizas, deformadas, CON MANCHAS BLANCAS.

Panadizos.

MANOS HÚMEDAS SIEMPRE Y A VECES TRANSPIRAN ABUNDANTEMENTE.

Dolores tironeantes en caderas y muslos.

Dolor de rodillas como si estuvieran fuertemente apretadas por un lazo.

Calambres en pantorrillas; tensión y contracción de pantorrillas.

Debilidad parálitica de piernas.

Osteítis de tibia.

PIES FRÍOS COMO HIELO Y SIN EMBARGO CUBIERTOS DE SUDOR; SUDOR DE PIES

OFENSIVO (baryta, graph., lycop., nit. ac., psorin., sanic., sepia), FÁCILMENTE SUPRIMIDO SI TIENE FRÍO EN ESTA REGIÓN; TRANSPIRACIÓN HABITUAL DE PIES Y CUYA SUPRESIÓN TRAE TRASTORNOS DE SALUD; hay que remediar esta supresión y restaurar esos sudores con medicación apropiada, so no sobrevendrán accidentes más o menos serios : silic. es buen remedio para conseguirlo cuando las características generales lo indican y hace desaparecer esta tendencia molesta (Nash), a menudo este sudor va acompañado de excoiación entre dedos grandes.

Dolores agudos que atraviesan los pies.

Sensibilidad dolorosa de planta de pies (ant. crud., ruta, etc.).

UÑAS ENCARNADAS; cuando silic. es insuficiente graph. le sigue bien.

Callos en pies (ant. crud., graph., etc.) (Kent).

Cuando se duerme sobre cualquier parte del cuerpo, ésta se entumece.

Epilepsia en ataques particularmente nocturnos que parte del plexosolar para subir a estómago y pecho.

Cura ciertas afecciones histéricas epileptoides y paráliticas relacionadas, con excesos eróticos, trabajos forzados de gabinete, neuralgias obstinadas, jaquecas.

Las convulsiones son calambroides y afectan músculos de relación; la parálisis incompleta y recae más sobre sensibilidad; va acompañada de atrofia (Espanet).

Piel

Sensibilidad dolorosa de piel, que es fina, malsana con TENDENCIA A SUPURACIÓN; la menor herida tiende a supurar (hep., sulph. calc., borax, graph., merc., etc.).

Las afecciones cutáneas mejor curadas o ventajosamente modificadas por silic.

son : erupciones papiliformes, psoriformes, impetiginosas y pitiriásicas; piel seca, lisa, pero con placas de pitiriásis que sirven a menudo de afección más avanzada.

Los jugos nutritivos faltan, diríamos, en la piel para reparar, mantener su tejido y la plasticidad disminuye al punto que los cabellos caen y el cuero cabelludo se cubre de capa de películas furfuráceas.

Este es uno de los caracteres de silic., lo mismo que ciertos enrojecimientos en piel de nariz y algunas articulaciones.

Estos intertrigos, enrojecimientos, esta alopecia, películas furfuráceas, son frecuentemente síntoma de astenia en convalecientes con otros síntomas característicos (Espanet).

ABSCESOS QUE SE VACÍAN MAL Y TIENE TENDENCIA A FISTULIZACIÓN; panadizos, forúnculos, viejas heridas fistulosas.

De todos los remedios de la MATERIA MEDICA, ninguna es más apta que silic.

para corregir la disposición viciosa de las úlceras más malignas, para cambiar una supuración fétida en pus de buena naturaleza, prevenir caries subyacentes : úlceras escrofulosas, saniosas, abscesos en madriguera con comunicaciones fistulosas y pus de mala índole, úlceras fungosas y rebeldes, úlceras callosas, herpéticas, varicosas, corrosivas y sobre todo sicóticas, que suceden a excrecencia varicosa de fondo grisáceo y bordes duros.

Como calc. ost., y los medicamentos que actúan sobre nutrición y jugos nutritivos que corresponden a erosiones de tejidos y exuberancias vegetativas, silic. tiene acción favorable en tales úlceras en grietas y ulceraciones largas y profundas, estrechas, como ciertas rasgaduras de pezón y otras partes de piel fina alterada por afección herpética y contra producciones verrugosas o sicóticas; en tales casos, difiere de thuya, lycop., y nit. ac. en que concierne a granos sicóticos, tensos, lustrosos, lancinantes, duros, dispuestos a degenerar o que comienzan a hacerlo.

Uno de los caracteres ordinarios de esas ulceraciones, de esos orificios fistulosos, es tener bordes callosos, indurados o reposar en base indurada (Espanet).

Hipertrofia ganglionar con tendencia a supuración.

Muchas enfermedades de silic. están asociadas a ganglios indurados pero sobre todo en cuello, ganglios cervicales, glándulas salivares y sobre todo parótidas; a cada resfrío las parótidas se hipertrofian e induran. (calc. carb., barb. carb., sulph.) (Kent).

SUDOR OFENSIVO EN PIES, AXILAS, MANOS, COMIENZA A TRANSPIRAR EN CUANTO SE DUERME (puls., conium) (Kent).

Fiebre

Constantes escalofríos, aún haciendo ejercicio o en habitación caliente, escalofríos en todo el cuerpo.

Violento calor general con sed intensa a la tarde, y noche.

Sudores abundantes de noche, sobre todo hacia la mañana, con olor irritante.

Pulso pequeño, rápido, frecuentemente irregular.

En fiebres hécticas se parece mucho a phosph.

Enfermo friolento; con frecuentes ataques de calor que duran poco; fiebre caliente sin escalofrío de día y sudores nocturnos.

En general, la menor caminata lo hace transpirar y a la mañana se declara transpiración que debilita mucho.

Hay abscesos, focos de supuración, obstrucciones, flujos mucosos que agotan y mantienen la fiebre a menudo con reabsorción purulenta.

Enrojecimiento de mejillas, como manchas, con calor ardiente, sensación ardiente en punta de dedos y al atardecer gran ardor de pies; pero habitualmente tiene frío en las extremidades.

Edemas de pies frecuentes, como las palpitaciones, opresión, palidez, adelgazamiento y debilidad general, excepto en paroxismos de fiebre, en que goza de cierta energía física y moral (Espanet).

Indicaciones muy marcadas en niños y jóvenes en estado de crecimiento enfermizo, con fiebre, dolores violentos en articulaciones, entumecimiento de miembros, borboteo de sangre o latidos arteriales.

Útil en fiebre de dentición prolongada en niños que enflaquecen mucho (Espanet).

Relaciones

Antídotos

Camph.; merc. que no le sigue bien; fluor. ac.; antidota el abuso de silic. en afecciones óseas. hep. sulph. calc.

Complementarios

Thuya; afecciones nerviosas y malos efectos de vacuna; sanic.; puls. : es el crónico de este último; corresponde a formas crónicas que el primero cura en estado agudo; puls. influye en terrenos que contienen silic. en sus partes constituyentes.

Las aguas de Barèges, en los Pirineos, contienen gran cantidad de silic.

y son elegidas empíricamente como muy útiles en muchos casos en que silic. está homeopáticamente indicada.

Moleschott escribe en "Kristanf des leches" que las cenizas de equisetum contienen mucha silic., la cura de ciertos trastornos de vejiga, atribuidas a este remedio, se explican probablemente por el hecho de que contiene mucha silic.

Silic. sigue muy bien a bell., puls., rhus tox., merc., en afecciones de esferasanguínea; a spig., puls., merc., phosph., en afecciones de estera nutritiva y plástica.

Ars. alb., carb. veg., sulph., sepia, calc. ost., lycop. completan o continúan la buena acción de silic. (Espanet).

SPIGELIA ANTHELMIA

O spigelia anthelmintica, planta herbácea anual; de la familia de las Logoniáceas, crece en América del Norte, especialmente en Carolina del Norte.

El primero en estudiarla fue un botánico belga, Adrián von der Spiegel (latinizado en Spigelius) de donde deriva su nombre.

Fresca, tiene olor fétido que, en ambiente cerrado puede causar una especie de narcotismo; y por estas cualidades y sus propiedades tóxicas se le ha dado el nombre de Brinvillier, por la marquesa de Brinvillier, célebre envenenadora de la época de Luis XIV.

Las dinamizaciones homeopáticas se preparan partiendo de una tintura madre obtenida de la planta fresca o de una trituración hecha con toda la planta seca y pulverizada.; en este caso, las tres primeras dinamizaciones se hacen por trituración hahnemanniana y después por diluciones sucesivas habituales.

Acción general del medicamento

Actúa principalmente sobre SISTEMA NERVIOSO que, bajo su influencia, tiende a astenia alojada de la vez sobre sistema cerebro-espinal y simpático.

Interesa más particularmente NERVIOS SENSITIVOS, entre ellos, regiones cervicales y torácicas, que presentan DOLORES AGUDOS, LANCINANTES, intolerables, que constituyen sus principales características.

Bajo su influencia, las SECRECIONES INTESTINALES sufren modificaciones que las hacen aptas para mantener vermes intestinales, lombrices particularmente, e impropias para la buena elaboración del bolo alimenticio.

Características

1) CONSTITUCIÓN Y TEMPERAMENTO : Especialmente indicado en anémicos de larga data, o deprimidos por mal estado de salud, cuyos trastornos parecen localizados en los nervios donde desarrollan estados neurálgicos muy dolorosos, tiene en general, pelo rubio, son pálidos y delgados, agitados, inquietos, no pueden dominarse, tiene palpitaciones, pulso irregular; al levantarse vértigos, aturdimiento y sus dolores se manifiestan principalmente en ese momento.

2) DOLORES NEURÁLGICOS LANCINANTES, ARDIENTES, DESGARRANTES, en cualquier nervio del cuerpo, pero más marcados en CARA, CUELLO, HOMBRO, a veces con sensación como si la región atacada fuera pinchada con agujas al rojo; se agravan por movimiento, hasta el simple movimiento de ojos o inspiración (bryon.,

kalmia, nat. mur., act. rac.) por ruido (bell.), por el menor contacto (china), por frío, humedad, lluvia; cuando se localizan en el ojo, mejoran por frío y por en cuello u hombro.

Dolores lancinantes, desgarrantes en extremidades, como si allituviera un alambre al rojo, a veces se agravan al acostarse, pero generalmente mejoran estando tranquilo; se agravan por luz, comiendo, moviéndose, por sacudidas; subir o descender escaleras, pasear en coche que sacude al enfermo lo hace insoportable.

3) CONTRACCIONES CARDIACAS TAN VIOLENTAS QUE SE PUEDEN VER LOS LATIDOS DEL CORAZÓN A TRAVÉS DE LA ROPA; SACUDEN SU CUERPO Y EL RUIDO DE SU RITMO SE OYE A DISTANCIA.

Modalidades

Agravación

a) A LA MAÑANA : muchos de sus síntomas se manifiestan a la mañana; a la mañana fatigado y lleno de dolores desgarrantes.

b) POR CALOR : LOS DOLORES DE CABEZA SE AGRAVAN por calor; el frío los mejora; cuando se localizan en otra región, el calor mejora los dolores.

Los síntomas de cabeza y estómago de phosph. mejoran por frío.

En ars. alb. los síntomas de cabeza mejoran lavándola con agua fría, pero el enfermo es sensible al frío y quiere calor para apaciguar sus otros síntomas.

c) CON LA SALIDA DEL SOL Y MEJORA A MEDIDA QUE DECRECE (nat. mur., tabac., nat. carb., sang., glonoin., kal.).

d) POR TIEMPO FRÍO, HÚMEDO, LLUVIOSOS sobre todo.

e) Por movimiento.

f) Por ruido, a un contacto ligero.

Mejoría

a) Permaneciendo tranquilo.

b) Por calor (dolores del cuerpo).

c) Por frío (dolores de cabeza).

d) Acostándose con la cabeza levantada o sobre la derecha.

Debe ser más experimentado pues sus síntomas mentales no son bien conocidos.

Estado de temor, angustia, ansiedad, como la mayoría de individuos en estado de neuralgia casi constante, cuyo sistema nervioso está muy debilitado.

Fácilmente irritable, memoria débil, aversión por trabajo; inquieto, agitado, movedizo, preocupado por el porvenir, sombrío.

A veces aparece el síntoma siguiente ; temor por objetos que pinchan, por ej., alfileres.

Cabeza

DOLORES DE CABEZA GENERALMENTE DE UN SOLO LADO; a menudo COMIENZAN EN OCCIPUCIO y se extienden hacia adelante por la coronilla, SE FIJAN ARRIBA DEL OJO IZQUIERDO (ojo derecho : sang. y silic.); SE AGRAVAN POR EL MENOR RUIDO Y MAS LIGERO MOVIMIENTO, LA MENOR SACUDIDA; AUMENTAN O COMIENZAN A LA SALIDA DEL SOL PARA DISMINUIR O DESAPARECER CUANDO SE PONE; EL OJO DEL LADO AFECTADO DEJA CORRER LAGRIMAS LÍMPIDAS (chel. maj.) : lado derecho con lágrimas.

DOLOR COMO SI TUVIERA UNA VENDA FUERTEMENTE APRETADA ALREDEDOR DE LA CABEZA (cactus, gels., carbol. ac.).

Pulsaciones y puntadas en cabeza, a veces mejoradas acostándose con la cabeza levantada y agravadas al agacharse, moverse, por ruido.

A veces los dolores mejoran lavándose con agua fría, particularmente si se localizan en el ojo, pero en seguida empeoran.

Con estos dolores de cabeza neurálgicos, cuello y hombros rígidos por que no puede moverlos por el dolor; permanece sentado, inmóvil, como anquilosado, el ruido, la luz, agravan; hasta la vista de personas que se mueven a su alrededor y a las que quiere seguir con los ojos agrava.

Dolores picantes, ardientes, desgarrantes, en el cerebro, o que siente en el cerebro, pero localizados probablemente en nervios de cuero cabelludo.

Dolor violento en región de parietal izquierdo, agravado por moverse, caminar, dar un paso en falso; al atardecer sensación de presión violenta de adentro a afuera de la frente, agravada al agacharse, al apretar con la mano; dolor de tensión, desgarrante, en frente, particularmente protuberancia frontal que se extiende a región supraorbitaria.

Dolor de gran intensidad, taladrante, desgarrante, en occipucio, en lado izquierdo de cabeza y frente, agravado por movimiento, ruido, hablar o hasta por sólo abrir la boca; mejora acostado.

Dolor presivo en lado derecho de la frente, sobre el ojo derecho, a la mañana cuando despierta, pero peor después de levantarse; el dolor se siente profundamente, o influenciado por la presión, muy agudo cuando mueve la cabeza, o la vuelve repentinamente, con sensación como si el cerebro se despegara; agravado a cada sacudida, a cada paso, por el esfuerzo al evacuar.

Al mover los músculos de la cara sensación como si la cabeza fuera a estallar.

Dolor neurálgico alrededor y en el ojo izquierdo en tiempo frío, húmedo, lluvioso..

Hiperestesia de ramales del quinto par.

Menos hiperestesia al principio del dolor, pero aumenta a medida que el ojo se congestiona.

Dolor a veces tan violento que provoca postración completa con sudor frío y vómitos.

Hep. sulf. es tan sensible al dolor que se siente mal, se desvanece.

Chamom. : siente el dolor con tal intensidad que cede a ataques de cólera, frenesí violento, extrema irritabilidad.

Spig. : sufre tan intensamente los dolores que le provocan hinchazón, enrojecimiento e hiperestesia en la región (Kent).

Ojos

Neuralgia ciliar cuyos dolores tienen las mismas características que los dolores de cabeza; son como puñaladas y se extienden a occipucio, o como en act. rac. : presivos de adentro a afuera, como si los ojos fueran demasiado grandes para las órbitas (comocladia) (Nash).

Neuralgia ciliar con dolores que irradian alrededor del ojo y sensación de frío en el ojo (thuya).

Agravación cuando piensa en ellos.

Agravación presionando sobre el ojo fuertemente; a veces una presión suave y prolongada alivia, pero el menor movimiento de la mano que presiona agrava; REGIÓN ABOTAGADA E INFLAMADA, OJOS ROJOS Y CONGESTIONADOS (Kent).

No puede mirar derecho hacia adelante, pues tiene vértigos aunque no sufra al mirar de arriba a abajo.

Trastornos de acomodación; es difícil encontrar cristales que corrijan su vista de manera constante (Kent).

Afecta particularmente la ESCLERÓTICA y si la esclerótica es atacada por oftalmía reumática spig. cura de la manera más satisfactoria (Hughes).

Cara

NEURALGIA FACIAL CON DOLORS VIOLENTOS PICANTES Y ARDIENTES; PIEL ABOTAGADA Y DOLORIDA EN LA REGIÓN DOLOROSA; LOCALIZADA PARTICULARMENTE A LA IZQUIERDA. GRAN ESTADO DE ERETISMO NERVIOSO, EXCITACIÓN E INTOLERANCIA A DOLOR.

Se puede comparar con : acon., ars. alb., coloc., colch., china, chamom., platina, puls., phosph., mezer., verbascum, thuya, etc.

Las principales indicaciones de los grandes remedios de la neuralgia facial son : Acon : Neuralgia facial

PARTICULARMENTE IZQUIERDA, dolores agudos, desgarrantes, intolerables.

CON HORMIGUEO; neuralgia a frigore, por exposición a viento frío y seco, congestiva, con dolores intolerables, cortantes, violentos, ardientes que llevan A LA DESESPERACIÓN, con SENSACIÓN DE HORMIGUEO, peor de noche, HACIA MEDIANOCHE; cara roja, hinchada, congestionada, AGITACIÓN característica.

Bell : Neuralgia con violentos DOLORS LATENTES, desgarrantes, más marcados a la derecha, agravados o despertados por el menor contacto, la menor sacudida, el menor movimiento; con mucho CALOR Y ENROJECIMIENTO DE CARA, latido de carótidas; después de EXPOSICIÓN A FRÍO; rigidez de nuca y estremecimientos convulsivos de cara.

China : Neuralgia facial con violentos dolores lancinantes en mejillas, mandíbula inferior, región supraorbitaria; EL AIRE FRÍO o UN SIMPLE ROCE SUPERFICIAL agravan en extremo; dolores típicos por su reaparición periódica y es muy indicado si hay antecedentes maláricos.

Comparar con cedron : neuralgia supraorbitaria con ataques con regularidad de reloj; casi siempre hay antecedentes maláricos.

Caust. : Neuralgia con dolores tensivos, pulsátiles, en huesos de cara y sobre todo pómulos, CON UNA ESPECIE DE PARÁLISIS DE MÚSCULOS FACIALES, o dolores tractivos de mandíbulas que impiden abrir la boca.

Sigue bien a acon.

Colocynt. : Neuralgia con dolores desgarrantes, lancinantes, especialmente a la izquierda de la cara, que se propagan hasta sien, cabeza, nariz, oreja, dientes, con HINCHAZÓN DE CARA DEL LADO DOLOROSO, aliviados al principio por presión; AGRAVACIÓN AL MENOR CONTACTO, etc.

Colch. : Neuralgia principalmente IZQUIERDA de cara, hasta el oído con HORMIGUEO de piel como si allí estuviera helada; mejilla del lado enfermo roja, hinchada, transpira; MUCHO ERETISMO NERVIOSO con los dolores que parecen insoportables, pero sin la AGITACIÓN TAN PARTICULAR DE acon.

Cham. : Neuralgia facial INTOLERABLE con dolores insoportables, desgarrantes, lancinantes, tractivos, pulsátiles, agravados por calor, CON ESTADO NERVIOSO CARACTERÍSTICO.

Phosph. : Violenta neuralgia de cara en mandíbulas y sienes, con sensación de calor, congestión de mejilla que está hinchada; AGRAVADO CUANDO HABLA, COME, POR TODO MOVIMIENTO DE MÚSCULOS DE CARA.

Platina : Neuralgia facial con dolores formicantes y SENSACIÓN DE FRÍO, ENTORPECIMIENTO, del lado afectado, o dolores calambroides y presión tensiva en pómulo; agravación o renovación de dolores al atardecer y durante el descanso; DOLORS QUE APARECEN GRADUALMENTE.

Puls. : Neuralgia de trigémino, comienza en región temporal derecha, con LAGRIMEO ABUNDANTE DEL MISMO LADO; con escalofríos; más marcada o comienza en medio de la noche.

Mezer. :Neuralgia facial con sensación de presión calambroide y aturdidora en huesos de cara, a veces de un solo lado y que se extiende a ojo, temporal, oído, dientes, cuello, hombro; a menudo ligada a supresión desafortunada de erupción o mercurialización profunda.

Nux vom. :Neuralgia facial con dolores desgarrantes que se extienden a interior de oído, con ENROJECIMIENTO Y A VECES HINCHAZÓN DE MEJILLA Y ESPASMOS MUSCULARES; AGRAVACIÓN POR TRABAJO INTELECTUAL, USO DE CAFÉ O VINO.

Merc. :Neuralgia con dolores desgarrantes o lancinantes, que afecta todo un lado de cabeza, desde temporales a dientes.

AGRAVADOS SOBRE TODO DE NOCHE AL CALOR DE LA CAMA, con SALIVACIÓN, LAGRIMEO, SUDOR en cara o cabeza, insomnio.

Lycop. :Dolores neurálgicos en la cara, EMPIEZAN POR SENSACIÓN DE FRÍO, principalmente a la derecha, con AGRAVACIÓN AL ATARDECER O LA NOCHE.

Lach. :Neuralgia facial principalmente izquierda con dolores profundos en huesos y SENSIBILIDAD EXQUISITA DE PIEL al tacto; AFLUJOS DE CALOR EN MEJILLA dolorosa.

Verbasc. :Neuralgia facial principalmente izquierda, con lagrimeo, coriza y SENSACIÓN COMO SI LAS PARTES DOLOROSAS FUERAN APLASTADAS, ROÍDAS, POR PINZAS.

Thuya :Neuralgia con dolores calambroides, lancinantes, de gran intensidad en pómulo, maxilar superior y dientes, a lo largo de ramales supraorbitarios; SENSACIÓN DE FRÍO INTERIOR; A CADA EXASPERACIÓN DEL DOLOR, CARA SÚBITAMENTE PÚRPURA; movimientos convulsivos de labio superior (TIC DOLOROSO).

Agaric. :Neuralgia facial con DOLORS PARECIDOS A PINCHAZOS CON AGUJAS DE HIELO EN MEJILLAS E IRRITANDO EL NERVIÓ : dolores lancinantes, agudos, como provocados por astilla de madera.

Ars. alb. :Neuralgia con dolores extremadamente ardientes, aliviados por calor.

Staphis. :Neuralgia con dolores presivos pusátiles, desde dientes hasta ojos; o dolores lancinantes, ardientes, tractivos, incisivos o desgarrantes, con SENSACIÓN DE HINCHAZÓN DEL LADO AFECTADO, LLANTO ESPASMÓDICO, MANOS FRÍAS Y SUDOR FRÍO EN CARA.

APARATO DIGESTIVO

BOCA :

Dolor de muelas desgarrante, peor por frío y después de comer.

Mal olor en la boca.

INTESTINOS :

Helmintiasis con estrabismo, movimientos sacudidos en ciertos músculos de cara, gran palidez de cara y ojeras azuladas; debilidad, abatimiento, náuseas y cólicos alrededor de ombligo (Dewey).

Aparato circulatorio

GRAN VIOLENCIA DE LATIDOS DE CORAZÓN que se pueden oír y ver a distancia y a veces sacuden el cuerpo.

DOLORS AGUDOS, PICANTES, PUNZANTES, en región precordial, que IRRADIAN ABRAZO Y CUELLO, AUMENTADOS POR MOVIMIENTO.

Sensación como si el corazón estuviera comprimido por una mano.

Sensación de palpitaciones por oleadas NO SINCRÓNICAS CON PULSO en región cardíaca.

Al poner la mano sobre la región del corazón se siente como un ronroneo comocuando se acaricia un gato.

ANGINA DE PECHO : dolor repentino en lado izquierdo de pecho que irradia a uno o ambos brazos y tan violento que puede hacer desfallecer.

Comparar con acon. : sensación de constricción de pecho con sofocación, cardialgia que irradia a brazo izquierdo, angustia y gran miedo a la muerte; amyl. nitr. : de acción clásica.

Arnica : dolor particularmente severo de hombro y brazo izquierdos.

Ars. alb. : de acción tan marcada sobre el corazón.

Cactus : sensación como de corazón apretado por mano de hierro, que impide todo movimiento, sofocación, sudor frío.

Cimicif. : sensación como de corazón doloroso, aumentado de volumen.

Cuprum. : cardialgia con sensación de apretón espasmódico, de violenta presión, seguida de vómitos.

Naja : dolor picante en región del corazón, sensación de ahogo imposibilidad de hablar y pulso irregular.

Nat. iod.; spong.; tabac. : síntomas de ardor con dolor marcado en región precordial.

AFECCIONES VALVULARES crónicas con ruidos de soplo que estalla y ataques violentos de palpitaciones; sólo puede acostarse sobre la derecha (phosph., nat. mur.) y con cabeza alta; el menor movimiento agrava (naja).

Complicaciones cardíacas del reumatismo; en estos casos, rara vez está indicados pig. en "flemáticos" que sienten poco intensamente (Kent).

Espalda y extremidades

Dolores neurálgicos en músculos de pecho.

Muchos dolores de spig. en el pecho, se atribuyen al corazón; pero tiene verdaderas neuralgias intercostales; dolores lancinantes en hombro y cuello, particularmente marcados a la izquierda y a lo largo del brazo; dolores volantes aquí y allá (Kent).

Relaciones

Antídotos

Puls.

PYROGENIUM BORR;Error! Marcador no definido.

O pyrogen o pyrexin, es un nosode introducido en la Materia Médica por los ingleses a fin del siglo pasado : el Dr. John Drysdale fue el primero, en 1880, en aconsejar su empleo como medicamento, en una publicación imposible de encontrar hoy : "ON pyrexin OR pyrogen AS A THERAPEUTIC AGENT", (edit.

por Baillere, Tyndale and Cox).

Se extrae de carne de buey flaca, que se trata de la siguiente manera :según procedimiento del Dr. Díaz de Cruz, se toma un recipiente que contenga 500 gr. de agua y 200 gr. de carne de buey desprovista de grasa y cortada en trocitos.

Se expone al aire seco durante una veintena de días y se obtiene un líquido rojizo, espeso, consistencia de jarabe y fétido.

Se filtra y se evapora a baño María hasta desecarlo.

Se deja macerar en alcohol durante dos horas el residuo seco que formará una masa compacta oscura.

Se deja secar; se mezcla con 30 gr. de agua destilada y se filtra, después de horas.

El líquido claro y ambarino que se obtiene es extracto acuoso de pyrogenium.

Se agrega un volumen doble de glicerina y con esta preparación que se puede considerar tintura madre, se preparan según métodos hahnemannianos las diferentes dinamizaciones : 3ø, 6ø, 12ø, 30ø, etc.

Características

Sus principales características son : 1) ESTADO SEPTICEMICO GRAVE CON GRAN AGITACIÓN : Se mueve sin cesar, desea continuamente cambiar de lugar porque la parte del cuerpo sobre la que se apoya le da casi enseguida sensación dolorosa de magulladura (arnica, bapt.).

En enfermos de pyrog. se nota estado complejo que responde a lacuádruple influencia de arnica, eupat., ars. alb., y rhus tox. : SENSACIÓN DE DOLORIMIENTO, MAGULLADURA, QUE HACE QUE LA CAMA PAREZCA DURA, de arnica : SENSACIÓN DE ROTURA, DE FATIGA DOLOROSA DE HUESOS, de eupat.; ANSIEDAD, ANGUSTIA AGITADA, de ars.; AGITACIÓN QUE DA ILUSIÓN DE ALIVIO, de rhus tox.

2) Es frecuente ver indicación de pyrog. en un síntoma desconocido para todos los otros remedios : DESACUERDO ENTRE TEMPERATURA Y FRECUENCIA DE PULSO : temperatura muy elevada, que pasa de 39 39ø5 a 40ø, con pulso relativamente lento; o temperatura relativamente moderada : 38ø5, y pulso frecuente y rápido, a 150 o 160 pulsaciones por minuto.

3) EXTREMA FETIDEZ DE TODAS LAS SECRECIONES :Diarrea, vómitos, sudor, reglas, etc., que es otro punto de contacto ars. alb.

4) ESFERA DE ACCIÓN :La esfera de acción de los remedios comprende todos los casos en que están presentes sus características, cualquiera sea el nombre de la enfermedad.

Pero, está permitido al terapeuta dirigir su atención a cuatro grupos clínicos en la que se encuentra, con mayor frecuencia, su sintomatología : a) ESTADOS SÉPTICOS, cuando hay indicaciones características para otro remedio, o cuando el elegido homeopáticamente no revela reacción orgánica, esfera de acción de todos los nosodes.

b) SEPTICEMIAS AGUDAS :Fiebre tifoidea, neumonía, influenza, difteria, fiebre escarlatina, disentería, cólera, intoxicaciones por ptomaínas, etc., estando presentes los síntomas característicos.

c) INFECCIONES LOCALES GRAVES por traumatismo que tienden a ganar todo el organismo : fiebre puerperal; metritis infecciosa, mastoiditis; apendicitis aguda; pinchazos anatómicos, etc.

d) ESTADOS INFLAMATORIOS DE ORIGEN SÉPTICO QUE TIENDEN A SUPURACIÓN.

Este grupo comprende casos que presentan historia de supuración o infección local con cura aparente, seguida tardíamente por trastornos de infección general graves, sin la menor provocación aparente.

Y los casos en que se constata, desde el principio, cuando la enfermedad aún no se ha desarrollado totalmente sino tiende a localización supurativa indeterminada.

En este caso actúa comp preventivo, impidiendo la evolución hacia un estado más serio.

5) La única MODALIDAD saliente es :MEJORÍA PASAJERA POR MOVIMIENTO, como rhus tox.

Síntomas mentales

Aquí se ven las dominantes de ars. : angustia, agitación, multitud de ideas atropelladas en su mente, lo atormentan. Locuaz, agitado, delirante.

"LOCUACIDAD; piensa y habla más rápido que habitualmente, sobre todo durante fiebre.

Irritable.

Delirio y confusión mental con respecto a su cuerpo y miembros (bapt.).

Sensación como si cubriera toda la cama.
 Sabe que su cabeza está sobre la almohada, pero no sabe dónde está el resto de su cuerpo.
 Acostada de lado, cree ser cierta persona y al darse vuelta del otro, creeser otra.
 Sensación como si tuviera multitud de brazos y piernas.
 Sus síntomas se parecen mucho a bapt., pero si la temperatura sube mucho bapt.
 no será tan eficaz como pyrog. (Kent).
 Cabeza y cara
 Dolores latentes en cabeza.
 Dolor de cabeza estallante, con agitación.
 Congestión violenta de cabeza con DOLORES PRESIVOS y pulsaciones, aumentada por presión.
 Transpiración abundante de cabeza.
 Dolores en occipucio al toser; a la mañana al despertar.
 Globos oculares dolorosos al tacto, al volverlos hacia arriba o afuera. (Kent).
 Sangría de nariz de origen séptico.
 Mejillas calientes y ardientes.
 Cara cubierta de sudor frío.
 Latidos como de abanico de alas de nariz, como lycop.
 Aparato digestivo
 BOCA :
 ALIENTO EXTREMADAMENTE FÉTIDO.
 Boca seca; mal gusto.
 Dientes cubiertos de fuliginosidades.
 Lengua fofa, extendida, ROJO VIVO, como BARNIZADA, seca, a veces como resquebrajada.
 Habla difícilmente (cros., ter.).
 ESTOMAGO :
 NAUSEAS persistentes y VÓMITOS.
 Vomita el agua en cuanto se le calienta en el estómago. (phosph.).
 VÓMITOS EXTREMADAMENTE FÉTIDOS.
 Vómitos de materias tirando a marrón, hematemesis; vómitos estercorosos.
 ABDOMEN Y DEPOSICIONES :
 Vientre hinchado, sensible, doloroso.
 Retortijones; dolores lancinantes, cólicos.
 Dolores si trata de respirar profundamente.
 Tenesmo intolerable, vesical y rectal.
 Diarrea con DEPOSICIONES OFENSIVAS, marrones o negruzcas, dolorosas, involuntarias; cada vez que expulsa
 un gas, sale un poco de materia líquida.
 Puede haber constipación, con inercia intestinal completa (opium).
 Se ven deposiciones abundantes, marrones, olor de carroña; o constituidas por bolitas secas, marrones.
 Hemorragia intestinal.
 Aparato urinario
 Orina escasa, a veces incontinencia, a menudo albuminosa.
 Tenesmo vesical.
 Aparato circulatorio
 Palpitación, angustia y debilidad precordial, sensación como si el corazón fuera demasiado grande.
 Siente su corazón; oye los latidos; los latidos le resuenan en los oídos.
 Debilidad de corazón.
 DISOCIACIÓN ENTRE FRECUENCIA DE PULSO Y TEMPERATURA : PULSO
 ANORMALMENTE RÁPIDO PARA LA FIEBRE QUE ES MAS BIEN MODERADA, O PULSO MAS BIEN
 MODERADO CON FIEBRE EXTREMA.
 Órganos genitales
 Reglas o más bien perdidas sanguíneas EXTRAORDINARIAMENTE OFENSIVAS, que huelen atrozmente.
 Metrorragia fétida.
 Loquios de olor nauseabundo, generalmente poco abundantes, como detenidos.
 Aparato respiratorio
 Epistaxis.
 Expiración sibilante.
 Respiración rápida; disnea.
 Tos con expectoración espesa, más o menos abundante y pútrida, como la última fase de la tisis.
 Piel y extremidades
 Generalmente seca, fría; en casos graves, lívida o color ceniza.

A veces cubierta de transpiración abundante, de OLOR CADAVERÍCO y que no corresponde a caída de temperatura.

Entumecimiento de manos, brazos, piernas, DOLORIMIENTO DE TRONCO Y MIEMBROS; la cama le parece demasiado dura; mejoría pasajera por movimiento (rhus tox) por lo que quiere cambiar sin cesar de lugar y esta agitación puede aumentar por la angustia mental del remedio (ars. alb.).

Fiebre

Determina y está indicado en fiebres de carácter séptico; caracterizadas por escalofríos que comienzan en espalda, entre hombros, muy marcados y terminan por agitar todo el cuerpo.

La faz de calor sobreviene de repente : piel ardiente y seca y temperatura muy elevada, que puede pasar de 40°.

Sudor frío, viscoso y de OLOR FÉTIDO, le sigue, pero sin que el termómetro baje.

RANUNCULUS BULBOSUS

O Nabo de San Antonio, planta vivaz de la familia de las ranunculáceas, común en prados, campos y pendientes soleadas.

Se obtiene la tintura madre, con la cual se preparan por diluciones sucesivas las diferentes dinamizaciones, haciendo macerar en alcohol a 90°, la planta entera recolectada en verano.

Acción general del medicamento

Actúa principalmente en PIEL Y TEJIDO MUSCULAR.

Aplicado en PIEL, produce eritema violento, con erupción primero vesicular con ardor, escozor y comezón; si los síntomas aumentan por acción de la intensidad del medicamento sin que nada se haga para exasperarla, puede sobrevenir ulceración y hasta gangrena, esta última asociada a fiebre y delirio.

EN MÚSCULOS, provoca y cura algia reumatoidea sobre todo marcada en músculos de tronco, el reumatismo intercostal cede mucho más rápido a este medicamento que a cualquier otro; hay dolor, mucha sensibilidad al tacto, y los músculos tienen sensación de rotura como si hubieran sido triturados.

En SEROSAS, se ven los mismos dolores agudos que en músculos, y pleura y peritoneo parecen ser los que más sufren su influencia.

Algunas MUCOSAS no escapan a su acción irritante.

Características

DOLORES AGUDOS, LANCINANTES, VIVOS, COMO PUÑALADAS, NEURÁLGICOS, MIALGICOS, REUMÁTICOS, EN PAREDES DEL PECHO, POR PAROXISMOS PROVOCADOS O AGRAVADOS POR CAMBIOS ATMOSFÉRICOS.

Modalidades

Agravación

a) POR MOVIMIENTO, INSPIRACIÓN, TACTO.

b) POR CAMBIOS ATMOSFÉRICOS, especialmente TIEMPO TORMENTOSO Y HUMEDAD.

c) AL AIRE LIBRE, POR AIRE FRÍO.

Ojos

Nictalopía; niebla ante los ojos.

Sensación de presión en glóbulos oculares.

Inflamación, lagrimeo y prurito.

Dolores que escuecen en ángulos de ojos.

Pequeñas vesículas de córnea con dolores intensos, fotofobia y lagrimeo; herpes de córnea.

Aparato respiratorio

NARIZ:

HORMIGUEO PENOSO y dolores de nariz.

Nariz roja, hinchada, inflamada, con colores tensivos y costras abundantes en interior.

RESFRÍO DE HENO, con nariz hinchada, especialmente al atardecer, sensación de presión dolorosa en raíz y de comezón violenta en fosas nasales; a veces esta sensación pruriginosa se extiende haciendo escupir y tragar al enfermo que trata de desembarazarse por todos los medios de esta irritación; al mismo tiempo, sensación de escozor de ojos cuyos párpados arden y están dolorosos.

Ars. alb. y silic. también tienen estos síntomas.

También hay ronquera, muy fácilmente dolores picantes en el pecho y sus paredes, sensibilidad muscular que también puede ser general; cuello de vejiga afectado en algunos casos, con sensación de ardor en la micción.

PECHO :

SENSIBILIDAD DOLOROSA DE PECHO EN PAREDES, MÚSCULOS INTERCOSTALES, PLEURA, etc. QUE SE MANIFIESTA O AGRAVA SOBRE TODO POR MOVIMIENTO, TACTO, O AL EXTENDER EL CUERPO.

DOLORES LANCINANTES DE MÚSCULOS INTERCOSTALES; REUMATISMO INTERCOSTAL
CONDOLores AGUDOS, VIVOS, PICANTES, PUNTADAS EN PECHO, TODO AGRAVADO POR MOVIMIENTO, AUN DE LA RESPIRACIÓN, POR PRESIÓN Y CAMBIOS ATMOSFÉRICOS; LA DISNEA DA A VECES EN ESTOS CASOS SENSACIÓN DE ANGUSTIA; MUCHA SENSIBILIDAD AL TACTO Y

SENSACIÓN DE MAGULLADURA EN MÚSCULOS COMO SI HUBIERAN SIDO TRITURADOS (amica, acon., bryonia).

DERRAMES PLEURALES con dolores agudos, como puñalada, gran ansiedad, disnea y desfallecimiento, por el derrame y la angustia provocada por los dolores : podrá, en esto, ser tan útil como : apis, bryon. o sulf. cuando están presentes sus dolores característicos.

Puede ser útil contra puntadas de pecho después de neumonía; la sensación característica que acompaña su sensibilidad dolorosa es una sensación de ulceración subcutánea, puramente subjetiva.

Este síntoma también se ve en puls. ranunc. puede ser útil contra dolores de pecho por adherencias consecutivas a pleuresía.

Ha curado dolores lancinantes de pecho a cada cambio de tiempo.

Está indicado en inflamaciones reumáticas de diafragma con dolores agudos, lancinantes, que van de hipocondrios y epigastrio hasta la espalda.

Espalda y extremidades

Dolores reumáticos de rotura en todo el tronco y entre omoplatos.

Dolores musculares en borde de omoplato en mujeres con oficio sedentario, con sensación de ardor en pequeños puntos localizados (phosph., agar.), en costureras, dactilógrafas, pianistas (act. rac.). (Allen).

Dolores reumáticos en miembros y músculos; dolores provocados por contacto, movimiento, expansión, o cambio de posición, sobre todo en tronco y miembros.

Piel

Sensación de ardor con intenso prurito, luego, por tacto, erupción herpética con mucho prurito; zona precedido o seguido por neuralgias intercostales (mezer.).

Eczema con espesamiento de piel y formación de costras duras, corneas; comparar con : ant. crud. que tiene excrescencias córneas y callosidades de planta de pies.

Callos hipersensibles, que escuecen, ardientes (salyc. ac.).

Pénfigo con anchas ampollas que revientan y dejan superficie en carne viva.

Relaciones

Sulfur no sigue bien a ranunc. que es incompatible con staph.

RHODODENDRON

Rhodendron chrysanthum, o Rosa de Siberia, pequeño arbusto de la familia de las Ericáceas, crece en altas mesetas de Siberia y Kamtchatka.

Con brotes y pedúnculos secos se obtienen las diferentes dinamizaciones preparando las tres primeras por trituración.

Acción general del medicamento

Actúa sobre TEJIDO MUSCULAR Y FIBROSO, determinando DOLORES GRANDEMENTE INFLUENCIADOS POR EL TIEMPO.

En él, la modalidad tiempo tiene gran influencia, como dulc., acon., etc. y su gran característica es : AGRAVACIÓN POR TIEMPO TORMENTOSO.

Especialmente ANTES DE TORMENTA, SOBRE TODO CON TRUENOS; DESPUÉS DE LA TORMENTA MEJORAN Y LA AGRAVACIÓN POR TORMENTA CON TRUENOS NO PARECE DEPENDER TANTO DE LA HUMEDAD; PARECIDO A phosph., nat. carb., y silic.

Sus dolores, como los de rhus, se agravan por tiempo húmedo y REPOSO, y MEJORAN POR MOVIMIENTO.

En cuanto a su acción propiamente dicha sobre el organismo, pareceter tener especial afinidad por TESTÍCULOS : están HINCHADOS, con DOLORES CONTUSOS, TIRONEANTES, a veces SE EXTIENDEN DE ABDOMEN A MUSLOS Y MUY SENSIBLES AL TACTO.

Los que más se le parecen en esto son : aur. met., clemat., puls., arg. nit., y spong.

En afecciones de origen sifilítico preferimos aur. met., sobre todo si antes el sujeto ha sido fuertemente mercurializado; después de supresión brusca de gonorrea, clemat. y puls.; si es de origen o carácter reumático rhodod. ocupa el primer lugar.

Características

CONSTITUCIÓN Y TIPO : INDIVIDUOS NERVIOSOS, que temen las tormentas y se asustan particularmente del trueno; se agravan por tormentas, PARTICULARMENTE CON ATMÓSFERA CARGADA DE ELECTRICIDAD (phosh., nat. carb., psor., silic.).

Modalidades

Agravación

a) Por tormenta, tiempo ventoso y tormentoso, cambios eléctricos de atmósfera, aproximación de tormenta con relámpagos y truenos; los síntomas vuelven con este mal tiempo.

b) Por tiempo húmedo.

c) Por reposo (rhus tox.).

Mejoría

a) DESPUÉS DE TORMENTA; POR MOVIMIENTO Y CALOR SECO; abrigándose la cabeza.

b) Comiendo.

Patogenesia

Su patogenesia, con cuadro poco característico y sin gran personalidad, presenta no obstante, fuera de sus modalidades tan importantes, algunos síntomas particulares : DOLOR DE DIENTES con dolores neurálgicos profundos, desgarrantes, MAS VIVOS ANTES O DURANTE TIEMPO TORMENTOSO, A CADA CAMBIO DE TIEMPO, CON GRAN VIENTO DE TORMENTA, en cada primavera; aliviados mientras come. TESTÍCULOS RETRAÍDOS, HINCHADOS y dolorosos; testículos en particular epidídimo, muy dolorosos al tacto; dolores de contusión en testículos; alternando con dolores agudos; tumefacción e induración de testículos, en particular izquierdo, con violentos dolores agudos, que se extienden a abdomen y muslos. Orquitis con sensación como si el glándula fuera aplastado (aur., chamom.); orquitis reumática. HINCHAZÓN INFLAMATORIA AGUDA DE ARTICULACIONES, QUE PASA DE UNA A OTRA, MUY DOLOROSA DE NOCHE, AGRAVADO POR REPOSO Y TIEMPO TORMENTOSO (kalmia). DOLORS REUMÁTICOS TIRANTES, DESGARRANTES, EN TODOS LOS MIEMBROS, AGRAVADOS POR TORMENTA, REPOSO, TIEMPO HÚMEDO, O VENTOSO, O POR FRÍO (rhus tox.). Gota con depósitos en articulaciones de dedos grandes de pie, confundida con juanetes (led. pal., colch.) con DOLORS AGRAVADOS Y PROVOCADOS POR TIEMPO TORMENTOSO. NO PUEDE DORMIRSE O DORMIR SIN TENER LAS PIERNAS CRUZADAS.

RHUS TOXICODENDRON

Arbusto de la familia de las terebintáceas originario de América Septentrional, se encuentra también en bosques frondosos y lugares húmedos de Europa.

Tiene grandes ramas flexibles, delgadas, que alcanzan muchos metros de altura y se mezclan a árboles vecinos en cuya corteza se implantan.

Hojas color verde pálido, dentadas, y según la estación, flores verdosas pequeñas en espigas y pequeños frutos carnosos, blancos, redondeados.

Contiene jugo marrón amarillento, de olor penetrante y nauseoso, cáustico y produce en piel vesículas llenas de serosidad extremadamente pruriginosas y ardientes; son las hojas las que contienen más; con ellas se prepara la tintura madre con la que se obtienen las diferentes dinamizaciones por diluciones sucesivas.

Acción general del medicamento

Rhus tiene acción muy profunda en PIEL; provoca ERUPCIÓN VESICULOSA característica, con EDEMA, ARDOR, COMEZÓN y PINCHAZOS : la menor cantidad de tintura de rhus o de jugo de la hoja produce en anchas superficies de piel enrojecimiento y ardor que no tardan en producir tumefacción, edema y cubrirse de vesículas con prurito casi intolerable (Hughes).

El ardor y enrojecimiento de boca y garganta, diarrea, tos irritativa, irritación cutánea, indican acción análoga sobre mucosas.

Para TESTE sus efectos son los de un cáustico corrosivo que, por su extrema sutileza, tiene tendencia a invadir anchas superficies más bien que a penetrar profundamente en tejidos; lo compara a arnica que penetra más y a ledum cuya acción se localiza mejor (Hughes).

Tiene SOBRE MENTE ACCIÓN DEPRIMENTE que se traduce en estado de prostración y estupor que lo indica en muchos estados tifoideos.

Ejerce sobre SISTEMA MUSCULAR acción igualmente deprimente que se manifiesta por rigidez dolorosa y fenómenos paralíticos.

Pero ejerce sobre todo su acción electiva EN TEJIDO CONJUNTIVO FIBROSO.

Ningún medicamento actúa más profundamente en aponeurosis y tendones musculares, de ahí derivan numerosos síntomas de muchos estados reumáticos, dolores aponeuróticos, etc.; especialmente si el factor surmenaje está etiologicamente en juego.

Para el Dr. Nebel esta acción electiva sobre tejido conjuntivo fibroso explica su gran característica : mejoría por movimiento; según él, bajo su influencia el organismo drena toxinas a nivel de aponeurosis, tendones, envolturas fibro conjuntivas de articulaciones, y, como el movimiento favorece la aceleración de la circulación linfática, permitiría así una eliminación tóxica más rápida, lo que trae alivio.

Por su acción sobre tejido conjuntivo fibroso, influencia LA CIRCULACIÓN actuando sobre túnica externa fibrosa de vasos.

Características

1) CONSTITUCIÓN Y TIPO : No tiene tipo netamente definido.

Es útil en casi todos los temperamentos.

Lo más que se puede decir es que desarrolla más fácilmente sus síntomas en neuroartríticos y gotosos.

2) ESTUPOR : ESTUPOR CON DELIRIO SUAVE, PERO REGULAR, PERSISTENTE, es estado característico de rhus tox.

Va acompañado de AGITACIÓN que es otra de sus características; se da vuelta para todos lados sin tener consciencia de su agitación ni de lo que pasa alrededor.

Este estado se ve en disentería, peritonitis, neumonía, escarlatina, difteria, fiebre tifoidea, etc., localización y nombre de enfermedad nada importan en el caso (Nash).

3) AGITACIÓN :Muy grande, puede ser su primera característica.

Tiene de particular QUE ESTA EN RELACIÓN CON EL DOLOR, DOLORIMIENTO O SENSACIÓN DE MOLESTIA DOLOROSA y que MEJORA TEMPORARIAMENTE POR MOVIMIENTO.

Aunque no haya dolor muy neto, hay una especie de molestia vaga, pero intensa, mejorada por movimiento, de manera tal que desea estar sin cesar en movimiento, porque el solo hecho de cambiar de sitio alivia.

Esto se parece a la agitación de acon; y ars. alb. con los que rhus. forma lo que Nash llama "TRIO DE LA AGITACIÓN".

Modalidades

Lateralidad

De preferencia derecha.

Mejoría

a) POR MOVIMIENTO : como bryon., su principal característica está en la modalidad : MEJORÍA POR MOVIMIENTO, AGRAVACIÓN POR REPOSO, que es tan importante para la acción de rhus como la inversa : agravación por movimiento y mejoría por reposo es para bryon.

En enfermedades crónicas, como reumatismo, debe moverse para tener alivio; al principio de los movimientos sufre, pero si continúa se siente mejor.

En enfermedades agudas, el movimiento que hace parece ser su único alivio, de ahí su gran agitación.

b) POR CALOR, APLICACIONES CALIENTES; TIEMPO SECO Y CALUROSO

Agravación

a) POR REPOSO b) POR HUMEDAD; TIEMPO FRÍO Y HÚMEDO; todo esto está lleno de malos efectos para el enfermo, y en todas las formas : agravación por lluvia, cuando se moja, por haber estado expuesto al frío, mientras transpira abundantemente.

c) DE NOCHE, PARTICULARMENTE A MEDIA NOCHE; sus síntomas sobrevienen o se agravan de noche.

d) ESTANDO ACOSTADO SOBRE EL LADO DOLOROSO, al contrario de bryon.

Síntomas mentales

Tiene fácilmente fatiga cerebral; no puede encontrar su mente, reflexionar largo tiempo, sostener esfuerzo mental.

Memoria débil, olvida letras o palabras al escribir; ideas fácilmente confusas.

Irritable, inquieto, gran sensibilidad moral, la más ligera contrariedad aumenta todos sus sufrimientos; agitado, nerviosidad extrema; gran aprensión como si la fuera a pasar una desgracia que le impide quedar en el lecho de noche. Asco por la vida, triste, llora sin saber porqué, ideas de suicidio, quiere ahogarse pero teme a la muerte; quisiera morir, pero no tiene valor para suicidarse.

Oscurecimiento de sensorio; delirio suave pero regular y persistente.

Delirio vago y consciente.

Delirio de persecución, delirio con miedo de ser envenenado (hyosc.).

Sueño

Insomnio antes de medianoche, enseguida sueño agitado, no reparador, con sueños, principalmente de violentos ejercicios físicos, fatigantes : carreras, natación, remo, etc.; sueña con sus ocupaciones cotidianas.

Cabeza

ERUPCIÓN HÚMEDA, PRURIGINOSA DE CUERO CABELLUDO; COSTRAS DE LECHE.

Cabeza pesada; sensación como si el cerebro fuese sacudido y golpease la caja craneana al mover la cabeza.

Cefalea con dolores presivos en temporales, frente y órbitas, como si los ojos fueran empujados hacia afuera.

Sensación dolorosa como si una tablita estuviera unida muy apretada sobre la frente.

Cefalea occipital (rhus radicans).

Vértigo estando parado o al caminar.

Ojos

Inflamación de ojos, en reumáticos, después de exposición a humedad y frío, o de transpiración bruscamente detenida por haberse expuesto al frío (Kent).

Párpados inflamados, hinchados y pegados a la mañana, con sensación de escozor.

Ojos rojos, hinchados, conjuntiva inyectada; dolores presivos, ardientes, los ojos, que escuecen y pican.

Pústulas de córnea, iritis reumática después de exposición a frío húmedo.

Inyección circunscripta de córnea.

Fotofobia; sensación como si tuviera velo o niebla delante de los ojos.

Ptosis.

Parálisis de músculos de pupila por reumatismo o después de haber tomado frío, en tiempo húmedo, o después de mojarse los pies (Kent).

Oídos

Sensación de zumbidos o silbidos, peor al caminar, neuralgia de oídos.

Inflamación erisipelatosa con vesículas de oído externo.

Cara

Pálida, de aspecto enfermizo, o roja y cubierta de sudor.

Ulceraciones de comisuras de labios.

Herpes febril alrededor de la boca.

LAS MANDÍBULAS CRUJEN A CADA MOVIMIENTO DE MASTICACIÓN Y SE DISLOCAN FÁCILMENTE.

Luxación fácil de mandíbula en articulaciones témporo-maxilares (ignat., petrol.).

ERISPELA DE CARA con anchas ampollas que se extienden rápidamente de izquierda a derecha, con inflamación violeta de piel que está edematizada, hinchada; mucho ardor, escozor, pinchazos; con fuerte temperatura, delirio y agitación características.

Eczema pruriginoso y escozor de cara : COSTRAS DE LECHE, (viola tricol., calc. ost.).

Neuralgias faciales reumáticas.

Aparato digestivo

BOCA :

SEQUEDAD DE BOCA, LENGUA Y FARINGE, CON GRAN SED.

Encías ardientes y dolorosas.

Los dientes parecen largos y flojos.

Lengua seca, dolorosa, agrietada, con capa espesa de mucus blanco u oscuro excepto en la punta donde hay UN ESPACIO TRIANGULAR ROJO; POR OTRA PARTE a menudo sus bordes gruesos conservan impresión de dientes.

Arg. nit., puede tener extremidad de lengua roja dolorosa pero no se parece al triángulo rojo de rhus tox., con lengua seca, en arg. nit., no hay sed como en rhus tox.

Gusto amargo y metálico.

FARINGE Y ESÓFAGO :

Faringe seca, dolorosa, inflamada; la inflamación recae particularmente en tejido mucoso pero también submucoso; pinchazos y gran dificultad para tragar alimentos sólidos cuya deglución provoca espasmo de faringe.

Papilas con hinchazón de parótidas que están rojo oscuro, sobre todo izquierda, pinchazos al tragar.

Inflamación aguda de esófago por absorción de líquidos corrosivos que determinan lesiones mucosas parecidas a rhus tox (Kent).

ESTÓMAGO :

SED MUY MARCADA, INEXTINGUIBLE; CON GRAN SEQUEDAD DE BOCA, GENERALMENTE CON DESEO DE AGUA O LECHE FRÍA.

Deseo de ostras y dulces, aversión por carne.

Hambre si apetito.

Sensación de hambre, de vacío en boca de estómago pero si deseo de alimentos (Kent).

Náuseas y vómitos; vómitos biliosos y náuseas después de beber agua fría.

Náuseas después de comer, con vómitos súbitos, apetito anormal con tendencia a vomitar; náuseas y regurgitaciones, peor de noche o después de comer.

Sensación de plétora y pesadez de estómago como de peso.

Sensación de latidos en boca de estómago.

Dolor que roe, de estómago.

Sensación dolorosa de estómago y náuseas, sobre todo después de tomar alimentos fríos, helados.

ABDOMEN Y DEPOSICIONES :

Gran distensión abdominal con acumulación de gas; sensibilidad tal que no puede soportar ninguna presión ni aún las frazadas.

Cólicos, dolores como pinchazos, cortantes, aliviados acostándose de espaldas levantando las piernas.

Dolores marcados en región de colon ascendente.

Hígado grande, doloroso, impide acostarse sobre la derecha.

DIARREA CON DEPOSICIONES POCO ABUNDANTES, VISCOSAS, A MENUDO MEZCLADAS CON SANGRE; sensación de ardor DE RECTO antes de deposición que alivia inmediatamente.

Deposiciones DE OLOR CADAVERÍCO, espumosas sin dolor; deposiciones acuosas o en chorro,

INVOLUNTARIAS, MUY NUMEROSAS DE NOCHE y menos de día; deposiciones involuntarias con GRAN AGOTAMIENTO.

Deposición disintérica a la mañana temprano que obliga a levantarse en seguida. (sulphur).

Comezón y ardor de recto con violento tenesmo.

Aparato urinario

Orina poco abundante, muy coloreada, con sedimento más o menos marcado y a veces olor fuerte y penetrante.

Disuria con hematuria.

Necesidad de orinar con tenesmo y dolores en región prostática que provocan deseo de evacuar; mejoría moviéndose.

Tenesmo vesical violento con orina sanguinolenta.

Orina emitida lentamente por especie de debilidad paralítica de vejiga.

Hay a veces parálisis completa de vejiga con incontinencia nocturna.

Micciones frecuentes día y noche, debilidad de vejiga en niñas o mujeres con necesidad de orinar, pérdida involuntaria de orina si tiene frío (Kent).

Dolores en región renal con orina albuminúrica, sanguinolenta o cargada de espeso sedimento blanco que se deposita en el fondo del recipiente (Kent).

Órganos genitales

MASCULINOS :

Hinchazón erisipelatosa, erupción húmeda, piel gruesa, edematizada, en escroto, con prurito intolerable.

FEMENINOS :

Hinchazón erisipelatosa, erupción húmeda, extremadamente pruriginosa de órganos genitales externos : labios, etc.

Reglas adelantadas, acres e irritantes, se prolongan demasiado.

A veces, con restos mucosos (Kent).

Loquios en pequeña cantidad, durante largo tiempo, ofensivos, dolores de puntada en vagina.

Prurito de pezón.

Aparato respiratorio

NARIZ :

Erupción costrosa alrededor de fosas nasales con comezón y ardor.

Coriza con sensación abundante, acre y excoriente; dolores en huesos de nariz al estornudar; particularmente indicado si ese coriza sobreviene después de exposición torpe a humedad.

Epistaxis al agacharse, o de noche; la sangre es negra.

LARINGE Y PULMONES :

Sensación de calor, escozor, desolladura de laringe.

Ronquera después de forzar la voz (arnica).

Ronquera sobre todo marcada al empezar a hablar, cantar, luego desaparece o mejora después de hablar un instante o cantar algunas notas.

Tos provocada por sensación de cosquilleo detrás de esternón, seca, molesta, sobre todo marcada de medianoche a la mañana, o durante escalofrío o en cuanto se destapa un poco, o simplemente por sacar las manos de las frazadas.

Resfrío gripal, influenza con dolores en todos los huesos (eupat.

perf.) particularmente después de estar expuesto al frío húmedo.

Hemoptisis de sangre rojo vivo por esfuerzo, por haber tocado muy violentamente un instrumento de viento.

Aparato circulatorio

Produce verdadero ERETISMO CIRCULATORIO con PALPITACIONES a veces muy marcadas, y pueden sobrevenir aún estando sentado, en reposo; palpitations que sacuden todo el cuerpo; palpitations con angustia, a la mañana al despertar; palpitations haciendo ejercicio.

Sensación de debilidad en pecho como por músculo cardíaco fatigado, como si hubiera sido forzado.

Por eso está indicado EN HIPERTROFIA CARDÍACA SIMPLE, no ASOCIADA A LESIONES, VALVULARES O RENALES Y PROVENIENTES DE ESFUERZOS PROLONGADOS, EXAGERADOS.

(Arnica, cactus); hipertrofia cardíaca en corredores a pie y deportistas.

A menudo los malestares de corazón van acompañados DE SENSACIÓN DE ENTUMECIMIENTO Y DEBILIDAD DE BRAZO Y HOMBRO IZQUIERDOS.

PULSO PEQUEÑO Y ACELERADO, A MENUDO IRREGULAR E INTERMITENTE; sin tendencia a ser lleno y fuerte como acon.

Espalda y extremidades

Por su acción electiva sobre TEJIDO FIBRO CONJUNTIVO tiene influencia de primer orden en esta región.

Ningún medicamento tiene síntomas tan marcados en APONEUROSIS, TENDONES MUSCULARES O LIGAMENTOS ARTICULARES Y rhus tox es el más indicado cuando están inflamadas POR ATAQUE DE REUMATISMO, O DESPUÉS DE ABUSO DE EJERCICIO, O TORCEDURA SÚBITA, una entorsis, por ej.

En todos estos casos; el factor humedad como causa determinante o agravante, tiene gran importancia.

SENSACIÓN DE RIGIDEZ MUSCULAR DOLOROSA ALIVIADA POR MOVIMIENTO.

SENSACIÓN DE RIGIDEZ DOLOROSA DE TENDONES, LIGAMENTOS, ARTICULACIONES Y FASCIES, DESPUÉS DE REUMATISMO, DE ESFUERZO VIOLENTO, EJERCICIO MUSCULAR PROLONGADO, EXPOSICIÓN A FRÍO HÚMEDO; Y SIEMPRE MEJORADOS POR MOVIMIENTO.

RIGIDEZ MUSCULAR GENERAL O PARCIAL, RIGIDEZ ARTICULAR, QUE DESAPARECE POR MOVIMIENTO.

Ante tales síntomas y cuando son consecuencia de ejercicio muy violento o prolongado, comparar con arnica; pero ésta actúa más especialmente sobre músculos que sobre ligamentos; está indicado cuanto después de largo ejercicio, hay menos rigidez muscular y sobre todo articular, que una especie de sensación dolorosa que da sensación de contusión, de magulladura muscular; las articulaciones están poco o nada interesadas; el movimiento no alivia como en rhus tox....

Para entorsis, arnica no es el mejor remedio, sino más bien rhus tox. a menos que haya equimosis, o extravasación sanguínea, en cuyo caso arnica está indicado.

Ars. alb., para consecuencias de largo esfuerzo muscular, cuando se ha hecho para escalar una montaña, para hacer una ascensión larga y penosa, aquí los efectos de la rarefacción del aire se pueden agregar a los de la fatiga.

En ambos no se nota mejoría por movimiento característica de rhus tox.

RIGIDEZ ARTICULAR DOLOROSA, REUMÁTICA AGRAVADA POR REPOSO, MEJORADA POR MOVIMIENTO : RIGIDEZ DOLOROSA AGRAVADA CUANDO COMIENZA A MOVERSE, PERO CONTINUAR EL MOVIMIENTO ALIVIA; EL CALOR TAMBIÉN MEJORA, EL FRÍO Y LA HUMEDAD TIENEN COMO PARA TODO EN rhus tox., LOS MALOS EFECTOS QUE YA CONOCEMOS.

MIEMBROS SIEMPRE EN MOVIMIENTO PORQUE SE SIENTE MEJOR POR UN TIEMPO, DESPUÉS DE CAMBIO DE POSICIÓN.

HINCHAZÓN ARTICULAR DOLOROSA; DOLORES DESGARRANTES DE TENDONES, LIGAMENTOS ARTICULARES Y FASCIAS MEJORADOS POR MOVIMIENTO, AGRAVADOS POR REPOSO; EL AIRE NO ES TOLERADO, PONE LA PIEL DOLOROSA.

DOLORES ARTICULARES DE DISLOCACIÓN, TORSIÓN, PESADEZ, PRESIÓN CON SENSACIÓN DE FRÍO, ENTUMECIMIENTO, RIGIDEZ; AGRAVADOS POR REPOSO, HUMEDAD, FRÍO, DESPUÉS DE MEDIANOCHE; MEJORADOS POR MOVIMIENTO DE ARTICULACIÓN ENFERMA.

Cierto número de remedios tienen mejoría por movimiento y se pueden comparar con rhus tox. : anacard. : dolor de cuello peor al comenzar a moverse pero no tiene enseguida mejoría por reposo; conium : agravación al principio del movimiento, pero ambos difieren completamente.

Lycop. y puls. : alivio por movimiento lento.

Ferr. met. : dolores neurálgicos y reumáticos aliviados hacia la noche por movimientos lentos.

Kalmia lat. : dolores tirantes de piernas pero extremadamente inestables, cambian de lugar a cada instante y no se alivian por movimiento.

Rhodod. : gran susceptibilidad a cambios de tiempo, hormigueos y rigidez dolorosa como rhus tox., y agravación por reposo; especialmente indicado para gota reumática de pequeñas articulaciones y tiene características especiales que impiden confundirlo con rhus tox.

DOLOR y RIGIDEZ DE CINTURA, PEOR ESTANDO SENTADO, MEJOR ACOSTADO SOBRE ALGO DURO Y POR MOVIMIENTO.

DOLORES EN REGIÓN LUMBAR COMO SI LA ESPALDA ESTUVIERA ROTA.

EXCELENTE PARA LUMBAGO DESPUÉS DE MOJADURA, DE HABER TOMADO FRÍO, DE SUPRESIÓN MAL HECHA DE TRANSPIRACIÓN ABUNDANTE, DE LEVANTAR ALGO MUY PESADO : DOLOR MAS VIVO CUANDO COMIENZA A MOVERSE.

PERO LA CONTINUACIÓN DEL MOVIMIENTO MEJORA.

SENSACIÓN DE RIGIDEZ DOLOROSA EN SACRO Y REGIÓN LUMBAR, AGRAVADA REPOSANDO DESPUÉS DE HABER HECHO EJERCICIO.

Sulph. : dolores reumáticos, con rigidez en región lumbar, pérdida súbita de fuerza al tratar de moverse, pero tiene otras características que no tiene rhus y permiten elegir entre ambos.

Bryon. : dolores tironeantes, pinchazos, con rigidez de músculos de espalda y lumbares que impiden caminar, pero con agravación por movimiento y mejoría por reposo.

Calc. fluor. : dolores de lumbago por esfuerzo, agravados al comenzar los movimientos, que, continuados, mejoran, lo mismo que el calor.

Nux vom. : dolores de lumbago en relación con hemorroides o abuso de onanismo; vivos, obligan a sentarse para darse vuelta, cuando está acostado; estando parado le es penoso darse vuelta o doblar el cuerpo; la posición sentada le es particularmente desagradable.

Kali carb; : dolores agudos en región lumbar, peores a las 3 de la mañana y obligan a levantarse y caminar; irradian hacia abajo, hacia nalgas.

Petrol., y ruta : útiles cuando los dolores lumbares están peor a la mañana, pies rígidos.

Hay que pensar en valer.

Debilidad parálitica de miembro superior con sensación de frío e insensibilidad.

Hinchazón y contractura dolorosa de dedos.

Cuando toma algo, siente pinchazos y hormigueos en manos y dedos; entumecimiento y hormigueo en dedos.

Sensación constante en vejiga como si estuviera llena.

CIÁTICA CON DOLORES DESGARRANTES, TIRONEANTES A LO LARGO DEL NERVIIO, PEOR DURANTE REPOSO, MEJOR POR MOVIMIENTO, MIEMBRO DOLOROSO EN MOVIMIENTO CONSTANTE; PARTICULARMENTE ÚTIL EN TAL CIÁTICA POR FRÍO, TIEMPO HÚMEDO, EXPOSICIÓN A LLUVIA, POR TOMAR FRÍO ESTANDO TRANSPIRADO, SI HA SIDO SUPRIMIDA LA TRANSPIRACIÓN.

A continuación los principales medicamentos para tratamiento de ciática clasificados por lateralidad de acción : no basta para determinar la elección pues muchos tienen lateralidad indiferente; pero; al menos, esta clasificación tiene la ventaja de fijar la atención, sin excluir la búsqueda de otras características.

(Según el Dr. Paul Chiron) : "El tratamiento de la ciática" en La revista francesa de homeopatía - Septiembre 1920.
Medicamentos de lateralidad indiferente

Acon. : Ciática al principio, con dolores lancinantes o desgarrantes, con entumecimiento e hipersensibilidad al menor contacto.

Agravación de noche y por movimiento, mejoría estando sentado; gran agitación.

Ars. alb. : Ciática con dolores ardientes y desgarrantes con agitación, gran debilidad, tendencia a estar acostado.

Agravación de noche, particularmente después de medianoche.

Por frío.

Mejoría por calor y aplicaciones calientes.

Bell. : Ciática con dolores lancinantes en ataques cotidianos, a la tarde hasta medianoche.

Hipersensibilidad de piel de miembros tal que ni puede soportar el simple contacto de las frazadas.

Gran agitación.

Agravación por la menor corriente de aire.

Mejoría por calor; o estando parado o cuando tiene las piernas colgando.

Bryon. : Ciática con dolores tironeantes, desgarrantes, lancinantes o como causados por ulceración subcutánea; dolores localizados en región lumbar y que se extienden al muslo.

Agravación por el menor movimiento y por presión fuerte.

Mejoría por reposo y estando acostado sobre el lado doloroso.

Gelsem. : Ciática obstinada, dolores ardientes, por ataques, contemblor y gran debilidad del miembro.

Agravación de noche por reposo y al comenzar a caminar.

Mejoría por transpiración y por movimiento.

Lycop. : Caso crónico, con dolores ardientes y pinchazos, periódica, con completa remisión en intervalos de ataques.

Rigidez y debilidad de miembro afectado, no puede enderezar la pierna.

Agravación por reposo, estando parado, o acostándose sobre el lado doloroso.

Mejoría por movimiento.

El Dr. Chiron lo clasifica como teniendo ciática de lateralidad indiferente; ciertos autores aconsejan no olvidar que lo más frecuente es su lateralidad derecha.

Merc. : Ciática con dolores desgarrantes y tironeantes a todo lo largo de muslo, de cadera a rodilla con sensación de debilidad, de calor intenso aunque la piel esté fría.

Agravación por acostarse, al movimiento, al atardecer y de noche.

Mejoría al aire libre y al mañana.

Nux v. : Dolores tironeantes y desgarrantes a lo largo de miembro afectado, de cadera a pie, con rigidez y contracción.

Agravación a la mañana, acostándose sobre el lado doloroso, por frío.

Mejoría por reposo y aplicaciones de agua caliente.

Plumb. : Ciática crónica, con atrofia muscular.

Dolores continuos, constrictivos y desgarrantes.

Agravación de noche, por calor, movimiento, presión ligera.

Mejoría por masaje.

Phytol. : Dolores lancinantes, tironeantes, latentes de parte externa, localizados en cara externa de muslo, aunque se puede encontrar en parte posterior.

Agravación por movimiento, presión de noche y después del sueño.

Mejoría por reposo y calor.

Un terreno sifilítico es una indicación más.

Rhus tox. : Dolores penetrantes, ardientes, desgarrantes, con sensación de frío y entumecimiento.

Hormigueos y rigidez parálitica de miembro.

Agravación de noche, por reposo y al empezar a moverse.

Mejoría por movimiento, calor seco.

Ciática a frigore o por esfuerzos.

Ruta grav. : Dolores profundamente situados, como en médula de huesos, o con sensación como si el hueso estuviera roto.

Enfermo obligado a caminar constantemente durante el ataque, porque el dolor aumenta en cuanto se sienta o acuesta.

Agravación por tiempo húmedo, de noche.

Visc. alb. : Caso grave; dolores tironeantes y latentes en los muslos.

Sensación como si los músculos fueran retorcidos con pinzas calientes.

La pierna parece pesada como plomo.

Hipersensibilidad de muslo.
 Gran postración.
 Agravación por tacto, por el menor movimiento.
 Mejoría por reposo.
 Medicamentos con lateralidad derecha
 Colocynth. : Ciática derecha con dolores agudos, tireantes, pinchazos, en región sacra, cadera, muslo, rodilla; a veces dolores fulgurantes de sacro a talón.
 Ataques dolorosos intolerables.
 Mejoría por reposo absoluto y aplicaciones calientes.
 Dioscorea : Ciática derecha con dolores desgarrantes, tireantes encadera derecha y a lo largo del muslo.
 Dolores calambroides de piernas.
 Agravación al levantarse, moviendo el miembro al caminar.
 Mejoría por reposo.
 Graph. : Afecta particularmente la derecha : dolores lancinantes, a todo lo largo del nervio ciático y dolores ardientes; sensación de entumecimiento alternando con dolores.
 Agravación dejando el miembro estirado, por caminar, por movimiento.
 Mejoría estando sentado en una silla, flexionando la pierna sobre el abdomen.
 Índigo : Dolores agudos de cadera derecha al resto de la pierna, con rigidez de miembro.
 Agravación por reposo, estando sentado, después de comer.
 Mejoría por movimiento.
 Magn. phosph. : Ciática derecha, con dolores lancinantes, agudos por ataques bruscos fulgurantes.
 Imposibilidad de quedar en cama de noche, debe estar de pie constantemente.
 Pallad. : Ciática derecha con dolores lancinantes, de dedo grande a cadera o de trocánter a hueso poplíteo.
 Agravación por frío, movimiento, a la noche.
 Mejoría por calor y reposo.
 Tellur. : Ciática principalmente derecha, que irradia de sacro a pierna con sensibilidad de columna vertebral.
 Agravación por el menor esfuerzo, risa, tos y estando acostado sobre el lado afectado.
 Medicamentos con lateralidad izquierda
 Amm. mur. : Ciática grave que dura largo tiempo.
 Dolores de pierna izquierda con sensación de contractura en miembro que obliga a renegar.
 Dolores desgarrantes y pinchazos agravados cuando está sentado, ligeramente disminuidos por caminar; enteramente mejorado estando acostado.
 Chamom. : Ciática izquierda con dolores tireantes y desgarrantes; con sensación de entumecimiento en todo el miembro.
 Gran sensibilidad al menor dolor que es insoportable.
 Agravación de noche, en cama y por el menor movimiento.
 Cimicif. : Dolores violentos de cadera izquierda que obligan a salir del lecho.
 Mejoría por presión y estando parado.
 Aupat. perf. : Ciática izquierda con dolores violentos en todo el largo del nervio con sensación de pierna débil como paralizada.
 Agravación por movimiento.
 Iris versic. : Ciática izquierda, con dolores agudos, ardientes, a todo lo largo del nervio, hasta el pie.
 Sensación como si la articulación coxo femoral estuviera luxada.
 Agravación de noche, por reposo, al principio del movimiento.
 Mejoría por movimiento.
 Kali bichro. : Ciática izquierda con dolores violentos que se desplazan a todo lo largo de la pierna.
 El dolor sobreviene y desaparece bruscamente.
 Agravación estando parado, estando en la cama y sentado.
 Mejoría por caminar, por flexión de miembro.
 Kali iodat. : Dolores tireantes con puntadas en parte posterior de muslo y rodilla izquierdos.
 Contracciones espasmódicas de músculos.
 Agravación de noche y acostado sobre el lado afectado.
 Mejoría por movimiento.
 Ledum pal. : Dolores que afectan más el lado izquierdo.
 Pinchazos y tirones que se extienden de cadera a pie, con sensación de presión y contractura en músculos de región posterior del muslo.
 Agravación de noche, por calor del lecho, tacto.
 Mejoría por frío.
 Stillingia : Ciática izquierda con dolores violentos con tirones de cadera a pierna y dedo grande.

Terreno sífilítico Sulphur : Dolores penetrantes, tironeantes, de cadera izquierda a extremidad inferior de miembro, con sensación de pesadez y entumecimiento.

Agravación por caminar y de noche, por el calor del lecho.

Si deseamos clasificar estos medicamentos, no solamente por lateralidad sino por otras características, tendremos el cuadro siguiente.

Medicamentos con lateralidad indiferente

1) MEJORÍA POR REPOSO : Acon., bryon., merc., nux v., plumb., phytol., visc. alb.

2) MEJORÍA POR MOVIMIENTO : Gels., lycop., rhus tox., ruta.

3) MEJORÍA POR CALOR : Ars. alb., bell., rhus tox.

4) MEJORÍA POR APLICACIONES DE AGUA CALIENTE : Nux v.

5) AGRAVACIÓN DE NOCHE : Acon., gels., merc., plumb., rhus tox., ruta.

6) AGRAVACIÓN A LA MAÑANA : Nux v.

Medicamentos con lateralidad derecha

1) MEJORÍA POR REPOSO : Coloc., dioscor., graph., pallad., tellur.

2) MEJORÍA POR MOVIMIENTO : Índigo, magn. phosph.

3) MEJORÍA POR CALOR : Coloc., magn. phosph.

4) AGRAVACIÓN POR FRÍO : Coloc., pallad.

5) MEJORÍA DOBLANDO LA PIERNA : Gnaphal.

6) AGRAVACIÓN POR EL MENOR ESFUERZO : Tellur.

Medicamentos con lateralidad izquierda

1) MEJORÍA POR MOVIMIENTO : Iris., kali iod., kali bich.

2) AGRAVACIÓN POR REPOSO : Chamom., eupat purp., sulph., still.

3) MEJORÍA ESTANDO ACOSTADO : Ammom. mur.

4) AGRAVACIÓN EN CAMA, DE NOCHE : Chamom., sulph., ledum.

5) MEJORÍA POR PRESIÓN O ESTANDO PARADO : Cimicif.

Gran fatiga y sensación de pesadez de miembros inferiores pero que no impiden moverlos, porque esto alivia.

Debilidad de piernas al subir escaleras.

ENTORSIS DE TOBILLOS Y OTRAS ARTICULACIONES; si hay equimosis, es útil después que arnica ha hecho desaparecer los síntomas más dolorosos, y para combatir debilidad de ligamentos articulares y tendones que sigue generalmente a entorsis.

Calambres de pantorrillas, de noche, o cuando se sienta después de caminar, mejorados por movimiento.

Hinchazón de pies, de noche.

Piel

DOLOROSA AL AIRE FRÍO Y AGUA FRÍA.

Rhus tox. desarrolla y cura ERUPCIÓN VESICULOSA CON EDEMA, ARDOR Y COMEZÓN INTENSA, NO MEJORADA POR RASCADO : HAY MUCHA HUMEDAD, REZUMA MUCHO LA PIEL CON LA ERUPCIÓN.

LA COMEZÓN CONTINUA SE ALIVIA A VECES APLICANDO AGUA TAN CALIENTE COMO LA PUEDASOPORTAR.

Para Nash, es uno de nuestros mejores remedios en EL ZONA.

Comparar aquí con ars. alb., crot. tigl., dolich. prur., graph., mezer., ran.

bulb.

ERISIPELA, LO MAS A MENUDO DE CARA, con vesículas, supuración, escozor y prurito externo; edema de piel, que está rojo oscuro en ese lugar; tendencia a ir DE IZQUIERDA A DERECHA al contrario de apis, que va de derecha a izquierda y se acompaña de coloración menos oscura, rosada, ausencia de supuración, de sed y mejora por frío.

Rhus tox. precede a menudo aquí al estado de ars. alb.

Fiebre

Cada vez que, en enfermedad febril, la inteligencia se vuelve confusa, nublada, o la estupefacción se instala con profundo grado de delirio suave, balbuceo, lengua seca, cubierta por capa oscura con triángulo rojo en la punta, gran sed, hay que pensar en rhus tox.; siempre que haya su agitación característica (Nash).

Fiebre adinámica con agitación y temblor.

Escalofríos pasajeros o continuos con sensación de ser salpicado con agua fría y seguidos de calor y deseo de estirar los miembros.

Sed durante el calor, raramente durante escalofríos.

Sudor en todo el cuerpo, excepto cabeza y cara.

En FIEBRE TIFOIDEA, el cuadro clínico que requiere rhus tox. es : delirio suave asociado a agitación mental y física con profunda postración; enfermo indiferente a todo y la sensación de gran debilidad está fuera de proporción con los otros síntomas; cuando se lo interroga, responde lentamente y contra su voluntad, a veces con vivacidad,

jamás con violencia; tiene fuerte cefalea frontal cuyo dolor compara al que causaría una plancha fuertemente apretada sobre la frente; esta cefalea puede ser acompañada de epistaxis que alivia.
Lengua seca, marrón, agrietada, conserva impresión de dientes, con triángulo rojo en la punta.
Diarrea más o menos abundante, de olor cadavérico, con deposiciones marrón amarillentas, a veces involuntarias, sobre todo durante el sueño.
Abdomen timpanizado, superficie del cuerpo seca y caliente y si hay transpiración, es copiosa, de olor agrio con rash miliar.
En fiebres intermitentes, la tos durante el escalofrío es característica.
Relaciones
Complementarios
Bryon., calc. fluor., ars. alb., bovista, en urticaria.
Antídotos
Anacard., croton tigl., mezer., cypriped., plumbago (eczema de vulva); graph., bryon., bell., rhodod.
Incompatible
Apis.

RUMEX CRISPUS

O Paciencia Silvestre, Paciencia Amarilla, planta vivaz de la familia de las Polygonáceas, crece en lugares húmedos. Se prepara la tintura madre con la que se obtienen, por diluciones hahnemannianas sucesivas, las diferentes dinamizaciones, haciendo macerar en alcohol a 90º, la planta recolectada durante la floración.

Acción general del medicamento

Rumex crispus sólo ha sido experimentado incompletamente; sus síntomas mentales han sido mal observados y la información que tenemos no es perfecta; pero sus síntomas catarrales han sido bien experimentados y los conocemos bien (Kent).

SU TENDENCIA CATARRAL es muy notable; bajo su influencia, todas las mucosas del árbol respiratorio se inflaman y esta inflamación va acompañada de MUCOSIDAD EXTREMADAMENTE ABUNDANTE.

"La he visto correr tan abundantemente por nariz, escribe Kent, que parecía continua; también la he visto en tal cantidad por tráquea y bronquios que en poco tiempo el enfermo había expectorado un cuarto litro de mucosidades blancas como agua".

Pero en ciertos casos DISMINUYE SECRECIONES DE MUCOSA TRAQUEAL Y LARINGEA, provocando sequedad marcada en esas zonas con exaltación de sensibilidad; de ahí, alteraciones de voz y tos con sensación desagradable de cosquilleo; yendo apenas esta acción hasta la inflamación.

A veces toma carácter gripal, hay secreción mucosa abundante y expectoración líquida, acuosa, espumosa, emitida en verdaderas bocanadas; luego el mucus se hace espeso, blanco o amarillo, filamentoso, tenaz, tan difícil de expectorar que ni tosiendo no sonándose llega a expectorarlo.

Este estado catarral va generalmente acompañado por DIARREA MATINAL, que es rasgo importante de su acción.

Actúa de manera marcada sobre PIEL donde determina INTENSO PRURITO AGRAVADO POR EXPOSICIÓN A AIRE FRÍO Y ALIVIADO POR CALOR, diferente del de sulf.

y merc.

Modalidades

Agravación

a) AL FRÍO, RESPIRANDO AIRE FRÍO, ESTANDO DESCUBIERTO : gran sensibilidad al aire frío, marcada sobre todo en vías respiratorias; tal vez ningún otro tiene mucosas de estas regiones tan sensibles al frío : debe cubrir su cabeza con las frazadas para no respirar el aire frío que en seguida excitaría la tos.

b) Sensible al aire frío, a baños fríos, como rhus tox., pero SE AGRAVA POR MOVIMIENTO.

Por eso, se podría confundir con bryon. pero éste no es tan sensible al aire frío; al contrario, bryon. puede aliviarse por aire frío y agravarse en cuarto caliente (Kent).

c) La sensibilidad nerviosa de rumex al aire libre es tan marcada como en nux. v. (Kent).

d) A LA NOCHE (excepto la diarrea que es peor a la mañana).

e) En hemitórax izquierdo.

f) Estando extendido (hyosc.).

Mejoría

POR CALOR

CABEZA

Dolor de cabeza catarral con gran irritación de laringe y tráquea, y sensación de magulladura dolorosa detrás de clavículas y esternón.

Estos dolores sobrevienen durante las fases de sequedad de mucosa alternando con aquellas en que domina secreción abundante (Kent).

Aparato digestivo

ESTOMAGO :

La mucosa gástrica parece interesada como las otras.

Digiere difícilmente y sólo el alimento más liviano y simple.

Dolores sordos, constrictivos, sofocantes, en epigastrio hasta la espalda.

La ropa parece muy ajustada.

Dolores sordos en hueco de estómago que se extienden al pecho, con sensación de presión como de bola en hueco de estómago, a veces con sensación de subir hasta detrás del esternón; agravación después de comer y mejoría permaneciendo acostado muy tranquilo.

Dolor lancinante en hueco de estómago que irradia al pecho, particularmente a la izquierda, dolor sordo, o lancinante, en hueco de estómago, y arriba, de cada lado del esternón.

SE AGRAVA HABLANDO; ES CURIOSO OBSERVAR COMO SE AGRAVAN HABLANDO LOS SÍNTOMAS DE ESTÓMAGO; este parece magullado; se grava caminando, respirando aire frío; necesita cosas calientes.

ABDOMEN Y DEPOSICIONES :

Flatulencia abdominal y gástrica, con dolores, por gases; dolores aliviados por emanaciones y emisiones de gas (carb. veg.).

DIARREA parecida a sulph., podoph., y nat. sulf., en que SOBREVIENE LA MAÑANA Y ES TAN IMPERIOSA QUE OBLIGA A LEVANTARSE ENSEGUIDA PARA EVACUAR; pero es una diarrea marrón, maloliente, QUE TIENE TENDENCIA A ACOMPAÑARSE DE TOS.

Tal diarrea se encuentra a veces en tisis y rumex será muy útil.

Aparato respiratorio

NARIZ :

Coriza con sensación de obstrucción nasal y de sequedad hasta en rino-farinx.

Coriza que comienza por sensación de sequedad muy marcada en parte posterior de nariz y rino-farinx a tal punto que carraspea continuamente; irritación inflamatoria grande que no puede dejarla tranquila; sensación de mucosa como gruesa; de picoteo, comezón, desde punta de nariz hasta faringe y se suena sin cesar, estornuda y carraspea. Esta inflamación puede descender a laringe, tráquea, bronquios, y alcanzar terminaciones brónquicas, desencadenando bronquitis capilar o neumonía (Kent).

Estornudos violentos con el coriza que es fluente sobre todo al atardecer y noche, como muchos síntomas del remedio.

Coriza líquido con estornudos y dolores de cabeza, agravando al atardecer y la noche.

Acumulación de mucosidades en rino-farinx, muy difíciles de expectorar.

Secreción de mucosidades amarillas detrás de la nariz, en rino-farinx.

Epistaxis, estornudos violentos e irritación violenta de fosas nasales (Kent).

LARINGE, BRONQUIOS Y PULMONES :

Sensación de comezón e irritación de faringe y tráquea; carraspea continuamente; afonía, no puede hablar porque las cuerdas vocales están cubiertas de mucosidades tenaces que tiene gran dificultad para expectorar.

Caut. afonía por estado paralítico de cuerdas vocales; phosph. : afonía aliviada carraspeando y sacando mucosidades allí acumuladas.

Sensación de bola en garganta, no aliviada al tragar o carraspear; parece descender y desaparecer cuando traga, pero el movimiento de deglución terminado, enseguida sube (este es también un gran síntoma de lach.).

Afecciones catarrales de garganta y rino-farinx.

Este remedio muestra las fases sucesivas de un gran resfrío, pero es sobre todo indicado en los que TOMAN FRÍO CONTINUAMENTE, SE AGRAVAN AL MENOR CAMBIO DE TIEMPO, ESTÁN SIEMPRE TIRITANDO, NO ABANDONAN EL RINCÓN AL LADO DEL FUEGO, QUIEREN ESTAR MUY ABRIGADOS, AUN LA CABEZA (KENT).

Afonía después de exponerse al frío, con mucosidades tenaces en laringe y deseo continuo de carraspear.

COSQUILLEO EN EL FONDO DE LA GARGANTA QUE PROVOCA TOS; trata de luchar tanto como puede contra la tos por la sensación de ardor y desolladura que experimenta en laringe y tráquea.

TOS INCESANTE, VIOLENTA, SECA, FATIGANTE, CON POCO O NADA DE EXPECTORACIÓN.

AGRAVADA AL HABLAR, POR PRESIÓN Y SOBRE TODO AL RESPIRAR AIRE FRÍO, DE NOCHE.

(Phosph., spong.), PASANDO DE CUARTO CALIENTE A PIEZA MÁS FRÍA O AL AIRE FRÍO (bryon. y nat. carb. lo contrario).

Tos con dolor detrás del esternón.

Tos ronca, perruna, algunos instantes después de acostarse o por ataques, hacia las 23 hs. o entre 2 y 5.

Lach., tiene un síntoma similar; en él, se ve a niños, toser así durante el primer sueño, pero si se los mantiene despiertos no tosen más : esta tos corresponde a la agravación general por el sueño.

En rumex, al contrario, la tos sobreviene hacia las 23, duerma o no el niño.

Tos seca, atormentadora, impide dormir; agravada por presión, por hablar, y ESPECIALMENTE DE NOCHE, Y RESPIRANDO AIRE FRÍO; la tos se agrava, no solamente por frío; sino POR TODO LO QUE AUMENTA EL VOLUMEN O RAPIDEZ DE AIRE RESPIRANDO; debe permanecer sentado sin moverse; no puede respirar

rápido ni profundamente, ni irregularmente, porque eso provoca violentos accesos de tos con violenta sensación de ardor en laringe y tráquea.

El ataque es tan violento que lo tiene a la mañana, al despertar, al mismotiempo que la necesidad de evacuar, emitirá la evacuación involuntariamente.

También la orina corre involuntariamente durante el ataque. (caust.).

Gran sensación de ardor y escozor en laringe y tráquea.

DOLOR DE MAGULLADURA, DE DESOLLADURA DETRÁS DE CLAVÍCULAS, con sensación como si el tejido estuviera en carne viva, si a cada inspiración, el aire frío pasara por esa parte y avivara la sensación de desolladura y ardor.

Calmante precioso en tisis avanzada; ayuda a soportar un invierno más.

Con rumex, puls., senega, ars. alb., y nux v. se podrán aliviar los últimos años de un tísico.

Con respecto a la diarrea de la mayoría de casos de tisis, acet. ac. se puede recomendar; pero, a menos que sea muy marcado, vale más dejar este estado tranquilo; si tal diarrea es muy agotadora, más vale emplear un remedio simple como éste para disminuirla un poco; pero si hay sólo un poco de diarrea, una sola deposición líquida a la mañana, esto es mejor para el tísico; en cuanto a sudores nocturnos, cuanto más se trate de detener estos emuntorios naturales, de cerrar estas válvulas, más se perjudicará al enfermo, y si se llega a esto, vale más abandonar la homeopatía pues sólo se podrán calmar los sufrimientos del paciente con morfina.

Los dolores sordos, las sensaciones de magulladura, de fatiga dolorosa del tísico, se calmarán con arnica que también calmará la tos y traerá el sueño.

Mas tarde, pyrog. puede calmar dolores de huesos y accesos de tos dolorosa.

Así se lleva a tropezones, al enfermo, de un año a otro.

A veces necesita ars. alb. y generalmente hay que repetirlo más frecuentemente.

Otras, lycop. o puls.

Pero finalmente se produce la decadencia vital, y estos remedios, aún repetidos cada vez con mayor frecuencia ya no surten efecto.

Poco a poco se instala una terrible disnea, la superficie respiratoria disminuye y hay falta de aire, extremidades edematizadas, mayor adelgazamiento, facies hipocrática y fallo cardíaco, sudor frío; debilidad cada vez mayor.

Siempre se puede aliviar con tarent. cub. que provocará una eutanasia que nada tiene de comparable con los efectos de la morfina (Kent).

Piel

ERUPCIÓN CARACTERIZADA POR COMEZÓN INTENSA EN CUANTO SE DESVISTE PARA ACOSTARSE.

Es vesiculosa o parecida a urticaria simple.

PRURITO VIOLENTO EN REGIONES VARIADAS; AGRAVADO POR FRÍO; MEJORADO POR CALOR; PEOR AL DESVESTIRSE O EXPONERSE AL AIRE (hep. sulf. calc., nat. sulf., oleand.; en éste último hay más ictericia y síntomas de paludismo; si se trata de comezón general agravada por calor, sobre todo calor de la cama, pensar en merc. sol. o merc. protoiod.) (Nash).

RUTA GRAVEOLENS

Planta herbácea vivaz, familia de la Rutáceas crece en el Mediodía de Europa y Norte de África.

También se cultiva en jardines, pero la silvestre es más activa y es la que se emplea para la preparación del remedio; tiene olor fuerte, fétido, penetrante, característico.

Las diferentes dinamizaciones se preparan por diluciones hahnemannianas sucesivas, partiendo de la tintura madre obtenida por maceración en alcohol a 90º de hojas y botones floríferos recogidos un poco antes de que abran las flores.

Acción general del medicamento

Aplicada en estado fresco sobre la PIEL, irrita violentamente y determina inflamación con enrojecimiento y tumefacción y flictenas.

Ingerida y en dosis ponderables, inflama mucosa de estómago y duodeno, no tardando en producir un poco de narcotismo con agitación y excitación nerviosa y finalmente, si es una mujer encinta, irritación espasmódica de útero y expulsión de feto.

Es, para nosotros, un remedio importante, por su INFLUENCIA SOBRE TEJIDO FIBROSO, APONEUROSIS Y TENDONES, particularmente flectores (Kent).

Las MUÑECAS parecen ser uno de los principales lugares de elección en su acción sobre estos tejidos.

Tiene acción pronunciada sobre PERIOSTEO y parece actuar particularmente bien sobre él, después de haber sido lesionado por traumatismo, intervención quirúrgica.

Tiene tendencia a FORMACIÓN DE DEPÓSITOS, NUDOSIDADES, en tendones, alrededor de articulaciones y en periosteo (Nash).

Características

1) SENSACIÓN DE MAGULLADURA, FATIGA DOLOROSA, EN TODO EL CUERPO COMO DESPUÉS DE CAÍDA, PERO MAS MARCADA EN MIEMBROS Y ARTICULACIONES.

Todas las partes del cuerpo sobre las que reposa están dolorosas, como magulladas y ESTO LE HACE CAMBIAR CONTINUAMENTE DE POSICIÓN (bapt., pyrog., arnica); no tiene descanso, cambia sin cesar de posición cuando está acostado; tan agitado como rhus tox.

Modalidades

Agravación

a) POR FRÍO HÚMEDO, como rhus tox.

b) POR REPOSO; ESTANDO ACOSTADO, sobre todo los dolores.

c) HACIA LA NOCHE : tendencia a melancolía hacia la noche.

Mejoría

a) Por movimiento, siempre como rhus tox.

Síntomas mentales

Aquí no hay nada muy particular; irritable, de mal humor, descontento de los otros y de sí mismo.

También puede estar deprimido, triste, inquieto, abatido, sobre todo hacia la noche.

Ojos.

Si fatiga la musculatura del ojo leyendo caracteres demasiado finos o mal impresos, con trabajos de costura demasiado fina, si ABUSA DE LA VISTA por trabajo demasiado minucioso o prolongado, puede tener en los ojos sensación de FATIGA DOLOROSA, se ponen ROJOS, CALIENTES, ARDIENTES, con dolores de cabeza.

En tal caso, ruta grav. podrá ser de suma utilidad.

Pero hay que distinguirlo de onosmod. y arg. nit., que con nat. mur. se parecen por el dolor de cabeza por fatiga de ojos.

También hay que pensar en mang. acet.

Aparato digestivo

Muy sediento de agua fría, como phosph. (Kent).

Constipación con PROLAPSO RECTAL cuando quiere evacuar; necesidades frecuentes sin resultados con prolapso anal; salida de recto después de parto; dolores de recto estando sentado (Kent).

Prolapso de recto al tratar de evacuar, o si la deposición tiene la menor dificultad para pasar; o si lleva vida demasiado sedentaria; ruta se parece mucho a ignat. en esto; ambos se agravan al agacharse, levantar algo pesado, evacuar; mur. ac. y podoph. también deben tenerse en cuenta : con el primero, prolapso de recto muy doloroso y sensible al menor contacto, al menor tacto, hasta de la sábanas; el recto desciende también al orinar (aloe) el prolapso del segundo va casi siempre acompañado de diarrea característica y puede ser resultado de esfuerzo; también puede haber prolapso uterino.

Aparato urinario

Sensación constante en vejiga, como si estuviera llena aún después de la micción; fin de micción doloroso.

Espalda extremidades

SENSACIÓN DE FATIGA DOLOROSA EN ESPALDA.

Dolor de magulladura en vértebras lumbares.

Dolores de espalda y coxis como si se hubiera magullado por golpe o caída.

SENSACIÓN DE AGOTAMIENTO GENERAL; miembros inferiores que parecen incapaces de sostenerlo por lo débiles que le parecen caderas y muslos (phosph., conium); las piernas flaquean al levantarse de la posición sentado.

Los dolores son a menudo provocados por forzada o esguince de articulación (rhus tox.).

Dificultad para mover la muñeca o tobillo después de entorsis; al principiar arnica y pronto rhus tox., pero cuando se forman nudosidades de tendones de articulaciones lesionadas, dar ruta.

Tendones dolorosos, como magullados.

Muslos dolorosos al estirar las piernas.

Contractura de tendones flexores de manos y pies.

Dolores en tendón de AQUILES, (act. rac.).

Dolor de ciática que desciende desde espalda a caderas y muslos, soportable de día, pero agravado en cuanto se acuesta a la noche. (graph.).

Piel

Erupciones de piel con comezón que cambia de lugar cuando se rasca la región pruriginosa. (Mezer).

SABADILLA

O veratrum sabadilla, o cebadilla (de Cebada), planta herbácea vivaz

de la familia de las Colchicáceas originaria de México.

Su raíz es un rizoma tuberoso; su tallo termina en espiga de flores púrpura negruzco; fruto rojizo que se compone de 3 folículos oblongos que contienen semillas, generalmente tres, negruzcas y angulosas; pulverizadas, llevan el nombre vulgar de polvo de capucina.

El sabor de las cápsulas es algo amargo; el de la semillas acre y cáustico; son extremadamente venenosas y encierran un alcaloide, la veratrina, cuyo poder tóxico es considerable.

Para uso homeopático se emplean las semillas con sus cápsulas pulverizadas, y con ellas se obtienen las tres primeras dinimizaciones por trituración hahnemanniana.

Acción general del medicamento

Además de una influencia muy particular sobre LA MENTE en que provoca síntomas tan marcados como especiales, actúa fuertemente sobre MUCOSAS, particularmente de vías respiratorias superiores y tubo digestivo. En ciertas patogenias se han visto síntomas de PIEL bastante marcados.

Modalidades

Lateralidad

DE IZQUIERDA DE DERECHA (lach.); dolores y estados inflamatorios de garganta comienzan a la izquierda y ganan la derecha, como lach. pero en éste el calor agrava los dolores y provoca espasmos de garganta con sensación de ahogo que la hace desear bebidas frías que lo alivian y traga más fácilmente; en sabad. se alivia por calor, externo o interno (Kent).

Agravación

a) POR FRÍO : "Tirita, sensible a cuarto frío, a alimentos y bebidas fríos que agravan; quiere estar bien abrigado; quiere bebidas calientes para calentar su estómago; propenso a estados catarrales y entonces pide aire caliente, si es catarro nasal, bebidas y alimentos calientes, si es inflamación catarral de garganta; las cosas calientes lo reconfortan; dificultad para tragar cosas frías, esto aumenta sus dolores" (Kent).

b) CON LUNA LLENA.

Mejoría

POR BEBIDAS CALIENTES, ALIMENTOS CALIENTES, ESTANDO BIEN ABRIGADO.

Síntomas mentales

Presenta estado mental tan curioso como particular en sus síntomas : "Lleno de TRASTORNOS IMAGINARIOS; ideas extrañas con respecto a los demás y a sí mismo; impresiones erróneas con respecto a estado de su cuerpo; por ej. : imagina que su cuerpo se marchita, que sus miembros están retorcidos o encogidos, que su mentón se ha alargado, que está más gordo de un lado que del otro; aunque pueda ver que todo esto no es verdad, está persuadido de que así es; convencido de que tiene una espantosa enfermedad de garganta cuyo fin será fatal; imagina estar encinta cuando sólo está hinchada por gases.

Todo esto no es fundado : son enfermedades imaginarias, sin embargo sufren vez más que si fuera real.

Aquí, pueden compararse algunos remedios : thuya, imagina que su cuerpo es de vidrio y tiene miedo terrible de que se rompa; puls. : gran temor de la mujer que cree perderá su alma; anacard. : cree tener un diablo sentado sobre el hombro, que le habla al oído, mientras en el otro un ángel parece a su vez hablarle, y no sabe a cual escuchar; iod. : lleno de ideas fijas, etc.

Delirio por intermitencia.

Gran disposición a dormir de día; se duerme leyendo, pensando, reflexionando; el esfuerzo mental, que aumenta el dolor de cabeza, provoca sueño; reflexionando, sentado en su sillón, se duerme como nux mosch. y phosph. ac. (Kent).

Cabeza

Puede estar cubierta de sudor frío : muchos síntomas de ver. alb.

están estrechamente ligados, particularmente el sudor frío en la frente, que también acompaña muchos trastornos para los que es apropiado.

Muchos DOLORES DE CABEZA.

A menudo se levanta a la mañana con dolor de cabeza que aumenta.

Dolor de cabeza unilateral.

Meditación, esfuerzo mental, que lo impulsan al sueño, provocan dolor de cabeza.

Dolores de cabeza en escolares; niños débiles que deben suspender la escuela por sus dolores de cabeza y regresan a casa con toda clase de imaginaciones raras con respecto a la escuela y a sí mismo.

Dolor de cabeza estupefactivo, dolor en senos frontales, sobre los ojos, asociado a coriza.

Cefalalgia estupefactiva asociada a coriza; sensación de plétora, estallido, embriecimiento, agravado por sacudidas, estornudos, caminar (Kent).

Vértigos, aturdimientos; despierta de noche con vértigo; vértigo al aire libre, en cualquier ocasión (Kent).

Aparato digestivo

BOCA Y GARGANTA :

Sequedad de garganta; sensación como si tuviera una astilla en la garganta que lo obliga a esfuerzos para tragar; aspereza y picazón de garganta con necesidad de tragar.

Todo más marcado a la izquierda, o va de izquierda a derecha (lach.) y se alivia por bebidas calientes.

ESTOMAGO :

Gran deseo de bebidas y alimentos calientes.

Apetito extraño, generalmente en mujeres encintas ; dicen que no tienen hambre hasta que tienen aversión por los alimentos, verdadero asco por todo lo que se les ofrece; pero si, al hacerlas razonar consienten en tomar un bocado, encuentran que está rico y el apetito vuelve y hacen una buena comida (Kent).

Asco por todo alimento, carne, alimentos agrios, café, ajo.

Hambre mórbida o aversión por los alimentos.

Deseo violento de cosas dulces y farináceas.

Pirosis; salivación copiosa; vómitos de vermes.

ABDOMEN Y DEPOSICIONES :

Cólicos; retortijones con dolores como por hojas de cuchillo.

Dolores ardientes de abdomen.

Diarrea; deposiciones marrones y como fermentadas.

Hormigueo pruriginoso en recto y ano.

Gran remedio contra VERMES INTESTINALES, particularmente oxiuros.

Órganos genitales

Reglas tardías, algo antes de su aparición, sensación dolorosa de tirones hacia abajo, en útero.

Reglas disminuidas, que corren irregularmente, caprichosamente, con fuerzao poco marcadas; reglas intermitentes (puls., kreosot.).

Dolores cortantes, como por cuchillo, en ovario.

Ninfomanía provocada por vermes.

Aparato respiratorio

Coriza con ESTORNUDOS CONTINUOS y sensación como si la mucosa nasal estuviera en carne viva; sensación de ardor y obstrucción en nariz.

Secreción de mucosidades líquidas primero, enseguida espesas, mejora respirandoaire caliente, el olor a flores lo agrava; al sólo pensar en el olor de flores, estornuda y la secreción de coriza aumenta.

El estornudo es un gran síntoma de irritación de mucosa nasal de sabad.

Útil cuando el estado catarral de mucosa nasal se prolonga, en casosde coriza persistente que no cede a remedios habituales; en coriza prolongados cuya secreción aumenta por el olor de flores (Kent).

En "HAY-FEWER", cuando hay ATAQUES DE ESTORNUDOS ESPASMÓDICOS; aunquea veces hay secreción marcada, nariz con sensación de obstrucción y respiración difícil; y violenta comezón en fosas nasales, fuertes dolores en raíz de nariz y frente, enrojecimiento de párpados y gran sensibilidad a olor de flores y ajo que aumenta estornudos.

Comparar esto con algunos medicamentos, en resfío de heno : en ciertos casos,comezón muy marcada de velo de paladar, tal que está obligado a frotarlo con la lengua, todo con coriza y estornudos, etc.; wyethia detendrá esto.

Cuando la comezón se extiende a laringe y tráquea, con gran irritabilidady sensibilidad al frío, nux v.

Cuando la secreción es tan irritante y con tanto escozor que labio superiory fosas nasales están rojos e inflamados, ars. alb.

Si hay nariz suave, euphras.; all. cepa, lo contrario : secreción suave porojos e irritante por nariz.

Piel

SECA, como pergamino.

Sensación de calor, ardor; hormigueo.

Carne de gallina.

Relaciones

Antídotos

Puls., lycop., conium., lach.

SABINA

Juniperus sabina, o sabina, arbusto de la familia de las Coníferas, crece en colinas áridas del Mediodía de Europa, Italia, España, Grecia; se cultiva como planta ornamental.

Se conocen dos clases : una alta de 3 a 4 metros, sabina macho, o con hojasde ciprés; otra más pequeña, sabina hembra, o con hojas de tamarindo.

Para uso homeopático se usan indistintamente hojas de sabina machoo hembra recogidas en primavera, para preparar la tintura madre de la que se obtienen las diversas dinamizaciones por diluciones hahnemannianas sucesivas.

Acción general del medicamento

Tiene acción generalmente limitada a RIÑONES, VEJIGA, PARTE TERMINAL DE TUBO DIGESTIVO-RECTO y ANO-, Y SOBRE TODO ÚTERO; provoca profundo desorden en su sistema circulatorio, con TENDENCIA NETA A SANGRAR que ocupa un primer lugar entre los indicados contra pérdidas sanguíneas de esas regiones.

Actúa sobre SEROSAS ARTICULARES y es de gran indicación en ciertasformas de gota.

Características

1) METRORRAGIA CON FLUJO PAROXISTICO DE SANGRE CLARA, LÍMPIDA, CON DOLORES EN ARTICULACIONES.

Amenaza de aborto en el 3er. mes de embarazo.

CON DOLORES EN BASE DE RIÑONES QUE VAN HASTA MUSLOS; SENSACIÓN DE MAGULLADURA, ROTURA, A LO LARGO DE CARA ANTERIOR DE MUSLOS.

Metrorragia con las siguientes características : la hemorragia tiene tendencia a producirse POR PAROXISMOS; se AGRAVA POR EL MENOR MOVIMIENTO (secale), sangre fluida que se COAGULA ENSEGUIDA, u oscura (kali nit., cyclam.), y EN COÁGULOS (crocus) o en PARTE COÁGULOS EN PARTE LIQUIDA (ferrum), éstos son muy negros.

Parece consecuencia de pérdida de tonicidad de útero (cauloph.) después de parto o aborto, con dolores que van DE ESPALDA A PUBIS; este dolor es su gran característica y se ve no solamente en hemorragias sino también en amenazas de aborto y trastornos menstruales, en que está indicado.

Como puls., se AGRAVA POR AIRE CALIENTE, EN CUARTO CALIENTE, MEJORA EN HABITACIÓN FRESCA, AL AIRE LIBRE; esto se ve a veces con reglas muy profusas : en este caso no habría que dar puls. que aumentaría el flujo menstrual.

Respecto al dolor característico de sabina en el aborto su modalidad de dirección de espalda a pubis, no debe confundirse con vib. opul. que comienza en espalda, irradia alrededor y termina en calambres de útero.

2) HINCHAZÓN ARTRÍTICA DE ARTICULACIONES DE MUÑECA Y DEDOS GRANDES DE PIE.

GOTA CON DOLOR ARTRÍTICOS : estado que alterna con hemorragia ; cuando sufre de gota, no hay hemorragia; cuando empieza a sangrar, la gota desaparece (Kent).

Modalidades

Agravación

a) AL AIRE CALIENTE, POR CALOR, EN CUARTO CALIENTE (puls., apis).

Se siente incómodo en cuarto caliente, estando abrigado; desea tener ventanas abiertas o estar al aire libre.

b) POR EL MENOR MOVIMIENTO.

Mejoría

AL AIRE FRÍO, AL AIRE FRESCO, AL AIRE LIBRE.

Síntomas mentales

LA MÚSICA LE ES INSOPORTABLE; determina agitación nerviosa (nat. carb.), especie de desfallecimiento nervioso, sensación extraña, como vibración, a lo largo de médula ósea (thuya : La música da ganas de llorar).

Cabeza

Vértigo con supresión de reglas.

Flujo de sangre a cabeza y cara.

Dolor tironeante en músculos maseter.

Aparato digestivo

Sensación de plenitud en ano con HEMORROIDES Y PERDIDAS ABUNDANTES DE SANGRE ROJA, BRILLANTE.

Constipación con hemorroides que sangran copiosamente y sensación de plétora en ano.

Aparato urinario

Dolores ardientes, SENSACIÓN DE ARDOR Y LATIDOS EN REGIÓN RENAL.

Grandes sufrimientos en aparato urinario, con síntomas inflamatorios; ORINAS ANGUINOLIENTAS CON NECESIDAD CONTINUA DE ORINAR Y SENSACIÓN DE PULSACIONES, LATIDOS, EN TODO EL CUERPO; AGRAVACIÓN GENERAL POR CALOR (Kent).

Retención de orina con emisión ardiente que corre gota a gota alternada con emisión de orina abundante (Jousset).

Órganos genitales

MASCULINOS :

Inflamación dolorosa de uretra con secreción de pus.

Útil en casos de inflamación gonorréica de uretra con secreción como pus.

Dolores de glándula que está roja oscura y retracción de prepucio difícil (fimosi).

Induración de dorso de verga.

Exaltación de apetito venéreo, en los dos sexos.

FEMENINOS :

Este es su radio de acción más importante; sus síntomas se relacionan con trastornos de menstruación asociados a hemorragias uterinas (Kent).

REGLAS PROFUSAS, DEMASIADO PRECOCES, DURAN DEMASIADO; DE SANGRE EN PARTE LIQUIDA, ROJO BRILLANTE, EN PARTE COAGULADA (ferr.); en niñas que se desarrollan demasiado pronto; la sangre corre por paroxismos CON CÓLICOS COMO DE PARTO; DOLOR DE SACRO A PUBIS.

Reglas que duran demasiado, demasiado abundantes, y a veces la secreción no cesa, se prolonga hasta el período siguiente; reglas demasiado abundantes, demasiado prolongadas, demasiado frecuentes; secreción líquida, rojo vivo, mezclada con coágulos.

Con dolores tironeantes de arriba a abajo, cólicos como de parto y dolor violento de atrás a adelante, de sacro pubis o útero y muslos; dolores lancinantes como cuchillada que escuecen, suben a lo largo de vagina, hasta útero arrancando a veces con cada punzada, gritos a la enferma : estos dos rasgos, dolores lancinantes de atrás a adelante, de sacro pubis, y de abajo a arriba, en vagina, son confirmación marcada de su indicación (Kent).

Útil cuando, durante un período menstrual, la secreción disminuye, cesa durante algún tiempo; sobrevienen cólicos como de parto y emite un enorme coágulo semi descompuesto y vuelve la secreción abundante de sangre rojo vivo (Kent).

Hemorragias uterinas abundantes con cólicos uterinos.

Dolores constrictivos parecidos a los de parto, y que se extienden de espaldas pubis con gran deseo de orinar; emisión dolorosa de grandes coágulos, luego de sangre rojo vivo, en chorros.

Aquí se puede comparar a ipeca que tiene violenta hemorragia uterina de sangrerujo vivo tan abundante como sabina; pero en ipeca, desde el principio de la hemorragia, antes de que sea bastante abundante y prolongada como para provocar por agotamiento sanguíneo tales síntomas, la cara se pone pálida, hay náuseas y estado sincopal demasiado precoz para ser consecuencia secundaria de hemorragia, y que es el síndrome patogenético del remedio.

Millef. : secreción continua, gota a gota, durante días y días, de sangrerujo vivo.

Secale : se parece a sabina pero su secreción es de sangre oscura, maloliente, coagula difícilmente, casi acuosa al cabo de cierto tiempo, abundante y continua, como si el útero no pudiera ya contraerse; mejora por frío.

Phosph. : se parece un poco a sabina : secreción abundante de sangre rojo vivo con o sin coágulos; lo que lo indica es su facies, lengua seca, con sed violenta, inextinguible, de agua helada (Kent).

ABORTO O PARTO PREMATURO; HEMORRAGIA UTERINA DE SANGRE EN PARTEROJO-CLARO Y EN PARTE EN COÁGULOS, AGRAVADA POR EL MENOR MOVIMIENTO (secale), A MENUDO ALIVIADA POR CAMINAR Y CON DOLORES QUE SE EXTIENDEN DE SACRO A PUBIS (Allen).

Bell. Y sabina son los dos más importantes en aborto de 3er mes; ambos tienen los mismos dolores de expulsión para eliminar un gran coágulo, luego viene un flujo abundante de sangre rojo vivo; pero el estado de bell. no se parece a sabina.

En bell. hay hiperestesia nerviosa extremadamente marcada al tacto, sacudidas, etc.

El menor golpe dado por la enfermera a la cama le es insoportable; la sangre de hemorragia es caliente, pero demasiado caliente para la piel hipersensible sobre la que corre; es hipersensible a la luz, etc.

Hay muchos dolores, no solamente lancinantes de abajo a arriba, sino en todos sentidos; vienen y se van bruscamente, como relámpagos, aparecen e irradian en todas direcciones (Kent).

RETENCIÓN PLACENTARIA CON ATONÍA UTERINA; INTENSOS DOLORES DESPUÉS DEL PARTO (cauloph., secale).

La atonía uterina es uno de sus rasgos salientes; el útero no quiere contraerse a menos que sea excitado por la presencia de un coágulo en su cavidad (Kent).

Provoca expulsión de molas.

Secreción de sangre entre períodos menstruales con excitación sexual marcada (ambra).

Menorragia en menopausia en mujeres que han tenido numerosos abortos, o en niñas, en primeras reglas prematuras.

En viejas hemorragias uterinas con pérdidas que no terminan, molestas, que recomienzan a la menor provocación, detendrá la sangre, pero su acción no será de larga duración y la hemorragia volverá.

Si se quiere curar a la enferma, hay que darle un remedio constitucional : sulf. será a menudo el indicado (Kent).

Inflamación de ovarios o útero de aborto o parto prematuro.

Catarro crónico de vagina con granulaciones, leucorrea abundante, sanguinolenta : es útil cuando esto está ligado a leucorrea.

Excrecencias verrugosas en coliflor en labios o ano (thuya).

Verrugas con prurito intolerable y sensación de ardor; verrugas excoriantes (thuya, nit. ac.).

Espalda extremidades

DOLOR DE SACRO A PUBIS, DE UN HUESO A OTRO.

Dolores gotosos de articulaciones; nudosidades gotosas en articulaciones (amm. phosph.); arden tanto y están tan calientes que obligan a sacar manos y pies de la cama, de noche, si las articulaciones de esas regiones son alcanzadas.

Indicado en casos de gota en que los dolores alternan con hemorragias.

Relaciones

Complementarios

De thuya.

Antídotos

Puls.

SANGUINARIA

Sanguinaria canadensis o sanguinaria de Canadá, planta herbácea de la familia de las papaveráceas, crece en selvas de Estados Unidos y Canadá; se cultiva en jardines.

El nombre viene del jugo rojo como sangre que corre de su raíz al cortarla.

Para la tintura madre con la cual se obtiene, por diluciones hahnemannianas sucesivas, las diversas dinamizaciones, se hace macerar en alcohol a 90º la raíz, antes de que las hojas se desarrollen.

Acción general del medicamento

Actúa fuertemente sobre MUCOSAS A LAS QUE IRRITA violentamente, causando primero EXTREMA SEQUEDAZ, ya sea conjuntiva, bucal, de tubo digestivo o vías respiratorias o cualquier otra región.

Alternan con esta sequedad SENSACIÓN DE AVIVAMIENTO, ARDOR, como si las mucosas estuvieran desprovistas de epitelio.

Otro efecto sobre mucosas es formación de PÓLIPOS que sangran de manera prolongada y profusa (Farrington). TRASTORNOS VASO MOTORES caracterizados por enrojecimiento circunscripto de mejillas, TUFARADAS DE CALOR, AFLUJO DE SANGRE a cabeza y pecho, distensión de temporales Y SENSACIÓN DE ARDOR EN PALMAS DE MANOS Y PLANTA DE PIES.

No tiene acción profunda y larga.

Si se interrumpe una jaqueca periódica con sang., esta cura será momentánea y el dolor de cabeza volverá, a menos que se produzca una metástasis más grave, si no se da en el intervalo otro remedio de acción más profunda, constitucional.

Un enfermo muy debilitado por catarro de bronquios que dura largo tiempo y se hace sospechoso; toma frío al menor cambio de tiempo, si se expone a humedad, por la más pequeña corriente de aire, si se desabriga sensación de ardor de pecho, detrás de esternón, expectoración espesa, filamentosas, accesos de tos espasmódica que terminan en eructos; si se agrega a esta sensación de ardor de pecho, a dolores de laringe al hablar y de tráquea, a tos que termina en eructos, sensación de ardor en palma de manos y planta de pies.

Sang. atenuará el dolor y curará momentáneamente; muchos de estos casos son tratados con sulph., pero erróneamente.

Hay una serie de medicamentos que convienen más a estos estados tuberculosos que sulph., silic., o graph. : son puls., sang., senec. grac., cocc. cact., que atenúan este estado y puede traer mejoría tal del estado general que se puede dar un medicamento de acción profunda.

Hay que evitar esto si la vitalidad está muy disminuida, el organismo muy deteriorado por tratar de repararlo violentamente.

Hahnemann ha prevenido contra el empleo de phosph. en estos casos; sang. de acción superficial, procura sin inconvenientes, gran alivio (Kent).

Características

No presenta ningún "Keynote"; pero en su patogenesia se encuentran algunos síntomas generales bastante acusados.

1) GRAN DEBILIDAD Y POSTRACIÓN : Con el dolor de cabeza y muchos de sus síntomas hay sensación de debilidad, falta de fuerzas, desfallecimiento, con sensación de vacío de estómago, de falsa hambre; que en realidad es falsa hambre pues sang. tiene verdadera aversión por el alimento (Kent).

Debilidad y desfallecimiento; gran debilidad; sobre todo durante y después de los vómitos, o gran debilidad de piernas, de noche, al pasear al aire libre (Jahr).

2) TUFARADAS DE CALOR Y TRASTORNOS VASO MOTORES : GRAN SENSACIÓN DE CALOR ARDIENTE EN PALMAS DE MANOS Y PLANTA DE PIES, QUE A VECES OBLIGA A SALIR DEL LECHO DE NOCHE, COMO sulph.

3) ACRTUD DE SECRECIONES Y DOLORS ARDIENTES : Son otro trazo saliente que se ve a lo largo de su patogenesia.

4) VARIABILIDAD CONTINUA DE SÍNTOMAS : El enfermo sufre, y a de jaqueca, síntomas de pecho, diarrea, constipación, etc.

Modalidades

Lateralidad

DERECHA : se adapta principalmente a trastornos orgánicos predominantes del lado derecho.

Agravación

a) Estando acostado sobre la derecha.

b) De noche.

c) Por tacto, movimiento.

d) Por ruido.

Mejoría

a) Por sueño, oscuridad.

b) Por aire frío.

c) Por ácidos.

Síntomas mentales

ANSIEDAD casi siempre presente en sang.; aparece dando calificación a dolores de cabeza, trastornos gástricos, síntomas de pecho o aparato circulatorio; INQUIETUD, de noche, gran aprensión que impide quedarse en cama; GRAN AGITACIÓN, no puede estar largo tiempo en la misma posición.

Gran IRRITABILIDAD DE CARÁCTER, que lo hace fúnebre, de mal humor, irritable, fácilmente excitable; GRAN SENSIBILIDAD MORAL : la menor contrariedad aumenta todos sus sufrimientos.

La fatiga general se manifiesta aquí por TORPEZA MENTAL; FATIGA CEREBRAL FÁCIL; no puede concentrar su mente largo tiempo; tiene fácilmente ideas confusas; memoria débil; olvida palabras y cifras al escribir.

En ciertos casos de delirio vago y consciente, delirio de persecución.

Temor enfermizo de ser envenenado, a veces con impulso ansioso al suicidio.

Sueño

Mucha dificultad para dormirse en la primera parte de la noche; insomnio antes de medianoche.

Más tarde, sueño agitado, no reparador; este sueño es tan ligero quedesperta al menor ruido, como sulph.; a veces despierta sobresaltado como si fuera a caer.

Cabeza

Es uno de sus principales puntos de elección en su acción.

Dolor de cabeza nauseoso; sufre de aflujo de sangre a la cabeza que causadesfallecimiento y estado nauseoso marcado que llega a vómitos; LOS DOLORES, DE CARÁCTER LATENTE, EN TODO CASO AGUDO, LANCINANTES, COMIENZAN EN REGIÓN OCCIPITAL, SE EXTIENDEN A LA CABEZA PARA FIJARSE FINALMENTE EN REGIÓN SUPRA ORBITAL, GENERALMENTE DERECHA (ojo izquierdo spig.); en el momento de la crisis, no puede soportar olores, ni que caminen en la pieza donde está, el menor crujido le es insoportable; vomita a menudo en ese momento alimentos y bilis.

Debe estar acostado en habitación oscura y sólo tiene sosiego cuando el sueño viene a aliviarlo; a veces el dolor es tan violento que pierde la cabeza o busca alivio apretando fuertemente su cabeza con las manos o hundiéndola en su almohada.

Comparar aquí bell. : intolerancia a luz y ruido y localización particular derecha.

Pero bell. tiene casi siempre pies fríos y cabeza caliente lo que no siempre está presente en sang.; el enfermo de bell. no se alivia acostándose, sino sentándose en su lecho; no sigue necesariamente la dirección del desarrollo de los dolores de sang., que comienzan en occipicio para ganar la región supra orbitaria derecha, dirección imperativa en sang.; sang. es más útil que bell. en forma gástrica de la jaqueca.

Mell. alba. : violento dolor de cabeza con congestión intensa; le parece que el cerebro va a estallar a través de la frente y el dolor latente es casi tan violento como en glon. llevando casi hasta el furor el enfermo.

Iris vers. : jaquecas periódicas, principalmente las que sobrevienen en domingo, porque el esfuerzo de seis días de trabajo precedente ha cesado y el paciente que siente los efectos de ese esfuerzo sufre la jaqueca; dolores intensos, de carácter latente; supra orbitarios, afectan las dos regiones por encima de los dos ojos, causando a veces ceguera temporaria; en el máximo del dolor de cabeza puede haber vómitos de materia amarga o agria o ambas (Farrington). Ver act. rac.

Dolor de cabeza con estado congestivo; aunque comience a la mañana, sube desde el occipicio para fijarse sobre el ojo derecho, cabeza caliente y dolorosa.

Pulsaciones en cabeza con vómitos amargos, agravadas por movimiento; pero esta agravación no es tan acusada como en bryon.

Dolor de cabeza como si la frente fuera a estallar con escalofríos y ardor de estómago.

Dolor de cabeza arriba del ojo derecho.

Dolor de cabeza periódico con vómitos, comienza a la mañana, aumenta en el día y dura hasta la noche, la cabeza da sensación de querer estallar o como si los ojos quisieran salir de las órbitas; latidos dolorosos lancinantes a través del cerebro, peores a la derecha, sobre todo en frente y vértex, con escalofríos, náuseas, vómitos alimenticios o biliosos, está obligado a acostarse, estar tranquilo; mejora por sueño; luz, ruido, movimiento lo agravan (Kent).

Dolor de cabeza persistente de salida a puesta de sol (gels., glon., nat. mur., spig.).

No se encuentran todos estos síntomas en cada caso, pero todos contribuyen a describir el dolor de cabeza de sang. (Kent).

DOLOR DE CABEZA PERIÓDICO, comienzan de mañana, aumenta durante el día y disminuye a la noche; dolor de cabeza periódico QUE SOBREVIENE CADA 7 DÍAS, comienza de mañana cuando despierta, o lo despierta un dolor occipital que sube poco a poco hasta el vértice de la cabeza, para fijarse sobre ojo derecho o temporal derecho; se agrava de día por luz, a tal punto que busca una pieza oscura donde acostarse porque el movimiento también lo agrava; LOS DOLORES DE CABEZA SE ALIVIAN EXPULSANDO GASES.

Sulph., silic. también tienen dolores de cabeza periódicos cada 7 días; esto no quiere decir que no pueden curar otros dolores de cabeza; sang. por ej., tiene dolor de cabeza que vuelve cada 3 días.

La mayoría de dolores de cabeza que sobrevienen cada 15 días, son curados por ars. alb., o al menos aliviados, sobre todo en sujetos debilitados (Kent).

Dolor de cabeza por desarreglo de estómago, después de comer mucho o alimentos muy pesados o bebido vino; sang. es casi tan inútil como nux. v., en viejos bebedores; sujetos que han arruinado su estómago y destruido su buena digestión bebiendo demasiada cerveza; no puede ya comer, ningún alimento o líquido puede quedar en su estómago, vomitan hasta una cucharada de agua; dolores de cabeza asociados a esos trastornos, o a diarrea (Kent). Vértigo al girar rápidamente la cabeza o levantar los ojos.

Ojos

Sequedad ardiente de ojos; sensación como si tuviera cabellos bajo los párpados.

Sensación de ardor con lagrimeo de ojo derecho que está doloroso al tacto, seguido de coriza.

Neuralgia en y sobre el ojo.

Dilatación pupilar.

Oídos

Calor ardiente de oídos con enrojecimiento circunscripto en mejillas.

Enrojecimiento de oído externo con zumbidos y tintineos por congestión sanguínea.

Hyperexcitación de nervio auditivo; sensibilidad dolorosa particularmente a ruidos súbitos; sensación como si estuviera en un vagón que hiciera ruido como un tren en marcha, como si todas las personas que lo rodeasen hablasen rápido y confusamente, desea que lo sostengan para disminuir esta sensación nerviosa vibratoria que repercute a través de su cuerpo; esto es común en mujeres en la menopausia, sang. en este caso se parece a glon.; el deseo de estar sostenido recuerda a gels. que tiene trastornos cardíacos con temblores en todo el cuerpo y desea que lo sostengan para aliviarse (Farrington).

Cara

ENROJECIMIENTO CIRCUNSCRIPTO DE MEJILLAS CON SENSACIÓN DE CALOR ARDIENTE EN OÍDOS.

TUFARADAS DE CALOR EN CARA.

Hinchazón de cara con enrojecimiento marcado y sensación de rigidez.

NEURALGIA FACIAL mejorada arrodillándose y apretando fuertemente la cabeza contra el piso; dolor que irradia de maxilar superior en todas direcciones; sensación de plenitud y dolorimiento detrás de ángulo maxilar inferior.

Aparato digestivo

BOCA :

Sensación de sequedad ardiente de labios.

Lengua roja, arde como si tocara algo caliente (Kent).

Sensación de sequedad y excoiación de lengua.

Hormigueos y pinchazos en lengua.

Lengua cargada de capa blanca.

Odontalgia agravada por agua fría y mejorada por bebidas calientes.

Dientes flojos.

LARINGE Y ESÓFAGO :

La garganta parece en carne viva.

Deglución difícil; sensación al tragar como de sofocación, por hinchazón de mucosa de garganta.

SENSACIÓN DE ARDOR EN FARINGE Y A LO LARGO DE ESÓFAGO desde boca y paladar.

SENSACIÓN DE CALOR ARDIENTE en garganta, mejorada aspirando aire frío; garganta seca que la mucosa da sensación de querer rasgarse.

Esta sensación de ardor y desolladura se aplica a cualquier mucosa interesada por la acción del remedio (Kent).

ESTÓMAGO :

GRAN SED, FALTA DE APETITO.

SENSACIÓN DE FALSA HAMBRE, sensación de vacío, desfallecimiento en boca de estómago, pero no es hambre verdadera, pues tiene **AVERSIÓN POR LOS ALIMENTOS** y el pensamiento y olor de náuseas.

Esta sensación de falsa hambre acompaña a menudo los dolores de cabeza, "**DOLORES DE CABEZA CON HAMBRE**" que recuerdan a psorin. O phosph., pero uno y otro, psorin. sobre todo, tienen hambre real, deben comer y no se pueden saciar.

Deseo de platos condimentados.

Aversión por manteca.

Náuseas con salivación abundante.

VÓMITOS DE LÍQUIDOS ÁCIDOS, ARDIENTES que desuelan garganta y boca (Kent).

Vómitos que no alivian las náuseas.

SENSACIÓN DE ARDOR DE ESTÓMAGO, esófago, abdomen, con toda clase de desarreglos de estómago.

ABDOMEN Y DEPOSICIONES :

Cólicos ardientes en abdomen.

Hinchazón abdominal con emisión frecuente de gases.

Sensación de plétora, contusión, dolores en región del hígado; trastornos biliares; el hígado parece fabricar mucha bilis, y esto va acompañado de catarro gastro duodenal : la bilis parece subir al estómago y es vomitada en forma de líquido verdoso o amarillo, muy amargo.

En un enfermo crónico de sang. hay durante una semana desarreglos de estómago con vómitos biliosos, mucha flatulencia, eructos ardientes, agrios, constipación; luego todo desaparece y sobreviene diarrea con deposiciones extremadamente abundantes, líquidas, biliosas : nat. sulph., sang., puls., lycop., curan estas alternativas de diarrea y constipación (Kent).

Constipación con deseos ineficaces de evacuar y sensación de gruesa masa en recto.

Diarrea con deposiciones biliosas, acuosas, precedidas de cólicos y con copiosa emisión de gases.

DIARREA POR SUPRESIÓN BRUSCA DE CATARRO DE VÍAS RESPIRATORIAS.

Órganos genitales

Reglas adelantadas, abundantes, de sangre oscura mezclada con coágulos, irritantes y de mal olor.

Flujo menstrual rojo brillante, con coágulos, fétido, luego se hace oscuro y pierde su fetidez.

Reglas abundantes con dolor de cabeza supra orbitario sobre todo ala derecha.

Para cefalea durante reglas, comparar con : act. rac. : dolores de cabezalatentes.

Alum., calc. carb., calc. veg., croc. sat. : latidos dolorosos en cabeza en el momento de las reglas con sensación como si el aire frío pasara a través de los ojos; cyclam. : reglas irregulares con jaquecas y sensación de encandilamiento con puntos, manchas brillantes delante de ojos.

Glon. : reglas que se detienen bruscamente y reemplazadas por dolor de cabeza congestivo o dolor de cabeza congestivo en lugar de reglas; graph., ignat., lach., lycop., magn. carb.; nat. mur. : dolor de cabeza como si mil pequeños martillos golpearan su cabeza, marcado entre salida y puesta de sol y durante reglas, como si fuera resultado de pérdida de sangre; nat. sulph.; nux. v.; phosph.; platina; puls.; sepia : cefalea congestiva en el momento de las reglas cuando la secreción es poco abundante : sulph. : dolor de cabeza antes de reglas.

Ver. alb.; ustil. : dolor de cabeza nervioso con irregularidades menstruales.

Metrorragias de menopausia de sangre rojo brillante, con coágulos ya menudo fétidas; con jaqueca característica, aflujo de sangre a la cara que se pone escarlata y este color vivo desaparece cuando sobreviene sudor y sensación de desfallecimiento.

Se puede aquí comparar con : glon., lach., y nitr. de amilo. (Farrington).

Amenorrea con tufaradas de calor, palpitaciones, dolores neurálgicos en temporal derecho y dolores abdominales como si las reglas estuvieran por aparecer.

Sensibilidad e hinchazón dolorosa de senos en menopausia.

Pólipos uterinos.

Fisometria. (bromium, lycop., phosph. ac.).

Aparato respiratorio

NARIZ :

Coriza fluente, corrosivo, excoriente; sensación de ardor de nariz como en carne viva, fosas nasales excoriadas; todas las secreciones son excoriantes; mucosidades irritantes se forman en rino farinx provocando ardor de garganta. Hipersensibilidad tal a olores que puede provocar desvanecimiento; sensible a perfume de flores, "resfrío de rosas"; asma de heno con violenta sensación, en nariz, de ardor y sequedad, como si la mucosa se fuera a rasgar; también en garganta.

Ozena con secreción abundante, amarilla, muy irritante.

Pólipos de nariz, que sangran fácilmente (calc. ost., kali nitr., phosph., teucr. marum, etc.).

LARINGE Y TRAQUEA :

Inflamación y sensibilidad de laringe; sensación de sequedad y ardor de laringe con ronquera; sensación de cosquilleo que se extiende atrás de esternón.

Sensación de sequedad crónica de garganta, hinchazón de laringe con expectoración de mucosidades espesas, sensación de ardor y escozor.

Tos espasmódica, coqueluchoidea, peor de noche, con diarrea; tos violenta después de coqueluche, con caracteres espasmódicos de ataques de coqueluche; un adulto toma frío y tiene tos espasmódica, como coqueluche, dice que proviene del estómago, porque al mismo tiempo hace esfuerzos para vomitar; al mismo tiempo, sensación de ardor y diarrea (Kent).

Tos seca, espasmódica, penosa, agotadora, sobre todo en niños, acostándose, de noche, al entrar en habitación fría para dormir; sensación de despellejamiento en tráquea y bronquios (Kent).

Sensación de ardor y desolladura en tráquea; "un enfermo se acuesta con enfriamiento; tiene gran sensación de ardor de pecho, tos violenta, cada acceso provoca en tráquea y bifurcación de gruesos bronquios, sensación dolorosa de desolladura como si tuviera un cuchillo que lo desgarrar y después de la tos, numerosos y ruidosos eructos; esputos rosados y síntomas de congestión pulmonar : este conjunto no se encuentra en ningún otro remedio". (Kent).

PULMONES :

SENSACIÓN DE ARDOR DE PECHO, TOS SECA, JADEANTE Y SENSACIÓN DE GRAN SEQUEDAZ AL PASO DEL AIRE.

Sensación de ardor de pecho como de secreción caliente que desciende de pecho a abdomen.

TOS VIOLENTA, CONTINUA, CON O SIN EXPECTORACIÓN, CON

ENROJECIMIENTO CIRCUNSCRIPTO A MEJILLAS Y DOLOR EN PECHO, tos seca y sacudida, peor de noche cuando está acostado, y obliga a sentarse en su lecho; tos cargada, esputos color jugo de ciruelas secas o de óxido, adherentes, difíciles de expectorar, ofensivos; tos gruesa con esputos que huelen mal lo mismo que el aliento y este olor es tan objetivo como subjetivo.

Esputos herrumbrosos, viscosos, adherentes (bryon., phosph., squilla).

Gran DISNEA con sensación de constricción de pecho; asma asociada a desórdenes gástricos, como nux v.

Puntadas agudas en lado derecho del pecho, cerca del pezón.

CONGESTIÓN PULMONAR particularmente lado derecho del pecho que parece estar bajo la influencia del remedio, con enrojecimiento circunscripto a mejillas, como en fiebre hética, fiebre elevada.

Sang. puede compararse aquí a ver. vir. : que tiene el mismo estado congestivo de pulmón con gran intensidad se síntomas; pero tiene más excitación arterial; si se da antes que la hepatización se produzca, apacigua pulso, reduce congestión y modifica marcha de enfermedad; cuando la hepatización está francamente instalada, ya no está indicado; a phosph., ant. tart., etc.

Sulph., se parece a sang. en el estado de resolución cuando el pulmón no puede llegar a liberarse, los esputos se hacen purulentos; en este caso sang. es preferible si los esputos son extremadamente fétidos.

Hemoptisis por supresión de reglas. (phosph., bryon., etc.) Sang. es TUBERCULOSIS FLORIDA.

Aparato circulatorio

Palpitaciones de corazón con sensación de desfallecimiento.

Irregularidades de latidos del corazón.

Pulso lento, débil, irregular.

Trastornos circulatorios vaso motores.

Espalda y extremidades

Dolor de nuca y cuello, particularmente derecho; con rigidez, no puede darse vuelta en su lecho; el dolor corre a lo largo del cuello y va hasta DELTOIDES Y HOMBRO.

DOLORES REUMÁTICOS EN HOMBRO, AL PUNTO QUE NO PUEDE LEVANTAR LOS BRAZOS Y TODOS LOS MÚSCULOS DE HOMBRO Y CUELLO ESTÁN TOMADOS; si el dolor sobreviene de día, aumenta de noche; todos los síntomas se agravan de noche.

Dolores agudos, lancinantes, con hipersensibilidad y entumecimiento muscular; REUMATISMO DE DELTOIDE DERECHO (de deltoide izquierdo ferr. met.); REUMATISMO DE HOMBRO Y BRAZO DERECHO (magn. carb., coloc.), PEOR EN CAMA, DE NOCHE; si sang. prefiere el lado derecho puede ser igualmente útil en reumatismo izquierdo de hombro izquierdo (Kent).

Puede haber toda clase de dolores neurálgicos : cortantes, lacerantes, desgarrantes como si se estirasen los músculos; dolores desgarrantes en cualquier parte, neurálgicos o reumáticos.

Rigidez de articulaciones de dedos.

Debilidad en piernas.

ARDOR Y TUFARADAS DE CALOR EN PALMA DE MANOS Y PLANTAS DE PIES, sobre todo de noche; entonces está obligado a sacarlos de la cama.

Relaciones

Complementarios

Ant. tart.

[SARSAPARRILLA](#)

O smilax officinalis, pequeño arbusto de la familia de las Asparagináceas, crece en selvas de América tropical y meridional.

Para uso homeopático se emplea la raíz con la que se prepara la tintura madre de la que se obtienen, por diluciones hahnemannianas sucesivas, las diversas dinamizaciones.

Acción general del medicamento

Actúa de manera marcada sobre PIEL que, bajo su influencia, se pone seca, arrugada, con vesículas herpéticas, grietas, granos rojizos, etc.; Dewey la llama potente antisicótico.

Bajo su acción, las MUCOSAS se inflaman, pero la irritación es más BIENSECA; se caracteriza por dolores ardientes, sensación de ulceración y espasmos consecutivos; sólo ocasiona poca secreción serosa o sero-purulenta, pero de consistencia viscosa, acre, corrosiva.

Síntomas urinarios muy marcados y tan característicos que van a la cabeza para su indicación.

Conviene particularmente a ESTADOS CRÓNICOS COMPLEJOS, consecuencia de diatesis sicóticas y sifilíticas mezcladas y a las que el abuso de mercurio ha venido a complicar.

GRAN DEBILIDAD REACCIONAL de todo el individuo, como merc., lach., etc., tejidos sin vitalidad; cuando se hieren la lesión no quiere curar; se ulceran por la menor cosa; toda herida permanece abierta, se extiende y se hace fagedénica como ars. alb., lach., y merc. corr.

Gran SENSACIÓN DE DEBILIDAD en todo el cuerpo, especie de estado paralítico.

En cuanto a LA MENTE? ESTA TAN DÉBIL COMO LOS TEJIDOS; estado de estupidez; no puede comprender nada, mente lenta, debilidad de cerebro que frisa en imbecilidad.

TODOS LOS ÓRGANOS TIENEN ACCIÓN LENTA, DÉBIL, PEREZOSA y están CONGESTIONADOS.

Debilidad y dilatación de venas; tendencia a várices, úlceras varicosas, hemorroides; cara a menudo roja o con manchas rojas; donde la circulación es débil : tibias, dorso de dedos grandes, la piel toma TINTE AZULADO; manchas violetas, como gangrena senil en formación : útil en ancianos, cuando aparecen manchas negras o azul oscuro en dorso de manos u otra parte del cuerpo.

Erupciones húmedas con comezón; descamación como caspa, escaras.

Piel de dorso de manos y cara palmaria gruesa y dura, con descamación como de psoriasis y manchas azules (Kent).

Características

1) CONSTITUCIÓN Y TEMPERAMENTO : Conviene particularmente a sujetos de cabello morocho, con trastornos, de litiasis renal, a individuos de diatesis urática sicótica (Allen).

Indicado en antiguos sífilíticos cuya enfermedad ha estado disfrazada, que han sido blanqueados por mercurio; con mente y cuerpo postrados; especie de debilidad parética de extremidades, no tienen ningún aguante; palpitaciones al menor esfuerzo; siempre fatigados; en piel, úlceras indolentes salpicadas; piel floja, se agravan de noche; dolores osteoscópicos peor de noche; en tales casos, sarsap. antidota a merc. y permite reaccionar contra la enfermedad primitiva.

Niños muy enflaquecidos, atrepsicos, por sífilis hereditaria; enflaquecimiento especialmente marcado alrededor del cuello, cara de viejo; piel seca y fofa con erupciones o manchas violáceas, cobrizas; asimilan mal el alimento, deposiciones líquidas y vientre grande.

Niños que dejan arena amarillenta o blancuzca en los pañales; gritan cuando van a orinar, porque recuerdan cuánto sufrieron en micciones anteriores; a veces al fin de la micción lanzan un grito infernal; dolor agrio de vejiga al fin de la micción.

Viejos farristas debilitados por excesos de bebida y abuso de mujeres; mujeres enflaquecidas, arrugadas, con corazón, pulmones, cerebro, vejiga, débiles.

Sujetos envejecidos antes de tiempo, parecen de 80 años a los 40, caminan con dificultad, con paso tembloroso apoyados en bastón, con edema de piernas.

Al principio nux v. podrá atenuar el debilitamiento físico, pero llega el momento en que la debilidad mental iguala a la física y hay que orientarse hacia remedio como sarsap., lach., secale, etc. (Kent).

2) TRASTORNOS VESICALES CARACTERÍSTICOS QUE SE TRADUCEN POR : a) VIOLENTO DOLOR AL FIN DE LA MICCIÓN, INTOLERABLE (berb., equiset., medorr., thuya) a menudo con VIOLENTO TENESMO VESICAL.

Ningún otro tiene este síntoma tan marcado, aunque en puls. se encuentra algo análogo para tenesmo, relacionado con próstata grande; nat. mur. : después de la micción, ardor y sensación de cortadura que escuece en uretra, contracciones espasmódicas de abdomen, etc. (Nash).

b) ESPASMO DE ESFÍNTER CUANDO SE SIENTA PARA ORINAR, QUE HACE LA MICCIÓN IMPOSIBLE EN ESA POSICIÓN, PERO CUANDO SE LEVANTA Y ESTA PARADA LA ORINA CORRE FRANCAMENTE (Kent).

Modalidades

Agravación

a) POR CALOR : el calor INTERIOR agrava todos los síntomas, EXCEPTO SENSACIÓN DE FRÍO EXTERIOR QUE SE ALIVIA POR CALOR; bebidas y alimentos calientes agravan, desea bebidas y alimentos fríos; pero el calor exterior reconforta (Kent).

b) DE NOCHE.

c) POR HUMEDAD.

d) EN PRIMAVERA; como todos los remedios venenosos.

Lach., secale, hamam., se tonifica en invierno y se debilita en primavera, etc. (Kent).

e) Al bostezar.

f) Antes de reglas.

g) Después de micción.

Síntomas mentales

Gran debilidad mental, descorazonado, taciturno, de mal humor, carácter sensible, se ofende fácilmente.

Cabeza

Dolores de cabeza que causan depresión mental; dolores desde occipucio a ojos.

Dolor de cabeza después de gonorrea suprimida a destiempo y bruscamente (Nash).

Dolores óseos y periósticos, consecuencia de afección venérea.

Erupción húmeda de cuero cabelludo.

Costras de leche que empiezan en cara; erupción en cara y labio superior.

Aparato digestivo

BOCA Y GARGANTA :

Lengua cargada; salivación abundante; gusto metálico; olor fétido; no hay sed.

Aftas.

Se diría que mucosa de boca, lengua y faringe van a ulcerarse; manchas violetas que parecen querer ulcerarse, pero no es así y permanecen así semanas y meses (Kent).

ESTOMAGO :

En mal estado; flatulencia, eructos, náuseas continuas, vómitos de alimentos agrios.

Se diría que tiene fermentaciones molestas en estómago; sensación como si hubiera comido mucho, como si los alimentos le quedaran en estómago; digestión lenta y débil (Kent).

ABDOMEN Y DEPOSICIONES :

Borborismos y fermentaciones en abdomen; muchos gases.

Cólicos y dolor de riñones a cada período menstrual.

Constipación obstinada con necesidad violenta de orinar al tratar de evacuar.

Deposición pequeña y expulsión con muchos tirones de arriba a abajo.

Necesidad de evacuar con contracción de intestinos que da sensación como si fueran a salir por recto.

Durante deposición, violentos dolores cortantes de recto (Kent).

Aparato urinario

DEPOSITO DE ARENA BLANCA EN ORINA QUE ES ESCASA, VISCOSA O VEDIJOSA, ORINA POCO ABUNDANTE, VISCOSA, VEDIJOSA, DEJA DEPOSITO ARENOSO O PEQUEÑOS CÁLCULOS.

Cólicos nefríticos; arenillas; cálculos vesicales; arenillas con reumatismocrónico.

Catarro de vejiga.

DOLORES INTOLERABLES AL FIN DE MICCIÓN.

NO PUEDE ORINAR SENTADO PERO SI ESTA PARADO LA ORINA CORRE LIBREMENTE;

orina abundante de noche, inunda su cama; de día, sólo puede orinar parado.

Sensación de "SACUDIDAS" a lo largo de uretra masculina.

Cada vez que orina sale aire de uretra, con ruido de gorgoteo : frecuente en catarro de vejiga y consecuencia de fermentaciones vesicales.

Necesidad frecuente de orinar sin resultado, con secreción disminuida (Kent).

Órganos genitales

MASCULINOS :

Olor fétido intolerable de partes genitales; erupciones herpéticas con prurito.

FEMENINOS :

Erupciones húmedas y pruriginosas en frente antes de reglas; erupción húmeda, a veces, en ingle derecha, antes de reglas.

Reglas atrasadas y poco abundantes.

Senos flácidos, pequeños, pezones retraídos.

Piel

PIEL FACA, SECA, ARRUGADA, REVENIDA.

Va a la par de iodium, nat. mur., y abrot. para enflaquecimiento.

En sarsap., cuello enflaquecido y piel en general arrugada; sarsap., sanic., y nat. mur., como lycop. : adelgazamiento de arriba a abajo; abrot., de abajo a arriba.

Iodium : enflaquecimiento general con constante deseo de comer; nat. mur. : come todo el tiempo, pero adelgaza sin cesar, particularmente cuello; abrot. : enflaquecimiento general, sobre todo en piernas.

Arg. nit. : niño con aspecto de viejo seco, como momia (Nash).

Rash por exposición al aire libre, seco, pruriginoso.

Erupciones en primavera.

Grietas; piel agrietada en manos y pies.

Rash como rubéola de sífilis, molesta de manera intolerable.

Erupciones húmedas que segregan líquido irritante.

Manchas violáceas.

Manchas cobrizas.

Úlceras indolentes.

Espalda y extremidades

Dolores reumáticos después de gonorrea mal suprimida.

Debilidad paralítica de extremidades; temblor de manos y pies.

Depósitos gotosos en articulaciones.

Edemas de extremidades inferiores.

Grietas en manos y pies, particularmente bordes de dedos y dedos grandes de pies.

Onixis; ulceraciones en puntas de dedos y sensación de pinchazos bajo las uñas. (psorin.).

Relaciones

Complementarios

Merc., sepia.

Antídotos

Bell.

SECALE CORNUTUM

Secale cornutum, es el micelium del claviceps purpúrea hongo que se desarrolla en años lluviosos en ovarios del centeno y otras gramíneas.

Se recoge antes de cortar el centeno y se reduce a polvo con el que se prepara, por maceración en alcohol a 90º, la tintura madre con la que se obtienen, por diluciones hahnemannianas sucesivas, las diferentes dinamizaciones.

Acción general del medicamento

Actúa electivamente sobre TEJIDO MUSCULAR para el que es UN VENENO PARALIZANTE.

La parálisis que produce no se instala bruscamente, es progresiva y precedida por fase esténica de espasmos o convulsiones que marca principio de intoxicación; fase esténica que puede determinar por isquemia de médula por vaso constricción inicial de sus pequeños vasos, fenómenos paralíticos que no hay que confundir con el efecto de la actividad propia del veneno y que aparecen cuando su efecto tóxico se ejerce en su plenitud.

Actúa sobre músculos de vida de relación y vida vegetativa, modifica profundamente propiedades inherentes a la fibra muscular; la falta de coordinación de movimientos que produce marcha vacilante e insegura debe atribuirse a trastornos de tonicidad; la abolición de contractilidad explica la desaparición de reflejos; el relajamiento de fibra que termina por paralizarse y atrofiarse se relaciona con lesión de contractilidad.

LOS TRASTORNOS SENSITIVOS tienen marcha paralela a la de los motores; primero con calambres y dolores; luego, disociación de sentido muscular y abolición completa de sensibilidad.

LA ASTENIA MUSCULAR, que es expresión esencial de su acción, se encuentra en músculos voluntarios, donde se registra sensación de profunda laxitud, debilidad, pesadez y entorpecimiento de miembros, imposibilidad de deglutir, debilitamiento de voz, pérdida de palabra, incontinencia de esfínteres, lentitud de respiración que trae, por insuficiencia de hematosis, tendencia de la sangre a conservar aspecto de sangre venosa; se paralizan definitivamente los movimientos respiratorios causa de asfixia terminal y muerte.

El miocardio sufre la misma influencia : después de una fase muy corta de palpitations y a veces arritmia, el corazón se hace lento; sus contracciones se espacian cada vez más y a veces se detienen en diástole.

Manifiesta con más intensidad su poder asténico SOBRE FIBRAS LISAS y particularmente DE ÚTERO Y CAPILARES.

En caso de inercia uterina por parto, se muestra heroica, pero es incapaz durante embarazo, de provocar contracciones uterinas : la ley de los semejantes explica este hecho; por eso no estamos de acuerdo con Piedevache cuando escribe : "la excitación de fibra lisa de útero sólo alcanza su desarrollo completo en el acto fisiológico del parto".

Es éste un error, porque si la ergotina solamente actúa entonces, es que despierta un útero blando cuyas contracciones excita homeopáticamente; durante embarazo al contrario, mientras la tonicidad de fibra uterina es normal, la ergotina con dosis largamente prolongadas, sólo puede producir relajamiento de fibra muscular uterina; si desencadena algunos espasmos uterinos, son pasajeros; y sorprenderse por no verlos persistir como en el momento del parto es mostrar que uno confunde la primera fase del efecto primitivo su efecto curativo.

Por su acción sobre CAPILARES provoca éstasis sanguíneos que cuando son crónicos contienen la circulación y dan lugar a lesiones gangrenosas.

Esta atonía vascular produce también inercia de actividad plástica y trastorna profundamente el funcionamiento de glándulas, particularmente salivares e intestinales que ya sólo segregan productos mal elaborados a los que dejan correr pasivamente.

Características

1) CONSTITUCIÓN Y TIPO : Individuos flacos, descarnados; tales sujetos serán los que más a menudo necesitan ergotina.

Pero no está necesariamente contraindicado en gordos; ciertas naturalezas son más sensibles que otras a ciertos remedios; pero no hay por qué creer que estos remedios no actuarán en otros sujetos cuando los síntomas concuerdan : individuos descarnados corresponden especialmente a secale, pero cuando los síntomas lo llaman actuará también en gordos (Kent).

Personas de cierta edad, con músculos flojos y blandos, de apariencia enclenque; cara pálida, como cenicienta, rasgos tirantes, ojerosas; labios contraídos; piel arrugada, marchita y fría; con expresión de tristeza y desaliento; como viejos y quebrantados.

Mujeres con fibras musculares laxas, propensas a hemorragias pasivas por todos los orificios del cuerpo (Nash).

2) ASPECTO SECO Y ARRUGADO DE PIEL QUE ESTA INSENSIBLE O CON SENSACIÓN DE HORMIGUEO SUBCUTÁNEO MAS O MENOS MARCADA, COMO SI HORMIGAS CAMINASEN DEBAJO : Piel marchita, como si cubriera musculatura descarnada; de apariencia malsana; coloración púrpura o azulada, sea de manera generalizada, sea localmente, por zonas; manchas violetas en piel marchita, arrugada, principalmente donde la circulación es débil, como dorso de manos y pies, o tibias.

Hay allí sensación de entumecimiento, hormigueo.

Las extremidades pican, arden y hormiguean; sensación de reptación como si anduvieran hormigas bajo la piel, entre carne y piel; sensación de entumecimiento, como si estuvieran muertos, como si fueran de madera, en dedos y sobre todo dedos de pies.

Arruga senil de piel en extremidades, como en viejos adelgazados y debilitados; los vasos sanguíneos se obturan, la sangre circula mal en los dedos que se entumecen, se ponen insensibles y toman tinte violeta negro; sec. com. mejora circulación de extremidades en viejos y lucha contra gangrena senil (Kent).

3) GRAN FRÍO EN TODA LA SUPERFICIE DEL CUERPO, PERO NO PUEDE SOPORTAR ESTAR TAPADO PORQUE EL CALOR AGRAVA; SENSACIÓN OBJETIVA DE FRÍO MUY INTENSO EN TODA LA SUPERFICIE DEL CUERPO PERO NO TOLERA ESTAR TAPADO (Nash).

Esto se ve en gangrena senil y cólera; en este último, este síntoma hace pensar en camp., pero este es útil sobre todo en la primera parte de la enfermedad, en caso de colapso precoz, antes que las evacuaciones se hagan ofensivas y oscuras (Nash).

4) SENSACIÓN DE ARDOR A PESAR DE LA SENSACIÓN OBJETIVA DE FRÍO EXTERIOR : La sensación objetiva de frío no excluye sensación subjetiva de ardor : piel y extremidades arden; sensación intensa de ardor y exteriormente la región que arde está fría al tacto; sensación de ardor con frío.

Sensación de ardor de órganos interiores.

Sensación de sequedad con ardor en estómago, intestino, boca, garganta, vías respiratorias, pulmones (Kent).

5) INFLAMACIÓN VIOLENTA DE CUALQUIER PARTE DEL CUERPO : Neumonía gangrenosa, gastritis, peritonitis, inflamación de útero, ovarios, etc.

En estados inflamatorios compite con ars. alb.

Los síntomas de ambos tienen puntos tan parecidos que a menudo es difícil distinguirlos : ambos tienen vientre violentamente distendido, timpanismo marcado, sensación de quemadura ardiente, como de fuego, sed violenta, sensibilidad extrema a tacto y movimiento, tal que la menor sacudida es insoportable, vómitos de sangre, expulsiones de sangre en coágulos, secreciones extremadamente fétidas y sanguinolentas por intestinos; pero difieren en que ars. alb. quiere estar tapado, tener calor, mejora por aplicaciones calientes, secas o húmedas, secale quiere estar destapado y mejora al aire frío (Kent).

AFECCIONES CATARRALES DE TODAS LAS MUCOSAS.

ESTÁN SECAS Y SANGRAN FÁCILMENTE; POR SUPERFICIE MUCOSAS CATARRALES

CORRESANGRE LÍQUIDA, NEGRA, MALOLIENTE, SE COAGULA LENTAMENTE, DIFÍCILMENTE O NADA (Kent).

6) HEMORRAGIAS PASIVAS DE SANGRE LÍQUIDA, DIFÍCILMENTE COAGULABLE, OSCURA, A MENUDO MALOLIENTE, AGRAVADAS POR EL MENOR MOVIMIENTO : Pérdidas de sangre negra, líquida, aun cuando no haya inflamación de superficie que sangra.

Epistaxia de sangre líquida, venosa, negra, maloliente, hemorragia de garganta, pulmones, recto, vejiga, de sangre oscura.

Orina como tinta.

Hemorragias uterinas prolongadas durante reglas, al punto que un período se prolonga hasta el siguiente en mujeres marchitas, arrugadas; el primer día, flujo considerable de sangre líquida y negruzca, que se prolonga algún tiempo, luego secreción saniosa oscura, líquida y negruzca, que dura el próximo período, en cuya fecha aparece el verdadero flujo sanguíneo negro, de olor muy fétido.

Esto en mujeres que han tomado antes ergotina en altas dosis para abortar en un parto y son muy sensibles a su acción (Kent).

Anemia por tendencia a hemorragias y a destruir glóbulos rojos; la cara de estas anémicas es descarnada, arrugada, envejecida con aspecto sucio, grisáceo, como si no se hubieran lavado desde hace mucho y la suciedad hubiera secado; este aspecto arrugado, envejecido y sucio, es muy marcado en extremidades (Kent).

A propósito de las hemorragias de sec. com. se pueden comparar con carb. veg. : análogo en epistaxis persistentes; secreción obstinada de sangre oscura que no coagula; el diagnóstico de elección sólo se puede hacer por las otras características.

Util. : hemorragias uterinas, generalmente por pequeñas causas, simple tacto vaginal, por ej.; pero de sangre roja, brillante, en parte coagulada.

Bovista : parece producir relajamiento de capilares; epistaxis y hemorragias menstruales; esta secreción es más marcada a la caída de la noche o a la mañana.

Mitchella : hemorragia uterina de sangre más brillante que sec. y asociada a disnea.

Tril. pend. : flujo de sangre roja, brillante y profusa con sensación de debilidad; es más indicado en hemorragia activa, aguda que en secreción crónica y lenta de sec.; se parece a china.

Hamam. : secreción venosa y pasiva, oscura, agotadora; cefalea latente marcada en temporales.

Erig. canad. : hemorragia asociada a disuria como mitch., pero sobreviene por rachas : el flujo aparece, luego desaparece súbitamente.

Ferr. phosph. : hemorragias de sangre brillante en cualquier orificio, melleo, ipeca, etc.

7) CONVULSIONES; ESPASMOS MUSCULARES : Son uno de los síntomas predominantes :

ESTREMECIMIENTOS MUSCULARES QUE COMIENZAN EN CARA Y SE EXTIENDEN A TODO EL CUERPO.

Convulsiones, espasmos, generalizados en todo el sistema muscular o localizados en un grupo de músculos, opistótonos, calambres en pantorrillas, muslos, plantas de pie, palmas de manos; contracciones, histéricas.

Espasmo y convulsiones comienzan en músculos de cara como cic. vir. (Kent).

Modalidades

Agravación

a) POR CALOR, ESTANDO TAPADO, EN HABITACIÓN CALIENTE : Estado constitucional, en general, agravado por calor y hay pocas excepciones : desea tener frío, aunque tocándolo se ve que sus miembros están fríos

como hielo, quiere ventanas abiertas; una enferma con hemorragia de sec., quiere que la destapen aunque la pieza esté fresca; una enferma con úlceras de sec.

quiere estar destapada; y si tiene estado inflamatorio de sec. en intestinos estómago, quiere tener pecho y vientre descubiertos (Kent).

b) DURANTE SECRECIÓN HEMORRÁGICA, espasmos musculares y síntomas nerviosos agravados : convulsión puerperal, en medio de hemorragia (Kent).

Mejoría

a) POR FRÍO ESTANDO DESTAPADO : Estado de calor en piel y desea estar destapado; dolores agudos que escuecen, ardientes como fuego o cortantes como por un cuchillo, neurálgicos, aliviados por aplicaciones calientes; dolor de cabeza, peor al aire frío; peor de manera general, MEJORÍA DESTAPÁNDOSE EN HABITACIÓN FRÍA, Y SI EL AIRE LLEGA HASTA EL (Kent).

b) Estirándose, alargando los miembros.

Síntomas mentales

Los síntomas de depresión moral e intelectual dominan pero sin características particulares : desaliento con tristeza y melancolía; temores y angustias; temor a la muerte, gran debilitamiento de facultades intelectuales.

Demencia furiosa con IMPULSO DE AHOGARSE.

Locura activa con gran excitación; se desnuda, arranca sus partes genitales; mete sus dedos en vagina y se rasca hasta que la mucosa sangra, ha perdido toda idea de pudor (Kent).

Sueño

Somnolencia difícil de vencer o al contrario, insomnio, sueño turbado por pasadillas angustiosas.

Cabeza

Cefalea supraorbitaria u occipital, sorda, de invasión muy rápida.

Hemicránea con náuseas.

Vértigo, pesadez y latidos en cabeza.

Ojos

Vista débil; niebla, sensación de velo delante de los ojos.

CATARATA al principio.

Los sujetos envenenados por ergotina, particularmente ergotismo crónico, presentan opacidad de córnea como en casos de catarata senil; individuos arrugados, descarnados, con tendencia a ulceración, piel malsana y agravación marcada por calor, son maravillosamente curados por sec. (Kent).

Cara

Pálida, alterada, de rasgos tirantes, arrugada, marchita; ojos hundidos, ojeras azuladas; a veces expresión manifiesta de estupidez.

SENSACIÓN DE HORMIGUEO BAJO LA PIEL DE LA CARA.

CONTORSIONES ESPASMÓDICAS, CALAMBRES Y CONVULSIONES QUE COMIENZAN ENCARA Y GANAN TODO EL CUERPO.

Aparato digestivo

BOCA Y FARINGE :

Boca seca, agrietada, deja a veces exudar sangre negruzca que no coagula.

Lengua cargada, fría, lívida; o hinchada, paralizada.

PINCHAZOS EN PUNTA DE LENGUA QUE ESTA COMO PARALIZADA.

Parálisis de faringe y deglución imposible.

ESTOMAGO :

Hambre voraz, anormal; apetito excesivo pero continúa siendo flaco. (iod., nat. mur., etc.).

Como síntoma alternante, inapetencia y asco por alimentos, principalmente carne.

SED ARDIENTE.

Sensación de ardor en estómago y abdomen.

Náuseas y vómitos; estado nauseoso como mareo; vómitos como borra de café.

ABDOMEN Y DEPOSICIONES :

Violentos cólicos con vientre hinchado y distendido; timpanismo.

Diarrea acuosa, agotadora, con deposiciones como en CÓLERA, con calambres y frialdad de cuerpo y gran debilidad; y sed ardiente; en esto es muy parecido a camph., pero se distinguen fácilmente porque éste mejora por calor y agrava por frío.

Deposiciones involuntarias; la materia no termina de pasar por el ano que queda muy abierto (apis, phosph.).

Diarrea y hemorragia intestinal tienen gran tendencia a marchar parejas, sobrevenir juntas; diarrea acuosa, sanguinolenta o mezclada con sangre oscura, líquida, que coagula mal.

Aparato urinario

Al principio de intoxicación crónica, MICCIONES FRECUENTES, PENOSAS, GOTA A GOTA, CON TENESMO.

En esto se parece a cann. sat. : deseos frecuentes con dolores en cuello de vejiga, dolores ardientes durante micción, peor después; emisión de algunas gotas de orina solamente.

Canth. : deseo frecuente de orinar con dolores violentos de vejiga, emisión de algunas gotas de orina sanguinolenta con sensación de ardor, como por hierro candente, a lo largo de uretra; tenesmo vesical.

Copaiva : deseo frecuente e ineficaz de orinar; la orina corre gota a gota; ardor de cuello de vejiga.

Eup. perf. : constante deseo de orinar a pesar de frecuentes micciones, la vejiga parece siempre llena.

Más tarde parálisis de vejiga.

HEMATURIA.

Órganos genitales

Cólicos menstruales con sensación objetiva de frío en toda la superficie del cuerpo, pero intolerancia al calor.

REGLAS IRREGULARES, ABUNDANTES Y DE MUY LARGA DURACIÓN, DE SANGRE

NEGRA, LÍQUIDA, POCO O NADA COAGULADA, MAL OLOR; CONTINUA SECRECIÓN DE SANGRE ACUOSA HASTA EL PERÍODO SIGUIENTE.

Hemorragia pasiva de sangre negra en mujeres débiles y caquéticas, con gran postración, sensación objetiva de frío en superficie del cuerpo, y a pesar de ello, deseo de aire frío.

Dolores ardientes de útero que está congestionado.

Leucorrea marrón, ofensiva, irritante.

Amenaza de aborto hacia el tercer mes.

Cura esterilidad en casos en que el útero es incapaz de conservar el feto; esta debilidad se debe a abortos repetidos (Kent).

Dolores irregulares, débiles o ausentes, durante el parto, sin que una acción expulsiva se manifieste.

INERCIAS UTERINAS.

ACCIÓN SOBRE FIBRA UTERINA A LA QUE HACE CONTRAER, CUANDO LOS DOLORS DE PARTOS SON DÉBILES, SUPRIMIDOS O INEFICACES, EN MUJERES DELGADAS, DESCARNADAS, CON PIEL MARCHITA, PROPENSAS A HEMORRAGIAS.

Fuertes dosis de ergotina provocan tales contracciones de útero que su contenido es expulsado y una hemorragia agotadora se produce : expulsión de grandes coágulos mezclados con sangre roja al principio, pero el rasgo más saliente es secreción de sangre negra que no coagula (Kent).

Se puede comparar con Arnica : inercia uterina por fatiga de músculo uterino; dolores débiles; la parturienta desea constantemente cambiar de posición.

Caut. : inercia uterina con gran relajamiento de tejidos y postración.

Chamom. : dolores intolerables, ineficaces, a veces rigidez de cuello.

Gels. : inercia uterina con ausencia de dolor, aunque la dilatación sea completa; gran debilidad y temblor.

Puls. : loquios marrones y de mal olor.

Languidez de senos que se arrugan.

Ausencia de leche después de parto; senos marchitos, arrugados.

Aparato circulatorio

Además de su influencia sobre sangre y circulación hay : angustia precordial con palpitaciones; irregularidad de latidos de corazón; pulso pequeño e irregular.

Aparato respiratorio

NARIZ :

Hemorragia nasal; sangre oscura, líquida, que corre sin parar, con pulso pequeño, huido y gran postración : en viejos o borrachos, o mujeres jóvenes muy débiles.

BRONQUIOS Y PULMONES :

Respiración lenta.

Disnea y opresión con calambres de diafragma.

Espalda y extremidades

Irritación espinal; rigidez de nuca; sensación de frío a lo largo de espalda.

CALAMBRES Y ENTUMECIMIENTO DE MIEMBROS.

HORMIGUEO EN DEDOS, en esto se parece a : Aconit. : sensación parecida, particularmente cuando escribe; amm.

mur. : hormigueo en dedos con tirones y latidos con dolores como de ulceración en punta de dedos, Lycop. :

hormigueo de dedos, brazos, dedos entumecidos, también de noche.

Rhus tox. : sensación de hormigueo en punta de dedos con entumecimiento después de fatiga.

Silicea : entumecimiento con hormigueo de dedos y brazos cuando se duerme sobre uno de ellos.

FRÍO DE HIELO EN EXTREMIDADES (Aran. diad., Ars. alb., Camph., Carb.

veg., Helod., Hydroc. ac., Tabac., Silic., Ver. alb.).

Estado parético, parálisis de extremidades inferiores; estado parético de una pierna y un brazo, del mismo lado del cuerpo; parálisis de extremidades superiores con entumecimiento y hormigueo.

Entumecimiento y sensación de ardor a lo largo de columna vertebral.

Con estado parético, adelgazamiento general o solamente del nervio atacado (Kent).

Marcha vacilante, temblorosa; ataxia locomotriz.

GANGRENA, EFACELO DE DEDO GRANDE (ars. alb., se alivia por calor, secale por frío).

Piel

SECA Y ARRUGADA, MARCHITA; FRÍA AL TACTO PERO NO PUEDE SOPORTAR ESTAR TAPADO.

SENSACIÓN DE ARDOR ALIVIADA POR FRÍO.

HORMIGUEO BAJO LA PIEL, SENSACIÓN DE QUE HORMIGAS CORREN BAJO SU PIEL.

GANGRENA SECA QUE SE DESARROLLA LENTAMENTE, CON PIEL DE ASPECTO APERGAMINADO Y ARRUGADO.

La menor herida segrega durante largo tiempo y continuamente sangrelíquida y negra.

Púrpura hemorrágica.

Úlceras varicosas con dolores ardientes aliviados por frío.

Tendencia a escaras : ulceraciones antiguas toman aspecto extraño, lustroso, negruzco, marchito, arrugado, al mismo tiempo que se secan sin que se formen granulaciones; súbitamente aparecen granulaciones negruzcas, indolentes; finalmente toda la zona se despega lentamente; esta zona se seca; cuando mucho deja correr a veces un poco de sangre negra, fétida (Kent).

Relaciones

Antídotos

Camphora, opium.

SEPIA

Sepia o tinta de camarón, líquido marrón negruzco, proviene de un molusco cefalópodo que lo segrega por una glándula que se abre al lado del ano, para oscurecer el agua y disimular su presencia.

En tiempo de Hipócrates ya se conocía y empleaba como astringente; Plinio la prescribía como diurético y purgante.

Varios médicos de la antigüedad, Dioscorides, Plinio, Soranus, y Marcellus, empleaban su carne, huevos, huesos contra leucorrea, gonorrea, catarro de vejiga, cálculos, espasmos de vejiga, alopecia.

Hoy sólo se emplea el jugo.

Hahnemann lo utilizaba como antipsórico y según Farrington, volvió a descubrir este remedio conocido desde la antigüedad.

Hahnemann tenía un amigo artista que cayó gravemente enfermo y al que no podía curar; un día lo observó trabajar y vio que se llevaba el pincel a la boca.

Se le ocurrió que allí podía residir la causa de la enfermedad.

El artista sostenía que su color sepia era inofensivo.

Pero, por consejo de Hahnemann dejó de llevarse el pincel a la boca y, cosa curiosa, curó rápidamente.

Secreción

El producto obtenido por compresión de la bolsa de la tinta es un líquido espeso, de un negro intenso, reacción neutra y poder colorante muy considerable.

Algunas gotas bastan para oscurecer un vaso de agua.

Composición química

Materia colorante (melanina) 78%, carbonato de calcio 10,4%, carbonato de magnesio 7%, cloruro de sodio y sulfato de soda 2,16%, mucina 0,84%.

Soda 2,16%, mucina 0,84%.

Es un compuesto complejo que tiene esencialmente : calcarea carbónica, magnesio carbónica, natrum sulphuric, natrum muriatic, y como componente específico : melanina.

Von Fürth y Schneider admiten de manera general, que se puede atribuir la formación de pigmentos melánicos a la acción combinada de dos fermentos : uno AUTOLÍTICO que separaría de la albúmina un grupo aromático, el cual sería a su vez transformado en melanina por una TYROSINASA.

Acción general del medicamento

Sepia tiene acción profunda sobre el organismo, principalmente de la mujer, en que influye de manera marcada fuerzas vitales y órganos.

Causa ERETISMO DE SISTEMA NERVIOSO CON AGITACIÓN, ANSIEDAD, TRASTORNOS MENTALES CARACTERÍSTICOS; EL IMPRESIONA SEVERAMENTE LA CIRCULACIÓN POR INTERMEDIO DE LOS VASOS MOTORES Y ESTA ACCIÓN SE HACE SENTIR MÁS ESPECIALMENTE Y MUY INTENSAMENTE SOBRE CIRCULACIÓN PORTA, QUE ES VIOLENTAMENTE PLETORIZADA.

Cuatro horas después de absorción hay TUMORES DE CALOR EN CABEZA, QUE TERMINAN EN TRANSPIRACIÓN, CON SENSACIÓN DE DEBILIDAD Y ANIQUILAMIENTO.

Todo movimiento, ejercicio, provoca gran calor y termina en sudores abundantes.

A media que la experimentación progresa la influencia general deprimente de sepia aumenta y se generaliza : el sujeto LANGUIECE, SE ABATE y queda POSTRADO; tiene desfallecimientos, es presa de temblores; se queja de sensación general de aniquilamiento después del menor esfuerzo, se siente vacío.

Pero esta debilidad no se limita a fuerzas vitales y sistema nervioso :TEJIDO Y ÓRGANOS RELAJADOS, DÉBILES Y PEREZOSOS, realizan un trabajo orgánico más difícil, LAS VÍSCERAS ESTÁN CAÍDAS POR LAXITUD ANORMAL DE TEJIDOS, LIGAMENTOS, Y POR ESTADO CONGESTIVO QUE LOS HACE MAS PESADOS.

La congestión venosa, particularmente de sistema porta y que aparecerá rápidamente, se va agravando e instalando cada vez más profundamente : de ahí dolores de cabeza, congestiones locales, várices, etc.

ÚTERO CADA VEZ MAS CONGESTIONADO, SE PROLAPSA; HÍGADO HIPEREMIADO PESADO Y PEREZOSO; éstasis venoso en miembros, inferiores que se traduce en SENSACIÓN DOLOROSA DE ROTURA Y TIRONES; las piernas parecen pesadas, como paralizadas, rígidas, pesadas sobre todo después del sueño; LAS ARTICULACIONES PARECEN MAS DÉBILES Y DAN IMPRESIÓN DE DISLOCARSE FÁCILMENTE; LOS ESFÍNTERES terminan por ser atacados y perder tonicidad : poco a poco, la evacuación de vejiga e intestinos se hace más difícil, perezosa, pero no hay verdadera parálisis, más bien inercia.

Por éstasis venoso, se manifiesta en mucosas TENDENCIA CATARRAL MARCADA que se traduce EN SECRECIÓN MUCOSA ESPESA Y BLANCA COMO LECHE, O ESPESA AMARILLA Y VERDOSA, CON FORMACIÓN DE COSTRAS SECAS EN MUCOSAS.

Organismo profundamente atacado : CAMBIOS Y ELIMINACIONES SE HACEN MAL; las excreciones se hacen fétidas, AGRIAS, EXCORIANTES y el tinte es AMARILLO, TERROSO, aparece DISPOSICIÓN MARCADA A ERUPCIONES Y ULCERACIONES MALSANAS DE LA PIEL.

Estado general gravemente atacado y rápido agotamiento.

Sus principales centros de acción son : a) SISTEMA NERVIOSO SIMPÁTICO : por medio del cual disminuye la actividad funcional de todos los órganos y tejidos bajo su dependencia, con sensación de desfallecimiento, llamaradas de calor y sudores.

b) CIRCULACIÓN VENOSA : muy disminuida al punto que produce verdadera congestión venosa con éstasis sobre todo marcada en sistema porta, con plétora venosa de órganos pelvianos y tejidos irrigados por sistema porta.

Esto explica por qué su acción es tan grande sobre ÓRGANOS ÚTERO OVÁRICOS, en que determina CONGESTIÓN CRÓNICA, con prolapso, versión o flexión uterina y sensación "Bearing Down".

Como consecuencia de esta congestión de órganos genitales, hay numerosos trastornos reflejos.

Esta congestión uterina va acompañada de más o menos leucorrea blanca o amarillenta o también sanguinolenta.

c) ÓRGANOS DIGESTIVOS : digestión lenta con sensación de desfallecimiento en boca de estómago y constipación marcada, plétora violenta de sistema porta, congestión, en alto grado, de hígado y numerosos síntomas en relación con este estado.

d) RIÑONES : por perturbaciones propias de sepsia en cambios y eliminaciones orgánicas, emiten orina turbia, de coloración oscura, muy fétida, con abundante sedimento rojo o gris.

e) PIEL : bajo su influencia se hace malsana, terrosa, con manchas amarillas, sobre todo en cara y tendencia marcada a erupciones.

El hecho notable de su patogenia y de las modalidades sintomáticas sucesivas de su acción general sobre el organismo humano, es intensa congestión VENOSA PORTAL que es su característica.

De ahí 2 zonas principales de influencia : 1) POLO HEPÁTICO.

2) POLO GENITAL.

Características

CONSTITUCIÓN Y TIPO : Actúa especialmente sobre EL ORGANISMO FEMENINO aunque también puede ser útil en el hombre; pero ese caso de tipo femenino, como puls.

Se adapta perfectamente a mujeres en período pleno de actividad útero-ovárica; parece actuar mejor en : ALTAS, DELGADAS, DELICADAS, SENSIBLES A TODAS LAS IMPRESIONES, DE OJOS Y CABELLOS NEGROS, (aunque estos últimos no siempre son negros), tez pálida o ligeramente sucia con una especie de MANCHA AMARILLA CABALGANDO SOBRE RAÍZ DE NARIZ QUE SE EXTIENDE COMO ALAS DE MARIPOSA SOBRE MEJILLAS, BAJO LOS OJOS; otra mancha hepática AUREOLA TAMBIÉN FRECUENTEMENTE LA BOCA y es tan característica como la precedente.

Labio superior cubierto de fino vello negro aparente, mientras el labio inferior, un poco hinchado, está agrietado generalmente en el medio.

Tendencia a transpirar, particularmente órganos genitales, axilas, espalda.

Propensas a desórdenes característicos de órganos sexuales : eretismo genital con ÚTERO PESADO QUE DA SENSACIÓN DE QUERER CAER; A MENUDO PASA DE UNA SENSACIÓN Y EL ÚTERO ESTA VERDADERAMENTE PROLAPSO; el hombre también tiene eretismo sexual, pero en ambos el coito causa gran debilidad.

Estas mujeres sufren de AFLUJOS DE CALOR, CONGESTIONES LOCALES, dolor de cabeza, particularmente al despertar, en que se sienten aturcidas y fatigadas.

Pero lo más notable es sobre todo el éstasis portal que las marca profundamente : además de los síntomas uterinos que están íntimamente ligados con la plétora venosa portal, el HÍGADO ESTA CONGESTIONADO, perezoso, lo

mismo que el estómago que presenta dispepsia atónica; el intestino sufre muy a menudo CONSTIPACIÓN REBELDE.

En la orina hay uratos en cantidad más o menos grande y una serie de signos que atestiguan mala asimilación. EL ASPECTO GENERAL DE TALES PERSONAS NO ES JAMÁS DE FUERZA NI SALUD, MÁS BIEN DE POSTRACIÓN, LANGUIDEZ, CON GRAN LASITUD DE TEJIDO CONJUNTIVO; TIENEN FÁCILMENTE PALPITACIONES Y ANIQUILAMIENTO FÍSICO EN RELACIÓN CON ANIQUILAMIENTO MORAL.

sepia Mujer de cabellos (bastante escasos) y ojos negros; Cara amarilla y más bien flaca, tez descolorida, terrosa. Algunas pecas; Párpados pesados e incompletamente abiertos con ptosis más marcada en el izquierdo; Silla amarronada en raíz de nariz con "alas de mariposa" en mejillas u ojos.

Mancha marrón que rodea la boca; Labio superior cubierto por fino vello aparente; Labio inferior un poco caído, hinchado, con algunas grietas en el medio; Expresión fatigada e indiferente, apática, irritable, que da impresión de llano fácil.

Rasgos blandos, débiles, faltos de firmeza.

(Dr. Brissaud)

Síntomas mentales

Una de sus características más marcadas es su estado mental, sus síntomas mentales.

PARECE ABOLIR EL PODER DE SER NATURALMENTE AMABLE, AFECTUOSO; estose demuestra por el lenguaje de una madre de familia : "siento que debería amar más a mis hijos, a mi marido, mi casa y a pesar de mi deseo no consigo tener esos sentimientos" (Kent).

Enferma TRISTE, DEPRIMIDA, LÁNGUIDA; LLORA FÁCILMENTE, se vuelve INDIFERENTE A TODO; OCUPACIONES, FAMILIA, A LAS PERSONAS QUE MÁS QUIERE, su casa, todo lo suyo.

Su memoria ES DÉBIL Y SIENTE SU CABEZA "VACÍA", lo que le apena.

A esta depresión, a esta tristeza melancólica del espíritu, se une IRRITACIÓN QUE PUEDE LLEGAR A IRASCIBILIDAD MUY MARCADA : SE TORNA DE CARÁCTER ODIOSO.

No es mala ni francamente colérica, sino constantemente irritable, no sabe lo que quiere, contradice todo lo que le dicen; su hipersensibilidad la hace llorar sin cesar, la pone hipocondríaca, la empuja a la soledad a la que teme, pues su angustia es perpetua, sin ideas fijas, pero está como envuelta en una nube de melancolía que pinta toda su vida de negro.

Su astenia es extrema y la evolución de sus tendencias psíquicas la conduce a retraerse cada vez más en su actividad física, intelectual y sentimental, a indiferencia perfecta por sus ocupaciones preferidas, a sus afectos más caros.

1) DEBILIDAD Y DESFALLECIMIENTO : SENSACIÓN DE VACÍO EN BOCA DE ESTÓMAGO.

Muy débil; un paseo, aún pequeño, la fatiga mucho; DESFALLECE FÁCILMENTE; por calor o frío, tiempo húmedo, arrodillándose, después de corto paseo a pie o en coche, etc., por pequeñeces.

Un síntoma muy característico es : SENSACIÓN DE VACÍO, DESFALLECIMIENTO EN BOCA DE ESTÓMAGO, NO MEJORADA POR COMER; frecuentemente unido a desórdenes; y en conexión con estado de ptosis de órganos y postración general.

En esto puede compararse con sulph. : sensación de vacío de estómago, como si se muriera de hambre, a las 11, a menudo asociado con sensación de ardor en planta de pies, de noche y calor en la coronilla de la cabeza.

Phosph. : sensación marcada de vacío en la boca de estómago, pero se extiende a todo el abdomen y se agrava de noche y debe levantarse para comer.

Ignat. : sensación de vacío, desfallecimiento, pero no ligada a desórdenes orgánicos, sino que es manifestación puramente nerviosa, ligada a veces a desórdenes verdaderamente histerálgicos matriz y sistema nervioso presentan estado irritable.

Hydrast. : desfallecimiento muy marcado.

Lycop. : hambre pero se sacia a los primeros bocados; alternativas de hambre e inapetencia.

China : alternativamente, gran apetito e inapetencia como lycop.

Iodium : necesidad de comer todo el tiempo y mejora mientras come.

2) MANCHAS AMARILLAS ESPECIALMENTE EN CARA, DE FORMA CARACTERÍSTICA : Salpicadas en todas LAS MEJILLAS, sus manchas amarillas se agrupan más generalmente en coloración uniforme que cubre nariz y parte que rodea mejillas, como una silla de montar sobre arista de nariz, o dos manchas a cada lado de alas de nariz, o hacia las sienes, o en cualquier parte del cuerpo, sobre todo VIENTRE.

3) LLAMARADAS DE CALOR CON TRANSPIRACIÓN Y DESFALLECIMIENTO : Congestiones locales y llamaradas de calor casi tan características como en sulph., pues la irregularidad de circulación es tan marcada en uno como en otro, pero sepia no tiene sensación tan intensa de calor como sulph.; en sepia hay tendencia muy marcada a asociación de síntomas congestivos con pelvianos, de pesadez característica; las llamaradas de calor parecen tener origen en órganos pelvianos e irradiar a todo el cuerpo; la congestión de órganos va acompañada de muchos latidos y pulsaciones.

4) SENSACIÓN DE PESADEZ HACIA ABAJO, PRESIÓN DE ARRIBA HACIA ABAJO, EN REGIÓN PELVIANA, CON DOLORS TIRANTES DE SACRO; SENSACIÓN DE CAÍDA DE TODOS LOS ÓRGANOS PELVIANOS.

Dolores de útero, como de parto, con sensación tal, que tiene que cruzarlas piernas o sentarse con las piernas apretadas como para retener algo que parece querer salir de la vagina (Guernsey).

Prolapso de útero con sensación como si algo quisiera salir por vulva (Lippe).

Presión en vejiga y micciones frecuentes, con sensación de tensión en partes inferiores de abdomen.

Sensación de peso, de bola en recto.

Modalidades

Lateralidad

Izquierda

Agravaciones

a) A LA MAÑANA Y AL ATARDECER, de manera general, la tarde trae mejoría momentánea.

b) Por aire frío.

c) Lavándose.

d) ANTES DE TORMENTA.

E) DESPUÉS DE LA COMIDAS.

Mejoría

a) A LA TARDE.

b) POR EJERCICIO VIOLENTO (que da un latigazo a la circulación venosa obstruida).

c) POR CALOR DE LECHO, POR APLICACIONES CALIENTES.

d) TENIENDO LAS PIERNAS LEVANTADAS.

Síntomas mentales

COMPLETA INDIFERENCIA POR LOS QUE MAS QUIERE; aversión por su familia, casa, ocupaciones habituales.

TRISTE, MISERABLE, LLENA DE ANSIEDAD, MIEDO, IDEAS NEGRAS, SE ASUSTA DE TODO, INQUIETA POR SU SALUD, SENSIBLE A TODAS LAS IMPRESIONES, MENTE PEREZOSA, MEMORIA DEBILITADA, NO TIENE ALEGRÍA DE VIVIR, INDOLENTE, FATIGADA FÍSICA Y MORALMENTE, TACITURNA, responde apenas a las preguntas, muy distraída.

EXCESIVAMENTE IRRITABLE, se agrava por ruido, sociedad, aunque se asusta de estar sola.

FÁCILMENTE SE OFENDE, NO SOPORTA CONTRADICCIÓN, CARÁCTER EXCESIVAMENTE DIFÍCIL Y DESAGRADABLE, DESCARGA SU MAL HUMOR Y CÓLERA CONTRA LOS QUE MAS QUIERE, TODO LA EXCITA, LA ABURRE.

Este estado mental debe diferenciarse de puls. que también tiene estado de llanto, con ansiedad, mal humor, tristeza y preocupación extrema por su propia salud.

Puls. tiene un fondo de suavidad, busca ser rodeada de ternura y consuelo.

Sepia tiene irritabilidad colérica e indiferencia fría, carácter difícil, personal y desagradable, que no permite confundir los dos estados mentales.

Nat. mur. : complementario de sepia, ambos tienen humor lloroso, gran depresión mental, memoria disminuida, indiferencia; ambos se agravan por consuelo, desean que los dejen tranquilos, tienen gran debilidad e irritabilidad nerviosa.

Pero la INDIFERENCIA DE nat. mur., proviene de su desesperación y languidez de espíritu, en sepia tiene su origen en AVERSIÓN NO DISIMULADA POR TODOS LOS QUE LA RODEAN Y SON MAS QUERIDOS; sepia TIENE ERETISMO VASCULAR Y nat; mur. NO; con sepia, los trastornos de la sensibilidad determinan trastornos congestivos de la cabeza, pecho.

Una conversación animada provoca tufaradas de calor en la cara y toda agitación pronto va seguida de sudores.

Con nat. mur. los síntomas están más en conexión con debilidad nerviosa, lo que hace que las emociones determinen dolor de cabeza; los PENSAMIENTOS DESAGRADABLES, TRISTEZA, DEBILIDAD O IRRITABILIDAD, PERO SIN ERETISMO CIRCULATORIO.

Si es una hipocondríaca, es un estado de melancolía por depresión mental en relación íntima con la INERCIA DE INTESTINOS de nat. mur. y en sepia, el mismo estado está ligado a ESTASIS PORTAL MUY MARCADO, MAS PERSISTENTE Y ASOCIADO A TEMPERAMENTO MAS IRRITABLE.

Se puede encontrar perfectamente indicado a nat. mur. cuando el ESTADO MENTAL ESTÁ LIGADO A IRREGULARIDAD MENSTRUAL O PROLAPSO UTERINO, PERO SIN LA OBSTRUCCIÓN VENOSA DE sepia.

Caut. : causa gran tristeza particularmente antes de reglas como sepia.

Cara amarilla, pero la enferma es tímida, tiene estado de ansiedad que no se encuentra en sepia; teme la POSIBILIDAD DE ACCIDENTES PARA ELLA O LOS SUYOS.

Sueño

Gran deseo de dormir de día y al atardecer.

Luego gran insomnio por sobre excitación.

Despertares frecuentes sin causa aparente; sueño agitado, con sueños fantásticos, terroríficos, angustiosos, frecuentes sobresaltos de susto; puede tener sueños lascivos durmiendo, cree oír que la llaman; o grita y mueve sin cesar los miembros agitados por continuos estremecimientos.

Despierta a las 3 ó 4 y no puede volverse a dormir.

Cuando tiene que levantarse está muy cansada, con sensación de no haber tenido un sueño reparador.

Tal sueño nos hace pesar en magn. mur.; en sulph. : "sueño de gato", despierta a las 4 y no se duerme más.

Platina : durante muchas noches, despierta sin razón alguna a las 3, pero se vuelve a dormir enseguida; nux v. de sueño y despertar tan característicos : ars. : después de medianoche y sobre todo alrededor de las 3 se agita y sólo duerme a ratos; graph. : despierta a las 3 y no puede dormirse por mucho tiempo, por eso al levantarse está aturdido y destrozado; mezer. : despierta alrededor de las 3 con sensación de pesadez de miembros y cabeza y no puede volverse a dormir por mucho tiempo y es entonces atormentado por sueños angustiosos.

Cabeza

HEMICRÁNIA EN ENFERMAS CON TEMPERAMENTO DE SEPÍ Y QUE SUFREN DESARREGLOS UTERINOS CARACTERÍSTICOS.

Dolores de CARÁCTER LATENTE con sensación dolorosa, de presión o estallido o latido de adentro hacia afuera; localizados GENERALMENTE SOBRE UN OJO, MAS A MENUDO EL IZQUIERDO, Y SE AGRAVAN POR LUZ, RUIDO, MOVIMIENTO, SALVO EJERCICIO VIOLENTO; pueden venir en puntadas terribles que provocan movimiento espasmódico que echa la cabeza hacia atrás a pesar suyo.

Pueden ESTAR PEOR A LA MAÑANA Y VAN ACOMPAÑADOS DE NAUSEAS Y VÓMITOS, CON HÍGADO OBSTRUÍDO Y ORINA CARGADA DE ÁCIDO ÚRICO.

DOLOR DE CABEZA LATENTE, EXTREMADAMENTE doloroso en el momento de la formación con débil secreción menstrual.

CEFALEA CONGESTIVA DURANTE REGLAS, CUANDO LA SECRECIÓN ES POCO ABUNDANTE (ver sang.).

Cefalea el día que está libre o franco en el trabajo (sulph.).

Sensación de frío en la coronilla de la cabeza.

Vértigos con sensación de que algo gira dentro de ella, peor al agacharse o caminar.

Cefalea en frente principalmente arriba de cejas, o en occipucio, con sensación de presión y estallido, peor a la mañana, al aire libre, por trabajo mental, por ejercicio moderado.

Los cabellos se ponen grises y caen en gran cantidad.

Comezón de cuero cabelludo que se cubre de erupciones húmedas, rezumantes, sobre todo en coronilla y nuca; cuero cabelludo sensible al tacto.

Cara

HABITUALMENTE CARA PÁLIDA, TEZ AMARILLA, TERROSA O DE ASPECTO SUCIO; NUMEROSAS PECAS Y SOBRE TODO ANCHAS MANCHAS AMARILLAS ALREDEDOR DE LABIOS Y MENTÓN, O BAJO LOS OJOS, A CADA LADO DE LA NARIZ SOBRE LA CUAL CABALGAN Y SE REÚNEN EN FORMA DE MARIPOSA O SILLA DE MONTAR.

Puede estar hinchada, con aspecto abatido, de miedo, párpados superiores hinchados y caídos.

Labio inferior un poco hinchado y resquebrajado en el medio, labio superior recubierto de vello negro, si es morena, más o menos aparente.

A menudo es útil en erupciones herpéticas en cara, labios y mentón.

Ojos

PTOSIS, principalmente izquierda; periódica y sobreviene después de exposición a viento seco o por aire frío, especialmente durante reglas, acompañada de fatiga en globos oculares, con necesidad de cerrar los ojos.

Parece haber localización de ptosis general que caracteriza a sepia (caust., etc.).

NUMEROSOS SÍNTOMAS CATARRALES con vesículas, pústulas y manifestaciones psóricas; estado de infiltración variado en y alrededor de los ojos; pústulas en globo ocular y borde de párpados; tumores tarsales; aglutinación catarral de párpados.

LE PARECE VER LOS OBJETOS A TRAVÉS DE UNA GASA O NEBLINA (KENT).

Estos síntomas oculares se relacionan con sepia tuberculinica, con eliminaciones de endotoxinas que causan trastornos de insuficiencia hepática, congestión venosa de origen portal; de ahí metástasis tóxicas sobre ojos; o con sepia que con sus congestiones de pelvis, provoca ptosis orgánicas y reflejos nerviosos que pueden atacar acomodación y sistema nervioso extrínseco del ojo (Dr. Nebel).

Oídos

SECRECIÓN DE OÍDOS AMARILLENTO, espeso, ofensivo.

Sensación de obstrucción de conducto auditivo.

Zumbidos.

Aparato digestivo

BOCA :

Gusto pútrido y viscoso con aliento fétido.

La lengua puede estar pálida, floja, toma fácilmente la impresión de los dientes, lo que recuerda a merc.
Puede estar cargada, blanca y limpia durante reglas.
Puede haber sensación de ardor como si hubiera sido quemada, en paladar y lengua, sobre todo marcada en la punta.
Odontalgia peor al contacto del aire, en el lecho o comiendo caliente.

Labio inferior hinchado con grietas sobre todo al medio.

ESTOMAGO :

NO TIENE HAMBRE, puede haber ANOREXIA.

DESEA COSAS ÁCIDAS, VINAGRE, PICKLES, condimentos y la satisfacción del deseo parece aliviar los síntomas. (ant. crud.).

NO PUEDE SOPORTAR LECHE que la agrava (aeth., calc. ost., carb. veg., conium, magn. mur., magn. carb., nat. carb., sulph.); no le gusta mucho la CARNE (alumina, arnica, calc. ost., carb. veg., puls., sulph.).

A menudo LA VISTA U OLORES DE ALIMENTOS LE DAN NAUSEAS (colch.) NAUSEAS A LA MAÑANA ANTES DE COMER.

Esto hace a veces de sepia un buen remedio para náuseas y vómitos de embarazo. (nux v.).

Aunque la anorexia sea una de las características de sepia, se ha notado a veces GRAN SENSACIÓN DE HAMBRE difícil DE SATISFACER AUNQUE COME ENORMEMENTE.

Este síntoma que parece contradictorio con la anorexia que parece ligada al estado de insuficiencia hepática se explica si se lo considera en conexión CON LA GRAN FATIGA DEL REMEDIO y sobre todo con LA SENSACIÓN DE VACÍO, DE TIRONES EN EPIGASTRIO Y ABDOMEN Y PTOSIS DE VÍSCERAS DE PARTE INFERIOR DEL TRONCO.

Sensación de vacío, tirones, gran hambre, que no mejora comiendo o mejor por poco tiempo.

Todo tiene gusto muy salado (carb. veg., china) (Boericke).

Dispepsia ácida con abdomen hinchado y eructos agrios.

Tendencia a vomitar después de comer.

Trastornos dispepticos con lengua blanca y gusto ácido y amargo.

Pirosis.

Eructos ácidos.

Dolor de cintura alrededor de hipocondrio.

Generalmente los trastornos dispepticos van asociados a síntomas uterinos.

Dispepsia por tabaco.

ABDOMEN, RECTO Y DEPOSICIONES :

SENSACIÓN DE PTOSIS, RELAJAMIENTO DE ÓRGANOS DEL ABDOMEN QUE RESPONDE A REALIDAD ANATÓMICA.

Abdomen hinchado, distendido y digestión intestinal lenta, con ruidos, presión y pesadez abdominal.

SENSACIÓN DE PLENITUD, PRESIÓN, PINCHAZOS EN REGIÓN DEL HÍGADO QUE ESTACIONADO, MAS O MENOS HIPERTROFIADO Y DOLOROSO A PALPACIÓN, CON MANCHAS AMARILLAS EN PIEL DE ABDOMEN.

INTESTINO PEREZOSO; DEPOSICIONES DURAS, INSUFICIENTES, PERO AUN NORMALES EXPULSADAS CON DIFICULTAD.

ESCIBALOS MARRÓN OSCUROS, PEGADOS POR MUCUS.

SENSACIÓN DE PESO, BOLA EN RECTO, QUE NO SE ALIVIA POR DEPOSICIÓN.

SENSACIÓN COMO DE BOLA EN RECTO; NO PUEDE HACER ESFUERZOS; tenesmo con puntadas de abajo a arriba.

CONSTIPACIÓN POR FALTA DE DESEO Y NECESIDAD DE EVACUAR DURANTE DÍAS Y DÍAS; PROFUNDA INACTIVIDAD, GRAN PEREZA DE RECTO NO PUEDE EXPULSAR LA DEPOSICIÓN.

Tejidos, alrededor de recto, relajados e infiltrados de sangre venosa; esto puede traer PROLAPSO RECTAL, GRUESAS HEMORROIDES SALIENTES Y SECRECIÓN CONSTANTE, HUMEDAD TENAZ DE ANO.

HEMORROIDES SENSIBLES Y DOLOROSAS QUE SANGRAN AL EVACUAR CON SENSACIÓN DE PLENITUD EN RECTO, COMO SI ESTUVIERA DISTENDIDO POR CUERPO EXTRAÑO QUE EXCITARA LA NECESIDAD DE EVACUAR (NUX V.).

Aparato urinario

Puede haber DESEO ANORMALMENTE FRECUENTE DE ORINAR Y MICCIONES REPETIDAS por presión de vejiga por ptosis de órganos pelvianos sobre todo útero, que puede estar prolapsado o en ante flexión.

VEJIGA IRRITABLE Y SECRECIÓN INVOLUNTARIA DE ORINA EN EL PRIMER SUEÑO.

INCONTINENCIA; en el primer sueño, en cuanto se duerme; aquí generalmente sepia sigue bien a caust.

ORINA DE OLORES FÉTIDOS PARTICULARES, a tal punto que no puede tenerse en la pieza; muy turbia en reposo y con DEPOSITO QUE SE ADHIERE MUY TENAZMENTE COMO ARCILLA QUEMADA Y MOLIDA, MARRÓN O ROJIZA COMO POLVO DE LADRILLO. (caust., kali carb., berb. vulg., benz. ac.).

Órganos genitales

MASCULINOS :

Transpiración irritante de escroto.

Debilidad de órganos sexuales.

Frigidez.

"Gota militar"; secreción liviana pasiva, durante mucho tiempo; frecuentes emisiones de esperma acuoso y claro.

Se considera a sepia y kali hydr., como grandes remedios para gota crónica, "gota militar", persistente.

Condilomas alrededor de glánde.

FEMENINOS :

He aquí una gran esfera de acción del remedio tanto directamente como por acción refleja.

Sus síntomas en órganos genitales de la mujer son muy marcados, muy profundos, muy característicos.

EN ÚTERO, DOLORS COMO DE PARTO, CON SENSACIÓN TAL QUE DEBE CRUZARLAS PIERNAS Y SENTARSE CON LAS PIERNAS APRETADAS, COMO SI DESEARA RETENER ALGO QUE TRATARA DE SALIR POR VAGINA. (bell., kreos., lac. can., lil. tig., nat. carb., y podoph.).

DOLORS DE ÚTERO, SENSACIÓN DE PRESIÓN HACIA ABAJO, DE ESPALDA A ABDOMEN, QUE CAUSA OPRESIÓN Y CRUZA LAS PIERNAS PARA EVITAR PROLAPSO DE ÚTERO.

PESADEZ COMO SI ALGO QUISIERA PASAR A LA FUERZA A TRAVÉS DE VULVA Y

ESTA SENSACIÓN PARECE ALIVIADA POR SENTARSE CRUZANDO LAS PIERNAS.

A esta sensación de pesadez con asociado DOLOR DE ESPALDAS, EN REGIÓN LUMBO SACRA, PEOR CUANDO ESTA PARADA O CAMINA.

DOLORS ARDIENTES DE ÚTERO Y A VECES DOLORS AGUDOS LATENTES HACIA LA PARTE SUPERIOR DEL ÓRGANO; PUEDE HABER SENSACIÓN DE CONSTRICCIÓN DOLOROSA COMO SI EL ÚTERO FUERA AGARRADO POR UNA MANO.

CONGESTIÓN O INDURACIÓN DE CUELLO DE ÚTERO CON SENSIBILIDAD O ARDOR.

OBSTRUCCIÓN CONGESTIVA DE ÚTERO QUE ES DESPLAZADO, PROLAPSADO O EN MALA FLEXIÓN; Y LEUCORREA ABUNDANTE GRIS AMARILLENTO, MUY FÉTIDA.

REGLAS EN GENERAL TARDÍAS Y POCO ABUNDANTES AUNQUE EXCEPCIONALMENTE PUEDEN ADELANTARSE Y SON PROFUSAS.

Antes de reglas, cólicos; durante reglas, melancolía, odontalgia, cefalalgia, FATIGA DOLOROSA DE MIEMBROS, O CÓLICOS ESPASMÓDICOS Y SENSACIÓN DE PRESIÓN, PESADEZ EN REGIÓN UTERO-VAGINAL.

REGLAS IRREGULARES : atrasadas y poco abundantes, o adelantadas y profusas con sangre negra.

Conium tiene reglas semejantes con curiosa relación refleja entre útero y senos que están grandes y dolorosos antes de reglas.

Iodium : igualmente y esta irregularidad de reglas va acompañada de vértigos y palpitación.

Senecio : además de reglas irregulares, dismenorrea por falta de tonicidad de útero.

Thuya : en general se agrava durante reglas, irregulares como sepia; tiene dolores como de parto.

LEUCORREA AMARILLO VERDOSO CON MUCHA COMEZÓN Y FETIDEZ EN GENERAL. (ars. alb., cham., bovista, hydrast., lach., lill., merc., nat. sulph.).

Dolores picantes en parte superior de vagina, que irradian hasta ombligo.

VAGINA DOLOROSA DURANTE COITO.

El conjunto de esta acción de sepia sobre órganos genitales femeninos lo tienen también dos medicamentos que desarrollan en esta esfera un cuadro patogenético muy parecido : mur. purp. : sensación de vacío, desfallecimiento en boca de estómago y de presión hacia abajo, como si órganos de pelvis menor quisieran salir, "Dolores de útero; sensación de dolorimiento en útero (helon.), "siente" el útero; útero tan doloroso que no puede caminar sin sufrir; sensación de ptosis, de prolapso uterino, con verdadera ptosis uterina; hipertrofia de útero con tenesmo pelviano y dolores punzantes que irradian al pecho y agravado acostándose; dismenorrea y endometritis crónica con desplazamiento uterino; necesidad de apretar los muslos como para retener el contenido pelviano" (Nash). Todo esto se parece a sepia; pero la gran diferencia es que en sepia no hay deseo sexual, hasta hay aversión, sobre todo cuando hay prolapso.

En mur. purp. deseo contrario, EXTREMADAMENTE VIOLENTO, IRRESISTIBLE; EL MAS LIGERO TOCAMIENTO PUEDE LLEVAR AL PAROXISMO ESTA FIEBRE SEXUAL, ESTA IRRITACIÓN DEL ERETISMO GENITAL POR EL MAS LIGERO CONTACTO ES CASI CARACTERÍSTICA (Nash).

La enferma de mur. purp., es fácilmente excitada y sigue el camino casi siempre fatal de la ninfomanía (lil. tig., platina).

EL MENOR CONTACTO EN VULVA PROVOCA VIOLENTO IRRITACIÓN SEXUAL (orig., zincum).

En esfera genital lill. tigr. es muy parecido a sepia : conviene a muchos estados reflejos que dependen de ciertas condiciones patológicas del útero y sus reflejos.

Lill. tiene de manera muy marcada este síntoma : PESADEZ CON SENSACIÓN COMO SI EL CONTENIDO DE LA PELVIS QUISIERA SALIR POR VAGINA A MENOS QUE LO CONTENGA POR PRESIÓN DE LAS MANOS O SENTÁNDOSE.

Es muy eficaz en desplazamientos uterinos : la sensación de constante pesadezhacia abajo en región uterina va acompañada de sensación muy marcada como si las VÍSCERAS PELVIANAS Y TODO EL CONTENIDO ABDOMINAL FUERAN ATRAÍDOS HACIA ABAJO HASTA LA VAGINA; ESTA SENSACIÓN DE PTOSIS SE SIENTE TAMBIÉN EN EL PECHO, HASTA LOS HOMBROS.

El diagnóstico entre lill. tig. y sepia no siempre es fácil; los casos de sepiason más bien crónicos, los de lill. tienen manifestaciones más intensas, dolorosas, molestas, más agudas; pero si la caquexia del remedio es bastante marcada, decidirá en favor de sepia.

Lill. tig. TIENE MAS IRRITACIÓN URINARIA QUE sepia, más frecuente necesidadde orinar y los trastornos de la micción son tan intensos que hacen pensar en cantharis; siempre en lill. tig. a la irritación vesical puede agregarse verdadera IRRITACIÓN RECTAL y (recordemos al respecto a merc. corr., caps., y nux v.) (Nash).

En ciertos casos de lill. los síntomas uterinos pueden estar disfrazadospor TRASTORNOS VIOLENTOS DE CORAZÓN : palpitaciones, latidos, dolores vivos, agudos, sensación como si el corazón estuviera apretado por una mano de hierro (cactus).

Pero en realidad todos estos trastornos : cardíacos, urinarios y rectalesparecen de origen reflejo cuyo punto de partida se encuentra en útero y ovarios.

Aparato circulatorio

Gran congestión venosa principalmente de sistema porta.

Sepia puede tener gran resonancia sobre manifestaciones circulatorias.

Llamaradas de calor que comienzan en el tronco y suben a la cabezacon ansiedad y sensación de presión y terminan en transpiración.

Se nota también sensación de congestión latente, pulsátil, particularmente en epigastrio, región hepática, uterina y riñones.

Dolores latentes de útero que está repleto de sangre caliente, sensible altacto, pesado y desplazado de su posición normal.

Manos calientes y pies fríos o en cuanto los pies se calientan, lasmanos se enfrían.

Palpitaciones de corazón a la noche después de la comidas.

Suspensión de latidos de corazón con gran angustia sobre todo al levantarsede la cama.

Epistaxis por supresión de reglas (phosph., puls., etc.) o estando enpieza demasiado caliente.

Aparato respiratorio

NARIZ :

Catarro crónico con secreción mucosa espesa, abundante, no irritante (kali bichr., puls.).

LARINGE :

Ronquera súbita, sequedad de laringe y tráquea.

Escozor de laringe.

BRONQUIOS Y PULMONES :

Tos que parece venir de estómago o abdomen, con expectoración salada y pinchazos en epigastrio.

Tos a la mañana con expectoración abundante, salada.

Tos seca, breve, espasmódica, fatigante, a la noche en cama, casi sinexpectoración.

El Dr. Pierre Schmidt, en la publicación de un caso interesante ; "La tos desepia" señala como grandes características : agravación de la tos por posición acostada y mejoría sentándose; tos que impide dormir y despierta, tos que parece venir del estómago; debe apretarse el pecho mientras tose.

Asma nocturna.

Disnea peor después del sueño.

Espalda y extremidades

Sensación de debilidad en parte baja de la espalda.

TODOS LOS DOLORES PARECEN IRRADIAR A LA ESPALDA.

Sensación de frío entre hombros (ab. can., amm. mur., capsic., lach. nant.).

Debilidad en base de riñones.

DEBILIDAD EN ARTICULACIONES SOBRE TODO TIBIO-TARSIANA que se tuerce fácilmentecuando camina.

Indicado en casos en que las articulaciones se dislocan fácilmente. (caust.).

Temor continuo de torcerse.

Sensación de pesadez y rotura en miembros.

Crujidos de rodillas y tobillos.

Rigidez de extremidades inferiores y rengueo; rigidez de tendón de Aquiles.

Piel

Como consecuencia de mal estado de hígado, hay en piel numerosas MANCHAS AMARILLO MARRÓN en la cara, donde tienen el aspecto característico ya descrito, en pecho y vientre.

Pecas en mujeres jóvenes.

Muchos síntomas de piel dependen de la circulación venosa defectuosa que la hace más susceptible.

Sensibilidad dolorosa de piel, que está HÚMEDA sobre todo en rodillas y otras articulaciones.

ENROJECIMIENTO Y COMEZÓN que se transforma a menudo en sensación de ardor, después del rascado, (sulph.).

ERUPCIONES VESICULOSAS ALREDEDOR DE BOCA Y MENTÓN.

Herpes.

Erupciones herpéticas, vesiculosas, principalmente en ARTICULACIONES, codos, rodillas y sobre todo articulaciones de dedos que se localizan SOBRE TODO EN PLIEGUES DE FLEXIÓN, pues es una característica general del remedio determinar TRASTORNOS CUTÁNEOS, PARTICULARMENTE EN PLIEGUES ARTICULARES.

PRURITO NO MEJORADO POR RASCADO.

Sepia causa y cura, como sulph., numerosas formas de erupción de piel; hay gran parecido entre estos dos antipsóricos; cada uno de ellos sigue a menudo bien al otro, por supuesto cuando los síntomas concuerdan, cosa frecuente.

Sepia puede presentar ULCERACIONES PERO GENERALMENTE INDOLORAS que no se encuentran en borax ni en merc.

LA PIEL de sepia tiene en GENERAL MAL OLOR.

Transpiración fétida en axilas; HIPERHIDROSIS Y "BRONQUIDROSIS"; transpiración de pies, sobre todo en planta y dedos grandes, de olor fétido.

Relaciones

Incompatibles

Lach., puls.

Antídotos

Aconit., antim. crud., rhus tox.

Complementarios

Nat. mur., nux v., que intensifica su acción.

SILICEA

Silicea, tierra silicea o ácido salicílico es un compuesto oxigenado de silicium.

Se encuentra en la naturaleza en gran número de variedades minerales : cristal de roca, sílex, ágata, ónix, ópalo etc.

Para preparar el medicamento homeopático se usa silicea pura extraída de cristal de roca.

Las tres primeras dinamizaciones por trituración; a partir de la tercera se obtienen las más elevadas por dilución hahnemanniana.

Es uno de nuestros grandes remedios constitucionales, pero sólo puede tener valor como tal si se desarrolla el poder terapéutico por procedimientos de dinamización de Hahnemann.

En estado natural, es un cuerpo insoluble de acción nula; dinamizado es uno de los remedios más poderosos de la Materia Médica : es un gran ejemplo de la eficacia de la potencialización.

Acción general del medicamento

PREDOMINA EN TEJIDO CONJUNTIVO, es como una especie de cemento celular.

Es esencial en número considerable de PROCESOS DE ASIMILACIÓN en los tejidos más diversos : nervioso, cutáneo, ganglionar, óseo, fibras elásticas de aparato pulmonar y sistema vascular.

DOMINA EN CIERTO MODO LA NUTRICIÓN GENERAL DEL INDIVIDUO y responde A MALA ASIMILACIÓN, PERTURBACIÓN EN CAMBIOS NUTRITIVOS, EN GRADO DE DESMINERALIZACIÓN AVANZADO DE LA CÉLULA y se manifiesta por EXTREMA DEBILIDAD FÍSICA Y MENTAL, y en el niño por DETENCIÓN DE DESARROLLO.

Está en relación estrecha con inflamación de tejidos, cuando ha progresado hasta SUPURACIÓN.

Cada vez que se ha formado pus, puede estar indicada.

Como calc. sulph., corresponde a procesos supurativos; particularmente cuando la zona está infiltrada y debe continuar hasta que toda infiltración desaparezca.

Si la curación tarda y la supuración persiste corresponde calc. sulph.

Características

1) CONSTITUCIÓN Y TIPO : Acción lenta.

Se necesita mucho tiempo para desarrollar los síntomas.

Por eso conviene a enfermedades de desarrollo lento.

Se ve, en ciertos momentos del año y en ciertas condiciones, aparecer síntomas que muestran que su influencia dura siempre y puede persistir en algunos por el resto de su vida.

Así actúan los medicamentos de acción larga y profunda; son capaces de impregnar profundamente el organismo, descubren taras hereditarias dormidas y las hacen manifestar por síntomas aparentes (Kent).

Conviene mejor a individuos que desarrollan muy completamente su historia patogenética : HIPERSENSIBLE, DELGADO NO POR FALTA DE ALIMENTACIÓN, SINO DE ASIMILACIÓN (Nash).

El niño de sílicea no es anormalmente gordo, pero tiene vientre grande, miembros delgados, cara desdichada, envejecida; no aumenta de peso, ni fuerzas, tarda en caminar; parece detenido en su desarrollo : Cabeza muy grande, transpira fácilmente, cuero cabelludo, cuello y cara; calc.

ost., transpira en cuero cabelludo solamente.

Niños escrofulosos con vientre grande y tobillos débiles, transpiran abundantemente toda la cabeza.

Constipación fácil característica : hace violentos y largos esfuerzos y consigue deposición incompleta que no tarda en volver a entrar casi completamente, como si su debilidad general afectase poder expulsivo de recto.

En otros casos, diarrea persistente especialmente durante dentición o calores; no tiene dos deposiciones iguales pero no hay que dejarse engañar por este solo síntoma y dar puls.

Este pequeño enfermo come bien, pero conserve o no su alimento la debilidad aumenta, la delgadez progresa y puede haber muerte por inanición.

Nervioso, movedizo, inquieto, agitado, hipersensible; inteligente, extremadamente sensible, moral y físicamente, se estremece al menor ruido; ansioso, tímido, propenso a ideas fijas, testarudo, obstinado.

El adulto delgado, débil, con músculos blandos, como su moral y sistema nervioso que están debilitados; deprimido, afectado por agotamiento con eretismo, irritable, débil, tímido, sumiso, dócil, se deja estar sin energía; el trabajo mental le es muy difícil; leer, hablar, pensar, la fatigan.

2) ESQUEMA COMPARATIVO ENTRE EL NIÑO DE calc. ost., calc. phosph., sílicea y sulphur : I. calc. ostrear.

1) CUERPO GORDO, HINCHADO; LEUCOFLEMÁTICO; OLOR AGRIO EN TODO EL CUERPO MUY DIFERENTE DEL OLOR FÉTIDO DE sulphur.

2) NIÑOS APÁTICOS.

3) PIEL PÁLIDA, BLANCA, COMO CRETA.

Tez clara, ojos azules, CABELLOS RUBIOS.

4) CABEZA GRANDE, cubierta de transpiración abundante, PERO SOBRE TODO EN CUERPO CABELLUDO.

5) VIENTRE GRANDE, DURO, HINCHADO, EN MEDIO DEL CUERPO DEMASIADO GORDO.

6) DESEO DE HUEVO; TOLERA MAL LA LECHE.

7) Deposiciones acuosas CON RESTOS DE ALIMENTOS NO DIGERIDOS.

II. calc. phosph. 1) Sujeto MAGRO, con cuerpo enflaquecido.

2) Niños HURANOS, comprenden mal.

3) Tez y ojos oscuros, MOROCHOS.

4) VIENTRE HUNDIDO Y BLANDO.

5) DESEO DE TOCINO Y JAMÓN.

6) DEPOSICIONES VERDES, viscosas, en chorros con muchos gases fétidos.

III. sílicea 1) Niño FLACO con miembros delgados.

2) Niños voluntariosos, obstinados, movedizos, agitados.

Hipersensibles.

3) CARA INFELIZ Y AVEJENTADA.

4) Cabeza grande, transpira abundantemente, TANTO DE CUERO CABELLUDO COMO DE CARA Y CUELLO.

5) VIENTRE GRANDE, se destaca en la delgadez del cuerpo.

6) FALTA DE APETITO Y GRAN SED.

7) CONSTIPACIÓN ESPECIAL : La deposición sale con mucha dificultad pero cuando comienza a ser expulsada, vuelve a entrar.

IV. sulphur 1) Niño de CUERPO FLACO, piel floja y arrugada, VIEJECITO, ASPECTO DE SUCIO, HUELE MAL.

2) Niños IRRITABLES Y GRUÑONES.

3) Cara pálida, AVEJENTADA, LABIOS MUY ROJOS, GRANATES como las OREJAS.

4) Cabeza GRANDE, TRANSPIRAN ABUNDANTEMENTE DURANTE EL SUEÑO.

5) VIENTRE GRANDE, llama la atención en medio del cuerpo flaco.

6) Aunque gran comilón, está delgado; BEBE MUCHO, DESEA DULCES.

A) VIENTRE HUNDIDO, BLANDO. Calcarea phosphorica Transpiración abundante de cabeza, sobre todo durante el sueño.

Enrojecimiento de orificios del cuerpo.

Cabeza (arriba) caliente y pies fríos.

1. NIÑO FLACO B) GRAN VIENTRE QUE LLAMA LA ATENCIÓN EN CUERPO DELGADO sulphur
Sucio, maloliente; gran apetito a pesar de lo cual está delgado.

silicea Gran sed, deseo de confituras; irritable, gruñón.

Sudor de toda la cabeza.

Gran sed; constipación especial.

Hipersensibilidad.

2. NIÑO GORDO) VIENTRE GRANDE EN MEDIO DE CUERPO REGORDETE, blando como carácter; huele agrio.

Calc. ostrear.

Conviene a estados de malformación en niños cuyos fascículos nerviosos no han tenido crecimiento normal, estados de debilidad nerviosa seria en agotados por trabajo intelectual, tristeza, vida desordenada.

Indicado en supuraciones crónicas : tisis, bronquiectasia, gangrena pulmonar, en que el almacén del órgano está como roído por lesión, abscesos, ulceraciones, fistulas interminables, caries óseas, en caquéticos.

Influencia beneficiosa en arteriosclerosis al principio, en evolución de tumores muy duros : escirros, osteomas, etc. (Dr. Mouézy-Eon).

En caquexias en linfáticos o agotados por largas enfermedades, cuando esas caquexias se caracterizan por eretismo, fiebre lenta, agravada después de comer, constipación, esputos abundantes o vómitos a la mañana, cefalalgia obtusa, dolores erráticos muy vivos, piel terrosa, amarillenta, seca y lisa, *a veces cubierta de manchas ptiriásicas, silic. es el más apropiado para restablecer la armonía de funciones, reconstruir tonicidad de trama orgánica, plasticidad de sangre, dirigir fuerzas nutritivas, activar vitalidad de sistema óseo y piel.

Es uno de los remedios esenciales en diatesis purulenta, sobre todo después de largas enfermedades y cuando hay eretismo interno y expansión con descomposición pirogénica de piel en tejido celular subcutáneo, abscesos de superficie. (Dr. Espanet).

3) FALTA DE VITALIDAD PARA RESISTIR INFLUENCIAS EXTERIORES : Parece haber falta de poder nervioso reaccional de vitalidad PARA RESISTIR las influencias deprimentes exteriores (Nash).

FALTA DE CALOR VITAL, TIENE SIEMPRE FRÍO, AUN HACIENDO EJERCICIO (Hering).

Muy sensible al aire frío, toma frío fácilmente; ESTA MEJOR AL CALOR que su falta de calor natural y le da temperatura que no puede darle su propia combustión.

4) Silicea Y LA SUPURACIÓN : Silicea puede ser un precioso recurso en la supuración.

Es útil en período más tardío que hep. sulf. calc., cuando la supuración no quiere cesar ni producirse cicatrización normal, como en abscesos fríos, etc.

Parece indicado en SUPURACIONES DE TIPO INDOLENTE NO NECESARIAMENTE MALIGNAS, PERO CON MAS O MENOS TENDENCIA A CRONICIDAD.

La constitución tiene gran importancia para la elección.

Si se elige juiciosamente es muy útil primero, actuando localmente y secundando la supuración, luego levantando el estado general más o menos afectado por larga supuración.

Comparar con calc. sulph.; la diferencia está en que silic. favorece la supuración, hace madurar el proceso y vacía el absceso; calc. sulph. favorece la detención y formación de brotes cicatriciales.

Modalidades

Lateralidad

Izquierda.

Agravación

a) POR FRÍO AL AIRE LIBRE, EN INVIERNO, DESTAPÁNDOSE A LA MAÑANA, ACOSTADO.

Friolento, sus síntomas desarrollan particularmente en tiempo frío y húmedo y pueden mejorar en tiempo frío y seco (Kent).

b) Por humedad; a veces los síntomas aparecen después de un baño.

c) DURANTE REGLAS.

d) En luna nueva y durante luna llena.

Mejoría

a) POR CALOR, en verano, se envuelve la cabeza; se AGRAVA POR EXTREMOS DE CALOR Y FRÍO; fácilmente afectado por diferencia de temperatura aún de algunos grados; enferma por tener mucho calor, se acalora y transpira fácilmente a la menor elevación de temperatura y se resfría (Kent).

b) Siendo magnetizado. (phosph.).

Síntomas mentales

Produce sobre sistema nervioso tendencia de debilidad PARALÍTICA, que parece debida A NUTRICIÓN DEFECTUOSA DE NERVIOS Y CEREBRO.

Este estado paralítico va acompañado de constipación característica e hiperestesia sensorial, hipersensibilidad a estimulantes nerviosos.

Cerebro y médula no pueden soportar choque ni vibración común, superficie del cuerpo hipersensible a tacto e impresiones exteriores.

LA INDOLENCIA ES UNA CONTRAINDICACIÓN DE silic. EN ESTADOS NERVIOSOS; no se debe emplear en individuos flojos, sin nervios; exactamente lo contrario en trastornos de tejidos inferiores, la supuración, por ej., indolente.

Moral debilidad como todo el sistema nervioso en general.

Silic. es al espíritu humano lo mismo que el tallo de trigo.

Mirad el exterior liso, rígido, sólido, de un tallo de trigo y veréis con qué firmeza llevará la espiga; esta fuerza la debe a silic. acumulada poco a poco en sus tejidos para darle rigidez y resistencia necesarias.

Así pasa con la mente : cuando el individuo necesita silic., está en gran estado de debilidad, temor, impotencia y tiene conciencia de su impotencia (Kent).

TÍMIDO, ANSIOSO, PUSILÁNIME, CEREBRO FATIGADO, REFLEXIONA DIFÍCILMENTE, LE CUESTA FIJAR SU ATENCIÓN; DEBE SER ESTIMULADO PERO SE FATIGA FÁCILMENTE MORAL Y FÍSICAMENTE.

DESALENTADO, HURAÑO, TIENE ASCO POR LA VIDA.

Los escolares, se confunden al recitar sus lecciones porque no pueden concentrar su atención.

Debería reflexionar más pero son incapaces.

Un abogado en un pleito, un pastor u orador acostumbrado a hablaren público con confianza, seguridad, en plena posesión de su mente o palabra dirá que tiene aprensión de hablar ante un auditorio porque tiene conciencia de no poder hacerlo, de no poderse concentrar; tiene miedo de no poder arreglarse, su mente no quiere funcionar; está fatigado por el esfuerzo prolongado de trabajo mental asiduo.

Pero hace un esfuerzo de voluntad y decide vencer el temor, el propio dominio vuelve y puede hacer su discurso con soltura; la tarea se cumple rápida y correctamente.

El estado especial de silic. consiste EN TEMOR DE NO TENER ÉXITO, SI SE LE EXIGE UN ESFUERZO MENTAL O TRABAJO INTELECTUAL INUSITADO.

TEME NO ESTAR A LA ALTURA DE SU TAREA, FRACASAR, Y SIN EMBARGO CUANDO ESTÁ OBLIGADO A HACERLO, LO LOGRA CON ÉXITO.

He aquí otro ejemplo : un joven que terminó sus estudios, cerca de fin de curso, teme extremadamente el examen final y sin embargo lo aprueba, pero enseguida es presa de gran fatiga mental; no puede ejercer la profesión a la cual estaba destinado pues teme emprender cualquier cosa.

Lycop., está realmente embrutecido y su temor a emprender algo proviene de la comprensión de su incapacidad intelectual, que es real, mientras en silic.

es imaginaria.

Silic. no conviene a agotamiento nervioso, por surmenage por negocios, sino más bien al de estudiante, abogados, predicadores.

Un abogado dice : "no me he sentido bien desde el proceso X, que me exigió largo esfuerzo intelectual con insomnio".

Silic. volverá a poner en buena forma a tal cerebro.

Este miedo de fracasar en algo y que al final resulta bien, es el estado del principio de la moral del sujeto que necesita silic.; llega un momento en que no puede cumplir su trabajo con exactitud y por lo tanto puede necesitar silic.

(Kent).

NERVIOSO, IRRITABLE, MUY SENSIBLE A TODAS LAS IMPRESIONES, HIPERSENSIBLE AL RUIDO, ETC., CON ANSIEDAD, GRAN IRRITABILIDAD, NIÑOS VOLUNTARIOSOS, OBSTINADOS, HIPERSENSIBLES, AGITADOS, MOVEDIZOS.

Irritable, irascible, cuando está animado; cuando lo dejan tranquilo, tímido; trata de escapar a todo; niñas suaves, tímidas, lloronas.

El niño, gruñón, llora cuando le hablan.

Es el complemento natural y crónico de puls., por su gran parecido; es más profundo y extenso.

Silic. cura superimpresionabilidad en personas de nutrición insuficiente, no por calidad y cantidad, sino por falta de asimilación; son constipadas, propensas a neuralgias súbitas, erotismo, melancolía (Espanet).

Hipocondría religiosa; tristeza; irascibilidad; depresión (Kent).

Ideas fijas; ideas fijas de alfileres : les teme, los busca, los cuenta.

Estado mental particular marcado por tendencia a jugar durante horas con alfileres o agujas.

Sueño

Insomnio con congestión y calor en cabeza; INSOMNIO POR ORGASMOS SANGUÍNEOS; palpitaciones, pulso rápido, calor, comienza a transpirar en cuanto se duerme. (puls., conium).

Insomnio nocturno con sueño interrumpido por sueños lascivos o terroríficos.

Tufaradas de calor, borboteo de sangre, somnolencia de día y gran agotamiento; insomnio obstinado, a menudo sin ninguna afección orgánica (Espanet).

Frecuentes sobresaltos, sacudidas de miembros durante el sueño.

Habla dormido; tiene sueños angustiosos.

Sale de su lecho dormido; sonambulismo.

Inquietud nocturna con sueños lascivos o terribles, ansiedad nerviosa con movimientos congestivos de cabeza, latidos y borboteo de sangre y aunque los síntomas del sueño varían, a veces una de las contraindicaciones de silic., es el sueño apacible (Espanet).

Cabeza

Cuero cabelludo muy sensible y fácilmente doloroso.

Puede ser sede de prurito marcado o DE ERUPCIONES HÚMEDAS, eczematosas, escamosas.

Caída de cabello.

Erupción ofensiva en cuero cabelludo, particularmente en occipucio.

TRANSPIRACIÓN DE CABEZA EN NIÑOS, COMO SI HUBIERA TENIDO ENVOLTURAS CALIENTES; FONTANELAS ABIERTAS.

Puede ser muy útil cuando hay especies de nódulos generalmente de origensifilítico bajo cuero cabelludo, entre piel y huesos del cráneo; y para tratamiento de ulceraciones fagedénicas sifilíticas de cuero cabelludo.

Hay numerosos síntomas cefalálgicos : DOLOR DE CABEZA CEREBRO ESPINAL, QUE COMIENZA EN NUCA Y ASCIENDE PROGRESIVAMENTE A CABEZA HASTA REGIÓN SUPRAORBITARIA DONDE SE FIJA.

Dolores de cabeza crónicos, con náuseas y aún vómitos.

Dolor de cabeza que comienza atrás, a la mañana o a medio día, con tendencia a ganar la frente, peor a la noche, agravado por ruido; MEJOR POR CALOR, neuralgia supraorbitaria mejorada por presión Y CALOR, con abundante transpiración de cabeza.

Dolor de cabeza de nuca a vértex, peor a la derecha, agravado por ruido, ejercicio, luz, y aliviado por calor : EN GENERAL MEJORA SU DOLOR ABRIGÁNDOSE LA CABEZA. (magn. mur., strontia).

Dolor de cabeza a través de nuca sobre todo a la derecha. (Parecido a sang.).

Sensación de peso en occipucio, como si fuera tirado hacia atrás por aflujode sangre a la cabeza, como carb. veg. y sepia.

Dolor de cabeza una vez por semana (gels., lycop., sang., sulph.).

Dolor de cabeza latente presivo, CON SENSACIÓN DE FRÍO EN LA CABEZA Y NECESIDAD CONSTANTE DE ABRIGARLA; DOLOR de cabeza agravado al aire frío; psorin. usa gorro de piel aún en verano; mag. mur. está mejor con cabeza cubierta pero quiere estar al aire libre.

Silic. evita el aire frío; necesita abrigarse la cabeza, sobre todo la parte dolorosa que transpira abundantemente.

Dolor de cabeza agravado por esfuerzo mental, estudios prolongados, movimiento, alteración de paso, luz, agacharse, esfuerzos para evacuar, hablar, al aire frío, por tacto.

Dolor de cabeza en ayunas.

Dolor de cabeza con vértigo que coincide con existencia de pequeños nódulos bajo el cuero cabelludo, después de haber tenido hambre, por irritación abdominal o fatiga nerviosa.

Dolor de cabeza presivo de arriba a abajo con prurito intermitente en vulva.

Silic. es apto para curar jaqueca esencial en vértigo y náuseas o vómitos, sobre todo a la mañana; los dolores son desgarrantes por accesos, parecen salir de los ojos a cada tirón.

Puntadas, latidos, vértigo forman parte de ella y el movimiento de los ojos hacia arriba o abajo o el agacharse aumenta el vértigo y se acompañan a menudo con sudores en la frente (Espanet).

El dolor de cabeza de silic. se parece a spig., par. quad., picr. ac., coccul., gels., sang., etc. (Boericke), también act. rac.

Puede ser útil en apoplejía cerebral precedida por dolor profundo en región parietal derecha y pesadez, entumecimiento y dolor con calambres en brazos.

Vértigos que parecen ir, como la cefalea, de médula a cabeza; agravados al levantar la cabeza, mirar arriba (puls.); vértigo con tendencia a caer hacia adelante y hacia la izquierda, vértigo laberíntico (natr. salyc.).

Ojos

Silic. tiene numerosos e importantes síntomas en ojos.

Hinchazón roja y caliente de párpados, más marcada a la mañana y disminuyendo durante el día, con secreción espesa y abundante supuración de borde de párpados con enrojecimiento, sensación de ardor, escozor, inflamación, caída de pestañas.

Es buen remedio para orzuelos, y VÍAS LAGRIMALES, en que desarrolla muchos síntomas tipo, particularmente en bolsa lagrimal.

Inflamación con supuración de vías lagrimales, "ángulo interno del ojo" enfermo; hinchazón de conductos lagrimales; fistulas lagrimales (nat. mur., petrol.).

Las afecciones del ojo van acompañadas de FOTOFobia intensa; la luz, principalmente del día hace doler y provoca encandilamiento.

Trastornos de visión; las letras bailan ante los ojos al leer.

Dolores agudos a través de los ojos que están sensibles al tacto, sobre todo cerrados.

Excelente remedio, cuando los otros síntomas concuerdan, en iritis e iridocoroiditis con pus en cámara anterior; en casos de perforación o úlcera de córnea, en abscesos de córnea después de traumatismo.

Oftalmias escrofulosas con inminencia de perforación de córnea, ulceraciones de córnea con hinchazón de bordes libres de párpados y casos muy graves de esa clase de oftalmias crónicas y a menudo indoloras (Espanet).

Oídos

Así como en trastornos del ojo, el nervio óptico es hipersensible a la luz, a menudo el nervio auditivo es hipersensible al ruido; hipersensibilidad al ruido.

Puede haber zumbidos, ruidos diversos asociados a diversas afecciones de estos órganos y aún sordera. Silbidos como producidos por chorros de vapor; estruendo como el de un tren al pasar; que puede ser provocado por causa exterior o estado de nervios, pero en general es un principio de catarro seco de oído medio.

Útil en catarro de oído medio y trompa de Eustaquio; hay una fase de sordera que dura cierto tiempo, luego del oído vuelve después de un ruido seco provocado por escape de mucus acumulado en oído o trompa y que el enfermo describe como detonación; detonaciones súbitas en el oído o ruidos como lejanos, acompañado de vuelta del oído. Estados catarrales de oído interno y trompa de Eustaquio con sensación súbita de obstrucción mejorada al bostezar o tragar (Kent).

Otorrea antigua, maloliente, espesa o grumosa.

Inflamación del oído medio, especialmente cuando hay supuración crónica.

Hinchazón inflamatoria de meato.

Otorrea con pus granuloso e icoroso con carie de células mastoideas.

Otitis supurada; carie de huesecillos.

Inflamación con supuración de oído después de un baño.

Eczema en pabellón de la oreja.

Tos espasmódica provocada al rascarse el conducto auditivo. (kali carb., mang.).

Cara

Pálida, cerosa; de aspecto fatigado la piel se agrieta fácilmente, particularmente en ala de nariz y labios que están agrietados; erupciones herpetiformes, acné, principalmente de mentón.

Puede haber sudor frío, pegajoso, maloliente en la frente.

Cuando hace un esfuerzo, aún ligero, TRANSPIRA PRONTO LA CARA, PARTE INFERIOR DEL CUERPO SECA O CASI; sólo un ejercicio violento provoca transpiración general; la transpiración de cara, cabeza y parte superior del cuerpo, es rasgo notable de silic.

Neuralgia facial con latidos, tirones, enrojecimiento de cara, peor en tiempo húmedo.

Ciertas neuralgias de cara, cabeza, ojos, dientes, oídos, necesitan silic.

Hay tirones, por sacudidas, dan puntadas desgarrantes; tocarlas agrava, en intervalos de paroxismos, hormigueos, prurito, debilidad; vista, oído, olfato exaltados al principio de la neuralgia o mientras dura; pierde a la vez agudeza y se embota; hay escalofríos y las extremidades están frías y por momentos, sudores parciales en pies, axilas; nariz seca, hay costras, excoiraciones en el interior; ojos lagrimosos, mucosa de boca irritada, pero piel generalmente lisa y pálida (Espanet).

Induración de tejido celular de cara por absceso de encías.

Carie y necrosis de huesos de cara con aberturas fistulosas.

Aparato digestivo

BOCA :

Síntomas marcados en labios.

Primero, LABIO SUPERIOR FRECUENTEMENTE HINCHADO como hep. sulf. calc.

De manera más general LABIOS AGRIETADOS, FISURADOS, SECOS, RESQUEBRAJADOS, ESCAMOSOS, particularmente, borde externo.

A lo largo del borde, contorno agrietado, costroso.

COMISURAS ULCERADAS, AGRIETADAS (amm. carb., aur. tryph., condurango, graph., nat. mur., nit. ac., hep. sulf. calc.).

Boca seca y puede haber sed viva.

Lengua revestida de capa marrón, tumefacta, excoirada, parece entumecida.

Un síntoma particular es : SENSACIÓN DE CABELLO SOBRE LA LENGUA, como all. sat., en que esta sensación es marcada sobre todo de noche y a la mañana; nat. mur.; nat. ph. : más marcada en la punta; kali bich. : en la base.

LOS DIENTES SE ARRUIAN POR ALTERACIÓN DEL ESMALTE, en sujetos con desmineralización de silic. marcada; la dentina contiene mucho silicato de calcio y la superficie del diente se hace rugosa, pierde su apariencia esmaltada y la carie poco a poco se instala; esto es más marcado a lo largo de la encía, en el cuello (Kent).

Los dientes duelen con tiempo húmedo y frío, dolor de muelas en tiempo lluvioso.

DIENTES AMARILLOS, se arruinan rápidamente y en cuello, se descaman, la encía se retrae (Kent).

Violento dolor de muelas de noche, cuando ni calor ni frío alivian y después de haber tomado frío en los pies.

En GENERAL, LOS DOLORS DE DIENTES DE silic. MEJORAN EN HABITACIÓN CALIENTE Y POR BEBIDAS CALIENTES (Kent).

Dolor de dientes muy profundo en periosteo, en vaina fibrosa de raíces y formación de absceso; FÍSTULAS DENTARIAS; ABSCESOS EN RAÍZ DE DIENTES.

PIORREA. (merc. sol.).

Encías sensibles al frío, al tacto; abscesos de encías; encías hinchadas y sensibles al frío.

El niño de silic., DENTICIÓN DIFÍCIL.

HINCHAZÓN E INDURACIÓN DE GLÁNDULAS SALIVARES, SOBRE TODO PAROTIDAS, se agrandan a cada resfrío y se hacen duras (bar. carb., calc., sulph.).

Puls. conviene más en inflamación aguda de parótida, silic. en formas crónicas, en casos en que la escrófula está en juego.

En estos viejos casos crónicos los síntomas están peor después de un baño, quiere calor, teme al frío, tiritita continuamente y en hipertrofia indurada de glándulas salivares y parótidas y ganglios de cuello.

Puede ser útil en inflamación aguda o reciente de esas glándulas, pero con modalidades contrarias; el enfermo se queja de tufaradas de calor, fiebre irregular, extremidades frías y parte superior del cuerpo caliente; transpiración marcada en cabeza y cuello; sensación de calor y sofocación en habitación caliente; en esto se parece a puls. : en sus manifestaciones crónicas tiene mucho calor, pero en sus enfermedades agudas es friolento.

Silic. y puls. tienen modalidades inversas en estados agudos y crónicos; puls.

en estados agudos es friolento y transpira (Kent).

FARINGE :

En resfríos que repiten sin cesar **ANGINAS, AMIGDALITIS A REPETICIÓN**, que bell.

u otros remedios han curado, pero que recomienzan siempre, silic. contienea menudo esta enfadosa tendencia; hay, en cierta manera, un catarro crónico de garganta que cada resfrío, cada enfriamiento despierta; silic. está al lado de nat. mur., para esos dolores de garganta inveterados.

ANGINAS PERIÓDICAS; enrojecimiento de mucosa faríngea; deglución difícil con dolores y pinchazos.

En **AMIGDALITIS SUPURADA**, cuando las amígdalas han evacuado su contenido purulento y sin embargo la cicatrización no se hace, hay que pensar en silic.

PARÁLISIS DE VELO DE PALADAR; los alimentos son expulsados por la nariz cuando trata de comer.

Al tragar se atora fácilmente.

ESTOMAGO :

FALTA DE APETITO Y GRAN SED.

Sin embargo, a veces hay gran hambre : la bulimia, especie de hambre canina que hace que se coma enormemente y a menudo, se relaciona con silic., sea esencial o sintomática, cuando los sujetos son secos, nerviosos, irritables, con mucha saliva, deposiciones fáciles o diarreicas y transpiración, sobre todo nocturna (Espanet).

AVERSIÓN MUY DECIDIDA POR ALIMENTOS CALIENTES, QUIERE COSAS FRÍAS; le agradan los helados, agua helada y se siente bien cuando los tiene en el estómago; a veces le es completamente imposible beber caliente, los líquidos calientes provocan transpiración en cara y cabeza y tufaradas de calor (bar. carb.) (Kent).

Pero aunque tenga aversión marcada por alimentos y bebidas calientes y los desea fríos, en afecciones del pecho bebidas y platos fríos aumentan la tos hasta sofocación y aparición de esfuerzos violentos para vomitar; es generalmente cubierto por carb. veg., pero silic. también lo tiene (Kent).

ASO POR CARNE, como alum., arnica, calc., carb. veg., puls., sepia, etc.; pero si come carne, la prefiere fría cortada en tajadas (Kent).

Intolerancia característica por **ESTIMULANTES ALCOHÓLICOS.**

LA LECHE NO LE CONVIENE.

El niño vomita inmediatamente después de mamar; diarrea causada por leche; se puede comparar a silic. con aeth. cyn., nat. carb., etc.

"Repugnancia por alimentos, pronta saciedad, pérdida de apetito, testimonio de atonía de órganos digestivos.

El hambre extraordinaria de ciertos casos, traiciona la necesidad urgente de la economía de reparar sus fuerzas agotadas y darle los materiales alimenticios que le faltan" (Espanet).

Estómago a veces débil, perezoso; antiguos dispépticos que vomitan desde hace largo tiempo tienen aversión marcada por comidas calientes, no pueden digerir leche, no les gusta la carne, se encuentran bien con silic. cuando los otros síntomas mentales y físicos concuerdan (Kent).

Hipo, náuseas; eructos ruidosos, ácidos o con el gusto de los alimentos; pirosis.

Vómitos sobre todo después de alimentos calientes; vómitos después de beber (ars. alb., ver. alb.).

Vómitos acuosos con escalofríos, lengua cubierta de capa marrón; náuseas con vómitos de lo que ha bebido, peor a la mañana; el agua tiene mal gusto; vomita después de beber (Kent).

Puede curar gastralgias sea con pirosis, hipos y náuseas y vómitos viscosos; hay calor, pesadez, sensibilidad y sensación de constricción; constipación obstinada, gases, eructos, somnolencia, agotamiento frío en extremidades; pérdida de apetito; digestión lenta; laboriosa; a menudo bulimia pero con imposibilidad de satisfacer el apetito (Dr. Espanet).

Después de la comida sensación de plenitud y peso en el estómago.

Sensibilidad de hueco epigástrico; sensación dolorosa de contusión a la presión.

ABDOMEN :

Hígado grande e indurado; en abscesos de hígado, silic. es útil cuando los otros síntomas concuerdan.

Abdomen duro, tenso, sobre todo después de comer; flatulencia y borborismos.

Dolor de contusión en abdomen; cólicos, dolores cortantes alrededor del ombligo con necesidad de evacuar; sensación de constricción a través del vientre; no le gustan vestidos ajustados y se agrava después de comer y el rasgo saliente es mejoría por calor.

RECTO Y DEPOSICIONES :

Prurito, ardor en ano y recto.

Hemorroides muy dolorosas.

FISURAS DE ANO con espasmos de esfínter.

FÍSTULA ANAL.

Sujetos que son buen terreno para tuberculosis, tienen fácilmente abscesos en región del recto, abscesos que al vaciarse provocan trayecto fistuloso que no cura; y este estado parece suplir una localización pulmonar que no tarda en mostrarse si se curan brutalmente estas fístulas por intervención quirúrgica intempestiva o cualquier otro medio externo; silic., al contrario pondrá las cosas en orden, en profundidad, en un lapso de 1 a 5 años.

Transformará el terreno tuberculoso y la fístula que ya no será necesaria para drenaje curará : durante cierto tiempo el enfermo está bien, algunos años sobreviene tuberculosis pulmonar u otra y muere.

Caut., berb., calc. phosph., graph., sulph., pueden compararse con silic. que sigue bien a thuya (Kent).

EL RECTO PARECE PARALIZADO; HACE VIOLENTOS ESFUERZOS PARA EVACUAR.

LA DEPOSICIÓN SALE DESPUÉS DE MUCHAS DIFICULTADES, PERO CUANDO HA SALIDO EN PARTE, VUELVE A ENTRAR.

Gran constipación por incapacidad de recto para expulsar materia fecal.

Es raro que la deposición permanezca en ampolla rectal sin provocar necesidad de expulsarla, como en alumina; hay en silic. necesidad marcada de evacuar, hace muchos esfuerzos, pero el recto es incapaz de expulsar la materia, la deposición puede estar formada por bolitas o largos trozos blandos o duros, pero cualquiera sea la naturaleza de la materia que la constituye, va acompañada de esfuerzos violentos, con dolores y transpiración de cabeza; hace esfuerzos violentos y repetidos, la deposición sale un poco, el esfínter se agota, vuelve a entrar y abandona su tentativa infructuosa, desesperada; sólo puede aliviarse con ayuda de medio mecánico.

Los violentos esfuerzos que acompañan la necesidad de evacuar se encuentran en muchos remedios, pero sobre todo, con silic. en alum., alumen., china, nat. mur., nux v., nux mosch. (Kent).

CONSTIPACIÓN CONSTANTE ANTES Y DURANTE REGLAS, con irritación de esfínter (graph., kali carb., nat. mur., plumb.).

Kent señala que en ciertos sujetos con síntomas característicos silic.

ha provocado expulsión de tenia, como calc., y sulph.

Diarrea causada por leche o humedad, mucosa, disenteriforme, sanguinolenta, de olor cadavérico con necesidades frecuentes y tenesmo.

Aparato urinario

Micciones frecuentes; deseo continuo y tenesmo.

La orina sale gota a gota con viva irritación de uretra.

Incontinencia nocturna en niños.

Orina poco abundante, se enturbia rápidamente **Y DEJA DEPOSITAR SEDIMENTO ROJO LADRILLO, ARENOSO.**

Orina sanguinolenta, involuntaria, deja sedimento rojo o amarillo.

ORINA PURULENTE, SUPURACIÓN DE VÍAS URINARIAS; SUPURACIÓN DE RIÑONES.

PROSTATITIS SUPURADA.

Órganos genitales

MASCULINOS :

ERETISMO SEXUAL con pensamientos lascivos persistentes y espermatorea nocturna con afección paralítica.

O al contrario **DEBILIDAD DESPUÉS DEL COITO QUE LO AGOTA**; aunque tenga relaciones con frecuencia moderada, queda agotado, necesita de 10 a 15 días para reponerse (agaricus) (Kent).

TRANSPIRACIÓN A VECES ABUNDANTE DE ESCROTO.

Puede haber erupción eczema tosa en escroto que se extiende a superficie interna de muslos.

INFLAMACIÓN E INDURACIÓN CRÓNICA DE TESTÍCULOS con muchos dolores y sensación dolorosa como si estuvieran apretados, comprimidos.

HYDROCELE.

ABSCESOS CON FÍSTULA de periné o un testículo o de pene o próstata.

Gonorrrea crónica con pus fétido y espeso.

Emisión de líquido prostático a cada deposición o micción.

FEMENINOS :

Como en el hombre, estado de deficiencia de funciones sexuales.

Comezón en vulva y vagina.

Silic. es un remedio de primer plano para abscesos fistulizados de vulva y vagina que dejan una vez cicatrizados nódulo fibroso que se siente bien bajo la piel, o cicatriza y segrega líquido maloliente, con olor a queso rancio.

En mujeres de tal tendencia, silic. los hace a menudo desaparecer (Kent).

Quistes serosos en vagina, desde el tamaño de una arveja hasta unanaranja o a veces pequeños quistes del grosor de una avellana agrupados; rhodo. y silic. los han curado cuando no hay otros síntomas (Kent).

También lycop. y puls. actúan bien en estos casos.

Reglas ADELANTADAS, muy abundantes, o demasiado débiles y a veces AMENORREA.

CONSTIPACIÓN DURANTE REGLAS; o sensación de ardor de vagina, con erupción encara interna de muslos, hacia vulva.

SECRECIÓN DE SANGRE ENTRE PERIODOS MENSTRUALES, PIERDE fácilmente sangre por útero; sobreviene hemorragia uterina antes de reglas por agitación, sobre todo en nodrizas : SECRECIÓN DE SANGRE POR VAGINA MIENTRAS CRÍA; cuando el niño mama, la secreción comienza; calc. ost. : hemorragias parecidas durante lactancia pero no especialmente cuando el niño mama (Kent).

Por secreción de sangre en períodos intermenstruales comparar con amb. gris., bovista, calc. carb., hamam., phosph., sabina, etc.

Muy útil en cura de ciertos casos de hidrosalpinx, piosalpinx.

Ciertas mujeres tienen en región ovárica, de un lado o del otro del útero, un pequeño tumor que crece hasta que súbitamente tienen por útero y vulva abundante secreción de líquido acuoso, sanguinolento, purulento y el pequeño tumor desaparece, para llenarse de nuevo al cabo de cierto tiempo y volverá a desaparecer de la misma manera (Kent).

Leucorrea abundante, acre, ardiente, lechosa (calc. carb., sepia, puls.) precedida por dolores cortantes alrededor de ombligo, sobre todo abundante durante micción o después de comida agria; puede coexistir con cáncer de útero (Kent).

Pezones muy sensibles, fácilmente ulcerados, hundidos.

Masas duras en senos (conium).

Amenaza de absceso de seno; si es dado a tiempo, hará abortar el absceso; si la supuración es inevitable; es útil; puede haber dolor, sensación de pesadez y latidos en seno enfermo; silic. los calmará, apresurará la abertura del absceso y traerá cicatrización rápida (Kent).

Ulceraciones fistulosas de senos.

Útil en casos de esterilidad en mujeres que tienen tendencia a abortar cuyos órganos son muy débiles para cumplir sus funciones normales (Kent).

Aparato respiratorio

NARIZ :

Catarro nasal, con, en mucosas, ulceraciones que segregan líquido fluente, excoriente : o catarro seco, con sequedad molesta de nariz.

Proceso catarral que se extiende hacia abajo, a rino farinx e invade trompas de Eustaquio donde produce cosquilleo, comezón intolerable.

Ozena con secreción fétida, ofensiva, cuando la afección tiene origen en tejido conjuntivo submucoso o periosteal.

Caries de huesos de nariz.

Costras secas en nariz con hemorragia nasal cuando las quita.

Epistaxis abundantes.

Coriza alternativamente fluente, seco, muy tenaz; estornudos a la mañana.

Secreción nasal sanguinolenta, en niños (calc. sulph.) (Kent).

Comezón y enrojecimiento de punta de nariz.

LARINGE :

Ronquera, crudeza, sequedad de laringe, tos con cosquilleo que parece venir de fosa supraesternal; sensación como si tuviera un cabello en garganta, laringe o tráquea; la tos es excitada por bebidas frías (rhus tox.), por la menor palabra (phosph., rumex, amb. gris.), peor de noche acostado (rumex, phosph., lycop.); a veces termina en vómito de mucus.

Tos seca, agotadora, con ronquera, con amenaza de tuberculosis laríngea; voz quebrada, de timbre especial característico, consecuencia de espesamiento de mucosa laríngea.

BRONQUIOS Y PULMONES :

Tendencia crónica a resfriados localizados en pecho donde provocan síntomas asmáticos.

Conviene a primer grado de tisis, cuando el pulmón no está afectado y los signos premonitorios se manifiestan en individuos de constitución característica.

Útil afecciones pulmonares en talladores de piedras en cuyas vías respiratorias partículas de piedra provocan irritación crónica; provoca supuración alrededor de estos pedacitos de piedra y son expulsados con la expectoración (Kent).

Disnea con imposibilidad para hacer inspiraciones profundas.

Útil en casos de antiguos catarros de vías respiratorias inferiores, cuando la respiración se hace asmática, sofocante al menor esfuerzo; esto pasa porque estando acalorado se expone a corriente de aire o toma frío después del baño; asma con grandes rales húmedos, el pecho parece lleno de mucosidades, parece no poder respirar; muy útil en casos

de asma en antiguos "sicóticos" o en niños de padres "sicóticos", en estos casos, comparar con nat. sulph.; tales sujetos son débiles postrados, de tez pálida cerosa y muy sedientos (Kent).

Útil en asma nerviosa esencial; con tos seca y espasmódica; opresión que impide estar acostado y agacharse; constricción de garganta y latidos bajo el esternón: accesos a toda hora pero sobre todo después de acostarse; respiración a veces corta y sibilante de noche, aunque no haya accesos de asma.

Útil cuando tal afección, después de duración más o menos larga, ha modificadola mucosa brónquica; el asma se hace húmeda y toma forma de catarro sofocante; provoca vómitos y expectoración abundante y a menudo purulenta (Espanet).

Útil EN ABSCESOS DE PULMÓN, NEUMONÍA TUBERCULOSIS QUE HAN LLEGADO A ESTADOS DE SUPURACIÓN, (phell. aquat.); COPIOSA EXPECTORACIÓN DE ESPUTOS PURULENTOS, ESPESOS, VERDE AMARILLO, CON FIEBRE HÉCTICA, TRANSPIRACIÓN NOCTURNA ABUNDANTE y gran debilidad.

Tos con expectoración abundante, vómitos viscosos a la mañana, en medio del acceso de tox, disnea, esputos de sangre y sudores nocturnos la indican en tisis (Espanet).

Expectoración abundante, purulenta, FÉTIDA, a menudo sólo de día; viscosa, lechosa; a veces mezclada con un poco de sangre.

Bronquitis crónica; inflamación de pulmones con supuración.

Conviene a casos avanzados de neumonía o en complicaciones crónicas después de neumonía; neumonía de convalecencia lenta, prolongada (lycop., sulph., phosph., calc. ost.).

Tufaradas de calor en cara de día como sulph., sepia, lach., lycop., y rales en pecho como ant. tart. (Kent).

Broncorrea en viejos con expectoración fétida (bals. peru.).

Hemoptisis de sangre granate.

Pleurodinia con dolores lancinantes, agudos en costados del pecho; imposibilidad de acostarse del lado doloroso (kali carb., etc.).

Espalda y extremidades

Actúa sobre la médula, causando debilidad general de todo lo que depende de este centro nervioso.

IRRITABILIDAD DE MEDULA y sensibilidad de columna vertebral con numerosos dolores reflejos; TEMBLOR DE MIEMBROS CON SÍNTOMAS PARETICOS.

IRRITACIÓN ESPINAL DESPUÉS DE TRAUMATISMO DE COLUMNA VERTEBRAL.

Rigidez de cuello por irritación espinal; rigidez extendida a músculos de canales vertebrales.

Región lumbar dolorosa como si hubiera sido golpeada.

Dolor hacia el coxis con calambres como cuando ha estado mucho tiempo sentado.

Tabes (alumina, ruta).

Debilidad de espina dorsal; muy sensible a corriente de aire en la espalda.

CARIE DE VÉRTEBRAS; MAL DE POTT.

Debilidad parálitica de miembros superiores.

Debilidad parálitica de antebrazo.

TEMBLOR DE MANOS AL USARLAS.

Entumecimiento de manos, de noche.

Calambres en las manos al escribir. (magn. ph., gels., sulph. ac., arg. met., caust., etc.).

Dedos como entumecidos, con pérdida de fuerza.

Dolores picantes, tirones en punta de dedos, con pérdida de fuerza o entumecimiento.

Extremidad de dedos fisurada, agrietada.

Uñas rugosas, grises, sucias, quebradizas, deformadas, CON MANCHAS BLANCAS.

Panadizos.

MANOS HÚMEDAS SIEMPRE Y A VECES TRANSPIRAN ABUNDANTEMENTE.

Dolores tironeantes en caderas y muslos.

Dolor de rodillas como si estuvieran fuertemente apretadas por un lazo.

Calambres en pantorrillas; tensión y contracción de pantorrillas.

Debilidad parálitica de piernas.

Osteítis de tibia.

PIES FRÍOS COMO HIELO Y SIN EMBARGO CUBIERTOS DE SUDOR; SUDOR DE PIES

OFENSIVO (baryta, graph., lycop., nit. ac., psorin., sanic., sepia), FÁCILMENTE SUPRIMIDO SI TIENE FRÍO EN ESTA REGIÓN; TRANSPIRACIÓN HABITUAL DE PIES Y CUYA SUPRESIÓN TRAE TRASTORNOS DE SALUD; hay que remediar esta supresión y restaurar esos sudores con medicación apropiada, so no sobrevendrán accidentes más o menos serios : silic. es buen remedio para conseguirlo cuando las características generales lo indican y hace desaparecer esta tendencia molesta (Nash), a menudo este sudor va acompañado de excoriación entre dedos grandes.

Dolores agudos que atraviesan los pies.

Sensibilidad dolorosa de planta de pies (ant. crud., ruta, etc.).

UÑAS ENCARNADAS; cuando silic. es insuficiente graph. le sigue bien.

Callos en pies (ant. crud., graph., etc.) (Kent).

Cuando se duerme sobre cualquier parte del cuerpo, ésta se entumece.

Epilepsia en ataques particularmente nocturnos que parte del plexosolar para subir a estómago y pecho.

Cura ciertas afecciones histéricas epileptoides y paralíticas relacionadas, con excesos eróticos, trabajos forzados de gabinete, neuralgias obstinadas, jaquecas.

Las convulsiones son calambroides y afectan músculos de relación; la parálisis incompleta y recae más sobre sensibilidad; va acompañada de atrofia (Espanet).

Piel

Sensibilidad dolorosa de piel, que es fina, malsana con TENDENCIA A SUPURACIÓN; la menor herida tiende a supurar (hep., sulph. calc., borax, graph., merc., etc.).

Las afecciones cutáneas mejor curadas o ventajosamente modificadas por silic.

son : erupciones papiliformes, psoriformes, impetiginosas y pitiriásicas; piel seca, lisa, pero con placas de pitiriásis que sirven a menudo de afección más avanzada.

Los jugos nutritivos faltan, diríamos, en la piel para reparar, mantener su tejido y la plasticidad disminuye al punto que los cabellos caen y el cuero cabelludo se cubre de capa de películas furfuráceas.

Este es uno de los caracteres de silic., lo mismo que ciertos enrojecimientos en piel de nariz y algunas articulaciones.

Estos intertrigos, enrojecimientos, esta alopecia, películas furfuráceas, son frecuentemente síntoma de astenia en convalecientes con otros síntomas característicos (Espanet).

ABSCESOS QUE SE VACÍAN MAL Y TIENE TENDENCIA A FISTULIZACIÓN; panadizos, forúnculos, viejas heridas fistulosas.

De todos los remedios de la MATERIA MEDICA, ninguna es más apta que silic.

para corregir la disposición viciosa de las úlceras más malignas, para cambiar una supuración fétida en pus de buena naturaleza, prevenir caries subyacentes : úlceras escrofulosas, saniosas, abscesos en madriguera con comunicaciones fistulosas y pus de mala índole, úlceras fungosas y rebeldes, úlceras callosas, herpéticas, varicosas, corrosivas y sobre todo sicóticas, que suceden a excrecencia varicosa de fondo grisáceo y bordes duros.

Como calc. ost., y los medicamentos que actúan sobre nutrición y jugos nutritivos que corresponden a erosiones de tejidos y exuberancias vegetativas, silic. tiene acción favorable en tales úlceras en grietas y ulceraciones largas y profundas, estrechas, como ciertas rasgaduras de pezón y otras partes de piel fina alterada por afección herpética y contra producciones verrugosas o sicóticas; en tales casos, difiere de thuya, lycop., y nitr. ac. en que concierne a granos sicóticos, tensos, lustrosos, lancinantes, duros, dispuestos a degenerar o que comienzan a hacerlo.

Uno de los caracteres ordinarios de esas ulceraciones, de esos orificios fistulosos, es tener bordes callosos, indurados o reposar en base indurada (Espanet).

Hipertrofia ganglionar con tendencia a supuración.

Muchas enfermedades de silic. están asociadas a ganglios indurados pero sobre todo en cuello, ganglios cervicales, glándulas salivares y sobre todo parótidas; a cada resfrío las parótidas se hipertrofian e induran. (calc. carb., barb. carb., sulph.) (Kent).

SUDOR OFENSIVO EN PIES, AXILAS, MANOS, COMIENZA A TRANSPIRAR EN CUANTO SE DUERME (puls., conium) (Kent).

Fiebre

Constantes escalofríos, aún haciendo ejercicio o en habitación caliente, escalofríos en todo el cuerpo.

Violento calor general con sed intensa a la tarde, y noche.

Sudores abundantes de noche, sobre todo hacia la mañana, con olor irritante.

Pulso pequeño, rápido, frecuentemente irregular.

En fiebres hécticas se parece mucho a phosph.

Enfermo friolento; con frecuentes ataques de calor que duran poco; fiebre caliente sin escalofrío de día y sudores nocturnos.

En general, la menor caminata lo hace transpirar y a la mañana se declara transpiración que debilita mucho.

Hay abscesos, focos de supuración, obstrucciones, flujos mucosos que agotan y mantienen la fiebre a menudo con reabsorción purulenta.

Enrojecimiento de mejillas, como manchas, con calor ardiente, sensación ardiente en punta de dedos y al atardecer gran ardor de pies; pero habitualmente tiene frío en las extremidades.

Edemas de pies frecuentes, como las palpitaciones, opresión, palidez, adelgazamiento y debilidad general, excepto en paroxismos de fiebre, en que goza de cierta energía física y moral (Espanet).

Indicaciones muy marcadas en niños y jóvenes en estado de crecimiento enfermizo, con fiebre, dolores violentos en articulaciones, entumecimiento de miembros, borboteo de sangre o latidos arteriales.

Útil en fiebre de dentición prolongada en niños que enflaquecen mucho (Espanet).

Relaciones

Antídotos

Camph.; merc. que no le sigue bien; fluor. ac.; antidota el abuso de silic. en afecciones óseas. hep. sulph. calc.

Complementarios

Thuya ; afecciones nerviosas y malos efectos de vacuna; sanic.; puls. : es el crónico de este último; corresponde a formas crónicas que el primero cura en estado agudo; puls. influye en terrenos que contienen silic. en sus partes constituyentes.

Las aguas de Barèges, en los Pirineos, contienen gran cantidad de silic.

y son elegidas empíricamente como muy útiles en muchos casos en que silic. está homeopáticamente indicada.

Moleschott escribe en "Kristanf des leches" que las cenizas de equisetum contienen mucha silic., la cura de ciertos trastornos de vejiga, atribuidas a este remedio, se explican probablemente por el hecho de que contiene mucha silic. Silic. sigue muy bien a bell., puls., rhus tox., merc., en afecciones de esferasanguínea; a spig., puls., merc., phosph., en afecciones de estera nutritiva y plástica.

Ars. alb., carb. veg., sulph., sepia, calc. ost., lycop. completano continúan la buena acción de silic. (Espanet).

SPIGELIA ANTHELMIA

O spigelia anthelmintica, planta herbácea anual; de la familia de las Logoniáceas, crece en América del Norte, especialmente en Carolina del Norte.

El primero en estudiarla fue un botánico belga, Adrián von der Spiegel (latinizado en Spigelius) de donde deriva su nombre.

Fresca, tiene olor fétido que, en ambiente cerrado puede causar una especie de narcotismo; y por estas cualidades y sus propiedades tóxicas se le ha dado el nombre de Brinvillier, por la marquesa de Brinvillier, célebre envenenadora de la época de Luis XIV.

Las dinamizaciones homeopáticas se preparan partiendo de una tintura madre obtenida de la planta fresca o de una trituración hecha con toda la planta seca y pulverizada.; en este caso, las tres primeras dinamizaciones se hacen por trituración hahnemanniana y después por diluciones sucesivas habituales.

Acción general del medicamento

Actúa principalmente sobre SISTEMA NERVIOSO que, bajo su influencia, tiende a astenia alojada de la vez sobre sistema cerebro-espinal y simpático.

Interesa más particularmente NERVIOS SENSITIVOS, entre ellos, regiones cervicales y torácicas, que presentan DOLORES AGUDOS, LANCINANTES, intolerables, que constituyen sus principales características.

Bajo su influencia, las SECRECIONES INTESTINALES sufren modificaciones que las hacen aptas para mantener vermes intestinales, lombrices particularmente, e impropias para la buena elaboración del bolo alimenticio.

Características

1) CONSTITUCIÓN Y TEMPERAMENTO : Especialmente indicado en anémicos de larga data, o deprimidos por mal estado de salud, cuyos trastornos parecen localizados en los nervios donde desarrollan estados neurálgicos muy dolorosos, tiene en general, pelo rubio, son pálidos y delgados, agitados, inquietos, no pueden dominarse, tiene palpitaciones, pulso irregular; al levantarse vértigos, aturdimiento y sus dolores se manifiestan principalmente en ese momento.

2) DOLORES NEURÁLGICOS LANCINANTES, ARDIENTES, DESGARRANTES, en cualquier nervio del cuerpo, pero más marcados en CARA, CUELLO, HOMBRO, a veces con sensación como si la región atacada fuera pinchada con agujas al rojo; se agravan por movimiento, hasta el simple movimiento de ojos o inspiración (bryon., kalmia, nat. mur., act. rac.) por ruido (bell.), por el menor contacto (china), por frío, humedad, lluvia; cuando se localizan en el ojo, mejoran por frío y por en cuello u hombro.

Dolores lancinantes, desgarrantes en extremidades, como si allituviera un alambre al rojo, a veces se agravan al acostarse, pero generalmente mejoran estando tranquilo; se agravan por luz, comiendo, moviéndose, por sacudidas; subir o descender escaleras, pasear en coche que sacude al enfermo lo hace insoportable.

3) CONTRACCIONES CARDIACAS TAN VIOLENTAS QUE SE PUEDEN VER LOS LATIDOS DEL CORAZÓN A TRAVÉS DE LA ROPA; SACUDEN SU CUERPO Y EL RUIDO DE SU RITMO SE OYE A DISTANCIA.

Modalidades

Agravación

a) A LA MAÑANA : muchos de sus síntomas se manifiestan a la mañana; a la mañana fatigado y lleno de dolores desgarrantes.

b) POR CALOR : LOS DOLORES DE CABEZA SE AGRAVAN por calor; el frío los mejora; cuando se localizan en otra región, el calor mejora los dolores.

Los síntomas de cabeza y estómago de phosph. mejoran por frío.

En ars. alb. los síntomas de cabeza mejoran lavándola con agua fría, pero el enfermo es sensible al frío y quiere calor para apaciguar sus otros síntomas.

c) CON LA SALIDA DEL SOL Y MEJORA A MEDIDA QUE DECRECE (nat. mur., tabac., nat. carb., sang., glonoin., kal.).

d) POR TIEMPO FRÍO, HÚMEDO, LLUVIOSOS sobre todo.

e) Por movimiento.

f) Por ruido, a un contacto ligero.

Mejoría

a) Permaneciendo tranquilo.

b) Por calor (dolores del cuerpo).

c) Por frío (dolores de cabeza).

d) Acostándose con la cabeza levantada o sobre la derecha.

Debe ser más experimentado pues sus síntomas mentales no son bien conocidos.

Estado de temor, angustia, ansiedad, como la mayoría de individuos en estado de neuralgia casi constante, cuyo sistema nervioso está muy debilitado.

Fácilmente irritable, memoria débil, aversión por trabajo; inquieto, agitado, movedizo, preocupado por el porvenir, sombrío.

A veces aparece el síntoma siguiente ; temor por objetos que pinchan, por ej., alfileres.

Cabeza

DOLORES DE CABEZA GENERALMENTE DE UN SOLO LADO; a menudo COMIENZAN EN OCCIPUCIO y se extienden hacia adelante por la coronilla, SE FIJAN ARRIBA DEL OJO IZQUIERDO (ojo derecho : sang. y silic.); SE AGRAVAN POR EL MENOR RUIDO Y MAS LIGERO MOVIMIENTO, LA MENOR SACUDIDA; AUMENTAN O COMIENZAN A LA SALIDA DEL SOL PARA DISMINUIR O DESAPARECER CUANDO SE PONE; EL OJO DEL LADO AFECTADO DEJA CORRER LAGRIMAS LÍMPIDAS (chel. maj.) : lado derecho con lágrimas.

DOLOR COMO SI TUVIERA UNA VENDA FUERTEMENTE APRETADA ALREDEDOR DE LA CABEZA (cactus, gels., carbol. ac.).

Pulsaciones y puntadas en cabeza, a veces mejoradas acostándose con la cabeza levantada y agravadas al agacharse, moverse, por ruido.

A veces los dolores mejoran lavándose con agua fría, particularmente si se localizan en el ojo, pero enseguida empeoran.

Con estos dolores de cabeza neurálgicos, cuello y hombros rígidos por que no puede moverlos por el dolor; permanece sentado, inmóvil, como anquilosado, el ruido, la luz, agravan; hasta la vista de personas que se mueven a su alrededor y a las que quiere seguir con los ojos agrava.

Dolores picantes, ardientes, desgarrantes, en el cerebro, o que siente en el cerebro, pero localizados probablemente en nervios de cuero cabelludo.

Dolor violento en región de parietal izquierdo, agravado por moverse, caminar, dar un paso en falso; al atardecer sensación de presión violenta de adentro a afuera de la frente, agravada al agacharse, al apretar con la mano; dolor de tensión, desgarrante, en frente, particularmente protuberancia frontal que se extiende a región supraorbitaria.

Dolor de gran intensidad, taladrante, desgarrante, en occipucio, en lado izquierdo de cabeza y frente, agravado por movimiento, ruido, hablar o hasta por sólo abrir la boca; mejora acostado.

Dolor presivo en lado derecho de la frente, sobre el ojo derecho, a la mañana cuando despierta, pero peor después de levantarse; el dolor se siente profundamente, o influenciado por la presión, muy agudo cuando mueve la cabeza, o la vuelve repentinamente, con sensación como si el cerebro se despegara; agravado a cada sacudida, a cada paso, por el esfuerzo al evacuar.

Al mover los músculos de la cara sensación como si la cabeza fuera a estallar.

Dolor neurálgico alrededor y en el ojo izquierdo en tiempo frío, húmedo, lluvioso..

Hiperestesia de ramales del quinto par.

Menos hiperestesia al principio del dolor, pero aumenta a medida que el ojo se congestiona.

Dolor a veces tan violento que provoca postración completa con sudor frío y vómitos.

Hep. sulf. es tan sensible al dolor que se siente mal, se desvanece.

Chamom. : siente el dolor con tal intensidad que cede a ataques de cólera, frenesí violento, extrema irritabilidad.

Spig. : sufre tan intensamente los dolores que le provocan hinchazón, enrojecimiento e hiperestesia en la región (Kent).

Ojos

Neuralgia ciliar cuyos dolores tienen las mismas características que los dolores de cabeza; son como puñaladas y se extienden a occipucio, o como en act. rac. : presivos de adentro a afuera, como si los ojos fueran demasiado grandes para las órbitas (comocladia) (Nash).

Neuralgia ciliar con dolores que irradian alrededor del ojo y sensación de frío en el ojo (thuya).

Agravación cuando piensa en ellos.

Agravación presionando sobre el ojo fuertemente; a veces una presión suave y prolongada alivia, pero el menor movimiento de la mano que presiona agrava; REGIÓN ABOTAGADA E INFLAMADA, OJOS ROJOS Y CONGESTIONADOS (Kent).

No puede mirar derecho hacia adelante, pues tiene vértigos aunque no sufra al mirar de arriba a abajo.

Trastornos de acomodación; es difícil encontrar cristales que corrijan su vista de manera constante (Kent).

Afecta particularmente la ESCLERÓTICA y si la esclerótica es atacada por oftalmía reumática spig. cura de la manera más satisfactoria (Hughes).

Cara

NEURALGIA FACIAL CON DOLORES VIOLENTOS PICANTES Y ARDIENTES; PIEL ABOTAGADA Y DOLORIDA EN LA REGIÓN DOLOROSA; LOCALIZADA PARTICULARMENTE A LA IZQUIERDA. GRAN ESTADO DE ERETISMO NERVIOSO, EXCITACIÓN E INTOLERANCIA A DOLOR.

Se puede comparar con : acon., ars. alb., coloc., colch., china, chamom., platina, puls., phosph., mezer., verbasum, thuya, etc.

Las principales indicaciones de los grandes remedios de la neuralgia facial son : Acon : Neuralgia facial

PARTICULARMENTE IZQUIERDA, dolores agudos, desgarrantes, intolerables.

CON HORMIGUEO; neuralgia a frigore, por exposición a viento frío y seco, congestiva, con dolores intolerables, cortantes, violentos, ardientes que llevan A LA DESESPERACIÓN, con SENSACIÓN DE HORMIGUEO, peor de noche, HACIA MEDIANOCHE; cara roja, hinchada, congestionada, AGITACIÓN característica.

Bell : Neuralgia con violentos DOLORES LATENTES, desgarrantes, más marcados a la derecha, agravados o despertados por el menor contacto, la menor sacudida, el menor movimiento; con mucho CALOR Y

ENROJECIMIENTO DE CARA, latido de carótidas; después de EXPOSICIÓN A FRÍO; rigidez de nuca y estremecimientos convulsivos de músculos de cara.

China : Neuralgia facial con violentos dolores lancinantes en mejillas, mandíbula inferior, región supraorbitaria; EL AIRE FRÍO o UN SIMPLE ROCE SUPERFICIAL agravan en extremo; dolores típicos por su reaparición periódica y es muy indicado si hay antecedentes maláricos.

Comparar con cedron : neuralgia supraorbitaria con ataques con regularidad de reloj; casi siempre hay antecedentes maláricos.

Caust. : Neuralgia con dolores tensivos, pulsátiles, en huesos de cara y sobre todo pómulos, CON UNA ESPECIE DE PARÁLISIS DE MÚSCULOS FACIALES, o dolores tractivos de mandíbulas que impiden abrir la boca.

Sigue bien a acon.

Colocynt. : Neuralgia con dolores desgarrantes, lancinantes, especialmente a la izquierda de la cara, que se propagan hasta sien, cabeza, nariz, oreja, dientes, con HINCHAZÓN DE CARA DEL LADO DOLOROSO, aliviados al principio por presión; AGRAVACIÓN AL MENOR CONTACTO, etc.

Colch. : Neuralgia principalmente IZQUIERDA de cara, hasta el oído con HORMIGUEO de piel como si allí estuviera helada; mejilla del lado enfermo roja, hinchada, transpira; MUCHO ERETISMO NERVIOSO con los dolores que parecen insoportables, pero sin la AGITACIÓN TAN PARTICULAR DE acon.

Cham. : Neuralgia facial INTOLERABLE con dolores insoportables, desgarrantes, lancinantes, tractivos, pulsátiles, agravados por calor, CON ESTADO NERVIOSO CARACTERÍSTICO.

Phosph. : Violenta neuralgia de cara en mandíbulas y sienes, con sensación de calor, congestión de mejilla que está hinchada; AGRAVADO CUANDO HABLA, COME, POR TODO MOVIMIENTO DE MÚSCULOS DE CARA.

Platina : Neuralgia facial con dolores formicantes y SENSACIÓN DE FRÍO, ENTORPECIMIENTO, del lado afectado, o dolores calambroides y presión tensiva en pómulo; agravación o renovación de dolores al atardecer y durante el descanso; DOLORES QUE APARECEN GRADUALMENTE.

Puls. : Neuralgia de trigémino, comienza en región temporal derecha, con LAGRIMEO ABUNDANTE DEL MISMO LADO; con escalofríos; más marcada o comienza en medio de la noche.

Mezer. : Neuralgia facial con sensación de presión calambroide y aturdidora en huesos de cara, a veces de un solo lado y que se extiende a ojo, temporal, oído, dientes, cuello, hombro; a menudo ligada a supresión desafortunada de erupción o mercurialización profunda.

Nux vom. : Neuralgia facial con dolores desgarrantes que se extienden a interior de oído, con ENROJECIMIENTO Y A VECES HINCHAZÓN DE MEJILLA Y ESPASMOS MUSCULARES; AGRAVACIÓN POR TRABAJO INTELECTUAL, USO DE CAFÉ O VINO.

Merc. : Neuralgia con dolores desgarrantes o lancinantes, que afecta todo un lado de cabeza, desde temporales a dientes.

AGRAVADOS SOBRE TODO DE NOCHE AL CALOR DE LA CAMA, con SALIVACIÓN, LAGRIMEO, SUDOR en cara o cabeza, insomnio.

Lycop. : Dolores neurálgicos en la cara, EMPIEZAN POR SENSACIÓN DE FRÍO, principalmente a la derecha, con AGRAVACIÓN AL ATARDECER O LA NOCHE.

Lach. : Neuralgia facial principalmente izquierda con dolores profundos en huesos y SENSIBILIDAD EXQUISITA DE PIEL al tacto; AFLUJOS DE CALOR EN MEJILLA dolorosa.

Verbas. : Neuralgia facial principalmente izquierda, con lagrimeo, coriza y SENSACIÓN COMO SI LAS PARTES DOLOROSAS FUERAN APLASTADAS, ROÍDAS, POR PINZAS.

Thuya : Neuralgia con dolores calambroides, lancinantes, de gran intensidad en pómulo, maxilar superior y dientes, a lo largo de ramales supraorbitarios; SENSACIÓN DE FRÍO INTERIOR; A CADA EXASPERACIÓN DEL DOLOR, CARA SÚBITAMENTE PÚRPURA; movimientos convulsivos de labio superior (TIC DOLOROSO).

Agaric. :Neuralgia facial con DOLORES PARECIDOS A PINCHAZOS CON AGUJAS DE HIELO EN MEJILLAS E IRRITANDO EL NERVIO : dolores lancinantes, agudos, como provocados por astilla de madera.
Ars. alb. :Neuralgia con dolores extremadamente ardientes, aliviados por calor.

Staphis. :Neuralgia con dolores presivos pusátiles, desde dientes hasta ojos; o dolores lancinantes, ardientes, tractivos, incisivos o desgarrantes, con SENSACIÓN DE HINCHAZÓN DEL LADO AFECTADO, LLANTO ESPASMÓDICO, MANOS FRÍAS Y SUDOR FRÍO EN CARA.

APARATO DIGESTIVO

BOCA :

Dolor de muelas desgarrante, peor por frío y después de comer.

Mal olor en la boca.

INTESTINOS :

Helmintiasis con estrabismo, movimientos sacudidos en ciertos músculos de cara, gran palidez de cara y ojeras azuladas; debilidad, abatimiento, náuseas y cólicos alrededor de ombligo (Dewey).

Aparato circulatorio

GRAN VIOLENCIA DE LATIDOS DE CORAZÓN que se pueden oír y ver a distancia y a veces sacuden el cuerpo.

DOLORES AGUDOS, PICANTES, PUNZANTES, en región precordial, que IRRADIAN ABRAZO Y CUELLO, AUMENTADOS POR MOVIMIENTO.

Sensación como si el corazón estuviera comprimido por una mano.

Sensación de palpitaciones por oleadas NO SINCRÓNICAS CON PULSO en región cardíaca.

Al poner la mano sobre la región del corazón se siente como un ronroneo comocuando se acaricia un gato.

ANGINA DE PECHO : dolor repentino en lado izquierdo de pecho que irradia a uno o ambos brazos y tan violento que puede hacer desfallecer.

Comparar con acon. : sensación de constricción de pecho con sofocación,cardialgia que irradia a brazo izquierdo, angustia y gran miedo a la muerte; amyl. nitr. : de acción clásica.

Amica : dolor particularmente severo de hombro y brazo izquierdos.

Ars. alb. : de acción tan marcada sobre el corazón.

Cactus : sensación como de corazón apretado por mano de hierro, que impide todo movimiento, sofocación, sudor frío.

Cimicif. : sensación como de corazón doloroso, aumentado de volumen.

Cuprum. : cardialgia con sensación de apretón espasmódico, de violenta presión,seguida de vómitos.

Naja : dolor picante en región del corazón, sensación de ahogo imposibilidad de hablar y pulso irregular.

Nat. iod.; spong.; tabac. : síntomas de ardor con dolor marcado en región precordial.

AFECCIONES VALVULARES crónicas con ruidos de soplo que estalla y ataques violentos de palpitaciones; sólo puede acostarse sobre la derecha (phosph., nat. mur.) y con cabeza alta; el menor movimiento agrava (naja).

Complicaciones cardíacas del reumatismo; en estos casos, rara vez está indicado spig. en "flemáticos" que sienten poco intensamente (Kent).

Espalda y extremidades

Dolores neurálgicos en músculos de pecho.

Muchos dolores de spig. en el pecho, se atribuyen al corazón; pero tiene verdaderas neuralgias intercostales; dolores lancinantes en hombro y cuello, particularmente marcados a la izquierda y a lo largo del brazo; dolores volantes aquí y allá (Kent).

Relaciones

Antídotos

Puls.

REPETIDO

SPONGIA MARINA TOSTA[Error! Marcador no definido.](#)

O esponja, cuerpo organizado del grupo de los zoófitos espongiarios, parece tener algo de animal y de vegetal.

Se adhiere a rocas submarinas de Mar Rojo y de Mediterráneo y especialmente Islas del Archipiélago.

Las diferentes dinamizaciones se obtienen de la tintura madre preparada haciendo macerar en alcohol a 90º, la esponja tostada hasta poder ser pulverizada fácilmente.

Acción general del medicamento

En su constitución entran, además de sílice, fosfato de cal, cloruro de sodio, magnesia, azufre, etc., notables cantidades de iodo; pero no parece poderse asimilar completamente los efectos de iod. y spongia : iod. corresponde de preferencia a individuos morochos y spong. parece convenir mejor a los de tez clara, rubios; no tiene la propiedad de iod. de producir exudados plásticos.

Como los halógenos, actúa de manera preeminente sobre MUCOSAS y TEJIDO GLANDULAR Y LINFÁTICO.

Tiende a afectar notablemente las glándulas; puede alcanzar a todas : cuerpotiroides, testículos, ovarios, ganglios linfáticos, etc. y bajo su influencia, se HIPERTROFIA E INDURAN.

INFLAMACIÓN MUCOSA muy marcada en LARINGE Y TRAQUEA.

Potente MEDICAMENTO CARDIACO, importante en lesiones de este órgano.

Características

1) CONSTITUCIÓN Y TIPO : Ejerce al máximo su patogenesia en individuos de temperamento linfático, particularmente mujeres y niños, de tez y cabellera clara, ojos azules, fibra floja, tipo muy parecido a puls. y bromium.

2) HIPERTROFIA E INDURACIÓN GLANDULARES :HIPERTROFIA E INDURA GLÁNDULAS Y GANGLIOS LINFÁTICOS.

En forma tan marcada que esta propiedad merece lugar aparte en sus características.

3) SEQUEDAD DE MUCOSAS :Otra propiedad característica : extrema sequedad de mucosas a las que inflama.

4) SOFOCACIÓN NOCTURNA QUE DESPIERTA :Despierta a causa de sensación de sofocación con tos violenta, resonante, gran angustia, agitación, ansiedad y respiración difícil (lach.), en afecciones valvulares de corazón; con cara roja y caliente y mucho miedo de morir.

Modalidades

Agravación

a) DE NOCHE : acceso de sofocación nocturna que despierta.

b) ACOSTÁNDOSE CON CABEZA BAJA.

c) POR CALOR : se siente bien con calor, en cuarto caliente; quiere tener fresco como iod.; pero mejora por bebidas calientes, como ars. alb., nux vom., lycop. (Kent).

d) Por movimiento.

e) Por viento; en luna llena.

Mejoría

a) ACOSTÁNDOSE CON CABEZA ALTA.

b) POR BEBIDAS CALIENTES; "Disnea y tos aliviadas por alimentos y bebidas calientes" (Kent).

Síntomas mentales

Humor triste; mal humor; pereza mental.

Alternativas de gran hilaridad y tristeza profunda.

Ataques de palpitación y sofocación con gran angustia, agitación marcada, miedo intolerable a la muerte. (acon.).

Sueño

SE AGRAVA DE NOCHE, DURANTE EL SUEÑO, Y DUERME EN LA AGRAVACIÓN como lach. NO PUEDE DORMIR CON CABEZA BAJA; ACCESOS DE SOFOCACIÓN NOCTURNA LO DESPIERTAN.

No puede estar acostado de espaldas con cabeza baja, sin tener acceso de sofocación.

Despierta frecuentemente como sofocado; se sienta en la cama con aspecto ansioso, cara roja y respiración rápida y difícil.

Cabeza

Su acción va acompañada de muchos dolores de cabeza : cefalea con aflujo de sangre a la cabeza y sensación de estallido en frente; vértigo con tendencia a caer hacia atrás : la mayoría de los dolores de cabeza se relacionan con bocio, afección cardíaca, asma, etc. y son probablemente consecuencia de trastornos circulatorios cerebrales (Kent).

Aparato digestivo

BOCA Y GARGANTA :

Altas en borde de lengua y cara interna de mejillas.

Lengua seca, amarronada.

Gusto amargo.

Dolor de garganta peor después de comer alimentos dulces.

ESTOMAGO :

APETITO AUMENTADO; hambre violenta que llega a bulimia.

A veces, SED INEXTINGIBLE.

Sensación de peso en epigastrio con sensación de imposibilidad para soportar ropa apretada alrededor del talle.

Aparato urinario

Deseo frecuente de orinar con emisiones abundantes.

Incontinencia.

Órganos genitales

MASCULINOS :

HINCHAZÓN E INDURACIÓN DE TESTÍCULOS Y CORDONES ESPERMATICOS, con dolores lancinantes al tacto o espontáneos.

Actúa sobre el testículo, en forma más potente que sobre cualquier otra glándula, produciendo induración e hinchazón.

Particularmente útil en orquitis mal tratada o inflamación de testículo después de supresión mal hecha de blenorragia.

DOLOR PARTICULAR DE COMPRESIÓN EN TESTÍCULO Y CORDÓN, PEOR A CADA MOVIMIENTO O AL MENOR ROCE DE ROPA.

Pero, en orquitis, no es spong. nuestro primer remedio : puls. va a la cabeza y al lado, hamam.; este último puede ser empleado a la vez intus et extra; alivia el dolor y permite cumplir sus ocupaciones.

Otro buen remedio : merc. sol.; cuando la poca secreción que hay por meatoes verde amarillenta.

Al principio, gels.

Cuando hay dolor particular de comprensión, de aplastamiento, en cordón y testículo, con induración, spong. es uno de nuestros mejores medicamentos (Farrington).

FEMENINOS :

Reglas adelantadas y demasiado abundantes.

Antes dolores de sacro, bulimia, palpitaciones.

Durante, despierta de noche con ataques de sofocación (cupr., iod., lach.).

Amenorrea con asma (puls.).

Aparato circulatorio

Los síntomas mentales muestran que es un remedio del corazón : cuando un remedio produce la angustia, miedo, disnea que se ve en spong., se trata de un remedio del corazón, a menos que los síntomas vayan asociados a afección cerebral.

En spong. hay, aunque no haya irritación o enfermedad inflamatoria de cerebro, angustia marcada, temor profundo a la muerte y verdadera sofocación, ligados a palpitaciones y sensación de molestia, angustia, en región del corazón.

Apropiado cuando hay DOLOR Y SENSACIÓN DE AHOGO, PLÉTORA, EN REGIÓN DEL CORAZÓN Y PECHO, con DISNEA, ANGUSTIA, MIEDO A LA MUERTE, MIEDO POR EL PORVENIR, MIEDO DE QUE LE PASE ALGO TERRIBLE; DESPIERTA DE NOCHE CON GRAN SUSTO, necesita un buen momento antes de tranquilizarse y poder alternar con los que lo rodean (aesc., lycop., sambuc., lach., phosph., y carb. veg.).

Se parece mucho a acon. que también excita el corazón, provoca angustia, miedo, inquietud; pero ligado a estado afiebrado marcado, consecuencia de su acción superficial.

En spong., la acción es profunda; sus afecciones cardíacas se desarrollan lentamente, progresivamente, produciendo a la larga alteración de tejidos, hipertrofia de corazón, perturbación de funcionamiento de válvulas; por eso la auscultación revela ruidos de soplo o silbidos en orificios cardíacos y trastornos de regurgitación circulatoria (Kent).

PALPITACIONES RÁPIDAS Y VIOLENTAS CON DISNEA : NO PUEDE ACOSTARSE, DEBE PERMANECER SENTADO.

SENSACIÓN DE HINCHAZÓN DE CORAZÓN EN EL PECHO, COMO SI QUISIERA SALIRSE DE EL. (sulph.).

Hipertrofia de corazón, ESPECIALMENTE DE CORAZÓN DERECHO.

ANGUSTIA DE PECHO, desfallecimiento y sudores con angustia, disnea, miedo a la muerte (acon., cactus, naja, spig., etc.).

TOS SECA, SIMPÁTICA DE AFECCIÓN DE CORAZÓN (naja), ALIVIADA A MENUDO POR BEBIDAS O ALIMENTOS CALIENTES.

Sensación de hervidero de sangre.

Distensión de venas.

Pulso lleno, duro, rápido.

Síntomas circulatorios agravados por fatiga mental, tos, acostándose de lado derecho, antes de reglas, acostándose horizontalmente o inclinándose hacia adelante, después de subir escalera, por sueño; despierta angustiado y sofocado; se duerme tarde a la noche, pero despierta por sofocación (Kent).

Según Kent, en endocarditis aguda, los remedios principales son : spong., abrot., sepia y kalmia; naja : remedio de enfermedades valvulares : pero Farrington da el consejo siguiente : acon. : hiperemia que precede a endocarditis; spong. : una vez comenzada la exudación y establecida la lesión : impedirá el avance de la enfermedad.

Al tratar las enfermedades del corazón, no comencéis demasiado pronto con lach., cyanhydr. ac., o ars. alb., empezad más bien con acon., spong., spig., bryon., o phosph.

Ars. alb. y los que he citado con él, vienen más tarde; si se dan demasiado temprano, perjudican; si no hay un cuadro sintomático perfecto de alguno de ellos, no se debe dar en los primeros estados de la afección un medicamento generalmente indicado para un estado tardío.

Aparato respiratorio

NARIZ :

SEQUEDAD DE MUCOSA NASAL.

Coriza fluente alternando con obstrucción.

Catarro crónico con sequedad de mucosa.

LARINGE :

SENSACIÓN DE SEQUEDAD DE LARINGE CON SENSACIÓN DE ASTRICCIÓN Y ARDOR (acon., bell., conium, lach.); RONQUERA, voz ronca, luego afonía después de enfriamiento, "ronquera, luego afonía, gran sequedad de laringe, por resfrío primero de cabeza con estornudos, luego voz ronca, crupal, tos resonante y toda la

mucosa del árbol respiratorio superior extremadamente seca; más tarde, puede haber expectoración mucosa abundante, pero se debe recordar que cuanto más rales hay menos indicado es spong. hep. sulf. c. : grandes rales con mucha mucosidad" (Kent).

LARINGITIS ESTRIDULOSA (ignat., gels. lauroc.) (Kent).

SENSIBILIDAD DE LARINGE AL TACTO.

Laringitis con ronquera en sujetos con tendencia a tuberculosis, de herencia tuberculosa, aspecto caquéctico, propensos a bronquitis pero sin tubérculos pulmonares en evolución, y en los que súbitamente tienen ronquera.

Tendencia a afecciones de laringe en tuberculínicos o tuberculosos que necesitan spong. (Kent).

TOS HUECA, SECA, PERRUNA, CON DOLORES QUE ESCUECEN O DESGARRANTES DETRAQUEA, DÍA Y NOCHE, PEOR AL ATARDECER (acon., bell., dros., hep. sulf. c.); peor hablar, tragar o girar la cabeza.

Crup con respiración difícil y penosa, como si respirara a través de una esponja; tos ronca, seca, resonante con ruido como el de un serrucho cortando una plancha de pino; si hay expectoración, es poco abundante; la sofocación amenaza, tos a cada minuto más difícil, como si el gárgamo se encogiera minuto a minuto.

Se debe tener cuidado de diferenciar a acon. y hep. sulf. calc.

CUERPO TIROIDEO :

HIPERTROFIA DE CUERPO TIROIDEO.

Bocio con latidos y tirones en el cuello.

Bocio exoftálmico, (iod., brom., calc. ost., lapis alb.).

BRONQUIOS Y PULMONES :

DOLOR, SENSACIÓN DE ARDOR, SENSACIÓN DE CARNE VIVA, en bronquios y pecho (phosph., sang., sulphur.).

Puntadas agudas en pecho al inspirar profundamente.

Disnea asmática mejorada permaneciendo sentado en la cama; despertar súbitamente de noche por sensación angustiosa de sofocación (lach., phosph.).

DISNEA CARDIACA.

Tuberculosis laringo-pulmonar con tos penosa, de timbre metálico, agravada al respirar profundamente, por viento seco y frío, movimiento; mejorada al comer o beber caliente y agravada después de comer o beber frío (ver. alb.; mejora después de beber fría, pero la tos se agrava entonces.) (Kent).

Cuello, espalda y extremidades

Hipertrofia e induración de ganglios cervicales.

Piel

Prurito sin erupción visible; se diría que va a aparecer una erupción pero no hay nada de eso.

Relaciones

Antídotos

Camphora.

Complementarios

Acon.; spong. sigue bien a acon.; hep. sulf. c.

STANNUM

Stannum metallicum o Estaño, es un metal blanco plateado maleable, muy blando, fácil de cortar con cuchillo.

En general cristalizado y al doblarlo, la frotación de cristales, unos contra otros, produce un ruido conocido como "grito del estaño".

Es uno de los más antiguamente conocidos, aunque relativamente escaso.

Se lo encuentra en Inglaterra, España, Sajonia, Bohemia, China y Australia, en estado de óxido de estaño, con tungsteno, arsénico, antimonio, cobre y zinc.

Para uso homeopático se emplea estaño químicamente puro con el que se preparan las tres primeras dinamizaciones por procedimientos de trituración hahnemanniana : las más elevadas, por diluciones sucesivas.

Acción general del medicamento

Todos sus efectos traducen su INFLUENCIA ASTENISANTE por su acción sobre el SIMPÁTICO y en este sistema debe buscarse el punto de partida de las alteraciones orgánicas profundas que produce.

GRAN SENSACIÓN DE DEBILIDAD GENERAL, sobre todo localizada EN EL PECHO, tan agotadora, QUE NO PUEDE HABLAR; con adelgazamiento; generalmente ligado a AFECCIONES CATARRALES

BRONCO-PULMONARES caracterizadas por EXPECTORACIÓN MUCO-PURULENTA MUY ABUNDANTE.

Su acción sobre sistema nervioso se manifiesta también por DOLORES que tienen la particularidad de aumentar y disminuir gradualmente de intensidad, como platina.

Como todos los metales, parece ser un gran policresto, pero sus aplicaciones terapéuticas son limitadas quizá porque muchos síndromes no están todavía suficientemente determinados y la clínica sólo se ha pronunciado sobre su empleo en ciertas afecciones de sistema nervioso, tubo digestivo y vías respiratorias (Jousset).

Características

1) CONSTITUCIÓN Y TIPO : Conviene especialmente a enfermos que se debilitan de larga data, y este estado es tan notable que muestra que deben estar profundamente atacados.

Se debilitan, hasta llegar a caquexia; sufren de larga data viejas neuralgias o trastornos catarrales; muy sensibles al dolor, aversión cada vez más marcada por toda ocupación : hombres, por sus negocios; mujeres, por la atención de su hogar; todo trabajo se les hace cada vez más penoso, y están siempre fatigados.

Rostro cada vez más pálido, hasta ponerse ceroso, caquético (Kent).

Tienen gran tendencia a marchar hacia la tisis.

2) GRAN DEBILIDAD : Esta es una de sus principales manifestaciones generales : estado de debilidad general, a veces excesiva, sobre todo a la mañana y a la noche, con frío en extremidades, o sensación de calor con sudor abundante al menor movimiento; gran sobreexcitación nerviosa, como se ve a veces en casos de agotamiento por pérdidas de sangre, excesos, o larga enfermedad, con irascibilidad, misantropía, repugnancia invencible por la conversación que fatiga en exceso, propensión al "Spleen" y al suicidio; adelgazamiento considerable (Teste). Muy agotado cuando camina, habla, lee en voz alta; lasitud muy grande de todo el cuerpo al subir escaleras; gran sensación de debilidad de laringe y pecho, que gana todo el cuerpo; temblor que aumenta por movimiento (Kent). SENSACIÓN DE GRAN DEBILIDAD EN PECHO (arg. met.) y TAL QUE NO PUEDE HABLAR es uno de sus principales "Keynotes"; ningún otro tiene este síntoma tan marcado y se constata no solamente en trastornos laríngeos y pulmonares, para los que es gran remedio, sino también como dependientes de su gran debilidad general. ESTA TAN DÉBIL QUE NO PUEDE PERMANECER PARADO Y SE DEJA CAER SOBRE UNA SILLA.

También se ve esta debilidad relacionada con desplazamientos uterinos, leucorrea, en mujeres flacas, extremadamente debilitadas, en que se han visto brillantes curas.

3) DOLORES QUE AUMENTAN Y DISMINUYEN GRADUALMENTE DE INTENSIDAD (platina) : El dolor de stannum se ha comparado a veces con el producido por un hilo que se tirará y aflojará lentamente.

El de puls. se le parece un poco en su primera mitad : sobreviene lentamente, progresivamente, pero cesa súbitamente.

Bell. : sobreviene bruscamente, súbitamente, alcanza enseguida gran intensidad, puede continuar así varias horas, luego cesa súbitamente.

También se puede comparar con : arg. nit., platina, stront. carb., syphil.

A veces el dolor de stann. es tan violento, que va acompañado de violentas pulsaciones latentes y la mente parece entumecida.

Neuralgias en cara, ojos, estómago, intestino, no con dolores lancinantes, desgarrantes, sino que comienzan lentamente, aumentan progresivamente de intensidad y disminuyen igual.

LOS DOLORES COMIENZAN A VECES CON LA SALIDA DEL SOL, AUMENTAN HASTA MEDIODÍA, Y ENSEGUIDA DISMINUYEN POCO A POCO PARA DESAPARECER CON LA PUESTA DEL SOL.

También pueden comenzar en cualquier momento : a las 10, por ej., pero siempre tienen la misma modalidad de aparecer y desaparecer progresivamente.

Algunos remedios tienen neuralgias de cabeza en relación con la marcha del sol : kalmia : dolor de cabeza que no aumenta y disminuye tan regularmente, sino siempre peor a mediodía, cactus, nat. mur., sang.

Su tendencia tísica está estrechamente ligada a neuralgias.

Si tales individuos arreglan su constitución neurálgica pueden retardar largo tiempo el estallido de la tuberculosis, pero si tratan de hacerla desaparecer por analgésicos como : quinina, aspirina, etc., si suprimen así sus neuralgias, precipitan la aparición de esta terrible enfermedad.

Si por medios artificiales no permiten a sus neuralgias seguir su curso, pronto se vuelven sensibles al frío, se resfrían cada más fácilmente : antes cada enfriamiento provocaba una neuralgia; tenían neuralgia a cada cambio de tiempo; representaban lo que Grauvogl llamó "constitución hidrogenoidea"; pero desde que atenuaron la tendencia neurálgica por analgésicos o medicamentos homeopáticos inapropiados, como phosph., por ej., en que todos los enfriamientos tienden a localizarse en pecho, no pueden curar sus resfríos y tienen perpetuo estado catarral de vías pulmonares.

Terminarán por hacer tuberculosis de la que morirán.

Stann. previene todo esto y más tarde es muy útil para atenuar la tisis (Kent).

Modalidades

Agravación

a) Por bebidas calientes.

b) Estando acostado sobre la derecha.

c) Al bajar escaleras (borax; calc. ost. lo contrario : se agrava al subir escaleras).

Mejoría

POR PRESIÓN : sus dolores mejoran por presión como coloc. y bryon.; si coloc. no alivia dolores abdominales mejorados por presión, stann. lo reemplazará favorablemente para curarlos, especialmente si sufren de antigua data y parecen querer hacerse crónicos; niño aliviado cuando lo llevan apoyando su vientre sobre el hombro o la mano, por compresión del abdomen (Nash).

Síntomas mentales

Deprime tanto espíritu como cuerpo.

Generalmente triste, ansioso, desanimado; no le gusta ver gente; necesidad de llorar todo el tiempo (nat. mur., puls., sepia); verdadero estado neurasténico.

Cabeza

Dolor de cabeza, a la mañana, sobre uno de los ojos, generalmente izquierdo, que se extiende poco a poco para invadir toda la frente, aumentando y disminuyendo progresivamente con náuseas y vómitos; dolores violentos, latentes, con ardor; a veces latidos tan fuertes que tiene la sensación que su cabeza va a estallar.

Neuralgia sobre ojo izquierdo que aumenta poco a poco a partir de las 10 hasta mediodía, con lagrimeo, luego disminuye poco a poco y desaparece al atardecer.

Neuralgia intermitente sobre órbita, desde las 10 hasta las 15 ó 16 que aumenta y disminuye progresivamente, después de abuso de quinina.

Al mismo tiempo, gran debilidad, gran palidez de cara y los antecedentes muestran que cada vez que tome frío, en lugar de coriza o resfrío de pecho, tiene neuralgias.

Poco a poco, cada enfriamiento empieza a localizarse en bronquios; disnea, tos violenta, sacudida, esfuerzos para vomitar en cada ataque, atoramiento; expectoración abundante de mucosidades espesas amarillentas, a veces sanguinolentas, pero con gusto dulce característico; despierta a la mañana con el pecho lleno de mucosidades, tose, escupe, siempre le quedan, hace esfuerzos para expulsarlas, se atora, vomita; además, muy flaco, fatigado, el menor trabajo le representa gran esfuerzo; da impresión de estar camino a la tisis (Kent).

Aparato digestivo

El olor a comida da náuseas y vómitos (colch.).

Cólicos con dolores calambrosos alrededor del ombligo y sensación de vacío, mejorados por presión, acostándose sobre el estómago (cupr., coloc.) doblándose en dos, agravados por movimiento. (bryon.).

Constipación: deposiciones duras, secas, nudosas, a veces insuficientes.

Recto perezoso, como paralizado, aún pujando fuertemente, no puede expulsarla deposición, aunque sea blanda, lo que también sucede.

Órganos genitales

Prolapso uterino y LEUCORREA, con gran debilidad; tan agotada que apenas tiene fuerza para hablar y debe sentarse a menudo al asearse a la mañana.

Reglas demasiado precoces y abundantes.

Aparato respiratorio

Gran debilidad de voz; ronquera, afonía, cuerdas vocales que parecen sin fuerza, como paralizadas.

Sensación de debilidad al hablar, sobre todo en el pecho.

Ronquera, debilidad, sensación de vacío en el pecho al comenzar a cantar a tal punto que debe detenerse a cada instante para una inspiración profunda.

A VECES PEQUEÑO ATAQUE de tos con algunos esputos, quita la ronquera durante algunos minutos.

Sensación de desolladura en laringe y tráquea con sensación de escozor cuando tose.

Irritación, cosquilleo provocado por mucosidades en tráquea; al respirar, tos floja, cargada, o seca, más estando sentado, encogido, que cuando camina.

Acumulación de gran cantidad de mucosidades en tráquea, fácilmente expulsadas al toser.

Respiración disnea al subir, al menor ejercicio, al acostarse a la noche, al toser.

Ataques de tos fatigosos, región epigástrica dolorosa como si estuviera agallada; tos violenta, ruidosa, profunda, corta, por ataques, o como emitida por un pecho debilitado, con timbre ronco, débil.

Tos provocada al hablar, cantar, reír, acostándose de lado, al beber algo caliente.

Expectoración como clara de huevo, o purulenta, amarilla verdosa, DE GUSTO DULZÓN, o pútrido, o salado, durante el día.

El pecho está tan débil que no puede hablar.

SENSACIÓN DE VACÍO EN EL PECHO.

A menudo indicado en casos en que un médico rutinario prescribiría bryon., etc., en bajas diluciones, para atenuar la tos.

No es peligrosa en la tisis, y si es un incurable, por lo menos le hará bien, si está indicado, y alargará la evolución; no provocará reacción violenta, como silic., por ej., pero puede ser seguido por agravación nerviosa.

Si su empleo despierta antiguos dolores neurálgicos, aún en el período terminal y cuando no le queda mucho tiempo de vida, y sufra demasiado, puls. es el antídoto natural de stan.

Cuando una tos cargada, fácil, se vuelve por empleo de stan., seca, violenta, sacude el pecho, y esto parece querer prolongar.

Puls. devolverá tos fácil y floja (Kent).

Espalda y extremidades

Gran debilidad general; temblor de todo el cuerpo.

Síntomas paralíticos, generalmente en extensores, que impiden sentarse, descender escaleras.

Calambre de escritores; temblor en manos con dolor calambrosos entre pulgar e índice.

Calambre en la mano al trabajar : la mujer no puede soltar la escoba (dros.) (Kent).

Piel

Sudores nocturnos profusos (acet. ac., ars. iod., calc. ost., china, conium, hep. sulf. c., iod., jaborandi, merc. sol., phosph. ac., pilocarpine, salvia, sambuc., silic., etc.).

Sudor a la mañana temprano.

Relaciones

Complementarios

Puls.

ACTÚA bien después de caust. y lo siguen bien : calc. ost., phosph., silic., sulfur, tuberc. (Allen).

STAPHISAGRIA

O delphinium staphisagria o Hierba de los piojos, planta herbácea vivaz, de la familia de las Ranunculáceas, crece en lugares sombríos del Mediodía de Francia, Italia y Europa meridional.

Para preparar el medicamento se emplean las semillas; cada una encierra un carozo que contiene una sustancia aceitosa de fuerte olor desagradable y que parece ser su parte activa.

Las tres primeras dinamizaciones se obtienen por trituración hahnemanniana y las más elevadas por diluciones sucesivas.

Acción general del medicamento

Actúa sobre SISTEMA NERVIOSO, ejerciendo ACCIÓN HIPOTENSIVANTE.

CEREBRO, MEDULA y SIMPÁTICO son vivamente influenciados por ella, por medio del simpático ataca vísceras cuyas funciones se hacen más lentas y vasos cuyo relajamiento ocasiona éstasis sanguíneo abdominal, torácico y cefálico.

Las mucosas que bajo su influencia irritante dan secreciones acres y ardientes, se cubren de mucosidades y productos purulentos fétidos, a veces estriados de sangre, presentan ulceraciones, fungosidades sangrantes y excrescencias poliposas, lo que lo relaciona con numerosos catarros subagudos, lo más a menudo de origen escrofuloso, (oftalmía, leucorrea).

También actúa sobre GLÁNDULAS que se hipertrofian e induran; ganglios escrofulosos hipertrofiados e indurados; ovarios y testículos hinchados y duros; dolores lancinantes en todas partes, en glándulas (Kent).

Parece tener acción electiva sobre ÓRGANOS GENITO-URINARIOS, particularmente, próstata.

ACTÚA sobre HUESOS Y PERIOSTEO, a los que inflama, y sobre PIEL donde hace aparecer lesiones costrosas que segregan abundantemente, expanden olor fétido, con sede de prurito intenso y ocasionan rápidamente inflamación de ganglios linfáticos correspondientes, lesiones ulcerosas y hasta fagedénicas.

Todos estos efectos son profundos y durables, por eso conviene usarlo en afecciones crónicas que después de evolución generalmente lenta, llegan a extinción de fuerzas vitales sin ataxia propiamente dicha (Espanet).

Características

1) CONSTITUCIÓN Y TEMPERAMENTO : Sujeto PÁLIDO, DEPRIMIDO, con SISTEMA NERVIOSO AGOTADO; RASGOS ABATIDOS, nariz larga y puntiaguda, ojos HUNDIDOS, OJEROSOS; es UN SENSUAL QUE HA ABUSADO DE LOS ÓRGANOS SEXUALES PARTICULARMENTE POR ONANISMO.

Conviene particularmente a individuos debilitados por emociones morales enervantes o penas, despecho y contrariedades que los irritan, por EXCESOS SEXUALES, SOBRE TODO MASTURBADORES.

Parece haber analogía evidente entre sus síntomas y trastornos nerviosos, conjunto de partida sexual; por eso combate eficazmente ciertos sufrimientos cuya causa real reside en excesos libidinosos (Espanet).

2) MORAL PARTICULAR : Los síntomas mentales tienen gran valor en staph.; y las impresiones recibidas por el cerebro y transmitidas al organismo nos guían útilmente en su elección.

EXCITABLE, FÁCILMENTE IRRITABLE PERO RARA VEZ DEJA ESTALLAR SU CÓLERA, es decir, fácilmente irritable, pero exteriormente, no la deja ver, y estado moral prominente particularmente en casos de malestares provocados por cólera contenida, contrariedad disimulada, emociones escondidas, indignación contenida, gran indignación por acciones de otros o de él mismo y preocupación por sus consecuencias; trastornos orgánicos resultantes, como vejiga irritable y necesidad urgente de orinar que dura varios días.

Un hombre bien educado tiene una discusión con un individuo grosero que termina por insultos; se contiene, da vuelta la espalda y se va.

Una vez en su casa no dice nada, se domina, pero eso lo enferma.

No duerme de noche, de día está fatigado, su cerebro no funciona; no puede calcular, comete errores al escribir o hablar; vejiga irritable, cólicos, etc.

Pérdida de memoria con sensación de peso entre los ojos, le es difícil decir si es una especie de dolor de cabeza o pesadez de espíritu; sensación como si tuviera una bola de madera en la frente o el cerebro entumecido, de madera; no sabe decir si es sensación orgánica o del espíritu; asociado a esto sensación de vacío en toda la parte de atrás de cabeza, como sensación de entumecimiento o insensibilidad.

INDIFERENCIA, ABATIMIENTO, PESADEZ MENTAL DESPUÉS DE ONANISMO.

Staph. lo cura cuando es resultado de excesos sexuales; son irritables, fácilmente fatigados, muy excitables y cuando están obligados a dominar las emociones sufren intensamente.

Una persona que está bien de salud, puede fácilmente no continuar una discusión, sabiendo que es razonable; pero un sujeto de staph. está obligado a dominarse fuertemente, se agota, pierde fuerzas, tiembla de pies a cabeza, pierde la voz, no puede dormir ni trabajar, tiene dolor de cabeza.

Muchos hombres vienen a consultar, los labios azules, manos temblorosas, dolores cardíacos, creen que van a morir, cuentan que han tenido una discusión violenta, cólera reprimida; staph., dada entonces, detiene el temblor y los calma.

Sin el remedio, tendrán durante semanas insomnio, fatiga cerebral, postración y dolores de cabeza.

Estos estados pertenecen sobre todo a aquellos que han cometido excesos venéreos (Kent).

3) **HYPERSENSIBILIDAD EXAGERADA MORAL Y FÍSICA** : Así como es extremadamente sensible a lo que se pueda y decir de él, sus sentidos están hiperestesiados.

"Punta de dedos hipersensible, oídos hipersensibles al ruido; lengua hipersensible al gusto y nariz a olores, esta hipersensibilidad es tal que las menores sensaciones son dolorosas.

Cada partícula inflamada de piel tiene en su centro puntitos hipersensibles; cuando se tocan las ulceraciones sentirá tal dolor que lo pondrá a punto de desfallecer con amenaza de crisis nerviosa.

Las hemorroides son tan sensibles que no se pueden tocar; puede presentar pequeñas excrecencias polipoideas del grosor de un grano de trigo, rojas, inflamadas, rezumantes o azuladas, sensibles al menor contacto que lo hace desfallecer; puede tener excrecencias en órganos genitales, ano y tan sensibles, que si se los pellizca tendrá un desfallecimiento, sobre todo si es mujer.

Estos estados nerviosos se encuentran en todos sus malestares y sólo será útil en casos en que el espíritu y todo el sistema nervioso están extremadamente irritados y agitados (Kent).

4) **HERIDAS POR INSTRUMENTOS CORTANTES CON INCISIÓN NETA, COMO DESPUÉS DE INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA** : Staph. es a estas heridas lo que caléndula a llagas infructuosas; arnica, hamam., ledum, y sulph. ac., contusiones, rhus, calc. ost. y nux vom., esfuerzos; calc. ph. y simph., fracturas.

Modalidades

Agravación

a) Por cólera, indignación, humillación, penas dominadas.

b) Por onanismo y excesos sexuales.

c) Por el menor tocamiento de regiones enfermas.

d) Por tabaco (ignat.).

e) Por el menor alimento o bebida.

Mejoría

a) Por calor.

b) Por reposo.

c) De noche.

Síntomas mentales

MUY SENSIBLE A LAS MENORES IMPRESIONES MENTALES.

La menor acción o palabra inocente ofende.

Gran indignación por cosas desafortunadas hechas por él u otros; se apena por sus consecuencias; tiene miedo continuo del porvenir (Farrington).

1) **SUFRIMIENTOS** : Consecuencias de sentimiento de orgullo dominado, deseo reprimido, tristeza escondida, cólera dominada.

Ha sido insultado; demasiado digno para reaccionar, esconde su cólera, regresa a casa temblando y agotado;

CÓLERA REPRIMIDA.

2) **EFFECTOS MENTALES DEL ONANISMO Y EXCESOS SEXUALES** : Apatía, hipocondría, indiferencia, debilidad de memoria, después de abusos genitales, busca la soledad y huye del sexo opuesto, en jóvenes después de excesos de onanismo, con fascies característica; localmente, irritabilidad de región prostática de uretra, esto puede ser resultado de relaciones sexuales.

Platina puede curar espasmos y convulsiones y adelgazamiento y ese conjunto de trastornos por abuso de órganos sexuales antes de la pubertad; con estado mental característico.

Otro remedio es caladium : cuando por masturbación, la verga está floja como un trapo; el prepucio, cuando es llevado hacia atrás, no tiene contractilidad para volver a cubrir el glande; hay poluciones nocturnas con o sin sueños sexuales.

Dios. y gels., y el grupo bien conocido formado por nux vom., sulph., calc.

ost., y lycop., kali brom. : parece hacer bien cuando hay depresión mental y debilidad de piernas después de masturbación.

Conium : Nebel lo señala como útil en pederastas : nigrítella o orchis vanille : planta de los Aples Suizos que calma la inquietud erótica.

MAL HUMOR, IRRITABILIDAD; NIÑOS DE MAL HUMOR QUE GRITAN POR TENER ALGO Y LO TIRAN CON IMPACIENCIA ENSEGUIDA QUE SE LO DAN; chamom. : es dada en casos en que convendría

mejor staph., chamom., nux vom., cina., coloc., tienen con staph., valor más o menos igual, para individuos irritables, huraños y de mal humor; phosph. ac., aurum y staph. para apáticos e hipoconciados (Nash).

Cabeza

Erupciones costrosas, escamosas, en cuero cabelludo.

Sensibilidad dolorosa de cuero cabelludo; descamación con prurito y escozor, agravados a la noche y por acalorarse; las costras de erupción se levantan por exudado acuoso, y dejan al descubierto superficie extremadamente sensible al tacto (Kent).

Cefalea sorda, como entumecedora, localizada en frente u occipucio, especialmente en nerviosos.

Sensación como si tuviera en la frente, entre los ojos, una bola pesada, fijae inmóvil, aún cuando mueve la cabeza.

Dolor de cabeza, por contrariedad o cólera (Kent).

Ojos

Afecciones en ángulo de ojos, particularmente interno; prurito y escozor en ángulo interno.

ORZUELOS, TUMOR EN BORDE DE PÁRPADOS, sobre todo PÁRPADO SUPERIOR, pero que pueden sobrevenir en uno después del otro.

Y DEJAN NUDOSIDADES DURAS.

Útil en orzuelos, particularmente párpado superior, que no llega a supuración ni resolución; persisten indefinidamente en forma de nódulos más o menos duros, generalmente circunscriptos y muy hiperemiados.

Comparar con : apis mel. : ORZUELOS INFLAMADOS con edema de párpado considerable, dolorosos y mejorados por aplicaciones frías; ars. alb. : orzuelos con lagrimeo irritante intenso, dolores ardientes mejorados por aplicaciones calientes y con párpado rojo violáceo; hep. sulf. calc. : orzuelos que supuran con conjuntivitis y extremadamente sensibles al tacto.

Puls. : tendencia a orzuelos en individuos con temperamento y moral característicos.

Merc. : párpados rojos, excoriados, orzuelos y ulceraciones que supuran y exasperación de dolores de noche, a la luz y al aire, etc.

COMEZÓN EN BORDE DE PÁRPADOS; en BLEFARITIS CRÓNICA comparar con graph., borax.

Oídos

Eczema.

Erupción costrosa, amarillenta, detrás de orejas.

Cara

Rasgos hundidos, tez malsana, nariz afilada; ojos hundidos, anchas ojeras azuladas.

Facies de onanista.

Masturbador.

Dolores faciales presivos, latentes, penosos, desde dientes hasta ojo; neuralgia facial (ver spig.).

Aparato digestivo

BOCA :

DIENTES QUE ENNEGRECEN O ESTRIADOS DE NEGRO; no los puede mantener blancos; caen en pedazos, carian el borde.

ODONTALGIA DURANTE REGLAS, en dientes sanos y cariados; dolor de muelas condolor al contacto con alimentos o líquidos, pero no por masticación; dolor de muelas inmediatamente DESPUÉS DE COMER O AGRAVADOS POR BEBIDAS FRÍAS, POR CORRIENTE DE AIRE FRÍO.

Sialorrea; encías esponjosas, sangran fácilmente; ulceraciones en interior de boca.

Hinchazón de glándulas submaxilares.

Faringe :

Después de amigdalitis agudas anteriores, amígdalas ligeramente hipertrofiadas, pero sobre todo induradas, duras, dolorosas después de comer; particularmente en escrofulosos, bruscos, irritables, o después de abuso de merc. (Kent).

ESTOMAGO :

HAMBRE EXTREMA, aún con estómago lleno, después de comer.

DESEO DE VINO Y TABACO.

Sensación como de estómago RELAJADO, CAÍDO, SUSPENDIDO EN EL VACÍO, LO MISMO EL ABDOMEN, con necesidad de sostenerlo con las manos.

AGRAVACIÓN DESPUÉS DEL MENOR ALIMENTO, BEBIDA, O DE COMER CARNE.

Náuseas con deseo de vomitar todas las mañanas.

ABDOMEN Y DEPOSICIONES :

Cólicos con calambres cortantes y deseo de evacuar.

ABUNDANCIA DE GASES, expulsión frecuente de gases calientes y fétidos.

Puede haber constipación con hemorroides hipersensibles o hipertrofiada próstata.

Pero el síntoma más frecuente es DIARREA : provocada por agua fría, al comer, por cólera, con mucha flatulencia y gases fétidos, con olor a huevo podrido.

Diarrea crónica en niños o deposiciones disintéricas en niños débiles, enfermizos, después de cólera, penitencia, emoción (coloc., cham.).

Aparato urinario

NECESIDAD URGENTE DE ORINAR A CADA HORA EN RECIÉN CASADOS, NERVIOSOS.

SENSACIÓN DE ARDOR DE URETRA CUANDO NO ORINA; DURANTE MICCIÓN, EL ARDOR CESA.

Sensación como si una gota de agua corriera continuamente a lo largo del canal.

Emisión involuntaria de orina acre, corrosiva con ardor de uretra, agravado por movimiento.

TRASTORNOS PROSTATICOS; hipertrofia de próstata (thuya, sabal., ferr.

picr.); necesidad urgente de orinar, con emisión poco abundante, chorro débil, gota a gota; a veces sensación como si la vejiga no se hubiera vaciado bien; TRASTORNOS PROSTATICOS EN VIEJOS.

CON MICCIONES FRECUENTES Y AL FINAL, O DURANTE, SECRECIÓN DE ORINA GOTA A GOTA, y a veces, dolor en ese momento.

Órganos genitales

MASCULINOS :

Gran excitación genésica, pero gran impotencia, gran debilidad de órganos.

Útil en casos de consecuencias molestas de onanismo o excesos sexuales.

Espermatorrea con rasgos del rostro hundidos, aspecto vergonzoso y confuso; poluciones nocturnas con lumbago, debilidad, postración, relajamiento y atrofia de órganos sexuales, falta de calor vital y gran tendencia a enfriamientos; dolores sordos de testículos; comezón voluptuosa de escroto.

Verrugas secas, muy sensibles en órganos genitales; (verrugas rojas, húmedas y malolientes pertenecen a thuya).

FEMENINOS :

Violenta excitación sexual, ninfomanía con impresiones físicas y mentales extremas; mente siempre ocupada en cosas sexuales.

Hipersensibilidad de partes genitales, vulva tan sensible que apenas soporta el contacto de una toalla.

Verrugas hipersensibles en vulva.

Reglas irregulares, atrasadas y abundantes, a veces ausentes; primerode sangre pálida, luego oscura y en coágulos. Leucorrea.

Dolores muy agudos, lancinantes, de ovarios que están excesivamente dolorosos al tacto; irradian a lo largo de regiones crurales y muslos.

Aparato circulatorio

"Puntadas", punzadas en región del corazón con temblor y agitación nerviosa característica; si estos nerviosos tienen la mente preocupada por el estado de su corazón, toman los dolores cardíacos lancinantes intercostales por cardíacos (Kent).

Espalda y extremidades

Dolor de espalda con la característica de ser peor en la cama, a la noche y a la mañana, antes de levantarse; a menudo relacionado con excesos sexuales y onanismo.

Nudosidades artríticas en articulaciones, sobre todo dedos; útil en gota, en paroxismo agudo, sino más tarde cuando los uratos en lugar de ser eliminados por la orina se depositan en articulaciones en forma de nudosidades conocidas como tofos.

Neuralgias crurales; dolores vivos de nalgas que se extienden a cadera y parte baja de espalda.

Los músculos, principalmente de pantorrillas, parecen haber sido golpeados y están dolorosos.

Piel

Sensación como si gusanos le caminaran; a veces muy marcada en órganos genitales femeninos externos; comparar con : coffea, plat., petrol., apis, tarent.

Erupciones secas o húmedas.

ECZEMA CON SECRECIÓN DEBAJO DE LAS COSTRAS, DE LIQUIDO ACRE, A CUYO CONTACTO SE FORMAN ALREDEDOR DE LAS COSTRAS, NUEVAS PLACAS ECZEMATOSAS.

LA COMEZÓN QUE LO ACOMPAÑA TIENE COMO CARACTERÍSTICA QUE ES MUY INTENSA, Y CUANDO CALMA EN UN PUNTO POR RASCADO, APARECE INMEDIATAMENTE EN OTRO.

Se localiza sobre todo EN CABEZA, OREJAS, pero su ZONA PREDILECTA ES ALREDEDOR DE LOS OJOS.

Condilomas; excrecencias en forma de coliflor.

Relaciones

Incompatible

Ranunc. bulb.

Antídotos

Camphora.

Complementarios

Caust., coloc.

STICTA PULMONARIA

O pulmonaria del Roble, es un líquen que crece al pie de viejos troncos de árboles.

La tintura madre de la que se obtienen las diversas dinamizaciones por diluciones hahnemannianas sucesivas, se prepara haciendo macerar en alcohol la planta fresca.

Acción general del medicamento

Actúa de manera electiva sobre MUCOSA DE ÁRBOL RESPIRATORIO, en la que ofrece síntomas de catarro como coriza, bronquitis, etc.

TRASTORNOS NERVIOSOS Y SÍNTOMAS REUMÁTICOS bastante característicos.

Sus diversos trastornos van acompañados de SENSACIÓN GENERAL DE MALESTAR, LASSITUD Y FATIGA DOLOROSA COMO por enfriamiento.

Síntomas mentales

Un síntoma curioso es : le parece que sus piernas flotan en el aire, o que son livianas, como si no apoyaran sobre la cama (asarum., valer., dat.

arb.); tales sensaciones se ven con frecuencia en histéricos (Nash).

Aparato respiratorio

NARIZ :

SEQUEDAZ MUY FATIGANTE DE MUCOSA NASAL; NECESIDAD CONSTANTE DE SONARSE, PERO SIN RESULTADO.

SENSACIÓN SORDA DE PRESIÓN DOLOROSA EN RAÍZ DE NARIZ con sensación de plenitud.

Se ve al principio de un coriza; cuando el catarro se hace fluente y comienza a correr, el dolor cesa o se hace menos agudo.

Otras veces, aparece en frente y sinus frontales, cuando, durante coriza, la secreción nasal se seca intempestivamente; las secreciones nasales toman tendencia a secarse y son difíciles de expulsar, pero la irritación es tan grande que tiene siempre deseo de sonarse sin resultado; la secreción nasal tiene tendencia a hacerse seca y dura hasta formar costras muy parecidas a las de kali bichr. que llega a producir debajo, verdaderas ulceraciones de septum nasal; y tiene ese violento dolor en frente y raíz de nariz que se ve en sticta pul., de modo que a veces es difícil diagnosticar entre ellos.

Coriza reincidente, con estornudos incesantes a la tarde y sensación de plenitud a la derecha de la frente a raíz de la nariz, con cosquilleo en cavidad nasal del mismo lado.

Se parecen a sticta pul. en coriza agudo : acon., ammon. carb., camph., nux vom., sambuc., y en coriza crónico : ammon. carb. y lycop. sticta pulm.

no tiene el coriza fluente y acuoso de : merc., euphr. ars., y kali hydr.; nunca es útil cuando hay secreción espesa y suave, como puls., sepia o kali sulph.

También cura el "hay fever" cuando los síntomas se localizan en cabeza y senos frontales; nariz completamente tapada a pesar de continuos estornudos.

BRONQUIOS Y PULMONES :

TOS PEOR DE NOCHE.

ACOSTADO QUE LO MANTIENE DESPIERTO, aunque no pueda decir si su insomnio se debe a la tos o a una especie de estado de nerviosidad, malestar general, que cae bajo la acción de sticta pul.

Es uno de nuestros mejores agentes para combatir la tos obstinada que acompaña a la rubéola y va acompañada de insomnio nervioso; en estos casos, se parece a coffea cruda, también muy eficaz.

Espalda y extremidades

Rigidez reumática de nuca.

Dolores reumáticos en hombro, deltoide, bíceps derechos (magn. carb., sang.).

HINCHAZÓN, calor u enrojecimiento de articulaciones dolorosas; zona inflamada y roja en articulación atacada; dolores reumáticos precedidos por síntomas catarrales.

Reumatismo inflamatorio de rodillas.

STRAMONIUM

Datura stramonium, yerba de los magos o Manzana espinosa, planta de la familia de las solanáceas probablemente originaria de la India, crece entre escombros alrededor de viejos muros o a lo largo de caminos.

La tintura madre con la que se obtienen las diferentes dinamizaciones por diluciones sucesivas se prepara haciendo macerar en alcohol la planta entera, fresca, recolectada antes de la floración.

Acción general del medicamento

Parece actuar exclusivamente sobre CEREBRO Y SISTEMA NERVIOSO CENTRAL, aunque bajo su influencia PIEL Y MUCOSAS PRESENTAN algunos síntomas.

En ellos manifiesta mejor el poder de su genio.

Actúa sobre CEREBRO de manera análoga a bell., y hyosc., pero en diferente grado : su delirio es mucho más furioso que el de ellos; el aflujo de sangre al cerebro es más considerable que el de hyosc. pero menor y de carácter menos inflamatorio que el de bell.

Va acompañado de alucinaciones; pupila dilatada, inmóvil; sensibilidad general disminuida; gran agitación de sistema muscular que ya no está bajo control de la voluntad, agitación que llega a verdaderas convulsiones; violenta agitación sexual; disnea y disfagia espasmódicas; gran sequedad de garganta e interior de boca, da sensación de mucosa en carne viva y la lengua, después de cierto tiempo, se pone rígida, luego paralizada; a menudo, erupción roja brillante en todo el cuerpo; deposiciones diarreicas, negruzcas con olor espantoso; o supresión de deposiciones y orina.

Si el envenenamiento continúa, sueño congestivo, sudor profuso, que no alivia, pérdida total de vista, oído, palabra y verdadera parálisis general que lleva a la muerte, a menos que una terapéutica apropiada socorra a tiempo al enfermo.

Características

1) CONSTITUCIÓN Y TIPO : Muy adaptado a jóvenes pletóricos, (acon., bell.), en locura y delirio de las fiebres; especialmente ciertas coreas infantiles.

2) DELIRIO DE EXTREMA VIOLENCIA, QUE LLEGA A VERDADEROS ACCESOS DE LOCURA FURIOSA : stram. da idea de violencia.

Al ver un sujeto envenenado por él o con necesidad del remedio, sorprende su extraordinaria agitación, la gran conmoción de su espíritu y cuerpo; lleno de excitación, cólera; todo en él es tumultuoso y violento; cara de aspecto salvaje; miedoso, inquieto, rojo, febril, caliente, así como la cabeza, pero extremidades frías; delirio violento con fiebre alta calor tan intenso como bell.

Se parece a un verdadero temblor de tierra por su violencia.

Espíritu trastornado; jura, desgarrar su ropa, se expresa con violencia, frenesí, puede convertirse en verdadero erotómano con crisis de exhibicionismo.

Esto se ve en fiebre tifoidea violenta, fiebre continua, congestión cerebral, locura (Kent).

Modalidades

Agravación

a) En la oscuridad.

b) Mirando una luz u objetos brillantes.

c) En la soledad.

d) Después del sueño. (lach., apis, opium, spongia).

e) Al tratar de tragar.

Mejoría

a) A plena luz.

b) Cuando está en compañía.

c) Por calor.

Síntomas mentales

Completa "EL TRIO DE REMEDIOS DEL DELIRIO" de Nash, sólo defiere de hyosc. y bell. en la intensidad.

DELIRIO FURIOSO, DESORDENADO, CON CARA ROJA, BRILLANTE, MIRADA PERDIDA, OJOS BRILLANTES Y CONGESTIONADOS; ALUCINACIONES HORRIBLES, VISIONES ESPANTOSAS QUE SURGEN DE TODOS LADOS Y DAN MIEDO; MAS QUE LOS OTROS REMEDIOS ES LOCUAZ, HABLA TODO EL TIEMPO, RÍE, JURA, CANTA, REZA.

Puede presentar muchas variedades : a veces jocoso con charla incesante y discursos absurdos que ordinariamente se dirigen a personas ausentes, gestos ridículos, danzas extravagantes, cantos y risas.

Otras, mutismo completo, pero con aspecto jocoso; pero lo más a menudo, furioso con impulso de gritar, golpear, morder, desgarrar con los dientes, morderse él mismo.

Este furor alterna a menudo, con convulsiones; a veces, mezcla de delirio alegre y furioso.

El furor es a veces terrible; canta, ríe, llora, silba, aúlla, suplica lastimosamente o blasfema de manera horrible, toma todas las posiciones correspondientes a su delirio cambiante; se pone atravesado, a lo largo; rueda como una bola; se pone rígido, de manera típica, LEVANTA SU CABEZA BRUSCAMENTE DE ENCIMA DE LA ALMOHADA, REPETIDAS VECES.

Desea luz y teme la oscuridad; desea estar en compañía, pero la vista de un objeto brillante o luz intensa provoca delirios, movimientos espasmódicos y aún convulsiones.

El impulso al terror con alucinaciones es muy pronunciado : visiones de muchedumbre numerosa, fantasmas, espectros, animales, perros a su alrededor; al principio sabe que sólo son alucinaciones; pero no tarda en persuadirse de que son verdaderas; estas alucinaciones van acompañadas de sobresaltos y los rasgos expresan ansiedad y miedo.

Alucinaciones sobre todo en la oscuridad.

A veces aversión por luz fuerte que le es penosa; a veces se sienta y mira al fuego de la chimenea, pero esto puede provocar todos u otros síntomas (Kent).

Canta canciones amorosas, o dice palabras obscenas.

Está loco de inquietud, salta fuera de su lecho.

Grita hasta enronquecer o quedar sin voz.

Tiene ideas extrañas sobre la conformación de su cuerpo; imagina que es deforme, alargado, sensaciones extrañas en cuanto a su estado físico.

Gran inquietud angustiosa y aún miedo al oír correr el agua (Kent).

Es nuestro principal medicamento en LOCURA, MANÍA AGUDA, con más ventajas que bell., que es "inflamatorio", (es decir que corresponde sobre todo a afecciones agudas inflamatorias).

Útil en casos de locura de larga data y cuyas crisis sobrevienen por paroxismos que aparecen más o menos bruscamente, al punto que una de ellas tomada aisladamente parecería necesitar bell.; al principio de la crisis éste podrá tener efecto calmante pero enseguida no producirá ningún efecto.

Stram. es a menudo indicado en "MANÍA GROSEIRA, TOSCA, DE PATANES", en viejos borrachos.

A veces en complicaciones cerebrales de fiebre tifoidea, pero menos frecuentemente que hyosc. y bell.; en ninfomanía (origan) y en manía puerperal (cann. ind.) que ocupa un primer lugar; en epilepsia por susto y reciente; en hidrofobia es más homeopático que bell.

En eretismo nervioso provocado por la inflamación que determinan estas enfermedades en los centros intracraneales, cuando se manifiesta en médula espinal (Hughes).

Sueño

Más pronunciado y rápido que en bell. y hyosc.

Presenta más estertor y agitación que hyosc.

El niño despierta presa de gran terror, no reconoce a nadie, grita de miedo, se aferra a los que lo rodean.

Cabeza

Aflujos de sangre a la cabeza; TAMBALEA con tendencia a caer hacia adelante y a la izquierda.

Tambalea en la oscuridad o con los ojos cerrados. (alum., arg. nit.).

Cefalalgia violenta.

Dolores de cabeza violentos por exposición al sol, causada por el calor del sol (lach.); agravación diurna marcada y la noche, está obligado a sentarse, porque el dolor aumenta cuando está extendido; cada movimiento, sacudida, lo agrava; ojos fijos y vidriosos, cara roja, más tarde pálida, mira fijo a un rincón cualquiera del cuarto y está sin movimiento; delira, dice cosas extrañas.

En congestiones cerebrales, el delirio se calma con la pérdida de conocimiento, tiene entonces aspecto de embriaguez profunda; pupilas dilatadas o contraídas (en bell., siempre dilatadas); estado de estupidez marcada; respiración estertorosa y mandíbula inferior caída; a veces, sorprendentemente útil en ciertos casos de meningitis bacilar por supresión mal hecha de secreción de oídos; frente arrugada, ojos vidriosos, mirada fija, pupilas dilatadas, no tiene casi fiebre, dolor terrible de base de cráneo (Kent).

Ojos

Muy abiertos, prominentes, brillantes, pupilas muy dilatadas, pero en ciertos casos achicadas.

He curado muchas afecciones oculares, irritación de cerebro, por estudios prolongados en estudiantes obligados a estudiar mucho de noche, mientras siguen numerosos cursos de día; está casi ciego; muchos dolores de ojos por luz débil, pero aliviados por luz brillante (Kent).

Cara

Enrojecimiento con hinchazón de cara más marcado que en las otras solanáceas.

Expresión de odio más marcada que en bell., a menudo precedida de expresión amistosa.

Cuando no hay delirio, aspecto de sufrimiento en la cara; frente arrugada, rasgos estirados; cara pálida, enfermiza, con rasgos tirantes.

Cuando tiene dolor de cabeza, aspecto inquieto, angustiado, que indica sufrimientos intensos.

Aparato digestivo

Como en bell. los síntomas dominantes son : SEQUEDAD DE BOCA Y GARGANTA que no disminuye por beber; GRAN SED PERO CON DISFAGIA MARCADA, imposibilidad de tragar sobre todo líquidos; HINCHAZÓN ENORME DE LENGUA, que llena la boca y está húmeda a pesar de la sequedad de boca.

En ciertos casos de TARTAMUDEZ, se ha mostrado útil al lado de cann. sat.

Aparato urinario

SUPRESIÓN DE ORINA : orina suprimida, vejiga vacía.

COMBATE bien el paro secreción urinaria en ciertas formas de fiebre tifoidea.

Órganos genitales

Impotencia y lascivia en el hombre.

En la mujer, tendencia a ninfomanía y gran abundancia de reglas con excitabilidad marcada durante metrorragia con locuacidad, habla, canta, ruega.

Útil en casos de convulsiones después del parto, manía puerperal, consintomas mentales característicos y transpiración profusa.

Aparato respiratorio

Disnea excesiva con violenta sofocación hasta amenaza de asfixia, por sensación de constricción intensa de pecho.

Tos provocada o agravada al mirar una luz brillante.

Espalda y extremidades

En el delirio, miembros animados por movimientos rítmicos graciosos.

Convulsiones de extremidades superiores o grupos de músculos aislados; espasmos parciales que cambian sin cesar de lugar.

Convulsiones agravadas por luz o vista del agua; un lado paralizado, el otro en convulsión (bell.).

Convulsiones violentas que implican a cada músculo del cuerpo, contorsiones violentas, opistótonos, contracción de miembros, mordedura de lengua, sangre por boca y nariz; durante la crisis está cubierta de sudores fríos (camph.).

Convulsiones puerperales o convulsión en caso de locura, depresión melancólica de larga data, cree haber perdido su salvación por sus pecados, triste, imagina cosas extrañas, hace cosas extrañas, hasta que sobrevienen crisis de delirio violento con cara roja, ojos brillantes, palabra incoherente, gritos, (ver.

alb. debe compararse aquí con stram.).

Piel

Rash rojo, brillante, milliar como el de la escarlatina.

Útil en consecuencias de escarlatina "resumida" con delirio, etc.

Fiebre

Fiebre con delirio violento; en hyosc; el delirio van acompañado de fiebre poco elevada, en stram. es violenta como en bell., pero en esta última hay fases de remisión y en stram. son apenas acusadas; en bell. la fiebre es sobre todo marcada de las 15 a las 3 de la mañana, para disminuir enseguida, lo que no es tan marcado en stram.

SULPHUR

Azufre, cuerpo simple de la familia de los metaloides, abunda en la naturaleza, se encuentra en estado nativo cerca de ciertos volcanes (Sulfataras de Pozzoles, Vulcano, etc.): combinando con metales, sea como sulfuro, como sulfato.

En compuestos orgánicos, forma parte constitutiva de materias albuminoideas.

Se presenta en forma de cuerpo sólido, amarillo limón, insípido y sin olor.

Insoluble en alcohol, soluble en éter, bencina, aceites y sulfuro de carbono.

Se prepara para uso homeopático, en las 3 primeras dinamizaciones, triturandola flor de azufre previa y cuidadosamente purificada.

Tiene extrema importancia y Farrington tiene razón al escribir que este gran policresto es UN REMEDIO CENTRAL POR LAS RELACIONES BIEN DEFINIDAS QUE PRESENTA CON LA MAYORÍA DE LOS MEDICAMENTOS QUE CONOCEMOS.

Kent hace notar que "parece contener una apariencia de todas las enfermedades del hombre, y un debutante, al leer su patogenesia, podría creer que no necesita otro remedio, en la práctica, puesto que este parece bastar para todo.

En realidad, no cura todo, e igual que los otros, no se debe emplear sin discernimiento.

Cuanto menos conoce un médico su Materia Médica, más da sulphure equivocadamente; pero frecuentemente los terapeutas más experimentados lo dan, por eso no se puede determinar el saber de un médico por la frecuencia con que lo receta" (Kent).

Acción general del medicamento

Es el "REY DE LOS ANTIPSORICOS" DE HAHNEMANN.

Tiene la notable propiedad de COMBATIR Y SALVAR CIERTOS OBSTÁCULOS QUE SE OPONEN A LA ACCIÓN DE LOS MEDICAMENTOS INDICADOS POR LOS SÍNTOMAS O QUE PARECEN SERLO Y CONVENIENTEMENTE ELEGIDOS.

Sucede que un remedio bien indicado por el conjunto de síntomas, no domina el caso o actúa incompletamente.

Se prescribe entonces otro que se cree mejor indicado, luego otro, etc., sin resultado...

PERO SI SE DA sulph. SE VE QUE, A PESAR DE QUE EL CASO NO PARECE NECESITARLO, PERMITE AL ORGANISMO REACCIONAR CONVENIENTEMENTE A LA ACCIÓN DEL REMEDIO EXACTO.

Si en el ejemplo citado se vuelve a los medicamentos que se pensaba que eran útiles actúan bien.

Es lo que Nash describe así : "Cuando EL MEDICAMENTO NO ACTÚA A PESAR DE PARECER BIEN INDICADO POR LOS SÍNTOMAS, DAD sulph., PORQUE LA PSORA ES EL OBSTÁCULO QUE SE DEBE VENCER" (Nash).

Sulph., mejor que ningún otro, despierta la receptividad del organismo para un medicamento cuyas dosis repetidas parecen haberle hecho perder su influencia; ninguno mejor para excitar el sistema sanguíneo y sensibilidad y desarrollar una enfermedad crónica, estacionaria y tórpida, recrudescencia de fenómenos de reacción o algún antiguo síntoma capaz de dar bases más sólidas para elegir el medicamento que se adapta mejor a fondo y forma de afección".

Desde el principio de su historia, desde Hahnemann y por recomendación suya, sulph. ha sido prescripto cuando no hay síntomas marcados y hay latencia de síntomas netos debidos a psora.

EN TAL CASO, HA SIDO PRESCRIPTO CON MUCHO ÉXITO.

Cuando, aparentemente, remedios bien indicados en primera instancia y superficialmente, no tiene éxito, cuando no se pueden encontrar síntomas marcados para otro remedio mejor, sulph. puede tener acción tan profunda, que los medicamentos actúan mejor después de su absorción.

A veces se ve, después de dar un medicamento que parece indicado, que en realidad no domina el caso, se dará, entonces, otro que parece mejor indicado, luego otro y todos sin resultado.

Uno se preguntará de donde viene eso, y se verá que aunque el caso no parece necesitar sulph. concuerda tan bien con él que en realidad es una diatesis escondida; (como tan a menudo lo es la psora) sulph. hace mejor que los otros. Esto es una constatación hecha por Hahnemann mismo y desde entonces, por todos nuestros predecesores.

Tal empleo de sulph. sólo es útil cuando hay ausencia de síntomas netos, característicos, cuando después de un examen profundo, hay que hacer lo mejor posible, utilizando un procedimiento que justifique, hasta cierto punto, basado en la experiencia y el estudio profundo de enfermo y enfermedad.

En estos casos de síntomas característicos escasos o ausentes, hay diatesis latente disimulada en el fondo del organismo y que es la psora, la sífilis o la sicosis.

Si nos damos cuenta que se trata de sífilis, elegiremos un remedio entre los que tiene apariencia de sífilis; si nos damos cuenta que es sicosis, elegiremos entre los de la sicosis.

Sulph. está a la cabeza de los que tienen apariencia de psora enmascarada, latente, y si a pesar de esta latencia, se encuentra su indicación, provocará manifestaciones exteriores o más bien visibles, de este latente, y aunque no actúe como curativo los síntomas característicos de esta diatesis escondida se manifestarán después de su empleo, con más franqueza y nitidez.

Lo que hace sulph. en caso de psora merecida lo hará en los de sífilis y también en los de sicosis (Kent).

Cuando AL FINAL DE UNA ENFERMEDAD, EL ENFERMO TARDA, SIN CAUSA APARENTE, EN IRFRANCAMENTE HACIA UNA FELIZ CONVALESCENCIA, sulph., combatirá victoriosamente el obstáculo que se opone a la curación, porque éste no es, a menudo, otra cosa que esa diatesis especial llamada por Hahnemann, psora.

Muy útil cuando, después de enfermedad aguda prolongada, no reacciona bien, no entra en franca convalecencia por diatesis profunda -diatesis psórica- que se opone.

Cuando al final de enfermedad aguda, no se llega a franca convalecencia y se pone, al contrario, más débil y abatido; cuando una inflamación de tejidos termina en supuración y luego infiltración, cuando un convaleciente continúa débil, abatido, fatigado, con sudores nocturnos; cuando después de tifoidea u otra enfermedad aguda, las cosas se prolongan y no puede entrar en franca convalecencia, cuando el restablecimiento tarda, es lento y persiste un estado de fatiga y el enfermo no entra en franca curación, sulph. será útil.

Viejos alcohólicos se debilitan y necesitan más alcohol.

Desean cosas fuertes, picantes; no quieren comer nada, pero tienen mucha sed de agua fría y bebidas muy alcoholizadas; continúan bebiendo alcohol hasta estar completamente agotados y aparecen trastornos: en estos casos sulph. les quitará ese deseo de alcohol durante un tiempo y los fortificará" (Kent).

PARA ESTA FALTA DE REACCIÓN DEL ORGANISMO, frente a medicamentos que serían útiles, poner al lado de sulph. a: psor. muy parecido y también un "antipsórico maestro"; laurocer.: falta de reacción en enfermedades de aparato respiratorio; capsic.: individuos de "fibras laxas"; opium: enfermo amodorrado, postrado, estúpido; valer. y amb. gris.: cuando en enfermedad nerviosa el remedio no actúa bien, a pesar de juiciosamente elegido; carb. veg.: falta de reacción en enfermedad abdominal, con gran enfriamiento, respiración fría, pulso rápido (Farrington).

Ningún medicamento tiene sobre PIEL acción tan general, positiva, persistente como sulph.

Su afinidad con ella es tan fuerte, que PARECE LLEVAR A LA SUPERFICIE, A LA PIEL, TODAS LAS INFLAMACIONES INTERNAS, TODAS LAS TOXINAS.

Nebel dice que sulph. elimina toxinas por la piel, particularmente tuberculosas.

"Lleva LOS MALES A LA SUPERFICIE".

Es un gran antídoto general; a él se recurre a menudo en casos de erupción suprimida, sea por frío, por medicamento mal prescrito; sulph. la llevará a la piel, y por eso figura a la cabeza de medicamentos útiles para combatir malos efectos de supresión brusca y a destiempo de erupción a cualquier flujo humoral actuando como eliminados de toxinas intraorgánicas, después de terapéutica mal hecha (Kent).

Tal vez su acción más importante en el organismo humano es que "demuestra plenamente el mecanismo de la metástasis de interior a exterior, o de exterior a interior si una influencia violenta ha hecho volver a entrar la afección periférica.

Su metástasis esencial, parece estar en la piel: las partículas del metaloidetratan de abrir camino hacia el exterior en lugares de menor resistencia.

(Anas capilares que erican la dermis, bajo la epidermis; glándulas sudoríparas y sebáceas: de ahí sudores localizados y fétidos, congestión definitiva de glándula sebácea en forma de acné; cuando la eliminación se generaliza en toda la superficie de la piel, descamación en anchas porciones, lesiones de queratinización con espesamientos psoriasiformes y pruritos insoportables; si la piel es afectada en profundidad, se observan todas las formas de eczema crónico, principalmente secos, por estrangulamiento progresivo de todos los elementos cutáneos. "LAS SECRECIONES MUCOSAS DE sulph. SON FÉTIDAS, MALOLIENTES Y EXCORIANTES.

Catarro de todas las mucosas, con secreciones que irritan, excorían: la secreción del coriza desuella nariz y labios, el líquido mucoso que queda en nariz quema como fuego y cuando corre y cae sobre labios los quema de tan irritante, como sulph. ac., y las partes que toca se ponen rojas.

Leucorrea abundante que desuella la piel.

Deposiciones líquidas que provocan vivo ardor de ano, al que desuellan.

En mujeres, si queda una gota de orina en partes genitales, provoca sensación dolorosa de ardor y no le basta con secarse, tendrá que lavarse para calmar el dolor ardiente.

En niños, nalgas y ano desollados, lo mismo que surco interglúteo : piel roja, en carne viva, irritada e inflamada por deposiciones excoriantes.

Con esta tendencia excoriente de secreciones mucosas se ha formado un síntoma clave : **TODOS LOS LÍQUIDOS QUEMAN LOS LUGARES POR DONDE PASAN**, es decir que son acres y provocan escozor, ardor" (Kent).

Actúa sobre MUCOSAS de manera marcada y profunda y tal, dice Hughes, que : "después de la piel, son las mucosas las que sienten más intensamente su influencia"; en general determina en ellas **SECRECIÓN EXCESIVAMENTE EXCORIANTE Y ARDIENTE**.

El azufre, insoluble, insuficientemente oxidado, que no puede eliminarse en sus formas más solubles, sulfatos, ácidos sulfoconjugados, etc., busca hacerlo por mucosas en forma de secreciones espesas, dulzonas, purulentas, catarro pulmonar de sulph. o reglas tardías, irritantes, o leucorrea excoriente, o descargas diarreicas súbitas, o enteritis con constipación, tenesmo anal, gases ricos en hidrógeno sulfuroso, etc.

Para Nebel, los estados de combustión insuficiente, de metástasis catarral irritante y derrames crónicos se ven cuando hay lentitud de nutrición, disminución de productos sulfoconjugados y exceso de ácido oxálico en orina.

Clínicamente, corresponden a disminución de cambios pulmonares, retenciones de serosas, diarreas de eliminación (sulf. hidrogenoide), o provocan intoxicación de sistema nervioso, colemia, cálculos renales, urticaria (sulfur-carbonitrógeno).

También actúa sobre **TEJIDO LINFOIDE**, cuyos ganglios inflama e hipertrofia.

EN APARATO CIRCULATORIO determina **TRASTORNOS CONGESTIVOS** variados pero muy característicos : actúa en **CIRCULACIÓN VENOSA** perturbando su distribución regular.

Sulf. tiene perturbación marcada de venas y circulación venosa : **ES UN REMEDIO VENOSO**.

Las paredes venosas parecen relajadas y hay circulación venosa lenta.

Cara con aspecto rojo a la menor irritación : el aire libre, el frío, rocede un vestido.

Tumefacción de cara.

Muchas várices; más marcadas en venas hemorroidarias que están distendidas, arden, escuecen.

Várices en miembros inferiores.

Las venas varicosas pueden ulcerarse y sangrar.

Al pasar de aire frío a calor, el enfermo se queja de hinchazón de venas, hinchazón de manos y pies y sensación de plétora en todo el cuerpo (Nash).

La vaso dilatación, congestión venosa, es una de sus grandes características; el organismo hace pasar el máximo posible de sangre en el mínimo de tiempo a través de un territorio determinado, para que el oxígeno queme los desechos.

De ahí, sensación de ardor, tensión ardiente, calor generalizado o localizado, (orejas ardientes; borde de ano, labios púrpura, etc.) de ahí la pesadez de cabeza, dolores latentes con vértigo; de ahí los esfuerzos de la bomba cardíaca, que pone todo en movimiento para establecer un régimen circulatorio máximo (sensación de corazón muy grande, hipertensión, etc.).

Esta circulación forzada fatalmente acarrea irregularidades (cabeza caliente, pies fríos).

Todos estos rasgos trazan el retrato de sulph. circulatorio.

Según Nebel, el estado de vaso dilatación y congestión venosa se ve en el **sulfur-oxigenoides**, con exceso de oxigenación de ácido oxálico.

Existe en : congestión de pulmones, diarreas por oxidación, trastornos hepáticos (hígado uricémico).

Sulphur nervioso o mental, puede tener mecanismo de congestión análoga.

La vaso dilatación e hipertensión de cerebro provocan euforia patológica (muy atareado todo el tiempo, delirio de grandeza, egoísmo absoluto, imagina que trapos son ropas suntuosas, se cree inmensamente rico; manía religiosa; abusa de los grandes conceptos metafísicos).

Esta fachada pretensiosa disimula una deficiencia mental real, con pérdida de memoria, empobrecimiento de asociación de ideas, depresión, irritabilidad, etc.

El sueño, tan liviano de sulph., sueño de gato, tendría las mismas causas.

La fatiga tan característica de sulph. que se encorva, no puede estar parado, siente tirones insoportables entre hombros, sufre de lumbago tenaz, sería debida a congestión venosa de médula.

Otro aspecto interesante que se puede relacionar al precedente es **sulph. linfático**.

Sobre todo en pequeños escrofulosos que adelgazan, con cara de viejecitos arrugados.

A fuerza de fabricar glóbulos blancos, por desviación de diátesis anabólica, el organismo deja agotar la fuente de leucocitos, en este caso constructores y agentes del crecimiento de tejidos; la estimulación de oxidasas desfallece, el mecanismo de regulación de oxígeno se falsea, la química profunda del azufre gana terreno en el ciclo nutritivo.

Esto se parece a su acción sobre tejido linfoideo.

Si los desechos albuminosos no pueden ser completamente destruidos durante la sobreexcitación circulatoria, un medio de destrucción más activo interviene, gracias a la oxidación combinada, al desplazamiento, en esos laboratorios de movimiento que son los músculos y sobre todo las articulaciones; de ahí, temblores, calambres, rigidez, sacudidas durante el sueño y sobre todo, toda la gama de reumatismos.

Actúa sobre NUTRICIÓN GENERAL, provocando ASIMILACIÓN DEFECTUOSA; de ahí producción de "inercia y relajamiento de fibras". (Espanet).

La desnutrición sulfurosa o más bien, carencia sulfurosa, causa gran número de fenómenos que dañan el buen funcionamiento del organismo.

El azufre participa en la formación de los tejidos celulares como phosph., por ej., y los trastornos tróficos por esta carencia, son más importantes que los que puede producir la deficiencia de fósforo.

El azufre es la base de toda materia proteica, que a su vez es base de todos los agregados celulares de la economía.

En todo el organismo hay azufre en más o menos cantidad, y si "falla" se producen trastornos profundos.

El hígado es uno de los órganos que distribuye el azufre alimenticio en diversas formas, unas útiles a la desinfección intestinal, otras presiden la sulfonación de fenoles para impedir su nocividad; otras facilitan la asimilación de sales insolubles; otras permiten la disolución de desechos del desgaste celular; mientras phosph. o ars., agentes católicos necesarios, sólo dan fosfatos o arseniatos, el azufre, verdadero elemento proteico que posee el don de las transformaciones gracias a sus numerosos isómeros alotrópicos, forma una cantidad tan considerable de derivados que su número no se puede determinar.

Desgraciadamente, y precisamente por esta razón, a causa de este empleo considerable de formas empleadas, el azufre que está en pequeña cantidad relativa en el organismo se gasta pronto.

La orina sola arrastra 3 gramos por día; el sudor, saliva, residuos de función intestinal, contienen cierta cantidad; uñas, pelos, cabellos arrastran también azufre en su caída.

El azufre es difícil de recuperar normalmente, pues nuestra alimentación es pobre en azufre.

De ahí, multiplicidad de trastornos orgánicos en que la deficiencia sulfurada juega un gran rol y la utilidad del remedio para reparar efectos nocivos.

Sulph. representa en INFLAMACIONES, en particular INFLAMACIONES SEROSAS, un rol que SU PODER DE ABSORCIÓN hace muy importante.

Cuando el derrame está hecho, y aún más tarde, cuando queda hacer desaparecer los resultados del proceso inflamatorio, como espesamiento de articulaciones en el reumatismo, exudados serosos de pleura, meninges, peritoneo etc., sulph. es muy útil.

"Determina INFILTRACIÓN de partes inflamadas al punto que se induraron esas induraciones pueden persistir años" (Kent).

"LA SUPURACIÓN es muy marcada en sulph.

Establece toda clase de cavidades supurantes pequeños o grandes abscesos bajo la piel, en tejido celular, en parénquimas orgánicos" (Kent).

"Bajo su influencia, LOS TEJIDOS PARECEN TENER falta de vitalidad; se debilita tanto que la menor presión, frotamiento un poco prolongado producen inflamación, induración, que puede llegar a supuración.

Se hacen escaras de nalgas al poco tiempo de estar en cama, porque hay circulación deficiente.

Induraciones POR PRESIÓN, FROTAMIENTO, son rasgo marcado.

Si el zapato le aprieta un poco, se forma callo o juanete.

Si los dientes frotan una parte de lengua o mucosa bucal, se forman pequeños nódulos que a la larga se inflaman con sensación de ardor y escozor y llegan a tomar aspecto maligno" (Kent).

Para terminar, citaremos esta página de Kent : "En las regiones de minas de hulla de Pennsylvania, los obreros y los que viven en la proximidad de las minas, necesitan a menudo sulph.

Sabemos que el carbón no es azufre sino otra cosa; que la gente que maneja carbón necesita a menudo sulph.

Los obreros que muelen kaolín. y los diferentes productos empleados en fabricación de porcelana y talladores de piedra, necesitan calcárea y sílice; los mineros de carbón necesitan sulph., entre ellos, los enfermos tienen la fisonomía del remedio y aún cuando tienen síntomas locales de otros medicamentos no se obtendrá de estos últimos ninguna acción eficaz antes de dar una dosis de sulph.; después su estado mejora".

Características

1) CONSTITUCIÓN Y TIPO : Es raro encontrar en la naturaleza los tipos morfológicos en estado puro : están más o menos mezclados en el mismo individuo, predominando uno de ellos.

Sulph., gran policresto, caracteriza EL TIPO MIXTO; es un compuesto que se adapta a multitud de casos y sus síntomas se encuentran casi en cada línea de nuestros repertorios.

Si en este conjunto se trata de establecer una graduación, se podría decir que es primero un digestivo, en segundo lugar un respiratorio, luego un cerebral y en fin un muscular (d'Espiney).

SU ASPECTO GENERAL es particular : EN CUANTO SE PARA BUSCA INSTINTIVAMENTE APOYO.

Se deja ir hacia adelante, como arrastrado por el peso de su cabeza y sobre todo un tironeamiento en plexo celiaco; en cuanto puede se sienta y toma una actitud atareada, apoya los codos para sostener su cabeza; si no le es posible sentarse, va y viene, la postura de pie, inmóvil, le es completamente ANTIPÁTICA" (d'Espiney).

"SUJETOS FLACOS, AGOBIADOS, QUE CAMINAN O SE SIENTAN ENCORVADOS, COMO VIEJOS; CUANDO ESTÁN PARADOS NO PUEDEN ESTAR TRANQUILOS, HACEN CAER EL PESO DEL CUERPO YA SOBRE UNA PIERNA YA SOBRE LA OTRA; O CAMINAN POR TODOS LADOS PARA BUSCAR UN ASIENTO, PORQUE LES FATIGA ESTAR PARADOS" (Nash).

"Si lo visitamos, encontraremos su pieza en desorden; nos recibirá mal peinado, con ropa interior sucia; sus ropas tiradas con descuido.

Parece haber perdido todo sentido de refinamiento, confort, orden.

Es todo lo contrario de ars., que es refinado y en este orden de ideas los dos medicamentos son los dos extremos.

Ars. quiere su ropa cuidada y limpia; que todo esté en orden, su escritorio; que los cuadros estén derechos; tiene la manía del orden; al sujeto de ars.

se le llama "el enfermo del bastón con puño de oro", por su refinamiento en el orden, limpieza, aseo.

Es todo el opuesto de sulph." (Kent).

"Parece mal lavado, inquieto por un mal olor que dice emana de él y lo tiene obsesionado" (Dr. d'Espiney).

"EN GENERAL ESTA LLENO DE SUCIEDAD; HUELE MAL, ALIENTO FÉTIDO;

DEPOSICIONES HEDIONDAS; TODAS SUS SECRECIONES HUELEN MAL A PESAR DE LOS LAVADOS CONSTANTES; EN ÓRGANOS GENITALES, AXILAS, DESPIDE OLORES ACRES, DESAGRADABLES, BASTANTE PARECIDO A LOS INDIVIDUOS DE RAZA DE COLOR, A VECES TODO EL CUERPO DESPIDE ESTE MAL OLOR" (Kent).

EL SUJETO DE sulph. HUELE MAL PORQUE NO SE LAVA.

NO LE GUSTA EL AGUA PORQUE AGRAVA TODOS SUS SÍNTOMAS (Nash).

"LA CARA ES MÁS BIEN FLACA, ESTIRADA, los segmentos se aproximan a la igualdad con predominancia de la parte media donde LA NARIZ SE ADORNA A MENUDO CON UNA EXTREMIDAD ROJA, LUSTROSA Y LA PARTE INFERIOR DONDE LAS MANDÍBULAS FUERTES ESBOZAN EL TIPO DIGESTIVO.

PIEL FINA, DELICADA, ENROJECE AL MENOR MOTIVO pero tiene apariencia SUCIA a pesar de que se lava. LABIOS, BORDES DE PÁRPADOS, ORIFICIO AURICULAR Y PABELLÓN DE LA OREJA, DE UN ROJO VIVO, COMO LLENOS DE SANGRE, SU GRÁNATE RESALTA SOBRE LA PALIDEZ AMARILLENTA DEL ROSTRO, EN TODA LA CARA ANIDAN PUNTOS NEGROS, EFELIDOS, PÚSTULAS DE ACNÉ, PÁPULAS ROJIZAS QUE TRAEN DESOLACIÓN AL PACIENTE" (d'Espiney).

"Si lo hacemos desnudar; EN MEDIO DE ESTE CUERPO FLACO CUYA MUSCULATURA TIENE POBRE APARIENCIA, EL ABDOMEN LLAMA ENSEGUIDA LA ATENCIÓN : ESTA HINCHADO, DISTENDIDO, CON BORBORIGMOS Y DOLORS A MENUDO ARDIENTES" (Kent).

"A la palpación, revela pronto puntos dolorosos sobre todo en hígado; se nota la cuerda cólica con ruidos y crepitación gaseosa marcada en ciego.

El tórax bastante largo, a veces globuloso por enfisema; se debilita, respira penosamente, el pecho parece agotado y la palabra lo fatiga.

El sudor corre por sus axilas, sobre todo a la menor emoción y su olor fétido es penetrante.

EL CUELLO DEJA BALANCEAR la cabeza hacia adelante, parece que no puede equilibrar el peso por su falta de tonicidad muscular, la columna vertebral sigue un movimiento análogo, se inclina hacia adelante como en los asténicos y los hombros suben" (d'Espiney).

Examinado de más cerca, se ve que ese cuerpo enflaquecido, con vientre grande, está cubierto de PIEL RUGOSA, ESPESA, PROPENSA A ERUPCIONES VARIADAS y esta tendencia a erupciones va desde simple eritema hasta formas de eczema más variadas.

EL SISTEMA PILOSO ES TOSCO Y GROSERO.

ES UN INDIVIDUO IRRITABLE E INTRATABLE; "uno no diría que es nervioso.

Está lleno de enervamiento, se asusta al menor ruido; despierta sobresaltado de noche como por un cañonazo y como si hubiera visto un espectro.

Propenso a trastornos durante el sueño : Duerme profundamente al principio de la noche, hasta las 3 de la mañana, pero a partir de ese momento su sueño es turbado y duerme muy mal.

Teme la llegada de la luz del día, quiere dormirse, cuando lo ha logrado le cuesta despertarse a la mañana, desearía dormir toda la mañana : es el momento en que duerme mejor y más profundamente.

Mientras duerme, tiene sueños horribles y pesadillas.

ES UN "FILOSOFO GRUÑÓN", con, a menudo INDOLENCIA DE ESPÍRITU Y CUERPO.

A menudo tiene DESEO MARCADO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS.

Hering lo ha llamado el "filósofo harapiento".

El sabio de tipo sulph., el inventor, trabaja noche y día con ropas raídas.

Tiene un viejo sombrero deformado, cabellos largos, mal cortados y cara sucia; su pieza o escritorio están desaseados, en desorden; sus libros mal ordenados; sus papeles embarullados.

Al mismo tiempo que este estado de desorden, de falta de limpieza, se observa profundo egoísmo e indiferencia.

Se vuelve un falso filósofo, y cuanto más persevera en este estado, más se decepciona porque no lo consideran el más grande hombre del mundo.

Viejos inventores que trabajan sin cesar pero sin éxito.

Los malestares que sobrevendrán en tales casos, aún trastornos agudos, harán pensar en sulph.

Estos individuos llevarían la misma camisa durante muchas semanas, si su mujer no se ocupara de ellos, la llevarían hasta que cayese en pedazos.

"Sujetos que llevan vida sedentaria, enconados, en su escritorio donde realizan trabajo intelectuales, especulaciones filosóficas, y no hacen ningún movimiento.

Pronto sólo pueden comer alimentos muy ligeros para alimentarse y hacen locura filosófica" (Kent).

EL NIÑO DE sulph. TIENE ASPECTO DE VIEJECITO; en medio de su cuerpo flaco PIEL FLÁCCIDA Y ARRUGADA, AMARILLENTA, MALSANA, EL VIENTRE DISTENDIDO O HINCHADO llama enseguida la atención, como en el adulto.

A pesar de ser gran comilón, ES DELGADO (nat. mur.); esta comida abundante no aprovecha porque hay asimilación defectuosa.

En ese cuerpo enflaquecido con vientre grande, LA CABEZA ES VOLUMINOSA, las fontanelas, quedan abiertas largo tiempo, particularmente la anterior; esta gran cabeza TRANSPIRA ABUNDANTEMENTE DURANTE EL SUEÑO.

Como el adulto, tiene ASPECTO DESASEADO, HUELE MAL, HUYE DEL AGUA. ES IRRITABLE Y GRUÑÓN.

Es de asombrar con qué rapidez, sobre todo los niños, ensucian sus vestidos, los chicos de sulph. tienen tendencia a ser mugrientos; la madre contará las cosas sucias que hacen sus hijos.

Son propensos a secreciones catarrales de nariz, ojos, ponen sin cesar sus dedos en la nariz para sacarse las costras y se las comen.

Y es curioso ver que a estos enfermos les molestan los malos olores, SON HIPERSENSIBLES A ELLOS, aunque tragan cosas repugnantes.

Tienen asco al olor de su cuerpo y aliento; el olor de las deposiciones es tan nauseabundo que los perseguirá todo el día.

Se imaginan, a causa de su hipersensibilidad, que no se han limpiado bien, que ha quedado adherida materia fecal a su cuerpo.

El sentido del olfato es exagerado, se imaginan constantemente sentir malos olores y buscan de dónde pueden venir. Tienen una imaginación tan fuerte, que creen oler cosas de las que solamente tienen un recuerdo (Kent).

El sujeto de sulph. es delgado, (aunque puede haber un tipo grueso).

Compararemos aquí, con Nash, los otros PRINCIPALES REMEDIOS DE LOS TEMPERAMENTOS FLACOS : Bryon. : muy parecido a sulph. que es su crónico, como calc. ost. es el crónico de bell.

El sujeto de bryon., como el de sulph. es delgado, pero en este último hay tez clara, cabello rubio o rojo, fibra relajada; en bryon., cabello y tez oscuros, morochos, "fibra rígida".

Caust. : flaco, cabello y tez morochos como bryon., "FIBRA RÍGIDA".

Si, como sulph. tiene sensación frecuente de ardor, en sulph. con comezón, en caust. con gran sensibilidad y sensación de "carne viva".

Iod. : moreno, escrofuloso, extremadamente flaco, tal vez más que sulph.

Ignat. y nux. v. : delgado, activo, nervioso, moreno, cuya moral y otras grandes características lo individualizan.

Lach. : flaco, melancólico, generalmente viejo bebedor o antiguo sifilítico; medicamento de menopausia.

Lycop. : moreno, flaco, sobre todo parte superior del cuerpo.

Tiene muchos puntos de contacto con nux. v. y sulph., al que completa cuando está indicado.

Nat. mur. : flaco; a pesar de apetito sólido, como iod., pero su fisionomía es tan característica que no se puede confundir.

Nit. ac. : moreno, ojos negros, descarnado, muy flaco, "fibra rígida"; indicado en enfermedades crónicas, en individuos que se resfrían fácilmente, viejos particularmente o antiguos sifilíticos que han abusado de merc. como tratamiento, o en sicóticos.

Phosph. : flaco, sanguíneo, piel y cabellos claros, a veces difícil de distinguir de sulph.

Psor. : flaco, muy parecido a sulph. pero siempre friolento, aún en verano; es la gran diferencia con sulph., que tiene casi siempre calor y ardor, sobre todo en ciertas partes.

Sepia : flaco, generalmente moreno, "fibra rígida".

Fascies características que no se parece a ningún otro; moral particular, los síntomas pelvianos en la mujer y sus otros síntomas claves.

Silic. : crónico de puls. es un débil con cabeza grande que se cubre fácilmente de transpiración abundante que cubre cuero cabelludo, cuello, cara sobre todo, mientras calc. ost. que también tiene cabeza grande sólo transpira en cuero cabelludo; niño gordo, cuyo cuerpo no se parece nada a silic.

El individuo flaco de silic. es nervioso, agitado; calc. ost. es un "leucoflemático".

Tuberculinum.

2) SENSACIONES PARTICULARES a) SENSACIÓN DE ARDOR : EN TODAS PARTES.

En todas partes en sulph. hay ardor; sensación de ardor donde hay congestión; en piel puede haber placas ardientes; en glándulas, pulmones, estómago, intestino, recto; sensación de ardor en hemorroides, con escozor; sensación de ardor al orinar, o de calor en vejiga.

Sensaciones de calor en cualquier parte, pero el típico de sulph. dirá particularmente : sensación de ardor en planta de pies, palma de manos, vértice de cabeza.

Especialmente ardor en planta de pies, de noche cuando comienza a calentarse en su cama, que puede ser tal, que saca los pies fuera de las frazadas para refrescarlos.

Al examinarlo, planta de pie y palma de manos cubiertas de piel gruesa consensación de ardor cuando se calienta en el lecho (Kent).

Sulph. va a la cabeza de todos los remedios que tienen esta sensación, con ars. y phosph., pero ars. OCUPA EL PRIMER RANGO EN ENFERMEDADES AGUDAS, sulph.

en CRÓNICAS (Nash).

La sensación de ardor de ars., está casi siempre presente en todas las inflamaciones de carácter agudo; es más intensa que phosph. y sulph. y lo indica a menudo después de acon. que se le parece por su agitación.

Casi siempre se alivia por calor; va acompañada de la agitación característica de su postración particular, y con agravación característica de 1 a 3.

Phosph. : sensación de ardor que iguala en intensidad a sulph.

Ardor en palmas de manos (sulph. en planta de pies); ardor entre omoplatos (lycop.).

Acon. nap. : sensación de ardor en regiones profundas, en la primera etapa de afecciones inflamatorias agudas, con agitación y angustia características.

Apis : edema con ardor y dolores punzantes; el ardor mejora por frío y se agrava por calor.

Agar. : enrojecimiento ardiente con comezón semejante a sabañón.

Bell. : ardor no solamente subjetivo sino que puede ser objetivo en el momento agudo de las inflamaciones.

Canthar. : sensación de ardor localizada en cualquier parte de tubo digestivo, sobre todo trayecto urinario : ardor al orinar es síntoma clave.

Caps. : ardor con sensación de carne viva, y gran sensibilidad.

Carb. ac. : muy útil en aplicaciones locales en quemaduras.

Tarent. y anthrac. : sensación de ardor muy intenso en forúnculos e hinchazones inflamatorias en general.

Tarent. tiene otra característica : color de piel azulado en ese lugar. (lach.).

Contrariamente a ars. que puede tener en ciertos casos edema localizado oscuro, no mejora por calor.

b) SENSACIÓN DE FRÍO : No TAN DEFINIDA como a precedente, ES MAS VARIABLE, en ciertos casos SI UNA PARTE DEL CUERPO SE PONE CALIENTE Y ARDE, OTRAS SE PONEN FRÍAS, lo que concuerda muy bien con el poder de sulph. de producir trastornos circulatorios con congestiones locales, por ej. : cabeza y cara calientes y manos o pies, o ambos fríos.

Aunque sulph. tiene esta sensación de frío en muchas formas y en diferentes partes del cuerpo, se puede decir que es menos marcada que la sensación de calor y QUE sulph. ES SOBRE TODO "ARDIENTE" y calc. ost., "ES FRÍA" (Nash).

Modalidades

Lateralidad

Izquierda.

Agravación

a) POR CALOR DEL LECHO, DE NOCHE; la agravación por calor del lecho, de noche, con necesidad de destaparse, se explica por la influencia congestionante de esas condiciones que aumentan hasta saturación de plétora venosa e impiden la irradiación calórica (puls.).

Esta plétora explica el alivio de sulph. cuando pone los miembros al aire (brazos y piernas, como puls. los brazos); al acostarse sobre la derecha, porque esta posición tiende a expulsar la sangre de la esponja venosa que es su hígado.

La agravación nocturna es rasgo marcado en sus agravaciones horarias : los dolores de cabeza comienzan después de la cena y aumentan durante la noche; no se puede dormir por el dolor; hay dolores y sed nocturnos; angustias nocturnas y síntomas cutáneos, que comienzan a medida que se calienta en su lecho.

Neuralgias intermitentes periódicas peor cada 24 horas, generalmente a mediodía o medianoche (Kent).

b) EN REPOSO, POR EL SUEÑO : la agravación por reposo y mejoría por movimiento se explican por la falta de oxidaciones y aceleración momentánea que le procura el movimiento (sepia).

Pero esta modalidad es limitada para la agravación, por posición de pie, debido a congestión de médula.

En cuanto a agravación después de haber dormido, concuerda con los síntomas de sulph., sobre todo los de mente y sentidos (Kent).

c) CUANDO ESTA PARADO : todos los dolores de sulph. aumentan entonces, estar de pie es una posición desagradable : tiene entonces agravación de *confusión* mental, aturdimiento, trastornos de estómago y abdomen; sensación de plenitud, ensanchamiento de venas, pesadez pelviana en la mujer..., (Kent).

d) POR EL AGUA, BAÑOS, LAVADOS EN GENERAL: la agravación por agua, baño; el estado hiperhigrométrico del aire, se explican porque las irradiaciones calóricas y otras que alivian al enfermo de su falta de

vitalidad patológica, tienen dificultad para abrirse camino a través de esta pantalla de humedad y agua : al contrario, la atmósfera de tiempo bueno y seco, buena conductora, es favorable a sulph.
Cualquier sea la explicación de esta agravación, no es menos cierto que el enfermo de sulph. está peor después de un baño.

Tiene miedo de bañarse; no se baña y, por su aspecto general, tiene el aspecto de "no lavado".

No puede tomar un baño sin resfriarse (Kent).

e) A LA MAÑANA O A LAS 17 : la agravación de la mañana y la diarrea característica en ese momento, se explican en el esfuerzo de eliminación intestinal que le organismo intoxicado ha cumplido durante la noche.

Lo mismo que el viejo catarroso debe vaciar sus bronquios al despertar, sulph.

expulsa por brusca deposición acuosa todas las mucosidades tóxicas que llenan su intestino.

La diarrea de nat. sulph. que tiene lugar después del desayuno, no obliga a saltar imperiosamente del lecho, apenas despierto, como la de sulph. que parece obedecer a un proceso fisiológico diferente de origen hepático, tiene como punto de partida el reflejo que la provoca, estimulación del hígado por el bolo alimenticio al rozar la mucosa intestinal.

La diarrea de bryon., que tiene la misma modalidad horaria, parece depender sobre todo de causa nerviosa; la gran excitabilidad de centros simpáticos y medulares, tal vez del laberinto, hace que el primer movimiento, el brusco paso de la posición acostada a de pie, desatan el flujo intestinal por simple cambio de equilibrio nervioso.

En cuanto a la agravación a las 11 podría buscarse su justificación en la exageración del catabolismo hacia la mitad del día, unido al parentesco bioquímico que liga a oxígeno y azufre.

A esta hora las oxidaciones serían más intensas por exigirle así el ciclo nutritivo, había hambre de aire y alimentos, últimamente ligados, puesto que una estadía al aire libre estimula el apetito.

f) DESPUÉS DE HABER COMIDO.

g) PERIÓDICAMENTE; todas las semanas, cada 7 días.

Parece que la causa de la agravación de sulph. a las 11, es la periodicidad del remedio : debe haber período de fase lunar o solar sea en el transcurso de las 24 horas del día, en el curso del mes o del año, en que el oxígeno, más o menos vitalizado, se fija más activamente en los tejidos.

El sujeto de sulph., especie de oxígeno negativo, podría decirse, puede sentir todas las pulsaciones del gas y ver influenciada toda su patología según una periodicidad dada, de acuerdo con las oscilaciones ocultas del oxígeno vitalizador.

h) Por estimulantes alcohólicos.

i) Por gran aire frío, por frío, por cambio de tiempo.

Mejoría

a) POR TIEMPO SECO Y CALIENTE.

No puede soportar demasiado calor, ni frío, aunque le gusta el aire libre, pero ni muy frío, ni muy caliente :

NECESITA TEMPERATURA PAREJA y no está bien si varía mucho (Kent); no soporta ni el calor, ni el frío, aunque tiene deseo de aire libre, pide temperatura pareja y sufre si cambia mucho.

A menudo está obligado a abrigarse, pero si tiene mucha ropa le molesta un prurito cutáneo y sensación de ardor de piel.

b) Acostándose sobre la derecha.

c) Por fricciones.

d) Doblando el miembro enfermo.

Síntomas mentales

ES UN NERVIOSO, VIVAMENTE IMPRESIONABLE, VIVAMENTE CALMADO.

NO SE PUEDE IMAGINAR QUE NERVIOSO ES sulph.; ES VIVAMENTE Y FÁCILMENTE EXCITABLE, FÁCILMENTE SORPRENDIDO POR UN RUIDO INESPERADO, DESPIERTA BRUSCAMENTE Y ASUSTADO (Kent).

INDIVIDUOS FLACOS Y DÉBILES, GRUÑONES, SIEMPRE DE MAL HUMOR.

EXTREMADAMENTE IRRITABLES, susceptibles, peleadores, violentos, insaciables, se enojan con facilidad y por todo.

Irresoluto, PEREZOSO, queda horas enteras inmóvil, aunque tenga muchas ocupaciones.

Tiene horror al movimiento, hasta profunda indiferencia por todo : placer, trabajo, conversación.

Profunda pereza de cuerpo y espíritu.

Demasiado perezoso para sacudirse y muy desgraciado para vivir, cansado de vivir, desea la muerte (Kent).

VERDADERA DEBILIDAD MENTAL, le cuesta comprender y asocia difícilmente sus ideas.

GRAN DEBILIDAD DE MEMORIA, MUY OLVIDADIZO.

Memoria débil particularmente para nombres propios o falta de memoria total, particularmente para acontecimientos recientes.

Se puede comparar con anacard. : útil sobre todo en sujetos gastados, viejos; lycop. : olvida significado de la letra o emplea unas por otras, o sílabas, o palabras; nux. mosch. ; debilidad o pérdida de memoria, con gran lentitud mental, olvida todo lo que está leyendo y se duerme; phosph. ac. : une a falta de memoria, apatía o indolencia; generalmente

débil, sensorio deprimido; muy útil en jóvenes que se han desarrollado muy rápido o han abusado de masturbación o coito.

CONFUSIÓN MENTAL O TRISTEZA :A menudo en estado de tristeza o confusión mental profunda que imposibilidad para reunir sus ideas; PERMANECE SENTADO, OCUPADO EN NO PENSAR EN NADA, NO HACE NINGUN ESFUERZO PARA FIJAR SU MENTE EN CUALQUIER COSA (Kent).

ESTÚPIDO, INSENSIBLE, CONFUSO, EVITA CONVERSACIONES.

Abatimiento; afluencia de multitud de ideas tristes y desagradables.

Gran tendencia a asustarse; miedo de noche, después de acostarse; miedo a espectros.

EGOÍSTA, sulph. PERVIERTE LOS AFECTOS, SE VUELVE EGOÍSTA, no piensa en los gustos de nadie, no tiene en cuenta deseos de los otros, sólo piensa en los propios.

Jamás tiene reconocimiento por nadie.

IDEA EXAGERADA DE SU PROPIO valer. : puede ser ignorante pero imagina ser un gran hombre (Kent).

GRAN TENDENCIA A ESPECULACIONES MENTALES.

Es "un filósofo desarraigado".

La manía de filosofía es rasgo marcado de sulph.; puede caer en melancolía religiosa, "humor melancólico", se extiende largamente en temas religiosos o en puras especulaciones filosóficas del espíritu.

Intelectual de apariencia sucia, grisenta, siempre inclinado a meditar, pensar, especular, pero no a trabajar verdaderamente (Nash).

IMAGINATIVO, TIENE FÁCILMENTE ILUSIONES FANTÁSTICAS, IDEAS ENTERAMENTE FALSAS SOBRE PERSONAS Y COSAS.

FATUO Y ORGULLOSO, EUFORIA ORGULLOSA, TODO LE PARECE BELLO CUANDO TIENE GANAS; toma a harapos por ricos vestidos, cada trapo viejo le parece cosa suntuosa, se cree inmensamente rico (Nash).

Sueño

EL SUEÑO DE sulph. ES MALO; la causa parece ser mala circulación (Nash).

Durante toda la noche, está AGITADO, EXCITADO; sueño entrecortado POR SUEÑOS Y PESADILLAS ANGUSTIOSOS, grita durmiendo.

PUEDE TENER SUEÑO PESADO, NO REPARADOR, O LIGERO DEL QUE DESPIERTA AL MENOR RUIDO, VERDADERO SUEÑO DE GATO. (alum., graph., lach., merc.).

COMO nux v. DESPIERTA A LAS 3 ó 4 Y YA NO SE PUEDE DORMIR.

Cuando lo consigue, no SE PUEDE DESPERTAR A LA MAÑANA SINO CON GRAN ESFUERZO.

DESEARÍA DORMIR TODA LA MAÑANA; ES LA HORA EN QUE MEJOR REPOSA.

PRESENTA DE NOCHE EL SÍNTOMA CARACTERÍSTICO : SENSACIÓN DE ARDOR EN PLANTA DE PIES, tan intensa que LOS SACA DEL LECHO PARA REFRESCARLOS.

De día y a la noche somnoliento y bostezo fácilmente.

Pero una vez en el lecho, tarda en dormir, se mantiene despierto por gran afluencia de ideas y agitación incesante.

Cabeza

Hiperestesia de cuero cabelludo.

Cabellos secos, caen.

COMEZÓN, PRURITO IMPERIOSO, RASCADO VOLUPTUOSO AL PRINCIPIO, SEGUIDO DE SENSACIÓN DE ARDOR (ver agaric.).

CALOR CONSTANTE EN VÉRTICE DE CABEZA. (cupr. sulf., graph.) CABEZA CALIENTE Y PIES FRÍOS.

Sulph. tiene MUCHOS DOLORS DE CABEZA, DE TIPO CONGESTIVO, lo que responde bien a su acción general sobre circulación.

DOLOR DE CABEZA CONGESTIVO CON SÍNTOMAS CONGESTIVOS DE CEREBRO, OBNUBILACIÓN, CON NAUSEAS Y VÓMITOS.

DOLOR DE CABEZA EN SUJETOS DE CARA CONSTANTEMENTE ROJA, tez sucia y borrosa, síntomas de estasis venoso en cara (kent).

El dolor de cabeza se agrava INCLINÁNDOSE HACIA ADELANTE, POR LUZ, RUIDO, DESPUÉS DE COMER; Y MEJORA EN PIEZA CALIENTE.

DOLOR DE CABEZA CON CALOR EN VÉRTICE QUE DA SENSACIÓN DE ARDOR TAL QUE DESEARÍA APLICAR COSAS FRÍAS, PERO ESTA MEJOR EN PIEZA CALIENTE (Kent).

Personas que se levantan a la mañana con jaqueca, vértigos y cara congestionada.

Personas que dicen que van a tener dolor de cabeza en el día, PORQUE SE SIENTEN CONGESTIONADOS A LA MAÑANA AL DESPERTAR; antes que el dolor de cabeza llegue, tienen centelleos resplandores, delante de los ojos (nat. mur., psor.). (Kent).

DOLOR DE CABEZA LOS DOMINGOS EN TRABAJADORES (Kent).

DOLOR DE CABEZA PERIÓDICO CON MAREO.

Migrañas periódicas, cada 8 días, cada 15 días, peor a la mañana al despertar, caminando al aire libre, por trabajo intelectual.

Se puede comparar con gels., lycop., sang., y silic. MUCHOS VÉRTIGOS.

CUANDO ESTA PARADO UN TIEMPO TIENE VÉRTIGO.

Lo mismo, CUANDO SE DESPIERTA, TARDA EN RECOBRARSE : se siente pesado, maldescansado; los objetos le parecen girar a su alrededor; se agrava por posición parada y por el sueño (Kent).

Vértigos a la mañana al salir del lecho, caminando al aire libre o atravesando un puente sobre un río.

Ojos

Tiene muchos síntomas oculares : TODO ENFRIAMIENTO REPERCUTE EN OJOS.

CUANDO hay síntomas oculares, los agrava y cuando no hay los hace nacer.

ENROJECIMIENTO DE OJOS, y sobre todo ENROJECIMIENTO DE BORDE CILIAR DE PÁRPADOS que responde a las características de sulph. : enrojecimiento de orificios del cuerpo en los que la mucosa parece llena de sangre.

Síntomas de CONJUNTIVITIS : ARDOR; ESCOZOR; COMEZÓN; SENSACIÓN DE SEQUEDAD DE

MUCOSA, COMO SI TUVIERA ARENA EN EL OJO; SECRECIÓN DE MUCO-PUS O PUS.

Síntomas catarrales AGRAVADOS POR LAVADO, como todo sulph.

QUERATITIS : LA CORNEA PARECE UN VIDRIO SIN PULIR; ulceración de córnea; hiperemia de retina.

Gran sensibilidad a la luz, principalmente del sol.

Lagrimo, particularmente al aire libre.

TRASTORNOS DE VISIÓN QUE ESTA OSCURECIDA COMO POR NIEBLA.

MOSCAS NEGRAS delante de ojos.

HALO ALREDEDOR DE LA LUZ DE LA LAMPARA.

CENTELLEO, manchas, moscas volantes.

Según Nash, los medicamentos que tienen acción similar sobre ojos son :

POR LA SENSACIÓN DE ARDOR

All. cep. : estado inflamatorio de ojos, relacionado con coriza agudo.

Apis : sensación de ardor extremadamente intensa, sensación de escozor, pinchazos, en ojos; parecida a la que produce el humo; necesidad de frotarse los ojos.

Esto se ve en conjuntivitis, queratitis, etc.; especialmente indicado cuando en estos casos, hay erisipela o hinchazón edematosa de párpados.

Ars. alb. : sensación de ardor muy intensa pero mejorada por calor y agravada de noche, especialmente de 1 a 3. (apis y bell. mejoran por frío).

Bell. : sensación de ardor de ojos con sensación de sequedad marcada análoga a la de garganta; ardor y cefalea agravados cuando está acostado, extendido.

Bell. es muy útil en inflamaciones agudas de ojos.

Puls. : sensación de ardor de ojos con sensación de comezón, agravada a la tarde, mejorada al aire libre y por aplicaciones frías.

Euphr. : sensación de ardor muy marcada con lagrimo acuoso, profuso, acre.

Alum., carb. veg., conium, nat. mur., caust., ruta, zinc. : pueden agregarse a la lista.

POR LA SENSACIÓN DE COMEZÓN, PRURITO

Puls. : además de prurito, secreción que no es ardiente, excoriante, como ars. o euphr.

Tendencia marcada a orzuelos.

Alumina : tiene los 3 síntomas de sulph. : prurito, sequedad, ardor; además párpados gruesos, granulados y se aglutinan de noche.

(Puls.) indicado en cloróticas y anémicas.

Arg. met. : violenta comezón en ángulos de ojos en blefaritis.

Mang. acet. : prurito con sensación de sequedad persistente.

POR LA OSCURIDAD DE LA VISIÓN

Caust.

Cina : mejora frotándose los ojos.

Santonina.

Cyclam. : en mujeres anémicas, con síntomas de puls., pero mejoran por calor en lugar de frío.

Gels. : oscuridad de visión, con vértigos.

Caída de párpados después de difteria.

Parálisis de acomodación.

Lycop. : sólo ve la mitad izquierda de los objetos.

Puls. : visión molesta, como si viera los objetos a través de un velo; mejora enjuagándose los ojos y se agrava al atardecer.

Oídos

El estado catarral es rasgo muy fuerte de sulph.

Ninguna mucosa escapa de él, todas tienen secreciones catarrales copiosas, a veces purulentas, otras sanguinolentas.

Los oídos como los ojos, no hacen excepción a esta ley (Kent).

OTITIS CRÓNICA CON SECRECIÓN PURULENTO.

OTITIS SOBRE TODO CUANDO LOS OTROS REMEDIOS HAN FRACASADO Y PRESENTA LA CARACTERÍSTICA DE sulph. CON DOLORS AGUDOS, LANCINANTES, DESGARRANTES, CON DISMINUCIÓN DE AUDICIÓN.

OTALGIA peor a la derecha, se exaspera al calor del lecho.

Comparar con : acon., bell., en que al mismo tiempo hay delirio, semiestupor, latido característico de carótidas, dolores latentes que aparecen y desaparecen bruscamente.

Merc. : escalofríos a flor de piel, que indican que el pus se forma, al mismo tiempo que los síntomas de boca y transpiración que no alivia.

Hep. sulph. calc. : supuración inminente e hipersensibilidad al dolor y altacto.

SORDERA POR CATARROS REPETIDOS.

Sordera alternando con sensibilidad excesiva al ruido.

Los otros remedios que se le pueden comparar son : puls. : catarro nasal y bronquial; merc. dulc. : con trompa de Eustaquio afectada; kali mur. y graph. : mejoría del oído por ruido.

ZUMBIDOS DE IODOS; ZUMBIDOS DE IODOS A LA NOCHE, EN EL LECHO, CON AFLUJO DE SANGRE A IODOS Y CABEZA.

Comparar con caust. : zumbidos persistentes, los pasos alrededor y las palabras que se pronuncian cerca de él, hacen eco en su cabeza; sobre todo en reumáticos.

China : graph. : zumbidos en audición mala, mejorada por ruidos; phosph. ac. : zumbidos y sordera en nerviosos, debilitados, onanistas; petrol. : zumbidos concomitantes, con dolores de trompa de Eustaquio; kali phosph. : zumbidos por debilitamiento nervioso; salic. ac. OREJAS MUY ROJAS, CON O SIN HINCHAZÓN Y ARDOR; ENROJECIMIENTO, NO SOLAMENTE DE MEATO, SINO DE TODOS LOS ORIFICIOS, DE TODA LA CABEZA, EN RELACIÓN CON CONGESTIÓN LOCAL MARCADA.

Caust. : muy parecido a sulph.

Agaric. : orejas enrojecidas como por jabones.

Apis : enrojecimiento relacionado con edema verdadero de carácter erisipelatoso.

China : orejas muy rojas y extremadamente dolorosas; se agrava por el menor contacto y acostándose sobre ellas.

Puls. : oído externo muy rojo, hinchado, con otitis externa.

Cara

Los principales síntomas de sulph. son : TEZ AMARILLO SUCIO Y ENFERMIZO; piel cubierta de COMEDONES NEGROS O PÚSTULAS DE ACNÉ.

RASGOS TIRANTES Y EXPRESIÓN A MENUDO ENFERMIZA.

OJEROSOS, BORDE DE PÁRPADOS ROJOS A VECES TUMEFACOTOS, LABIOS REPLETOS DE SANGRE, BRILLANTES DE COLOR, COMO TEÑIDOS DE CARMÍN.

MEJILLAS LLENAS FRECUENTEMENTE DE ENROJECIMIENTOS RÁPIDOS.

Tufaradas de calor en cara y cabeza, parecidas a las de la menopausia.

COMIENZAN EN EL PECHO, EN REGIÓN DEL CORAZÓN y hay sensación como si un fuerte calor subiese por el cuerpo, hasta la cara; ésta se pone roja, caliente y finalmente esta sensación de calor termina en transpiración más o menos marcada.

TUFARADAS DE CALOR CON SUDORES Y CARA ROJA, CABEZA ARDIENTE.

El enfermo lo describirá como : sensación como de vapor caliente en su cuerpo, que sube poco a poco a la cara y luego se pone a transpirar.

A veces será una mujer que tiene pequeños escalofríos, seguidos de tufaradas de calor y enrojecimiento en la cara, se abanica enérgicamente, no lo puede hacer bastante fuerte y rápido, desea puertas y ventanas abiertas.

Sulph., es como lach. y otros, pero cuando las tufaradas de calor comienzan en el pecho, a nivel del corazón, se parece más a sulph.; cuando comienzan en espalda o estómago, se parecen más a sulph. (Kent).

Aparato digestivo

Boca :

Alrededor de labios ROJOS Y BRILLANTES, SECOS Y ARDIENTES, hay mucho acné y erupciones.

El interior de la boca presenta a menudo en mucosa AFTAS, lesiones de estomatitis; ninguna de estas lesiones tiene síntomas muy característicos, pero si otros remedios habitualmente empleados como merc., hydrast., borax, etc., fracasan, sulph. ayuda la acción.

DESPUÉS DE LAS COMIDAS, EL ALIENTO PUEDE SER MALO.

Y puede tener gusto amargo, a la mañana, al despertar, con saliva salada.

LENGUA BLANCA EN EL CENTRO, PERO ROJA EN PUNTA Y BORDES. (ars., bell., chelid., merc., rhus tox., arg. nit.).

Odontalgia agravada de noche, al comer, por agua fría.

GARGANTA :

ENROJECIMIENTO de mucosa faríngea, con sensación de ARDOR Y SEQUEDAD.

Sensación como si tuviera un cuerpo extraño, espina, cabello, en garganta.

Deglución penosa con sensación de constricción.

Angina con gran sensación de sequedad y ardor PRIMERO A LA DERECHA, LUEGO A LA IZQUIERDA.

APETITO Y SED :

GRAN DESEO DE AZÚCAR, DULCES, PLATOS AZUCARADOS.

Pero menos marcado que en arg. nit., que tiene deseo irresistible de azúcar, ochina, lycop., calc. ost., kali carb. y medorr. que tienen este deseo de manera acentuada.

REPUGNANCIA POR CARNE (alum., arnica, calc. ost., carb. veg., puls., sepia) y LA LECHE ES MAL TOLERADA (aeth., calc. ost., carb. veg., magn. mur., magn.

carb., sepia).

Gran deseo de estimulantes y alcohol (asarum, coca, nux v., lach., selen., ars. alb., carvol ac., phosph., sulph. ac., lues., caust., etc.).

MUY SEDIENTO y debe mucha agua (ars. alb., bryon., china, nat. mur.).

MUCHA SED Y BEBE TODO EL TIEMPO AGUA; MUCHOS DESEOS DE AGUA (Kent).

GRAN SENSACIÓN DE HAMBRE, PERO CUANDO SE PONE A LA MESA, NO COMENADA, o casi nada, o solamente los platos más livianos.

De ahí este síntoma : BEBE MUCHO Y COME POCO (Kent).

SENSACIÓN DE DEBILIDAD, DESFALLECIMIENTO, DE VACÍO EN BOCA DE ESTÓMAGO, HACIA LAS 11.

Sensación de morir de hambre, de vacío de estómago a las 11; sensación de ardor en planta de pies, de noche; sensación de calor en vértice de la cabeza, son de manera condensada, un grupo de síntomas que piden imperiosamente sulph. (Kent).

Nash compara con sulph. por este vacío a las 11 los siguientes medicamentos : iod. : necesidad de comer todo el tiempo y mejora come.

China : alternativamente, gran hambre o falta de apetito; lycop. : gran hambre, pero se sacia a los primeros bocados; alternativas de hambre y falta de apetito; china : un día desea todo lo que ve y el siguiente no quiere nada.

Ignatia : sensación de vacío, desfallecimiento, ligado no a trastornos de digestión, sino uterinos histéricos; matriz y sistema nervioso en estado irritable y que es una manifestación puramente nerviosa; sepia : sensación de vacío, desfallecimiento, en hueco de estómago, relacionada con estado de postración general y ptosis de órganos; phosph. : marcada sensación de vacío, hueco, desfallecimiento, no solamente localizada en boca de estómago, sino que se extiende a todo el abdomen; se agrava de noche, y debe levantarse para comer; cicif., zincum, hydrast.

ESTÓMAGO :

Dispéptico que no puede digerir nada, apenas los alimentos más simples.

Sensación de morir de hambre antes de la hora de las comidas; no puede estar largo tiempo sin comer, si no se pone débil y desfalleciente, pero como el estómago es lento en digerir, siente SENSACIÓN DE PESO, después de comer, aún después de ingerir alimentos comunes, pero que requieren un estómago normal para digerirlos; en ese momento es presa de dolores como SENSACIÓN DE ARDOR, DESOLLADURA; REGURGITACIONES ÁCIDAS con gusto ácido, desagradable (Kent).

ABDOMEN :

VIENTRE DISTENDIDO, SENSIBLE, DOLOROSO; sulph. ES UN PANZÓN.

Los otros remedios que tiene vientre grande son : bar. carb. individualizado por sus características; calc. ost. : "LEUCOFLEMÁTICO".

Silic. : hipersensitivo, más parecido a sulph. por su temperamento que ningún otro.

Sepia : también "panzón", sobre todo, niños pálidos, con manchas amarillas en la cara, que sufren de enterocolitis, con vientre grande.

Sulph. presenta EXTREMA FLATULENCIA ABDOMINAL; es uno de los mejores flatulentos.

MUCHA HINCHAZÓN, BORBORISMOS, ERUCTOS y EMISIÓN DE GASES.

Esta flatulencia lo coloca al lado de carb. veg., lycop., china, chamom., magn. carb., nat. sulph., nux v., etc.

PLÉTORA ABDOMINAL : además de extrema flatulencia, verdadera plétora abdominal CON ESTASIS PORTAL con SENSACIÓN DE PLENITUD, TENSIÓN, de abdomen.

A menudo con CONSTIPACIÓN, HEMORROIDES y TRASTORNOS DIGESTIVOS.

También tienen estasis portal con trastornos : china, nux v., puls., lycop., por la constipación bryon., antim., nat. mur., etc.

Congestión portal relacionada con trastornos uterinos : aloes, sepia, etc.

CÓLICOS, terribles ataques, dolores cortantes, desgarrantes, ardientes, catarro de todo el tracto intestinal.

HÍGADO MUY MOLESTO EN sulph.

Puede presentar una gama de lesiones desde simple congestión hasta litiasis, con la repercusión habitual en la economía.

Pero no hay síntomas muy particulares.

Sensación de movimiento, contracciones de abdomen.

SENSACIÓN COMO SI TUVIERA "ALGO VIVO" EN EL VIENTRE. (thuya).

RECTO Y DEPOSICIONES :

Como todos los orificios, ANO MUY ROJO, con sensación de pinchazos, ardor, reptación, presión hacia abajo.

DIARREA MATUTINA HACIA LAS 5 ó 6, INDOLORA PERO IMPERIOSA QUE OBLIGA A SALTAR DEL LECHO; obligado a levantarse precipitadamente como si el intestino no pudiera retener la materia.

Esto hace pensar en bryon. : diarrea a la mañana pero sólo se manifiesta después que se ha levantado, se ha movido un poco.

(Agravación por movimiento), peor por tiempo caluroso.

Nat. sulph. : diarrea con flatulencia a la mañana después que se mueve un poco.

Phosph. : diarrea crónica; aloes : diarrea a la mañana, temprano, con debilidad de esfínter.

Podoph. : diarrea más tarde por la mañana y a menudo relacionada con trastornos de hígado; rhus ven. : abundantes deposiciones con cólicos a las 4; deposiciones acuosas expulsadas con fuerza.

Rumex : deposiciones acuosas, negras o marrones, a la mañana; pueden estar asociadas con tos seca con cosquilleo, tan característica.

Aunque la diarrea es lo más frecuente y característico del remedio a veces será útil en CONSTIPACION, sobre todo, CASOS CRÓNICOS, EN HEMORROIDARIOS, HIPOCONDRIAS, MUJERES ENCINTAS O QUE CRÍAN. A menudo alterna con DIARREA o TRASTORNOS CUTÁNEOS; se parece mucho a nux v. y ambos se completan útilmente; puede haber también, deposiciones secas, como bryon., que en este caso, trabaja bien con sulph.

Aparato urinario

CATARRO DE VEJIGA con muchos dolores, deseo constante de orinar con ardor y escozor en la micción.

Todo enfriamiento repercute en vejiga, en ciertos enfermos; como dulcam. y cuando éste no actúa ya sulph. sigue bien.

Orina más abundante, sobre todo de noche.

INCONTINENCIA, ver (sepia).

Orina acuosa y clara o turbia, con sedimento blanco o rojo, o marrón oscuro.

ENROJECIMIENTO, ARDOR Y COMEZÓN DE MEATO URINARIO.

Órganos genitales

MASCULINOS :

Función genital muy disminuida, frigidez.

Para este estado hay otros remedios como : lycop., selen., sepia, staph. y thuya; son todos excelentes y sulph. ayuda a todos (Nash).

PERDIDAS SEMINALES INVOLUNTARIAS : (agnus, anacard., arg. nit., avena, bar. carb., calad., calc. c., calc. ph., canthar., cinch., gels., graph., kali brom., kali carb., kali ph., lycop., medorr., nat. mur., nux v., onosm., phosph., phosph. ac., picr. ac., sabal., sal. nigr., selen., sepia, silic., staph., zinc., picr.).

Testículos relajados, colgantes.

SUDOR DE ESTROTO O ENTRE ESCROTO Y MUSLOS.

ENROJECIMIENTO, ARDOR Y COMEZÓN DE URETRA, PARTICULARMENTE MEATO; ARDOR DE URETRA DURANTE MICCIÓN QUE CONTINUA LARGO RATO.

(Si cann. sat., canth., merc. sol. o merc. corr., no actúan en gonorrea, pensemos en sulph.).

Estado inflamatorio de pene y glánde; erupción de órganos genitales, comezón peor con el calor del lecho; sudor de órganos genitales.

FEMENINOS :

COMEZÓN MOLESTA DE VULVA, ERUPCIÓN PRURIGINOSA ALREDEDOR DE GRANDES LABIOS, TRANSPIRACIÓN MUY OFENSIVA (lycop., merc., petrol., thuya).

ARDOR DE VAGINA, no puede estar tranquila; que puede estar relacionada con diferentes estados patológicos y ningún otro remedio lo tiene de manera tan marcada; afecciones cancerosas pueden exigir el remedio que se pondrá al lado de ars., kreos. y phosph., pero ninguno tendrá sensación de ardor tan pronunciada como sulph.

Sequedad, ardor y comezón de vagina, sensación de excoriación, que hacen el coito doloroso.

Reglas CON TODA CLASE DE IRREGULARIDADES EN SU FLUJO : adelantadas o atrasadas; abundantes o insignificantes; a menudo de sangre negra, espesa, irritante; precedidas, en ciertos casos, de dolor de cabeza, ver sanguin.

LEUCORREA AMARILLA, ABUNDANTE, ARDIENTE, EXCORIANTE.

Ars. : leucorrea ácida, ardiente, excoriantes, irritante, como hydrast. cuya leucorrea es de mucus difícil de desprender; peor después de reglas.

La leucorrea de iodium es tan ácida que corroe la ropa.

Kreosot. : leucorrea amarillo verdosa corrosiva, ardiente, irrita partes externas e internas; nitr. ac. : leucorrea acre acuosa, marrón, color carne.

TUFARADAS DE CALOR EN MENOPAUSIA, con cabeza, manos y pies calientes y gran sensación de vacío en boca de estómago, sobre todo a la mañana, hacia las 11.

Sulph. rivaliza aquí, con lach., sepia, glon., sang., nitr. amyl., sulph. ac., que tienen todas tufaradas de calor en menopausia; pero hay pocos casos en que sulph. no puede ayudar en cualquier etapa de este estado (Nash).

NAUSEAS DURANTE GESTACIÓN (alest. far., ars. alb., cocc. ind., simphor., sepia).

Senos agrietados, con comezón.

Aparato circulatorio

Sulph. actúa de manera predominante sobre CIRCULACIÓN especialmente VENOSA, provocando y curando CONGESTIONES LOCALES ALGUNAS DE LAS CUALES TIENEN el significado de verdaderos síntomas

claves : ESTAS CONGESTIONES agudas crónicas se manifiestan : a) POR ENROJECIMIENTO CARACTERÍSTICO DE DIFERENTES ORIFICIOS DEL CUERPO cuya mucosa da impresión de contener sangre de color bermellón, labios rojo brillante como si la sangre fuese a brotar : borde ciliar de párpados, orejas, ano, vulva, meato urinario.

b) CONGESTIONES LOCALES : EN CABEZA, con zumbidos de oídos, enrojecimiento de cara, todo mejorado en habitación caliente y agravado por frío; cabeza pesada y llena como para estallar y se agrava cuando se inclina hacia adelante (bell., glon., melitot.).

c) EN PECHO Y CORAZÓN (acon., glon.), LE PARECE TENER MUCHA SANGRE EN EL CORAZÓN; dice QUE LE PARECE QUE SU CORAZÓN ES MUY GRANDE PARA SU CAJA TORÁCICA, con ello hay PALPITACIONES y DISNEA que lo despiertan de noche o aparecen de día, cuando sube una escalera o hace un esfuerzo.

d) EN SISTEMA PORTA, con trastornos abdominales; sulph. estará mejor indicado si estos trastornos se deben a supresión de flujo hemorroidario.

Por esta tendencia a congestiones locales, comparar con : ferr. met. y phosph., que no tiene enrojecimiento de orificios del cuerpo; cactus : en que se relacionan con trastornos cardíacos; sepia : en relación con trastornos de órganos pelvianos, en la mujer, etc.

Pulso duro, acelerado, lleno.

Pulso más rápido a la mañana que a la noche.

Aparato respiratorio

NARIZ :

CADA VEZ QUE TOMA FRÍO, TIENE CORIZA : no puede tomar un baño, ir a un lugar frío, sin tener coriza; los cambios de tiempo le acarrearán ataque de coriza.

CORIZA con sequedad y obstrucción alternando con secreción serosa y ardiente.

Catarro crónico, seco, costras secas y MUCOSA QUE SANGRE FÁCILMENTE; catarro crónico con olor fétido, frecuentes estornudos.

NARIZ TURGESCENTE e inflamada con orificios rojos y costrosos.

FRECUENTES EPISTAXIS a la mañana, al sonarse.

LARINGE :

Sequedad, escozor, ardor de laringe con ronquera o afonía completa.

BRONQUIOS Y PULMONES :

DISNEA; opresión con sensación de peso en el pecho; siente que se sofoca y pide que puertas y ventanas estén abiertas sobre todo de noche.

GRAN AFLUJO DE SANGRE; sensación como si el pecho estuviera congestionado, sensación de ardor en fosas nasales (Nash).

SENSACIÓN DE ARDOR EN EL PECHO QUE SUBE A LA CARA.

Sensación de debilidad en el pecho cuando habla. (stann.).

TOS SECA, BREVE, SACUDIDA, continua, principalmente de noche y seguida a la mañana de expectoración espesa, amarillo verdosa, de gusto dulce.

TOS FLOJA A LA MAÑANA, peor hablando; expectoración verdosa, purulenta, dulce; rales en mucosa muy marcados; acumulación de mucosidades en bronquios.

SENSACIÓN DE PINCHAZOS, DE PUNTADAS EN PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DEL PECHO QUE IRRADIA HACIA ESPALDA Y OMOPLATO IZQUIERDO.

(Myrt. corn., pix liquid., therid.); las puntadas agravan acostándose de espaldas, por movimiento o respiración profunda.

Congestión de pulmón : "se debe asignar a sulph. un lugar entre bryon.

y phosph. en neumonía cuya marcha no es bastante rápida.

Corresponde al momento en que la hepatización y exudación serosa y sin plástica, alcanzan su apogeo y comienzan a despojarse de signos de agudeza. La indicación de sulph. contiene un resto de irritación sanguínea que no admite todavía a phosph. y que ya no basta a bryon.

Sulph. es muy útil por su acción sobre tejido celular y trama de capilares, tanto de órganos parenquimatosos como de tejidos extendidos en superficie y a los que esta acción atacando el proceso plástico y excitando vasos capilares tiende a reabsorción de exudados y desobstrucción de tejidos (d'Espanet).

Hemoptisis más repetidas que abundantes.

EXUDADOS PLEURETICOS : sulph. es de primera utilidad para hacer desaparecer restos de proceso inflamatorio de pleura.

Espalda y extremidades
 Dolores de tironeamiento entre hombros.
 Rigidez de nuca.
 CAMINA ENCORVADO HACIA ADELANTE; no puede caminar derecho.
 DOLOR EN REGIÓN DE RIÑONES; lumbago, dolores contusos en regiones lumbares y sacras; agravados al levantarse del asiento.
 Le cuesta enderezarse (aesc.); mejora por caminar.
 Duerme de noche de espaldas (puls. duerme de espaldas con los 2 brazos sobre la cabeza).
 TRANSPIRACIÓN MUY OFENSIVA DE AXILAS, A LA MENOR EMOCIÓN.
 SENSACIÓN DE TEMBLOR EN MANOS CUANDO ESCRIBE.
 MANOS FRÍAS O ARDIENTES.
 SABAÑONES EN MANOS (agaric., apis).
 Dedos rojos y torcidos.
 Rigidez y crujidos de rodillas (caust., petrol.).
 Calambres en pantorrillas y planta de pies, sobre todo de noche (ars. alb.).
 Pies fríos de día y ARDIENTES DE NOCHE, SOBRE TODO LA PLANTA; necesidad de ponerlos en sitio frío, de sacarlos de la cama, para refrescarlos.
 DOLORES REUMÁTICOS.
 REUMATISMO CRÓNICO.
 GOTA.
 Dolores musculares o en trayecto de nervios.
 DOLORES ARTICULARES, en grandes articulaciones, con dolor, rigidez y crujidos característicos de artritis seca; en pequeñas articulaciones de dedos, y de dedo grande, hinchazón, enrojecimiento y finalmente tofus; la artritis aguda, gotosa, de dedo grande es netamente característica.
 CIÁTICA, con dolores tironeantes, penetrantes sobre todo de pierna izquierda; van acompañados de pesadez y entumecimiento y se agravan por caminar y de noche, al calor de la cama.
 Piel
 RUGOSA, MALSANA.
 En la cara, muchos "puntos negros", acné, granos, pústulas, etc.
 Sulph. está lleno de acné en todas partes del cuerpo, erupciones escamosas, vesiculosas, etc.
 Forúnculos, impétigo, ECZEMA SOBRE TODO EN PLIEGUES DE MIEMBROS y orificios, pero con comezón y ardor.
 Haya o no erupción, comezón y ardor son característicos.
 Las erupciones de sulph. son muy numerosas, tienen como característica :ARDOR, COMEZÓN y AGRAVACIÓN POR CALOR DEL LECHO.
 Sulph. tiene la propiedad de LLEVAR TODOS LOS MALES A LA SUPERFICIE.
 ES GRAN ANTÍDOTO GENERAL; a él habrá que recurrir ante supresión mal hecha e intempestiva de erupción, sea por frío o tratamientos externos.
 Es entonces muy útil traer las erupciones a la superficie y por eso sulph. va a la cabeza de los remedios aconsejados para combatir los malos efectos de erupciones suprimidas a destiempo o de cualquier flujo detenido por medicación malamente aplicada (Kent).
 MAL OLOR DE PIEL.
 SUDORES LOCALES, PARCIALES, pero pueden HACERSE GENERALES; son FÉTIDOS, AGRIOS, HUELEN A MOHO.
 TRANSPIRACIÓN DESPUÉS DE DESPERTARSE A LA MAÑANA.
 Fiebre
 Su acción congestiva provoca muchos síntomas.
 FIEBRE CON TUFARADAS DE CALOR EN LA CARA Y ESCALOFRÍOS EN TODO EL CUERPO;
 VIOLENTO FLUJO DE CALOR EN TODO EL CUERPO.
 PIEL SECA Y GRAN SED.
 TRANSPIRACIONES PARCIALES, particularmente en nuca y occipucio; en manos; más pronunciadas después de despertarse.
 SUDOR ÁCIDO, IRRITANTE, QUE HUELE MAL.
 relaciones
 Antídotos
 Teste da como antídotos de sulph. : camph., crot. tigl., puls. y coffea.
 Se puede agregar : acon., chamom., china, merc., rhus, y thuya.
 Complementarios
 Aloes, acon., psorin., sulph.
 Es complementario de nux v.

"Quiero decir que, muy a menudo; después que nux v. ha hecho todo lo que podía, los síntomas restantes encuentran en sulph. el remedio que los hará desaparecer y completará la curación" (Farrington).

Sulph. sigue bien a lycop., pero lycop., no sigue bien a sulph. (Kent).

Forma parte del grupo alternante : sulph., calcarea, lycop., primero sulph., luego calcarea, luego lycop. después sulph. de nuevo, puesto que sigue bien a lycop. (Kent).

Sulph. y ars. son muy parecidos : se tratará durante cierto tiempo un caso con sulph., luego habrá que dar ars. durante cierto tiempo, para volver enseguida a sulph. (Kent).

"Sulph. sigue favorablemente a la mayoría de remedios agudos" (Kent).

SULFURIS ACIDUM

O ácido sulfúrico o vitriolo, existe en estado libre en el agua de los ríos de América; Río Vinagre y Páramo de Ruiz; pero se encuentra en la naturaleza combinado con cal, barita, alúmina, hierro y se prepara industrialmente por procedimientos variados.

En el comercio, hay dos clases de ácido sulfúrico : ácido sulfúrico de Nordhausen, líquido marrón que humea, casi completamente anhidro y ácido sulfúrico inglés, menos concentrado y que no humea.

Para uso homeopático sólo se emplea ácido sulfúrico de Nordhausen, previamente purificado por manipulaciones especiales.

Las dos primeras dinamizaciones se preparan por procedimientos habituales hahnemannianos de dilución, con agua destilada; la tercera con mitad alcohol y mitad agua destilada; sólo a partir de la cuarta se utiliza alcohol puro.

Acción general del medicamento

Acción debilitante habitual de los ácidos.

Es uno de los medicamentos más francamente HIPOTENIZANTES : su acción es extrema, va acompañada de debilidad tal, que el sudor aparece al menor movimiento; la sangre está fluidificada, de ahí hemorragias pasivas, pútridas, supuraciones sanguíneas, secreciones sanguíneas en superficie atónica de mucosas obstruidas y aún ulceradas; hinchazones edematosas (d'Espanet).

Acción deprimente sobre SISTEMA CAPILAR VENOSO y GRAN SIMPÁTICO, de ahí su acción particular sobre ÓRGANOS DE NUTRICIÓN Y MEMBRANAS MUCOSAS.

Produce flogosis subagudas de bronquios, tractus intestinal, órganos genito-urinares, ojos, nariz, piel, tiene carácter general de anemia, con prurito, sequedad inicial, ardor y flujo de mucosidades serosas, acre, ácido, mal o demasiado elaboradas que tienden a putrefacción en cuanto son segregadas y terminan en estado caquético en el cual la nutrición es anulada por entorpecimiento de elaboración simpática (d'Espanet).

ANTIFLOGÍSTICO de sujetos malsanos, temperamentos venosos, constituciones destrozadas, escrofulosas, hemorroidarios agotados por pérdidas de sangre repetidas, sujetos sometidos a accesos de fiebre violenta con diversos flujos mucosos o serosos, mal estado de órganos digestivos, congestión de brazo, hígado; ictericia, ganglios (d'Espanet).

Características

1) CONSTITUCIÓN Y TEMPERAMENTO : Actúa con éxito en linfáticos, grandes comilones, predispuestos, si no a diarrea a relajamiento casi continuo de vientre, de modo que las deposiciones son raramente moldeadas (Dr. Teste).

Se puede esquematizar así el tipo de sulph. ac. : linfáticos, rubios, tez pálida, labios fisurados, con tendencia especial a hemorragias y diarrea; gran debilidad general.

Moralmente siempre apresurados, hacen todo con prisa, rapidez, pero también puede encontrar el estado opuesto : gran depresión como en estados tifoideos; responde lentamente a preguntas y con gran dificultad.

2) GRAN POSTRACIÓN : GRAN AGOTAMIENTO, ENERVAMIENTO Y SENSACIÓN DE ESTAR SIEMPRE APRESURADO son rasgos constantes (Kent).

3) SENSACIÓN DE TEMBLOR, ESTREMECIMIENTO INTERIOR : Puramente subjetiva, sin manifestación objetiva; sobre todo en viejos bebedores (ran. bulb.) y también en otros casos en que la debilidad proviene de otra causa (Nash).

La sensación de estremecimiento en todo el cuerpo y miembros, SIN TEMBLOR VISIBLE, es síntoma muy pronunciado de sulph. ac. (Kent).

4) OLOR AGRIO EN TODO EL CUERPO, A PESAR DE LOS BAÑOS : Bebés que huelen agrio, como hep. sulf. calc.; como en este último, muy sensibles al tacto y casi tan sensibles al frío (Kent).

Por este olor agrio de todo el cuerpo se puede comparar con : calc. carb., magn. carb., rheum.

5) DESEO DE ESTIMULANTES : Sufre particularmente de órganos digestivos; perpetua sensación de frío, de relajamiento de estómago, que hace que desee bebidas fuertes y estimulantes, como aguardiente, aunque no sea afecto a la bebida (Farrington).

6) LOS DOLORS AUMENTAN LENTAMENTE, PROGRESIVAMENTE, HASTA EL PAROXISMO, LUEGO CESAN BRUSCAMENTE; se renuevan frecuentemente.

Pueden ser ardientes, desgarrantes, lancinantes, por sacudidas.

Ignat. y puls. tienen como sulph. ac. dolores que aumentan progresivamente para cesar bruscamente.

Modalidades

Agravación

a) POR FRÍO : Muy sensible al frío.

Cuando el remedio ha curado su sensibilidad al frío, se agrava a veces : hay quedarle entonces puls. que es complemento y antidoto de sulph. ac.

b) Por excesos de calor.

c) A la mañana, la agravación matinal es rasgo saliente.

Mejoría

a) Por calor medio.

b) Acostándose sobre el lado enfermo.

Síntomas mentales.

POSTRACIÓN DE CUERPO Y ESPÍRITU, con tristeza extrema, pensativo, alejado de la conversación; llora continuamente, asco por la vida.

SE ENERVA POR LA MENOR COSA, SE CONTRARIA POR NADA; nada de lo que se hace le gusta, carácter extremadamente irritable, lleno de aprensiones ansiosas y desconfianza.

AGITACIÓN, PRECIPITACIÓN E IMPACIENCIA : cada cosa debe ser hecha rápidamente; no puede comer o trabajar despacio.

Siempre apresurado al hacer cualquier cosa o ir a cualquier parte.

Este síntoma : HACE TODO CON APURO Y PRECIPITACIÓN, recuerda a arg. nit., aur. met., alum., lil. tigr., merc., medorr., nat. mur., nux v., etc.

Espíritu obtuso, no quiere responder a preguntas, no por obstinación, sino por incapacidad.

Sueño

Insomnio por excitación cerebral.

Se duerme tarde y se despierta temprano a la mañana.

Pesadillas frecuentes, particularmente en mujeres, antes de reglas.

Contracciones espasmódicas de dedos durmiendo.

Cabeza

Los cabellos caen o encanecen.

Ulceraciones de cuero cabelludo; erupciones extremadamente sensibles.

Sensación de contusión muy dolorosa en periosteo, como en sífilis.

DOLORES DE CABEZA QUE APARECEN Y AUMENTAN PROGRESIVAMENTE PARA DESAPARECER BRUSCAMENTE.

La sangre fluye fuertemente a la cabeza y los pies quedan fríos.

Sensación como si se clavasen una estaca en la cabeza con grandes golpes.

Sacudidas eléctricas en frente y temporales a la mañana o al atardecer.

Sensación como si el cerebro fuera móvil y cayese contra la parte de la bóveda craneana sobre la cual está acostado.

Mejora cuando está sentado perfectamente tranquilo, agravación cuando camina; SENSACIÓN COMO SI EL CEREBRO VACILARA, BAILARA EN LA CABEZA, (ars. alb., barb.

carb., rhus tox., spig.).

Cefalalgia con sensación como si el cerebro fuera desgarrado.

Dolores de cabeza violentos en personas debilitadas.

Vértigos cuando está en pieza cerrada.

Está mejor caminando al aire libre o acostado; a veces el vértigo obliga a quedar en cama.

Ojos

Inflamación crónica de ojos, con congestión de venas que están muy marcadas y ulceraciones.

Ardor y escozor de ojos con LAGRIMEO sobre todo leyendo.

Sensación como si tuviera un cuerpo extraño en ángulo externo de ojo derecho.

QUEMOSIS (apis, puls., rhus tox.).

Hemorragia interocular por traumatismo.

Oídos

SORDERA, como si tuviera una venda sobre las orejas.

Pérdida gradual de oído.

Zumbidos, principalmente de noche.

Severos dolores de oídos, que aumentan progresivamente y cesan bruscamente.

Secreción sanguinolenta por oído.

Cara

Pálida, enfermiza, adelgazada, a veces icterica, con expresión de sufrimiento marcado; piel tensa y sensación

COMO SI ESTUVIERA CUBIERTA POR CAPA DE CLARA DE HUEVO SECA, que no hay que confundir con sensación de tela de araña de graph., alum., bar. carb., bromium, borax.

Violentas neuralgias faciales que aparecen progresivamente, desaparecen bruscamente, mejoradas acostándose sobre el lado doloroso y por calor.

Aparato digestivo

BOCA :

Labios hinchados, violentamente coloreados de rojo, dolorosos al tacto, a menudo agrietados y despellejados.

Sensación de dentera en DIENTES QUE SE CARIAN FÁCIL Y PRECOZMENTE, VIOLENTAS NEURALGIAS DENTARIAS con dolores desgarrantes, corrosivos que SOBREVIENTEN LENTAMENTE, AUMENTAN PROGRESIVAMENTE, CESAN BRUSCAMENTE, agravadas de noche, en cama, por frío y mejoradas por calor. AFTAS EN LA BOCA, MAL ALIENTO, SALIVACIÓN ABUNDANTE; hinchazón de encías que sangran fácilmente; ulceraciones que se extienden muy rápidamente en la boca; hemorragia de mucosa bucal con o sin púrpura hemorrágica.

Sulph. ac. es uno de los remedios más frecuentemente indicados para AFTAS DURANTE AMAMANTAMIENTO sea de la boca de la madre o del niño : la inflamación, y ulceración de mucosa bucal es uno de los rasgos más marcados (Kent).

ESTOMATITIS AFTOSA EN ESTADO DE DEBILIDAD POR ENFERMEDAD QUE SE HA PROLONGADO EN NIÑOS MARASMÁTICOS (Farrington).

Lengua hinchada, cubierta de espesa capa blanca, con bordes y puntarajos.

Hinchazón de glándulas submaxilares.

FARINGE :

INFLAMACIÓN AFTOSA O FOLICULAR DE FARINGE CUYA MUCOSA PARECE DESNUDA.

Garganta cubierta DE ULCERACIONES QUE TIENEN GRAN TENDENCIA A EXTENDERSE.

Dolor de garganta con deglución difícil; mientras tiene dolor de garganta trata de beber los líquidos vuelven por nariz.

EXUDACIÓN DIFTERICA AMARILLENTA o blanca con aspecto aftoso, hemorragia de nariz o mucosa faríngea, gran agotamiento; mal olor extraordinario de boca y edema de campanilla.

"Hay que pensar en sulph. ac. en difteria cuando las amígdalas tienen aspecto rojo vivo y están muy hinchadas : tan hinchadas que los líquidos salen por nariz; enfermo tan pálido que tiene aspecto de cadáver; muy amodorrado, extremadamente somnoliento; gran dificultad para respirar hablar o producir sonidos por gran abundancia de membranas diftéricas" (Farrington).

ESTOMAGO :

PERDIDA DE APETITO con debilidad progresiva, es rasgo marcado.

DESEO DE FRUTAS FRESCAS, particularmente ciruelas : alum. ant. tar., phosph. ac., magn. carb., ver. alb., etc., también tiene deseo de frutas.

AVERSIÓN POR OLOR A CAFÉ (chamom., fluor. ac., phosph. ac., lycop., nux v., etc.).

NO PUEDE BEBER AGUA FRÍA, le hiela el estómago y lo enfría entero, la mezcla con alcohol.

GRAN DESEO DE ALCOHOL, AGUARDIENTE, (ars. alb., asarum., calc. ost., caust., carb. ac., coca, conium, hep., kali phosph., lach., lues., magn. carb., nux v., opium, petrol., phosph., puls., selen., sulph., staph.).

Tiene un uso que se debe a su poder de modificar la sed de espirituosos : bastaponer 2 o 3 gotas de ácido en medio vaso de agua y prescribir la absorción por cucharitas de café cada 2 à 3 hs.; con esta ayuda terapéutica el borracho vencerá la necesidad física de alcohol.

Hay que dárselo hasta que esté curado, aunque la boca esté irritada.

Si produce diarrea, puls. será entonces el remedio apropiado (Farrington).

HIPO (nux v., hydr. ac., moschus, etc.) ACIDEZ Y ERUCTOS AGRIOS QUE ARRUIAN LOS DIENTES.

Pirosis.

VINAGRERA, ACIDEZ DE ESTOMAGO, VÓMITOS ÁCIDOS. (robinia, iris vers.).

Vómitos ácidos en borrachos, a la mañana (ars.); se distinguirá en dispepsia de bebedores, a sulph. ac. de carb. veg., el primero es más "ácido, agrio" y el segundo sobre todo "pútrido" (Farrington).

Vómitos agrios durante embarazo.

No vomita la comida sino que no puede comer porque le provoca dolor de estómago y vomita mucosidades (Kent).

El estómago parece colgar, como relajado (sepia) (Kent).

Vómitos después de beber agua fría.

Sensación de frío en estómago, mejorada por aplicaciones calientes.

Violentos dolores espasmódicos de estómago; se instalan progresivamente y cesan bruscamente.

SUDOR GENERAL DESPUÉS DE COMER.

Abdomen :

Dolores cortantes, sensación de pellizco en el abdomen, sobre todo de noche.

Cólicos flatulentos, con borborigmos.

Sulph. ac. ha curado a menudo envenenamiento por plomo y cólicos de plomo (Kent).

Sensación como si tuviera hernia, principalmente izquierda.

Sensación de debilidad, flaqueza, en el abdomen después de deposición.

Sensación de debilidad en el abdomen como si las reglas quisieran venir.

Dolores de vientre parecidos a los de parto, que se extienden a caderas y espalda (Kent).

DOLORES LANCINANTES DE BAZO, QUE ES DURO Y AUMENTADO DE VOLUMEN (agar.,ars. alb., ceanoth., china).

Al cabo de cierto tiempo de evolución de la fiebre intermitente el bazo se hipertrofia y está doloroso al tacto, y al toser punzadas, puntadas en bazo e hígado.

ANO Y DEPOSICIONES :

Hemorroides rezumantes, muy dolorosas al tacto o durante deposición, con violento prurito, especialmente en borrachos.

Deposiciones atrasadas, duras, nudosas y negras.

Constipación con deposiciones de materia en forma de bolitas.

Diarrea horriblemente fétida, de consistencia de puré o acuosa, verdosa, con OLOR AGRIO de cuerpo o deposición y gran debilidad general.

Diarrea con gran debilidad general y temblores con sensación de debilidad, flaqueza en el vientre después de deposición.

Diarrea crónica con muchos cólicos.

Deposiciones excoriantes, sensación de ardor en recto durante deposición.

Diarrea provocada por el menor desarreglo de régimen, especialmente después de comer fruta, sobre todo si no está madura, u otras.

Deposición líquida, naranja-amarillo, filamentosa, mucosa, mezclada de sangre, verdosa, no digerida, huele a huevo podrido (Kent).

Aparato urinario

Dolor de vejiga, si la necesidad de orinar no es inmediatamente satisfecha.

Disminución de secreción urinaria, con sensación de ardor, al orinar.

Orina sanguinolenta.

Órganos genitales

MASCULINOS :

Sensación de fuerte calor en partes genitales.

Relajamiento de escroto.

Secreción de esperma sin sensaciones voluptuosas.

FEMENINOS :

Erosiones de cuello que sangra fácilmente en mujeres viejas.

Reglas adelantadas, muy frecuentes, abundantes, de larga duración.

METRORRAGIAS.

Muchos síntomas aparecen antes de reglas; pesadillas antes o al fin de reglas.

Leucorrea sanguinolenta, acre, ardiente, lechosa o albuminosa, amarillenta.

La mujer, EN MENOPAUSIA, tiene muchos síntomas de sulph. ac.

Tufaradas de calor, debilidad, sensación de temblor, apresuramiento nervioso moral y físico, hemorragias uterinas o de sangre que no tiene tendencia a coagulación, constipación con materia en bolitas duras, parecidas a deposición de oveja, forman con conjunto en esta fase de la vida de la mujer (Kent).

Ha curado esterilidad cuando se supone sea consecuencia de reglas abundantes y frecuentes.

Aparato respiratorio

NARIZ :

Coriza seco o líquido, con pérdida de olfato y gusto.

Sensación de tensión en la frente con coriza.

EPISTAXIS, hemorragia de nariz, de noche, de sangre que corre lentamente, oscura y muy líquida.

Cura escurrimientos acres y sanguinolentos de nariz, en sujetos debilitados, cuando los síntomas generales concuerdan.

FARINGE :

Ronquera con sensación de sequedad y rugosidad de laringe, dolores de laringe al tragar.

BRONQUIOS Y PULMONES :

Dolor ardientes y cortante detrás y a lo largo de esternón.

Disnea con gran debilidad de pecho; hace un movimiento rápido con las alas de la nariz durante la respiración como lycop., al mismo tiempo la laringe sube y baja rápidamente en ritmo sincrónico con la respiración precipitada y disneica.

Opresión y sofocación a menos que deje colgar las piernas (Kent).

Tos seca corta, jadeante, a veces a la mañana, después de levantarse, pero generalmente fuera de la mañana es cuando es seca y cortante.

Tose al aire libre al caminar o pasear en coche; la tos se agrava por bebidas frías y olor a café.

Tos agravada al aire libre como ars. alb., kali nit., phosph., rum. crisp. etc.

Tos seguida de vómitos.

Tos con esputos de sangre.

Expectoración matutina de sangre oscura, líquida o mucosidades líquidas amarillentas, sanguinolentas, de gusto ácido, agrio.

Dolores ardientes; puntadas.

Sensación de presión del lado izquierdo del pecho.

Congestión de pulmones.

Abundante hemorragia de pulmones de sangre oscura, líquida, después de neumonía o en menopausia (Kent).

Muy útil en las primeras fases de la tisis, cuando hay transpiración abundante, y gran debilidad, pero cuando ha sido dado en las últimas fases ha parecido provocar hemorragias y aumentar el estado inflamatorio de los pulmones (Kent).

Aparato circulatorio

Palpitaciones de corazón.

Puntos dolorosos en región del corazón; dolores en región precordial.

Várices.

Una disposición hemorrágica neta, acompaña muchos de sus estados patológicos.

Hemorragia DE SANGRE NEGRA, fluida, con poca tendencia a coagulación.

Hemorragias pasivas, como en el último período de fiebres infecciosas graves, cuando la sangre sale de superficies atónicas de mucosas obstruidas y ulceradas.

Nitri. ac., mur. ac., phosph. ac. y sulph. ac. no varían en tales casos sino por otros síntomas característicos (Espanet).

Espalda y extremidades

Gran debilidad de columna vertebral, principalmente sentado o parado.

Rigidez de espalda, a la mañana.

Sensación de rotura en espalda y riñones.

Calambres con contracciones en brazos y manos.

Pesadez de miembros, gran debilidad.

Pesadez y entumecimiento de piernas.

Necesidad de estirar las piernas.

Contracciones espasmódicas de dedos.

Piel

TRANSPIRACIÓN ABUNDANTE, particularmente parte posterior del cuerpo, por movimiento o después de comer un alimento caliente; es AGRIA, de OLOR ÁCIDO, fría.

Sudores nocturnos.

Sudores matinales.

Prurito en todo el cuerpo.

MANCHAS ROJAS O LIVIDAS, como por EQUIMOSIS.

Malos efectos de traumatismos con contusiones y equimosis. (arnica, acet. ac.).

PURPÚREA HEMORRÁGICA.

PETEQUEIAS. (crotal., arnic.).

Grupo de pústulas lívidas o rojas, pruriginosas.

Las cicatrices se hacen rojas y dolorosas.

Desolladuras fácilmente seguidas de ulceraciones; heridas, ulceraciones por larga permanencia en cama.

Viejas úlceras indolentes que sangran fácilmente, dejan correr sangre negra, sensibles, dolorosas, con pinchazos, tendencia a extenderse; en borrachos o después de fiebre grave.

Sabañones, con tendencia a gangrena.

Fiebre

Frecuentes escalofríos a través del cuerpo.

Tufaradas de calor a través de todo el cuerpo.

Transpiración abundante al menor movimiento.

Relaciones

Complementarios

Puls.

Sigue bien a arnica en traumatismos.

Contiene bastante azufre para actuar contra tufaradas de calor en menopausia, después del fracaso de sulph. si los otros síntomas concuerdan.

TARENTULA

Arenae tarentula, o lyocsa tarentula, de la familia de los arácnidos; araña común en países cálidos de la cuenca mediterránea, un poco parecida a la doméstica, pero más grande y robusta.

Abunda en Italia, Tarento, de donde viene su nombre : en Córcega, ciertas regiones del Mediodía de Francia y Andalucía, que es la que sirvió al Dr. Nuñez para su patogenesia; también se conoce como tarentula hispánica.

La tintura madre con la que se obtienen por diluciones hahnemannianas sucesivas las diferentes dinamizaciones se prepara, con el animal vivo aplastado en mortero con alcohol a 90°.

Acción general del medicamento

La picadura de tarentula produce a veces dolor intenso como la de abeja; otras veces no es más sensible que la de picadura de pulga; con sensación de frío y entumecimiento que parte del punto mordido y se extiende a todo el cuerpo; o en forma de mancha rojiza en la piel o un pequeño tubérculo ligeramente inflamado : rara vez se ve tumefacción considerable.

Al cabo de algunos minutos, 1/2 hora a lo sumo, sensación de frío, ligerasconvulsiones, GRAN ANSIEDAD con disnea, verdadero estado lipotímico y angustia que arranca lamentos.

Cara pálida y plomiza, ojos hundidos, respiración con suspiros; dolorcalambroide localizado en el corazón; pulso irregular, débil.

Las lipotimias y síncope del principio se repiten y se hacen más profundos;aparecen sudores fríos, sed, náuseas, vómitos, timpanismo.

Músculos primero como paralizados, luego TEMBLORES, CONTRACTURAS,

LOCALIZADASPRINCIPALMENTE EN FLEXORES; CONVULSIONES CLONICAS, limitadas a un sólo lado y hasta A UN SOLO MIEMBRO.

Generalmente, facultades intelectuales intactas, pero los enfermos estánTRISTES, DESESPERADOS, CON ACCESOS CAMBIANTES Y VIOLENTOS DE ALEGRÍA O CÓLERA.

Se ha visto pérdida de oído y vista, catalepsia, especie de estado comatoso,gran excitación de apetito venéreo; la vista de agua, ciertos colores brillantes, objetos relucientes, pero principalmente CIERTAS MÚSICAS RÍTMICAS como la tarantela, ALIVIAN.

Los autores que han descripto el tarantismo concuerdan al decir que la músicaexcitaría una especie de danza que se prolongaría 12 hasta 24 horas y traería su curación (Jousset).

LA INQUIETUD Y LA AGITACIÓN son dos características que dominan a travésde toda su historia, haciéndola parecer mucho a ars. alb.

Inquietud tanto física como moral; así como está ansioso, agitado, moralmente,piernas, brazos, tronco, están en movimiento continuo; también la cabeza; no puede estar quieto, tranquilo; agitación de miembros a la noche, en cama, antes de dormirse, como lycop. y ars. alb.; la agitación extrema de miembros se parece a ars. alb. y también es un medicamento de acción profunda, que a veces ha curado allí donde ars. alb. fracasó, a pesar de haber sido aparentemente bien elegido (Kent).

Tarent. como ars. alb. tiene sensación DE ARDOR muy marcada en muchos lugares,pero sobre todo en recto, palma de manos o planta de pies y útero (Kent).

Modalidades

Mejoría

a) POR LA MÚSICA; a veces la música mejora los síntomas, otras los agrava; las crisis histéricas mejoran por la música, canta hasta caer agotada (Kent).

b) A LA NOCHE, DESPUÉS DE COMER : los síntomas mentales mejoran a lanoche después de comer, pero muchos síntomas físicos están peor de noche, sobre todo estados afiebrados.

c) POR CAMINAR AL AIRE LIBRE, CUANDO NO HACE FRÍO, mejora la mayoría de síntomas.

d) Desea estar acostado EN LA OSCURIDAD Y QUE NO LE HABLEN.

e) POR FRICCIÓN SUAVE en regiones dolorosas.

Agravación

a) Todos los síntomas empeoran por PENA O EXCITACIÓN.

b) POR FRÍO, TIEMPO FRÍO Y HÚMEDO, cambio de tiempo; los dolores demiembros se agravan por frío o enfriamiento.

c) POR CONTACTO BRUSCO en regiones afectadas.

d) PERIÓDICAMENTE, periodicidad marcada, tanto que se ha empleadoútilmente en ciertas fiebres intermitentes, con agitación de miembros, inquietudes, etc.

e) LADO DERECHO : ojo derecho más a menudo atacado que el izquierdo;muchos síntomas del cuerpo se limitan al lado derecho.

Síntomas mentales

Una gran característica moral es MOVILIDAD EXCESIVA DE ESTADOS MENTALES OPUESTOS; pasa bruscamente de alegría loca con risa en carcajadas a tristeza profunda con llanto; pero TRISTEZA Y

MELANCOLÍA tienen predominancia marcada.

A menudo MEMORIA E INTELIGENCIA DEBILITADAS CON GRAN IMPRESIONABILIDAD; a vecesla música mejora y otras agrava; la música excita mucho; se agrava por penas o la menor excitación.

GRAN AVERSIÓN POR COLORES COMO : VERDE, ROJO o NEGRO, cuya vista puede provocarataque.

El consuelo provoca lágrimas.

En medio de este estado aparecen ataques de DELIRIO INCOHERENTE, CON CANTO YDANZAS; delirio durante el que se golpea violentamente; alucinaciones de vista, visiones de animales monstruosos, insectos, fantasmas, etc.; se golpea la cabeza con las manos, se golpea el cuerpo, a su enfermera, a sus mejores amigos; se

arranca el cabello, canta y danza locamente; LA VIOLENCIA ES UN GRAN RASGO de este estado moral de tarent.; violencia con cólera; desgarrar su ropa.

IMPULSOS DE CAMBIAR CONSTANTEMENTE DE LUGAR; se agita sin cesar, MUEVE LOS MIEMBROS QUE NO PUEDEN ESTAR TRANQUILOS, GIRA LA CABEZA DE DERECHA A IZQUIERDA; estos impulsos van acompañados de fatiga excesiva y TEMBLORES MUSCULARES, ESPASMOS SACUDIDOS que dan a menudo una perfecta imagen de la DANZA DE SAN VITO.

Estos síntomas se relacionan principalmente con la HISTERIA de la medicina antigua, para la que tarent. es excelente remedio.

Sueño

Deseo irrefrenable de dormir, de día, siempre a la misma hora, o durante trabajo intelectual.

De noche, antes de dormirse agitación de miembros a los que no puede tener quietos (caust., zincum., etc.).

De noche, sueño turbado por sueños y pesadillas; despierta sobresaltado con palpitaciones.

Cabeza

CABEZA CONTINUAMENTE EN MOVIMIENTO; GIRA CONSTANTEMENTE DE DERECHA A IZQUIERDA, LA FROTA SOBRE ALGO DURO, SOBRE LA ALMOHADA CUANDO ESTA EN CAMA.

Sacude la cabeza de un lado a otro.

Contorsiones y sacudidas de cabeza.

Sensación de calor ardiente en cabeza.

Dolores de cabeza numerosos y variados; acompañados a veces de disnea, palpitaciones, tristeza y deseo de llorar, sensación de congestión de cabeza; se agrava al agacharse o por resplandor de la luz; el dolor puede ser general, sordo o agudo hasta arrancar gritos; o localizado en un lado de la cabeza, sienes, frente, occipucio, propagándose a nuca y garganta.

La picadura de tarent. produce vértigo con desfallecimiento.

Palidez de rostro y náuseas; vértigo que puede llegar a caída; al caminar, de noche, al descender escaleras, al fijar la vista sobre un objeto.

Ojos

Fijos, muy abiertos.

Síntomas de conjuntivitis; sensación de arena en ojos; comezón en ojos; sensación de ardor peor a la derecha.

Dolores violentos en globo ocular derecho.

Sensación de agua fría en globo ocular.

Fotofobia marcada; pérdida de la facultad de ver el rojo, verde y amarillo.

Oscurecimiento y hasta pérdida momentánea de la vista (Amaurosis histérica).

Oídos

Dolor de oídos particularmente derecho; dolor con escozor de meato auricular; agravación por presión; dolores excesivos en oído interno.

Zumbidos, ruidos; zumbidos con vértigo; al despertar, a la mañana, ruidos de campanas.

Hipersensibilidad de oído.

Sordera histérica pasajera.

Como el ojo, oído derecho más afectado que el izquierdo.

Cara

Por la picadura, la cara se pone pálida y terrosa.

El veneno da lugar a erupción papulosa de cara, análoga a la miliar; prurito y escozor en cara.

Dolores diversos en la cara; neuralgia de nervio maxilar inferior.

Aparato digestivo

BOCA :

Sensación de ardor y sequedad en mucosa de boca y lengua, a veces con gusto ácido y pastoso.

Aftas en boca y lengua.

Rigidez y dificultad para mover la lengua.

Se ven diversas variedades de odontalgias, a veces con calor y sudor de cara.

Dolor en ángulo de mandíbula inferior, como si los dientes fueran a caer (Kent).

FARINGE :

Inflamación de garganta y amígdalas, marcada a la derecha.

Dolores lancinantes de garganta y amígdalas que se propagan al oído.

Constricción de garganta; disfagia.

ESTOMAGO :

ANOREXIA COMPLETA CON SED.

Asco marcado por carne.

A veces deseo de cosas crudas.

Deseo de agua fría, pero repugnancia por beber; la vista del agua es agradable.

Hipo, náuseas y vómitos biliosos, mucosos o alimenticios.

Dolores variados, a veces ligeros, indeterminados; otras violentos, como calambre, con angustia, desfallecimiento, pero sobre todo inquietud y necesidad de moverse; se propagan a veces a región de bazo e hígado.

ABDOMEN :

Cólicos, dolores ardientes, puntadas; dolores con sensación de desfallecimiento que fuerzan a sentarse; irradian a ano y vagina; dolores lancinantes de vientre, ano y vagina al mismo tiempo; se complican con borborigmos y timpanismo.

Dolores lancinantes de bazo.

Dolores de hígado que está sensible al tacto e hipertrofiado.

Constipación obstinada, sin deseo, con agitación e inquietud, deposiciones duras, difíciles; en recto, dolores de escozor, tenesmo.

Como efecto alternante, diarrea abundante con postración.

Aparato urinario

Altas dosis determinan orina poco abundante, rojiza, turbia, con tenesmo, escozor ardiente, sensación de excoriación de uretra.

Dosis infinitesimales, orina muy abundante, con fatiga y languidez.

En la mujer, incontinencia al toser, reír, al menor movimiento.

Útil en ciertos casos de diabetes azucarada con angustia, debilidad dolor de magulladura en todo el cuerpo.

A veces, en ciertos casos cistitis, arenillas, cuando los síntomas concuerdan.

Órganos genitales

MASCULINOS :

TODAS LAS DOSIS producen excitación de deseos venéreos : DESEO SEXUAL INDOMABLE Y TAL QUE PARECE ESTAR EN ESTADO ESPIRITUAL TAL QUE NO TIENE NINGÚN DESEO DE DOMINAR SUS PASIONES SEXUALES; LASCIVIA QUE LLEGA CASI A LOCURA.

Pérdidas seminales; esperma sanguinolento; testículos dolorosos, con, a veces, nudos dolorosos e indurados; dolores a lo largo de cordones espermáticos.

FEMENINOS :

Igual ERETISMO VIOLENTO en indomable: las relaciones sexuales sólo aumentan el deseo y no procuran ningún alivio.

HIPERESTESIA EXTREMA DE PARTES GENITALES.

PRURITO VULVAR que se extiende profundamente a vagina, peor de noche.

DOLORES Y CALAMBRES VIOLENTOS DE ÚTERO; contracciones expulsivas, dolores de útero parecidas a los de parto; dolores ardientes de útero que puede estar hipertrofiado, indurado; matriz excesivamente sensible a la presión.

Relajamiento de músculos uterinos con desplazamiento de órgano y sensación de tirón hacia abajo en pelvis.

REGLAS DEMASIADO TEMPRANAS Y ABUNDANTES.

Aparato respiratorio

Ronquera y sequedad de laringe que desciende a tráquea; sensación de ardor desde garganta a pecho.

Tos convulsiva, sea seca o con expectoración abundante; puede ser provocada por ligero cosquilleo de garganta y se produce sobre todo a la mañana.

Disnea con respiración jadeante; cuando levanta los brazos o está acostado sobre la izquierda; dolores diversos en pecho.

Aparato circulatorio

PALPITACIONES CON ANSIEDAD, con tendencia a síncope; al mismo tiempo, pulso pequeño, débil, frecuente.

Dosis infinitesimales han producido los mismos síntomas.

Las palpitaciones tienen sobre todo carácter nervioso; PALPITACIONES CONTRISTEZA Y DESEO DE LLORAR.

IRREGULARIDAD DE LATIDOS CARDIACOS y síntomas en relación con ANGINA DE PECHO.

Dolor en región de la aorta y arterias subclaviculares derechas.

Dolores que se extienden a brazo izquierdo; hiperestesia de piel de esas regiones; dolores de compresión en el corazón, como si estuviera comprimido por una mano, una ligadura.

Espalda y extremidades

Sus dolores son los más a menudo RIGIDEZES DOLOROSAS O DOLORES CON SENSACIÓN DE PARÁLISIS; DOLORES LANCINANTES, PUNZADAS QUE HACEN GRITAR.

Rigidez dolorosa de cuello; a lo largo de columna vertebral.

Violentos dolores lumbares.

Dolores articulares, tan fuertes que no puede soportar el peso de la ropa.

PESADEZ Y ENTUMECIMIENTO DE MIEMBROS.

AGITACIÓN de extremidades; está obligado a mover las manos constantemente, se rasca sin cesar los dedos;

AGITACIÓN CONSTANTE DE MIEMBROS INFERIORES CON DESEO CONSTANTE DE LLORAR (ars).

alb., agaric., etc.); mueve constantemente las piernas; está obligado a caminar de arriba a abajo a la noche como ars. alb., o va de una silla a otra.

Piel

COMEZÓN, HORMIGUEO Y PINCHAZOS en todo el cuerpo pero más marcado en extremidades.

Prurito y pinchazos como de picadura de pulgas, sobre todo de noche.

Comezón y ardor.

La picadura de tarántula puede dar lugar a forúnculos, flemones, erisipelas; manchas rojas y amarillentas en diferentes partes del cuerpo.

Relaciones

Antídotos

Lachesis.

TEREBENTHINA

O terebenthinæ oleum, o aceite de trementina, jugo resinoso volátil, corre naturalmente o por incisiones de la corteza de ciertos árboles de la familia de las Coníferas.

Para uso homeopático se usa esencia de trementina, es decir, aceite volátil rectificado por destilación y desembarazado así de su parte resinosa.

Las diversas dinamizaciones se obtienen por diluciones sucesivas partiendodirectamente de la substancia.

Acción general del medicamento

Ejerce su acción más enérgica e importante sobre RIÑONES, en los que provoca IRRITACIÓN, CONGESTIÓN E INFLAMACIÓN con HEMATURIA y ALBUMINURIA : VERDADEROS DOLORES DE RIÑONES, SENSACIÓN DE PESADEZ, DOLORIMIENTO; ORINA ESCASA, HEMORRÁGICA y con OLOR A VIOLETA.

Afecta hasta cierto punto todas las MUCOSAS, en las que provoca TENDENCIA A CONGESTIÓN E INFLAMACIÓN CATARRAL; pero más particularmente las de vejiga y uretra, porque sus síntomas renales van acompañados de ESTRANGURIA, que puede, como la inflamación vesico-uretral, existir independientemente de toda afección renal.

Hay más estranguria que con berb. vulg. y más sangre en orina; por el ardor y escozor al paso de la orina, se parece a canthar. o cann. sat., más bien que a berb. vulg.

Los cuatro tienen empleo en la primera etapa de la albuminuria, tereb. a lacabeza, y merc. sol. generalmente algo después.

Es ANTIHEMORRAGICO : en hematuria, hemoptisis, sobre todo hemorragia intestinal, de fiebre tifoidea, y hasta púrpura hemorrágica, da resultados espléndidos : sus características son : LENGUA ROJA, LISA, BARNIZADA (crotal., pyrog.), y TIMPANISMO ABDOMINAL MARCADO.

Según Hughes, ha sido apenas objeto de experimentaciones regulares; pero las observaciones de efectos de dosis demasiado fuertes son tan numerosas, así como las de efectos producidos en dosis mínimas, en sujetos sensibles, que se ha podido constituir una patogenesia interesante aunque incompleta.

Aparato digestivo

BOCA :

Lengua roja, lisa, barnizada, como desprovista de papilas.

LENGUA CARGADA EN PLACAS SEPARADAS POR ESPACIOS ROJO-LISOS : LENGUA CARGADA QUE NO SE LIMPIA PROGRESIVAMENTE, SINO EN PLACAS : Hay un estado particular, frecuente y a veces muy peligroso, en fiebre tifoidea, en que lo he empleado con éxito : cuando la lengua, en lugar de limpiarse gradualmente empezando por bordes y punta, se libera de su capa sucia bruscamente y en grandes placas primero desde el medio o parte posterior de su superficie, donde la mucosa está unida brillante como si no tuviera papilas.

Si después de esto la lengua permanece húmeda, se puede esperar con confianza la evolución de la convalecencia.

Pero si de nuevo se pone seca, se verá aumentar el timpanismo abdominal y los otros síntomas, o en todo caso no disminuirán : esto depende de nueva actividad inflamatoria de placas intestinales y tereb., casi infaliblemente, lo remediará rápidamente (Dr. Vood).

ABDOMEN Y DEPOSICIONES :

Abdomen extremadamente sensible al tacto; extrema flatulencia; TIMPANISMO EXCESIVAMENTE

MARCADO; METEORISMO (colch.).

Ascitis; ANASARCA.

Ardor y comezón de ano con sensación de presencia de ascárides o segmentos de tenia listos para salir.

Helminthiasis con aliento fétido, y sensación de sofocación (cina, spig.); tos seca, sacudida (Allen).

Congestión inflamatoria de intestinos.

Hemorragias intestinales con ulceraciones de mucosa; hemorragias pasivas, desangre oscura.

Diarrea acuosa, mucosa, verdosa, deposiciones frecuentes, profusas, fétidas, sanguinolentas, con sensación de ardor de ano y recto, agotadoras (ars. alb.) (Allen); la postración que la acompaña es síntoma dominante.

Catarro intestinal y diarrea en nefritis.

Aparato urinario

SENSACIÓN DE PESADEZ Y PRESIÓN en región renal, DOLORS ARDIENTES, VIOLENTOS, QUE CORROEN, en región renal.

ESTRANGURIA muy dolorosa; ORINA ESCASA Y SANGUINOLENTA; micciones frecuentes de noche con ARDOR INTENSO : LA ORINA TIENE OLOR A VIOLETAS; puede ser CLARA Y ABUNDANTE.

(La secreción urinaria aumentada por pequeñas dosis del remedio, es disminuida y hasta suprimida por dosis tóxicas) o TURBIA, OSCURA, contiene SEDIMENTO COMO BORRA DE CAFÉ, células epiteliales, sedimentos sanguinolentos de tubos renales, ALBÚMINA.

VIOLENTO ARDOR Y DOLORS CON TIRONES DE RIÑONES, VEJIGA Y URETRA (berb., canth., cannab.). Violento ardor y puntadas en vejiga; tenesmo; sensibilidad hipo gástrica; CISTITIS y retención por atonía de cuello de vejiga.

ALBUMINURIA AGUDA, en las primeras fases, cuando sangre y albúmina abundan más que cilindros y restos epiteliales (Allen) en escarlatina, difteria, fiebre tifoidea.

Piel

Púrpura hemorrágico con equimosis que aparece en gran número gradualmente día a día (sulph. ac.).

Relaciones

Antídotos

Phosph.; ononis spinosa.

THUYA OCCIDENTALIS

O thuya de Occidente o de Canadá, árbol resinoso de la familia de las Coníferas, originario de Virginia y Canadá, fué importado a Francia en el siglo XV.

Desde entonces se cultiva en jardines; se parece mucho al ciprés.

La tintura madre se prepara con hojas tiernas recogidas a principios del verano, maceradas en alcohol.

Acción general del medicamento

Hahnemann pretendía que existen tres clases de "miasmas", como los llamaba, que venían generalmente a complicar marcha y tratamiento de muchas enfermedades : psora, sífilis, sicosis.

Sulph. era su "remedio maestro" antipsórico; merc. su "remedio maestro" antisifilítico; thuya su "remedio maestro" antisicótico.

Dígame lo que se diga de esta teoría, es cierto que los 3 corrigen indudablemente ciertas diátesis que parecen oponerse a la acción terapéutica de medicamentos indicados : thuya cura o cambia las condiciones existentes del organismo permitiendo que otros medicamentos curen enseguida, cosa que no hubiera pasado si thuya no hubiera sido dada.

Su poder terapéutico no se limita a la sicosis y puede, como los otros remedios, curar cuando los síntomas lo indiquen a pesar de que no haya sicosis.

Sin embargo, su supremo poder se manifiesta sobre todo en casos en que el "poder sicótico" está indiscutiblemente presente y asombra constatar cuántas formas diversas de enfermedades son modificadas por él, lo bastante para necesitar tratamiento antisicótico.

Grauvogl dice que la toxina gonocócica produce en el organismo humano estragos especiales particularmente profundos en ciertas constituciones a las que ha clasificado como HIDROGENOIDES, es decir que retienen mucha agua en sus tejidos.

Si alguien tiene esta constitución, ofrece tenesmo maravillosamente preparado para la infección gonocócica y una vez contraída, este enfermo es más apto que otro para desarrollar diatesis sicótica.

En tales sujetos hidrogenoides no solamente la sicosis actuará de manera particularmente nefasta: para ellos la vacunación antivariólica es muy peligrosa y puede dejar rastros profundos contra los cuales thuya se coloca al lado de silic. y kali mur.

Cuando se encuentra un individuo que sufre consecuencias lejanas de vacunación antivariólica, vacuna libre de otra causa de infección, se puede estar seguro de que tiene constitución hidrogenoidea.

Tenemos dos antídotos para tales casos : silic. que responde a casi todos los síntomas, hasta las convulsiones y thuya especialmente cuando hay diarrea y las pústulas de la vacuna son muy grandes.

Por este último síntoma Boeninghausen, recomendaba thuya en viruela y la daba en cuanto las vesículas se hacían pustulosas y decía que llegaba a impedir las cicatrices.

Kent escribe : "thuya es extremadamente enérgico para combatir consecuencias molestas de vacunación, de viruela boba o cualquier intoxicación de origen animal como mordedura de serpiente.

Su rol antisicótico así definido, parece que la droga actúa de manera especial sobre SISTEMA NERVIOSO : además de los síntomas mentales particulares, determina cefalea especial, al mismo tiempo que dolores erráticos, agudos, lancinantes, a lo largo de trayectos nerviosos, con contracciones fibrilares reflejas".

Actúa sobre GLÁNDULAS, en las que provoca dolores punzantes, desgarrantes, sensación de que las glándulas son desgarradas en trozos.

Esto se ve en cualquier glándula, pero sobre todo en OVARIOS que son más afectados que cualquier otro y especialmente el izquierdo.

LAS MUCOSAS no escapan a su influencia: reacción inflamatoria sobre todo marcada en órganos génito-urinarios, luego mucosas nasales, bucales, etc.

Sensación de ardor en varios puntos del aparato mucoso (Hughes).

Provoca en PIEL excrecencias verrugosas muy características.

Esta acción sobre la piel es primordial y nos dará sus más grandes características.

Características

CONSTITUCIÓN Y TIPO : Thuya tiende a alterar la constitución sicótica, a cambiar el terreno sobre el cual la enfermedad se desarrolla.

Hay dos factores necesarios para que una enfermedad evolucione : los elementos exteriores, microbios u otros, que determinan la enfermedad propiamente dicha y el terreno, es decir, la constitución a la que esos elementos exteriores atacan y desarrollan a sus expensas estado mórbido y sus síntomas, es decir, la enfermedad propiamente dicha.

La constitución sicótica modifica toda enfermedad subsiguiente; y haya o no habido antes secreción uretral.

Luego, thuya ES UN REMEDIO MAESTRO PARA TRANSFORMAR ESTA DIATESIS NOCIVA.

El tipo de thuya está representado, dice Nebel, por sujeto fuerte, ENTRADO EN CARNES, corpulento, aunque puede convenir a ciertos individuos flacos y también a ciertos casos de adelgazamiento extremo, PECHO ESTRECHO, PELVIS ANCHA Y VOLUMINOSA Y PIERNAS DELGADAS.

CABELLO NEGRO Y TEZ MORENA.

LA FACIES SOBRE TODO es característica, a veces, para determinar por sí sola la elección.

PIEL DE CARA GRASOSA Y BRILLANTE como si hubiera sido untada de vaselina; CUBIERTA DE ACNÉ Y BARROS, sobre todo en SURCO NASOLABIAL y MENTÓN en que es lustrosa y roja y hay granos y barros abundantes.

EN LA FRENTE, RAÍZ DE NARIZ Y HASTA EL MEDIO DE LA FRENTE, ARRIBA, HASTA LAS CEJAS DE CADA LADO, enrojecimiento eczematoso de piel y más que el resto grasosa, lustrosa y cubierta de acné o bien de manera acusada, seca y escamosa con caspa; puede haber verrugas.

La parte carnosa de la mejillas es otro sitio de elección de estos mismos desórdenes cutáneos, está más roja que en los pómulos; con arrugas muy marcadas y a menudo, entre LAS CEJAS CUYAS COLAS ESTÁN COMIDAS, INEXISTENTES y forman una especie de triángulo.

LABIOS ESTIRADOS, CON PLIEGUES VERTICALES, DE UN BLANCO AZULADO; DAN LA IMPRESIÓN DE ESTAR CUBIERTOS POR AFEITE BLANCO O COMO TEÑIDAS POR DELGADA CAPA DE LECHE QUE ACABARA DE BEBER.

En los párpados, hay a menudo orzuelos y chalazios.

Los oídos se inflaman fácilmente, supuran a menudo, y se ve CASPA EN CUERO CABELLUDO y el cabello cae o crece lentamente y la punta se quiebra, o bien se pone seco, se parte en la extremidad y el cuero cabelludo se cubre de costras secas, se hace escamoso.

En todo el cuerpo, la cara, LA PIEL ES GRASOSA, MALSANA, presentan numerosos síntomas importantes; en todo el cuerpo, están diseminados NEVIS Y PEQUEÑAS EXCRECENCIAS SICOTICAS en forma de coliflor.

En BRAZOS Y MANOS, LAS VENAS, MUY MARCADAS, forman relieve a veces muy visible LAS UÑAS DELGADAS, ACANALADAS, SE ROMPEN FÁCILMENTE.

MORALMENTE, presenta GRAN EMOTIVIDAD SOBRE TODO POR LA MÚSICA que causa a veces llanto y temblores y gran TENDENCIA A IDEAS FIJAS : una persona extraña está sin cesar a su lado, o bien en él alma y cuerpo están separados, o tiene algo vivo en el abdomen.

Modalidades

Agravación

a) POR HUMEDAD; es el tipo de medicamentos hidrogenoides; o más bien que se dirigen particularmente a constituciones hidrogenoides, es decir que retienen mucha agua en sus tejidos, tienen agravación marcada por humedad, de manera general (igualmente su localización en aparato génito-urinario que rige las secreciones acuosas del organismo).

b) DE NOCHE; POR EL CALOR DEL LECHO.

c) De 3 a 15 hs.

d) POR FRÍO, POR AIRE LIBRE.

e) Por café, narcóticos, POR TE Y CEBOLLA.

f) DESPUÉS DE VACUNA; la vacunación determina síntomas molestos (meland., silic., y ant. tart.).

g) GONORREA MAL TRATADA O SUPRIMIDA DE MANERA INTIMPESTIVA PUEDE PROVOCAR COMPLICACIONES (medorr.).

Mejoría

Por frotamiento y presión.

Lateridad

Izquierda.

Síntomas mentales

Depresión mental.

La depresión mental domina, aunque síntomas de excitación, alegría expansiva, han sido observados al cabo de pocas horas.

INQUIETUD CONSTANTE A PROPÓSITO DE TODO, AGITACIÓN.

Abatimiento profundo, preocupación exagerada por el porvenir y asco por la vida.

DEBILITAMIENTO INTELECTUAL; lentitud de palabra y reflexión, busca las palabras al hablar, se pone preocupado, pensativo por la menor bagatela.

SENSIBLE E IMPRESIONABLE.

La música lo hace llorar (acon., ambra, graph., sabina, phosph., se agrava por la música).

IDEAS FIJAS, cree que tiene algo vivo en el abdomen, (crocus, sulph.).

Cree que tiene un animal vivo el vientre; cree estar bajo la influencia de una potencia superior (anacard., lach., opium, platina).

Cree QUE UNA PERSONA EXTRAÑA ESTA A SU LADO; que su alma y su cuerpo están separados.

(No hay que confundir con la sensación de ser doble de anacard., bapt., can. ind., stram.), que su cuerpo es de vidrio, muy frágil y que el menor choque lo quiebra.

Sueño

GRANDES DESEOS DE DORMIR AL ATARDECER; pero A VECES EL SUEÑO ES TARDÍO PORQUE ESTA AGITADO Y TIENE SENSACIÓN DESAGRADABLE DE CALOR SECO.

Sueño corto, agitado, con SUEÑOS PENOSOS, ANGUSTIOSOS, de muerte o caída de un sitio elevado; o sueño con gritos y sobresaltos, SOBRE TODO SI ESTA ACOSTADO DEL LADO IZQUIERDO.

SUEÑO NO REPARADOR; a la mañana, despierta roto y le cuesta mucho levantarse; fatiga extrema a la mañana, al despertar.

Sensibilidad

Hiperestesia general de piel.

Dolores muy agudos, siguen principalmente el trayecto de los nervios, y van acompañados de contracciones fibrilares reflejas.

Son en general más fuertes después de las 3 y 15 hs.; el calor las alivia.

Cabeza

Cuero cabelludo de caspa blanca, con escamas, crece lentamente y se quiebra.

Cefalea de origen sicótico con síntomas variados.

Cefalea principalmente izquierda como si un clavo estuviera clavado en hueso parietal, vértex o eminencias frontales, (coffea, ignat.) o como si un botón convexo estuviera fuertemente apoyado sobre la región dolorosa; agravación por CALOR, EXCESOS SEXUALES Y TE.

Selen. : dolor arriba del ojo izquierdo agravado después de tomar té.

Cefalea con sensación de fuerte apretón en la frente.

Intenso dolor penetrante que lleva a la desesperación; mejora acostado.

VÉRTIGO CERRANDO LOS OJOS (lach., therid.).

Cara

CARA DE PIEL ACEITOSA, DE ASPECTO SUCIO, granos en SURCO NASO-LABIAL Y MENTÓN, donde la piel es particularmente roja y brillante, en RAÍZ DE NARIZ Y ENTRE CEJAS, donde hay un triángulo limitado por dos surcos profundos y donde los desórdenes cutáneos se muestran de manera característica y privilegiada; LA PARTE MAS CARNOSA DE LAS MEJILLAS presenta las mismas características y es más roja que los pómulos. CEJAS MUY ABUNDANTES HACIA RAÍZ DE NARIZ CON COLA POCO ABUNDANTE COMO "COMIDA".

LABIOS BLANCUZCOS COMO SI HUBIERA BEBIDO LECHE.

En general piel de cara GRASOSA Y LUSTROSA, cubierta de acné, barritos, oSECA, ESCAMOSA, con descamación escamosa; poros marcados de puntos negros que los hacen visibles y dan ASPECTO DE "CASCARA DE NARANJA".

DOLORES CALAMBROIDES, LANCINANTES, DE PÓMULOS, MAXILAR SUPERIOR Y DIENTES; la cara se pone roja a cada exacerbación del dolor; sensación de frío interior; movimientos convulsivos de labio superior (tic doloroso); puntadas dolorosas a lo largo de ramales supraorbitarios de trigémino, con extensión hacia oído; los sufrimientos disminuyen al aire libre y por movimiento y más raramente por tacto.

El Dr. Escalier ha citado, en el "Art médical", NEURALGIAS FACIALES que habían resistido a la neurotomía y cedieron a thuya.

Es excelente remedio DEL TIC DOLOROSO; se debe al Dr. Gallavardin padre, una observación de cura DE NEURALGIA CERVICO BRAQUEAL cuyos síntomas encontraron su simillimum en thuya.

Oídos

Inflamados y supuran.

Otitis crónica con secreción purulenta.

Otalgia con dolor de martilleo.

Ruidos en los oídos como de agua en ebullición.

Ojos

PÁRPADOS AGLUTINADOS DE NOCHE, SECOS, COSTROSOS EN LOS BORDES; ORZUELOS, CHALAZION GRUESO E INDURADO; thuya viene después de staph, cuando ésta ha mejorado pero no ha curado.

Inflamación de córnea; conjuntivitis flictenular; escleritis y epiescleritis.

Iritis y neuralgia ciliar.

Lagrimo sobre todo al aire libre.

Sensación como si una corriente de aire frío saliese de la cabeza a través de los ojos.

Sensación como si los ojos fueran apretados de adentro a afuera.

En la oscuridad, chispazos delante de los ojos; durante el día, o a la luz, manchas marrones delante de los ojos.

Sensación como de velo, niebla delante de los ojos cuando lee; las letras parecen turbias, como cuando uno lee, al despertar después de una noche muy corta, o que no ha dormido suficiente.

Aparato digestivo

BOCA :

En su interior puede localizarse viva irritación : aftas en lengua o interior de boca.

Síntomas interesantes de dientes : COMIENZAN A ARRUINARSE EN LA BOCA EN CUANTO CRECEN. SE DESCARNAN Y ESTÁN MUY SENSIBLES.

Raíz de dientes cariada, corona sana (mez.).

Caries solamente en borde cortante (staph.).

Los dientes se ponen amarillos.

Odontalgia peor al beber té, o en bebedores de té.

Lengua saburral, MUY SENSIBLE EN LA PUNTA : cist. can. : lengua muy sensible con sensación como si estuviera en carne viva; lengua y paladar secos.

Nitri. ac. : lengua muy sensible; la menor partícula de alimento provoca sensación de escozor.

Sabad. : lengua sensible con dolor picante en la punta.

Sepia : sensibilidad de lengua con sensación como si su punta hubiera sido escaldada.

Ampollas blancas en bordes y raíz de lengua.

Varicosidades en la boca, sobre todo cara inferior de lengua y garganta.

Ránula (ambra).

Hinchazón de glándulas salivares y salivación abundante.

FARINGE :

Sequedad de faringe que parece excojiada; necesidad incesante de tragar.

Deglución difícil y dolorosa, principalmente en vacío o al tragar saliva.

ESTOMAGO Y ABDOMEN :

SED VIVA o solamente SED DE NOCHE Y A LA MAÑANA.

AUSENCIA DE APETITO O SACIEDAD PRONTO AL COMER (lycop.).

DESEO DE SAL; los alimentos no parecen jamás bastante salados (phosph., caust.).

Real asco POR CARNE FRESCA (alumina, arnica, calc. carb., carb. veg., puls., sepia).

No puede comer PAPAS, por las que tiene mucha aversión. (alumina, sepia).

EL PAN TIENE GUSTO AMARGO Y LA CEBOLLA lo fatiga, dificultad para digerirla.

Algunos trastornos dispépticos sin gran dolor característico.

Hinchado y abatido después de comer.

En el abdomen, distensión, hinchazón, flatulencia.

Ruido de gorgoteo; abdomen grande, hinchado, con protuberancias parecidas a las producidas por los miembros de un feto o algo parecido.

Sensación como si el abdomen estuviera apretado por una cuerda.

Retortijones alrededor del ombligo.

Grandes manchas marrones en abdomen, como en enfermedades de hígado.

ANO Y DEPOSICIONES :

ANO FISURADO Y RODEADO DE CONDILOMAS (ant. crud., graph., silic.), deformado o flácido, doloroso al tacto.

Constricción, comezón y ardor de ano.

Pólipos en recto.

HINCHAZÓN DE VENAS HEMORROIDARIAS, con dolores presivos y ardientes.

HEMORROIDES hinchadas llenas de sangre con dolor agravado al sentarse.

CONSTIPACIÓN CRÓNICA CON ESCIBALOS NEGROS Y DUROS.

Constipación obstinada con necesidad frecuente e inútil.

Dolores violentos de recto que impiden hacer esfuerzos suficientes : DESPUÉS DE HABER SIDO PARCIALMENTE EXPULSADA LA DEPOSICIÓN SUBE POR EL RECTO (silic., sanic.).

Esto se ve también en constipación con deposiciones abundantes.

DEPOSICIONES DIARREICAS, acuosas, amarillentas, violentamente expulsadas, (con gases abundantes a la mañana, después del desayuno).

Diarrea crónica cuyas deposiciones líquidas son expulsadas con fuerza, como agua por el agujero de un tonel y CUYO ORIGEN ES UNA VACUNACIÓN.

Aparato urinario

CONGESTIÓN E INFLAMACIÓN DE RIÑONES con dolores vivos en región renal.

INFLAMACIÓN DE URETRA Y VEJIGA no siempre proveniente de gonorrea.

Pus en vejiga.

Parálisis de vejiga : DEBE ESPERAR LARGO TIEMPO ANTES DE ORINAR: micciones muy frecuentes, penosas, difíciles, con sensación de ardor de uretra.

CHORRO INTERRUMPIDO CINCO A SEIS VECES DURANTE DE LA MICCIÓN Y EMISIÓN DE ÚLTIMAS GOTAS PARTICULARMENTE DIFÍCIL; O CHORRO BÍFIDO Y DELGADO.

Después de la micción, violento dolor cortante de uretra (sarsap.); escalofríos después de la micción, SENSACIÓN COMO SI UNA GOTA DE ORINA CORRIERA EN EL INTERIOR DE LA URETRA DESPUÉS DE LA MICCIÓN, O EN OTRO MOMENTO.

Órganos genitales

MASCULINOS :

Inflamación de prepucio y glande, con dolor de pene; prepucio hinchado con ulceraciones en surco balano prepucial.

Vegetaciones lisas detrás del glande, en parte interna de prepucio.

Condilomas vegetantes que sangran fácilmente.

GONORREA con secreción poco abundante, amarillo verdoso y micciones ardientes.

GONORREA SUPRIMIDA intempestivamente por inyecciones y complicada con REUMATISMO U ORQUITIS sobre todo izquierda; habrá que pensar en puls. en orquitis por supresión mal hecha de secreción.

HIPERTROFIA DE PRÓSTATA; próstata inflamada e hipertrofia (iod, ferr. pic., sabal., thysin.).

TRANSPIRACIÓN ABUNDANTE Y FÉTIDA DE ESCROTO Y PERINE.

FEMENINOS :

EXCRECENCIAS VERRUGOSAS en vagina y periné; CONDILOMA; PÓLIPOS.

Inflamación de grandes labios.

PRURITO VULVAR.

Escozor de vagina.

EXTREMA SENSIBILIDAD DE VAGINA QUE IMPIDE EL COITO. (bell., berb., cact., caulph., cimic., coffea, kali bichr., kreos., lysin., gels., ignat., mag. phos., nit. ac., platina, plumb., staph.).

Reglas adelantadas, abundantes, muy prolongadas, de sangre espesa, negruzca, mezclada con coágulos negros con dolores de abdomen, principalmente región del ovario izquierdo.

Pero, Clarke escribe : reglas muy precoces, pero poco abundantes.

Boericke : reglas poco abundantes y atrasadas.

Jahr : menstruación poco abundante; convendría considerar, en general, las reglas de thuya como poco abundantes e irregulares.

LEUCORREA profusa, espesa, verdosa, fétida y corrosiva.

Vagina muy dolorosa (berberis, kreos., lysin.).

Fibromas.

Pólipos de útero.

OVARITIS PRINCIPALMENTE IZQUIERDA; dolores muy violentos, tironeantes, desgarrantes, de ovarios, sobre todo, izquierdo y en región inguinal izquierda; PEOR EN EL MOMENTO DE LAS REGLAS Y AUMENTAN A MEDIDA QUE LA SANGRE APARECE (lach. y zincum tienen lo contrario) pinchan, desgarran, arden como si arrancasen el ovario; grita, tiene un verdadero ataque.

Tendencia al aborto al tercer mes.

Aparato respiratorio

NARIZ :

Catarro de mucosa nasal; sensación de mucus espeso y verde, como puls., o costras en interior de nariz.

Verrugas en la nariz; erupciones en alas de nariz; pólipos.

CORIZA SECO EN LA CASA Y FLUENTE AL AIRE LIBRE.

LARINGE :

Pólipos de cuerdas vocales.

Ronquera con sensación de contracción de laringe.

BRONQUIOS Y PULMONES :

Tos a la mañana, por irritación de tráquea, seguida de expectoración poco abundante, esputos amarillo verdosos.

Tos seca, sacudida a la tarde, con dolor en boca de estómago.

Dolores lancinantes en el pecho.

Puntadas en el pecho, después de beber líquidos fríos.

Disnea, necesidad frecuente de hacer grandes inspiraciones.

Asma en niños. (nat. sulph.).

Espalda y extremidades

Dolores como de fractura y rigidez de nuca, espalda y sacro, principalmente a la mañana después de levantarse.

Calor ardiente en región lumbar con dolores tironeantes.

CRUJIDOS EN ARTICULACIONES QUE PARECEN SECAS.

DOLORES REUMÁTICOS O NEURALGIAS POR GONORREA SUPRIMIDA; dolores en planta de pies, rodillas, a lo largo de ciático, región lumbodorsal, tobillos; extremidades superiores afectadas menos a menudo que las inferiores; AGRAVACIÓN MARCADA CUANDO PERMANECE INMÓVIL, como rhus tox., y si guarda cama, se mueve constantemente; si el caso no fuera "siccótico" rhus tox. lo curaría pero cuando la siccosis lo complica, se necesitará thuya o medorr. sobre todo si los síntomas aparecen por supresión mal hecha de gonorrea, para llegar a curación (Kent).

Entumecimientos y puntadas con dificultad para mover los brazos.

EXTREMOS DE DEDOS HINCHADOS Y ROJOS :Charge dice : "thuya produce deformación de pulpa de dedos que tiene analogía con los DEDOS HIPOCRÁTICOS y por ese solo hecho debe ser tomado en consideración para tísicos con este importante signo diagnóstico.

UÑAS DEFORMADAS, FRÁGILES; en caust. es dura como asta; en thuyafisurada, quebradiza hacia arriba con apariencia de coliflor (Dewey).

Sacudidas musculares, temblor, debilidad muscular.

Estremecimiento convulsivo de un brazo.

Temblor de manos, al escribir, las piernas parecen de madera.

Sensación como si las piernas fueran de vidrio y se fueran a romper.

Debe probarse en ciática cuyos movimientos convulsivos reflejos musculares parecen a los de neuralgia epileptiforme de cara.

Piel

Tiene gran número de síntomas importantes.

Primero TRANSPIRACIÓN particular : de olor dulzón, parecido a miel, pero aveces FUERTE Y PENETRANTE como ajo; olor penetrante emana DE ÓRGANOS GENITALES, donde hay a menudo sudor con olor dulzón, como miel, puede tener OLOR A "CUERO QUEMADO"; sobre todo cuando hay verrugas en forma de higos en órganos genitales, como las que cura thuya.

Puede haber SUDOR ABUNDANTE EN TODO EL CUERPO CUANDO ESTA A PUNTO DE DORMIRSE, como ars.

Si se tiene solamente como guía esta transpiración y el aspecto ceroso de la piel, como producen ars. y thuya, ars., aunque habitualmente es un crónico, será útil en casos agudos y thuya en crónicos (Kent).

SUDOR SOLAMENTE EN PARTES DESCUBIERTAS O EN TODO EL CUERPO, SALVO LA CABEZA, DURANTE EL SUEÑO.

Piel de aspecto SUCIO, MALSANO, en todo el cuerpo, puede haber grandes manchas marrones diseminadas como en enfermedades de hígado.

Gran hiperestesia de piel.

Gran tendencia a cubrirse de excrecencias verrugosas suaves al tacto, pulposas, muy sensibles, arden, dan puntadas y sangran fácilmente, al simple roce de la ropa.

Excrecencias como asta en la manos y se abren como coliflor, sobre base que se resquebraja alrededor.

Excrecencias parecidas a coliflor en vagina, cuello, grandes labios alrededor del ano.

(Nitr. ac.) y en todas las mucosas en general.

Excrecencias como asta en la piel, verrugas color marrón, sobre todo en abdomen.

NEVIS.

Excrecencias siccóticas.

Verrugas intempestivamente suprimidas y síntomas que son la consecuencia.

ERUPCIONES SOLO EN PARTES CUBIERTAS POR LA ROPA, ardientes después del rascado.

ZONA; ERUPCIONES HERPÉTICAS como sepia; herpes labial y prepucial.

Comparar con rhus tox., graph., kali hydro., merc., pueden ir acompañadas de muchos dolores.

Sabañones.

Relaciones

Antídotos

Camph., colch., merc., puls., sulph., sabina.

(Verrugas).

Complementarios

Medorr., nat. sulph., sabina, silic., ars. alb.

VERATRUM ALBUM

O heléboro blanco, planta de la familia de las liliáceas, crece entre pastos en altas cimas de Alpes, Pirineos, Jura. Su raíz, rizoma vivaz, carnoso, grueso, negruzco por fuera, blancuzco en el interior y munida de pequeñas raíces secundarias amarillentas en la única parte empleada.

Se recoge antes de la floración y se prepara con ella la tintura madre con la que se obtienen las diferentes dinamizaciones por diluciones sucesivas.

Acción general del medicamento

Actúa profundamente sobre el organismo, "produciendo perfecta imagen DE POSTRACIÓN CON ENFRIAMIENTO, CIANOSIS y COLAPSO" (Dewey).

Actúa de manera preeminente sobre SIMPÁTICO, cuya irritación, bajo su influencia, produce ESPASMOS VISCERALES que traen desórdenes funcionales graves (vómitos y diarrea sobre todo) y terminan muy rápidamente en aniquilamiento de la vida orgánica.

Tal es su poder en estados mórbidos caracterizados por POSTRACIÓN Y ALGIDEZ, cuando aparecen como consecuencia de abundancia y frecuencia de evacuaciones por arriba y abajo que se considera no solamente como remedio específico del cólera, sino también como preventivo.

Su acción tiene tantas analogías con ars. que Pfaff lo llama "Arsénico Vegetal", pero difiere en que como no tiene la misma cronicidad es menos durable y menos profunda.

Actúa con igual poder sobre MÚSCULOS ESTRIADOS, perturbando directamente funciones de relación y consecutivamente respiración y circulación, pues EL MIOCARDIO también es tocado por el veneno.

Esta acción muscular es muy remarcable y comprende :a) Efecto primitivo constante y consistente en alargamiento considerable de la curva de contracción del músculo, lo que da a los movimientos del cuerpo más energía, pero también más lentitud y ocasiona RIGIDEZ MUSCULAR APARENTE que se debe a que un grupo muscular todavía no ha vuelto al reposo cuando el grupo antagónico comienza a entrar en acción.

b) Efecto alternante que consiste en fenómenos paralíticos que no hacen más que acentuar trastornos cardíacos y pulmonares.

Actúa sobre CENTROS PSÍQUICOS a cuyo funcionamiento lleva perturbaciones profundas que desatan estado de delirio vesánico o demencia melancólica que se produce aislada o alternativamente (Espanet).

Características

1) CONSTITUCIÓN Y TIPO : No tiene constitución neta, pero parece desarrollar mejor sus síntomas en sujetos rubios, de carnes blancas, cara pálida, fría, labios secos, agrietados, con pérdida de calor vital.

2) FRÍO GENERAL DE TODA LA SUPERFICIE DEL CUERPO :FRÍO extraordinario : NO HAY GRUPO DE SÍNTOMAS, QUE NO VAYA ACOMPAÑADO POR ESTE FRÍO (Kent).

TODO EL CUERPO ESTA FRÍO COMO HIELO.

Pero la característica es : SUDOR FRÍO EN LA FRENTE; es el único que lo tiene de manera tan neta; ya sea en, cólera, neumonía, asma, fiebre tifoidea, constipación, etc.

Si este síntoma es predominante y al mismo tiempo hay DEBILIDAD, COLAPSO, GRAN POSTRACIÓN, ver. alb., es el primer medicamento en el que habrá que pensar (Nash).

GRAN SENSACIÓN DE FRÍO, como si la sangre fuera agua helada, FRÍO POR PARTES, en el cuerpo;

EXTREMIDADES FRÍAS, como de cadáver; PIEL DEL CRÁNEO FRÍA (Kent).

3) DEBILIDAD GENERAL, COLAPSO, AGOTAMIENTO :POSTRACIÓN NOTABLE, ABATIMIENTO Y AGOTAMIENTO COMPLETO, acompaña sus diferentes grupos de síntomas (Kent).

Pérdida RÁPIDA DE FUERZAS, COMPLETA POSTRACIÓN CON SUDOR Y RESPIRACIÓN FRÍAS.

Cualquiera sea el nombre de la enfermedad, si este ESTADO GENERAL DE COLAPSO VAN ACOMPAÑADO DE FRÍO, CIANOSIS, SOBRE TODO EN LA FRENTE característicos, ver. alb. es de primera utilidad.

4) TODAS LAS ELIMINACIONES EXTREMADAMENTE ABUNDANTES :Transpiración, vómitos, diarrea, etc.; abundantes secreciones acuosas que parecen abandonar el cuerpo sin causas aparentes.

Esto permite distinguirlo de camph., en tratamiento de cólera : ambos tienen el mismo colapso con enfriamiento, cianosis, pero en camph., transpiración, vómitos, diarrea, son muy poco abundantes; es lo que se ha llamado "cólera seco", en ver. alb. las emisiones son extremadamente abundantes (Kent).

5) SENSACIÓN DE ARDOR INTERIOR :Este síntoma es paradójico; pero es muy frecuente; en ciertos casos arde, TIENE GRAN SENSACIÓN DE ARDOR INTERIOR Y PIEL Y SUDOR FRÍO (Kent).

Modalidades

Agravación

a) DE NOCHE.

b) POR TIEMPO FRÍO Y HÚMEDO.

c) POR EL MENOR MOVIMIENTO.

d) BEBIENDO :Muchos síntomas de ver. alb., se agravan bebiendo; sensación interior de frío que corre de la cabeza a los pies (Kent).

Mejoría

- a) POR REPOSO.
- b) EN POSICIÓN HORIZONTAL.
- c) POR CALOR.

Síntomas mentales

CARÁCTER MIEDOSO, TEMEROSO, MUY PROPENSO A ASUSTARSE.

AGITACIÓN ANSIOSA, INQUIETA, MEZCLADA DE GEMIDOS Y LLANTOS.

MELANCOLÍA CON ESTUPOR Y MANÍA; se queda sentado, estúpido, indiferente, tosco, no presta atención a lo que pasa a su alrededor.

LLENO DE DESESPERACIÓN Y ABATIMIENTO A MEDIDA QUE LA LOCURA SE ACERCA.

DESESPERA DE CURAR, TRATA DE SUCIDARSE.

Individuos ABATIDOS POR GRAN PENA y que marchan hacia la locura.

Melancolía, cabeza inclinada sobre el pecho, queda sentado, rumiando en silenciosa desesperación.

Los locos no están desesperados, pero sí los que se aproximan a la locura (Kent).

SÍNTOMAS MENTALES marcados por GRAN VIOLENCIA, EXCITACIÓN Y FRENESÍ; emite gritos agudos, blasfema y aúlla toda la noche; anda errante fuera de casa por temor a una desgracia inminente.

LOCURA CON DESEO DE CORTAR, DESGARRAR, ESPECIALMENTE SUS VESTIDOS, CON PALABRAS IMPÚDICAS, LASCIVAS, RELIGIOSAS O AMOROSAS.

No hay que confundirlo con stram. : ambos son muy locuaces y religiosos, muy violentos, pero la cara de stram. está a veces hinchada y muy roja y en ver. alb., pálida, estirada, a veces verdaderamente hipócrita; ver. alb. es mucho más débil que stram. (Nash).

Tiene gusto marcado por la destrucción; quiere romper algo; se arranca la ropa y la desgarrar.

Quiere estar siempre ocupado; continúa sin parar su trabajo cotidiano habitual o una imitación de ese trabajo (Kent).

Estado exaltado DE FRENESÍ RELIGIOSO; imagina ser Cristo resucitado; grita hasta que su cara se pone cianótica; pero su cabeza está fría como hielo.

Extiende los brazos, predice, exhorta a la penitencia; luego canta canciones obscenas, se desnuda.

Tiene miedo a la muerte y a ser condenada (Kent).

ESTADOS ALTERNANTES DE GRITOS Y MELANCOLÍA; de alegría excesiva y depresión melancólica.

La locura furiosa alterna a veces con silencio, postración melancólica, pero si entonces se lo irrita se pone furioso, aúlla e injuria a todo el mundo (Nash).

Estas formas de locura son a menudo CONSECUENCIA DE TRASTORNOS MENSTRUALES O ESTADO PUERPERAL.

Puede ser agudas o hacerse crónicas.

Niñas que tiene desde hace años reglas difíciles; antes de cada menstruación, estado de gran melancolía y aún desesperación; jamás sonríen, todo les parece triste y sombrío, van hacia la locura.

Niñas que sufren de dismenorrea en la pubertad; durante las reglas se ponen frías como muertas, labios cianóticos, así como extremidades que están heladas, presentan síntomas histéricos, tienen la manía de abrazar a todo el mundo; están cubiertas de sudor frío, tienen diarrea y vómitos.

Ver. alb. evitará el manicomio a muchas mujeres, sobre todo las que sufren de afecciones uterinas.

Locura puerperal con convulsiones y tendencia a morder y desgarrar (Kent).

Cabeza

DOLOR DE CABEZA CON NAUSEAS, VÓMITOS, DIARREA, CARA PÁLIDA Y FRÍA.

Dolor de cabeza neurálgico, de gran violencia, con frío característico, gran agotamiento, sudores fríos abundantes y vómitos penosos pues el estómago está vacío.

La sangre sube a la cabeza con violencia; congestión de cabeza con extremidades heladas.

SENSACIÓN COMO SI TUVIERA HIELO EN VÉRTEX U OCCIPUCIO O COMO SI TUVIERA LA CABEZA RODEADA DE HIELO (calc. ost.) (Kent).

Dolores faciales desgarrantes, multilaterales, en mejillas, temporales, ojos.

Aparato digestivo

BOCA :

SECA, FRÍA, con sensación como la que queda después de haber tragado menta.

LENGUA PÁLIDA Y FRÍA O NEGRUZCA, AGRIETADA, PERO SIEMPRE HELADA.

Gran salivación.

Odontalgia; dientes pesados como llenos de plomo.

ESTÓMAGO :

SED VIOLENTA DE AGUA FRÍA Y HIELO; aversión por alimentos calientes.

Deseo de ácidos, cosas jugosas y frías, frutas, pero le causan distensión dolorosa de estómago.

NAUSEAS Y VÓMITOS ABUNDANTES, agravados por el menor movimiento y bebidas; SED ARDIENTE DE AGUA FRÍA QUE VOMITA EN CUANTO TRAGA; hambre que corroea pesar de náuseas y vómitos violentos y continuos Y GRAN AGOTAMIENTO DESPUÉS DEL VÓMITO.

La menor gota de líquido tragado provoca vómitos.

Vómitos de sangre y bilis.

Sensibilidad excesiva de región epigástrica.

ABDOMEN Y DEPOSICIONES :

Gran sensibilidad dolorosa de abdomen al tacto.

Vientre duro e hinchado con CÓLICOS VIOLENTOS, CALAMBRES.

SENSACIÓN DE FRÍO EN EL ABDOMEN.

CONSTIPACIÓN OBSTINADA POR INACTIVIDAD DE RECTO, con deposiciones negras, duras, difíciles de expulsar, con dificultad que puede llegar a desvanecimiento; hace esfuerzos hasta que se cubre de sudor frío, sobre todo en frente; entonces cesa y las heces continúan acumulándose en ampolla rectal.

Pero su gran acción en este nivel, se manifiesta por DIARREA EXTREMADAMENTE ABUNDANTE, DEPOSICIONES ACUOSAS, PRECEDIDAS DE MUCHOS DOLORES, CÓLICOS CORTANTES, CALAMBRES; EVACUADAS CON GRAN DESEO, EXPULSADAS CON FUERZA Y SEGUIDAS DE GRAN POSTRACIÓN.

Gran sensación DE VACÍO, DEBILIDAD EN EL VIENTRE, DESPUÉS DE LA DEPOSICIÓN.

EN CÓLERA Y AFECCIONES COLERIFORMES ver. alb. es muy importante en el cuadro clínico siguiente : vómitos y diarrea al mismo tiempo, con violentos cólicos calambroides y calambres de pantorrillas; este síntoma cólico es importante porque no está indicado dar ver. alb. en cólera y afecciones coleriformes si no hay dolores abdominales.

Deposiciones profusas, oscuras "agua de arroz" como se la llama y hay grandebilidad, casi desfallecimiento a cada esfuerzo por evacuar y evacuación seguida de gran postración : sudor frío, sobre todo en frente, donde es característico; agravación nocturna neta e invasión rápida de síntomas que no tardan en llevar a la muerte.

El primer remedio a comparar aquí con ver. alb. es camph. : ambos tienen enfriamiento, colapso, cianosis, pero camph. tiene evacuaciones poco abundantes : es el remedio del "CÓLERA SECO"; en ver. alb., todas las eliminaciones : diarrea, transpiración, vómitos, son profusos.

Cuprum : otro remedio del cólera, con ver. alb. y camph.; pero en él los calambres dominan la escena y si vómitos y deposiciones son abundantes, lo que lo elimina es que no tiene el sudor frío marcado de ver. alb.

Jatr. curc., produce un cuadro de cólera todavía más exacto que ver. alb., pero tiene vómitos de materia viscosa de aspecto albuminoso que acompaña la diarrea.

Podoph. : se parece a ver. alb., en que presenta un buen cuadro sintomatológico del cólera; especialmente indicado cuando no hay cólicos, lo que lo diferencia de ver. alb.

Iris vers., buen remedio en afecciones coleriformes en niños, en verano; su característica es sensación de herida, desolladura en el ano.

Comparar con crot. tig., elater., gambog., etc.

Órganos genitales

Reglas muy precoces, muy abundantes y debilitantes; durante reglas, dolores de cabeza, SUDORES FRÍOS, síntomas histéricos, MANÍA SEXUAL ANTES DE REGLAS.

DISMENORREA CON FRÍO GENERAL y trastornos mentales.

Amenorrea con trastornos físicos característicos.

Espalda y extremidades

Hay muchos dolores neurálgicos y reumáticos en extremidades; se agravan por calor del lecho y obligan a levantarse de noche y pasearse por el cuarto frío.

Esto sorprende y uno podría creer que el calor debiera aliviar como en los dolores de vientre y otros lugares donde tiene sensación de frío; pero no es así para los dolores reumáticos de miembros a los que agrava, (merc.) (Kent).

Dolorimiento de articulaciones.

Neuralgias ciáticas o branquiales.

CALAMBRES EN DEDOS, pantorrillas, pies.

FRÍO GLACIAL en manos o pies.

Piel

Floja, sin elasticidad, FRÍA, HELADA, SUDOR FRÍO, ABUNDANTE SOBRE TODO EN LA FRENTE.

En afecciones mentales, piel seca, salvo en la frente donde hay sudor frío (Kent).

Erupción miliar con prurito nocturno.

Fiebre

GRAN FRÍO, CON ESCALOFRÍOS Y SED VIOLENTA.

SUDOR FRÍO, viscoso, abundante, sobre todo en la cara, particularmente enfrente.

Relaciones

Antídotos

Aconit., camph., coffea, china.

Complementarios

Actúa bien después de ars. alb., china, cuprum, ipeca. : después de amm. carb., bovista, en dismenorrea con vómitos y diarrea (Allen).

ZINCUM METALLICUM

Metal sólido laminado, dúctil, blanco azulado.

Quebradizo en seco y hacia 200°, por eso sólo se lo puede dejar a temperatura intermedia.

Al aire húmedo se cubre de ligera capa de hidrocarbonato que adhiere fuertemente al metal e impide toda oxidación ulterior.

Calentado al rojo vivo arde al aire con bella llama verde y da óxido de zinc, Zn. O.

Abunda en la naturaleza, pero combinando con azufre o sílice.

Se encuentra en Francia, Inglaterra, India, Australia, etc.

Hasta Hahnemann, caso no fue usado en medicina; cuando mucho, algunos hacían tomar granalla contra la tenia o como medio puramente mecánico para combatir este entozoario.

Y si muchos de sus compuestos figuran en fórmulas actuales, el zinc metálico no ocupa en ellas ningún lugar.

Fue Hahnemann quien le dio su verdadero lugar en la Terapéutica y gracias a sus trabajos los homeópatas deben a este remedio muchos éxitos.

Acción general del medicamento

Actúa sobre el CONJUNTO DE SISTEMAS SIMPÁTICO Y CEREBRO ESPINAL.

Pero su acción recae más particularmente "SOBRE PLEXOS DE PECHO Y BAJO VIENTRE, SOBRE GRANDES TRONCHOS Y RAMALES NERVIOSOS QUE DISTRIBUYEN EN EL APARATO LOCOMOTOR EL MOVIMIENTO Y LA SENSIBILIDAD" (Teste).

La primera fase de su acción consiste en exaltación de sensibilidad y contratilidad; pero los efectos espasmódicos o convulsivos resultantes sólo son pasajeros : pronto ceden el lugar a FENÓMENOS ASTENICOS : DEBILIDAD EXCESIVA, INSENSIBILIDAD GENERAL, que son propios de su genio, que se caracteriza sobre todo por el hecho de que el zinc "PUEDE, EN CIERTOS CASOS, PROVOCAR LOS DOLORES MAS AGUDOS O DETERMINAR LOS TRASTORNOS MAS RAROS EN FENÓMENOS DE INERVACIÓN, SIN QUE LAS OTRAS FUNCIONES ORGÁNICAS SEAN SENSIBLEMENTE ALTERADAS" (Teste).

Pero no se debe ignorar que en la plenitud de su acción es ante todo un VENENODEPRESIVO y trastorna la nutrición al punto de determinar CAQUEXIA y provocar muerte por parálisis de pulmones y corazón (Michaelis).

En especial, ataca, por intermedio del gran simpático, diferentes tejidos del organismo, pero especialmente mucosas y piel.

En MUCOSAS, el zinc corresponde por sus síntomas simplemente tóxicos, aciertas fluxiones activas determinadas por convulsiones, neuralgias o susto y por síntomas hipertóxicos, a flogosis subagudas de conjuntivas, uretra y vagina, "con secreción serosa o muco-purulenta, escozor, prurito, sensación de excoriación y ardor" (Espanet).

EN EL LIMITE DE LAS LINEAS DONDE SE ENCUENTRAN PIEL Y MUCOSAS; labios, partes sexuales, nariz, borde palpebral, provoca grietas.

EN PIEL, hace aparecer EMPEINES SECOS, cubiertos de costras que caen y serenuen muy rápidamente; o úlceras herpéticas cuyos bordes irritados se rodean de numerosos granitos forunculosos.

En general zincum se adapta sobre todo a AFECCIONES CRÓNICAS; es el remedio de las neurosis pero especialmente de corazón y pulmones.

Características

1) CONSTITUCIÓN Y TIPO : Individuos DÉBILES, DE ASPECTO ENFERMIZO, enflaquecidos, tez pálida, terrosa, párpados caídos.

Cuerpo animado por movimientos automáticos de agitación y temblor, sobre todo en miembros inferiores; TIENEN SENSACIÓN CONSTANTE DE INQUIETUD EN LAS PIERNAS, QUE DEBEN MOVER CONSTANTEMENTE.

Nerviosos y EXCESIVAMENTE SENSIBLES, excitables y temblorosos, tienen dolores desgarrantes a lo largo de trayectos nerviosos, se estremecen, se excitan por la menor cosa, pueden sufrir hipersensibilidad en un sitio y anestesia en otro.

La hipersensibilidad es tan marcada y característica como en nux v., con el que no concuerda, los individuos que tienen surmenage por trabajo y excitables, pertenecen a nux v. o a zincum.

En los de zinc. hay debilidad paralítica, postración, enflaquecimiento; están llenos de síntomas cerebrales y medulares.

Los centros tróficos son anemiados por influencia del remedio, de ahí enflaquecimiento de todo el cuerpo, la piel parece marchita; cara pálida y arrugada, enfermiza, malsana.

Muy sensible al menor frío.

Lleno de dolores neurálgicos; dolores desgarrantes en cualquier región del cuerpo cuando ha estado expuesto a corriente de aire.

Sensación de tensión y estiramiento en cualquier región.

Extraña sensación de tironeamiento en los ojos, como si tuviera estrabismo; sensación de tironeamiento en músculos del cuello como si fuera atraído hacia atrás; sensación de tensión y tironeamiento en todas partes.

Cuando está en reposo, necesita estirar los miembros.

El zinc parece actuar primero y sobre todo SOBRE SISTEMA NERVIOSO.

LO QUE EL HIERRO ES PARA LA SANGRE, zinc ES PARA EL SISTEMA NERVIOSO.

2) PROFUNDA DEPRESIÓN NERVIOSA : Actúa de manera predominante sobre sistema nervioso y su influencia determina GRAN DEPRESIÓN : LA DEBILIDAD NERVIOSA domina toda su patogenesia y de ella fluyen sus grandes características.

Así como zincum AUMENTA EL PODER QUE TIENE EL SISTEMA NERVIOSO DE PRODUCIR LA ENERGÍA NECESARIA A LAS BUENAS FUNCIONES DEL ORGANISMO EN SALUD, es también inestimable CUANDO EL ENFERMO ESTA MUY DÉBIL, NERVIOSAMENTE, PARA DESARROLLAR UNA ENFERMEDAD, por lo que sufre de todas las consecuencias de una afección que ha gastado su fuerza sobre los órganos, PUES LAS POTENCIAS REACCIONALES DEL ORGANISMO ESTÁN MUY DEBILITADAS, NERVIOSAMENTE, PARA PODER EVOLUCIONAR NORMALMENTE SU SINTOMATÓLOGIA, y en consecuencia la eliminación de productos mórbidos por ej., si una escarlatina u otra fiebre exantemática presenta erupción que desarrolla mal, que no puede salir, por gran debilidad del paciente, como lo prueban la depresión del pulso, temperatura etc., zinc. es útil.

Hay otros remedios para trastornos semejantes : cupr. : pero aquí la erupción ha sido suprimida por causa externa; en zinc. la erupción no ha salido bien o se ha suprimido por falta de vitalidad reaccional.

Sulph. puede ser comparado, pero en él es la psora la que está en juego paramolestar la evolución normal de la erupción (Nash).

Cuando el estado del niño se agrava en sarampión o escarlatina, cae en estupor; la erupción no sale; hay tendencia a convulsiones, contracciones, espasmos de extremidades; la orina es escasa o suprimida; mueve la cabeza de un lado a otro y de estupor cae en profunda inconsciencia; parece incapaz de llevar su erupción a la piel (Kent).

Otro ejemplo de no reacción por debilidad nerviosa, se encuentra en el cuadro siguiente : DOLOR DE OVARIOS, EN UNA MUJER CON REGLAS ANORMALES, Y QUE ES ALIVIADA CUANDO EL FLUJO MENSTRUAL APARECE. (Lach.).

Todas las funciones son lentas : erupciones que aparecen muy lentamente, difícilmente, tardíamente.

Toda la economía parece fatigada y débil, como se ve en niñas en la pubertad y en las que las reglas deberían aparecer y vienen; declinan, tienen manifestaciones coreicas, espasmo, temblores, dolores de riñones y nuca, ardores a lo largo de columna vertebral, manifestaciones hietéricas en todas partes y de todas clases; sensibles al menor ruido, a la voz de alguien que habla en la pieza, a un simple roce de papel, hablar o escuchar las hace infelices.

NIÑOS DÉBILES, NIÑAS DÉBILES, ESPÍRITU DÉBIL, MEMORIA MEDIOCRE, TENDENCIA A SER DÓCIL PERO ES IRASCIBLE CUANDO ESTA EXCITADA (Kent).

3) SENSACIÓN DE INQUIETUD VIOLENTA E INCESANTE EN PIES O MIEMBROS INFERIORES QUE DEBE MOVER SIN CESAR : Este síntoma, RELACIONADO CON DEBILIDAD GENERAL, se presenta en casi todas las afecciones en que es útil.

Su gran agitación nerviosa es manifiesta en los pies.

Se la ve en un niño o adulto que tiene un pie sin cesar en movimiento, no puede tenerlo tranquilo.

Muchos remedios tienen esta agitación nerviosa en pies aliviada por movimiento, pero como zinc. ninguno.

Una niña de 12 años no tiene síntomas netos y no encontramos el remedio; su madre dice que mueve constantemente los pies cuando está en la iglesia u otros lugares; preguntamos a la niña por qué hace eso y responde que si se queda tranquila, pierde orina : zinc. la curará (Kent).

Inquietud y MOLESTIA GENERAL, NO PUEDE QUEDARSE TRANQUILA Y

CAMBIAR CONSTANTEMENTE DE POSICIÓN, NO COMO rhus tox., PORQUE EL MOVIMIENTO ALIVIA SU DOLOR, SINO SIMPLEMENTE PORQUE ESTA NERVIOSO : phosph. (Nash).

Para estos movimientos constantes de pies, recordar a agaric. : mueve constantemente las piernas para aliviar dolores con tirones que tiene en músculos de piernas y tibias esté sentado o parado; asa foet. : cura la agitación, como ammom. carb. : ars. alb. : casos obstinados de corea, y caracterizado por este hecho; malestar en piernas; obligado a cambiar la posición de pies todo el tiempo o a caminar para aliviarse.

Caust. : movimientos convulsivos de piernas, de noche durante el sueño.

Lach. : debe mover constantemente los pies para evitar hormigueos y tirones en las piernas que determinan sensación de malestar general.

Mephit. : cura una clase de malestar en las piernas como si se volvieran insensibles.

Mygale : movimiento constante de piernas cuando está sentado.

Stic. pulm. : sensación como si las piernas flotaran en el aire; puede ser tan viva que se acuesta y empieza a agitar las piernas dando puntapiés en el aire, exclama que se siente a punto de volar; esto recuerda el deseo de saltar de tarent. que puede presentar sensación de inquietud moviediza de piernas que impide a veces dormir (Farrington).

4) TEMBLOR GENERAL POR POSTRACIÓN NERVIOSA GENERAL CARACTERÍSTICA : Pierde control de movimientos, aunque no esté paralizado; la parálisis puede llegar a producirse si no se remedia este estado de cosas.

5) CONTRACCIONES Y SACUDIDAS DE DIFERENTES MÚSCULOS : Ignat. zinc. y agaric. están en primera en espasmos generalizados (Nash).

6) EXCITABILIDAD REACTIVA EXTENSA : Reacción demasiado rápida e intensa a remedios.

Este poder de reacción del organismo frente a una medicación cualquiera, aún perfectamente indicada, es muy violento, como en bell., nux v. y cuprum.

Modalidades

Agravación

a) POR VINO Y ESTIMULANTES : Su debilidad nerviosa es tal que no puede tomar vinos ni estimulantes, aún en pequeña cantidad.

Otros remedios con agravación por vino y estimulantes son : ant. crud., fluor. ac., glonoine, led. pal., etc. pero Nash asigna el primer lugar a zinc.

b) DEL LADO DERECHO.

Su lateralidad sería más bien derecha.

c) ENTRE 17 y 19 hs.

d) Por tacto.

Mejoría

a) POR SECRECIONES, POR APARICIÓN DE ERUPCIÓN; los síntomas del pecho mejoran por expectoración; los de vejiga, por micción, los de la espalda, por emisión; los síntomas generales por reglas.

b) Por reposo.

Síntomas mentales

MENTE DÉBIL Y SUJETO CANSADO Y AGOTADO, MEMORIA DÉBIL, olvidadizo, repite todas las preguntas antes de responder; cuando un individuo hace esto, es para que su mente se dé cuenta de lo que dicen y comprender bien lo que le preguntan antes de contestar.

Un síntoma igual, se encuentra en fiebre tifoidea, cuando el período se prolonga el enfermo no puede entrar en convalecencia; o en niños después de enfermedad de cerebro.

Postración nerviosa; cuando se le habla, queda un momento esperando, con aspecto deprimido, luego su cara se anima y responde.

Frente a un sujeto de zinc. si no se le habla, uno no puede darse cuenta de su debilidad nerviosa; pero si se le hace una pregunta él mira con estupor, luego se anima y dice : Oh! y responde.

Zinc. NO ESTA INDICADO, CUANDO HAY DEBILIDAD MENTAL CRÓNICA, por ej. : niño en estado crónico vecino a la idiosia; es el caso de bar. carb.

Cuando se le dirige la palabra zinc. parece despertar de un estado de semidormido y mira un rato fijamente antes de responder (Kent).

EXCESIVA VARIABILIDAD DE HUMOR; ALTERNANCIA DE ALEGRÍA Y TRISTEZA, DESESPERACIÓN Y CALMA, CÓLERA Y TIMIDEZ.

HIPOCONDRIA CON PEREZA Y ASCO POR TODA OCUPACIÓN.

DEPRESIÓN DE TODAS LAS FACULTADES INTELECTUALES; PERDIDA DE MEMORIA; AVERSIÓN AL TRABAJO; POR LA PALABRA, MUY SENSIBLE AL RUIDO; MELANCOLÍA.

Estupor; el menor ruido hace estremecer o despierta.

Pronto pasa este estado, se pone menos excitable y finalmente cae en estado de inconsciencia, estupor del que no se lo puede sacar.

A veces se verán casos de trastornos cerebrales fuertemente establecidos, que demandan paciencia.

Por ej. : el enfermo se hunde gradualmente, lentamente en la indiferencia; durante el día, rota la cabeza sobre la almohada, mirada apagada, cuerpo enflaquecido, cara marchita y parece cada día más vieja, lengua seca y apergaminada, endurecida como cuero, casi como los labios, pierde orina y materia fecal en su cama.

Puede haber parálisis de manos y pies o le parece que el sistema muscular está paralizado.

El dolor hace gritar, pero no con gritos tan agudos y penetrantes como apis; una dosis de zinc. volverá a veces a este enfermo a la vida.

Después de algunos días de haberlo tomado, tendrá sacudidas y temblores en las partes que estaban sin movimiento y la acción del remedio se manifestará por transpiración copiosa; podrá tener muchos vómitos : esta acción secundaria podría inquietar y ser tomada como agravación, pero no es así : es en realidad comienzo de reacción.

Durante días y noches, mientras va tomando consciencia, el retorno a la sensibilidad de partes enfermas, va acompañado por HORMIGUEO DESAGRADABLE, SENSACIÓN DE PINCHAZOS, los parientes querían que se le dé algo para hacerlo desaparecer pero si se cede y se da algún otro remedio, se puede ver al sujeto retornar al estado en que se encontraba pues todos los síntomas sólo eran manifestación del retorno a la salud.

En estos casos dejar actuar al remedio, una semana o dos, después de las cuales, se pueden mostrar síntomas reales de retorno hacia atrás : dar entonces solamente una nueva dosis de zinc. que será seguida de transpiración, vómitos, etc.

Se verá esto en meningitis cerebro-espinal; el primer período, será de congestión y bell. deberá paliarlo; pero cuando aparezcan los síntomas enumerados más arriba, zinc. es el único que curará.

Está indicado bell. cuando hay cara roja, cabeza caliente y que la rota sobre la almohada, ojos brillantes, y las carótidas laten; bryon. : cara púrpura, somnoliento, estúpido y mejora por reposo; helleb. tiene poca fiebre,

extremidades frías, pupilas dilatadas, está inconsciente y sale difícilmente del estado de somnolencia y mueve la cabeza de un lado a otro; pero cuando los reflejos son abolidos, zinc. es el indicado.

Al fin de escarlatina o meningitis mal cuidada o meningitis tuberculosa, después del alivio traído por gels., bell. o bryon., es conveniente dar zinc.; jóvenes ceñudos, enflaquecidos, inconscientes, que quedan en este estado durante semanas.

Es necesario prevenir a la madre de todo lo que pasará cuando su hijo entre en convalecencia (Kent).

Sueño

Somnolencia y bostezos durante el día.

De noche, sueños muy agitados con sacudidas en todo el cuerpo y despertares frecuentes con sobresaltos.

Sueños terroríficos, pesadillas, sonambulismo.

Cabeza

Caída de cabello con sensibilidad de cuero cabelludo.

Hemicrania después de comer; dolor occipital con presión de vértex.

Cefalalgia, sensación de presión dolorosa en la frente, después de beber LA MENOR CANTIDAD DE VINO.

Fatiga cerebral; DOLOR DE CABEZA EN NIÑOS RECARGADOS EN LA ESCUELA.

No tiene dolores de cabeza muy característicos, en general están LIGADOS A MARCHA ANORMAL DE ERUPCIÓN EXANTEMATOSA QUE SALE MAL.

Ya provengan los desórdenes cerebrales de supresión torpe de erupción, de ladentición o fiebre tifoidea, si sus características están presentes, hay que dar zinc. (Nash).

Vértigo, COMO PRODUCIDO POR EMBRIAGUEZ, CON TENDENCIA A CAER HACIA LA IZQUIERDA,

bell. : vértigos al caminar con tendencia a caer a la izquierda o hacia atrás y latidos en la cabeza; dros. : vértigos al caminar al aire libre, con tendencia a caer hacia la izquierda; iod. : vértigos al agacharse o en pieza caliente, con tendencia a caer hacia la izquierda.

Salic. ac. : vértigos con tendencia a caer a la izquierda; mientras los objetos cercanos parecen caer a la derecha; conium; aur.; silic.; stram.

Ojos

ESPESAMIENTO PARTICULAR Y OPACIDAD DE CONJUNTIVA que está infiltrada, como cuero; manchas amarillas y ángulos gruesos en PTERYGION; Dunham ha hecho curas notables de pterygion y expone los casos en "síntomas guías", así : pterygion de ojo derecho que avanza en la córnea; en ojo izquierdo, se extiende sobre córnea a partir del canto interno; comezón y dolor ardiente de ángulo interno de ojos con oscuridad de vista, mucho ardor en ojos y párpados, mañana y tarde, son sensación de sequedad y presión.

Zinc. ha curado casos de ESPESAMIENTO GRAVE DE PÁRPADOS, ECTROPION Y

ENDOPION; ESPESAMIENTO GRANULOSO DE PÁRPADOS; en un caso grave de ectropion en que las pestañas atacaban en todos sentidos el globo ocular, con lagrimeo, gran inflamación y enrojecimiento, zinc. hizo desaparecer todo.

VIOLENTA FOTOFobia, sensación como si la luz cegara.

Zinc. y euph. están muy unidos en síntomas de ojos (Kent).

Inflamación crónica de glándulas de Meibomius.

Conjuntivas rojas sobre todo ángulo interno.

Sensación como si los ojos estuvieran hundidos en la cabeza.

ESTRABISMO DESPUÉS DE TRASTORNOS CEREBRALES; después de fiebre tifoidea (Kent).

Oídos

Zumbidos y ruidos.

Sordera.

Dolores desgarrantes y profundos de oído, sobre todo derecho.

Secreción purulenta y fétida.

Cara

Tez pálida, terrosa, caquética, con alternancias de enrojecimiento pasajero.

Excoriaciones en comisuras de labios que están secos de hinchados.

Erupción pruriginosa de mentón.

Dolores neurálgicos con sensación de desgarramiento y constricción de músculos de cara.

Aparato digestivo

BOCA :

Encías hinchadas y ulceradas, sangran, fácilmente al menor contacto.

Aftas en parte interna de mejillas y lengua: inflamación de velo de paladar.

Lengua cargada, blanco amarillenta.

SALIVACIÓN ABUNDANTE CON GUSTO METÁLICO (cupr. met., merc., nit. ac., también tienen gusto metálico).

ESTOMAGO :

Anorexia alternada con hambre canina.

HAMBRE A LAS 11; gran avidez, come muy rápido.

Sed inextinguible; pero NO PUEDE SOPORTAR LA MENOR CANTIDAD DE VINO, leda dolor de cabeza o estómago.

Los principales remedios que tienen asco al vino o no lo pueden soportar son :ant. crud., glonoin., fluor. ac., ignat., ledum., mancin., rhus tox., sabad., veg., puls., sepiá); por confituras y dulces (ars. alb., graph., sin. nig.) pirosis por haberlos comido (caust.); alimentos cocidos y calientes, pescado.

Debilidad de digestión.

Náuseas, eructos agrios después de comer, sobre todo de tomar leche.

Pirosis después de comer dulces.

Sensación de presión con ardor en hueco de estómago.

Hipos muy violentos.

ABDOMEN Y DEPOSICIONES :

Intestinos perezosos.

Abultamiento abdominal con sensación de plenitud y presión.

Cólicos flatulentos con emisión abundante de gases fétidos.

Aumento de volumen del hígado que está doloroso.

Puntadas en el bazo.

El recto se estrecha; sensación de excoiación y prurito violento en el ano.

Constipación con deposición duras, secas, insuficientes.

Diarrea con tenesmo.

Cólera infantil.

Aparato urinario

MICCIÓN DIFÍCIL; parálisis de vejiga con constipación rebelde, asociada a síntomas espinales; orina lentamente al principio, A MENUDO LA ORINA SOLO PUEDE PASAR CUANDO ESTA SENTADO Y en algunos casos, solamente ESTANDO SENTADO Y LA ESPALDA FUERTEMENTE APOYADA CONTRA EL RESPALDO DEL ASIENTO (Kent).

Micciones frecuentes de noche.

Emisión involuntaria de orina al caminar, sonarse, toser.

(Caust.), orina sanguinolenta.

Sensación de presión en vejiga.

Dolores incisivos en orificio de uretra.

Dolores desgarrantes con puntadas en región renal.

Órganos genitales

MASCULINOS :

Excitación de apetito venéreo con eyaculaciones muy rápidas.

Testículos hinchados, retraídos, dolorosos.

FEMENINOS :

Prurito vulvar con gran excitación sexual de noche.

Ninfomanía.

Dolor de OVARIO IZQUIERDO que mejora durante reglas.

Reglas IRREGULARES Y EN GENERAL MAS ABUNDANTES DE NOCHE.

(Magn., carb., bovista, coca, ammon. mur.); antes de reglas, excitación histérica, irascibilidad, dolor de útero, ovarios y en cuanto APARECEN REGLAS, SE ALIVIA; al contrario de lo que se ve en cimic. que tiene gran excitación neuro-histérica durante reglas y cuanto más abundante es el flujo, más violenta es la agravación.

Lach. como zinc., es peor antes y mejor durante y después de reglas; pero los dolores vuelven si disminuyen.

Cimicif. : a veces reglas intermitentes, el dolor cesa a cada interrupción para volver en cuanto la sangre reaparece.

LEUCORREA de mucus espeso, a veces precedida de dolor en el abdomen.

Aparato respiratorio

TOS CON INCONTINENCIA DE ORINA al levantarse, caminar, estomudar, sonarse; CON EXTREMA FATIGA NERVIOSA Y AGITACIÓN CONSTANTE DE PIES Y AGRAVACIÓN GENERAL POR LA MENOR CANTIDAD DE VINO, a veces TEMBLORES GENERALES; por esta TOS con micción involuntaria, se puede comparar con caust., natr. mur., puls.

y scilla.

Asma catarral con SENSACIÓN DE GRAN CONSTRICCIÓN DE PECHO (kadm. sulf., kali chlor., cact. grand.), con gran dificultad para expectorar, EN CUANTO ESCUPE, SE ALIVIA.

Disnea mejorada en cuanto expectora.

Aparato circulatorio

Tiene algunos síntomas notables de corazón.

SENSACIÓN DE CONSTRICCIÓN DE TODO EL PECHO EN SUJETOS DÉBILES (Kent).

Palpitaciones de corazón con puntadas y ansiedad.

Irregularidad de latidos.

Pulso rápido, vibratorio.

Venas varicosas particularmente en miembros inferiores.

Espalda y extremidades

Rigidez y dolor de músculos de cuello; dolor y sensación de lasitud en la nuca como si el cuello hubiera estado mucho tiempo en una misma posición; agravación al escribir y por cualquier movimiento.

SENSACIÓN DE ARDOR A TODO LO LARGO DE COLUMNA VERTEBRAL, es una sensación puramente subjetiva, pues no hay ninguna elevación local de temperatura (Nash). (alumina, ars. alb.).

NO PUEDE SOPORTAR QUE LE TOQUEN LA ESPALDA, LA MENOR PRESIÓN EN LA ESPALDA; se puede comparar con agaric. : una presión en la espalda determina risa involuntaria, con sacudidas espasmódicas de músculos de la cabeza, corea; chin. sulph. : gran sensibilidad de vértebras dorsales, a la presión, particularmente estando acostado durante el escalofrío de la fiebre.

Nat. mur. : espina dorsal muy sensible al tacto, pero la presión fuerte atenúa esta sensibilidad; tar. hisp. : el menor tacto a lo largo de columna, determina dolor espasmódico de tórax, en región del corazón; therid. : gran sensibilidad entre discos vertebrales : se sienta de costado para evitar presión de estos discos, unos sobre otros, caries óseas.

DOLORES DE ÚLTIMA VÉRTEBRA DORSAL O PRIMERA LUMBAR, PEOR SENTÁNDOSE; DOLORES DE ESPALDA EN REGIÓN LUMBAR SACRA MEJOR AL CAMINAR Y PEOR AL LEVANTARSE DEL ASIENTO, rhus tox. : dolor en región sacra y mejora caminando o sentándose, con él calc., phosph., sulph. y sepia, tienen este dolor lumbar en algo grado; zinc. ocupa un grado más bajo en la agravación al levantarse del asiento, como petrol., ledum (Kent).

Puls. : tiene también este síntoma, pero generalmente en relación con reglas irregulares; zinc. no tiene sensación de dolorimiento general aliviado por movimiento como rhus tox.; el que más se parece en esto a zinc., es cobalto, pero el dolor lumbar es consecuencia de numerosos excesos sexuales o debilidad; en zinc. si bien está relacionado con gran debilidad, una emisión aliviará temporariamente el dolor, lo que no pasará en cobalto (Nash).

Tensión y pinchazos entre hombros (phosph., lycop., sulph.), tienen sensación de ardor entre hombros.

DEBILIDAD, TEMBLORES Y ESPASMOS de grupos musculares varios, COREA (agaric., ars. alb., cimic., crocus, cupr., ignat., mygale, stram., tarent., ver. vir., zizia).

PIES Y PIERNAS SIN CESAR EN MOVIMIENTO; NO SE PUEDE QUEDAR TRANQUILO.

Miembros paralizados; pereza, enseguida parálisis, uní o bilateral; sacudidas, temblores y postración, choques, sacudidas musculares durmiendo.

Planta de pies muy sensible.

Dolorimiento de planta de pies, con dolores cortantes y dolorimiento de talones cuando camina; dolores fulgurantes, pinchazos, penetrantes, desgarrantes, tabes dorsal (Kent).

Piel

Prurito general al atardecer y la noche, en la cama.

Sensación de insectos que corren por la piel.

Eczema húmedo, rezumante; rasgaduras.

Tendencia a cronicidad de la erupciones.

Enrojecimiento de piel que escuece como por sabañones dolorosos.

Relaciones

Antídotos

Ignat., hep. sulf. calc.; camphora.

Incompatibles

Nux vom., chamom.